



Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Familia Haemulidae - roncadores
Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 2, junio, 2005
Universidad de Costa Rica
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032048>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Familia Haemulidae - roncadores

HAEMULIDAE 1

Haemulon flaviguttatum, roncador amarillo - Cada escama con una mancha celeste; mancha caudal difusa y aletas amarillas en juveniles; boca pequeña, maxilar no llega a la mitad del ojo. (UCR665-1, 22cm CC).

Haemulon maculicauda, roncador rayado - Rayas alternas perla brillante y pardo oscuro a lo largo del cuerpo; mancha pardo difusa en la base de la aleta caudal. (UCR 295-35, 20 cm CC).

Haemulon scudderi, roncador pecoso - Manchas negras formando un patrón reticular en el cuerpo; aletas dorsal y anal negras; sin mancha caudal. (UCR 1523-1, 23 cm CC).

Haemulon sexfasciatum, roncador almejero - Seis barras anchas pardas o gris oscuro sobre el lomo y los costados superiores. (UCR 628-8, 13 cm CC).

Haemulon steindachneri, roncador frijol - Rayas alternas perla brillante y pardo oscuro, oblicuas arriba y horizontales en los costados; mancha pardo oscuro definida en la base de la aleta caudal; boca grande, maxilar casi llega al borde posterior del ojo. (UCR 632-1, 22 cm CC).

Haemulon flaviguttatum, spotted yellow grunt - Each scale with a pale blue spot; diffuse caudal blotch and yellow fins in juveniles; mouth small, maxillary not reaching to mid-eye.

Haemulon maculicauda, spottail grunt - Alternating pearl and brown stripes along body; diffuse brown blotch on caudal fin base.


Haemulon scudderi, mojarra grunt - Black spots forming reticular pattern on body; no caudal blotch.

Haemulon sexfasciatum, graybar grunt - Six wide brown or gray bars on dorsum and upper flanks.


Haemulon steindachneri, Latin grunt - Pearly oblique stripes above lateral line, horizontal below, on dark brown background; distinct dark brown blotch on base of caudal fin; mouth large, maxillary nearly reaches posterior border of eye.

Apuntes/Notes:


HAEMULIDAE 1




*Haemulon
flaviguttatum*




Haemulon maculicauda



*Haemulon
scudleri*



Haemulon sexfasciatum



*Haemulon
steindachneri*

HAEMULIDAE 2

Anisotremus caesius, frijol - Cuerpo y aletas amarillento plateado, una barra difusa debajo del origen de la aleta dorsal; aletas medianas oscuras; aletas pectorales largas, llegan al origen de la aleta anal. (UCR 651-1, 18 cm CC, IC).

Anisotremus interruptus, vieja nata - Cuerpo con brillo dorado, muchas escamas con una mancha negra; aletas medias oscuras; aletas pectorales largas, casi llegan al origen de la aleta anal. (UCR 632-2, 20 cm **CC**, **IC**).

Anisotremus scapularis, burro chita - Cola truncada o ligeramente recortada; primeros radios de las aletas dorsal y anal más largos que los posteriores. Cuerpo gris oscuro a parduzco en el dorso, blanco abajo. (LACM 43919-2, 12 cm). Presencia en Costa Rica no confirmado.

Anisotremus taeniatus, bandera - Cuerpo y aletas amarillos, rayas celestes a lo largo del cuerpo y dos barras negras: una en la cabeza y otra adelante en la parte anterior del cuerpo. (UCR 295-42, 13 cm **CC**, **IC**).

Anisotremus caesius, longfin grunt - Body and fins with yellowish-silver tint, a diffuse dark bar below dorsal fin origin; median fins dusky; pectoral fins long, reaching to anal fin origin.


Anisotremus interruptus, burrito grunt - Body with golden sheen, many scales with a black spot; median fins dusky; pectoral fins long, nearly reaching anal fin origin.

Anisotremus scapularis, Peruvian grunt - Caudal fin truncate or slightly emarginate; anterior rays of dorsal and anal fins longer than posterior rays. Body dark charcoal gray to brownish above, white below. Unconfirmed at Cocos.


Anisotremus taeniatus, Panamic porkfish - Body and fins yellow, with blue lines along flanks; 2 vertical black bars behind head.

Apuntes/Notes:


HAEMULIDAE 2




*Anisotremus
caesius*



Anisotremus interruptus



*Anisotremus
scapularis*



Anisotremus taeniatus