



Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Familia Labrisomidae - trambollos
Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 2, junio, 2005
Universidad de Costa Rica
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032063>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Familia Labrisomidae – trambollos

LABRISOMIDAE 1

Malacoctenus afuerae, trambollo puntiado – Cabeza y vientre cubiertos con puntitos; con frecuencia una mancha negra detrás del ojo; una banda mediolateral discontinua posteriormente; parches oscuros pequeños a lo largo de la base de la aleta dorsal y a lo largo de la parte inferior de los costados. (UCR 651-4, 5 cm CC).

Malacoctenus costaricanus, trambollo costaricense – Extremo del morro pronunciado. Cinco barras anchas en los costados, más oscuras en la línea media. Puntos pequeños que cubren la cabeza y el cuerpo en las hembras; barras difusas. Parte inferior de la cabeza de los machos con líneas curvas negras, barras en el cuerpo más distintivas. (UCR 119-8, 4 cm M+; 129-2, 5 cm F+ CC).

Malacoctenus ebisui, trambollo dorado – Cinco barras anchas color parado en los costado. Machos en celo con 3 barras negras en la partes posterior del cuerpo, mitad anterior pardo-rojisa arriba, amarilla abajo. Hembras pardo- verdusco arriba, blanco abajo. (UCR 1673-26, 4 cm M+; 4 cm F+ CC).

Malacoctenus margaritae, trambollo margarita – Hembras con cinco ó 6 barras difusas, oscurecidas por puntuaciones irregulares de color pardo en la cabeza y el cuerpo, machos con barras verticales distintivas, las 3 posteriores más evidentes. (UCR 840-19, 4 cm M+; 4 cm F+ CC).

Malacoctenus zonifer, trambollo de pozo – Aletas mediales con puntos. Cinco barras oscuras difusas, cabeza y cuerpo cubierto con manchas grises irregulares. (UCR 140-6, 6 cm CC).

Malacoctenus afuerae, spotbelly blenny – Head and belly covered with fine dots; often a black blotch behind eye; a brown midlateral band is discontinuous posteriorly; small dark patches along base of dorsal fin and along lower half of sides.

Malacoctenus costaricanus, Costa Rican blenny – Tip of snout pronounced. Five broad bars on sides, darkest mid-laterally. Small dots covering head and body of females, bars diffuse. Head of males with curved black lines on lower head, bars more distinct.


Malacoctenus ebisui, fishgod blenny – Five broad brown bars on sides. Nuptial males with 3 black bars on posterior body, anterior half of body reddish brown above, yellow below. Females greenish brown above, white below.

Malacoctenus margaritae, margarita blenny – Five or 6 bar pattern of females diffuse, obscured by irregular brown speckling over head and body; males with distinct crossbars, posterior 3 most distinct.


Malacoctenus zonifer, glossy blenny – Median fins spotted. Five dusky bars diffuse, head and body covered with irregular gray markings.

Apuntes/Notes:

LABRISOMIDAE 1



*Malacoctenus
fueae*




Hembras arriba,
machos abajo



*Malacoctenus
costaricanus*



*Malacoctenus
ebisui*



Malacoctenus margaritae



Malacoctenus zonifer

LABRISOMIDAE 2

Labrisomus multiporosus, trambollo curiche – Una mancha negra entre la 1era. y la 3era. espinas dorsales. Líneas curvas negras irradiando desde el ojo, una se extiende hasta la base de la aleta pectoral, otra a través de los radios pectorales. Cabeza y cuerpo cubiertos con manchas moteadas color pardo. (UCR 128-19, 7 cm CC).

Dialommus macrocephalus, chalaco listo – Ojo con córnea poliédrica y sobresale del perfil dorsal. (UCR 312-13, 10 cm CC).

Paraclinus beebei, trambollo rojo - Color rojo uniforme, ocasionalmente con barras oscuras en la parte posterior. Una mancha negra redonda en la aleta dorsal suave. (UCR 851-21, 3 cm **CC**).

Paraclinus magdalenae, trambollo de Baja - Seis manchas negras en la aleta anal, un ocelo en la aleta dorsal suave. Manchas oscuras formando 7 barras irregulares en los costados. (UCR 664-4, 3 cm **CC**).

Paraclinus mexicanus, trambollo llorón – Una barra abajo del ojo y manchas negras en la parte inferior de la cabeza; un ocelo grande en la aleta dorsal suave. (UCR 1157-30, 5 cm **CC, IC**).

Starksia fulva, trambollito amarillo – Color pardo; manchas negras a lo largo de las bases de las aletas dorsal y anal; 2 manchas oscuras en la base de cada aleta pectoral. (UCR 1573-37, 3 cm **CC**).

Starksia posthon, trabollito moteado – Color canela; una mancha oscura en las primeras espinas dorsales; 2 ó 3 filas de manchas pardas a lo largo de los costados. (UCR 688-2, 4 cm **CC**).

Labrisomus multiporosus, porehead blenny – A black spot between 1 st and 3 rd dorsal spines. Curved black lines radiating from eye, one extending onto pectoral fin base, another across pectoral rays. Head and body covered with brown mottling.

Dialommus macrocephalus, foureye rockskipper – Eye multifaceted and above head profile, snout concave. Body uniform brown or mottled.

Paraclinus beebei, red blenny - Color uniform red, occasionally with dark bars posteriorly. A round black spot on soft dorsal fin.

Paraclinus magdalenae, Baja blenny - Six black spots on anal fin, an ocellus on soft dorsal fin. Dusky blotches forming 7 irregular bars along flanks.


Paraclinus mexicanus, Mexican blenny – A black bar below eye and small black dots on lower head; a large ocellus on soft dorsal fin. Head and body dark gray with 5 or 6 dusky bars.

Starksia fulva, yellow blenny – Color brown; black spots along bases of dorsal and anal fins; 2 dark spots on base of each pectoral fin.


Starksia posthon, brown-spotted blenny – Color tan; a dark spot on first dorsal spines; 2 or 3 rows of brown blotches along flanks.

Apuntes/Notes:


LABRISOMIDAE 2




Labrisomus multiporosus




Dialommus macrocephalus




Paraclinus beebel




Paraclinus magdalena



Paraclinus mexicanus



Starksia fulva



Starksia posthon