



Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Familia Gobiesocidae - chalacos, chupapiedras  
Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 2, junio, 2005  
Universidad de Costa Rica  
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032065>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## **Familia Gobiesocidae – chalacos, chupapiedras**

### GOBIESOCIDAE 1

***Gobiesox adustus***, chalaco panámico. - Cabeza y labio superior festoneado. Cabeza y cuerpo gris, a menudo con 4 barras a cada lado de la cabeza; 4 ó 5 barras oscuras en el dorso; una mancha negra detrás del ojo. Ano más cerca de la punta de la cola que la punta del hocico. (UCR 1673.45, 4 cm **CC**).

***Gobiesox daedaleus brachysoma***, chalaco punteado – Cabeza y cuerpo gris oscuro con 6 ó 7 barras oblicuas en los costados; una mancha negra distintiva en la aleta dorsal. (UCR 169-3, 6 cm **CC**).

***Gobiesox fulvus***, chalaco de quebrada – Una especie de tamaño grande restringida a quebradas de aguas dulces en Isla del Coco. Una mancha negra en la aleta dorsal (UCR 7-11, 9 cm **EIC**).

***Gobiesox papillifer microspilus***, chalaco barbudo – Con numerosas papilas en la cabeza. Cabeza cubierta con puntos oscuros; aletas mediales con franjas curvas negras. (UCR 128-9, 4 cm **CC**).

***Gobiesox woodsi***, chalaco de Coco – Cabeza y labio superior festoneado. Cabeza y cuerpo gris, 4 ó 5 barras oscuras en el dorso; una mancha negra detrás del ojo. Ano casi en medio entre la punta del hocico y extremo de la cola. (UCR 1157-8, 4 cm **EIC**).

***Arcos rhodospilus***, chalaco roquero – Color canela o pardo-rojizo con puntos blancos. (UCR 978-19, 3 cm **CC, IC**).

***Arcos decoris***, chalaco elegante – Color canela con puntos azules en la cabeza y el dorso. (UCR 423-55, 3 cm **CC**).

---

***Gobiesox adustus***, Panamic clingfish – Head and upper lip crenulate. Head and body gray, often with 4 white bars on each side of head; 4 dark bars on back; a black spot behind eye. Anus closer to tip of tail than snout tip.

***Gobiesox daedaleus brachysoma***, dotted clingfish – Head and body dark gray with 6 or 7 oblique bars on flanks; a distinct black spot on dorsal fin.

***Gobiesox fulvus***, Cocos stream clingfish – A large species restricted to fresh water streams on Isla del Coco. A black spot on dorsal fin.

***Gobiesox papillifer microspilus***, bearded clingfish – Numerous papillae around head. Head covered with dusky dots; median fins with curved black stripes.


***Gobiesox woodsi***, Cocos reef clingfish – Head and upper lip crenulate. Head and body gray, 4 or 5 dark bars on back; a black spot behind eye. Anus nearly midway between snout and tip of tail.

***Arcos rhodospilus***, rock clingfish – Tan or reddish brown with white dots.

***Arcos decoris***, elegant clingfish – Tan with pale blue spots on head and dorsum.

**Apuntes/Notes:**

**GOBIESOCIDAE 1**



**GOBIESOCIDAE 2**

***Tomicodon petersi***, chupapiedra dos manchas – Cinco manchas oscuras irregulares con centros pálidos en el dorso.(UCR 1834-1, 5 cm CC).


***Tomicodon vermiculatus***, chupapiedra vermiculada – Una mancha negra conspicua arriba de cada aleta pectoral. (UCR 1157-9, 3 cm EIC).

---


***Tomicodon petersi***, two-spot clingfish - Five irregular dusky blotches with pale centers along dorsum.

***Tomicodon vermiculatus***, vermiculate clingfish – A conspicuous black spot above each pectoral fin.

**GOBIESOCIDAE 2**



*Tomicodon petersi*



*Tomicodon vermiculatus*