



Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Familia Gobiidae - gobios, bocones
Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 2, junio, 2005
Universidad de Costa Rica
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032068>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Familia Gobiidae – gobios, bocones

GOBIIDAE 1

Lythrypnus cobalus, gobio pícaro – Cabeza y cuerpo anaranjado-rojizo con barras azules bordeadas de negro. Una cresta predorsal baja en la cabeza. (LACM 32271-22, 2 cm **EIC**).

Lythrypnus alphagena, gobio puntiblanco – Con diez barras angostas uniformemente oscuras en el cuerpo; cabeza con barras arriba, manchas pálidas abajo. No se conoce los colores de ejemplares vivos. LACM 44827-1, 4 cm **EIC**).

Lythrypnus lavenbergi, gobio del Coco – Diez barras angosta pálidas con una franja en el centro alternando con barras más anchas; cabeza atravesada por 2 barras oblicuas detrás del ojo y que se extiende por la garganta. No se conoce la coloración en vida. (LACM 32264-7, 2 cm **EIC**).

Lythrypnus rhizophora, gobio ligero – Nueve a 14 barras gris-azules pálidos con una línea medial contrastando con interespacios pardo-naranja oscuros; cabeza con barras arriba con manchas pardas abajo. (UCR 729-7, 2 cm **IC**).

Lythrypnus pulchellus, gobio coquetón – Once a 14 barras con una línea medial alternando con interespacios anchos color naranja, barras de intensidad similar; cabeza con barras arriba, manchas pardo-naranja abajo. (UCR 432-25, 3 cm **CC**).

Lythrypnus cobalus, knave goby – Head and body orange-red with blue dark-edged crossbars. A low predorsal crest on head.

Lythrypnus alphagena, white-spot goby - Ten narrow uniformly dark crossbars on body; head barred above, pale spots below. Live color unknown.


Lythrypnus lavenbergi, Cocos goby – Ten narrow pale crossbars with a dark median stripe alternating with wide dark bars; head crossed by 2 oblique bars behind eye that cross over nape. Live color unknown.

Lythrypnus rhizophora, banded goby – Nine to 14 light blue-gray bars with a dark median line contrasting with dark orange-brown interspaces; head barred above with brown dots below.

Lythrypnus pulchellus, gorgeous goby – Eleven to 14 narrow blue-gray bars with a dark median line alternating with wide orange interspaces, crossbars of equal intensity ; head barred above, orange-brown spots below.

Apuntes/Notes:

GOBIIDAE 1




Lythrypnus cobalis




Lythrypnus alphagena



Lythrypnus lavenbergi



Lythrypnus rhizophora



Lythrypnus pulchellus

GOBIIDAE 2

Elacatinus inornatus, gobio tigre – Cabeza color anaranjado con 3 barras blancas; una 4ta. barra en la base de las aletas pectorales, cuerpo translúcido-amarillo con 5 barras anchas oscuras internamente. (LACM 32493-43, 3 cm **CC**).

Elacatinus nesiotus, gobio bandeado – Cabeza anaranjada con 3 barras blancas; cuerpo con cerca de 10 barras blancas alternando con bandas oscuras superficiales sobrepuestas a 5 barras internas. (LACM 44821-3, 3 cm **EIC**).

Elacatinus janssi, gobio lomopintado – Cabeza y cuerpo blanco o translúcido amarillento; barras oscuras en la cabeza y en la base de la aleta pectoral; dorso con muchos puntos color pardo, una fila de manchas en la línea medio lateral; aletas con bandas oscuras.(UCR 618-23, 3 cm **CC**).

Elacatinus puncticulatus, gobio testaraja – Cabeza y cuerpo blanco translúcido; rayas ojo brillante detrás de los ojos y en el espacio interorbital; cerca de 8 manchas oscuras internamente en la línea medio-lateral .(UCR 618- 10, 3 cm **CC**).

Gobulus crescentalis, gobio creciente – Cabeza bicolor, blanco arriba, pardo oscuro abajo, cuerpo con un patrón de malla oscura arriba, canela abajo.(UCR 693-21, 5 cm **CC**).

Gobulus hancocki, gobio invertido – Tercio superior de la cabeza y del cuerpo color blanco, contrastando fuertemente con pardo oscuro en los dos tercios inferiores.(UCR 1154-22, 3 cm **CC, IC**).

Elacatinus inornatus, inornate goby – Head orange with 3 white bars; a 4 th bar through base of pectoral fins, body yellow-translucent with 5 wide dusky bars internally.

Elacatinus nesiotis, brocken-back cleaner goby – Head orange with 3 white bars; body with about 10 white bars alternating with superficial dusky bars overlaying 5 internal bars.

Elacatinus janssi, spotback goby – Head and body white or yellowish-translucent; dusky bars on head and pectoral fin base; dorsum with many brown spots, a midlateral row of spots; fins with dusky bands.


Elacatinus puncticulatus, redhead goby – Head and body translucent white; brilliant red streaks behind eyes and on interorbital space; about 8 dusky midlateral blotches internally.

Gobulus crescentalis, crescent goby – Head bicolor, white above, dark brown below; body with a pale dusky network above, tan below.

Gobulus hancocki, sandtop goby – Upper one-third of head and body white, contrasting sharply with dark brown lower two-thirds.

Apuntes/Notes:


GOBIIDAE 2




Elacatinus inornatus




Elacatinus nesiotes



Elacatinus janssi



Elacatinus puncticulatus



Gobulus crescentalis



Gobulus hancocki

GOBIIDAE 3

Chriolepis atrimelum, gobio bandera – Cabeza y cuerpo gris pálido, opérculo con una mancha negra conspicua. Macho con 3 espinas dorsales muy alargadas. (LACM 32264-10, 6 cm EIC).

Chriolepis dialepta, gobio estrellas blancas – Cabeza color rosado con manchas blancas en forma de estrella. Dorso con 6 manchas blancas, 6 manchas blancas de forma irregular en la línea media de los costados. Una barra negra en la base de la cola y franja submarginal en la aleta anal. (LACM 44821-4, 4 cm EIC).

Chriolepis cuneata, gobio cuña – Cabeza y cuerpo color blanco; una barra negra debajo de ojo, 2 barras en la nuca, 5 barras angostas en el cuerpo; una banda cóncava en la aleta caudal.(LACM 44828-1, 3 cm CC).

Gymneleotris seminudus, gobio rayado – Cabeza y cuerpo pardo oscuro con numerosas barras blancas.(UCR 201-2, 4 cm CC).

Coryphopterus urospilus, gobio pintado – Cabeza y cuerpo color blanco con filas horizontales de manchas anaranjado-rojas; una mancha negra en la parte inferior de la base de la aleta caudal.(UCR 621-8, 5 cm CC, IC).

Bathygobius ramosus, gobio de pozo – Radios pectorales superiores filamentosos. Color gris oscuro uniforme o con parches irregulares en la cabeza, cuerpo y aletas.(UCR 320-27, 8 cm CC, IC).

Sicydium cocoensis, chupapiedra del Coco – Morro redondeado, boca inferior. Color pardo oscuro, puntos negros en la cabeza y base de la aleta pectoral; algunas veces con puntos submarginales en la aleta dorsal.(UCR 6-1, 7 cm EIC).

Chriolepis atrimelum, cheekspot goby – Head and body pale gray, gill cover with a conspicuous black blotch. Male with 3 greatly elongated dorsal-fin spines.

Chriolepis dialepta, white-starred goby – Head pink with star-shaped white spots. Dorsum with 6 white patches, 6 irregular white blotches on mid flanks. A black bar on tail base and submarginal black streak on anal fin.

Chriolepis cuneata, wedge goby – Head and body white; a black bar below eye, 2 bars on nape, 5 narrow bars along body; a dark crescent on caudal fin.

Gymneleotris seminudus, spiltbanded goby – Head and body dark brown overlaid with numerous white bars.


Coryphopterus urospilus, redlight goby – Head and body white with horizontal rows of red-orange spots; a black spot on lower caudal fin base.

Bathygobius ramosus, Panamic frillfin – Upper pectoral-fin rays filamentous. Color uniform dark gray or with irregular blotches on head, body and fins.

Sicydium cocoensis, Cocos river goby - Snout rounded, mouth inferior. Color dark brown, black dots on head and pectoral fin base; sometimes with submarginal black dots on dorsal fin.

Apuntes/Notes:

GOBIIDAE 3




Chriolepis atrimelum




Chriolepis dialepta



Chriolepis cuneata



Gymneleotris seminudus



Coryphopterus urospilus



Bathygobius ramosus



Sicydium cocoensis