

# CATÁLOGO DE PLANTAS Y LÍQUENES DE COLOMBIA

**VOLUMEN II**

Rodrigo Bernal  
S. Robbert Gradstein  
Marcela Celis

— EDITORES —



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE CIENCIAS

INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES



FUENTE: Shadowfox, [https://es.wikivoyage.org/wiki/Parques\\_nacionales\\_naturales\\_de\\_Colombia#/media/File:Mapa\\_de\\_Colombia\\_\(parques\\_naturales\).svg](https://es.wikivoyage.org/wiki/Parques_nacionales_naturales_de_Colombia#/media/File:Mapa_de_Colombia_(parques_naturales).svg)

1. Cueva de Los Guácharos; 2. Sierra Nevada de Santa Marta; 3. Isla Salamanca; 4. Farallones de Cali; 5. Volcán Puracé; 6. Tayrona; 7. El Tuparro; 8. Sierra de La Macarena; 9. Las Orquídeas; 10. Los Katíos; 11. Los Nevados; 12. Amacayacu; 13. Páramo Las Herosas; 14. Nevado del Huila; 15. Serranía de Los Picachos; 16. Chingaza; 17. Páramo de Sumapaz; 18. Sierra Nevada del Cocuy; 19. Páramo de Pisba; 20. Tamá; 21. Iguaque; 22. Islas Corales

del Rosario y San Bernardo; 23. Ciénaga Grande de Santa Marta; 24. Sanquianga; 25. Sierra Macuira; 26. Nudo de Paramillo; 27. Munchique; 28. Los Colorados; 29. Isla de La Corota; 30. Los Flamencos; 31. Isla Gorgona; 32. La Paya; 33. Volcán Galeras; 34. Cahuinarí; 35. Ensenada de Utría; 36. Tatamá; 37. Los Estoraques; 38. Sierra de Chiribiquete; 39. Nukak; 40. Puinawai; 41. Tinigua; 42. Catatumbo Barí; 43. Guanentá Alto Río Fonce; 44. Old Providence Mc Bean

Lagoon; 45. Isla Malpelo; 46. Otún Quimbaya; 47. Río Puré; 48. Alto Fragua Indi Wasi; 49. El Corchal Mono Hernández; 50. Selva de Florencia; 51. Serranía de Los Yarigües; 52. Volcanes Doña Juana Cascabel; 53. Serranía de Los Churumbelos Auka Wasi; 54. Plantas Medicinales Río Orito Ingi Andé; 55. Yaigogé Apaporis; 56. Uramba Bahía Málaga; 57. Acandí, Playón y Playona; 58. Corales de Profundidad.

CATÁLOGO DE  
**PLANTAS Y**  
**LÍQUENES**  
DE COLOMBIA

**V O L U M E N   I I**



## GRANDES BIOMAS Y BIOMAS CONTINENTALES DE COLOMBIA

### Gran bioma del desierto tropical

- 1 Zonobioma del desierto tropical de La Guajira y Santa Marta
- 2 Helobioma de La Guajira

### Gran bioma del bosque seco tropical

- 3 Zonobioma seco tropical del Caribe
- 4 Halobioma del Caribe
- 5 Zonobioma alterno higrico o subserofitico tropical del Alto Magdalena
- 6 Zonobioma alterno higrico o subserofitico tropical del Valle del Cauca
- 7 Helobioma del Valle del Cauca

### Gran bioma del bosque húmedo tropical

- 8 Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y la Orinoquia
- 9 Helobioma de la Amazonia y la Orinoquia
- 10 Peinobioma de la Amazonia y la Orinoquia
- 11 Litobioma de la Amazonia y la Orinoquia
- 12 Zonobioma húmedo tropical del Pacifico y el Atrato
- 13 Helobioma del Pacifico y el Atrato

- 14 Halobioma del Pacifico
- 15 Zonobioma húmedo tropical del Magdalena y el Caribe
- 16 Helobioma del Magdalena y el Caribe
- 17 Zonobioma húmedo tropical del Catatumbo
- 18 Helobioma del río Zulia
- 19 Orobioma bajo de los Andes
- 20 Orobioma medio de los Andes
- 21 Orobioma alto de los Andes
- 22 Orobiomaazonal de Cúcuta
- 23 Orobiomaazonal del río Dagua

- 24 Orobiomaazonal del río Sogamoso
- 25 Orobiomaazonal del valle del Patía
- 26 Helobiomas andinos
- 27 Orobioma de San Lucas
- 28 Orobioma de La Macarena
- 29 Orobioma del Baudó y el Darién
- 30 Orobioma bajo de la Sierra Nevada de Santa Marta y Macuira
- 31 Orobioma medio de la Sierra Nevada de Santa Marta
- 32 Orobioma alto de la Sierra Nevada de Santa Marta

### Bioma insular

- 33 Bioma insular del Pacifico
- 34 Bioma insular del Caribe



© Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012

ESCALA 1:7.500.000



Fuente: IDEAM, IGAC, IAVH, Invenmar, I. Sinchi e IIAF, 2007. Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia.

CATÁLOGO DE  
**PLANTAS Y  
LÍQUENES**  
DE COLOMBIA

**VOLUMEN II**

MAGNOLIACEAE A ZYGOPHYLLACEAE -  
ESPECIES INTRODUCIDAS Y CULTIVADAS

RODRIGO BERNAL

S. ROBERT GRADSTEIN

MARCELA CELIS

— EDITORES —



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE CIENCIAS

**INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES**

© Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá  
Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales  
© Editorial Universidad Nacional de Colombia  
© Rodrigo Bernal González, editor  
Stephan Robbert Gradstein, editor  
Marcela Celis Pacheco, editora

**PRIMERA EDICIÓN, 2016**

ISBN 978-958-775-726-2 (de la obra completa-papel)  
ISBN 978-958-775-720-0 (de la obra completa-digital)  
ISBN 978-958-775-723-1 (de la obra completa-IBD)

**VOLUMEN II**

ISBN 978-958-775-728-6 (papel)  
ISBN 978-958-775-722-4 (digital)  
ISBN 978-958-775-725-5 (IBD)

**Edición**

Editorial Universidad Nacional de Colombia  
direditorial@unal.edu.co  
www.editorial.unal.edu.co

**Instituto de Ciencias Naturales**

www.icn.unal.edu.co

**Diseño y diagramación**

Isabel Sandoval

Salvo que se indique lo contrario, las tablas y figuras fueron elaboradas por los autores.

La fotografía de cubierta y la de la página 9 fueron amablemente cedidas por R. Bernal.

Los mapas de las guardas 1 y 4 se reproducen con el amable permiso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); el de la guarda 2 fue elaborado por los editores; el de la guarda 3 fue elaborado por Shadowfox y se reproduce bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en Bogotá, D. C., Colombia

LOS EDITORES DESEAN AGRADECER EL APOYO DE

Fundación Volkswagen  
Missouri Botanical Garden  
GBIF - Global Biodiversity Information Facility  
Instituto Alexander von Humboldt  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
Fundación Natura  
The Andrew W. Mellon Foundation  
JRS Biodiversity Foundation  
The Inter-American Biodiversity Information Network (IABIN)

**Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia**

Bernal González, Rodrigo Germán, 1959-

Catálogo de plantas y líquenes de Colombia / Rodrigo Bernal, S. Robbert Gradstein, Marcela Celis, editores. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad de Ciencias. Instituto de Ciencias Naturales, 2016.

2 volúmenes (3060 páginas) : ilustraciones a blanco y negro, fotografías, mapas

Incluye referencias bibliográficas e índice de sinónimos, familias y géneros

ISBN 978-958-775-726-2 (Obra completa, rústico). -- ISBN 978-958-775-720-0 (Obra completa, e-book). -- ISBN 978-958-775-723-1 (Obra completa, IBD). -- ISBN 978-958-775-727-9 (volumen I, rústico). -- ISBN 978-958-775-721-7 (volumen I, e-book). -- ISBN 978-958-775-724-8 (volumen I, IBD). -- ISBN 978-958-775-728-6 (volumen II, rústico). -- ISBN 978-958-775-722-4 (volumen II, e-book). -- ISBN 978-958-775-725-5 (del vol. II, IBD).

1. Plantas -- Distribución geográfica -- Colombia -- Catálogos 2. Líquenes 3. Plantas -- Identificación 4. Paleobotánica 5. Taxonomía vegetal 6. Flora colombiana 7. Plantas -- Conservación de especímenes I. Gradstein, Stephan Robbert, 1943-, editor II. Celis Pacheco, Yolanda Marcela, 1972-, editor III. Título IV. Título: Catalogue of the plants and lichens of Colombia

CDD-21 581.9861 / 2016

**ORCHIDACEAE**

POR PEDRO ORTIZ

VALDIVIESO<sup>1</sup>, PAULA

VIVEROS<sup>2</sup>, CARLYLE A. LUER<sup>2</sup>,

MARCELA CELIS<sup>2,3</sup>, ERIC

HÁGSATER<sup>4</sup>, MARIO BLANCO<sup>5</sup>,

HILDA DEL CARMEN DUEÑAS<sup>6</sup>,

GÜNTER GERLACH<sup>7</sup>, CÁSSIO

VAN DER BERG<sup>8</sup>, GERMÁN

CARNEVALI FERNÁNDEZ-

CONCHA<sup>9</sup>, GIOVANNY

GIRALDO<sup>10</sup>, DIEGO BOGARÍN<sup>11</sup>,

HENRY F. OAKELEY<sup>12</sup>, GUSTAVO

ROMERO-GONZÁLEZ<sup>13</sup>,

CARLOS LUIS LEOPARDI

VERDE<sup>14</sup>, ELIANA NOGUERA-

SAVELLI<sup>15</sup>, WILLIAM CETZAL<sup>16</sup>,

RODRIGO BERNAL<sup>17</sup>, ERIC DE

CAMARGO SMIDT<sup>18</sup>, LIZANDRO

NICANOR PERAZA<sup>19</sup> Y RICARDO

BALAM-NARVÁEZ<sup>20</sup>

<sup>1</sup> *Aspasia*, *Bletia*, *Brassia*,  
*Catasetum*, *Caucaea*,  
*Cischweinfia*, *Cleistes*, *Clowesia*,  
*Comparettia*, *Corymborkis*,  
*Crossoglossa*, *Cuitlauzina*,  
*Cycnoches*, *Cyrtochiloides*,  
*Cyrtochilum*, *Cyrtopodium*,  
*Dichaea*, *Dressleria*, *Duckeella*,  
*Elleanthus*, *Eloyella*, *Epistephium*,  
*Eriopsis*, *Erycina*, *Fernandezia*,  
*Galeandra*, *Gomesa*, *Govenia*,  
*Habenaria*, *Hofmeisterella*,  
*Ionopsis*, *Koellensteinia*,  
*Leochilus*, *Liparis*, *Miltoniopsis*,  
*Monophyllorchis*, *Mormodes*,  
*Notylia*, *Notyliopsis*, *Oliveriana*,  
*Oncidium*, *Ornithocephalus*,  
*Otoglossum*, *Otostylis*, *Palmorchis*,  
*Plectrophora*, *Polyotidium*,  
*Psilochilus*, *Psychopsis*,  
*Pterostemma*, *Rodriguezia*,  
*Rossioglossum*, *Rudolfiella*,  
*Santanderella*, *Sertifera*, *Sobralia*,  
*Solenidium*, *Systeloglossum*,

*Telipogon*, *Teuscheria*,  
*Tolumnia*, *Trichoceros*,  
*Trichopilia*, *Triphora*, *Trizeuxis*,  
*Valdiviesoa*, *Vanilla*, *Vitekorchis*,  
*Warmingia*, *Xylobium*, *Zelenkoa*,  
*Zygosepalum*. <sup>2</sup> *Acianthera*,  
*Anathallis*, *Andinia*, *Barbosella*,  
*Brachionidium*, *Diodonopsis*,  
*Draconanthes*, *Dracula*,  
*Dresslerella*, *Dryadella*,  
*Echinosepala*, *Fronдаря*,  
*Kraenzlinella*, *Lepanthes*,  
*Lepanthopsis*, *Masdevallia*,  
*Myoxanthus*, *Octomeria*,  
*Pabstiella*, *Phloeophila*, *Platystele*,  
*Pleurothallis*, *Pleurothallopsis*,  
*Porroglossum*, *Restrepia*,  
*Scaphosepalum*, *Specklinia*,  
*Stelis*, *Teagueia*, *Trichosalpinx*,  
*Trisetella*, *Zootrophion*.

<sup>3</sup> *Cyrtochylum*, *Phragmipedium*.

<sup>4</sup> *Epidendrum*. <sup>5</sup> *Camaridium*,  
*Christensonella*, *Cyrtidiorchis*,  
*Heterotaxis*, *Inti*, *Lockhartia*,  
*Mapinguari*, *Maxillaria*,  
*Maxillariella*, *Mormolyca*,  
*Neomoorea*, *Nitidobulbon*,  
*Oeceoclades*, *Ornithidium*,  
*Pityphyllum*, *Rhetinantha*,  
*Sauvetea*, *Trigonidium*. <sup>6</sup> *Aa*,  
*Altensteinia*, *Aspidogyne*,  
*Baskervillea*, *Beloglottis*,  
*Brachystele*, *Coccineorchis*,  
*Cranichis*, *Cybebus*, *Cyclopogon*,  
*Eltroplectris*, *Eurystyles*,  
*Gomphichis*, *Hapalorchis*,  
*Helonoma*, *Kreodanthus*,  
*Lankesterella*, *Ligeophila*,  
*Lyroglossa*, *Mesadenella*,  
*Microchilus*, *Myrosmodes*, *Pelexia*,  
*Platythelys*, *Ponthieva*, *Prescottia*,  
*Pseudocentrum*, *Pterichis*, *Sacoila*,  
*Sarcoglottis*, *Sauroglossum*,  
*Stenorrhynchos*, *Veyretia*.

<sup>7</sup> *Acineta*, *Aganisia*, *Batemannia*,  
*Benzingia*, *Braemia*, *Chaubardia*,

*Chaubardiella*, *Chondrorhyncha*,  
*Chondroscaphe*, *Cochleanthes*,  
*Coeliopsis*, *Coryanthes*,  
*Cryptarrhena*, *Daiotyla*,  
*Echinorhyncha*, *Embreea*,  
*Euryblema*, *Galeottia*, *Gongora*,  
*Houlletia*, *Huntleya*, *Ixyophora*,  
*Kefersteinia*, *Kegeliella*,  
*Lueddemannia*, *Lycomormium*,  
*Macradenia*, *Paphinia*, *Peristeria*,  
*Pescatoria*, *Polycynis*, *Schlimmia*,  
*Sievekingia*, *Soterosanthus*,  
*Stanhopea*, *Stenia*, *Trevoria*,  
*Warczewiczella*, *Warrea*,  
*Warreella*, *Warreopsis*.

<sup>8</sup> *Arpophyllum*, *Cattleya*,  
*Chysis*, *Dimerandra*,  
*Guarianthe*, *Homalopetalum*,  
*Laelia*, *Nemaconia*, *Nidema*,  
*Oestlundia*, *Prosthechea*,  
*Scuticaria*, *Selenipedium*,  
*Uleiorchis*, *Wullschlaegelia*,  
*Xerorchis*, *Zygostates*.

<sup>9</sup> *Caularthron*, *Chelyorchis*,  
*Cryptocentrum*, *Encyclia*,  
*Myrmecophila*, *Orleanesia*.

<sup>10</sup> *Chysis*, *Dimerandra*, *Laelia*,  
*Oestlundia*, *Prosthechea*,  
*Scuticaria*. <sup>11</sup> *Campylocentrum*,  
*Scaphyglottis*. <sup>12</sup> *Anguloa*, *Lycaste*,  
*Sudamerlycaste*. <sup>13</sup> *Encyclia*,  
*Orleanesia*. <sup>14</sup> *Caularthron*,  
*Chelyorchis*, *Cryptocentrum*,  
*Encyclia*, *Myrmecophila*.

<sup>15</sup> *Brassavola*, *Malaxis*.

<sup>16</sup> *Cohniella*, *Trichocentrum*.

<sup>17</sup> *Bifrenaria*, *Hirtzia*, *Hylaeorchis*,  
*Isochilus*, *Jacquinella*, *Lacaena*,  
*Pteroglossa*, *Solenocentrum*,  
*Stenoptera*, *Tropidia*.

<sup>18</sup> *Bulbophyllum*, *Eulophia*.

<sup>19</sup> *Polystachya*. <sup>20</sup> *Lophiaris*.

(Lista preliminar compilada por  
Jorge Sarmiento)

247 géneros, 3591 especies, 1477  
especies endémicas

**Aa Rchb.f.**

7 especies

***Aa argyrolepis* Rchb.f.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Perú y N Brasil.

NOTA: citada de Colombia por Govaerts *et al.* (2012), sin referencia de espécimen / recorded from Colombia by Govaerts *et al.* (2012) without reference to a specimen.

***Aa colombiana* Schltr.***Altensteinia colombiana* (Schltr.)

Garay

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.

2600-4300 m.

CAL, CES, CUN, NAR, RIS. No evaluada.

Colombia a Bolivia; Honduras.

*Madero 23* (HT: AMES).***Aa denticulata* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 3500 m.

CAU. No evaluada.

Honduras a Ecuador.

*Madero s.n.* (T: AMES).

NOTA: en Colombia solo se conoce del tipo, recolectado a principios del siglo XX / in Colombia only know from the type, collected in the early 20th century.

***Aa hartwegii* Garay**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 3200-3720 m.

CUN, HUI. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Pedraza 215* (COL).***Aa leucantha* (Rchb.f.)****Schltr.***Aa nigrescens* Schltr., *Altensteinia**leucantha* Rchb.f., *Altensteinia**nigrescens* (Schltr.) Løjtnant

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.

2800-4350 m.

BOY, CAL, CAU, CES, CUN,

MAG, NAR, QUI, SAN, TOL.

No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Rangel 1813* (COL).***Aa maderoi* Schltr.***Altensteinia fragosa* Løjtnant

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 2800 m.

CAU, CUN. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Madero s.n.* (T: AMES).

NOTA: en Colombia solo se conocen dos colecciones / only two collections are known in Colombia.

***Aa paleacea* (Kunth) Rchb.f.***Altensteinia paleacea* (Kunth)Kunth, *Ophrys paleacea* Kunth

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 2800-4100 m.

BOY, CAL, CAU, CUN, HUI,

NAR, QUI, SAN, TOL. No

evaluada.

Costa Rica a Perú.

*Lozano 4787* (COL).***Acianthera* Scheidw.**

21 especies, 5 especies endémicas

***Acianthera adeodata* P.Ortiz et al.***Pleurothallis adeodata* (P.Ortiz et al.) Pfahl

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1860 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Pérez 512* (HT: VALLE).***Acianthera aphthosa* (Lindl.)****Pridgeon & M.W.Chase***Humboldtia foetens* (Lindl.)Kuntze, *Pleurothallis aphthosa*Lindl., *Pleurothallis ciliata*var. *abbreviata* C.Schweinf.,*Pleurothallis foetens* Lindl.,*Pleurothallis macrophyta* Barb.Rodr., *Pleurothallis pelioxantha* Barb.Rodr.

Luer 2004; Viveros &amp; Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000 m.

CAU. No evaluada.

Colombia a Bolivia, SE a S Brasil, Paraguay.

*Lehmann s.n.* (K).***Acianthera capillaris* (Lindl.)****Pridgeon & M.W.Chase***Pleurothallis capillaris* Lindl.,*Specklinia capillaris* (Lindl.) Luer

Luer 2004; Viveros &amp; Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1100 m.

QUI. No evaluada.

Colombia a Brasil y Paraguay;

Antillas Menores.

*Viveros 135* (HUQ).***Acianthera chamelopoda*****(Luer) Luer***Pleurothallis chamelopoda* Luer

Luer 2004; Viveros &amp; Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 200-400 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 346* (HT: K).

***Acianthera chionopa* (Luer)  
Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis chionopa* Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1650 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
NOTA: registrada de Colombia,  
sin indicación de espécimen.  
Datos de elevación de Ecuador /  
recorded from Colombia with no  
specimen citation; elevation data  
from Ecuador.

***Acianthera ciliata* (Knowles  
& Westc.) F.Barros &  
L.R.S.Guim.**

*Humboldtia ciliata* (Knowles  
& Westc.) Kuntze, *Humboldtia  
lanceana* (Lindl.) Kuntze,  
*Humboldtia plumosa* (Lindl.)  
Kuntze, *Humboldtia serrifera*  
(Lindl.) Kuntze, *Humboldtia  
sprucei* (Lindl.) Kuntze,  
*Pleurothallis ciliata* Knowles  
& Westc., *Pleurothallis crassifolia*  
H.Focke, *Pleurothallis daguensis*  
F.Lehm. & Kraenzl., *Pleurothallis  
huebneri* Schltr., *Pleurothallis  
lanceana* Lodd., *Pleurothallis  
minax* Rchb.f., *Pleurothallis  
plumosa* Lindl., *Pleurothallis  
serrifera* Lindl., *Pleurothallis  
sprucei* Lindl.  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1880 m.  
VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Perú y Brasil;  
Trinidad y Tobago.  
*Lehmann 49* (W).

***Acianthera cogniauxiana*  
(Schltr.) Pridgeon &  
M.W.Chase**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
NOTA: esperada; citada de  
Colombia por Govaerts *et  
al.* (2012), sin referencia de  
espécimen / expected; recorded  
from Colombia by Govaerts *et  
al.* (2012) without reference to a  
specimen.

***Acianthera decurrens*  
(Poepp. & Endl.) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Humboldtia decurrens* (Poepp.  
& Endl.) Kuntze, *Pleurothallis  
decurrens* Poepp. & Endl.  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1830 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a N Perú.  
*Croat 69890* (MO).

***Acianthera geminicaulina*  
(Ames) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Pleurothallis geminicaulina* Ames  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 152 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Espina 2752* (CHOCO, MO).

***Acianthera lojiae* (Schltr.)  
Luer**

*Acianthera citrophila* (Luer)  
Pridgeon & M.W.Chase,  
*Acianthera florosa* (Luer)  
Pridgeon & M.W.Chase,  
*Pleurothallis brunnescens*  
Schltr., *Pleurothallis citrophila*

Luer, *Pleurothallis florosa* Luer,  
*Pleurothallis lojiae* Schltr.  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1830 m.  
ANT. No evaluada.  
Costa Rica a Bolivia.  
*Luer 11365* (MO).

***Acianthera melanoglossa*  
(Luer & R.Escobar) Luer**

*Pleurothallis melanoglossa* Luer &  
R.Escobar  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16795* (HT: MO).

***Acianthera pazii* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1830 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Silverstone-Sopkin 8522* (HT:  
CUVC; IT: MO).

***Acianthera polystachya* (Ruiz  
& Pav.) Pupulin**

*Acianthera casapensis* (Lindl.)  
Pridgeon & M.W.Chase,  
*Acianthera coffeicola* (Schltr.)  
Pridgeon & M.W.Chase,  
*Humboldtia casapensis* (Lindl.)  
Kuntze, *Humboldtia chamensis*  
(Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis  
casapensis* Lindl., *Pleurothallis  
chamensis* Lindl., *Pleurothallis  
coffeicola* Schltr., *Pleurothallis  
triangularis* Klotzsch & H.Karst.,  
*Pleurothallis triquetra* Lindl.,  
*Pleurothallis wolfiana* Schltr.  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300-2850 m.  
ANT, SAN. No evaluada.

Panamá a Bolivia; Venezuela y Brasil.

Luer 10279 (MO).

***Acianthera prognatha* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis prognatha* Luer & R.Escobar

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1750 m.

NSA. No evaluada.

NE Colombia a NO Venezuela.

Luer 7918 (HT: SEL).

***Acianthera pubescens* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Humboldtia polystachya* (A.Rich. & Galeotti) Kuntze, *Humboldtia pubescens* (Lindl.) Kuntze, *Humboldtia smithiana* (Lindl.) Kuntze, *Humboldtia truxillensis* (Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis bufonis* Klotzsch, *Pleurothallis coriacea* Bello, *Pleurothallis polystachya* A.Rich. & Galeotti, *Pleurothallis pubescens* Lindl., *Pleurothallis rio-grandensis* Barb.Rodr., *Pleurothallis rio-grandensis* var. *viridicata* Barb. Rodr., *Pleurothallis smithiana* Lindl., *Pleurothallis truxillensis* Rchb.f., *Pleurothallis vittata* Lindl.

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

SAN. No evaluada.

México a Paraguay.

Luer 10156 (MO).

***Acianthera rodrigoii* (Luer) Luer**

*Pleurothallis rodrigoii* Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

ANT. No evaluada.

Escobar 5170 (HT: MO).

***Acianthera rubroviridis* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Perú; Cuba.

NOTA: citada de Colombia

por Govaerts *et al.* (2012), sin referencia de espécimen / recorded from Colombia by Govaerts *et al.* (2012) without reference to a specimen.

***Acianthera sicaria* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Humboldtia sicaria* (Lindl.)

Kuntze, *Pleurothallis alpina*

Ames, *Pleurothallis sicaria*

Lindl., *Pleurothallis trigonopoda*

Klotzsch, *Pleurothallis tripteris* Rchb.f.

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1250-2000 m.

ANT, NAR. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia, Venezuela; Trinidad.

Luer 14166 (MO).

***Acianthera testifolia* (Sw.) Solano**

*Epidendrum testifolium* Sw.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Surinam; Antillas.

NOTA: citada de Colombia

por Govaerts *et al.* (2012), sin referencia de espécimen / recorded from Colombia by

Govaerts *et al.* (2012) without reference to a specimen.

***Acianthera wagneriana* (Klotzsch) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis convexifolia* Barb.

Rodr., *Pleurothallis dasychila*

Luer, *Pleurothallis wagneriana*

Klotzsch, *Pleurothallis*

*xylobiochila* Kraenzl.

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

RIS. No evaluada.

Colombia a Bolivia y SE Brasil; Venezuela.

Escobar 5016 (MO).

***Acianthera wyvern* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis wyvern* Luer & R.Escobar

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

PUT. No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

Luer 3726 (HT: SEL).

***Acineta* Lindl.**

6 especies, 3 especies endémicas

***Acineta antioquiae* Schltr.**

Schlechter 1917; Gerlach 1999b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

ANT. No evaluada.

Colombia.

Gerlach 92/3710 (M).

***Acineta cryptodonta* Rchb.f.**

*Acineta erythroxantha* Rchb.f.

Gerlach 1999a; Gerlach 1999b.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Lehmann 3839 (BM).*

***Acineta densa* Lindl.**

*Acineta gymnostele* Schltr.,  
*Acineta warszewiczii* Klotzsch  
Gerlach 1999b; Gerlach & Weber  
2003.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
*Königer K-173 (M).*

***Acineta moorei* Rolfe**

*Acineta beyrodtiana* Schltr.,  
*Acineta hennisiana* Schltr.,  
*Acineta hrubyana* Rchb.f.  
Gerlach 1999a; Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000-2000 m.  
ANT, CAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Gerlach 92/2499 (M).*

***Acineta sulcata* Rchb.f.**

Gerlach & Weber 2003.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000-2200 m.  
ANT, CAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Gerlach 98/3228 (M).*

***Acineta superba* (Kunth)**

**Rchb.f.**

*Acineta humboldtii* (Lindl.)  
Lindl., *Anguloa superba* Kunth  
Gerlach 1999b; Dodson & Luer  
2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1800-2000 m.  
ANT, CUN, MAG, NSA. No  
evaluada.  
Colombia a Perú y Venezuela.  
*Lehmann 3189 (G).*

***Aganisia* Lindl.**

3 especies

***Aganisia cyanea* (Lindl.)  
Rchb.f.**

*Acacallis cyanea* Lindl., *Aganisia  
tricolor* N.E.Br., *Kochiophyton  
caeruleum* Hoehne, *Kochiophyton  
negrense* Cogn.

Schultes 1958.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena, Orinoquia. 120-400 m.  
AMA, CAQ?, GUI, GUV, MET,  
VAU, VIC? No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Betancur 9957 (COL).*

***Aganisia fimbriata* Rchb.f.**

*Acacallis coerulea* (Rchb.f.)  
Schltr., *Acacallis fimbriata*  
(Rchb.f.) Schltr., *Acacallis  
oliveriana* (Rchb.f.) Schltr.,  
*Aganisia coerulea* Rchb.f.,  
*Aganisia oliveriana* Rchb.f.  
Schultes 1958.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
150 m.  
AMA, GUI?, GUV?, VAU?, VIC?  
No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Guyana,  
Surinam, Guayana Francesa,  
Brasil, Perú.  
*Fox 35 (K).*

***Aganisia pulchella* Lindl.**

*Aganisia brachypoda* Schltr.  
Schultes 1958.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
250 m.  
VAU. No evaluada.  
E Colombia, Venezuela, Guyana,  
Surinam, Guayana Francesa,  
Brasil, Perú, Trinidad y Tobago.  
*Cortés 768 (COL).*

***Altensteinia* Kunth**

2 especies

***Altensteinia fimbriata* Kunth**

*Altensteinia boliviensis* Rusby,  
*Altensteinia sceptrum* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.

Nativa. Andes. 2350-2985 m.  
BOY, CAU, CUN, GUV, NAR,  
NSA. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Uribe-Uribe 6000 (COL).*

***Altensteinia virescens* Lindl.**

*Prescottia crassicaulis* F.Lehm. &  
Kraenzl.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.

Nativa. Andes. 2910 m.

CAU. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Idrobo 3660 (COL).*

NOTA: en Colombia se conoce  
solo de una colección / known  
in Colombia from a single  
collection.

***Anathallis* Barb.Rodr.**

19 especies, 2 especies endémicas

***Anathallis acuminata*  
(Kunth) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Anathallis racemosa* Barb.  
Rodr., *Humboldtia acuminata*  
(Kunth) Kuntze, *Humboldtia  
aurea* Kuntze, *Pleurothallis  
acuminata* (Kunth) Lindl.,  
*Pleurothallis angustipetala*  
C.Schweinf., *Pleurothallis aurea*  
Lindl., *Pleurothallis brittonii*  
Rolfe, *Pleurothallis nigro-hirsuta*  
Kraenzl., *Pleurothallis ochroleuca*  
Schltr., *Pleurothallis racemosa*  
(Barb.Rodr.) Cogn., *Pleurothallis*

*tenuifolia* C.Schweinf., *Specklinia acuminata* (Kunth) Lindl.

Luer 1999; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1650-2850 m.

NSA, QUI, RIS. No evaluada.

Colombia a Bolivia; NO y N Venezuela.

Viveros 35 (HUQ).

***Anathallis barbulate* (Lindl.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Humboldtia barbulate* (Lindl.)

Kuntze, *Panmorphia barbulate*

(Lindl.) Luer, *Pleurothallis*

*barbulate* Lindl., *Specklinia*

*barbulate* (Lindl.) Luer,

*Specklinia minutissima* (Luer)

Luer

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 200-1500 m.

CAU, VAL. No evaluada.

S México a Bolivia y Brasil.

*Lehmann 8204* (HT: K).

***Anathallis brevipes***

**(H.Focke) Pridgeon &**

**M.W.Chase**

*Panmorphia brevipes* (H.Focke)

Luer, *Pleurothallis brevipes*

H.Focke, *Pleurothallis modesta*

(Barb.Rodr.) Cogn., *Specklinia*

*brevipes* (H.Focke) Luer

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Orinoquia. 300 m.

MET. No evaluada.

N Suramérica a Bolivia y Brasil.

*Luer 14303* (MO).

NOTA: cultivada en Antioquia / cultivated in Antioquia.

***Anathallis ciliolata* (Schltr.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia?

DESCONOCIDO. No evaluada.

N Suramérica.

NOTA: citada de Colombia

por Govaerts *et al.* (2012),

sin referencia de espécimen /

recorded from Colombia by

Govaerts *et al.* (2012) without

reference to a specimen.

***Anathallis cuspidata* (Luer)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Panmorphia cuspidata* (Luer)

Luer, *Pleurothallis cuspidata*

Luer, *Specklinia cuspidata* (Luer)

Luer

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2800 m.

PUT. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

*Ospina 152* (AMES, COL).

***Anathallis dimidia* (Luer)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-1600 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

NOTA: citada de Colombia

por Govaerts *et al.* (2012),

sin referencia de espécimen /

recorded from Colombia by

Govaerts *et al.* (2012) without

reference to a specimen.

***Anathallis funerea* (Barb.**

**Rodr.) Luer**

*Lepanthes funerea* Barb.Rodr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Suramérica tropical.

NOTA: registrada de Colombia,

sin indicación de espécimen /

recorded from Colombia with no

specimen citation.

***Anathallis meridana***

**(Rchb.f.) Pridgeon &**

**M.W.Chase**

*Pleurothallis meridana* Rchb.f.,

*Specklinia meridana* (Rchb.f.)

Luer

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a NO Venezuela.

NOTA: registrada de Colombia,

sin indicación de espécimen /

recorded from Colombia with no

specimen citation.

***Anathallis millipeda* (Luer)**

**Luer**

*Panmorphia millipeda* (Luer)

Luer, *Pleurothallis millipeda* Luer,

*Specklinia millipeda* (Luer) Luer

Luer 2006a; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Lehmann s.n.* (HT: K).

NOTA: espécimen sin datos de

departamento ni elevación /

specimen without department or

elevation data.

***Anathallis muricaudata***

**(Luer) Pridgeon &**

**M.W.Chase**

*Panmorphia muricaudata* (Luer)

Luer, *Pleurothallis muricaudata*

Luer, *Specklinia muricaudata*

(Luer) Luer

Luer 2006a; Govaerts *et al.*

2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Panamá a Bolivia.

*Luer 14747* (MO).

NOTA: espécimen sin datos de

departamento y elevación /

specimen without department or

elevation data.

***Anathallis obovata* (Lindl.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Anathallis densiflora* Barb.Rodr., *Anathallis fasciculata* Barb. Rodr., *Anathallis micrantha* Barb. Rodr., *Anathallis osmosperma* Barb.Rodr., *Humboldtia obovata* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis albida* Lindl., *Pleurothallis angustilabia* Hoehne & Schltr., *Pleurothallis brachyantha* Schltr., *Pleurothallis citrina* Schltr., *Pleurothallis dendrophila* Rchb.f., *Pleurothallis densiflora* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis fasciculata* (Barb.Rodr.) Cogn., *Pleurothallis guentheri* Schltr., *Pleurothallis minutiflora* Cogn., *Pleurothallis obovata* (Lindl.) Lindl., *Pleurothallis octomeriiformis* Rchb.f., *Pleurothallis osmosperma* (Barb. Rodr.) Cogn., *Pleurothallis stenoglossa* Pabst, *Specklinia citrina* (Schltr.) Luer, *Stelis fasciculiflora* Regel  
Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1800 m.  
SAN. No evaluada.  
América tropical.  
*Killip 16401* (AMES, NY).

***Anathallis polygonoides* (Griseb.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Panmorphia polygonoides* (Griseb.) Luer, *Pleurothallis polygonoides* Griseb., *Specklinia polygonoides* (Griseb.) Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
C y S América Tropical;  
Trinidad.  
NOTA: registrada de Colombia, sin indicación de espécimen / recorded from Colombia with no specimen citation.

***Anathallis rabei* (Foldats)**

**Luer**

*Panmorphia rabei* (Foldats) Luer, *Pleurothallis rabei* Foldats, *Specklinia rabei* (Foldats) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Orinoquia. 200-2400 m.  
CAQ, CUN. No evaluada.  
NO Venezuela a N Perú.  
*Lehmann HK-140* (K).

***Anathallis ramulosa* (Lindl.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis ramulosa* Lindl., *Specklinia ramulosa* (Lindl.) Luer  
Luer 1999; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2600 m.  
CUN, NAR. No evaluada.  
NO Venezuela a Ecuador.  
NOTA: recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Anathallis schlimii* (Luer)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis schlimii* Luer, *Specklinia schlimii* (Luer) Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
NSA. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schlim 1441* (HT: W; IT: K).

***Anathallis sclerophylla***

**(Lindl.) Pridgeon &**

**M.W.Chase**

*Pleurothallis sclerophylla* Lindl., *Specklinia sclerophylla* (Lindl.) Luer  
Luer 1999; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1980-3100 m.  
ANT, QUI, RIS. No evaluada.

Suramérica tropical.

*Viveros 362* (HUQ).

***Anathallis spathilabia***

**(Schltr.) Pridgeon &**

**M.W.Chase**

*Pleurothallis spathilabia* Schltr., *Specklinia spathilabia* (Schltr.) Luer  
Luer 1999; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a O Ecuador.  
*Hopp 117* (HT: B; destruido).  
NOTA: conocida en Colombia solo del tipo, que fue destruido / known in Colombia only from the type, which was destroyed.

***Anathallis spiculifera***

**(Lindl.) Luer**

*Humboldtia acutissima* (Lindl.) Kuntze, *Humboldtia spiculifera* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis acutissima* Lindl., *Pleurothallis sertularioides* var. *trinitensis* Griseb., *Pleurothallis spiculifera* Lindl., *Pleurothallis trinitensis* (Griseb.) Carnevali & G.A.Romero, *Specklinia spiculifera* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase  
Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Guayana y Macarena. 150-200 m.  
AMA, VAU. No evaluada.  
N Suramérica a Ecuador y Brasil; Trinidad y Tobago.  
*Schultes 14559* (MO).

***Anathallis stenophylla***

**(F.Lehm. & Kraenzl.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis stenophylla* F.Lehm. & Kraenzl., *Specklinia stenophylla* (F.Lehm. & Kraenzl.) Luer

Luer 1999; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-1800 m.

CAU. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

*Lehmann 4515* (HT: K).

### **Andinia (Luer) Luer**

3 especies, 1 especie endémica

#### **Andinia hystricosa (Luer)**

##### **Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis hystricosa* Luer

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2590 m.

HUI. No evaluada.

*Little 8519* (HT: US).

#### **Andinia trimytera (Luer**

##### **& R.Escobar) Pridgeon &**

##### **M.W.Chase**

*Pleurothallis trimytera* Luer & R.Escobar

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600 m.

ANT, BOY, SAN. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer 8033* (SEL).

#### **Andinia vestigipetala (Luer)**

##### **Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis vestigipetala* Luer

Luer 1994; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500-3000 m.

CUN. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

*Lehmann 7087* (K).

### **Anguloa Ruiz & Pav.**

12 especies, 5 especies endémicas

#### **Anguloa ×acostae Oakeley**

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500 m.

ANT. No evaluada.

*Oakeley 2008* (Foto).

NOTA: híbrido natural de

*A. hohenlohii* × *A. eburnea*,

identificado en una colección /

a natural hybrid of *A. hohenlohii*

× *A. eburnea* identified in a

collection.

#### **Anguloa brevilabris Rolfe**

*Anguloa* × *ruckerivar. retusa*

Rchb.f.

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400-1600 m.

ANT. En Peligro (Calderón-

Sáenz 2007).

Cordillera Occidental.

*Lehmann s.n.* (K).

#### **Anguloa cliftonii Farmer**

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1690 m.

ANT, VAL. En Peligro

(Calderón-Sáenz 2007).

*Oakeley 7* (K, T de la var. *alba*).

*Anguloa cliftonii* var. *alba*

Oakeley, *Anguloa cliftonii* var.

*concolor* Oakeley

#### **Anguloa clowesii Lindl.**

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

NSA. En Peligro (Calderón-

Sáenz 2007).

NE Colombia y O Venezuela.

*Lehmann BT107* (K).

*Anguloa clowesii* var. *flava* A.DC.

#### **Anguloa dubia Rchb.f.**

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1200-1800 m.

CAU, HUI. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

S cordillera Central.

*Lehmann 2274* (BM).

#### **Anguloa eburnea**

##### **B.S.Williams**

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700 m.

PUT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

S Colombia a Perú.

*Ortiz 4393* (HPUJ).

#### **Anguloa hohenlohii**

##### **C.Morren**

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

NSA. En Peligro (Calderón-

Sáenz 2007).

NE Colombia y O Venezuela.

NOTA: originalmente recolectada

en Norte de Santander, pero

no se ha vuelto a encontrar en

Colombia / originally collected

in Norte de Santander but

has not been rediscovered in

Colombia.

#### **Anguloa ×rolfei Rolfe**

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: híbrido natural de

*A. brevilabris* × *A. cliftonii*.

Originalmente recolectada en

Colombia, sin localidad precisa;

no se ha vuelto a encontrar

en el país / a natural hybrid

of *A. brevilabris* × *A. cliftonii*;

originally collected in Colombia,

without precise locality; has not

been rediscovered in the country.

#### **Anguloa ×ruckeri Lindl.**

*Anguloa ruckeri* Lindl.

Oakeley 2008.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 900-2000 m.  
NSA. No evaluada.  
Venezuela, NE Colombia,  
Ecuador?

NOTA: señalada de Colombia por Oakeley (2008), sin indicación de espécimen. Híbrido natural de *A. hohenlohii* × *A. clowesii* / recorded from Colombia by Oakeley (2008), with no indication of specimen; a natural hybrid of *A. hohenlohii* × *A. clowesii*.

***Anguloa* × *speciosa* Linden**

Oakeley 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
QUI. No evaluada.  
O Venezuela a N Ecuador.  
NOTA: señalada de Colombia por Oakeley (2008), sin indicación de espécimen. Híbrido natural de *A. virginalis* × *A. tognettiae* / recorded from Colombia by Oakeley (2008), with no indication of specimen; a natural hybrid of *A. virginalis* × *A. tognettiae*.

***Anguloa tognettiae* Oakeley**

Oakeley 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1250-2300 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia, O Venezuela.  
NOTA: señalada de Colombia por Oakeley (2008), sin indicación de espécimen / recorded in Colombia by Oakeley (2008), with no indication of specimen.

***Anguloa virginalis***

**B.S. Williams**  
Oakeley 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-1600 m.  
NSA, QUI, VAL. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

Venezuela a Bolivia.  
*Schlim s.n.* (LT: K).  
*Anguloa virginalis* var. *turneri*  
(B.S. Williams) Oakeley

***Arpophyllum* La Llave & Lex.**

1 especie

***Arpophyllum giganteum* Lindl.**

*Arpophyllum cardinale* Linden & Rchb.f.  
Garay 1970a; Withner 1998.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1320-1930 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Venezuela.  
*Schlim 1706* (K).  
*Arpophyllum giganteum* subsp. *giganteum*

***Aspasia* Lindl.**

4 especies, 1 especie endémica

***Aspasia epidendroides* Lindl.**

*Aspasia barclayi* Rolfe,  
*Aspasia fragrans* Klotzsch,  
*Odontoglossum aspasia* Rchb.f.  
Williams 1974.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 10-20 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia a Centroamérica.  
*Rentería 4852* (JAUM).

***Aspasia omissa* Christenson**

Christenson 2004.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico.  
5-1100 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Christenson 2066* (HT: NY).

***Aspasia principissa* Rchb.f.**

Christenson 2004; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico, V Magdalena.  
0-1000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Centroamérica.  
*Escobar 871* (AMES).

***Aspasia variegata* Lindl.**

*Odontoglossum variegatum* (Lindl.) Rchb.f.  
Williams 1974.  
Hierba, epífita.  
Nativa. V Magdalena. 75 m.  
SAN. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Haught 1591* (US).

***Aspidogyne* Garay**

14 especies, 4 especies endémicas

***Aspidogyne boliviensis* (Cogn.) Garay**

*Erythrodes cylindrostachys* Garay,  
*Physurus boliviensis* Cogn.  
Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007; Ormerod 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2460 m.  
ANT, CAU, CHO, HUI, NAR, RIS, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Galeano 2470* (COL).

***Aspidogyne carauchana* Ormerod**

Ormerod 2009a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2290 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Grant 9157* (HT: US).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Aspidogyne chochoensis* Ormerod**

Ormerod 2009a.  
Hierba.

Endémica. Andes. 2000 m.  
CHO. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Core 341* (HT: US).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Aspidogyne clavigera*  
(Rchb.f.) Meneguzzo**

*Erythrodes clavigera* (Rchb.f.)  
Ames, *Ligeophila clavigera*  
(Rchb.f.) Garay, *Physurus claviger*  
Rchb.f.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.

Nativa. Amazonia. 100 m.  
AMA. No evaluada.  
México a Guayanas y Perú.  
*Schultes 8544* (AMES).  
*Aspidogyne clavigera* var.  
*rhodostachys* (Ormerod)  
Ormerod.

***Aspidogyne confusa*  
(C.Schweinf.) Garay**

*Erythrodes confusa* C.Schweinf.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.

Nativa. Guayana y Macarena.  
350 m.  
MET. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guayana  
Francesa.

*Stevenson 1339* (MO).

NOTA: la identidad del único  
especimen colombiano requiere  
verificación / identity of the  
only Colombian specimen needs  
verification.

***Aspidogyne foliosa* (Poepp. &  
Endl.) Garay**

*Erythrodes aratanhensis* (Barb.  
Rodr.) Ames, *Erythrodes*  
*densiflora* (Lindl.) Ames,  
*Erythrodes foliosa* (Poepp. &  
Endl.) Ames, *Pelexia foliosa*  
Poepp. & Endl., *Physurus*

*aratanhensis* Barb.Rodr.,  
*Physurus densiflorus* Lindl.,  
*Physurus stenocentron* Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.

Nativa. Amazonia, Orinoquia,  
Pacífico, V Magdalena. 100-700  
m.

AMA, ANT, CHO, GUV, NAR,  
VIC. No evaluada.

N Suramérica.

*Marulanda 1704* (COL, HUA).

***Aspidogyne goaltalensis*  
Ormerod**

Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.

Nativa. Andes? 1230-1250 m.  
NAR? No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), justo en la  
frontera con Nariño / expected;  
collected in Carchi (Ecuador),  
right on the border with Nariño.

***Aspidogyne mosaica*  
Ormerod**

Ormerod 2004; Dueñas &  
Fernández 2007; Ormerod 2007.  
Hierba.

Nativa. Andes, Pacífico. 520 m.  
CHO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cárdenas 475* (HT: MO).

NOTA: conocida en Colombia  
solo de una colección / known  
in Colombia from a single  
collection.

***Aspidogyne popayanensis*  
Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007;  
Ormerod 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 1800-2300 m.  
CAU. No evaluada.

*Lehmann 7128* (HT: K; IT: K).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Aspidogyne querceticola*  
(Lindl.) Meneguzzo**

*Erythrodes jamaicensis* (Fawc.  
& Rendle) Fawc. & Rendle,  
*Erythrodes maculata* (Hook.)  
Ames, *Erythrodes mayoriana*  
(Kraenzl.) Ames, *Erythrodes*  
*sagrana* (A.Rich.) León,  
*Erythrodes trinitatis* Ames,  
*Physurus commelinifolius* Rchb.f.,  
*Physurus jamaicensis* Fawc. &  
Rendle, *Physurus maculatus*  
Hook., *Physurus mayorianus*  
Kraenzl., *Physurus sagraeanus*  
A.Rich., *Platythelys maculata*  
(Hook.) Garay, *Platythelys*  
*mayoriana* (Kraenzl.) Garay,  
*Platythelys querceticola* (Lindl.)  
Garay, *Platythelys sagreana*  
(A.Rich.) Garay  
Ormerod 2013.

Hierba.

Nativa. Andes, V Cauca, V  
Magdalena. 600-1450 m.

ANT, CHO, QUI. No evaluada.  
SE Estados Unidos a Guayanas,  
Ecuador y Perú.

*Archer 1628* (US).

***Aspidogyne rariflora* (Lindl.)  
Garay**

*Erythrodes rariflora* (Lindl.)  
Ames, *Physurus rariflorus* Lindl.  
Garay 1977; Ortiz 1995; Dueñas  
2002.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y NO Venezuela.

NOTA: pobremente conocida /  
poorly known.

***Aspidogyne robusta*  
(C.Schweinf.) Garay**

*Erythrodes robusta* C.Schweinf.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena. 100-1780  
m.  
AMA, MET, VAL. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Guyana.  
*Idrobo 2488* (COL).

***Aspidogyne umbraticola*  
(Garay) Meneguzzo**

*Erythrodes umbraticola* (Garay)  
P.Ortiz, *Ligeophila umbraticola*  
Garay  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 200 m.  
VAU. No evaluada.  
Colombia y Bolivia.  
*Zarucchi 1361* (AMES, COL).  
NOTA: conocida en Colombia  
solo de una colección / known  
in Colombia from a single  
collection.

***Aspidogyne zonata* Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007;  
Ormerod 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
VAL. No evaluada.  
*Lehmann s.n.* (HK 1283) (HT:  
K).  
NOTA: conocida solo del tipo.  
Identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Barbosella* Schltr.**

4 especies

***Barbosella cucullata* (Lindl.)  
Schltr.**

*Barbosella rhynchantha* (Rchb.f.  
& Warsz.) Schltr., *Masdevallia*  
*longiflora* Kraenzl., *Restrepia*  
*antennifera* var. *angustifolia*  
Kraenzl., *Restrepia rhynchantha*  
Rchb.f. & Warsz., *Restrepia*  
*varicosa* Lindl.

Luer 2000b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700-3500 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO  
Venezuela.  
*Hartweg 1430* (HT: K).

***Barbosella dolichorhiza*  
Schltr.**

*Barbosella anaristella* (Kraenzl.)  
Garay, *Barbosella bradeorum*  
Schltr., *Barbosella fuscata*  
Garay, *Masdevallia anaristella*  
Kraenzl., *Pleurothallis anaristella*  
(Kraenzl.) L.O.Williams,  
*Pleurothallis bradeorum* (Schltr.)  
Ames *et al.*  
Luer 2000b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400 m.  
ANT, CAU, RIS. No evaluada.  
Nicaragua a Perú.  
*Luer 16607* (MO).

***Barbosella prorepens*  
(Rchb.f.) Schltr.**

*Barbosella brenesii* Schltr.,  
*Pleurothallis dussii* Cogn.  
Luer 2000b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700 m.  
CUN. No evaluada.  
México a América tropical.  
*Luer 10381* (MO).

***Barbosella schista* Luer &  
R.Escobar**

Luer 2000b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2750 m.  
NSA. No evaluada.  
E Colombia, NO Venezuela.  
*Luer 7751* (HT: SEL).

***Baskervillea* Lindl.**

3 especies

**[*Baskervillea assurgens*  
Lindl.]**

Ortiz 1995; Dueñas & Fernández  
2009.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea. S Ecuador  
a Perú / record based on a  
misidentification; S Ecuador to  
Peru.

***Baskervillea colombiana*  
Garay**

Garay 1978; Ortiz 1995; Dueñas  
& Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1050-3000 m.  
ANT, CAU, HUI, NAR. No  
evaluada.  
Panamá a Ecuador y Venezuela.  
*Von Sneider 1598* (HT: S).

***Baskervillea stenopetala*  
Dressler**

Dressler 1998.  
Hierba.  
Nativa. Pacífico? 1050-1400 m.  
CHO? No evaluada.  
NO Colombia?, Panamá.  
NOTA: esperada; recolectada en  
cerro Pirre, Darién (Panamá),  
en los límites con Colombia /  
expected; collected in Cerro  
Pirre, Darién (Panama), on the  
border with Colombia.

***Baskervillea venezuelana*  
Garay & Dunst.**

Ortiz 1995; Dueñas & Fernández  
2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2100 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Fonnegra 3223* (HUA).  
NOTA: en Colombia se conoce  
solo de un espécimen de

Antioquia / known in Colombia from a single collection of Antioquia.

### **Batemannia Lindl.**

3 especies

#### ***Batemannia armillata***

**Rchb.f.**

*Zygopetalum chloranthum*  
Kraenzl.

Senghas & Gerlach 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia?, Orinoquia?  
300 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela, Guyana, Surinam,  
Guayana Francesa, Perú,  
Ecuador.

NOTA: esperada; no se examinó ningún material de Colombia, pero se presume su existencia / expected; no specimens from Colombia were seen, but supposedly there are.

#### ***Batemannia colleyi* Lindl.**

*Batemannia peruviana* Rolfe,  
*Batemannia petronia* Barb.Rodr.,  
*Batemannia yauaperyensis* Barb.  
Rodr., *Petronia regia* Barb.Rodr.  
Romero-González 2003a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Orinoquia.  
215-600 m.

AMA, CAQ, GUV, MET, VAU.  
No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana,  
Surinam, Guayana Francesa,  
Perú, Ecuador.

*García-Barriga 15776* (COL,  
AMES).

NOTA: más rara que *B. lepida* y a menudo confundida con ella / rarer than *B. lepida* and often confused with it.

#### ***Batemannia lepida* Rchb.f.**

Romero-González 2003a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 150 m.

AMA, GUI, VAU. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana,  
Surinam, Guayana Francesa,  
Perú, Ecuador.

### **Beloglottis Schltr.**

1 especie

#### ***Beloglottis costaricensis* (Rchb.f.) Schltr.**

*Beloglottis bicaudata* (Ames)  
Garay, *Gyrostachys costaricensis*  
(Rchb.f.) Kuntze, *Spiranthes*  
*bicaudata* Ames, *Spiranthes*  
*costaricensis* Rchb.f., *Spiranthes*  
*subpandurata* Ames &  
C.Schweinf.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 1000 m.

CUN. No evaluada.

S Estados Unidos a N  
Suramérica.

*Haight 6014* (COL).

NOTA: conocida en Colombia solo de una colección, de 1947 / known in Colombia for a single collection, from 1947.

### **Benzingia Dodson**

3 especies

#### ***Benzingia cornuta* (Garay) Dressler**

*Ackermania cornuta* (Garay)  
Dodson & R.Escobar,  
*Chondrorhyncha cornuta* Garay  
Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 400-1500 m.

ANT, NAR. No evaluada.

Colombia y N Ecuador.

*Escobar 593* (AMES).

#### ***Benzingia palorae* (Dodson & Hirtz) Dressler**

*Ackermania palorae* (Dodson & Hirtz) Dodson & R.Escobar,  
*Stenia palorae* Dodson & Hirtz  
Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 500-1200 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Ecuador, Perú.

NOTA: esperada / expected.

#### ***Benzingia reichenbachiana* (Schltr.) Dressler**

*Chondrorhyncha reichenbachiana*  
Schltr.

Misas-Urreta 2005; Harding  
2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 50-1400 m.

CHO. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

### **Bifrenaria Lindl.**

1 especie

#### ***Bifrenaria longicornis* Lindl.**

*Adipe longicornis* (Lindl.)  
M. Wolff, *Stenocoryne longicornis*  
(Lindl.) Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 250 m.

CAQ. No evaluada.

N Suramérica; Trinidad.

*Arévalo 417* (COL).

### **Bletia Ruiz & Pav.**

6 especies, 1 especie endémica

#### ***Bletia campanulata* Lex.**

*Bletia altilamellata* Garay, *Bletia*  
*wagneri* Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Orinoquia. 120-  
1700 m.

CAU, HUI, VIC. No evaluada.  
México a Argentina.  
*Wagner 374 (W).*

***Bletia candida* Kraenzl.**  
Ortiz 1995.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1300 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Kalbreyer 448 (HT: W?).*  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Bletia catenulata* Ruiz & Pav.**  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Suramérica tropical.

***Bletia meridana* (Rchb.f.)  
Garay & Dunst.**  
*Bletia florida* var. *meridana*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1100 m.  
CES, SAN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.

***Bletia purpurea* (Lam.)  
A.DC.**  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
700-1700 m.  
ANT, MAG. No evaluada.  
América tropical.  
*Cuatrecasas 12830 (COL).*

***Bletia stenophylla* Schltr.**  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Orinoquia. 320-  
2720 m.  
BOY, CUN, NAR, TOL. No  
evaluada.

Venezuela a Ecuador.  
*Ortiz 492 (HPUJ).*

***Brachionidium* Lindl.**  
11 especies, 3 especies endémicas

***Brachionidium  
brachycladum* Luer &  
R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
ANT. No evaluada.  
O Colombia.  
*Luer 8946 (HT: SEL).*

***Brachionidium escobarii*  
Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3200 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Luer 3059 (HT: MO).*

***Brachionidium filamentosum*  
Luer & Hirtz**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1100-1200 m.  
CHO. No evaluada.  
Panamá a Ecuador.  
*Hartman 12434 (MO).*

***Brachionidium fornicatum*  
Luer & Hirtz**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a NO Ecuador.  
*Luer 4667 (SEL).*

***Brachionidium imperiale*  
Harling & L.Andersson**  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 16799 (HT: MO).*

***Brachionidium meridense*  
Garay**

Luer 1995; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
SAN. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 10194 (MO).*

***Brachionidium parvifolium*  
(Lindl.) Lindl.**

Luer 1995; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3660 m.  
TOL. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Lindley 1278 (HT: K).*

***Brachionidium  
phalangiferum* Garay**

Luer 1995; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela;  
C Perú.  
*Luer 7968 (SEL).*

***Brachionidium puraceense*  
Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3300 m.  
VAL. No evaluada.  
*Lozano 4697 (HT: COL).*

***Brachionidium tetrapetalum* (F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr.**

Luer 1995; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3300 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia a N Ecuador.

*Lehmann 347* (HT: K).

***Brachionidium tuberculatum* Lindl.**

Luer 1995; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2850 m.

CUN. No evaluada.

Colombia a Ecuador y Brasil; Venezuela.

*Luer 10384* (MO).

***Brachystele* Schltr.**

2 especies, 1 especie endémica

***Brachystele guayanensis* (Lindl.) Schltr.**

*Brachystele aguacatensis* (Rchb.f.) Schltr., *Brachystele brenesii* (Schltr.) Schltr., *Goodyera guayanensis* Lindl., *Gyrostachys aguacatensis* (Rchb.f.) Kuntze, *Gyrostachys hostmannii* (Griseb.) Kuntze, *Spiranthes aguacatensis* Rchb.f., *Spiranthes brenesii* Schltr., *Spiranthes guayanensis* (Lindl.) Cogn., *Spiranthes hostmannii* Griseb.

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Centroamérica a Venezuela y Guayanas; Caribe.

NOTA: esperada / expected.

***Brachystele maasii* Szlach.**

Szlachetko 1996; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Orinoquia. 150 m.

VIC. No evaluada.

Colombia.

*Haught 2778* (HT: COL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Braemia* Jenny**

1 especie

***Braemia vittata* (Lindl.)**

**Jenny**

*Houlletia vittata* Lindl.,

*Polycycnis vittata* (Lindl.) Rchb.f.

Romero-González 2003b.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 200-700 m.

AMA, CAQ, GUV, VAU. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador.

*Torres-Duque 1128* (COL).

***Brassavola* R.Br.**

5 especies

***Brassavola cucullata* (L.)**

**R.Br.**

*Bletia cucullata* (L.) Rchb.f.,

*Cymbidium cucullatum* (L.) Sw.,

*Epidendrum cucullatum* L.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Caribe, Pacífico, SN Santa Marta, V Magdalena. 50-1200 m.

ANT, ATL, BOL, CES, CHO, CUN, GUI, MAG, SAN, TOL.

No evaluada.

México a Venezuela.

*Edwards 586* (AMES).

***Brassavola filifolia* Linden**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

***Brassavola grandiflora* Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 0-1000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Venezuela.

*Smith 2368* (AMES).

***Brassavola martiana* Lindl.**

*Bletia martiana* (Lindl.) Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 180-450 m.

VAU. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil.

*Schultes 14247* (COL, AMES).

***Brassavola nodosa* (L.) Lindl.**

*Bletia nodosa* (L.) Rchb.f.,

*Cymbidium nodosum* (L.) Sw.,

*Epidendrum nodosum* L.

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes, Caribe, Pacífico, SN Santa Marta, V Magdalena. 0-1005 m.

ANT, ATL, BOL, CES, CHO, CUN, GUI, MAG, SAN, TOL.

No evaluada.

México a Venezuela.

*Brand 1228* (JAUM).

***Brassia* R.Br.**

28 especies, 8 especies endémicas

***Brassia allenii* C.Schweinf.**

*Ada allenii* (C.Schweinf.)

N.H. Williams, *Brassiopsis allenii*

(C.Schweinf.) Szlach. & Górniak Garay 1973b; Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 100-500 m.

CHO. No evaluada.

Colombia y Panamá.

*Misas 205* (HPUJ).

***Brassia andina* (Rchb.f.)**

**M.W.Chase**

*Bracthia andina* Rchb.f., *Bracthia verruculifera* Schltr.

Sweet 1974; Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2700 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

González 3119 (COL).

***Brassia arcuigera* Rchb.f.**

*Brassia antherotes* Rchb.f., *Brassia longissima* (Rchb.f.) Nash

Christenson 1996.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500 m.

RIS, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Ortiz 224 (HPUJ).

***Brassia aurantiaca* (Lindl.)**

**M.W.Chase**

*Ada aurantiaca* Lindl., *Ada aurantiaca* var. *maculata* Cogn., *Brassia cinnabarina* Lindl.

Williams 1972; Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-1500 m.

NSA, TOL. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

Schlim 403 (W).

***Brassia bidens* Lindl.**

Dodson 1990b.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia? 100 m.

GUI? No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil.

NOTA: esperada / expected.

***Brassia bowmanii* (Rchb.f.)**

**M.W.Chase**

*Mesospinidium bowmannii*

Rchb.f., *Symphyglossum*

*bowmanii* (Rchb.f.) Garay

Garay 1973a; Chase & Whitten

2011.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

*Bowmann* 1875 (HT: W).

NOTA: especie dudosa; conocida solo del tipo; datos insuficientes / dubious species; known only from the type. Insufficient data.

***Brassia brevis* (Kraenzl.)**

**M.W.Chase**

*Bracthia brevis* Kraenzl.

Sweet 1974; Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia.

*Kalbreyer* 1719 (HT: AMES).

***Brassia caudata* (L.) Lindl.**

*Brassia lewisii* Rolfe, *Epidendrum caudatum* L., *Oncidium caudatum* (L.) Rchb.f.

Carnevali 2003.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 125 m.

CAQ, CAU. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela.

*Ortiz* 596 (HPUJ, JAUM).

***Brassia cochlearis***

**(H.R.Sweet) M.W.Chase**

*Bracthia cochlearis* H.R.Sweet

Sweet 1974; Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1536-3000 m.

ANT, CAL. No evaluada.

Colombia.

*Garay* 1009 (HT: AMES).

***Brassia cochleata* Knowles & Westc.**

*Brassia lawrenceana* Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Orinoquia. 100 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil,

Venezuela, Guyana, Guayana

Francesa, Surinam.

*Escobar* 671 (AMES).

***Brassia cyrtopetala* Schltr.**

Schlechter 1912.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?

NOTA: conocida solo de la descripción original / known only from the original description.

***Brassia diphylla* (H.R.Sweet)**

**M.W.Chase**

*Bracthia diphylla* H.R.Sweet

Sweet 1974; Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Cuatrecasas* 22433 (HT: AMES).

***Brassia escobariana* Garay**

*Ada escobariana* (Garay) Dodson

Garay 1973b; Dodson 1990a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1560-1750 m.

ANT, ARA, RIS. No evaluada.

Colombia.

*Escobar* 744 (AMES).

***Brassia euodes* Rchb.f.**

*Ada elegantula* (Rchb.f.)

N.H.Williams, *Ada euodes*

(Rchb.f.) D.E.Benn. &

Christenson, *Brassia elegantula*

Rchb.f.

Bennett & Christenson 1998.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-2000 m.

ANT, CAU, VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.  
*Lehmann 1396* (K).

***Brassia farinifera* Linden & Rchb.f.**

*Ada farinifera* (Linden & Rchb.f.)  
N.H. Williams

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Ecuador?

NOTA: especie dudosa. Citada de Colombia por Govaerts *et al.* (2012), con duda / dubious species; recorded from Colombia by Govaerts *et al.* (2012), with a query.

***Brassia forgetiana* Sander**

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia?, Orinoquia?  
100 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela, Perú, Colombia?

NOTA: esperada / expected.

***Brassia gireoudiana* Rchb.f. & Warsz.**

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica, Panamá, Colombia?

NOTA: esperada; foto de planta cultivada / expected; photo of cultivated plant.

***Brassia glumacea* Lindl.**

*Ada glumacea* (Lindl.)

N.H. Williams, *Brassia imbricata* Lindl., *Oncidium imbricatum* (Lindl.) Rchb.f.

Williams 1972.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2200 m.

ANT, CUN, MET, TOL. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Sánchez 384* (MEDEL).

***Brassia glumaceoides***

**M.W.Chase**

*Bractia glumacea* Rchb.f.

Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Venezuela.

NOTA: citada de Colombia por Govaerts *et al.* (2012) / recorded from Colombia by Govaerts *et al.* (2012).

***Brassia incantans* (Rchb.f.)**

**M.W.Chase**

*Mesospinidium incantans* Rchb.f.

Garay 1973a; Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

VAL. No evaluada.

Colombia.

*Klaboch s.n.* (HT: W; COL).

***Brassia keiliana* Lindl.**

*Ada keiliana* (Lindl.)

N.H. Williams, *Brassia cinnamomea* Lindl., *Oncidium keilianum* Rchb.f.

Williams 1972.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
2000 m.

CHO, MAG. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Schlim 988* (K, W).

***Brassia lanceana* Lindl.**

Christenson 1996.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
100 m.

GUI. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana,  
Brasil, Perú, Ecuador, Panamá.

***Brassia lehmannii* (Garay)**

**M.W.Chase**

*Mesospinidium lehmannii* Garay

Garay 1973a; Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000 m.

NAR. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann 112* (HT: AMES).

***Brassia minutiflora* (Kraenzl.) M.W.Chase**

*Bractia minutiflora* Kraenzl.

Sweet 1974; Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

SAN. No evaluada.

Colombia.

*Kalbreyer s.n.* (HT: B destruido).

NOTA: identidad dudosa / dubious identity.

***Brassia neglecta* Rchb.f.**

Carnevali & Ramírez-Morillo 2003.

Hierba, epífita.

Nativa. Orinoquia. 100 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana,  
Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador.

***Brassia ocanensis* Lindl.**

*Ada ocanensis* (Lindl.)

N.H. Williams, *Brassia longicuspis* Rchb.f., *Brassia spathacea* Linden & Rchb.f., *Oncidium longicuspe* (Rchb.f.) Rchb.f.

Williams 1972.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1202 m.

NSA. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Schlim 735* (K, W).

***Brassia pumila* Lindl.**

Hierba, epífita.

Nativa. SN Santa Marta. 300 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Ortiz 1103* (HPUJ).

***Brassia wagneri* Rchb.f.**

*Brassia bicolor* Rolfe, *Brassia cryptophthalma* Rchb.f., *Oncidium wagneri* (Rchb.f.) Rchb.f.  
Garay & Wirth 1959.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Orinoquia. 100-735 m.  
GUI, NSA. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Perú.  
*Schlim 24720* (MO).

***Bulbophyllum* Thouars**

7 especies, 1 especie endémica

***Bulbophyllum antioquiense***

**Kraenzl.**  
*Bulbophyllum lehmannianum* Kraenzl.  
Smidt 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Guayana y Macarena, V Cauca. 500-1600 m.  
ANT, CAU, CUN, MET, SAN, TOL. En Peligro (Smidt 2007).  
*Lehman 8070* (AMES).

***Bulbophyllum bracteolatum***

**Lindl.**  
*Bulbophyllum sordida* Rchb.f., *Bulbophyllum ecuadorensis* Schltr., *Bulbophyllum pachyrachis* (A.Rich.) Griseb., *Bulbophyllum sordidum* Lindl., *Bulbophyllum wagneri* Schltr., *Phyllorchis sordida* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis pachyrachis* A.Rich.  
Smidt 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Guayana y Macarena, V Cauca. 500-1700 m.  
ANT, CAU, MET, TOL.  
Preocupación Menor (Smidt 2007).  
México a Bolivia.  
*Philipson 1911* (COL).

***Bulbophyllum exaltatum***

**Lindl.**  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1380-2600 m.  
ANT, BOY, CUN. Preocupación Menor (Smidt 2007).  
Suramérica.  
*Ospina 1126* (COL).

***Bulbophyllum meridense***  
**Rchb.f.**

*Didactyle meridensis* (Rchb.f.) Lindl.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 1400-2600 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Suramérica.  
*Funk 735* (W).  
NOTA: esperada; presente en Venezuela y Perú / expected; occurs in Venezuela and Peru.

***Bulbophyllum popayanense***  
**Kraenzl.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Cauca. 650-3800 m.  
ANT, CAQ, CAU, HUI, SAN, TOL. Preocupación Menor (Smidt 2007).  
Colombia, Ecuador, Perú.  
*Lehmann 7311* (S).

***Bulbophyllum setigerum***  
**Lindl.**

Smidt 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 180 m.  
AMA, CAQ. Preocupación Menor (Smidt 2007).  
Colombia, Brasil y Guayana.  
*Duivenvoorden 1350* (COAH).

***Bulbophyllum steyermarkii***  
**Foldats**

*Bulbophyllum bracteosum* C.Schweinf.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 1400-2800 m.  
CUN? Preocupación Menor (Smidt 2007).  
Venezuela, Colombia, Perú.  
*Ortiz 192* (HPUJ).  
NOTA: esperada; presente en Ecuador y Perú / expected; occurs in Ecuador and Peru.

***Camariidium* Lindl.**

17 especies, 4 especies endémicas

***Camariidium allenii***

**(L.O.Williams) M.A.Blanco**  
*Maxillaria allenii* L.O.Williams  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Misas 240* (HPUJ).  
NOTA: ilustrada por Misas Urreta (2005) como *Maxillaria campanulata* / illustrated by Misas Urreta (2005) as *Maxillaria campanulata*.

***Camariidium ampliflorum***  
**(C.Schweinf.) M.A.Blanco**

*Maxillaria ampliflora* C.Schweinf.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1670 m.  
PUT. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Betancur 5390* (COL, MO).

***Camariidium atrovinaceum***  
**(Christenson) M.A.Blanco**

*Maxillaria atrovinacea* Christenson  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
Serranía del Baudó.  
*Misas 162* (HT: HPUJ).

***Camaridium aurantiacum*****(Schltr.) M.A.Blanco***Maxillaria jugata* Garay,  
*Maxillaria lankesteri* AmesBlanco *et al.* 2007b.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-1500 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 345* (AMES).***Camaridium baudoense*****(Christenson) M.A.Blanco***Maxillaria baudoensis*

Christenson

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 400 m.

CHO. No evaluada.

Serranía del Baudó.

*Misas 338* (HT: HPUJ).***Camaridium campanulatum*****(C.Schweinf.) M.A.Blanco***Maxillaria campanulata*

C.Schweinf.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

NOTA: señalada de Colombia pero no se encontraron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

**[*Camaridium carinatum*****(Barb.Rodr.) Hoehne]**Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en identificación errónea; restringida a Brasil / record based on a misidentification; restricted to Brasil.

***Camaridium carinulatum*****(Rchb.f.) M.A.Blanco***Camaridium bradeorum* Schltr.,*Maxillaria bradeorum* (Schltr.)L.O.Williams, *Maxillaria carinulata* Rchb.f.

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes,

Pacífico. 0-1500 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Escobar 432* (AMES, COL, HUI).***Camaridium ferrugineum*****(Christenson) M.A.Blanco***Maxillaria ferruginea*

Christenson

Hierba, epífita.

Nativa. Andes?

NAR? No evaluada.

NOTA: esperada / expected.

***Camaridium inauditum*****(Rchb.f.) M.A.Blanco***Maxillaria inaudita* Rchb.f.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

***Camaridium insolitum*****(Dressler) M.A.Blanco***Maxillaria insolita* Dressler

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes. 1500-2000 m.

RIS. No evaluada.

Colombia y Panamá.

*Misas 134* (HPUJ).***Camaridium latifolium*****Schltr.***Maxillaria planicola* C.Schweinf.,*Sauvetea planicola* (C.Schweinf.)

Szlach.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se encontraron

especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Camaridium microphyton*****(Schltr.) M.A.Blanco***Maxillaria microphyton* Schltr.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 1600 m.

CHO. No evaluada.

O Colombia a Costa Rica.

*Croat 49908* (MO).***Camaridium misasii*****(Christenson) M.A.Blanco***Maxillaria misasii* Christenson

Misas-Urreta 2005; Christenson 2009.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 100 m.

CHO. No evaluada.

*Misas 161* (HT: HPUJ).NOTA: ilustrada por Misas Urreta (2005) como *Maxillaria densa* / illustrated by Misas Urreta (2005) as *Maxillaria densa*.***Camaridium neglectum*****(Schltr.) M.A.Blanco***Maxillaria neglecta* (Schltr.)L.O.Williams, *Ornithidium neglectum* Schltr.Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 0-1650 m.

ANT, CUN. No evaluada.

*Schneider 424/1* (COL).***Camaridium ochroleucum*****Lindl.***Camaridium affine* Schltr.,*Maxillaria camaridii* Rchb.f.,*Maxillaria lutescens* Scheidw.,*Ornithidium album* Hook.

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Orinoquia, Pacífico. 10-1850 m.

ANT, CHO, GUV, NSA, VIC. No evaluada.

Guatemala a Brasil y Bolivia.

Brand 647 (JAUM, MO).

***Camaridium vestitum* (Sw.)**

**Lindl.**

*Camaridium micranthum* M.A.Blanco, *Camaridium purpureum* Spreng., *Cymbidium vestitum* (Sw.) Sw., *Epidendrum vestitum* Sw., *Maxillaria conferta* (Griseb.) León, *Maxillaria parviflora* (Poepp. & Endl.) Garay, *Maxillaria purpurea* Ames & Correll, *Ornithidium confertum* Griseb., *Ornithidium simulans* Ames & C.Schweinf., *Ornithidium vestitum* (Sw.) Rchb.f., *Scaphyglottis parviflora* Poepp. & Endl.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Pacífico. 0-1850 m.

BOY, CAQ, CHO, VAL, VAU. No evaluada.

América tropical.

Franco 1062 (AMES, COL, HPUJ, MO).

***Camaridium vinaceum***

**(Christenson) M.A.Blanco**

*Maxillaria vinacea* Christenson

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico.

CHO. No evaluada.

Serranía del Baudó.

Misas 323 (HT: HPUJ).

***Campylocentrum* Benth.**

12 especies

***Campylocentrum burchellii***

**Cogn.**

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 120 m.

VAU. No evaluada.

Suramérica.

Fernández 2027 (COL).

***Campylocentrum colombianum* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 70-1200 m.

CAU. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Madero *s.n.* (HT: AMES, B).

***Campylocentrum fasciola* (Lindl.) Cogn.**

*Aeranthus fasciola* (Lindl.) Rchb.f., *Angraecum fasciola* Lindl., *Angraecum weigeltii* Rchb.f., *Campylocentrum lankesteri* Ames, *Campylocentrum loretoense* Schltr., *Campylocentrum sullivanii* Fawc. & Rendle Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 100-250 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Belice a Venezuela y Perú.

Schultes 14638 (AMES, COL).

***Campylocentrum huebneri* Mansf.**

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia? 80-320 m.

AMA? No evaluada.

Venezuela a Perú.

NOTA: esperada / expected.

***Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe**

*Aeranthus micrantha* (Lindl.) Rchb.f., *Angraecum brevifolium* Lindl., *Angraecum micranthum* Lindl., *Campylocentrum kuntzei* Kuntze, *Campylocentrum peniculus* Schltr., *Campylocentrum stenanthum* Schltr.

Carnevali *et al.* 2001; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes, Caribe, Orinoquia, Pacífico. 120-1900 m.

ANT, CAS, CAU, CHO, CUN, GUJ, VAL. No evaluada.

Neotrópico.

Schneider 512 (COL, HPUJ).

***Campylocentrum pachyrrhizum* (Rchb.f.) Rolfe**

*Aeranthus pachyrrhiza* Rchb.f., *Campylocentrum rimbachii* Schltr.

Carnevali *et al.* 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. V Magdalena. 0-500 m.

CUN. No evaluada.

Neotrópico.

Chaparro 109 (COL).

***Campylocentrum panamense* Ames**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 10-1000 m.

CHO. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

Cárdenas 1133 (JAUM, MO).

***Campylocentrum poeppigii* (Rchb.f.) Rolfe**

*Angraecum poeppigii* Rchb.f.

Carnevali *et al.* 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia? 75-480 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Neotrópico.

NOTA: esperada / expected.

***Campylocentrum polystachyum* Rolfe**

*Angraecum polystachyum* Lindl.

Dodson & Dodson 1982.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 875-2500 m.

NAR? No evaluada.

Colombia a Perú.

NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Campylocentrum puyense*  
Dodson**

Dodson 2003.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 235 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Brasil.  
NOTA: citada para Colombia por Dodson (2003), sin cita de espécimen / cited from Colombia by Dodson (2003) but without citing a specimen.

***Campylocentrum robustum*  
Cogn.**

*Campylocentrum mattogrossense*  
Hoehne  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia?, Andes? 235-1200 m.  
PUT? No evaluada.  
Colombia a Brasil.

NOTA: esperada; recolectada en Sucumbíos (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Sucumbíos (Ecuador), near the border.

***Campylocentrum tyrridion*  
Foldats**

Romero-González & Carnevali 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 10-200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Catasetum Kunth***

34 especies, 8 especies endémicas

***Catasetum barbatum*  
(Lindl.) Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 200-220 m.  
VAU. No evaluada.  
Caribe, Amazonia.  
*Cuatrecasas 6960* (AMES, COL).

***Catasetum bergoldianum*  
Foldats**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Orinoquia. 200-300 m.  
VIC. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Spruce 3739* (K).

***Catasetum bicolor* Klotzsch**

*Catasetum gongoroides* Kraenzl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 50-200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Centroamérica y N Suramérica.  
*Escobar 1990: No. 40* (?).

***Catasetum blepharochilum*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Lehmann 1061* (LT: G).  
NOTA: registrada de Colombia, sin indicación de espécimen. El LT (*Lehmann 1061*, G) es de Costa Rica / recorded from Colombia with no specimen citation; the LT (*Lehmann 1061*, G) is from Costa Rica.

***Catasetum callosum* Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 400 m.  
MET. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Schmidt 99* (COL).

***Catasetum caucanum* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. V Cauca. 800-1100 m.  
VAL. No evaluada.  
*Lehmann 4205* (LT: G).

***Catasetum collare* Cogn.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 50-200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Escobar 1990: No. 45* (?).

***Catasetum cristatum* Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 50-1000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
N Suramérica, Trinidad y Tobago.  
NOTA: citada para Colombia por Carnevali (2003) / recorded from Colombia by Carnevali (2003).

***Catasetum discolor* (Lindl.)  
Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Orinoquia. 180-500 m.  
AMA, GUI, GUV, VAU. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Garay 105* (AMES, COL).

***Catasetum finetianum*  
L.Linden & Cogn.**

*Catasetum tabulare* var.  
*finetianum* (L.Linden & Cogn.)  
Mansf  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Linden s.n.* (T: BR).

NOTA: descrita de una planta en cultivo / described from a cultivated plant.

***Catasetum integerrimum***

**Hook.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe. 5-500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Colombia.

***Catasetum lindleyanum***

**Mansf.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann BT22* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Catasetum longifolium***

**Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 100-700 m.  
VAU. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Zarucchi 1700A* (COL).

***Catasetum lucis* P.Ortiz &**

**G.Arango**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 770 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1052* (HT: HPUJ).

***Catasetum macrocarpum***

**Kunth**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 50-200 m.  
VAU. No evaluada.

N Suramérica.

*Garay 121* (AMES).

***Catasetum maculatum***

**Kunth**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe. 350 m.  
BOL. No evaluada.  
México a Colombia.  
*Escobar 1990-1998: No. 754* (?).

***Catasetum maroaense***

**G.A.Romero & C.Gómez**

Hierba, epífita.  
Nativa. Guayana y Macarena?  
124 m.  
GUI? No evaluada.  
Colombia?, Venezuela.  
NOTA: esperada; recolectada  
en la orilla venezolana del río  
Guainía / expected; collected  
in the Venezuelan side of the  
Guainia River.

***Catasetum microglossum***

**Rolfe**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 500 m.  
AMA. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Idrobo 11303* (COL).

***Catasetum napoense* Dodson**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia? 500-550 m.  
PUT? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

***Catasetum naso* Lindl.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.

***Catasetum ochraceum* Lindl.**

*Catasetum inornatum* Schltr.,  
*Catasetum lehmannii* Regel  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 300-1700 m.  
CAU, CUN, TOL, VAL. No  
evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Cuatrecasas 25706* (COL).

***Catasetum pileatum* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Orinoquia. 50-200 m.  
ARA, MET, VIC. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Escobar 1990-1998: No. 39* (?).

***Catasetum planiceps* Lindl.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
50-500 m.  
VIC. No evaluada.  
Panamá y N Suramérica.

***Catasetum rectangulare***

**G.F.Carr**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Steuerwald s.n.* (USF).  
NOTA: descrita a partir de una  
planta cultivada, originaria de  
Colombia, sin localidad precisa  
/ described from a cultivated  
plant, originally from Colombia  
but without precise locality.

***Catasetum ×roseoalbum*  
(Hook.) Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
50-500 m.

MET, VIC. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Jiménez s.n.* (Herb. Unillanos).

***Catasetum saccatum* Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Orinoquia. 120-1000 m.  
MET. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Ortiz 271* (HPUJ).

***Catasetum sanguineum***

**Lindl. & Paxton**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Escobar 1990-1998: No. 747* (?).

***Catasetum tabulare* Lindl.**

*Catasetum rhamphastos* Kraenzl.  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 550-2000 m.  
ANT, CAL, CAU, CUN. No  
evaluada.  
*Schmidt 61* (COL).

***Catasetum ×tapiriceps***

**Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
50-150 m.  
GUI?, VIC. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.

***Catasetum tricorne* P.Ortiz**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 700 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1072* (HT: HPUJ).

***Catasetum tuberculatum***

**Dodson**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 300-  
1000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Escobar 1990-1998: No. 41* (?).

***Catasetum villegasii***

**G.F.Carr**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Amazonia. 400-600  
m.  
CAQ. No evaluada.  
Colombia.  
*Carr s.n.* (HT: USF).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Catasetum ×violascens***

**Rchb.f. & Warsz.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita, hemiepífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Perú.

***Catasetum viridiflavum***

**Hook.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe. 0-400 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia, Panamá, Perú.  
*Escobar 1990-1998: No. 752* (?).

***Cattleya* Lindl.**

10 especies, 8 especies endémicas

***Cattleya aurea* Linden**

*Cattleya dowiana* var. *aurea*  
(Linden) B.S.Williams &  
T.Moore  
Withner 1986; Calderón 2007.  
Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y  
cultivada. Andes, Pacífico. 50-  
1600 m.

ANT, CHO, CÓR, RIS.  
Vulnerable (Calderón-Sáenz  
2007).

*Pérez-Arbeláez s.n.* (COL).

NOTA: protegida mediante  
resolución del MADS, bajo el  
nombre *C. dowiana* / protected  
through an act of the MADS,  
under the name *C. dowiana*.

***Cattleya boissieri* R.Hogg**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: identidad incierta /  
identity uncertain.

***Cattleya candida* (Kunth)**

**F.Lehm.**

*Cattleya chochoensis* Linden &  
André, *Cattleya quadricolor*  
B.S.Williams, *Cattleya*  
*quadricolor* Bateman  
Withner 1986; Calderón 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada, Endémica y  
cultivada. Andes, V Cauca. 950-  
1700 m.  
QUI, RIS, VAL. No evaluada.  
Colombia.

**[*Cattleya eldorado* Linden]**

Calderón 2007.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea / record  
based on a misidentification.

**[*Cattleya gaskelliana***

**(N.E.Br.) B.S.Williams]**

Govaerts *et al.* 2014a.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea; endémica  
del E de la cordillera de la  
Costa, en Venezuela. No llega  
a O Venezuela / record based  
on a misidentification; endemic  
to E Cordillera de la Costain

Venezuela; does not reach W Venezuela.

***Cattleya ×hardyana***

**B.S. Williams**

Withner 1986; Calderón 2007.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y cultivada. Andes.

VAL. No evaluada.

Colombia.

**[*Cattleya luteola* Lindl.]**

Calderón 2007.

NOTA: registro basado en identificación errónea / record based on a misidentification.

**[*Cattleya maxima* Lindl.]**

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en identificación errónea.

Restringida a N Perú y S Ecuador / record based on a misidentification; restricted to N Peru and S Ecuador.

***Cattleya mendelii* Dombrain**

Withner 1986; Calderón 2007.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y cultivada. Andes. 1200-1800 m.

BOY, NSA, SAN. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

Cordillera Oriental.

***Cattleya percivaliana***

**(Rchb.f.) O'Brien**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Orinoquia? 1300-2000 m.

ARA?, NSA? Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

NE Colombia?, Venezuela.

NOTA: esperada; crece en los Andes venezolanos. Información no confirmada sugiere su presencia en la región del río Catatumbo / expected; grows in the Venezuelan Andes;

unconfirmed information suggest its presence in the Catatumbo River region.

**[*Cattleya rex* O'Brien]**

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en identificación errónea; especie de Perú y N Bolivia, cuyas poblaciones no llegan a Ecuador / record based on a misidentification; a species of Peru and N Bolivia, whose populations do not reach Ecuador.

***Cattleya schroederiae***

**(Rchb.f.) Sander**

Withner 1986; Calderón 2007.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y cultivada. Andes, Orinoquia. 500-1600 m.

ARA, BOY, CAS, CUN, MET. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Cordillera Oriental.

*Cadena* 284 (COL).

***Cattleya trianae* Linden & Rchb.f.**

*Cattleya bogotensis* Linden

Withner 1986; Calderón 2007.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y cultivada. Andes. 900-1800 m.

CUN, HUI, TOL. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Ospina-H.* 1177 (COL).

***Cattleya violacea* (Kunth)**

**Rolfe**

*Cattleya superba* Lindl.,

*Cymbidium violaceum* Kunth,

*Epidendrum superbum* (Lindl.)

Rchb.f., *Epidendrum violaceum* (Kunth) Rchb.f.

Calderón 2007.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 200-646 m.

AMA, ARA, CAQ, CAS, GUI, GUV, MET, PUT, VAU, VIC.

Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador.

*Cárdenas* 21512 (COAH).

***Cattleya warscewiczii* Rchb.f.**

*Cattleya gigas* Linden, *Cattleya sanderiana* H.Low

Withner 1986; Calderón 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 300-1600 m.

ANT, CAL, CÓR. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Cogollo* 2296 (HPUJ, JAUM).

***Caucaea* Schltr.**

5 especies, 1 especie endémica

***Caucaea nubigena* (Lindl.)**

**N.H. Williams & M.W. Chase**

*Oncidium nubigenum* Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2200 m.

NAR. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

***Caucaea olivacea* (Kunth)**

**N.H. Williams & M.W. Chase**

*Caucaea cucullata* (Lindl.)

N.H. Williams & M.W. Chase,

*Caucaea rhodosticta* (Kraenzl.)

N.H. Williams & M.W. Chase,

*Oncidium olivaceum* Kunth

Stacy 1975.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-3600 m.

CAU, NAR, QUI, TOL. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

*Ortiz* 144 (HPUJ).

***Caucaea phalaenopsis*****(Linden & Rchb.f.)****N.H. Williams & M.W. Chase***Caucaea dayana* (Rchb.f.)

N.H. Williams &amp; M.W. Chase,

*Oncidium dayanum* (Rchb.f.)

Stacy

Stacy 1975.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500 m.

NAR. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

Ortiz 845 (HPUJ).

***Caucaea radiata* (Lindl.)****Mansf.***Oncidium radiatum* (Lindl.)

Foldats

Lindley 1852.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2200-3000 m.

BOY, CAL, CAU, NAR, TOL. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Ecuador.

Grub 524 (COL, TOLI).

***Caucaea sanguinolenta*****(Lindl.) N.H. Williams &****M.W. Chase***Caucaea mimetica* (Stacy)

N.H. Williams &amp; M.W. Chase,

*Oncidium sanguinolentum*

(Lindl.) Schltr.

Stacy 1975.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500 m.

NSA, SAN. No evaluada.

Colombia, Venezuela.

Ortiz 836 (HPUJ).

***Caularthron* Raf.**

2 especies

***Caularthron bicornutum*****(Hook.) Raf.***Diacrium amazonicum* Schltr.,*Diacrium bicornutum* Benth.,*Epidendrum bicornutum* Hook.Carnevali & Ramírez-Morillo  
2003.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena,  
Orinoquia. 100-250 m.

GUI, VAU, VIC. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana,  
Trinidad-Tobago, Brasil.

Galeano 1882 (COL).

***Caularthron bilamellatum*****(Rchb.f.) R.E. Schult.***Caularthron indivisum* (Griseb.)Garay & Dunst., *Diacrium**bilamellatum* (Rchb.f.) Hemsl.,*Epidendrum bilamellatum*Rchb.f., *Epidendrum indivisum*

Griseb.

Carnevali & Ramírez-Morillo  
2003.

Hierba, epífita.

Nativa. Orinoquia, Pacífico.

0-175 m.

ARA, BOY, CHO, MET, NAR.

No evaluada.

México a Venezuela, Brasil,

Ecuador y Perú.

Gentry 9249 (K, MO).

***Chaubardia* Rchb.f.**

2 especies

***Chaubardia klugii*****(C. Schweinf.) Garay***Andinorchis klugii* (C. Schweinf.)Szlach. et al., *Cochleanthes**klugii* (C. Schweinf.) R.E. Schult.& Garay, *Zygopetalum klugii*

C. Schweinf.

Dodson &amp; Luer 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia?

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Ecuador, Perú.

NOTA: esperada; ampliamente  
distribuida en la Amazonia /  
expected; widely distributed in  
the Amazon.***Chaubardia surinamensis*****Rchb.f.***Hoehneella santos-nevesii* Ruschi

Romero-González 2003c;

Dodson &amp; Luer 2005.

Hierba, epífita.

Nativa.

SAN. No evaluada.

Colombia a Bolivia y Brasil.

Renz 4018 (RENZ).

***Chaubardiella* Garay**

3 especies, 1 especie endémica

***Chaubardiella pubescens*****Ackerman**

Dodson 1990c.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 200 m.

CHO. No evaluada.

Colombia.

Ackerman 1379 (HT: SEL).

***Chaubardiella subquadrata*****(Schltr.) Garay***Chaubardiella chasmatochila*(Fowlie) Garay, *Kefersteinia**subquadrata* Schltr., *Stenia**chasmatochila* Fowlie

Pupulin 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 0-1300  
m.

ANT, CHO. No evaluada.

Costa Rica a N Ecuador.

Misas 138 (COL).

***Chaubardiella tigrina* (Garay****& Dunst.) Garay***Chaubardia tigrina* Garay &

Dunst.

Romero-González 2003d;

Dodson &amp; Luer 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia? 400-800 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Ecuador, Perú,

Venezuela, Surinam.

NOTA: esperada; distribuida en gran parte de la Amazonia / expected; distributed throughout much of the Amazon.

***Chelyorchis* Dressler & N.H. Williams**

1 especie

***Chelyorchis ampliata* (Lindl.) Dressler & N.H. Williams**

*Oncidium bernoullianum*  
Kraenzl.

Carnevali *et al.* 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Caribe, Pacífico. 0-500 m.

ANT, ATL, MAG. No evaluada.

Nicaragua a N Colombia.

*Elías 1181* (AMES, US).

NOTA: el género *Chelyorchis* ha sido incluido en *Rossioglossum* (Chase *et al.* 2008), pero todavía no hay una combinación bajo *Rossioglossum* para *Chelyorchis ampliata* / the genus *Chelyorchis* has been included in *Rossioglossum* (Chase *et al.* 2008) but there is still no combination under *Rossioglossum* for *Chelyorchis pardoi*.

***Chondrorhyncha* Lindl.**

3 especies, 2 especies endémicas

***Chondrorhyncha caquetae* Fowlie**

Dressler & Dalström 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia. 242 m.

CAQ. No evaluada.

*Schmidt-Mumm s.n.* (HT: LA).

***Chondrorhyncha inedita* Dressler & Dalström**

Dressler & Dalström 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2000 m.

NSA. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Schlim 34* (G).

***Chondrorhyncha macronyx* Kraenzl.**

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Caribe. 17 m.

ANT. No evaluada.

*Kalbreyer 1755* (HT: B, destruido).

NOTA: especie dudosa; no es seguro que se trate de una *Chondrorhyncha*; P. Harding cree que puede ser una *Kefersteinia*. Dado que no hay dibujo, y el tipo aparentemente se quemó en Berlín, nunca se podrá resolver este problema / dubious species; is not certain that it is indeed a *Chondrorhyncha*; P. Harding believes it could be a *Kefersteinia*; as there is no drawing and type was apparently burned in Berlin, this problem will never be solved.

***Chondroscaphe* (Dressler) Senghas & G.Gerlach**

5 especies, 2 especies endémicas

***Chondroscaphe amabilis* (Schltr.) Senghas & G.Gerlach**

*Chondrorhyncha amabilis* Schltr.

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1250-1400 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Escobar RE8025* (M).

***Chondroscaphe chestertonii* (Rchb.f.) Senghas & G.Gerlach**

*Chondrorhyncha chestertonii*

Rchb.f.

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1450 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cogollo 6948* (JAUM).

***Chondroscaphe dabeibaensis* P.A.Harding**

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Dodson 19007* (HT: MO).

***Chondroscaphe escobariana* (Dodson & Neudecker)**

**Rungius**

*Chondrorhyncha escobariana*

Dodson & Neudecker

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Dodson 19000* (HT: JAUM).

***Chondroscaphe flaveola* (Linden & Rchb.f.) Senghas & G.Gerlach**

*Chondrorhyncha fimbriata*

(Linden & Rchb.f.) Rchb.f.,

*Chondrorhyncha flaveola* (Linden

& Rchb.f.) Garay, *Chondroscaphe*

*fimbriata* (Linden & Rchb.f.)

Dressler, *Kefersteinia flaveola*

(Linden & Rchb.f.) Schltr., *Stenia*

*fimbriata* Linden & Rchb.f.,

*Zygopetalum flaveolum* Linden & Rchb.f.

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-1500 m.

NSA. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Schlim 42* (G).

***Christensonella* Szlach. et al.**

2 especies

***Christensonella subulifolia* (Schltr.) S.Koehler**

*Maxillaria subulifolia* Schltr.  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Pacífico. 250 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
E Panamá a Ecuador.  
*Misas* 266 (HPUJ).

***Christensonella uncata* (Lindl.) Szlach. et al.**

*Maxillaria macleei* Lindl.,  
*Maxillaria uncata* Lindl.  
Idárraga et al. 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia,  
Guayana y Macarena, Orinoquia,  
Pacífico. 10-700 m.  
AMA, ANT, CHO, GUV, VAL.  
No evaluada.  
México a Brasil y Bolivia.  
*Schultes* 13812 (COL).

***Chysis* Lindl.**

2 especies

***Chysis aurea* Lindl.**

Govaerts et al. 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1255 m.  
CUN. No evaluada.  
Panamá a Venezuela.  
*Chaparro* 158 (COL).

***Chysis bruennowiana* Rchb.f. & Warsz.**

Idárraga et al. 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1000 m.  
ANT. No evaluada.  
Nicaragua a N Perú.  
*Escobar* 1241 (AMES).

***Cischweinfia* Dressler & N.H.Williams**

6 especies, 2 especies endémicas

***Cischweinfia colombiana***

**Garay**  
Garay 1973b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1050-1535 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar* 1004 (HT: AMES).

***Cischweinfia dasyandra* (Rchb.f.) Dressler & N.H.Williams**

*Trichopilia dasyandra* Rchb.f.  
Dressler & Dalström 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
RIS. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Dodson* 19016 (MO, RPSC).

***Cischweinfia parva* (C.Schweinf.) Dressler & N.H.Williams**

*Miltonia parva* C.Schweinf.  
Dressler & Dalström 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.

***Cischweinfia platychila***

**Garay**  
*Cischweinfia platychila* f. *palatina*  
Tessmer  
Garay 1972.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
ANT, SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar* 889 (HT: AMES).

***Cischweinfia pusilla* (C.Schweinf.) Dressler & N.H.Williams**

*Aspasia pusilla* C.Schweinf.  
Dressler & Dalström 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.

***Cischweinfia rostrata* Dressler & N.H.Williams**

Dressler & Dalström 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1560 m.  
RIS. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Escobar* 259 (AMES).

***Cleistes* Lindl.**

7 especies, 2 especies endémicas

***Cleistes acuminata* Schltr.**

*Pogonia acuminata* Schltr.  
Govaerts et al. 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz* 1067 (HPUJ).

***Cleistes costaricensis* Christenson**

Govaerts et al. 2014a.  
Hierba.  
Nativa.  
ANT. No evaluada.  
NO Colombia a Costa Rica.

***Cleistes elegantula* (Schltr.) Schltr.**

*Pogonia elegantula* Schltr.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (B, destruido).

***Cleistes moritzii* (Rchb.f.)**

**Garay & Dunst.**

*Pogonia moritzii* Rchb.f.

Escobar, R. 1990-1998; Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

***Cleistes rosea* Lindl.**

*Cleistes venusta* (Schltr.) Schltr.,

*Pogonia rosea* (Lindl.) Rchb.f.,

*Pogonia venusta* Schltr.

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes,

Pacífico. 100-2205 m.

ANT, BOY, CAQ, CAU, CHO,

CUN, PUT, VAL. No evaluada.

Neotrópico.

Ortiz 120 (HPUJ).

***Cleistes tenuis* (Rchb.f.)**

**Schltr.**

*Pogonia tenuis* Griseb.

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes,

Guayana y Macarena. 100-1140 m.

AMA, ANT, VAU. No evaluada.

Neotrópico.

Schultes 12388 (AMES, COL).

***Cleistes triflora***

**(C.Schweinf.) Carnevali & I.Ramírez**

*Pogonia triflora* C.Schweinf.

Carnevali 2003.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

***Clowesia* Lindl.**

1 especie

**[*Clowesia russelliana***

**(Hook.) Dodson]**

Ortiz 1995.

NOTA: registro basado en identificación errónea; crece de México a Nicaragua / record based on a misidentification; grows from Mexico to Nicaragua.

***Clowesia warczewitzii* (Lindl. & Paxton) Dodson**

*Catasetum warczewitzii* Lindl. & Paxton

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Caribe,

Pacífico. 0-450 m.

CHO, VAU. No evaluada.

Costa Rica a Venezuela.

Misas 191 (HPUJ).

***Coccineorchis* Schltr.**

3 especies

***Coccineorchis cernua* (Lindl.)**

**Garay**

*Coccineorchis corymbosa*

(Kraenzl.) Schltr., *Spiranthes*

*coccinea* Garay, *Spiranthes*

*corymbosa* Kraenzl.,

*Stenorrhynchos cernuum* Lindl.

Garay 1978; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa y cultivada. Andes. 1800-3200 m.

ATL, BOY, CAU, CHO, CUN,

RIS, VAL. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia.

Dueñas 3108 (COL).

NOTA: un espécimen de Atlántico (60 m) es cultivado / a specimen from Atlántico (60 m) is cultivated.

**[*Coccineorchis cristata***

**Szlach. et al.]**

Dueñas & Fernández 2009.

NOTA: señalada como esperada, aunque solo se encuentra

de Costa Rica a C Panamá / recorded as expected but is only found from Costa Rica to C Panama.

***Coccineorchis navarrensis* (Ames) Garay**

*Stenorrhynchos navarrensis* Ames

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes, Pacífico. 500-

1450 m.

CHO. No evaluada.

Colombia a Nicaragua.

Gentry 17357 (COL).

***Coccineorchis standleyi***

**(Ames) Garay**

*Spiranthes standleyi* (Ames)

L.O.Williams, *Stenorrhynchos*

*standleyi* Ames

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Centroamérica.

NOTA: registrada de Colombia, sin indicación de espécimen / recorded from Colombia with no specimen citation.

***Cochleanthes* Raf.**

1 especie

***Cochleanthes flabelliformis***

**(Sw.) R.E.Schult. & Garay**

*Epidendrum flabelliforme* Sw.,

*Warczewiczella flabelliformis*

(Sw.) Cogn., *Zygopetalum*

*flabelliforme* (Sw.) Rchb.f.

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500 m.

MET. No evaluada.

México a Venezuela y Ecuador; Caribe.

Renz 3887 (RENZ).

***Coeliopsis* Rchb.f.**

1 especie

***Coeliopsis hyacinthosma*  
Rchb.f.**

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 100-500 m.

CAU, CHO. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).

Costa Rica a NO Ecuador.

***Cohniella* Pfitzer**

5 especies, 1 especie endémica

***Cohniella aguirrei* (Königer)****Königer***Stilifolium aguirrei* Königer,  
*Trichocentrum aguirrei* (Königer)  
M.W.Chase & N.H.Williams  
Königer & Pongratz 1999; Cetzal  
& Carnevali 2010.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, V Magdalena.  
200-1200 m.BOY, CUN, HUI, SAN. No  
evaluada.Königer 95 (HT: M; IT: JAUM, K,  
Herb. Königer).**[*Cohniella ascendens* (Lindl.)  
Christenson]**

Ortiz 1995.

NOTA: registro basado en  
material de Nicaragua; crece  
de N México a SE Costa Rica /  
record based on material from  
Nicaragua; grows from N Mexico  
to SE Costa Rica.***Cohniella cebolleta* (Jacq.)  
Christenson***Epidendrum cebolleta* Jacq.,  
*Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw.,  
*Trichocentrum cebolleta* (Jacq.)  
M.W.Chase & N.H.Williams  
Carnevali *et al.* 2010; Cetzal &  
Carnevali 2010; Cetzal-Ix *et al.*  
2013.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Caribe,  
Orinoquia, SN Santa Marta, V  
Magdalena. 0-900 m.ANT, ARA, BOY, CAS, CES,  
GUJ, MAG, MET, NSA, SAN,  
VIC. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Fonnegra* 7103 (HUA).***Cohniella croizatii* Cetzal &  
Carnevali**

Cetzal &amp; Carnevali 2010.

Hierba, epífita.

Nativa. Orinoquia? 80 m.

VIC? No evaluada.

E Colombia?, S Venezuela.

NOTA: esperada; recolectada  
en Venezuela, a lo largo del  
Orinoco, justo en la frontera /  
expected; collected in Venezuela  
along the Orinoco, just at the  
border.***Cohniella helicantha*  
(Kraenzl.) Cetzal &  
Carnevali***Cohniella teres* (Ames &  
C.Schweinf.) Christenson,  
*Oncidium helicanthum* Kraenzl.,  
*Trichocentrum teres* (Ames &  
C.Schweinf.) M.W.Chase &  
N.H.Williams

Cetzal &amp; Carnevali 2010.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Nicaragua a Colombia.NOTA: conocida en Colombia  
solo del tipo, sin datos de  
localidad / known in Colombia  
only from the type, without  
locality data.***Cohniella nuda* (Lindl.)  
Christenson***Oncidium nudum* Lindl.,  
*Trichocentrum nudum* (Lindl.)  
M.W.Chase & N.H.Williams  
Carnevali *et al.* 2010.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Caribe, Pacífico,  
SN Santa Marta, V Magdalena.  
0-1200 m.ANT, ATL, BOL, CES, CHO,  
CÓR, MAG, NSA, SUC. No  
evaluada.

Panamá a Venezuela.

*López* 4729 (HUA).**[*Cohniella stipitata* (Benth.)  
Christenson]**

Ortiz 1995.

NOTA: registro basado en  
material de Panamá. Conocida  
solo de áreas cercanas al Canal  
de Panamá / record based on  
specimens from Panama; known  
only from areas near the Panama  
Canal.***Comparettia* Poepp. & Endl.**

11 especies, 5 especies endémicas

***Comparettia auriculata*  
(Rchb.f.) M.W.Chase &  
N.H.Williams***Scelochilus auriculatus* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Ecuador, Colombia?NOTA: "América tropical  
occidental" / "Tropical West  
America".***Comparettia blankei*  
(Senghas) M.W.Chase &  
N.H.Williams***Scelochilus blankei* Senghas  
Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

PUT. No evaluada.

*Hiller s.n.* (HT: HEID).

***Comparettia carinata* (Rolfe)  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Scelochilus carinatus* Rolfe  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Ecuador, Colombia?  
NOTA: "América meridional andina" / "Andean South America".

***Comparettia falcata* Poepp.  
& Endl.**

*Comparettia pulchella* Schltr.,  
*Comparettia rosea* Lindl.  
Bock 1986.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2240 m.  
ANT, BOY, CAU, CUN, QUI,  
RIS, SAN, VAL. Preocupación  
Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
México a Brasil y Bolivia;  
Antillas.  
*Langenheim* 3302 (COL, HUPJ).  
*Comparettia falcata* var. *paulensis*  
(Cogn.) I.Bock

***Comparettia ignea* P.Ortiz**

Ortiz 1993.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1450-1600 m.  
ANT. En Peligro Crítico  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Ortiz* 1051 (JAUM).

***Comparettia langlassei*  
(Schltr.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Scelochilus langlassei* Schltr.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400-2500 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Langlassé* 93 (HT: K).

***Comparettia macroplectron*  
Rchb.f. & Triana**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1350-3000 m.  
BOY, CUN, HUI, MET.  
Preocupación Menor (Calderón-  
Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Uribe* 1938 (COL).

***Comparettia micrantha*  
(Poepp. & Endl.) M.W.Chase  
& N.H.Williams**

*Diadenium micranthum* Poepp.  
& Endl.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Ortiz* 1101 (HPUJ).

***Comparettia ottonis*  
(Klotzsch) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Scelochilus ottonis* Klotzsch  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700-2050 m.  
CUN, VAL. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Ortiz* 65 (COL).

***Comparettia palatina*  
(Senghas *et al.*) M.W.Chase  
& N.H.Williams**

*Scelochilus palatinus* Senghas *et al.*  
Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Senghas* 960 (HT: HEID).

***Comparettia variegata*  
(Cogn.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Comparettia escobariana*  
(Senghas) M.W.Chase &

N.H.Williams, *Scelochilus  
escobarianus* Senghas, *Scelochilus  
variegatus* Cogn.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Escobar* 4084 (JAUM, HT de S.  
*escobarianus*).

***Coryanthes* Hook.**

13 especies, 3 especies endémicas

***Coryanthes bruchmuelleri*  
Rchb.f.**

*Coryanthes balfouriana* Sander,  
*Coryanthes bungerothii* Rolfe  
Gerlach & Schill 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1202 m.  
NSA. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia y Venezuela.

***Coryanthes elegantium*  
Linden & Rchb.f.**

*Coryanthes elegantissima* Mast.,  
*Coryanthes wolfii* F.Lehm.  
Gerlach 1991; Idárraga *et al.*  
2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
ANT?, CHO, NAR. Casi  
Amenazada (Calderón-Sáenz  
2007).  
Colombia y Ecuador.

***Coryanthes flava* G.Gerlach**

Gerlach & Schill 1993.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 10 m.  
CHO. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Taggesell s.n.* (HT: HEID).

***Coryanthes leucocorys* Rolfe**

Gerlach 1994a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 100-1000 m.

AMA, ANT, NSA, PUT. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Perú.

***Coryanthes macrantha* (Hook.) Hook.***Gongora macrantha* Hook.

Gerlach &amp; Schill 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes.

GUI. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Amazonia, Trinidad.

***Coryanthes mastersiana*****F.Lehm.**

Gerlach 1991.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico, SN Santa Marta, V Magdalena. 400-570 m.

ANT, CAU, CHO, MAG, QUI, VAL. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Ecuador.

*Ramírez 659* (JAUM).***Coryanthes misasii*****G.A.Romero & G.Gerlach**

Gerlach 1991.

Hierba, epífita.

Nativa. Caribe. 500-1000 m.

ANT. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Panamá.

*Escobar 1103* (HT: AMES).***Coryanthes panamensis*****G.Gerlach**

Ortiz 2009a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, V Magdalena. 800-1000 m.

ANT. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Panamá.

*Giraldo 659* (HUA, JAUM).***Coryanthes seegeri*****G.Gerlach**

Gerlach &amp; Schill 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia.

PUT. No evaluada.

Colombia y Perú.

*Acosta s.n.* (JAUM).***Coryanthes senghasiana*****G.Gerlach***Coryanthes miuaensis* M.F.Silva & A.T.Oliveira

Gerlach 1994a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 180 m.

PUT, VAU. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Amazonia.

*Thiv s.n.* (COL).***Coryanthes toulemondiana*****G.Gerlach & T.Franke**

Gerlach 1994a.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia. 180 m.

CAQ, PUT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Seeger s.n.* (HT: M).***Coryanthes vieirae*****G.Gerlach**Gerlach & Schill 1993; Barros *et al.* 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia.

GUV. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Vieira s.n.* (HT: HEID).***Coryanthes villegasiana*****Peláez**

Peláez 2006.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800-1100 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Peláez NP0059* (HT: HUA; IT: HUA).***Corymborkis Thouars***

2 especies

***Corymborkis flava* (Sw.)****Kuntze***Serapias flava* Sw.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico, SN Santa Marta. 300-1900 m.

CAL, CHO, MAG, QUI, SAN. No evaluada.

América tropical.

*Lozano 7551* (COL).***Corymborkis forcipigera* (Rchb.f. & Warsz.)****L.O.Williams***Macrostylis forcipigera* Rchb.f. & Warsz.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1830-1925 m.

CUN, QUI. No evaluada.

México a Colombia; Caribe.

*Uribe 4909* (COL).***Cranichis* Sw.**

17 especies, 1 especie endémica

***Cranichis antioquiensis*****Schltr.***Cranichis curtii* Schltr., *Cranichis irazuensis* Schltr.

Garay 1978; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1730-3100 m.

ANT, BOY, CAU, CES, CUN,  
MAG, NAR, VAL. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador y  
Venezuela.

*Huertas 1120* (COL).

***Cranichis brachyblephara*  
Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 3000 m.

CAU. No evaluada.

*Madero s.n.* (T: destruido?).

NOTA: conocida solo del tipo.  
Identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Cranichis calva* (Kraenzl.)  
Schltr.**

*Ponthieva calva* Kraenzl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2100-3200 m.

CAU, NAR, TOL. No evaluada.

Colombia y Perú.

*Fernández-Pérez 5882* (COL).

***Cranichis ciliata* Kunth**

*Cranichis atrata* Schltr., *Cranichis*  
*mandonii* Schltr., *Cranichis*  
*pleioneura* Schltr., *Cranichis*  
*polyblephara* Schltr., *Cranichis*  
*schlimii* Rchb.f., *Cranichis sororia*  
Schltr., *Ophrys ciliata* Kunth

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1750-3540 m.

ANT, BOY, CAU, CHO, CUN,  
HUI, MAG, NAR, RIS, VAL. No  
evaluada.

Centro y Suramérica.

*Bernal 1648* (COL).

***Cranichis crumenifera* Garay**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2600-2700 m.

CUN. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Schneider 643* (HT: COL; IT:  
AMES).

NOTA: en Colombia solo se  
conoce el tipo / known in  
Colombia only from the type.

***Cranichis diphylla* Sw.**

*Cranichis monophylla* Lindl.,

*Cranichis nigrescens* Schltr.,

*Cranichis ovatilabia* Schltr.,

*Cranichis pittieri* Schltr.,

*Cranichis stictophylla* Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 1750-3550 m.

ANT, BOY, CAU, CES, CUN,  
GUJ, NAR, NSA, PUT, SAN,  
TOL. No evaluada.

Centroamérica y N Suramérica.

*Dueñas 3088* (COL).

***Cranichis engelii* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2010-2800 m.

ANT, CUN. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Zarucchi 5177* (COL, HUA,  
MO).

***Cranichis gibbosa* Lindl.**

*Cranichis ecuadorensis* Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes? 1800-2600 m.

NAR? No evaluada.

Colombia y Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la

frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Cranichis lehmanniana*  
(Kraenzl.) L.O. Williams**

*Cranichis cucullata* Schltr.,  
*Cranichis pastoensis* Schltr.,  
*Goodyera lehmanniana* Kraenzl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2200-3333 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, NAR,  
PUT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cuatrecasas 11957* (COL).

***Cranichis lehmannii* Rchb.f.**

*Cranichis cylindrostachys* Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 1000-1850 m.

ANT. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Callejas 9899* (HUA).

***Cranichis muscosa* Sw.**

*Cranichis bradei* Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes, Islas Caribeñas,  
Pacífico, V Magdalena. 100-2090  
m.

ANT, BOY, CHO, NSA, QUI,  
SAP. No evaluada.

Estados Unidos a Brasil; Caribe.

*Arévalo 827* (COL).

***Cranichis parvula* Renz**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes, Orinoquia. 500-  
700 m.

BOY, MET. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Renz 4124 (T: ?).

NOTA: conocida en Colombia solo de dos colecciones / known in Colombia only from two collections.

***Cranichis picta* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.

Nativa. Andes. 2800-3900 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Ortiz 4153 (HPUJ).

***Cranichis polyantha* Schltr.**

*Cranichis calva* var. *vargasii* C.Schweinf., *Cranichis polyantha* var. *caquetaensis* Renz

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 1450-2700 m.

CAQ, CAU. No evaluada.

Panamá a Perú.

Madero 22 (AMES).

***Cranichis pulvinifera* Garay**

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2500 m.

PUT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Bristol 1227 (HT: AMES).

NOTA: conocida en Colombia solo del tipo / known in Colombia only from the type.

***Cranichis tenuis* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 1750 m.

ANT. No evaluada.

Estados Unidos a Venezuela; Caribe.

Ortiz 655 (HPUJ).

NOTA: conocida en Colombia de una sola colección / known in Colombia from a single collection.

***Cranichis wagneri* Rchb.f.**

*Cranichis costaricensis* Schltr., *Cranichis pilosa* Fawc. & Rendle, *Cranichis subcordata* Schltr., *Cranichis viereckii* Ames

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 1200-2800 m.

ANT, CES, HUI, QUI. No evaluada.

Centroamérica a Venezuela.

Callejas 6374 (HUA).

***Crossoglossa* Dressler & Dodson**

7 especies, 4 especies endémicas

***Crossoglossa acuminatissima***

**Nog.-Sav. & Carnevali**

Noguera-Savelli *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2550 m.

SAN. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

Luer 10196 (MO).

NOTA: conocida en Colombia solo del tipo / known in Colombia only from the type.

***Crossoglossa exigua* (Garay)**

**Nog.-Sav. & G.A.Romero**

*Malaxis tipuloides* var. *exigua*

Garay

Garay 1958.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

Grant 9456 (AMES).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Crossoglossa kalbreyeriana***

**(Kraenzl.) P.Ortiz**

*Microstylis kalbreyeriana* Kraenzl.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

ANT. No evaluada.

Kalbreyer 1794 (B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Crossoglossa liparidoides***

**(Finet) Dodson**

*Microstylis liparidoides* Finet

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900-2700 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

Killip 33775 (US).

***Crossoglossa longissima***

**(Kraenzl.) P.Ortiz**

*Microstylis longissima* Kraenzl.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600-2700 m.

ANT. No evaluada.

Kalbreyer 1754 (B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Crossoglossa polyblephara***

**(Schltr.) Dodson**

*Microstylis polyblephara* Schltr.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

PUT. No evaluada.

Colombia.

Hopp 166 (B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Crossoglossa tipuloides***

**(Lindl.) Dodson**

*Microstylis tipuloides* Lindl.

Williams & Allen 1980; Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Nicaragua a Ecuador.

### ***Cryptarrhena* R.Br.**

2 especies

#### ***Cryptarrhena guatemalensis***

##### **Schltr.**

*Cryptarrhena acensis* Schltr.,  
*Cryptarrhena ghillanyi* Pabst,  
*Cryptarrhena quadricornu*  
Kraenzl.  
Ortiz 1994b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100-300 m.  
CHO, CUN, MET. No evaluada.  
América tropical.  
*Renz 3017* (RENZ).

#### ***Cryptarrhena lunata* R.Br.**

*Clinhymenia pallidiflora*  
A.Rich. & Galeotti,  
*Cryptarrhena brasiliensis* Brade,  
*Cryptarrhena kegelii* Rchb.f.,  
*Cryptarrhena pallidiflora*  
(A.Rich. & Galeotti) Rchb.f.,  
*Cryptarrhena unguiculata* Schltr.,  
*Orchidofunckia pallidiflora*  
A.Rich. & Galeotti  
Ortiz 1994b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 320-700 m.  
ANT, MET. No evaluada.  
México a Perú.  
*Renz 3015* (RENZ).

### ***Cryptocentrum* Benth.**

11 especies, 2 especies endémicas

#### ***Cryptocentrum escobarii***

##### **Carnevali**

Carnevali 1996; Carnevali 2001.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2700 m.

ANT, CHO. No evaluada.  
*Carnevali 4151* (IT: MES, JAUM,  
SEL, VEN).

NOTA: a veces erróneamente  
escrito *escobarii* / sometimes  
misspelled *escobarii*.

#### ***Cryptocentrum flavum***

##### **Schltr.**

*Cryptocentrum peruvianum* auct.  
non (Cogn.) C.Schweinf.  
Carnevali 1996; Carnevali 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0-400 m.  
CAU, CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Pittier 591* (HT: US).

#### **[*Cryptocentrum gracillimum***

##### **Ames & C.Schweinf]**

Govaerts *et al.* 2014a.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea / record  
based on a misidentification.

#### ***Cryptocentrum***

##### ***inaequisepalum* C.Schweinf.**

*Cryptocentrum jamesonii* auct.  
non Benth.  
Carnevali 1996; Carnevali 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Lehmann 4241* (G).

#### ***Cryptocentrum latifolium***

##### **Schltr.**

*Cryptocentrum latifolium* var.  
*brachypetalum* Garay  
Carnevali 1996; Carnevali 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico, V Cauca.  
0-1200 m.  
ANT, CAU, CHO, NAR, VAL.  
No evaluada.  
Nicaragua a Ecuador.  
*Cuatrecasas 21571* (F).

#### ***Cryptocentrum lehmannii***

##### **(Rchb.f.) Garay**

*Aeranthus lehmannii* Rchb.f.,  
*Campylocentrum lehmannii*  
(Rchb.f.) Schltr., *Cryptocentrum*  
*gracilipes* Schltr., *Cryptocentrum*  
*jamesonii* Benth.  
Carnevali 1996; Carnevali 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2500 m.  
ANT, BOY, CHO, NAR, VAL. No  
evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Cogollo 3244* (JAUM).

#### ***Cryptocentrum longipetalum***

##### **Carnevali**

Carnevali 1996; Carnevali 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2300 m.  
CAU, CHO. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Lehmann 587* (K).

#### ***Cryptocentrum misasii***

##### **P.Ortiz & Carnevali**

Misas-Urreta 2005; Carnevali *et al.* 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 800-1000 m.  
CHO. No evaluada.  
Serranía del baidó.  
*Misas-Urreta 268* (HT: HPUJ).

#### **[*Cryptocentrum pergracile***

##### **Schltr.]**

Govaerts *et al.* 2014a.  
NOTA: conocida solo de la  
descripción original. Podría  
ser coespecífica con *C.*  
*inaequisepalum* / known only  
from the original description;  
might be conspecific with *C.*  
*inaequisepalum*.

#### ***Cryptocentrum peruvianum***

##### **(Cogn.) C.Schweinf.**

*Centroglossa peruviana* Cogn.,  
*Cryptocentrum hoppii* Schltr.

Carnevali 1996; Carnevali 2001.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Guayana y  
Macarena, Pacífico, V Cauca.  
200-1800 m.

ANT, BOY, CAQ, CAU. No  
evaluada.

Venezuela a Perú.

Ramírez 4119 (JAUM, MO).

*Cryptocentrum peruvianum*  
subsp. *minus* (Schltr.) Carnevali

***Cryptocentrum roseans*  
(Schltr.) A.D.Hawkes**

*Anthosiphon roseans* Schltr.

Carnevali 1996; Carnevali 2001;  
Whitten *et al.* 2006; Blanco *et al.*  
2007a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500 m.

ANT. No evaluada.

Colombia, Panamá.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

***Cryptocentrum silverstonei*  
Carnevali**

Carnevali 1996; Carnevali 2001.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400-2425 m.

VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

*Silverstone 2750* (MO).

**[*Cryptocentrum spathaceum*  
Dodson]**

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en  
identificación errónea / record  
based on a misidentification.

***Cryptocentrum standleyi*  
Ames**

*Cryptocentrum longiscapum*  
Brieger

Carnevali 1996; Carnevali 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico, V Cauca.  
0-1310 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

*Cogollo 3105* (JAUM).

***Cuitlauzina La Llave & Lex.***

1 especie

***Cuitlauzina egertonii***

(Lindl.) Dressler &  
N.H.Williams

*Odontoglossum candidum*  
Linden & André, *Osmoglossum*  
*candidum* (Linden & André)  
Garay

Linden & André 1875.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

CAU. No evaluada.

Colombia a México.

*Linden s.n.* (?).

NOTA: conocida solo de un  
especimen, recolectado en  
1875; herbario no especificado /  
known only from one specimen  
collected in 1875. Herbarium not  
indicated.

***Cybebus Garay***

1 especie

***Cybebus grandis* Garay**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 1600-1800 m.

CAU, RIS. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Sneidern 731* (HT: S).

***Cyclopogon C.Presl***

14 especies

***Cyclopogon argyrotaenius*  
Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

**[*Cyclopogon bicolor* (Ker  
Gawl.) Schltr.]**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

NOTA: registro basado en  
identificación errónea; no  
hay ninguna evidencia de su  
presencia en Colombia; es de  
Brasil y Argentina / record based  
on a misidentification; there is  
no evidence of its presence in  
Colombia; is from Brazil and  
Argentina.

***Cyclopogon cranichoides*  
(Griseb.) Schltr.**

*Beadlea cranichoides* (Griseb.)  
Small, *Beadlea storeri*  
(Chapm.) Small, *Cyclopogon*  
*nigricans* (Schltr.) Schltr.,  
*Pelexia cranichoides* Griseb.,  
*Sauroglossum cranichoides*  
(Griseb.) Ames, *Spiranthes*  
*cranichoides* (Griseb.) Cogn.,  
*Spiranthes storeri* Chapm.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Centroamérica y N Suramérica;  
Caribe.

NOTA: esperada / expected.

***Cyclopogon elatus* (Sw.)  
Schltr.**

*Beadlea elata* (Sw.) Small,  
*Cyclopogon densiflorus* Schltr.,  
*Gyrostachys haenkeana* Kuntze,  
*Ibidium elatum* (Sw.) Salisb.,  
*Neottia elata* (Sw.) Sw., *Neottia*  
*minor* Jacq., *Sarcoglottis elata*  
(Sw.) P.N.Don, *Satyrium elatum*

Sw., *Sauroglossum richardii*  
Ames, *Spiranthes elata* var. *ovata*  
Cogn., *Spiranthes variegata*  
Kraenzl.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Cauca. 1000-  
2926 m.  
ANT, CUN, NAR, SAN, VAL.  
No evaluada.  
Estados Unidos a Suramérica;  
Caribe.  
*Bernal 1158* (COL).

***Cyclopogon epiphyticus*  
(Dodson) Dodson**

*Beadlea epiphytica* Dodson  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 880-1100 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador, Costa Rica.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), a 350 m de la  
frontera / expected; collected in  
Carchi (Ecuador), 350 m from  
the border.

***Cyclopogon hennisianus*  
(Sandt) Szlach.**

*Beadlea hennisiana* (Sandt)  
Garay, *Stenorrhynchos*  
*hennisianus* Sandt  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa.  
TOL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Hennis s.n.* (HT: M).  
NOTA: conocida en Colombia  
solo del tipo / known in  
Colombia only from the type.

***Cyclopogon lindleyanus*  
(Link et al.) Schltr.**

*Beadlea lindleyana* (Link et  
al.) Garay & Dunst., *Spiranthes*  
*lindleyana* Link et al.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1860 m.  
CUN. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Ortiz 176* (HPUJ).  
NOTA: conocida en Colombia  
de una sola colección / known  
in Colombia from a single  
collection.

***Cyclopogon maldonadoanus*  
Dodson**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 2500 m.  
NAR? No evaluada.  
S Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Cyclopogon millei* (Schltr.)  
Schltr.**

*Beadlea millei* (Schltr.) Garay,  
*Spiranthes millei* Schltr.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
NOTA: esperada / expected.

***Cyclopogon olivaceus* (Rolfe)  
Schltr.**

*Beadlea olivacea* (Rolfe) Garay,  
*Cyclopogon stictophyllus* Schltr.,  
*Sarcoglottis olivacea* (Rolfe)  
Schltr., *Spiranthes olivacea* Rolfe  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2150-2900 m.  
ANT, CUN. No evaluada.

Guatemala a Perú y Guayanas.  
*Forero 7464* (COL).

***Cyclopogon ovalifolius*  
C.Presl**

*Gyrostachys ovalifolia* (C.Presl)  
Kuntze, *Spiranthes preslii* Lindl.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1450-2100 m.  
ANT, CAQ, CAU, NAR. No  
evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú, Costa  
Rica.  
*Acevedo 7* (COL).

***Cyclopogon peruvianus*  
(C.Presl) Schltr.**

*Beadlea peruviana* (C.Presl)  
Garay, *Cyclopogon maderoi*  
Schltr., *Cyclopogon minutiflorus*  
(Rchb.f.) Schltr., *Cyclopogon*  
*spiranthoides* Schltr., *Gyrostachys*  
*peruviana* (C.Presl) Kuntze,  
*Spiranthes peruviana* C.Presl  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
2400-3300 m.  
ANT, BOY, CAU, CUN, GUJ,  
MAG, NAR. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Betancur 6917* (COL).

***Cyclopogon plantagineus*  
Schltr.**

*Beadlea plantaginea* (Schltr.)  
Garay  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 200-  
2350 m.  
CHO, CUN, HUI, NSA. No  
evaluada.  
Guatemala a Perú y Venezuela.  
*Galeano 4725* (COL).

***Cyclopogon prasophyllus* (Rchb.f.) Schltr.**

*Beadlea prasophylla* (Rchb.f.) Hamer & Garay, *Gyrostachys prasophylla* (Rchb.f.) Kuntze, *Spiranthes epiphytica* Schltr., *Spiranthes prasophylla* Rchb.f. Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NO Colombia a SE México.  
NOTA: registrada de Colombia, sin indicación de espécimen / recorded from Colombia with no specimen citation.

***Cyclopogon rimbachii* Schltr.**

*Beadlea rimbachii* (Schltr.) Garay, *Spiranthes rimbachii* (Schltr.) C.Schweinf.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2850-2900 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ospina 1583* (COL).

***Cycnoches* Lindl.**

9 especies, 3 especies endémicas

***Cycnoches barthiorum* G.F.Carr & Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico.  
0-1000 m.  
CAU. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Niessen s.n.* (HT: NY).

***Cycnoches brachydactylon* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 900 m.  
NAR. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

O Andes.  
*Hopp 73* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Cycnoches chlorochilon* Klotzsch**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. SN Santa Marta. 1250-1500 m.  
MAG. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Panamá a Venezuela.  
*Martin 3571* (MO).

***Cycnoches egertonianum* Bateman**

*Cycnoches densiflorum* Rolfe  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Magdalena.  
0-1000 m.  
ANT, BOY. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Birchenall s.n.* (HT: K).

***Cycnoches haagii* Barb.Rodr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 250-650 m.  
DESCONOCIDO. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Suramérica tropical.  
*Escobar 1990-1998: No. 105* (?).

***Cycnoches herrenhusanum* Jenny & G.A.Romero**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 50 m.  
NAR. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Jenny 86* (HT: AMES).

***Cycnoches loddigesii* Lindl.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Magdalena.  
200-1000 m.  
NSA, SAN. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
N Suramérica.

***Cycnoches maculatum* Lindl.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 100-1000 m.  
DESCONOCIDO. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia y N Venezuela.

***Cycnoches thurstoniorum* Dodson**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
SO Venezuela a Ecuador.  
NOTA: registrada de Colombia, sin indicación de espécimen.  
Datos de elevación de Ecuador / recorded from Colombia with no specimen citation; elevation data from Ecuador.

***Cyrtidiorchis* Rauschert**

3 especies, 2 especies endémicas

***Cyrtidiorchis frontinoensis* (Garay) Rauschert**

*Cyrtidium frontinoense* Garay  
Garay 1969.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400-2400 m.  
ANT, SAN. No evaluada.  
*Escobar 13* (HT: AMES).

***Cyrtidiorchis gerardi* P.Ortiz**

Ortiz 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.

NSA. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
Ortiz 1286 (HT: HPUJ).

***Cyrtidiorchis rhomboglossa***  
**(F.Lehm. & Kraenzl.)**

**Rauschert**

*Chrysocynis triptera* Schltr.,  
*Cyrtidium rhomboglossum*  
(F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr.  
Garay 1969.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1450-3000 m.  
ANT, CAU, CUN, TOL. No  
evaluada.  
NO Venezuela a Ecuador.  
Uribe 6216 (COL, AMES, US, K).

***Cyrtochiloides***  
**N.H.Williams & M.W.Chase**

1 especie

***Cyrtochiloides ochmatochila***  
**(Rchb.f.) N.H.Williams &**  
**M.W.Chase**

*Oncidium ochmatochilum* Rchb.f.  
Hierba, epífita, hemiepífita.  
Nativa. Andes. 600-950 m.  
CUN, RIS, SAN, VAL. No  
evaluada.  
México a Perú.  
Ortiz 521 (HPUJ).

***Cyrtochilum* Kunth**

67 especies, 27 especies  
endémicas

***Cyrtochilum aemulum***  
**(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium aemulum* Rchb.f. &  
Warsz.  
Dalström 2001; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3200 m.  
CUN, NSA. No evaluada.  
Colombia a NO Ecuador.

Luer 10264 (MO).  
NOTA: origen del tipo  
desconocido; prob. Colombia /  
origin of type unknown, prob.  
Colombia.

***Cyrtochilum angustatum***  
**(Lindl.) Dalström**

*Odontoglossum angustatum*  
Lindl., *Odontoglossum claviceps*  
Rchb.f., *Odontoglossum*  
*spilotanthum* Linden & Rchb.f.,  
*Odontoglossum ulopterum*  
Linden & Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2050-3400 m.  
CAU, NAR, PUT, TOL. No  
evaluada.  
S Colombia a N Perú.  
Cuatrecasas 11626 (COL,  
JAUM).

***Cyrtochilum annulare***  
**(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum lucescens* (Rchb.f.)  
Kraenzl., *Cyrtochilum*  
*monachicum* (Rchb.f.) Kraenzl.,  
*Oncidium annulare* Rchb.f.,  
*Oncidium lucescens* Rchb.f.,  
*Oncidium monachicum* Rchb.f.  
Dalström 2002; Idárraga *et al.*  
2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2450-2710 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Colombia.  
Escobar 500 (HUA, MO).

***Cyrtochilum auropurpureum***  
**(Rchb.f.) Dalström**

*Odontoglossum auropurpureum*  
Rchb.f., *Odontoglossum*  
*compactum* Rchb.f.,  
*Odontoglossum floribundum*  
Schltr., *Odontoglossum koehleri*  
Schltr., *Odontoglossum*  
*orientale* Rchb.f., *Oncidium*  
*auropurpureum* (Rchb.f.) Beer  
Bockemühl 1989; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita, terrestre.  
Nativa. Andes. 3000-3300 m.  
BOY, CUN, NSA, TOL. No  
evaluada.  
O Suramérica a NO Venezuela.  
Renz 3317 (RENZ).

***Cyrtochilum baldeviamae***  
**(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium baldeviamae* Rchb.f.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
CUN. No evaluada.  
Carder 134 (HT: W).

***Cyrtochilum ballii* (Rolfe)**  
**Kraenzl.**

*Oncidium ballii* Rolfe,  
*Trigonochilum ballii* (Rolfe)  
Königer & Schildh.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.

***Cyrtochilum betancurii***  
**G.Giraldo & Dalström**

Giraldo & Dalström 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-1800 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
Betancur 14882 (HT: COL).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Cyrtochilum brachypterum***  
**(Linden & Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium brachypterum* Linden  
& Rchb.f.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela.  
Linden 72 (HT: W).

NOTA: origen del tipo dudoso /  
type of doubtful origin.

***Cyrtochilum caquetanum***

**P.Ortiz et al.**

Ortiz 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000-2000 m.

CAQ. No evaluada.

*Ortiz 1393* (HT: HPUJ).

***Cyrtochilum cimiciferum***

**(Rchb.f.) Dalström**

*Cyrtochilum macropus*

(Linden & Rchb.f.) Kraenzl.,

*Cyrtochilum miradoreense*

(D.E.Benn. & Christenson)

Dalström, *Cyrtochilum*

*rusbyi* (Rolfe) Kraenzl.,

*Odontoglossum cimiciferum*

Rchb.f., *Oncidium cimiciferum*

(Rchb.f.) Beer, *Oncidium*

*macropus* Linden & Rchb.f.,

*Oncidium miradoreense* D.E.Benn.

& Christenson, *Oncidium*

*rusbyi* Rolfe, *Trigonochilum*

*cimiciferum* (Lindl.) Königer,

*Trigonochilum macropus* (Linden

& Rchb.f.) Königer & Schildh.,

*Trigonochilum miradoreense*

(D.E.Benn. & Christenson)

Königer, *Trigonochilum rusbyi*

(Rolfe) Königer & Schildh.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita, terrestre.

Nativa. Andes. 1150-2780 m.

ANT, NAR. No evaluada.

O Suramérica a NO Venezuela.

*Croat 71571* (MO).

***Cyrtochilum corniculatum***

**Dalström**

Dalström & Ruiz Pérez 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

ANT, CUN? No evaluada.

*Dodson 15264* (HT: RPSC; IT:

MO).

***Cyrtochilum cryptocopis***

**(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium cryptocopis* Rchb.f.

Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

O Suramérica.

***Cyrtochilum densiflorum***

**(Lindl.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum macrum* (Lindl.)

Kraenzl., *Cyrtochilum*

*posadarum* (Königer) Senghas,

*Cyrtochilum ramulosum* (Lindl.)

Kraenzl., *Cyrtochilum robustum*

(Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl.,

*Odontoglossum densiflorum*

Lindl., *Odontoglossum macrum*

Lindl., *Odontoglossum*

*posadarum* Königer,

*Odontoglossum ramulosum*

Lindl., *Odontoglossum robustum*

Rchb.f. & Warsz., *Oncidium*

*densiflorum* (Lindl.) Beer,

*Oncidium macrum* (Lindl.) Beer,

*Oncidium ramulosum* (Lindl.)

Beer, *Trigonochilum densiflorum*

(Lindl.) Senghas, *Trigonochilum*

*robustum* (Rchb.f. & Warsz.)

Senghas

Dalström 2001.

Hierba, epífita, terrestre.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a NO Venezuela.

*Linden 1377* (K, BR, T de

*Odontoglossum densiflorum*).

***Cyrtochilum detortum***

**(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium detortum* Rchb.f.

Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NO Venezuela a Perú.

NOTA: esperada / expected.

***Cyrtochilum diceratum***

**(Lindl.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum fallens* (Rchb.f.)

Kraenzl., *Oncidium diceratum*

Lindl., *Oncidium fallens* Rchb.f.

Dalström 2001; Idárraga *et al.*

2011.

Hierba, epífita, terrestre.

Nativa. Andes. 2770-3200 m.

ANT, CAU, NAR. No evaluada.

Colombia a N Ecuador.

*Zarucchi 5159* (HUA, MO).

***Cyrtochilum diodon* Kraenzl.**

*Oncidium diodon* Rchb.f.,

*Oncidium sodiroi* Schltr.,

*Trigonochilum diodon*

(Rchb.f.) Königer & Schildh.,

*Trigonochilum sodiroi* (Schltr.)

Königer

Hierba, epífita, terrestre.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

S Colombia a O Ecuador.

***Cyrtochilum dipterum***

**(Lindl.) Kraenzl.**

*Odontoglossum calodryas* Rchb.f.,

*Odontoglossum dipterum* Lindl.,

*Oncidium dipterum* (Lindl.) Beer

Dalström 2001; Calderón-Sáenz

2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600-3500 m.

ANT, CAL, QUI, TOL.

Vulnerable (Calderón-Sáenz  
2007).

Coordilleras Central y

Occidental.

*Ospina 35* (JAUM).

***Cyrtochilum distans***

**(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Odontoglossum distans* Rchb.f.,

*Oncidium distans* (Rchb.f.) Beer,

*Symphoglossum distans* (Rchb.f.)

Garay & Dunst., *Trigonochilum*

*distans* (Rchb.f.) Senghas

Dalström 2001.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
N Colombia a NO Venezuela.

***Cyrtochilum divaricatum*  
(Lindl.) Dalström**

*Cyrtochilum costatum* (Lindl.)  
Kraenzl., *Cyrtochilum*  
*mandibulare* (Linden &  
Rchb.f.) Kraenzl., *Cyrtochilum*  
*refractum* (Rchb.f.) Kraenzl.,  
*Odontoglossum costatum* Lindl.,  
*Odontoglossum divaricatum*  
Lindl., *Oncidium costatum*  
(Lindl.) Beer, *Oncidium*  
*divaricatum* (Lindl.) Beer,  
*Oncidium mandibulare* Linden  
& Rchb.f., *Oncidium refractum*  
Rchb.f.  
Dalström 2001; Idárraga *et al.*  
2011.

Hierba, epífita, terrestre.  
Nativa. Andes. 1970-2600 m.  
ANT, CUN. No evaluada.  
NO Venezuela a NO Ecuador.  
*Brant 1551* (MO).

***Cyrtochilum englerianum*  
(Kraenzl.) Kraenzl.**

*Oncidium englerianum* Kraenzl.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 6005* (HT: K).

***Cyrtochilum examinans*  
(Lindl.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum centifrancum*  
(Rchb.f.) Kraenzl., *Oncidium*  
*centifrancum* Rchb.f., *Oncidium*  
*examinans* Lindl., *Trigonochilum*  
*centifrancum* (Rchb.f.) König  
& Schildh., *Trigonochilum*  
*examinans* (Lindl.) König &  
Schildh.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a N Venezuela.

***Cyrtochilum exasperatum*  
(Linden & Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium exasperatum* Linden  
& Rchb.f., *Trigonochilum*  
*exasperatum* (Linden & Rchb.f.)  
König & Schildh.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Roehl 1880* (W, T de *Oncidium*  
*exasperatum* Rchb. f. & Linden).

***Cyrtochilum falcipetalum*  
(Lindl.) Kraenzl.**

*Oncidium falcipetalum* Lindl.,  
*Oncidium falcipetalum* var.  
*pavonii* Lindl.  
Dalström 2001; Idárraga *et al.*  
2011.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1730-2400 m.  
ANT, CUN, NSA. No evaluada.  
Colombia a NO y N Venezuela.  
*Sánchez 1035* (HUA).

***Cyrtochilum flexuosum*  
Kunth**

*Cyrtochilum cocciferum* (Rchb.f.  
& Warsz.) Kraenzl., *Cyrtochilum*  
*hartwegii* (Lindl.) Kraenzl.,  
*Cyrtochilum hartwegii* var.  
*parviflorum* (Rchb.f.) Kraenzl.,  
*Cyrtochilum trulla* (Rchb.f. &  
Warsz.) Kraenzl., *Oncidium*  
*cocciferum* Rchb.f. & Warsz.,  
*Oncidium flexuosum* (Kunth)  
Lindl., *Oncidium hartwegii*  
Lindl., *Oncidium hartwegii* var.  
*parviflorum* Rchb.f., *Oncidium*  
*micranthum* Lindl., *Oncidium*  
*trulla* Rchb.f. & Warsz.,  
*Trigonochilum cocciferum*  
(Rchb.f. & Warsz.) König  
& Schildh., *Trigonochilum*  
*flexuosum* (Kunth) König &  
Schildh., *Trigonochilum trulla*

(Rchb.f. & Warsz.) König &  
Schildh.  
Dalström 2001; Idárraga *et al.*  
2011.

Hierba, epífita, terrestre.  
Nativa. Andes. 1750-2780 m.  
ANT, CAQ, CHO, CUN, NAR,  
VAL. No evaluada.  
O Suramérica.  
*Gentry 60449* (MO).

***Cyrtochilum fractum*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum fractum*  
Kraenzl., *Cyrtochilum*  
*medellinense* Kraenzl.,  
*Dasyglossum fractum* (Rchb.f.)  
König & Schildh., *Irenea fracta*  
(Rchb.f.) Szlach., *Odontoglossum*  
*fractum* Rchb.f., *Odontoglossum*  
*medellinense* (Kraenzl.) Garay,  
*Odontoglossum microthysus*  
Kranzlin, *Trigonochilum fractum*  
(Rchb.f.) Senghas  
Dalström 2001; Idárraga *et al.*  
2011.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Perú.  
*Patin s.n.* (K, W).

***Cyrtochilum funis* (F.Lehm.  
& Kraenzl.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum scandens* Kraenzl.,  
*Dasyglossum funis* (F.Lehm. &  
Kraenzl.) König & Schildh.,  
*Irenea funis* (F.Lehm. & Kraenzl.)  
Szlach., *Odontoglossum funis*  
(F.Lehm. & Kraenzl.) Garay,  
*Oncidium funis* F.Lehm. &  
Kraenzl., *Trigonochilum funis*  
(F.Lehm. & Kraenzl.) Senghas  
Dalström 2001; Idárraga *et al.*  
2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2750-3600 m.  
ANT, NAR, PUT. No evaluada.  
C Colombia a Ecuador.  
*Ortiz-V. 4193* (HPUJ).

***Cyrtochilum grandiflorum*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium grandiflorum* Rchb.f.,  
*Oncidium steyermarkii* Foldats  
Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2950 m.

CUN. No evaluada.

Colombia a NO Venezuela.

*Ortiz 4389a* (HPUJ).

***Cyrtochilum halteratum*  
(Lindl.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum superbiens* (Rchb.f.)  
Kraenzl., *Oncidium halteratum*  
Lindl., *Oncidium halteratum*  
var. *fuscum* Lindl., *Oncidium*  
*halteratum* var. *luteum* Lindl.,  
*Oncidium inferlobum* auct.,  
*Oncidium superbiens* Rchb.f.  
Dalström 2001; Idárraga *et al.*  
2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2630-2700 m.

ANT, QUI. No evaluada.

NO Venezuela a Ecuador.

*Zarucchi 4422* (MO).

***Cyrtochilum ioplocon*  
(Rchb.f.) Dalström**

*Odontoglossum ioplocon* Rchb.f.  
Calderón-Sáenz 2007; Idárraga *et*  
*al.* 2011.

Hierba, terrestre.

Endémica. Andes. 2500-3000 m.

ANT, CUN, SAN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

Cordillera Oriental.

*Triana s.n.* (COL).

***Cyrtochilum ixiooides* Lindl.**

*Cyrtochilum narthecioides*  
Kraenzl., *Odontoglossum ixiooides*  
(Lindl.) Lindl., *Odontoglossum*  
*narthecioides* (Kraenzl.) Garay,  
*Oncidium ixiooides* (Lindl.) Beer  
Dalström 2002; Calderón-Sáenz  
2007.

Hierba, terrestre.

Endémica. Andes. 3000-3600 m.

BOY, CUN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

Cordillera Oriental.

*s.c. s.n.* (HT: K).

***Cyrtochilum kraenzlinianum*  
Szlach. & Kolan.**

Szlachetko & Kolanowska 2014.

Hierba, terrestre.

Endémica. Andes. 2700 m.

ANT, SAN. No evaluada.

Cordillera Oriental y Cental.

*Zarucchi 6210* (HT: COL; IT:  
MO).

***Cyrtochilum lamelligerum*  
(Rchb.f.) Krlz.**

*Oncidium lamelligerum* Rchb.f.  
Dalström 2001.

Hierba, epífita, terrestre.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Ecuador (Bolívar).

*Triana s.n.* (COL).

***Cyrtochilum leucopterum*  
(Rchb.f.) Dalström**

*Odontoglossum leucopterum*  
Rchb.f.

Dalström 2001; Calderón-Sáenz  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, SN Santa  
Marta. 2440-3300 m.

BOY, CUN, MAG. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Schlim 989* (HT: W; IT: BR, K).

***Cyrtochilum longifolium*  
(Lindl.) Kraenzl.**

*Dasyglossum longifolium*  
(Lindl.) Königer & Schildh.,  
*Odontoglossum longifolium*  
Lindl., *Trigonochilum longifolium*  
(Lindl.) Senghas

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700-3000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Ospina 130* (JAUM).

***Cyrtochilum maasii* Szlach.  
& Kolan.**

Szlachetko & Kolanowska 2014.

Hierba, terrestre.

Endémica. Andes. 2100-3000 m.

BOY, CAU, CUN, SAN. No  
evaluada.

*Maas 2111* (HT: COL).

***Cyrtochilum megalophium*  
(Lindl.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum forcipatum*  
(Linden & Rchb.f.) Kraenzl.,  
*Dasyglossum megalophium*  
(Lindl.) Königer & Schildh.,  
*Odontoglossum forcipatum*  
Linden & Rchb.f., *Odontoglossum*  
*megalophium* Lindl., *Oncidium*  
*forcipatum* (Linden & Rchb.f.)  
Schnee, *Oncidium megalophium*  
(Lindl.) Beer, *Trigonochilum*  
*megalophium* (Lindl.) Senghas  
Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 2000-  
3000 m.

BOY, CAQ, CUN, QUI. No  
evaluada.

O Suramérica a NO Venezuela.

*Schlim 1160* (MO).

***Cyrtochilum meirax*  
(Rchb.f.) Dalström**

*Cyrtochilum dodianum*  
(Ackerman & Chiron)  
Ackerman, *Oncidium alatum*  
Cogn., *Oncidium dodianum*  
Ackerman & Chiron, *Oncidium*  
*meirax* Rchb.f., *Trigonochilum*  
*alatum* (Cogn.) Königer  
& Schildh., *Trigonochilum*  
*dodianum* (Ackerman & Chiron)  
Senghas, *Trigonochilum meirax*  
(Rchb.f.) Königer & Schildh.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1200-2600 m.  
ANT, BOY, CUN, HUI, MAG,  
NAR, RIS, VAL. No evaluada.  
Puerto Rico a Venezuela y O  
Suramérica.  
*Uribe 4552* (COL).

***Cyrtochilum melanthes*  
(Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum pullulans* Kraenzl.,  
*Dasyglossum melanthes*  
(Rchb.f. & Warsz.) Königer  
& Schildh., *Irenea melanthes*  
(Rchb.f. & Warsz.) Szlach.,  
*Odontoglossum bachmannii*  
I.Bock, *Odontoglossum melanthes*  
Rchb.f. & Warsz., *Trigonochilum*  
*melanthes* (Rchb.f. & Warsz.)  
Senghas  
Dalström 2001; Calderón-Sáenz  
2007.  
Hierba, terrestre.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia a Perú.  
*Bachmann s.n.* (HT: HAL).

***Cyrtochilum mendax*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium mendax* Rchb.f.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a C Ecuador.  
*Lehmann s.n.* (W, T de *Oncidium*  
*mendax*).

***Cyrtochilum metallicum*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium metallicum* Rchb.f.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Wallis s.n.* (HT: W).

***Cyrtochilum minax* (Rchb.f.)  
Kraenzl.**

*Oncidium minax* Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2200 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 1028* (HPUJ).

***Cyrtochilum misasianum*  
P.Ortiz**

Ortiz 1997; Misas-Urreta 2005  
(Como *Oncidium* sp. nov.).  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 800-1000 m.  
CHO. No evaluada.  
*Misas 272d* (IT: COL).

***Cyrtochilum miserrimum*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium miserrimum* Rchb.f.  
Kränzlin 1922; Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Wagener s.n.* (HT: W).

***Cyrtochilum murinum*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Oncidium brachystachys* Kraenzl.,  
*Oncidium murinum* Rchb.f.,  
*Oncidium turpe* Kraenzl.,  
*Trigonochilum murinum*  
(Rchb.f.) Königer & Schildh.,  
*Trigonochilum turpe* (Kraenzl.)  
Königer & Schildh.  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Orinoquia. 450-  
2580 m.  
ANT, MET, NAR. No evaluada.  
NO Venezuela a N Perú.  
*Lehmann 259* (HT: W).

***Cyrtochilum orgyale* (Rchb.f.  
& Warsz.) Kraenzl.**

*Oncidium claesii* Rolfe, *Oncidium*  
*orgyale* Rchb.f. & Warsz.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2500 m.  
CUN, NSA. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela.  
*Warscewicz s.n.* (W, T de  
*Oncidium orgyale*).

***Cyrtochilum pardinum*  
Lindl.**

*Odontoglossum bellum* Schltr.,  
*Odontoglossum pardinum*  
(Lindl.) Lindl., *Odontoglossum*  
*spathaceum* Lindl., *Oncidium*  
*pardinum* (Lindl.) Beer,  
*Oncidium spathaceum* Beer,  
*Vierlingia dickinsoniae* Königer  
Dalström 2002; Calderón-Sáenz  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2900-3600 m.  
ANT, ARA, BOY, CAU, CUN,  
NAR, VAL. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a N Perú.  
*Cuatrecasas 7893* (COL, JAUM).

***Cyrtochilum porrigens*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum rotundatum*  
(Rchb.f.) Kraenzl., *Cyrtochilum*  
*saltabundum* (Rchb.f.) Kraenzl.,  
*Oncidium porrigens* Rchb.f.,  
*Oncidium rotundatum* Rchb.f.,  
*Oncidium saltabundum* Rchb.f.,  
*Trigonochilum porrigens*  
(Rchb.f.) Königer & Schildh.,  
*Trigonochilum rotundatum*  
(Rchb.f.) Königer & Schildh.,  
*Trigonochilum saltabundum*  
(Rchb.f.) Königer & Schildh.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Lutelyn 5033* (MO, NY).

***Cyrtochilum ramiro-medinae*****P.Ortiz**

Ortiz 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400 m.

PUT. No evaluada.

*Medina 456* (HT: HPUJ).***Cyrtochilum ramosissimum*****(Lindl.) Dalström***Odontoglossum liliiflorum* (A.H.Kent) auct., *Odontoglossum ramosissimum* Lindl., *Oncidium ramosissimum* (Lindl.) Beer Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita, terrestre.

Nativa. Andes. 1900-3600 m.

ANT, NAR. No evaluada.

O Suramérica a NO Venezuela.

*Callejas 3648* (HUA, MO).***Cyrtochilum revolutum*****(Lindl.) Dalström***Odontoglossum bogotense* Schltr., *Odontoglossum lindenii* Lindl., *Odontoglossum platyodon* Rchb.f., *Odontoglossum revolutum* Lindl., *Oncidium revolutum* (Lindl.) Beer Dalström 2001; Calderón-Sáenz 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3700 m.

BOY, CAU, CUN, NSA.

Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a NO Venezuela.

*Cuatrecasas 27374* (COL).***Cyrtochilum rostratum*****Schltr.***Oncidium rostratum* (Schltr.)

Garay

Dalström 2002.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

***Cyrtochilum scabiosum*****Kraenzl.***Dasyglossum scabiosum* (Kraenzl.) Königer & Schildh.,*Irenea scabiosa* (Kraenzl.)Szlach., *Odontoglossum**scabiosum* Kraenzl.,*Trigonochilum scabiosum*

(Kraenzl.) Senghas

Dalström 2002; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2630-3600 m.

ANT. No evaluada.

*Fonnegra 3762* (HUA, MO).***Cyrtochilum schulzei*****(Schltr.) Dalström***Odontoglossum schulzei* Schltr.,*Trigonochilum schultzei* (Schltr.)

Königer &amp; Schildh.

Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Schultze 13* (B, destruido, T de*Odontoglossum schultzei*).***Cyrtochilum simulans* Schltr.***Oncidium simulans* (Schltr.)

Garay

Dalström 2002.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Hopp 198* (HT: B, destruido).***Cyrtochilum tenense* (Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl.***Oncidium tenense* Rchb.f. & Warsz.

Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1380 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Hartweg s.n.* (W, K-L, T de*Oncidium tenense*).***Cyrtochilum tetracopis*****(Rchb.f.) Kraenzl.***Cyrtochilum chrysodipterum*(A.H.Kent) Kraenzl., *Cyrtochilum**chrysodipterum* var. *claesianum*Kraenzl., *Cyrtochilum ludens*(Rchb.f.) Kraenzl., *Oncidium**chrysodipterum* A.H.Kent,*Oncidium chrysodipterum* var.*claesianum* Cogn., *Oncidium**ludens* Rchb.f., *Oncidium**tetracopis* Rchb.f.

Dalström 2002.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2450-2800 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

O Suramérica a NO Venezuela.

*Bull 234* (W, T de *Oncidium**tetracopis*).***Cyrtochilum turpe* (Kraenzl.)****Kraenzl.**

Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300 m.

NAR. No evaluada.

*Lehmann 259* (W, T de*Trigonochilum turpe*).***Cyrtochilum undulatum*****Kunth**

Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Endémica. SN Santa Marta.

2800-3000 m.

MAG. No evaluada.

*Humboldt 2055* (HT: P; IT: W).***Cyrtochilum ustulatum*****(Rchb.f.) Kraenzl.***Oncidium ustulatum* Rchb.f.

Dalström 2001.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Carder s.n.* (HT: W).

***Cyrtochilum ventilabrum*  
(Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum carderi*  
(Rchb.f.) Kraenzl., *Oncidium carderi* Rchb.f., *Oncidium undulatum* Lindl., *Oncidium ventilabrum* Rchb.f. & Warsz.  
Dalström 2001; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita, terrestre.  
Nativa. Andes. 2010-2250 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Escobar 921* (AMES).

***Cyrtochilum viminale*  
(Rchb.f.) Dalström**

*Dasyglossum viminale* (Rchb.f.)  
Königer & Schildh., *Ireneia viminale* (Rchb.f.) Szlach.,  
*Odontoglossum viminale* Rchb.f.,  
*Trigonochilum viminale* (Rchb.f.)  
Senghas  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita, terrestre.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Sander s.n.* (HT: W).

***Cyrtochilum violaceum*  
Dalström**

Dalström 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. SN Santa Marta.  
2700-2900 m.  
MAG. No evaluada.  
*Jaramillo 5366* (HT: COL).

***Cyrtochilum weirii* (Rchb.f.)  
Dalström**

*Odontoglossum weirii* Rchb.f.  
Calderón-Sáenz 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700-3300 m.  
CUN. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
Cordillera Oriental.  
*Ospina 1558* (COL).

***Cyrtochilum wernerii*  
(Schltr.) Dalström**

*Odontoglossum wernerii* (Schltr.)  
Garay, *Oncidium wernerii* Schltr.,  
*Trigonochilum wernerii* (Schltr.)  
Königer & Schildh.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400 m.  
CUN, No evaluada.  
*Weir 17* (W, K, T de *Oncidium wernerii*).

***Cyrtochilum williamsianum*  
(Dodson) Dalström**

*Cyrtochilum rodrigoii*  
(Königer) Dalström, *Oncidium williamsianum* Dodson,  
*Trigonochilum rodrigoii* Königer,  
*Trigonochilum williamsianum*  
(Dodson) Senghas  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia a NO Ecuador.  
*Königer WK-104* (JAUM, W, T de  
*Trigonochilum rodrigoii*).

***Cyrtochilum xanthodon*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum cinereobrunneum*  
D.E.Benn. & Christenson,  
*Cyrtochilum phylloglossum*  
(Rchb.f.) Kraenzl., *Cyrtochilum plagianthum* (Rchb.f.) Kraenzl.,  
*Cyrtochilum plurituberculatum*  
D.E.Benn. & Christenson,  
*Oncidium phylloglossum* Rchb.f.,  
*Oncidium plagianthum* Rchb.f.,  
*Oncidium xanthodon* Rchb.f.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita, terrestre.  
Nativa. Andes. 1800-2800 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Bull 551* (W, T de *Oncidium phylloglossum*).

***Cyrtochilum zebrinum*  
(Rchb.f.) Kraenzl.**

*Cyrtochilum engelii* (Rchb.f.)  
Kraenzl., *Odontoglossum zebrinum* Rchb.f., *Oncidium engelii* Rchb.f., *Oncidium zebrinum* (Rchb.f.) Rchb.f.  
Dalström 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2010 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a NO y N Venezuela.  
*Zarucchi 5701* (COL, MO).

***Cyrtopodium* R.Br.**

7 especies

***Cyrtopodium andersonii*  
(Andrews) R.Br.**

Ortiz & Uribe 2008; Romero-Castañeda 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Orinoquia. 100 m.  
VIC. No evaluada.  
E Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil.

***Cyrtopodium cristatum*  
Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 115 m.  
VIC. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Zarucchi 3747* (MO).

***Cyrtopodium gigas* (Vell.)  
Hoehne**

Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 100-150 m.  
VIC. No evaluada.  
Colombia, Brasil.  
*Ortiz s.n.* (galería).

***Cyrtopodium longibulbosum*  
Dodson & G.A.Romero**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.

Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 100-200 m.  
CAQ. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú.

***Cyrtopodium paniculatum***  
**(Ruiz & Pav.) Garay**  
Ortiz 1995.

Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Caribe. 90-1800 m.  
ANT, ATL, BOL, CÓR, CUN,  
SAN, VAL. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Ortiz 822* (HPUJ).

***Cyrtopodium punctatum* (L.)**  
**Lindl.**

Romero-Castañeda 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 600-1500 m.  
CAU, CUN. No evaluada.  
S Estados Unidos a Argentina.  
*Haught 5156* (COL).

***Cyrtopodium schargellii***  
**G.A.Romero et al.**

Romero-Castañeda 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 250 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Guyana,  
Brasil.

### ***Daiotyla* Dressler**

2 especies, 1 especie endémica

***Daiotyla maculata* (Garay)**  
**Dressler**

*Chondrorhyncha maculata* Garay  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
CAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 543* (HT: AMES).

***Daiotyla xanthina* Pupulin**  
**& Dressler**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Pupulin 5891* (HT: COL; IT: CR).

### ***Dichaea* Lindl.**

39 especies, 6 especies endémicas

***Dichaea acuminata* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000-1200 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Lehmann 18* (B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Dichaea ancoraelabia***  
**C.Schweinf.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 100-450 m.  
AMA, CAQ. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Ortiz 531* (HPUJ).

***Dichaea angustisegmenta***  
**Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700 m.  
NAR. No evaluada.  
S Colombia a Ecuador.  
*Orejuela s.n.* (PSO).

***Dichaea antioquiensis***  
**Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Cárdenas 2206* (MO).

***Dichaea brachypoda* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 400-  
2000 m.  
CHO, NAR, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador y  
Venezuela.  
*Cárdenas 2206* (MO).

***Dichaea camaridioides***  
**Schltr.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 1600-  
1920 m.  
ANT, CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Ortiz 1043* (HPUJ).

**[*Dichaea campanulata***  
**C.Schweinf.]**

Ortiz 1995.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea; crece  
en Ecuador y Bolivia; no  
ha sido hallada cerca de  
Colombia / record based on  
a misidentification; grows in  
Ecuador and Bolivia and has not  
been found near Colombia.

***Dichaea caquetana* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 600 m.  
CAQ. No evaluada.  
*Hopp 112* (B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Dichaea chasei* Dodson**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 400-2200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Escobar 1990-1998: No. 800* (?).

***Dichaea dammeriana***

**Kraenzl.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1250-1920 m.  
ANT, MAG. No evaluada.  
Colombia, Perú, Costa Rica.  
*Smith 2773* (ST: MO).

***Dichaea ecuadorensis* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 450-2400 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Dichaea escobariana* Dodson**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1100 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Dodson 18090* (RPSC).

***Dichaea gorgonensis* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 1-100 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Hinds s.n.* (T: W).

***Dichaea graminoides* (Sw.)**

**Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Perú.  
NOTA: esperada / expected.

***Dichaea hirtzii* Dodson**

*Dichaea potamophila* Folsom  
Folsom 1994.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 40 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Folsom 11000* (JAUM).

***Dichaea histrio* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Misas 182* (HPUJ).

***Dichaea humilis* Cogn.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 500 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Perú.  
*Misas 180* (HPUJ).

***Dichaea hystricina* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1700 m.  
CAU, CHO. No evaluada.  
Centroamérica a Venezuela y  
Ecuador.  
*Misas 270* (HPUJ).

***Dichaea kegelii* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia?, Andes? 380-  
1300 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
NOTA: esperada; conocida de  
países vecinos / expected; known  
from neighboring countries.

***Dichaea lagotis* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1320 m.

ANT. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Escobar 1703* (HUA).

***Dichaea latifolia* Lindl.**

*Dichaea longa* Schltr.  
Folsom 1994.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 20-  
1420 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Escobar 1990-1998: No. 118* (?).  
*Dichaea latifolia* var. *longa*  
(Schltr.) Folsom

***Dichaea laxa* (Ruiz & Pav.)**

**Poepp. & Endl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia?, Andes? 400-  
700 m.  
NAR?, PUT? No evaluada.  
S Colombia? a Bolivia.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Sucumbíos (Ecuador), cerca de  
la frontera / expected; collected  
in Sucumbíos (Ecuador), near  
the border.

***Dichaea lehmanniana***

**Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-1800 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 7107* (W).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Dichaea lehmannii* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 800-1700 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 338* (HPUJ).

***Dichaea longa* Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a S Venezuela y  
Bolivia.NOTA: registrada de Colombia,  
sin indicación de espécimen /  
recorded from Colombia with no  
specimen citation.***Dichaea morrisii* Fawc. &  
Rendle**Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1250-2280 m.

ANT, CUN, NAR. No evaluada.

Centroamérica, N Suramérica y  
Caribe.*Ortiz 107* (HPUJ).***Dichaea muricata* (Sw.)  
Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

ANT. No evaluada.

América tropical.

*Ortiz 341* (HPUJ).***Dichaea muyuyacensis*  
Dodson***Dichaea tuberculilabris* Folsom

Folsom 1994.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 200-600  
m.

CHO, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Folsom 10556* (JAUM).***Dichaea panamensis* Lindl.**Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Caribe, Pacífico. 20-600  
m.ANT, CAU, CHO, GUJ, VAL. No  
evaluada.

Centroamérica y N Suramérica.

*Ortiz 219* (HPUJ).***Dichaea pendula* (Aubl.)****Cogn.***Dichaea trachysepala* Schltr.Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700-2440 m.

ANT, CUN, HUI. No evaluada.

América tropical.

*Ortiz 56* (HPUJ).*Dichaea pendula* var. *swartzii*

C.Schweinf.

***Dichaea picta* Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena.  
180-300 m.

GUI, VAU. No evaluada.

América tropical.

*Garay 92* (AMES).***Dichaea retroflexa* Kraenzl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 200 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Lehmann 134* (HT: ?).***Dichaea richii* Dodson**Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, V Magdalena.  
400-900 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Fonnegra 369a* (HUA).***Dichaea rubroviolacea*  
Dodson**Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1250 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cogollo 3098* (JAUM, MO).***Dichaea selaginella* Schltr.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 300 m.

CAU, CHO. No evaluada.

Colombia.

*Misas 181* (HPUJ).***Dichaea sodiroi* Schltr.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 450-2200 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Escobar 1990-1998: No. 159* (?).***Dichaea tamboensis* Dodson**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 750-1150 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Ecuador.NOTA: esperada; recolectada en  
Ecuador, cerca de la frontera /  
expected; collected in Ecuador,  
near the border.***Dichaea tenuifolia* Schltr.**Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1300-2000 m.

ANT, NAR. No evaluada.

Panamá a Ecuador.

*Cogollo 1449* (JAUM).***Dichaea trulla* Rchb.f.***Dichaea powellii* Schltr.Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 100-  
1390 m.

ANT, CHO. No evaluada.

América tropical.

*Misas 178* (HPUJ).

***Dichaea undulifolia* Dodson**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 1200 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Dimerandra* Schltr.**

3 especies, 1 especie endémica

***Dimerandra buenaventurae* (Kraenzl.) Siegerist**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes, Caribe, Pacífico, SN Santa Marta, V Magdalena. 5-1445 m.  
CES, MAG, TOL, VAL. No evaluada.  
*Cogollo 4160* (JAUM).

***Dimerandra elegans* (Focke) Siegerist**

*Ischilus elegans* H.Focke  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Caribe, Orinoquia, Pacífico, SN Santa Marta, V Magdalena. 10-1100 m.  
BOY, CES, CHO, MET, TOL. No evaluada.  
Costa Rica a Guayanas y Brasil.  
*Brand 498* (COL, HUA, JAUM).

***Dimerandra emarginata* (G.Mey.) Hoehne**

*Dimerandra latipetala* Siegerist, *Dimerandra stenopetala* (Hook.) Schltr., *Epidendrum stenopetalum* Hook.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Orinoquia, Pacífico, V Magdalena. 10-300 m.

ANT, CHO, MET, SAN. No evaluada.  
México a Trinidad y E Brasil.  
*Ortiz 301* (HPUJ, HUA).

***Diodonopsis* Pridgeon & M.W.Chase**

5 especies, 1 especie endémica

***Diodonopsis anachaeta* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Masdevallia anachaeta* Rchb.f., *Masdevallia nutans* F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia vulcanica* F.Lehm. & Kraenzl.  
Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100-2500 m.  
CAU, NSA, PUT, RIS.  
Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a Bolivia.  
*Luer 16776* (MO).

***Diodonopsis erinacea* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Masdevallia echinocarpa* Schltr., *Masdevallia erinacea* Rchb.f., *Masdevallia horrida* Teusch. & Garay  
Luer 2000c; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 200-2200 m.  
ANT, CHO, VAL. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Costa Rica a Ecuador.  
*Roezl s.n.* (HT: W).

***Diodonopsis hoeijeri* (Luer & Hirtz) Pridgeon & M.W.Chase**

*Masdevallia hoeijeri* Luer & Hirtz, *Pteroon hoeijeri* (Luer & Hirtz) Luer

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
ANT. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia, SE Ecuador.  
*Escobar 4064* (MO).

***Diodonopsis pterygiophora* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Masdevallia pterygiophora* Luer & R.Escobar, *Pteroon pterygiophorum* (Luer & R.Escobar) Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2000 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 2288* (HT: MO).

***Diodonopsis pygmaea* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Masdevallia exigua* Ames & C.Schweinf., *Masdevallia muriculata* Kraenzl., *Masdevallia pygmaea* Kraenzl.  
Luer 2000c; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-2000 m.  
ANT. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Costa Rica a NO Ecuador.  
*Luer 1835* (SEL).

***Draconanthes* (Luer) Luer**  
1 especie

***Draconanthes aberrans* (Schltr.) Luer**

*Lepanthes prionota* Luer & Hirtz, *Lepanthes trachysepala* Schltr.  
Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3300 m.

QUI. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO  
Venezuela.  
*Luer 16752* (MO).

### ***Dracula Luer***

80 especies, 65 especies  
endémicas

#### ***Dracula adrianae Luer***

*Luer 1998b*; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. Datos  
Insuficientes (Calderón-Sáenz  
2007).

*Sijm 20898* (HT: MO).

NOTA: al parecer, conocida  
solo del tipo, recolectado  
en Colombia y cultivado en  
Holanda, sin datos de localidad /  
apparently known only from the  
type, collected in Colombia and  
cultivated in Holland, without  
locality data.

#### ***Dracula alcithoe Luer & R.Escobar***

Calderón-Sáenz & Farfán  
2003; Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500 m.

PUT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

SO Colombia a Ecuador.

*Ospina s.n.* (HT: JAUM).

#### ***Dracula amaliae Luer & R.Escobar***

Calderón-Sáenz & Farfán  
2003; Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2000 m.

CAU, VAL. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

O Colombia.  
*Escobar 1746* (HT: JAUM).

#### ***Dracula andreettae (Luer)***

**Luer**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2150-2200 m.

ANT, NAR, VAL. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

O Colombia a N Ecuador.

*Luer 13139* (MO).

#### ***Dracula ×anicula Luer &***

**R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900-2100 m.

ANT. Datos Insuficientes

(Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1270* (HT: JAUM).

NOTA: híbrido de *D. cutis-bufonis*  
× *D. wallisii* / a hybrid of *D.*  
*cutis-bufonis* × *D. wallisii*.

#### ***Dracula anthracina Luer & R.Escobar***

*Luer 1993*; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

BOY. Datos Insuficientes

(Calderón-Sáenz 2007).

NO Colombia.

*Luer 3457* (HT: SEL).

#### ***Dracula antonii Luer***

Calderón-Sáenz & Farfán  
2003; Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. Datos  
Insuficientes (Calderón-Sáenz  
2007).

*Sijm s.n.* (HT: MO).

NOTA: al parecer, conocida solo  
del tipo, sin datos de localidad /  
apparently known only from the  
type, without locality data.

#### ***Dracula aphrodes Luer & R.Escobar***

*Luer 1993*; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-1900 m.

VAL. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Escobar 3978* (HT: JAUM).

#### ***Dracula bella (Rchb.f.) Luer***

*Luer 1993*; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700-2440 m.

ANT, CHO, RIS. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

OC Colombia.

*Wallis 218* (HT: W).

#### ***Dracula bellerophon Luer & R.Escobar***

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900-2100 m.

ANT, VAL. En Peligro  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 2894* (HT: JAUM; IT: SEL).

#### ***Dracula benedictii (Rchb.f.) Luer***

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700-2400 m.

ANT, QUI, RIS, VAL. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 13178* (MO).

***Dracula berthae* Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300-2600 m.

BOY. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1817* (HT: JAUM).

***Dracula brangeri* Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900 m.

ANT. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 11430* (HT: MO).

NOTA: al parecer, conocida solo del tipo, recolectado en Colombia y cultivado en Holanda / apparently known only from the type, collected in Colombia and cultivated in The Netherlands.

***Dracula callithrix* N.Peláez et al.**

Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400 m.

NAR. No evaluada.

*Peláez NP0283* (HT: JAUM; IT: HUA).

***Dracula carcinopsis* Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2000 m.

VAL. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

O Colombia.

*Escobar 4004* (HT: JAUM).

***Dracula chestertonii* (Rchb.f.) Luer**

*Masdevallia macrochila* Regel  
Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500-2200 m.

ANT, CHO, VAL. Casi

Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

*Chesterton s.n.* (HT: W).

***Dracula chimaera* (Rchb.f.) Luer**

*Masdevallia backhousiana*  
Rchb.f., *Masdevallia senilis*  
Rchb.f., *Masdevallia wallisii* var.  
*stupenda* Rchb.f.

Luer 1993; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1300-2200 m.

ANT, CAU, CHO. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

*Roetzl s.n.* (HT: W).

***Dracula chiroptera* Luer & Malo**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1750 m.

NAR. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

SO Colombia a Ecuador.

*Luer 6028* (SEL).

***Dracula circe* Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700-2000 m.

ANT. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1883* (HT: JAUM).

***Dracula citrina* Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 6545* (HT: SEL).

***Dracula cochliops* Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200 m.

PUT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 3127* (HT: JAUM).

***Dracula cutis-bufonis* Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2050 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

NO Colombia.

*Escobar 1377* (HT: JAUM; IT: K).

***Dracula decussata* Luer & R.Escobar**

*Dracula niesseniae* P.Ortiz  
Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400 m.

CHO, VAL. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1818* (HT: JAUM).

***Dracula dens-canis* N.Peláez**

Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1250 m.  
RIS. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Peláez NP0058* (HT: HUA; IT:  
HUA, JAUM).

***Dracula diabolus* Luer &  
R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán  
2003; Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200-2600 m.  
BOY. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Escobar 1864* (HT: JAUM).

***Dracula diana* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1993; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
VAL. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
O Colombia.  
*Escobar 1882* (HT: JAUM).

***Dracula dodsonii* (Luer)  
Luer**

*Masdevallia dodsonii* Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a NC Ecuador.  
NOTA: registrada de Colombia,  
sin indicación de espécimen /  
recorded from Colombia with no  
specimen citation.

***Dracula exasperata* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.

PUT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
SO Colombia.  
*Escobar 3796* (HT: MO).

***Dracula felix* (Luer) Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
NAR. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia a C Ecuador.  
*Escobar 4051* (JAUM).

***Dracula gerhardii* Luer &  
Sijm**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia.  
*Sijm 291122* (HT: MO).  
NOTA: encontrada en una  
colección viva en Alemania,  
proveniente de Norte de  
Santander / found in a living  
collection in Germany,  
originating in Norte de  
Santander.

***Dracula gigas* (Luer &  
Andretta) Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2200 m.  
VAL. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
O Colombia a NO Ecuador.  
*Luer 13011A* (MO).

***Dracula gorgona* (A.H.Kent)  
Luer & R.Escobar**

*Masdevallia chimaera* var.  
*gorgona* A.H.Kent

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2200 m.  
CAL, CHO, RIS. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
NO Colombia.  
*Luer 13162* (HT: MO).

***Dracula gorgonella* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2000 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Escobar 28* (HT: JAUM).

***Dracula hirtzii* Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
NAR. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia NC Ecuador.  
*Luer 12513* (MO).

***Dracula houtteana* (Rchb.f.)  
Luer**

*Dracula callifera* (Schltr.)  
*Luer, Dracula carderiopsis*  
(F.Lehm. & Kraenzl.) Luer,  
*Dracula mosquerae* (F.Lehm.  
& Kraenzl.) Luer, *Masdevallia*  
*callifera* Schltr., *Masdevallia*  
*carderi* var. *mosquerae* Lehm. &  
Kränzl., *Masdevallia carderiopsis*  
F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia*  
*mosquerae* F.Lehm. & Kraenzl.  
Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2440 m.

ANT, CAU, CHO, CUN, RIS.  
Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
*Lehmann 2335* (HT: G).

***Dracula inaequalis* (Rchb.f.)**

**Luer & R.Escobar**

*Dracula carderi* (Rchb.f.) Luer,  
*Masdevallia carderi* Rchb.f.  
Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 400-  
1500 m.  
ANT, CHO, VAL. Casi  
Amenazada (Calderón-Sáenz  
2007).  
*Luer 13309* (MO).

***Dracula incognita* Luer &  
R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
ANT. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 4008* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
se cree que puede provenir de  
Antioquia / known only from  
the type, thought to originate in  
Antioquia.

***Dracula insolita* Luer &  
R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007; Idárraga  
*et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-1900 m.  
VAL. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
O Colombia.  
*Escobar 3992* (HT: JAUM).

***Dracula iricolor* (Rchb.f.)**

**Luer & R.Escobar**

*Dracula quilichaoensis* (F.Lehm.  
& Kraenzl.) Luer, *Dracula*  
*trichroma* (Schltr.) Hermans,  
*Masdevallia quilichaoensis*  
F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia*  
*trichroma* Schltr.  
Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1990-2800 m.  
ANT, CAU, PUT, RIS, VAL. Casi  
Amenazada (Calderón-Sáenz  
2007).  
Colombia a NO Ecuador.  
*Roehl s.n.* (HT: W).

***Dracula lehmanniana* Luer  
& R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
CAU. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Luer 2982* (HT: SEL).

***Dracula lemurella* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1650 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Escobar 1540* (HT: JAUM).

***Dracula levii* Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2000 m.  
NAR. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).  
SO Colombia a NO Ecuador.  
*Escobar s.n.* (JAUM).

***Dracula ligiae* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Escobar 3979* (HT: JAUM).

***Dracula mantissa* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1850 m.  
NAR. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia a NO Ecuador.  
*Escobar 1946* (JAUM).

***Dracula minax* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Escobar 682* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Dracula nosferatu* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Escobar 3977* (HT: JAUM; IT: K,  
MO).

***Dracula nycterina* (Rchb.f.)****Luer**

*Masdevallia chimaera* André  
Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1200-1830 m.

ANT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 1839* (SEL).

***Dracula octavioi* Luer &****R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300 m.

PUT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

SO Colombia.

*Escobar 2001* (HT: JAUM).

***Dracula ophioceps* Luer &****R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1620 m.

CAU. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

SO Colombia.

*Escobar 1298* (HT: JAUM).

***Dracula orientalis* Luer &****R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2050 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

NE Colombia.

*Luer 7935* (HT: SEL).

***Dracula ortiziana* Luer &****R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2500 m.

VAL. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

O Colombia.

*Escobar 4085* (HT: JAUM).

***Dracula pholeodytes* Luer &****R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

BOY. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

NE Colombia.

*Luer 1976* (HT: SEL).

***Dracula pileus* Luer &****R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700-2000 m.

ANT. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

O Colombia.

*Escobar 1880* (HT: JAUM; IT:  
SEL).

***Dracula posadarum* Luer &****R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Escobar 1904* (HT: JAUM).

***Dracula presbys* Luer &****R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007; Idárraga  
*et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica.

ANT. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 14092* (HT: SEL).

NOTA: localidad incierta, prob.  
Antioquia / locality uncertain,  
prob. Antioquia.

***Dracula psittacina* (Rchb.f.)****Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Viveros & Higgins 2007; Idárraga  
*et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2400 m.

ANT, CUN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Lawrence s.n.* (HT: W).

***Dracula pusilla* (Rolfe) Luer**

*Dracula vagabunda* Luer &  
R.Escobar, *Masdevallia johannis*  
Schltr., *Masdevallia pusilla* Rolfe  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
SE México a Centroamérica,  
Colombia?

NOTA: registrada de Colombia,  
sin indicación de espécimen /  
recorded from Colombia with no  
specimen citation.

***Dracula radiosa* (Rchb.f.)****Luer**

*Dracula medellinensis* (Kraenzl.)  
Luer, *Masdevallia medellinensis*  
Kraenzl.

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600-2440 m.  
ANT, NAR. Preocupación Menor  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a NO Ecuador.  
*Escobar 433* (JAUM).

***Dracula ×radio-syndactyla***

**Luer**

Luer 1993; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1950 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia.

*Luer 6314* (HT: SEL).

NOTA: híbrido de *D. radiosa* ×  
*D. syndactyla* / a hybrid of *D.*  
*radiosa* × *D. syndactyla*.

***Dracula robledorum***

**(P.Ortiz) Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2200 m.

ANT, RIS. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Segura s.n.* (HT: K).

***Dracula roezlii* (Rchb.f.)**

**Luer**

*Masdevallia chimaera* var.  
*roezlii* (Rchb.f.) A.H.Kent,  
*Masdevallia chimaera* var. *roezlii*  
subvar. *rubra* Warner & Wms.,  
*Masdevallia chimaera* var.  
*winniana* (Rchb.f.) A.H.Kent,  
*Masdevallia roezlii* var. *rubra*  
Williams, *Masdevallia winniana*  
Rchb.f.

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2300 m.

ANT, RIS. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Roezl s.n.* (HT: W).

***Dracula rojasii* N.Peláez et  
al.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Central.

*Peláez NP0285* (HT: JAUM; IT:  
HUA).

***Dracula senex-furens***

**N.Peláez et al.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2200 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Peláez NP0288* (HT: JAUM; IT:  
HUA).

***Dracula sergioi* Luer &**

**R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1950 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Escobar 1402* (HT: JAUM).

***Dracula severa* (Rchb.f.)**

**Luer**

*Masdevallia chimaera* var. *severa*  
(Rchb.f.) A.H.Kent

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2000 m.

ANT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Patin 10* (HT: W).

***Dracula sibundoyensis* Luer**

**& R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300 m.

PUT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

SO Colombia a N Ecuador.

*Escobar 2002* (HT: JAUM).

***Dracula spectrum* (Rchb.f.)**

**A.Doucette**

*Dracula lowii* (Rolfe) Luer,  
*Dracula platycrater* (Rchb.f.)  
Luer, *Masdevallia lowii* Rolfe,  
*Masdevallia platycrater* Rchb.f.,  
*Masdevallia spectrum* Rchb.f.

Doucette 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500-1700 m.

ANT, CAL, CAU. No evaluada.  
*Shuttleworth s.n.* (LT: W).

***Dracula syndactyla* Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1950 m.

NAR. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 6313* (HT: SEL).

***Dracula tsubotae* Luer**

Calderón-Sáenz & Farfán  
2003; Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500 m.

NAR. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

SO Colombia.

*Barrow R08* (HT: MO).

***Dracula veleziana* Luer &**

**V.N.M.Rao**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900-2100 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Rao 171* (HT: MO).

***Dracula velutina* (Rchb.f.)****Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1220 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Wallis s.n.* (HT: W).

***Dracula venefica* Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica.

ANT. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1903* (HT: JAUM).

***Dracula venosa* (Rolfe) Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

O Colombia a NC y NO Ecuador.

*Sander s.n.* (HT: K).

NOTA: sin localidad en Colombia / without locality in Colombia.

***Dracula verticulosa* Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-1900 m.

VAL. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

O Colombia.

*Escobar 4000* (HT: JAUM).

***Dracula vespertilio* (Rchb.f.)****Luer**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-2100 m.

ANT, CAL, CHO, NAR, RIS, VAL. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Nicaragua a NC Ecuador.

*Wallis s.n.* (HT: W).

***Dracula villegasii* König**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Königer WK-91* (HT: M).

***Dracula vinacea* Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2200 m.

BOY. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 968* (HT: JAUM).

***Dracula vlad-tepes* Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

SAN. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

NE Colombia.

*Luer 2180* (HT: JAUM).

***Dracula wallisii* (Rchb.f.)****Luer**

*Masdevallia chimaera* var. *wallisii* (Rchb.f.) A.H.Kent, *Masdevallia*

*chimarea* J.D.Hooker, *Masdevallia chimarea* W.G.Smith  
Luer 1993; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2800 m.

ANT, CAU, CHO, VAL.

Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

O Colombia.

*Wallis s.n.* (HT: K; IT: W).

***Dracula xenos* Luer & R.Escobar**

Luer 1993; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

VAL. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 13012* (HT: MO).

***Dresslerella* Luer**

2 especies

***Dresslerella hispida* (L.O.Williams) Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 300 m.

CHO. No evaluada.

Centroamérica a NO Colombia.

*Luer 2662* (SEL).

***Dresslerella stellaris* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2050 m.

ANT. No evaluada.

Costa Rica a Colombia.

*Luer 2261* (HT: JAUM).

***Dressleria* Dodson**

5 especies, 2 especies endémicas

***Dressleria dodsoniana***

**H.G.Hills**

Escobar, R. 1990.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Escobar 1990-1998: No. 163 (?)*.

***Dressleria eburnea* (Rolfe)**

**Dodson**

*Catasetum eburneum* Rolfe  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200 m.  
NSA. No evaluada.  
Costa Rica a Perú.

***Dressleria kalbreyeri***

**H.G.Hills**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Kalbreyer 504* (HT: W).

***Dressleria kerryae* H.G.Hills**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0-500 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Misas 307* (HPUJ).

***Dressleria morenoi* H.G.Hills  
& M.H.Weber**

Hills & Weber 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 650 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Weber 319/2008* (HT: K; IT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Dryadella Luer***

15 especies, 4 especies endémicas

***Dryadella crassicaudata***

**Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, N Perú.  
NOTA: registrada de Colombia,  
sin indicación de espécimen /  
recorded from Colombia with no  
specimen citation.

***Dryadella cristata* Luer &  
R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1100-1700 m.  
CAU, VAL. No evaluada.  
O Colombia.  
*Escobar 1981* (HT: JAUM).

***Dryadella cuspidata* Luer &  
Hirtz**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 600-  
800 m.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia a E Ecuador.  
*Luer 2957* (SEL).

***Dryadella dodsonii* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50 m.  
VAL. No evaluada.  
O Colombia a NO Ecuador.  
*Otero 1003* (CUVC).

***Dryadella gnoma* (Luer)  
Luer**

*Dryadella misasii* Luer &  
R.Escobar

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 500 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Perú.  
*Escobar 1451* (HT: JAUM).

***Dryadella guatemalensis*  
(Schltr.) Luer**

*Masdevalliaguatemalensis*  
Schltr., *Masdevalliasimula* var.  
*guatemalensis* (Schltr.) Kraenzl.  
Luer 2003; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50-100 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a México.  
*Misas Urreta 71* (COL).

***Dryadella meiracyllium*  
(Rchb.f.) Luer**

*Masdevallia meiracyllium* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a N Ecuador.  
NOTA: descrita de Colombia, sin  
datos de localidad / described  
from Colombia with no locality  
data.

***Dryadella minuscula* Luer &  
R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Cauca. 800-  
1100 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia (Antioquia), Perú  
(Cajamarca).  
*Luer 1919* (HT: SEL).

***Dryadella mocoana* Luer &  
R.Escobar**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 600-800 m.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia.  
*Luer 2957* (HT: SEL).

***Dryadella odontostele* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 75 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a NO Colombia.  
*Luer 12905* (MO).

***Dryadella pusiola* (Rchb.f.)**

**Luer**

*Masdevallia albicans* Luer,  
*Masdevallia dolichopoda* Luer,  
*Masdevallia simulatrix* F.Lehm.  
& Kraenzl.  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 300-2600 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
NOTA: en Colombia se conoce  
del espécimen tipo, sin datos de  
localidad. La elevación reportada  
es la citada para los especímenes  
ecuatorianos / known in  
Colombia only from the type  
specimen, without locality  
data; recorded elevation is from  
Ecuadorian specimens.

***Dryadella rodrigo* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
CAU. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Escobar 1396* (HT: SEL).

***Dryadella simula* (Rchb.f.)**

**Luer**

*Dryadella popayanensis* (F.Lehm.  
& Kraenzl.) Luer, *Masdevallia*  
*popayanensis* F.Lehm. & Kraenzl.

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT, BOY, CAU. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Fernández-Alonso 12104* (COL,  
MO).

***Dryadella verrucosa* Luer &  
R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 10091* (HT: MO).

***Dryadella zebrina* (Porsch)**

**Luer**

*Masdevallia carinata* Cogn.,  
*Masdevallia zebrina* Porsch  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
O Suramérica, SE y S Brasil.  
NOTA: registrada de Colombia,  
sin indicación de espécimen /  
recorded from Colombia with no  
specimen citation.

***Duckeella* Porto & Brade**

1 especie

***Duckeella adolphii* Porto &  
Brade**

*Duckeella alticola* C.Schweinf.,  
*Duckeella pauciflora* Garay  
Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Guayana y Macarena,  
Orinoquia. 100-400 m.  
GUI, VAU, VIC. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
*Maguire 36277* (AMES).

***Echinorhyncha* Dressler**

4 especies, 2 especies endémicas

***Echinorhyncha antonii*  
(P.Ortiz) Dressler**

*Chondrorhyncha antonii* P.Ortiz  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 200 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1054* (HT: HPUJ).

***Echinorhyncha litensis*  
(Dodson) Dressler**

*Chondrorhyncha litensis* Dodson  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia? y Ecuador.  
NOTA: citada de Colombia por  
Dodson & Luer (2005), sin mas  
datos / recorded from Colombia  
by Dodson & Luer (2005)  
without further data.

***Echinorhyncha manzurii*  
(P.Ortiz) P.A.Harding &  
Manzur**

*Chondrorhyncha manzurii*  
P.Ortiz  
Harding 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1113* (HT: COL).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Echinorhyncha vollesii*  
(G.Gerlach et al.) Dressler**

*Chondrorhyncha vollesii*  
G.Gerlach et al.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.

NAR. No evaluada.  
SO Colombia y Ecuador.  
*Volles s.n.* (HT: HEID).

***Echinosepala* Pridgeon &  
M.W.Chase**

1 especie

***Echinosepala aspasicensis*  
(Rchb.f.) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Myoxanthus aspasicensis*  
(Rchb.f.) Luer, *Myoxanthus*  
*pastacensis* (Luer) Luer,  
*Pleurothallis aspasicensis* Rchb.f.,  
*Pleurothallis pastacensis* Luer  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Magdalena.  
760-1200 m.  
NSA. No evaluada.  
Costa Rica a Bolivia, Venezuela,  
Guyana, Surinam; Brasil.  
*Wagener 618* (HT: K).

***Elleanthus* C.Presl**

66 especies, 14 especies  
endémicas

***Elleanthus amethystinoides*  
Garay**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 100-500 m.  
AMA, GUI, VAU. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Bolivia.  
*Escobar 1990-1998: No. 843 (?)*.

***Elleanthus amethystinus*  
(Rchb.f. & Warsz.) Rchb.f.**

*Evelyna amethystina* Rchb.f. &  
Warsz.  
Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes?

DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: esperada; conocida en  
Venezuela y Perú / expected;  
known in Venezuela and Peru.

***Elleanthus ampliflorus*  
Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa.  
NAR. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Hopp 100* (HT: B, destruido).

***Elleanthus arpophyllostachys*  
(Rchb.f.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 1300-3400 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

***Elleanthus aurantiacus*  
(Lindl.) Rchb.f.**

*Elleanthus hoppii* Schltr.  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1600-3600 m.  
ANT, ARA, BOY, CAL, CAU,  
CUN, HUI, MAG, MET, NAR,  
PUT, QUI, RIS, SAN, TOL, VAL.  
Preocupación Menor (propuesta  
aquí).  
Honduras a Bolivia.  
*Triana 1323/3* (COL).

***Elleanthus aureus* (Poepp. &  
Endl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1300-2700 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Bristol 1216* (COL).

***Elleanthus bifarius* Garay**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 901* (HPUJ).

***Elleanthus blatteus* Garay**

Hierba.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Medina 356* (foto).

***Elleanthus bogotensis* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Hopf s.n.* (HT: B, destruido).

**[*Elleanthus bractescens*  
(Lindl.) Rchb.f.]**

Ortiz 1995.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea. Endémica  
de Perú / record based on a  
misidentification; endemic to  
Peru.

***Elleanthus capitatus* (Poepp.  
& Endl.) Rchb.f.**

*Elleanthus zamorensis* Garay  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1900-2350 m.  
ANT, CHO, PUT, VAL. No  
evaluada.  
Centroamérica a Bolivia; Caribe.  
*Killip 33869* (COL).

***Elleanthus cinnabarinus*  
Garay**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 3100 m.

ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 131* (HT: AMES).

***Elleanthus columnaris*  
(Lindl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1400-1500 m.  
ANT, CAQ, NAR. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, N Brasil.  
*Fonnegra 5465* (HUA, MO).

***Elleanthus congestus* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp 45* (HT: B, destruido).

***Elleanthus conifer* (Rchb.f. &  
Warsz.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1060-2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Brant 1599* (MO).

***Elleanthus coriifolius*  
(Linden) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. SN Santa Marta.  
MAG. No evaluada.  
Colombia.  
*Linden 1272* (HT: W).

***Elleanthus curtii* Schltr.**

Hierba.  
Nativa. 800-2500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: esperada; Nicaragua a  
Ecuador / expected; Nicaragua to  
Ecuador.

***Elleanthus discolor* (Rchb.f.  
& Warsz.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 500-1500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Nicaragua a Perú.  
*Escobar 1990-1998: No. 168* (?).

***Elleanthus ensatus* (Lindl.)  
Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2300 m.  
CUN. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Fernández-Pérez 1964:30*.

***Elleanthus escobarii* Dodson**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
RIS. No evaluada.  
*Escobar 5429* (HT: RPSC).

***Elleanthus flavescens* (Lindl.)  
Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
CAU. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Escobar 2749* (HUA).

***Elleanthus formosus* Garay**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2400-3350 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Schmidtchen s.n.* (HT: W).

***Elleanthus fractiflexus* Schltr.**

*Elleanthus tenellus* L.O. Williams  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1250-1750 m.

ANT, PUT. No evaluada.  
Panamá a Venezuela y Ecuador.  
*Brant 1750* (HUA, MO).

***Elleanthus furfuraceus*  
(Lindl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
*Fernández-Pérez 1964:14* (como  
*E. gracilis*).

***Elleanthus gastroglottis*  
Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1800-3400 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú.

***Elleanthus gracilis* (Rchb.f.)  
Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
CAU. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Escobar 1174* (AMES).

***Elleanthus graminifolius*  
(Barb.Rodr.) Løjtnant**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1850 m.  
ANT. No evaluada.  
América tropical.  
*Escobar 3660* (HUA).

***Elleanthus grandiflorus*  
Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

***Elleanthus haematoxanthus***  
**(Linden) Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
NSA. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schlim 25* (HT: G).

***Elleanthus hirtzii* Dodson**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1240-1700 m.  
ANT, NAR. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Bolivia.  
*Cogollo 2790* (JAUM, MO).

***Elleanthus hymenophorus***  
**(Rchb.f.) Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 300-1850 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Centroamérica a Perú.  
NOTA: esperada / expected.

***Elleanthus isochiloides***

**Løjtnant**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 300-2200 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Medina 366* (foto).

***Elleanthus jimenezii* (Schltr.)  
C.Schweinf.**

*Epilyna jimenezii* Schltr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. 700-1900 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

***Elleanthus kalbreyeri* Garay**

*Elleanthus longibracteatus*  
Kraenzl.

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2600-2700 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Kalbreyer 768* (HT: W).

***Elleanthus kermesinus***  
**(Lindl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1200-1500 m.  
NSA, TOL. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Linden 1276* (HT: K).  
*Elleanthus kermesinus* var.  
*aurantiacus-simplex* (Rchb.f.)  
Rchb.f.

***Elleanthus killipii* Garay**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Pacífico. 10 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Killip 11760* (HT: AMES).

***Elleanthus laetus* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp 144* (HT: B, destruido).

***Elleanthus lancifolius* C.Presl**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1500-2000 m.  
CAQ, PUT, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Cabrera 15823* (MO).

***Elleanthus leiocaulon* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.  
*Schultze 34* (HT: B, destruido).

***Elleanthus ligularis* Dressler  
& Bogarín**

*Adeneuleterophora ligularis*  
(Dressler & Bogarín) Dudek &  
Szlach.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a Colombia, Cuba.  
NOTA: señalada de Colombia,  
sin datos de localidad / recorded  
from Colombia, without locality  
data.

***Elleanthus linifolius* C.Presl**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 500-1780 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Cuatrecasas 13288* (COL).

***Elleanthus longibracteatus***  
**(Griseb.) Fawc.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Caribe. 10-2700  
m.  
ANT. No evaluada.  
N Suramérica, Caribe.  
*Escobar 698* (AMES).

***Elleanthus lupulinus* (Lindl.)  
Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 3000-3300 m.  
CUN, SAN. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Ortiz 44* (HPUJ).

***Elleanthus maculatus***  
**(Lindl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.

Nativa. Andes. 2440 m.  
ANT. No evaluada.  
Costa Rica a Perú.  
*Escobar 7876* (HUA).

***Elleanthus magnicallosus*****Garay**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
HUI. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Von Sneidern 2015* (S).

***Elleanthus myrosomatis*****(Rchb.f.) Rchb.f.**

*Evelyna myrosomatis* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
O Suramérica.  
NOTA: registrada de Colombia,  
sin indicación de espécimen /  
recorded from Colombia with no  
specimen citation.

***Elleanthus oeconomicus*  
(Rchb.f. & Warsz.) Garay &  
Dunst.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 2150-2300 m.  
NSA? No evaluada.  
Colombia?, Venezuela.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Táchira (Venezuela), cerca de la  
frontera / expected; collected in  
Táchira (Venezuela), near the  
border.

***Elleanthus oliganthus*  
(Poepp. & Endl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1300-2000 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Betancur 5510* (COL, MO).

***Elleanthus pastoensis* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp 32* (HT: B, destruido).

***Elleanthus petrogeiton* Schltr.**

Hierba.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Medina 273* (foto).

***Elleanthus purpureus*****(Rchb.f.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1140 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia, Bolivia.  
*Escobar 908* (AMES).

***Elleanthus reichenbachianus*****Garay**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1000-2600 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Schlim 90* (HT: W).

***Elleanthus robustus* (Rchb.f.)****Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 500-2500 m.  
NAR? No evaluada.  
S Colombia? a Perú.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Elleanthus ruizii* (Rchb.f.)****Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 180-1200 m.  
NAR?, PUT? No evaluada.  
Colombia a Perú.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi y Sucumbíos (Ecuador),  
cerca de la frontera / expected;  
collected in Carchi and  
Sucumbíos (Ecuador), near the  
border.

***Elleanthus scopula* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a Bolivia.  
NOTA: esperada / expected.

***Elleanthus smithii* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1900-3000 m.  
CUN, MAG. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Smith 2457* (HT: AMES).

***Elleanthus sodiroi* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1550-2750 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Escobar 1990-1998: No. 166* (?).

***Elleanthus sphaerocephalus*  
Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2300 m.  
NAR. No evaluada.  
Venezuela Bolivia.  
*Hopp 33* (HT: B, destruido).

***Elleanthus steyermarkii***

**Barringer**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 2100 m.

CHO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Forero 2181* (COL).

***Elleanthus strobilifer* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 800 m.

ANT. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Cogollo 3018* (JAUM, MO).

***Elleanthus towarensis* Ames**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes.

BOY. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Álvarez s.n.* (foto).

***Elleanthus ventricosus* Schltr.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1800-3300 m.

NAR? No evaluada.

S Colombia?, Ecuador.

NOTA: recolectada en Carchi y Sucumbíos (Ecuador), cerca de la frontera / collected in Carchi and Sucumbíos (Ecuador), near the border.

***Elleanthus venustus* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Endémica. Andes. 2300 m.

NAR. No evaluada.

*Hopp 145* (HT: B, destruido).

***Elleanthus vinosus* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Endémica. Andes. 3800 m.

NAR. No evaluada.

Colombia.

*Hopp 23* (HT: B, destruido).

***Elleanthus virgatus* (Rchb.f.) C.Schweinf.**

*Sobralia micrantha* Kraenzl.

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes. 1500-3000 m.

CAU, CHO, CUN. No evaluada.

Colombia a Perú y Brasil.

*Ortiz 188* (HPUJ).

***Elleanthus wagneri* (Rchb.f.) Rchb.f.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 1830-2780 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Zarucchi 5253* (HUA, MO).

***Elleanthus xanthocomus* Hook.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 2000-2500 m.

ANT. No evaluada.

Costa Rica a Perú.

*Santa 406* (HUA).

***Eloyella* P.Ortiz**

3 especies, 2 especies endémicas

***Eloyella antioquiensis* (P.Ortiz) P.Ortiz**

*Phymatidium antioquiense*

P.Ortiz

Ortiz 1977.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Escobar 1604* (HT: COL).

***Eloyella cundinamarcae* (P.Ortiz) P.Ortiz**

*Phymatidium cundinamarcae*

P.Ortiz

Ortiz 1977.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900-2500 m.

ANT, CUN. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz 768* (HT: COL; IT: HPUJ).

***Eloyella panamensis* (Dressler) Dodson**

*Phymatidium panamense*

Dressler

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 450 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Panamá a Ecuador y Guyana.

NOTA: esperada / expected.

***Eltroplectris* Raf.**

1 especie

***Eltroplectris calcarata* (Sw.) Garay & H.R.Sweet**

*Centrogenium calcaratum* (Sw.)

Schltr., *Centrogenium setaceum*

(Lindl.) Schltr., *Neottia calcarata*

Sw., *Pelexia setacea* Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Amazonia. 240 m.

AMA. No evaluada.

Estados Unidos, Caribe, N Suramérica.

*García-Barriga 14583* (COL).

NOTA: en Colombia se conoce solo de una colección / known in Colombia from a single collection.

***Embreea* Dodson**

1 especie, 1 especie endémica

***Embreea rodigasiana*****(Cogn.) Dodson***Stanhopea rodigasiana* Cogn.

Jenny 2002.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, Pacífico.

0-1000 m.

ANT, CAU, CHO, VAL.

Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Claes s.n.* (HT: BR; IT: K).***Encyclia* Hook.**

25 especies, 9 especies endémicas

***Encyclia aspera* (Lindl.)****Schltr.***Encyclia asperirachis* Garay,  
*Epidendrum asperum* Lindl.

Withner 2000.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Caribe. 200-800 m.

CÓR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cuming 1250* (HT: K).***Encyclia ceratistes* (Lindl.)****Schltr.***Epidendrum ceratistes* Lindl.

Romero-Castañeda &amp; Carnevali 2000; Withner 2000.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 1000-2000 m.

CES, CÓR, GUJ, MAG. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Linden 1658* (HT: K).***Encyclia chloroleuca* (Hook.)****Neumann***Encyclia acuta* Schltr., *Encyclia maravalensis* Withner, *Encyclia thienii* Dodson, *Encyclia viridiflava* L.C.Menezes, *Epidendrum chloranthum* Lindl., *Epidendrum chloroleucum* Hook.

Romero-González &amp; Carnevali 2000.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 0-700 m.

MET. No evaluada.

Colombia a Guayanas y Brasil; Trinidad y Tobago.

*Renz 3199* (RENZ).***Encyclia cordigera* (Kunth)****Dressler***Cymbidium cordigerum*Kunth, *Encyclia atropurpurea* (Willd.) Schltr., *Epidendrum atropurpureum* Willd.

Withner 2000; Carnevali &amp; Ramírez-Morillo 2003.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Caribe, SN Santa Marta, V Magdalena. 0-900 m.

ANT, ATL, BOL, BOY, CES, CÓR, GUJ, MAG, NSA, SAN, SUC. No evaluada.

México a Venezuela; Trinidad y Tobago.

*Haught 3721* (AMES).***Encyclia cyperifolia*****(C.Schweinf.) Carnevali &****I.Ramírez***Bletia ensiformis* Ruiz & Pav.,*Encyclia ensiformis* (Vell.)Hoehne, *Encyclia ensiformis* Mansf., *Epidendrum cyperifolium*C.Schweinf., *Epidendrum microtos* var. *grandiflorum*

C.Schweinf.

Withner 2000.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Orinoquia. 300-700 m.

MET. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.

*Renz 3203* (RENZ).***Encyclia elegantula* Dressler**

Dressler 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 900-1200 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Panamá, Colombia?, Venezuela.

NOTA: esperada; conocida de áreas vecinas, en Panamá y Venezuela / expected; known from neighboring areas in Panama and Venezuela.

***Encyclia expansa* (Rchb.f.)****P.Ortiz***Epidendrum expansum* Rchb.f.

Withner 2000.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Reichenbach 993* (HT: W).***Encyclia garzonensis*****Withner**

Withner 2000.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2100 m.

HUI. No evaluada.

*Kennedy s.n.* (HT: AMES).***Encyclia kermesina* (Lindl.)****P.Ortiz***Epidendrum kermesinum* Lindl.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a N Venezuela.

NOTA: especie dudosa; prob. un *Epidendrum* / dubious species; prob. *Epidendrum*.***Encyclia leucantha* Schltr.***Epidendrum leucanthum*

C.Schweinf.

Carnevali *et al.* 1994.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena, Orinoquia. 50-100 m.

ARA, BOY, CAS, GUI, GUV, MET, VIC. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Haught 2684* (AMES).

***Encyclia madero* Schltr.**

Withner 2000.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 900-1300 m.  
ANT. No evaluada.  
*Speckmaier s.n.* (W).

***Encyclia magdalenae***

**Withner**  
Withner 2000.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Withner s.n.* (HT: AMES).

***Encyclia microtos* (Rchb.f.)**

**Hoehne**  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
PUT? No evaluada.  
NOTA: esperada; conocida de áreas vecinas, en Perú / expected; known from neighboring areas in Peru.

**[*Encyclia oncidoides* (Lindl.) Schltr.]**

Govaerts *et al.* 2014a.  
NOTA: registro basado en identificación errónea. Nombre mal aplicado para especímenes de diversas especies. La auténtica *E. oncidoides* es de Brasil / record based on a misidentification; a name misapplied to specimens of several species; true *E. oncidoides* is from Brasil.

***Encyclia ortgiesii* (Regel)**

**Schltr.**  
*Epidendrum ortgiesii* Regel  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia?, Guayana y Macarena.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: especie dudosa.  
Pobremente conocida.  
Dudosamente atribuida a

Colombia / dubious species; poorly known; dubiously attributed to Colombia.

***Encyclia paralela* (Lindl.)**

**P.Ortiz**  
*Epidendrum paralellum* Lindl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
NOTA: especie dudosa, prob. un *Epidendrum* / dubious species; prob. *Epidendrum*.

***Encyclia parkeri* Reina-Rodríguez & Leopardi**

Leopardi-Verde *et al.* 2014.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1300-1400 m.  
VAL. En Peligro Crítico (Leopardi-Verde *et al.* 2014).  
Cordillera Occidental.  
*Reina-Rodríguez 1694* (HT: CUV; IT: COL, HUA).

***Encyclia pilosa* (C.Schweinf.) Carnevali & I.Ramírez**

*Epidendrum pilosum* C.Schweinf.  
Carnevali & Ramírez-Morillo 2003.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 100-350 m.  
CAQ. No evaluada.  
Colombia, Perú y Venezuela.  
*Arbeláez 389* (COAH).

***Encyclia profusa* (Rolfe) Dressler & G.E.Pollard**

*Epidendrum profusum* Rolfe  
Withner 2000.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
CUN. No evaluada.  
*Sander 566-11* (K).

***Encyclia remotiflora* (C.Schweinf.) Carnevali & I.Ramírez**

Hierba, epífita.  
Nativa. Guayana y Macarena? 60-200 m.  
GUI?, VIC? No evaluada.  
Venezuela.  
NOTA: esperada; conocida de áreas vecinas, en O Venezuela / expected; known from neighboring areas in W Venezuela.

***Encyclia replicata* (Lindl.) Schltr.**

*Epidendrum replicatum* Lindl. & Paxton  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Escobar 673* (AMES).

***Encyclia stellata* (Lindl.)**

**Schltr.**  
*Encyclia hunteriana* Schltr., *Epidendrum stellatum* Lindl.  
Carnevali *et al.* 1994; Withner 2000.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe, Orinoquia. 50-300 m.  
ANT, ARA, ATL, BOL, CAS, CES, CÓR, GUJ, MAG, MET, NSA, SAN, SUC. No evaluada.

***Encyclia* sp. 1**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1500 m.  
NSA? No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Leopardi 407* (CICY).  
NOTA: especie no descrita.  
Conocida solo de material cultivado. Emparentada con *E. diurna* / undescribed species, known only from cultivated material; related to *E. diurna*.

***Encyclia* sp. 2**

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Leopardi* 408 (CICY).

NOTA: especie prob. no descrita, conocida solo de material cultivado. Emparentada con *E. silvana* / prob. an undescribed species, known only from cultivated material; related to *E. silvana*.

***Encyclia* sp. 3**

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Leopardi* 409 (CICY).

NOTA: especie prob. no descrita. Conocida solo de material cultivado. Emparentada con *E. diurna* / prob. an undescribed species, known only from cultivated material; relatd to *E. diurna*.

***Encyclia* sp. 4**

Hierba, epífita.

Endémica. Islas caribeñas. 0-100 m.

SAP. No evaluada.

*Proctor* 3371 (US).

NOTA: especie prob. no descrita; emparentada con *E. alata* / prob. an undescribed species, related to *E. alata*.

***Epidendrum* L.**

456 especies, 189 especies endémicas

***Epidendrum acutissimum*****Lindl.**

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600-2900 m.

CAL, TOL. No evaluada.

Colombia.

*Pennell* 9271 (AMES, NY, US).***Epidendrum agathosmicum*****Rchb.f.***Epidendrum lilacinum* LindenGovaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. SN Santa Marta. 650 m.

GUJ. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Sudgen* 224 (COL).***Epidendrum aggregatum*****Lindl.***Epidendrum aggregatum* Steud.Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 1000-2600 m.

ANT, CHO, NAR, VAL. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Callejas* 3824 (AMES, COL, HUA, MO, NY).***Epidendrum aguaricoense*****Hágsater & Dodson**

Hágsater &amp; Dodson 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia? 230 m.

PUT? No evaluada.

Colombia? y Ecuador.

NOTA: esperada; descrita del río Aguarico, al sur del río Putumayo / expected; described from the Aguarico River, south of the Putumayo River.

***Epidendrum aguirrei*****Hágsater**Hágsater 1999; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500-2000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Hágsater* 11527 (HT: COL).***Epidendrum albertii* Schltr.**

Hágsater &amp; Santiago 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

CHO. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

*Ortiz* 667 (AMO).***Epidendrum alexii* Hágsater & Dodson**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2900-3200 m.

PUT, RIS. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cuatrecasas* 11876 (COL, US).***Epidendrum alfaroi* Ames & C.Schweinf.**

Hágsater &amp; Santiago 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1380 m.

ANT. No evaluada.

Costa Rica a Colombia.

*Cogollo* 2617 (AMO, JAUM, MO).***Epidendrum alpicola* Rchb.f. & Warsz.**Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2380-2540 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Juncosa* 1072 (JAUM, MO).

NOTA: a menudo erróneamente citada como *alpicolum* / often erroneously cited as *alpicolum*.

**[*Epidendrum alsum* Ridl.]**

Ortiz &amp; Uribe 2008.

NOTA: registro basado en identificación errónea / record based on a misidentification.

***Epidendrum althausenii* A.D.Hawkes***Epidendrum uniflorum* Barb. Rodr.

Sánchez &amp; Hágsater 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia? 225 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela, Surinam, Guayana  
Francesa, Brasil, Bolivia, Perú,  
Ecuador.

NOTA: esperada; registrada en  
áreas vecinas, en Amazonia  
/ expected; recorded from  
neighboring areas in Amazonia.

***Epidendrum amayense***

**Hágsater**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-3500 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Central.

*Hágsater 11669* (HT: COL).

***Epidendrum***

***ampelomelanoxeros* Hágsater  
et al.**

Hágsater *et al.* 2013p.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3350-3400 m.

CAL, VAL. No evaluada.

*Sarria 268* (HT: CUVC).

***Epidendrum***

***amplexigastrium* Hágsater &  
Dodson**

Hágsater & Dodson 1999.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia? y Ecuador.

NOTA: registro dudoso. Tipo  
de material cultivado, prob. de  
Ecuador / dubious record; type  
from cultivated material, prob.  
from Ecuador.

***Epidendrum***

***amplexirisaraldense***

**Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2013a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2890 m.

RIS. No evaluada.

*Jaramillo 6117* (HT: COL).

**[*Epidendrum anceps* Jacq.]**

Sánchez & Hágsater 2008;

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en  
especímenes de *E. musciferum*.  
*E. anceps* es principalmente de  
las Antillas / record based on  
specimens of *E. musciferum*. *E.*  
*anceps* is mainly from the West  
Indies.

***Epidendrum***

***anchinocturnum* Hágsater**

Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 250 m.

VAL. No evaluada.

Colombia.

*Hágsater 7383* (HT: AMO; IT:  
COL).

**[*Epidendrum anderssonii***

**Hágsater & Dodson]**

Hágsater & Dodson 1993.

NOTA: registro basado en  
especímenes de *E. colombianum*  
/ record based on specimens *E.*  
*colombianum*.

***Epidendrum andinum***

**Carnevali & G.A.Romero**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300-2450 m.

NSA. No evaluada.

Colombia? y Venezuela.

NOTA: esperada; tipo del lado  
venezolano del páramo de  
Tamá / expected; type from the  
Venezuelan side of the Paramo  
de Tamá.

***Epidendrum andrei* Hágsater**

**& L.Sánchez**

Hágsater & Sánchez 1999.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1250-1400 m.

VAL. No evaluada.

Colombia.

*André 2420* (HT: K-L).

***Epidendrum angaritae***

**Hágsater**

Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Hágsater 11625* (HT: AMO; IT:  
COL, JAUM, MO).

***Epidendrum angustatum***

**(T.Hashim.) Dodson**

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena.  
800 m.

CAQ. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Ortiz 461* (HPUJ).

***Epidendrum***

***angustilobopaniculatum***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

NAR. No evaluada.

S Colombia? y N Ecuador.

NOTA: esperada; descrita de  
Carchi (Ecuador), a 6 km de la  
frontera / expected; described  
from Carchi (Ecuador), 6 km  
from the border.

***Epidendrum angustissimum***

**Lindl.**

*Epidendrum chortophyllum*

Schltr.

Santiago & Hágsater 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2900-3900 m.

CAU, QUI, TOL, VAL. No  
evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Triana 128* (K-L, W).

***Epidendrum anitae* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1200-1500 m.  
CUN. No evaluada.

Colombia.

*Schultze 22* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo de la descripción original / known only from the original description.

***Epidendrum anthoceros*  
Linden & Rchb.f.**

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

NSA. No evaluada.

Colombia.

*Schlim 1157* (HT: W-R, IT: BR, G).

***Epidendrum antioquiense*  
Schltr.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

NOTA: prob. sinónimo de *E. elongatum* / prob. a synonym of *E. elongatum*.

***Epidendrum aporoides*  
F.Lehm. & Kraenzl.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann 4408* (?).

NOTA: no se examinó material / no material was examined.

***Epidendrum aporum* Garay**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 200-1600 m.

ANT, CAU, CHO, NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Escobar 367* (HT: AMES).

**[*Epidendrum aquaticoides*  
C.Schweinf.]**

Ortiz & Uribe 2008.

NOTA: registro basado en identificación errónea. Especie endémica de Perú. El espécimen citado (Escobar 5380) es el tipo de *E. platystachyum* / record based on a misidentification; endemic to Peru; the specimen cited (Escobar 5380) is the type of *E. platystachyum*.

***Epidendrum arachnoglossum*  
André**

Hierba.

Endémica. Andes. 2500-3000 m.

CAU, CUN, NAR. No evaluada.

Colombia.

*Cuatrecasas 5008* (COL).

***Epidendrum arevaloi*  
(Schltr.) Hágsater**

*Diothonea arevaloi* Schltr.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900-3200 m.

CAQ, CAU, NAR, PUT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Hágsater 10554* (NT: COL).

***Epidendrum aristatum*  
Ackerman & Montalvo**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 1500-2000 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Mora 4020* (COL).

***Epidendrum arnoldii* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2200 m.

CUN. No evaluada.

Colombia.

*Linares 2345* (COL, NY).

***Epidendrum atrobrunneum*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3500-4200 m.

CUN, NAR. No evaluada.

Colombia.

*García-Barriga 17719* (AAU, COL, NY).

***Epidendrum attenuatum*  
Lindl.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2470-3000 m.

CUN, GUJ. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Romero-Castañeda 7404* (COL).

***Epidendrum aurigineum*  
Barringer**

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-1900 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Central.

*Albert 7774* (HT: MO).

***Epidendrum aura-usecheae*  
Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013n.

Hierba.

Endémica. Andes. 1200-2600 m.

ANT, BOY, CUN, SAN, VAL. No evaluada.

*Rincón 3* (HT: COL; IT: CUVC).

***Epidendrum avicula* Lindl.**

*Lanium avicula* (Lindl.) Benth.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena.

250-1000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil.

*Ortiz s.n.* (foto, HPUJ).

***Epidendrum aylacotoglossum*  
Hágsater**

Hágsater 2004; Idárraga *et al.*

2011.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Sin colector 5515* (HT: AMES).

***Epidendrum barbaricum*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600-2850 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Gentry 30448* (JAUM, MO).

***Epidendrum batesii* Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 250 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Hágsater 7391* (AMO, COL).

***Epidendrum baumannianum*  
Schltr.**

Hágsater & Santiago 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 150-1000 m.  
CAU, NAR, SAN, VAL. No evaluada.  
Honduras a Ecuador.  
*Romero 2581* (COL).

***Epidendrum  
bianthogastrium* Hágsater &  
Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Escobar 5200* (AMO).

***Epidendrum bispathulatum*  
Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2010.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2200 m.  
CAL, VAL. No evaluada.  
*Pérez 513* (HT: VALLE).

***Epidendrum bivalve* Lindl.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Linden 1266* (HT: K-L, IT: G, OXF, W).

***Epidendrum blepharistes*  
Lindl.**

*Epidendrum brachycladium*  
Lindl., *Epidendrum  
brachycladium* var. *crassipes*  
Lindl., *Epidendrum crassipes*  
(Lindl.) Kraenzl., *Epidendrum  
crassipes* (Lindl.) Schltr.,  
*Epidendrum dolabrilobum* Ames  
& C.Schweinf., *Epidendrum  
funkii* Rchb.f.

Hágsater & Santiago 2008.  
Hierba, epífita, mirmecófila.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1200-2500 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, GUJ,  
MAG, NAR, PUT, SAN, TOL,  
VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; Costa Rica.  
*García-Barriga 20410* (AMES,  
COL, F, US).

NOTA: el tipo indica La Guaira (Venezuela), pero en el viaje los colectores visitaron Riohacha y la Sierra Nevada de Santa Marta; además, no hay ningún registro de Venezuela para esta especie / the type indicates La Guaira (Venezuela), but on their trip, the collectors visited Riohacha and Sierra Nevada de Santa Marta; moreover, there are no records of this species for Venezuela.

***Epidendrum bogotense*  
Schltr.**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2500 m.

CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopf s.n.* (B, destruido).

***Epidendrum brachyglossum*  
Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2800 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia? y Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Epidendrum brachypodum*  
Hágsater**

Hágsater 2004.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
CHO. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Paz 536* (HT: CUVVC).

***Epidendrum brachyschistum*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp s.n.* (HT: B, destruido).

***Epidendrum  
bractiacuminatum* Hágsater  
& Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2850 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Huertas 1126* (COL).

***Epidendrum brassivoliforme*  
F.Lehm. & Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.  
CAU. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann 6846* (HBG, K).

NOTA: a menudo erróneamente escrito *brassivolaeforme* / often misspelled *brassivaeliforme*.

***Epidendrum brevicernuum*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1650-2630 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Zarucchi 4437* (AMES, COL, MO, SEL).

***Epidendrum buenaventurae*  
F.Lehm. & Kraenzl.**

Sánchez & Hágsater 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 0-1420 m.

ANT, CAU, VAL. No evaluada.

México a Colombia.

*Killip 38618* (COL).

***Epidendrum caeciliae* P.Ortiz  
& Hágsater**

Ortiz, P. 2005.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

TOL. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz 1216* (HT: HPUJ).

***Epidendrum caesaris*  
Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1780-3160 m.

BOY, CUN, NSA, SAN. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Luer 7759* (SEL).

***Epidendrum calanthum*  
Rchb.f. & Warsz.**

*Epidendrum cauae* Schltr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Orinoquia. 300-1450 m.

BOY, CAU, CUN, MET, SAN,

VAU. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

*Fernández 5933* (COL, HPUJ).

***Epidendrum calothyrsus*  
Schltr.**

Ortiz & Uribe 2008.

Hierba.

Endémica. Andes. 1500 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

NOTA: tratada como sinónimo de *E. agathosmicum* por Govaerts *et al.* (2012) / treated as a synonym of *E. agathosmicum* by Govaerts *et al.* (2012).

***Epidendrum calyptratoides*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2750 m.

NAR. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Dodson 18105* (AMO).

***Epidendrum calyptratum*  
F.Lehm. & Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, SN Santa Marta. 2600-3510 m.

CAU, CES, CUN, PUT, QUI, RIS, TOL. No evaluada.

Colombia.

*Cuatrecasas 25243* (COL).

***Epidendrum calyptryctylosum*  
Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2013a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3000-3200 m.

CAU, NAR. No evaluada.

*Luer 8357* (HT: SEL).

***Epidendrum campyloglossum*  
P.Ortiz & Hágsater**

Ortiz & Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 50 m.

VAL. No evaluada.

Colombia.

*Calderón 53* (HT: TOLI).

***Epidendrum cancanae*  
(P.Ortiz) Hágsater**

*Epidendrum gymnopodium*

Hágsater, *Oerstedella cancanae*

P.Ortiz

Santiago & Hágsater 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 600-1000 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz 1121* (HT: COL).

***Epidendrum caquetanum*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia, Andes. 530 m.

CAQ. No evaluada.

Colombia.

*Hopp 181* (B, destruido).

NOTA: conocida solo de la descripción original / known only from the original description.

***Epidendrum carautaense*  
Hágsater & L.Sánchez**

Hágsater & Sánchez 2009.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3000 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Schmidtchen s.n.* (HT: W-R).

***Epidendrum carchiense*  
Hágsater & Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2540-2570 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Cogollo 11351* (JAUM).

***Epidendrum cardiodontatum*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2010.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000-3400 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: esperada; tipo recolectado en la frontera entre Colombia y Ecuador, cerca de Tulcán / expected; type collected at the Colombia/Ecuador border, near Tulcán.

***Epidendrum cardioglossum*  
Rchb.f.**

Santiago & Hágsater 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Sin colector 49952* (W).

***Epidendrum carmelense*  
Hágsater & Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3530 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Barclay 6016* (AMES, COL, MO).

***Epidendrum carnevalii*  
Hágsater & L.Sánchez**

Hágsater & Sánchez 1999.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.

NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Luer 7693* (SEL).

***Epidendrum catillus* Rchb.f.  
& Warsz.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2492 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Luer 13074* (MO).

***Epidendrum caurense*  
Carnevali & G.A.Romero**

Carnevali & Romero 1992.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1500 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Lehmann 6938* (AMES, K, NY).

***Epidendrum cereiflorum*  
Garay & Dunst.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Escobar 748* (AMO).  
NOTA: solo se examinó una fotografía / only a photo examined.

***Epidendrum cernuum* Kunth**

Santiago & Hágsater 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-3000 m.  
CAU, NAR, TOL. No evaluada.  
Colombia.  
*Humboldt 2111* (HT: P).

***Epidendrum cesar-fernandezii* Carnevali & I.Ramírez**

Hierba.  
Nativa. Andes. 2300-2500 m.  
BOY, NSA. No evaluada.

Colombia y Venezuela.  
*Foster 1788* (AMES).

***Epidendrum chaquirense*  
Hágsater & L.Sánchez**

Sánchez 2004; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800-3100 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Pennell 4347* (HT: NY, IT: AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Epidendrum chioneum* Lindl.**

*Epidendrum claesianum* Cogn.  
Santiago & Hágsater 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2100-3400 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Hágsater 11483* (AMES, AMO, COL, JAUM, QCA, W-R).

***Epidendrum chlorocorymbos*  
Schltr.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 20-540 m.  
ANT, CHO, NSA. No evaluada.  
Colombia a México.  
*Cárdenas 1379* (JAUM).

***Epidendrum chrysanthum*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3330-3450 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Idrobo 3182* (COL, MO).

***Epidendrum churunense*  
Garay & Dunst.**

Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-1900 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Galeano 2394* (COL).

***Epidendrum ciliare* L.**

*Auliza ciliaris* (L.) Salisb.,  
*Coilostylis emarginata* Raf.,  
*Epidendrum cuspidatum*  
G.Lodd., *Epidendrum viscidum*  
Lindl.

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Orinoquia. 500-1800 m.

ANT, BOY, CUN, MET, NSA, TOL. No evaluada.

México a Perú.

*Cuatrecasas 13416* (COL, F).

***Epidendrum ciliipetalum***

**(Garay) Hágsater &**

**E.Santiago**

*Epidanthus ciliipetalus* Garay  
Hágsater & Santiago 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800-1800 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia.

*Escobar 422* (HT: AMES).

***Epidendrum cirrhochilum***

**F.Lehm. & Kraenzl.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500-1000 m.

ANT, BOL, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Hágsater 7369* (AMO, COL, JAUM).

***Epidendrum cleefii* Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2009.

Hierba, epífita.

Endémica. SN Santa Marta.

3000-3300 m.

MAG. No evaluada.

Colombia.

*Jaramillo 5397* (HT: COL, IT: U).

***Epidendrum cleistocoleum***

**Hágsater & E.Santiago**

Santiago 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2700 m.

ANT, RIS, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Hágsater 11699* (HT: HUA).

***Epidendrum cleistogastrum***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Hágsater 11537* (AMO).

***Epidendrum cocornocturnum***

**Hágsater**

Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900-2500 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Hágsater 11652* (HT: COL).

***Epidendrum colliculosum***

**Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3200 m.

NAR. No evaluada.

Colombia.

*Luer 3746* (HT: SEL).

***Epidendrum colombianum***

**A.D.Hawkes**

*Epidendrum brachystele* Schltr.,

*Epidendrum brachysteloides*

Hágsater, *Epidendrum*

*inamoenum* var. *robustum*

C.Schweinf.

Santiago & Hágsater 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1350-3300 m.

NAR, PUT. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú,

Bolivia.

*Uribe 6571* (COL).

***Epidendrum commelinoides***

**Schltr.**

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Epidendrum compressum***

**Griseb.**

*Epidendrum laxum* Poepp. & Endl., *Epidendrum macrothyrsus* F.Lehm. & Kraenzl.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes,

Guayana y Macarena. 100-600 m.

AMA, CAQ, CAU, PUT, VAU.

No evaluada.

Colombia a Bolivia; Trinidad y Tobago.

*Gutiérrez 801* (AMES, COL, NY, US).

***Epidendrum convergens***

**Garay & Dunst.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-2260 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Fonnegra 4138* (COL).

***Epidendrum coordinatum***

**Rchb.f.**

*Epidendrum chondrochilum*

F.Lehm. & Kraenzl.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-2800 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Roezl s.n.* (HT: W-R).

***Epidendrum corallinum***

**Hágsater**

Hágsater 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
TOL. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Schmidtchen s.n.* (HT: W-R).

***Epidendrum cornanthera***

**F.Lehm. & Kraenzl.**

Sánchez & Hágsater 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-650 m.  
VAL. No evaluada.  
Panamá a Ecuador.  
*Folsom 10474* (AMO).

***Epidendrum cornicallosum***

**Foldats**

Hágsater & Santiago 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2880 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Lozano 5564* (COL, MA).

***Epidendrum coronatum* Ruiz & Pav.**

*Epidendrum amazonicum* Schltr.,  
*Epidendrum benignum* Ames,  
*Epidendrum moyobambae*  
Kraenzl., *Epidendrum*  
*subpatens* Schltr., *Epidendrum*  
*sulphuroleucum* Barb.Rodr.  
Jiménez & Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Caribe, V  
Cauca, V Magdalena. 325-700 m.  
ANT, BOL, CAU, CES, MET,  
SAN. No evaluada.  
México a Bolivia.  
*Cogollo 1350* (COL, JAUM).

***Epidendrum coryophorum***  
**(Kunth) Rchb.f.**

*Epidendrum bolbophylloides*  
F.Lehm. & Kraenzl., *Epidendrum*

*linearilingue* Rchb.f.,  
*Stenoglossum coryophorum*  
Kunth, *Stenoglossum subulatum*  
Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1750-2900 m.  
ANT, CAU, CHO, NAR, PUT,  
QUI. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Benavides 796* (COL).

***Epidendrum cotacachiense***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Santiago 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2700-3600 m.  
NAR? No evaluada.  
S Colombia? y Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Epidendrum cottoniiflorum***

**(Rchb.f.) Hágsater**

*Diothonea cottoniiflora* Rchb.f.  
Santiago & Hágsater 2006.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2500 m.  
CAU, CUN, NAR, PUT, VAL. No  
evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 67* (HPUJ).  
NOTA: a menudo erróneamente  
citada como *cottoniaeflorum*  
/ often erroneously cited as  
*cottoniaeflorum*.

***Epidendrum criniferum***

**Rchb.f.**

Santiago & Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 600-1000 m.  
MET, PUT, TOL. No evaluada.  
Nicaragua a Perú.  
*Renz 3075* (RENZ).

***Epidendrum cristatum* Ruiz & Pav.**

*Epidendrum alexandri* Schltr.,  
*Epidendrum bathyschistum*  
Schltr., *Epidendrum calliferum*  
Lem., *Epidendrum hexadactylum*  
Barb.Rodr., *Epidendrum*  
*longovarium* Barb.Rodr.,  
*Epidendrum raniferum* Lindl.,  
*Epidendrum tigrinum* Sessé  
& Moc., *Epidendrum validum*  
Schltr.  
Santiago & Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 730-900 m.  
CAU, NSA, VAL. No evaluada.  
México a Bolivia.  
*Ortiz 227* (HPUJ).

***Epidendrum cuatrecasasii***

**Garay**

Hágsater *et al.* 2006.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 0-100 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Cuatrecasas 16252* (HT: US, IT:  
AMES, U).

***Epidendrum cuicochaense***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Santiago 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 3100 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Guzmán 80* (COL).

***Epidendrum cuneatum***

**Schltr.**

Santiago & Hágsater 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1395 m.  
NAR? No evaluada.  
S Colombia?, Ecuador, Perú,  
Bolivia.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected

in Carchi (Ecuador), near the border.

***Epidendrum cupreum***

**F.Lehm. & Kraenzl.**

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 500-1800 m.

CAQ. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Ortiz 573* (HPUJ).

**[*Epidendrum curtisii***

**A.D.Hawkes]**

Ortiz & Uribe 2008.

NOTA: registro basado en identificación errónea; endémica de la cordillera de la Costa, en Venezuela / record based on a misidentification; endemic to the Cordillera de la Costa in Venezuela.

***Epidendrum cyclopterum***

**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

***Epidendrum cylindraceum***

**Lindl.**

Sánchez & Hágsater 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2700-3200 m.

BOY, CAU, CUN, NAR, NSA.

No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cuatrecasas 7908* (COL, US).

***Epidendrum cylindrostachys***

**Rchb.f. & Warsz.**

Sánchez & Hágsater 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-3100 m.

ANT, CHO, VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Hágsater 7286* (AMO, COL).

***Epidendrum***

***cylindrostenophyllum***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700-2000 m.

NAR? No evaluada.

S Colombia? y Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Epidendrum cystosum* Ames**

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 0-150 m.

CHO. No evaluada.

México, Belice, Nicaragua,

Colombia.

*Hágsater 7134* (AMO).

***Epidendrum dactylodes***

**Hágsater**

Hágsater 2009; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3010 m.

NAR. No evaluada.

*Triana 1376* (HT: W-R; IT: P).

NOTA: conocida solo del tipo, recolectado en 1853, en Túquerres / known only from the type, collected in 1853 in Túquerres.

***Epidendrum dasyanthum***

**Hágsater**

*Takulumena vazquezii* Szlach. *et al.*

Hágsater & Santiago 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300-2900 m.

ANT, CUN. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*García-Barriga 17385* (AMES, COL, NY).

***Epidendrum decipiens* Lindl.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

NSA. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Schlim 1032* (LT: K-L, IT: W-R).

***Epidendrum decurviflorum***

**Schltr.**

Santiago & Hágsater 2009;

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-3500 m.

ANT, CAU, NAR. No evaluada.

Colombia.

*Maas 2079* (COL, U).

***Epidendrum***

***deltogastropodium* Hágsater**

**& E.Santiago**

Santiago 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3070 m.

CAU, NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Luer 3013* (HT: SEL).

***Epidendrum dendrobii***

**Rchb.f.**

*Epidendrum pileatum* Rchb.f.,

*Epidendrum pleurobotrys* Schltr.

Hierba.

Nativa. Andes. 1000-2800 m.

ANT, BOY, CUN, MET, NAR,

SAN, TOL, VAL. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Schneider 531* (COL, HPUJ).

**[*Epidendrum dendrobioides***

**Thunb.]**

Idárraga *et al.* 2011.

NOTA: registro basado en un espécimen de *E. lindae* / record based on a specimen of *E. lindae*.

***Epidendrum dendromacrophorum***  
**Hágsater et al.**

Hágsater & Santiago 2013.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 840-1600 m.  
CAU, CHO, NAR, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Folsom 10448* (HT: AMO).

***Epidendrum dentiferum***  
**Ames & Schweinf.**

*Epidendrum platytilum* Schltr.  
Sánchez & Hágsater 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 890-1090 m.  
ANT, CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia y Costa Rica.  
*Cogollo 3439* (HUA, HPUJ, JAUM).

***Epidendrum dentilobum***  
**Ames et al.**

*Epidendrum begotii* P.Castro & da Silva  
Santiago & Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia, Panamá, Guayana Francesa, Brasil.  
*Misas 275* (AMO).

***Epidendrum dialytilum***  
**Hágsater & Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1350-1670 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Fernández 11257* (AMES, COL, MO).

***Epidendrum diothonaeoides***  
**Schltr.**

Santiago & Hágsater 2006.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-3150 m.  
CAU, TOL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 40* (HPUJ).

***Epidendrum diphyllum***  
**Schltr.**

Sánchez & Hágsater 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000-3150 m.  
CAU, NAR, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Rimann s.n.* (W-R).

***Epidendrum diurnum* (Jacq.) Poir.**

*Cymbidium diurnum* (Jacq.) Sw.,  
*Encyclia diurna* (Jacq.) Schltr.,  
*Limodorum diurnum* Jacq.  
Govaerts et al. 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a N Suramérica.

***Epidendrum dugandianum***  
**A.D.Hawkes**

*Epidendrum microdendron*  
Kraenzl.  
Govaerts et al. 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Kalbreyer 1736* (HT: B, destruido).

***Epidendrum dunstervillei***  
**A.D.Hawkes**

*Epidendrum oxyglossum* Schltr.  
Govaerts et al. 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3500 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp 184* (HT: B, destruido).

***Epidendrum eburneum***  
**Rchb.f.**

Hágsater & Sánchez 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0-600 m.  
CHO. No evaluada.  
Honduras a Colombia.  
*Ortiz s.n.* (HPUJ).  
NOTA: dibujo de P. Ortiz / a drawing by P. Ortiz.

***Epidendrum elatum***  
**C.Schweinf.**

Santiago & Hágsater 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2950 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Cuatrecasas 21712* (AMES, F, U, US).

***Epidendrum elephantinum***  
**Hágsater**

Hágsater & Sánchez 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 1000-1200 m.  
CHO? No evaluada.  
Colombia?, Panamá.  
NOTA: esperada; recolectada en la serranía del Darién, cerca de la frontera / expected; collected in the Serranía del Darién, near the border.

***Epidendrum elleanthodiceris***  
**Hágsater & E.Santiago**

Santiago 2004.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
HUI. No evaluada.  
Colombia.  
*Von Sneidern 2008* (HT: S; IT: AMES).

***Epidendrum elleanthoides***  
**Schltr.**

Santiago & Hágsater 2006.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3200 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, MET,  
PUT, RIS. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú.  
*Bristol 386* (AMES, COL, US).

***Epidendrum ellipsophyllum***

**L.O. Williams**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 900 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Sánchez 1669* (MEDEL).

***Epidendrum ellisii* Rolfe**

Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada, Endémica y  
cultivada. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Ellis s.n.* (HT: K-L, IT: AMES).

***Epidendrum elongatum* Jacq.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1500-3500 m.  
BOY, CAL, CAU, CES, CHO,  
CUN, HUI, MAG, NAR, PUT,  
RIS, SAN, TOL, VAL. No  
evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Zarucchi 7053* (MO).  
NOTA: taxonomía aún confusa /  
taxonomy still confuse.

***Epidendrum envigadoense***

**Hágsater**

Hágsater 1999.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-2650 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Escobar 5338* (HT: AMO).

***Epidendrum erosum* Ames &  
C.Schweinf.**

*Epidendrum holmnielsenii*  
Hágsater & Dodson

Santiago & Hágsater 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
2160-3685 m.  
ANT, CAU, CUN, MAG, NSA.  
No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Aristide A464* (HT: AMES).

***Epidendrum escobarianum***

**Garay**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-1700 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 75* (HT: AMES; IT:  
JAUM).

***Epidendrum euchroma***

**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1300 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Schultze 24* (HT: B, destruido).

***Epidendrum eugenii* Schltr.**

*Epidendrum nubigenum* Schltr.  
Santiago & Hágsater 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-4300 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Langlassé 100* (HT: K; IT: AMES,  
G, P, US).

***Epidendrum excisum* Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1780-3300 m.  
ANT, CAL, CAU, CUN, NAR,  
PUT, QUI, TOL, VAL. No  
evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Jaramillo 4867* (COL).

***Epidendrum fagerlindii***

**Hágsater & Dodson**

Santiago 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3200 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Epidendrum falsiloquum***

**Rchb.f.**

Hierba.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Bull s.n.* (HT: W-R).

***Epidendrum falsum* Rchb.f.**

Hágsater (inédito).  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700-3100 m.  
ANT, CUN, TOL. No evaluada.  
Colombia.  
*Schmidtchen s.n.* (W-R).

***Epidendrum farallonense***

**Hágsater**

Hágsater 1999.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2050 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Hágsater 7307* (HT: COL).

***Epidendrum fastigiatum***

**Lindl.**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2750 m.  
CUN, TOL. No evaluada.  
Colombia.  
*Triana 127* (HT: K-L, IT: W-R).

***Epidendrum festucoides***

**Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Kalbreyer 1775* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Epidendrum filamentosum***

**Kraenzl.**

*Epidendrum rostratum* Garay & Dunst.

Hágsater & Santiago 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena. 600-1250 m.

CUN, MET, VAL, VAU. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Schultes 17221* (AMES).

***Epidendrum fimbriatum***

**Kunth**

*Epidendrum alternans* Lindl., *Epidendrum integrilabium* Ames & C.Schweinf., *Epidendrum rhomboglossum* Kraenzl.

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1070-3800 m.

ANT, BOY, CAL, CAQ, CAU, CHO, CUN, GUJ, HUI, NAR, NSA, PUT, QUI, SAN, TOL, VAL. Preocupación Menor (propuesta aquí).

Venezuela a Bolivia.

*Garay 5* (AMES, COL, HUA, JAUM).

***Epidendrum flexuoecallosum***

**Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 520-1400 m.

CHO, NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cárdenas 457* (MO).

**[*Epidendrum flexuosissimum***

**C.Schweinf.]**

Idárraga *et al.* 2011.

NOTA: registro basado en un espécimen de *E. ciliipetalum* / record based on a specimen of *E. ciliipetalum*.

***Epidendrum flexuosum***

**G.Mey.**

*Epidendrum imatophyllum* Lindl., *Epidendrum lorifolium* Schltr., *Epidendrum palpigerum* Rchb.f., *Epidendrum persimile* Schltr.

Santiago & Hágsater 2008;

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita, mirmecófila.

Nativa. Amazonia, Andes, Caribe, Orinoquia, Pacífico, V Magdalena. 50-1000 m.

AMA, ANT, BOY, CAU, CÓR, GUJ, MAG, MET, SAN, VAL. No evaluada.

México a Bolivia.

*Cogollo 1816* (COL, JAUM, MO).

***Epidendrum fraternum***

**Schltr.**

Hierba.

Endémica. Andes.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

***Epidendrum frigidum* Lindl.**

*Epidendrum aurorae* Dodson & D.E.Benn.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3600 m.

ANT, BOY, CUN. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Escobar 1185* (AMES, JAUM).

***Epidendrum frutex* Rchb.f.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2740-3800 m.

ANT, CAL, CAU, CUN, MET, NAR, RIS, TOL, VAL. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Gentry 30474* (COL).

***Epidendrum fruticetorum***

**Schltr.**

Hágsater (inédito).

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2225-2300 m.

PUT. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Schultes 7696* (AMES).

***Epidendrum fusagasugaense***

**E.Parra et al.**

Parra *et al.* 2103.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Parra 315* (HT: VALLE).

***Epidendrum gaertelmaniae***

**Hágsater & O.Pérez**

Hágsater & Pérez 2010.

Hierba.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

***Epidendrum garayii* Lojtnant**

*Pleuranthium cardiochilum*

Garay

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3017-3500 m.

CAU, RIS, TOL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Jan-Wolf 792* (COL, SEL, TOLI).

***Epidendrum gastropodium***

**Rchb.f.**

*Gastropodium violaceum* Lindl.

Santiago & Hágsater 2006.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400-3700 m.  
CAU, CUN, HUI, NAR, PUT,  
VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lozano 4704* (COL, WIS).

***Epidendrum geminiflorum***

**Kunth**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-3280 m.  
ANT, BOY, CHO, CUN, HUI,  
NAR, PUT, QUI, RIS, SAN. No  
evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú.  
*Bristol 907* (COL, HPUJ).

[*Epidendrum gentryi*

**Dodson]**

Idárraga *et al.* 2011.  
NOTA: registro basado en un  
especimen de *E. lagenomorphum*  
/ record based on a specimen of  
*E. lagenomorphum*.

***Epidendrum gerlachianum***

**Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013e.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2750-3100 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Pérez 1104* (HT: CUVC).

***Epidendrum giraldo-cannasii***

**Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013f.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2050 m.  
VAL. No evaluada.  
*Pérez 1103* (HT: CUVC).

[*Epidendrum globiflorum*

**F.Lehm. & Kraenzl.]**

Santiago & Hágsater 2006;  
Idárraga *et al.* 2011.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea; endémica

de Ecuador / record based on  
a misidentification; endemic to  
Ecuador.

***Epidendrum glossoclinium***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Epidendrum golondrinense***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2690 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Epidendrum***

***goodspeedianum***

**A.D.Hawkes**

*Epidendrum muricatum* (Sw.)  
Rchb.f.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1060-2450 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia? Ecuador y Perú.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Epidendrum***

***grammipatlostachyum***

**Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2013.  
Hierba.

Endémica. Andes. 1200-2000 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
*Hágsater 7406* (HT: AMO).

***Epidendrum gratissimum***  
**(Rchb.f.) Hágsater & Dodson**

*Diothonea angustifolia* Schltr.,  
*Diothonea gratissima* Rchb.f.,  
*Epidendrum oyacachiense*  
Hágsater, *Epidendrum*  
*pentacarinatum* Hágsater &  
Dodson

Santiago & Hágsater 2006;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400-3530 m.  
ANT, CAL, CAU, NAR, PUT,  
QUI, TOL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Schmidtchen s.n.* (W).

***Epidendrum guanacasense***

**Hágsater & Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800-3500 m.  
CAU, HUI, NAR. No evaluada.  
S Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 6847* (HT: AMES; IT:  
AMES, K, L, NY, W-R).

***Epidendrum guaridense***

**Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2010.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1950-2000 m.  
VAL. No evaluada.  
*Cuatrecasas 22152* (HT: F, IT:  
US, VALLE).

***Epidendrum guillermoi***

**P.Ortiz**

Santiago & Hágsater 2013.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 400-500 m.  
CHO. No evaluada.  
Serranía del Baudó.  
*Misas 235* (HT: HPUJ).

***Epidendrum hamatum***

(Garay) Dressler

*Stenoglossum hamatum* Garay

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500-2500 m.

ANT, CUN. No evaluada.

Colombia.

*Ospina-Hernández 22A* (HT: AMES).

***Epidendrum hartmanii***

Hágsater & L.Sánchez

Hágsater & Sánchez 2013.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3100 m.

VAL. No evaluada.

*Hartman 616* (HT: CUCV).

***Epidendrum heliconense***

Hágsater & E.Santiago

Hágsater & Santiago 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 3000 m.

CUN. No evaluada.

Colombia.

*Grant 10253* (HT: US, IT: CAS, NY, WIS).

***Epidendrum hemiscleroides***

(Kraenzl.) Hágsater &

Dodson

*Diothonea hemiscleroides*

Kraenzl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300-2700 m.

SAN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Kalbreyer 766* (B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo /

known only from the type.

***Epidendrum herrenhusanum***

Hágsater

Hágsater 1999; Idárraga *et al.*

2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-2700 m.

ANT, SAN. No evaluada.

Colombia.

*Herklots 81/51* (HT: AMO).

***Epidendrum hesperium***

Hágsater & E.Santiago

Hágsater & Santiago 2004;

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.*

2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1720-1950 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Cordilleras Occidental y Central.

*Sánchez 1594* (COL).

**[*Epidendrum heterodoxum***

**Rchb.f.]**

Idárraga *et al.* 2011.

NOTA: registro basado en identificación errónea; especie endémica de Venezuela / record based on a misidentification; endemic to Venezuela.

***Epidendrum hexagonum***

Hágsater & Dodson

Hágsater & Dodson 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2100-2200 m.

NAR, RIS, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Escobar 5328* (AMO).

***Epidendrum hitchcockii***

Hágsater & Dodson

Sánchez 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-3350 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Ewan 16086* (AMES, US).

***Epidendrum holtonii***

Hágsater & L.Sánchez

Hágsater & Sánchez 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, V Cauca.

VAL. No evaluada.

Colombia.

*Holton s.n.* (NY).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Epidendrum hookerianum***

**Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400 m.

HUI. No evaluada.

Colombia.

*MacDonald s.n.* (AMES).

***Epidendrum hopfianum***

**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-3200 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Hopf s.n.* (B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Epidendrum humeadorensis***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 1999.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2295 m.

CAU. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Salgado 149* (CAUP).

***Epidendrum***

***hygrohylephilum* Hágsater &**

**E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, Pacífico. 75-500 m.

CAU, CHO, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Lehman 243* (HT: AMES, IT: K,

L. NY).

***Epidendrum hymenodes*****Lindl.***Epidendrum arundinaceum*  
E.Lehm. & Kraenzl., *Epidendrum*  
*zingiberaceum* Schltr.Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico, SN Santa Marta. 300-2160 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, MAG,  
VAL. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Schlim 986* (HT: K-L).***Epidendrum******hypoporphyreum* Hágsater  
et al.**Hágsater *et al.* 2013q.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-2870 m.

ANT, CAL, VAL. No evaluada.

*Hágsater 7248* (HT: AMO IT:  
COL).***Epidendrum ibaguense*****Kunth***Epidendrum fimbria* Rchb.f.Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, V Magdalena.  
1300-1750 m.ANT, CAU, CUN, HUI, NSA,  
SAN, TOL. No evaluada.

Colombia.

*Uribe 6143* (COL).***Epidendrum igneum*****Hágsater**Hágsater 2004; Idárraga *et al.*  
2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900 m.

ANT, CHO, VAL. No evaluada.

Cordilleras Occidental y Central.

*Hágsater 11708* (AMO).***Epidendrum imperator*****Hágsater**Hágsater 2004; Idárraga *et al.*  
2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Central.

*Hágsater 11524* (HT: COL; IT:  
AMES, AMO, JAUM).**[*Epidendrum incomptum*****Rchb.f.]**Idárraga *et al.* 2011.NOTA: registro basado en  
identificación errónea / record  
based on a misidentification.***Epidendrum******ingrabrachyphyllum*****Hágsater & E.Santiago**

Hágsater &amp; Sánchez 2013.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

*Madison 7065* (SEL).***Epidendrum inornatum*****Schltr.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2900-3000 m.

CUN. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Sarmiento 1550* (HJBB).***Epidendrum ionodesme*****Schltr.**Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2300 m.

ANT, CAU, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Uribe 2252* (COL, NY, U).***Epidendrum ionophyllum*****P.Ortiz**Hágsater 2006; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1400 m.

VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Ortiz 1075* (HPUJ).***Epidendrum isomerum*****Schltr.***Epidendrum guayasense* Schltr.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 600 m.

CHO, VAL. No evaluada.

México a Perú.

*Dodson 3229* (SEL).***Epidendrum isthmi* Schltr.**

Santiago &amp; Hágsater 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 0-1000 m.

CHO? No evaluada.

México a E Panamá (Darién).

NOTA: esperada / expected

***Epidendrum jajense* Rchb.f.***Epidendrum breviracemum*

C.Schweinf.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-2500 m.

ANT. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

*Dodson 15273A* (MO).***Epidendrum jamiesonis*****Rchb.f.***Epidendrum evectum* Hook.f.,*Epidendrum quitensium* Rchb.f.

Hágsater &amp; Dodson (inérito).

Hierba.

Nativa. Andes. 2600-3100 m.

NAR? No evaluada.

Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected

in Carchi (Ecuador), near the border.

***Epidendrum jejunum* Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 150-1250 m.  
CAQ, CHO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Misas* 32 (AMO, ilustración).

***Epidendrum kalloneuron* Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600-2700 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Kalbreyer 1103* (HT: B, destruido).

***Epidendrum karstenii* Rchb.f.**

Hágsater 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, SN Santa Marta. 2600-2900 m.  
BOY, CUN, MAG. No evaluada.  
Colombia.  
*Romero 886* (COL, US).

***Epidendrum kerryae* Hágsater & L.Sánchez**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 200-1500 m.  
CHO, NAR, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Van Rooden 694* (HT: U).

***Epidendrum killipii* Hágsater & L.Sánchez**

Hágsater & Sánchez 1999.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 200-275 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Killip 35303* (HT: AMES; IT: US).

***Epidendrum kirkbridei* Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. SN Santa Marta. 3100-3600 m.  
MAG. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Kirkbride 1790* (HT: US, IT: COL, NY).

***Epidendrum klotzscheanum* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2650-3300 m.  
BOY, CAL, CUN, SAN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Jaramillo 6955* (COL).

***Epidendrum kolanowskiae* Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013g.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1770-2050 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
*Rincón-Useche 43* (COL).

***Epidendrum lacustre* Lindl.**

*Epidendrum leucochilum* Lindl.,  
*Epidendrum obesum* Ames  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2600 m.  
CUN, PUT, SAN, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Perú.  
*Uribe 3238* (COL, HPUJ).

***Epidendrum laeve* Lindl.**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600-3000 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Hartweg 1425* (HT: K-L; IT: W-R).

***Epidendrum lagenomorphum* Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001;  
*Idárraga et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 200-900 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Cogollo 2993* (JAUM, MO).

***Epidendrum lagotis* Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CUN, SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Wagner s.n.* (HT: W-R).

***Epidendrum lambeauanum* De Wild.**

Hágsater (inédito).  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, V Cauca. 1400-1900 m.  
CAQ, CAU, CUN, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Fernández-Pérez 2920* (COL).  
NOTA: tratada por Govaerts *et al.* (2012) como sinónimo de *E. peperomia* / treated by Govaerts *et al.* (2012) as a synonym of *E. peperomia*.

***Epidendrum lamprochilum* Hágsater**

Hágsater 1999; *Idárraga et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 500-1000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 1024* (HT: AMES).  
NOTA: localidad exacta desconocida / exact locality unknown.

***Epidendrum lanipes* Lindl.**Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, V Cauca. 1000-1700 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, NSA, RIS, SAN, VAL. No evaluada. Colombia, Ecuador, Perú.

*Betancur 944* (COL, F, HUA, JAUM, MO).***Epidendrum laterinocturnum*****Hágsater**

Hágsater 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 200 m.

NAR. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann 25* (HT: W-R).**[*Epidendrum laucheanum*****Rolfe]**Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: la localidad del tipo fue equivocadamente atribuida a Colombia; solo se conoce de México a Panamá / the type locality was wrongly attributed to Colombia; only known from Mexico to Panama.

***Epidendrum laurelense*****Hágsater & Dodson**

Hágsater &amp; Dodson 2001.

Hierba.

Nativa. Andes. 2200-2700 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Sarmiento 1600* (HJBB).***Epidendrum laxifoliatum*****Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Madero s.n.* (B, destruido).***Epidendrum leeanum*****(Rchb.f.) Hágsater**

Santiago &amp; Hágsater 2008.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Orinoquia. 100-400 m.

BOY, MET. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Ortiz 168* (HPUJ).***Epidendrum leonorae*****Hágsater et al.**Hágsater *et al.* 2013h.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2900 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Colombia, Perú.

*Pérez 1000* (HT: VALLE).***Epidendrum leucochilum*****Link et al.***Epidendrum flavidum* Lindl., *Epidendrum longiflorum* Kunth, *Epidendrum spectatissimum* Rchb.f., *Epidendrum splendidum* Schltr.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 1000-2700 m.

BOY, CAU, CES, HUI, NAR, TOL, VAL. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Plowman 3641* (COL, F, SEL).***Epidendrum lilacinoides*****Hágsater & E.Santiago**

Hágsater &amp; Santiago 2010.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2200-2600 m.

NSA. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Linden 1174* (W-R).***Epidendrum lilijae* Foldats**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600 m.

ANT. No evaluada.

NW Venezuela a Ecuador.

*Hágsater 7265* (AMO, COL).**[*Epidendrum lima* Lindl.]**Idárraga *et al.* 2011.

NOTA: registro basado en identificación errónea / record based on a misidentification.

***Epidendrum lindae* Hágsater & Dodson**

Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1750-2385 m.

ANT, CAU, CHO, CUN, PUT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Pipoly 17546* (MO).***Epidendrum litense* Hágsater & Dodson**

Ortiz &amp; Uribe 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 800 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Ecuador.

*Ortiz s.n.* (dibujo, HPUJ).***Epidendrum littorale*****Hágsater & Dodson**Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 0-540 m.

ANT, CHO, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Zarucchi 5039* (MO, NY, SEL).***Epidendrum lockhartioides*****Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

***Epidendrum loejtnantii***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400-3200 m.

BOY, NAR, PUT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Bristol 831* (AMES).

***Epidendrum longicolle* Lindl.**

Hágsater (inérito).

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 150-580 m.

AMA, VAU. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Perú, Ecuador.

*García-Barriga 15778* (AMES).

***Epidendrum longicrurum***

**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann 8316* (AMES, K).

***Epidendrum longirepens***

**(C.Schweinf.) C.Schweinf.**

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 100 m.

AMA. No evaluada.

Colombia y Perú.

*Plowman 2324* (COL).

***Epidendrum lopezii* Hágsater**

Hágsater 1999; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2299-2500 m.

ANT, CHO, RIS. No evaluada.

Colombia.

*Hágsater 11648* (HT: AMO).

***Epidendrum luckei* I.Bock**

Sánchez & Hágsater 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 10-550 m.

ANT, CHO, NAR, VAL. No evaluada.

Panamá a Ecuador.

*Romero-Castañeda 5332* (COL, HUA, JAUM).

***Epidendrum luis-sanchezii***

**Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3500 m.

VAL. No evaluada.

*Parra 381* (HT: VALLE).

***Epidendrum macarense***

**Hágsater & L.Sánchez**

Sánchez 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Guayana y Macarena. 1000 m.

MET. No evaluada.

Colombia.

*Idrobo 8501* (HT: COL).

***Epidendrum macrocarpum***

**Rich.**

*Epidendrum incisum* Vell.,

*Epidendrum schomburgkii* Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes,

Orinoquia, Pacífico, V

Magdalena. 100-1000 m.

AMA, BOY, CAU, GUI, NSA,

PUT, TOL, VAU. No evaluada.

N y C Suramérica.

*Hallen 3085* (COL).

***Epidendrum macroceras***

**Schltr.**

Hierba, epífita.

Endémica. SN Santa Marta. 1200 m.

MAG. No evaluada.

Colombia.

*Smith 2488* (IT: AMES, CM, G, K, MO, NY, P).

***Epidendrum macrophorum***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater 1999; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 100-2600 m.

VAL. No evaluada.

Panamá a Ecuador.

*Guarín 14* (COL, HPUJ).

***Epidendrum macrophysum***

**Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013i.

Hierba.

Endémica. Andes. 1400 m.

CHO. No evaluada.

*Pérez 1400* (HT: CUVC; IT: VALLE).

***Epidendrum macrostachyum***

**Lindl.**

*Epidendrum bangii* Rolfe

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 330-2000 m.

ANT, CAQ, CAU, CUN, HUI,

NAR, TOL, VAL. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

*Tracey 180* (K).

***Epidendrum macrum***

**Dressler**

*Amblostoma gracile* var.

*robustum* C.Schweinf.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 400-1000 m.

CAQ, PUT. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Ortiz 528* (HPUJ).

***Epidendrum maderoi* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2700 m.

ANT, CUN. No evaluada.

Colombia.  
*Schneider* 83 (COL, NY).

***Epidendrum magnibracteum*  
Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Kalbreyer* 1172 (HT: B,  
destruido).

***Epidendrum magnicallosum*  
C.Schweinf.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena, Orinoquia. 200-500  
m.  
CAQ, GUV. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil,  
Perú.  
*Arévalo* 46 (COL).

***Epidendrum maldonadoense*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700-2000 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

**[*Epidendrum mancum*  
Lindl.]**

Idárraga *et al.* 2011.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea; es  
endémica de S Ecuador.  
Pertenece a un complejo de  
especies, varias de ellas presentes  
en Colombia / record based on  
a misidentification; endemic  
to S Ecuador; belongs to a  
species complex, many of them  
occurring in Colombia.

**[*Epidendrum marsupiale*  
F.Lehm. & Kraenzl.]**

Idárraga *et al.* 2011.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea / record  
based on a misidentification.

***Epidendrum mathewsii*  
Rchb.f.**

Hágsater (inérito).  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
CUN, VAL. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú.  
*Killip* 11272 (AMES, K, US).

***Epidendrum megalospathum*  
Rchb.f.**

*Diothonea megalospatha*  
(Rchb.f.) Garay & Dunst.,  
*Diothonea sodiroi* Schltr.,  
*Epidendrum puberulosum*  
Hágsater  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-3000 m.  
CHO, CUN, NAR, PUT, QUI,  
TOL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Cuatrecasas* 9444 (COL, HPUJ,  
TOLI).

***Epidendrum melanoxeros*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater 1999.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2950-3200 m.  
CAU, CUN. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Schultes* 1050 (AMES, K).

***Epidendrum melinanthum*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 800-1200 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Silverstone* 2301 (AMO, CUVC).

***Epidendrum*  
*mesogastropodium* Hágsater  
& Dodson**

Santiago 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000-3400 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Epidendrum microcarpum*  
Hágsater & Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1300 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Epidendrum microcephalum*  
Hágsater & L.Sánchez**

Hágsater & Sánchez 1999.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1950 m.  
NSA? No evaluada.  
Colombia?, Venezuela.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Táchira (Venezuela), cerca de la  
frontera / expected; collected in  
Táchira (Venezuela), near the  
border.

***Epidendrum microglossoides*  
Hágsater & Dodson**

Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2700 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz s.n.* (dibujo HPUJ).  
NOTA: tipo de Carchi (Ecuador) /  
type from Carchi (Ecuador).

***Epidendrum microphyllum*  
Lindl.**

*Lanium microphyllum* (Lindl.)  
*Benth.*, *Lanium microphyllum*  
subsp. *colombianum* (Schltr.)  
Brieger, *Lanium peruvianum*  
Schltr.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Orinoquia,  
Pacífico. 80-1500 m.  
ANT, CAL, CHO, CUN, GUV,  
MET, VAL, VAU. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil,  
Surinam.  
*Hallen 3102* (COL, HPUJ, HUA).

***Epidendrum mininocturnum*  
Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Monsalve 934* (CUVC, MO).

***Epidendrum minus* (Cogn.)  
Hágsater**

*Epidendrum nocturnum* var.  
*minus* Cogn.  
Hágsater (inérito).  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 150-270 m.  
AMA, VAU. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú,  
Bolivia, Brasil.  
*Schultes 12387* (AMES).

***Epidendrum misasii*  
Hágsater**

*Oerstedella viridiflora* Hágsater  
Santiago & Hágsater 2007;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 400-  
1150 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Hágsater 7234* (HT: AMO).

***Epidendrum miserrimum*  
Rchb.f.**

Santiago & Hágsater 2007;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1900 m.  
ANT, CAU, CHO, VAL. No  
evaluada.  
Centroamérica a N Suramérica;  
Antillas.  
*Ortiz 563* (HPUJ).

***Epidendrum modestissimum*  
E.Lehm. & Kraenzl.**

Santiago & Hágsater 2006;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2660-3000 m.  
ANT, BOY, CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Schneider 121/2* (COL).

**[*Epidendrum mojandae*  
Schltr.]**

Govaerts *et al.* 2014a.  
NOTA: endémica de Ecuador;  
registro colombiano basado en  
ejemplar de *E. musciferum* /  
endemic to Ecuador; Colombian  
record based on a specimen of *E.*  
*musciferum*.

***Epidendrum molau*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3420-3500 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Epidendrum molinae* P.Ortiz  
& Hágsater**

Ortiz & Hágsater 2013.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.  
TOL. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Molina 1402* (HT: HPUJ).

***Epidendrum morae* P.Ortiz  
et al.**

Ortiz *et al.* 2013.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2480 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Ortiz 1407* (HT: HPUJ).

***Epidendrum moritzii* Rchb.f.  
*Epidendrum stramineum* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100-3150 m.  
ANT, BOY, CUN, NSA, SAN. No  
evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*García-Barriga 17449* (COL, US).

***Epidendrum muricatoides*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 630-  
2000 m.  
CAU, CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Forero 6928* (COL).

***Epidendrum musciferum*  
Lindl.**

Sánchez & Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Caribe,  
Orinoquia, Pacífico, V Cauca, V  
Magdalena. 150-1000 m.  
ANT, CUN, RIS, VAL, VIC. No  
evaluada.  
Panamá a Bolivia y Brasil.  
*Cummings s.n.* (HT: K-L, IT: E,  
W-R).

***Epidendrum mutisii*****Hágsater**

Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, V Magdalena. 325-1000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Cogollo 1692* (HT: MO; IT: COL, JAUM).***Epidendrum******myrmecophorum* Barb.Rodr.***Epidendrum huebneri* Schltr.,*Epidendrum rectopedunculatum*  
C.Schweinf.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 200-500 m.

GUV, VAU. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil, Perú.

*Arévalo 236* (COL).***Epidendrum******mytiastropodium* Hágsater & E.Santiago**

Santiago 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3000 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Sneidern 2003* (HT: AMES; IT: AMES, G, S, US).***Epidendrum nanoecallosum*****Hágsater & E.Santiago**

Hágsater &amp; Santiago 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. 3050 m.

NAR, PUT? No evaluada.

*Lehmann s.n.* (HT: W-R).

NOTA: conocida solo del tipo, erróneamente atribuido a Putumayo, aunque por la vecindad la especie podría encontrarse allí / known only

from the type; type erroneously attributed to Putumayo, although the species might actually be found there.

***Epidendrum neudeckeri*****Dodson & Hágsater**

Ortiz &amp; Uribe 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 200-1050 m.

CAU, CUN, NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Foster 2085* (AMES, COL).***Epidendrum nevadense*****Hágsater & E.Santiago**

Hágsater &amp; Santiago 2004;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3670 m.

RIS. No evaluada.

Cordillera Central.

*Wolf 890* (HT: SEL, IT: U).***Epidendrum xnocteburneum*****Hágsater & L.Sánchez**

Hágsater &amp; Sánchez 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 100 m.

CHO? No evaluada.

Nicaragua a E Panamá.

NOTA: esperada / expected.

***Epidendrum nocturnum*****Jacq.***Amphiglottis nocturna* (Jacq.)Britton, *Auliza nocturna* (Jacq.)Small, *Epidendrum carolinianum*Lam., *Epidendrum discolor*A.Rich. & Galeotti, *Nyctosma nocturna* (Jacq.) Raf.Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Caribe, Orinoquia, Pacífico. 0-2500 m.

AMA, ANT, CAQ, CHO, GUI, GUV, NAR, VAL, VAU. No evaluada.

Florida a Bolivia.

*Maas 5448* (COL, U).***Epidendrum nora-mesae*****Hágsater & O.Pérez**

Hágsater &amp; Pérez 2010.

Hierba.

Endémica. Andes. 1800-2260 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Pérez 773* (HT: VALLE).***Epidendrum oblongialpicola*****Hágsater & Dodson**

Hágsater &amp; Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3400 m.

NAR? No evaluada.

Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Epidendrum obovatipetalum*****Hágsater & Dodson**Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-4000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Alzate 3212* (HUA).

NOTA: la identidad del espécimen requiere verificación / specimen identity needs verification.

***Epidendrum octomerioides*****Schltr.**

Santiago &amp; Hágsater 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 25 m.

CHO. No evaluada.

Honduras a Colombia.

*Folsom 10546* (AMO).

***Epidendrum oligophyllum***

**F.Lehm. & Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1650-3000 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann 6850* (HT: HBG; IT: AMES, K-L, LE).

NOTA: un registro de Perú (Govaerts *et al.* 2014a) requiere verificación / a record from Peru (Govaerts *et al.* 2014a) needs verification.

***Epidendrum oraion* Hágsater**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500-2000 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Lozano 3125* (COL, MO).

***Epidendrum orchidiflorum***

**Lindl.**

*Epidendrum caespitosum* Barb.

Rodr., *Epidendrum garayanum*

A.D.Hawkes

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 300 m.

AMA. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil.

*Duivenvoorden 1341* (NY).

***Epidendrum oreogena* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3300 m.

NAR. No evaluada.

Colombia.

*Hopp 61* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo. Con frecuencia, citada erróneamente como *oreogenum*; no obstante, *oreogena* es un sustantivo ("el que nace en los

montes") usado en aposición y, por tanto, es invariable / known only from the type; often erroneously cited as *oreogenum* but *oreogena* is a noun ("the one who is born in the mountains") used in apposition and is therefore invariable.

***Epidendrum orgyale* Lindl.**

Santiago & Hágsater 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

CUN. No evaluada.

Colombia.

*Renz 3150* (RENZ).

***Epidendrum orthophyllum***

**Hágsater & Dodson**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3530-3630 m.

CAU, HUI. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Idrobo 2960* (COL).

***Epidendrum orthopterum***

**Hágsater & E.Santiago**

Santiago 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3200-3500 m.

CAL, TOL. No evaluada.

Colombia.

*Killip 34572* (HT: AMES).

***Epidendrum ortizii* Hágsater**

**& E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2013b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2500 m.

CUN, SAN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*García-Barriga 12523* (HT: COL; IT: US).

***Epidendrum oscar-perezii***

**Hágsater et al.**

Hágsater & Santiago 2013c.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

BOY. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Parra 422* (HT: VALLE).

***Epidendrum oxybatesii***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 600-1500 m.

NAR? No evaluada.

Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; descrita de Imbabura (Ecuador), cerca de la frontera / expected; described from Imbabura (Ecuador), near the border.

***Epidendrum oxycalyx***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600-3000 m.

ANT, NAR, PUT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Ospina 127* (AMES).

***Epidendrum oxynanodes***

**Hágsater**

Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

ANT, CHO. No evaluada.

Colombia.

*Hágsater 11530* (HT: AMO).

***Epidendrum oxysepalum***

**Hágsater & E.Santiago**

Santiago 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3200-3950 m.

BOY, CUN, TOL. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Díaz-Piedrahita 2884* (COL, MO).

***Epidendrum pachoi* Hágsater**

**& L.Sánchez**

Hágsater & Sánchez 2001;

*Idárraga et al.* 2011.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2700 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Hágsater 11557* (HT: AMO).

***Epidendrum pachycoleum*  
Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013j.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3300-3600 m.  
VAL. No evaluada.  
*Pérez 873* (HT: CUVC).

***Epidendrum pachyneuron*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

***Epidendrum pachyphyllodes*  
Hágsater & E.Santiago**

Santiago 2004.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3300-3600 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Pennell 7026* (HT: AMES).

***Epidendrum pachyphyllum*  
Schltr.**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (B, destruido).

***Epidendrum pachyphyton*  
Garay**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Magdalena.  
400-2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Escobar 1033* (HT: AMES).

***Epidendrum pachypodium*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Sin colector s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: tratada por Govaerts *et al.* (2012) como sinónimo de *E. blepharistes* / treated by Govaerts *et al.* (2012) as a synonym of *E. blepharistes*.

***Epidendrum panamense*  
Schltr.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 650-1500 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Misas 52* (AMO, ilustración).

**[*Epidendrum paniculatum*  
Ruiz & Pav.]**

Idárraga *et al.* 2011.  
NOTA: registro basado en identificación errónea; es de Perú. Registro basado en especímenes de *E. cirrhochilum* / record based on a misidentification; this species is from Peru; record based on specimens of *E. cirrhochilum*.

***Epidendrum panicolorotundifolium*  
Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
VAL. No evaluada.  
*Guarín 100* (COL).

***Epidendrum papallactense*  
Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3800 m.

NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Jameson s.n.* (K-L).

***Epidendrum parra-sanchezii*  
Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013d.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 100 m.  
VAL. No evaluada.  
O Colombia.  
*Pérez 631* (HT: CUVC).

***Epidendrum pastoense*  
Schltr.**

Santiago & Hágsater 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2800-3700 m.  
CAU, NAR, PUT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 6150* (LT: NY; IT: AMES, K).

***Epidendrum pazii* Hágsater**

Hágsater 2001.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1850-2300 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Paz 493* (HT: CUVC).

***Epidendrum peperomia*  
Rchb.f.**

*Neolehmannia peperomia* (Rchb.f.) Garay & Dunst.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1350-2850 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Uribe-Uribe 1251* (COL, US).

***Epidendrum peraltum* Schltr.**

*Epidendrum altissimum* F.Lehm. & Kraenzl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2200-2650 m.

NAR, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 8317* (HT: K-L; IT: AMES).

***Epidendrum perijaense***  
**Carnevali & G.A.Romero**

Romero-González & Carnevali 2000.

Hierba.

Nativa. Andes. 2700 m.

CES? No evaluada.

Colombia?, Venezuela.

NOTA: esperada; descrita de la cordillera de Perijá (Venezuela), cerca de la frontera / expected; described from the Cordillera de Perijá (Venezuela), near the border.

***Epidendrum peristerium***  
**Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2010.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1200-1800 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Central.

*Escobar 5275* (HT: AMO).

NOTA: por mucho tiempo confundida con *E. convergens* / long confused with *E. convergens*.

***Epidendrum phragmitoides***  
**Hágsater**

Hágsater 2010.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Hágsater 7362* (HT: MO).

***Epidendrum phyllocharis***  
**Rchb.f.**

Santiago & Hágsater 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1350-2000 m.

RIS, VAL. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

*Bernal 1000* (COL).

**[*Epidendrum physodes***  
**Rchb.f.]**

Idárraga *et al.* 2011.

NOTA: registro basado en especímenes de *E. prostratum* / record based on specimens of *E. prostratum*.

***Epidendrum physopus***  
**Kraenzl.**

*Epidendrum schneideri* Hágsater,  
*Epidendrum trimeroglossum* Schltr.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600-3100 m.

CAU, CUN, SAN. No evaluada.

Colombia y Perú.

*Killip 15708* (AMES, US).

***Epidendrum pichincha***  
**Schltr.**

Santiago & Hágsater 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 1500-2100 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Mora 360* (COL).

***Epidendrum pilcuense***  
**Hágsater**

Hágsater 1993.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1100-1250 m.

CAU, NAR. No evaluada.

O Andes.

*Mora 2255* (HT: US).

***Epidendrum piperinum***  
**Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2800-3100 m.

BOY, CUN, MAG. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Lehmann 2482* (G).

***Epidendrum pirrense***  
**Hágsater**

Hágsater 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 1200-1400 m.

CHO? No evaluada.

Colombia?, Panamá.

NOTA: esperada; descrita del cerro Pirre, Darién (Panamá), cerca de la frontera / expected; described from Cerro Pirre, Darién (Panama), near the border.

***Epidendrum pittieri*** Ames  
Santiago & Hágsater 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2600-4000 m.

ARA, BOY, CAU, CUN, NAR,

PUT. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Cleef 10110* (SEL, U).

***Epidendrum platyglossum***  
**Rchb.f.**

Hágsater 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Escobar 778* (AMO).

***Epidendrum platypetalum***  
**Hágsater**

Hágsater 2001; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Ospina 88* (HT: AMES).

***Epidendrum platystachyum***  
**Hágsater**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2440 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Occidental.  
*Escobar 5380* (HT: AMO).

***Epidendrum pleiobracteatum***

**Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2013d.

Hierba.

Endémica. Andes. 3350-3450 m.

VAL. No evaluada.

*Cuatrecasas 18025* (HT: VALLE;

IT: AMES, F, US, VALLE).

***Epidendrum pogonochilum***

**Carnevali & G.A.Romero**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700-2400 m.

CÓR, NSA. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Luer 6687* (SEL).

***Epidendrum***

***polyanthostachyum* Hágsater et al.**

Hágsater et al. 2013o.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

***Epidendrum pomecense***

**Hágsater**

Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400-2500 m.

BOY, SAN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*García-Barriga 18072* (AMES,

COL).

***Epidendrum popayanense***

**F.Lehm. & Kraenzl.**

Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2800-3200 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann 8349* (HT: K-L).

***Epidendrum porpax* Rchb.f.**

*Epidendrum porphyrophyllum*

Schltr., *Nanodes porpax* (Rchb.f.)

Brieger & Lückel, *Neolehmannia*

*porpax* (Rchb.f.) Garay & Dunst.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-1700 m.

CUN. No evaluada.

Colombia a México.

*Uribe 1251* (COL, US).

***Epidendrum porphyreum***

**Lindl.**

Santiago & Hágsater 2010.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500-3000 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Triana 1371-6* (COL).

***Epidendrum porquerense***

**F.Lehm. & Kraenzl.**

Hágsater 2001.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1200-2800 m.

ANT, BOY, CUN, HUI, RIS,

VAL. No evaluada.

Colombia.

*Uribe 5412* (COL, HPUJ).

***Epidendrum portokalium***

**Hágsater & Dodson**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1100 m.

CAU. No evaluada.

S Colombia, Ecuador.

***Epidendrum posadarum***

**Hágsater**

Hágsater 2001; Idárraga et al.

2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2550-2800 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Cordilleras Occidental y Central.

*Betancur 1159* (HUA, MO).

***Epidendrum praetervisum***

**Rchb.f.**

*Epidendrum dichotomum* Lindl.

Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2700-2800 m.

CUN, MET. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Renz 3945* (RENZ).

***Epidendrum prasinum***

**Schltr.**

Hágsater 2006; Idárraga et al.

2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3200 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Schneider 145/1* (COL, HUA,

MO).

***Epidendrum pristis* Rchb.f.**

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y cultivada. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: afín a *E. elongatum* / related to *E. elongatum*.

***Epidendrum prostratum***

**(Lindl.) Cogn.**

*Physinga prostrata* Lindl.

Idárraga et al. 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, V Magdalena. 200-500 m.

AMA, ANT, SAN. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú,

Bolivia, Brasil, Guyana.

*Cogollo 505* (JAUM, MO).

***Epidendrum pseudokillipii***

**Hágsater & L.Sánchez**

Sánchez 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1350 m.

RIS. No evaluada.

Cordillera Occidental.

Bernal 965 (HT: COL).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Epidendrum pseudomancum***

**Hágsater & L.Sánchez**

Sánchez 2004; Idárraga *et al.*  
2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-3000 m.

ANT, CAU, HUI, NAR. No  
evaluada.

Colombia y Ecuador.

Luer 2721 (HT: SEL).

***Epidendrum***

***pseudonocturnum* Hágsater  
& Dodson**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 10-1000  
m.

CHO, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Killip 34957 (AMES, COL, S,  
US).

***Epidendrum***

***pseudopaniculatum* Dodson**

Santiago & Hágsater 2010.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 100-300 m.

CHO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Misas 48 (Ilustración AMO).

***Epidendrum***

***pseudoschumannianum*  
Fowlie**

*Oerstedella pseudoschumanniana*  
(Fowlie) Hágsater

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

CAU, VAL. No evaluada.

Colombia y Panamá.

Ortiz 1062 (HPUJ).

***Epidendrum psilosepalum***

**Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2700 m.

CAU. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Lehmann 2721 (HT: G).

***Epidendrum pterostele***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1990 m.

NAR. No evaluada.

Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; descrita de  
Sucumbíos (Ecuador), cerca de  
la frontera / expected; described  
from Sucumbíos (Ecuador), near  
the border.

***Epidendrum ptochicum***

**Hágsater**

Hágsater 2006.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 600-1800 m.

NAR, VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

Paz 341 (CUVC).

**[*Epidendrum pulchrum***

**(Schltr.) Hágsater &**

**Dodson]**

Ortiz & Uribe 2008.

NOTA: registro basado en  
identificación errónea; endémica  
de Pichincha (Ecuador) / record  
based on a misidentification;  
endemic to Pichincha (Ecuador).

***Epidendrum punense***

**Hágsater & Dodson**

Sánchez 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3200 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Ewan 16631 (US).

***Epidendrum purpurascens***

**Focke**

*Epidendrum bungerothii* Schltr.,

*Epidendrum clavatum* Lindl.

Sánchez & Hágsater 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Orinoquia. 200-  
950 m.

ARA, SAN. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana,

Surinam, Guyana Francesa,

Brasil, Costa Rica.

Schultes 14206 (COL).

***Epidendrum purum* Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1090-2000 m.

CAU, CUN, MET, SAN. No  
evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil,  
Ecuador.

Espinal 2385 (COL, HPUJ).

***Epidendrum putumayoense***

**Hágsater & L.Sánchez**

Hágsater & Sánchez 1999.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 800 m.

CAQ, PUT. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

Hágsater 11640 (HT: AMO).

***Epidendrum***

***quadrangulatum***

**A.D.Hawkes**

*Epidendrum quadratum* Lindl.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400-3100 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Jameson *s.n.* (US).

***Epidendrum***

***quinquecallosum* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800 m.

CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (B, destruido).

***Epidendrum radicans* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Cauca. 1000-2400 m.  
ANT, CAL, CAU, RIS, TOL, VAL. No evaluada.  
México a Colombia.  
*Camargo 7446* (COL).

**[*Epidendrum rafaél-lucasii* Hágsater]**

Ortiz & Uribe 2008.  
NOTA: endémica de Costa Rica; registro prob. basado en *E. mutisii* / endemic to Costa Rica; record prob. based on *E. mutisii*.

***Epidendrum ramosum* Jacq.**

*Epidendrum sellowii* Rchb.f.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes, Orinoquia, Pacífico. 400-2500 m.  
ANT, CHO, CUN, MET, PUT, SAN. No evaluada.  
México a Brasil.  
*Betancur 5182* (COL).

***Epidendrum recurvatum* Lindl.**

Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Escobar 185* (diapositiva, AMO).

***Epidendrum renilabioides* Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2035 m.  
NAR? No evaluada.

Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

**[*Epidendrum renzii* Garay & Dunst.]**

Ortiz & Uribe 2008.  
NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde en realidad a *E. pogonochilum* / record based on a misidentification; actually corresponds to *E. pogonochilum*.

***Epidendrum repens* Cogn.**

*Epidendrum bourgeauii* Schltr.,  
*Epidendrum protractum* Schltr.,  
*Epidendrum ramistratum* Schltr.,  
*Epidendrum solisequum* Kraenzl.  
Sánchez & Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta. 1200-1900 m.  
ANT, MAG, NAR, NSA. No evaluada.  
México a Ecuador, Guyana y Venezuela; Antillas.  
*Paz 286* (CUVC).

***Epidendrum restrepoanum* A.D.Hawkes**

*Epidendrum coccineum* Rchb.f.  
Santiago & Hágsater 2007;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta. 1500-3500 m.  
ANT, CAL, CES, CUN, NSA, PUT, QUI. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Boeke 256* (MO, NY, SEL).

***Epidendrum rhodanthum* Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 1999.  
Hierba.

Nativa. Andes. 3600 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Epidendrum rhodochilum* (Schltr.) Hágsater & Dodson**

*Diothonea rhodochila* Schltr.  
Hágsater 1992; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300-2600 m.  
ANT, NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Ospina-H. s.n.* (JAUM).

***Epidendrum rhodovandoides* Hágsater**

Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Ospina-H. 194* (JAUM).

***Epidendrum rhombochilum* L.O.Williams**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3330 m.  
CAU, MET, NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Idrobo 3182* (COL).

***Epidendrum rhomboscutellum* Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2013e.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700-3100 m.  
CAU, NAR. No evaluada.  
Colombia, Perú.  
*André 3203* (F, K-L).

[*Epidendrum rigidiflorum*  
Schltr.]

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en identificación errónea; endémica de Costa Rica / record based on a misidentification; endemic to Costa Rica.

*Epidendrum rigidum* Jacq.

*Spathiger rigidus* (Jacq.) Small  
Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico, V Cauca, V Magdalena. 200-1000 m.

ANT, BOY, CAL, CAU, CUN, HUI, MET, VAL. No evaluada.

Estados Unidos, Antillas, Colombia a Argentina; rara en Costa Rica.

*Foster 1648* (COL, HPUJ, JAUM).

*Epidendrum rocalderianum*

**P.Ortiz & Hágsater**

Ortiz & Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 50 m.

CHO, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz 1097* (HPUJ).

*Epidendrum rodrigoii*

**Hágsater**

Hágsater 1993; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, V Magdalena. 470-1100 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Escobar 4021* (HT: AMO).

*Epidendrum rolfeanum*

**F.Lehm. & Kraenzl.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2650 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Lehman 8182* (HT: K-L; IT: AMES).

*Epidendrum romero-castannedae* Hágsater & L.Sánchez

Hágsater & Sánchez 2006.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 10-700 m.

CHO, CÓR. No evaluada.

Colombia y Panamá.

*Romero-Castañeda 6381* (HT: COL, IT: MO).

*Epidendrum rothii*

**A.D.Hawkes**

*Epidendrum juncifolium* Schltr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1200-1500 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann 7306* (T: AMES, K, NY).

*Epidendrum rousseauae*

**Schltr.**

Santiago & Hágsater 2008;

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 40-200 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

*Ortiz 862* (HPUJ).

*Epidendrum rugulosum*

**Schltr.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1350-2750 m.

ANT, CAU, HUI, PUT, VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*McPherson 13267* (MO, U).

*Epidendrum ruizianum*  
**Steud.**

*Epidendrum nutans* Ruiz & Pav.,  
*Epidendrum spathaceum* Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 960-2000 m.

ANT, CAU, CUN, HUI, RIS, SAN, VAL. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Uribe 1381* (COL, HPUJ, JAUM).

*Epidendrum rupestre* Lindl.

Hágsater (inédito).

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600-3300 m.

CAU, CUN, NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Lehmann s.n.* (W).

*Epidendrum saccatum*

**Hágsater**

Hágsater 2001.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3000 m.

NAR, PUT. No evaluada.

Colombia.

*Fernández 7127-A* (HT: COL).

*Epidendrum sanctae-martae*

**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. SN Santa Marta.

1100-2650 m.

MAG. No evaluada.

Colombia.

*Pittier 1708* (IT: AMES, US).

*Epidendrum sanguineum*

**Schltr.**

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

NOTA: no se estudió ningún espécimen / no specimens studied.

***Epidendrum sarcochilum*****Linden & Rchb.f.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

NOTA: no se estudió ningún espécimen / no specimens studied.

***Epidendrum sarcodes* Lindl.**

Sánchez &amp; Hágsater 2006.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600-3350 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Huertas 6480* (COL).***Epidendrum scharfii*****Hágsater & Dodson**

Hágsater &amp; Dodson 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1300-1500 m.

BOY, CUN, HUI, NAR, RIS, VAL. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

*García-Barriga 17281* (AMES, COL, JAUM, NY).***Epidendrum schistochilum*****Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Uribe 1865* (COL).***Epidendrum schlimii* Rchb.f.***Epidendrum tenellum* Lindl.Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 1800-2100 m.

ANT, CUN, MAG, NSA, VAL.

No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Cuatrecasas 12538* (COL, MO).***Epidendrum schnitteri* Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Schnitter s.n.* (HT: B, destruido).***Epidendrum schunkei*****D.E.Benn. & Christenson**

Ortiz &amp; Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia Ecuador, Perú.

*Uribe [diapositiva]*.

NOTA: cultivada? / cultivated?

***Epidendrum sculptum*****Rchb.f.**Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Pacífico. 10-300 m.

ANT, CAQ, NAR. No evaluada. México a Brasil.

*Romero-Castañeda 5132* (COL, JAUM, MO).***Epidendrum scutella* Lindl.**Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2920-4000 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, NAR, NSA. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Ortiz 599* (HPUJ).***Epidendrum scytocladium*****Schltr.***Epidendrum subtorquatum*

Kraenzl.

Santiago &amp; Hágsater 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 2000-3150 m.

ANT, BOY, CAL, CHO, CUN, HUI, QUI, SAN, TOL. No evaluada.

Colombia.

*Killip 34649* (COL, AMES, US).**[*Epidendrum secundum* Jacq.]**Idárraga *et al.* 2011.NOTA: endémica de las Antillas Menores; los especímenes corresponden a *E. elongatum*, cuya taxonomía es aún confusa / endemic to the Lesser Antilles; specimens correspond to *E. elongatum*, whose taxonomy is still unclear.***Epidendrum serpens* Lindl.***Epidendrum ornithidii* Schltr.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2800-3900 m.

BOY, CUN, MET, TOL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cuatrecasas 1317* (COL).***Epidendrum sertorum* Garay & Dunst.**

Hierba, epífita.

Nativa. Orinoquia. 350-500 m.

MET. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Pérez-Arbeláez 228* (COL).***Epidendrum shigenobui*****Hágsater**

Hágsater 1999.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y cultivada. Andes.

RIS. No evaluada.

Colombia.

*Hágsater 11637* (HT: COL; IT: AMO, QCNE).***Epidendrum sierrae-peladae* Kraenzl.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600-2700 m.

SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Kalbreyer 731* (HT: B, destruido).

***Epidendrum silverstonei***  
**Hágsater**

Hágsater 1999.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2125-2550 m.  
ANT, CHO, VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Silverstone 3768* (HT: CUVC; IT: AMO, MO).

***Epidendrum sinuosum* Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1741-2650 m.  
CUN, HUI. No evaluada.  
Colombia.  
*Kapuler 139* (COL).

***Epidendrum siphonosepalum***  
**Garay & Dunst.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700 m.  
HUI. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Ortiz 620* (HPUJ).

***Epidendrum sisgaense***

**Hágsater**  
Hágsater 2001.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2750 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Uribe 6741* (COL).

***Epidendrum smaragdinum***  
**Lindl.**

Hierba, epífita.  
Nativa. V Magdalena. 100-200 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Guyana.  
*Romero-Castañeda 8357* (COL, ENCB, NY, P).

***Epidendrum smithii* Schltr.**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, SN Santa Marta. 1800 m.  
MAG, NSA. No evaluada.  
Colombia.  
*García-Barriga 20753* (COL).  
NOTA: tratada por Govaerts *et al.* (2012) como sinónimo de *E. ibaguense* / treated by Govaerts *et al.* (2012) as a synonym of *E. ibaguense*.

***Epidendrum sneidernii***

**Hágsater & E.Santiago**  
Hágsater & Santiago 2010.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2900 m.  
CAU, NAR. No evaluada.  
*Lehman 3516* (G).

***Epidendrum socorrense***

**Rchb.f. & Warsz.**  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Schlim 75* (HT: K-L).  
NOTA: del complejo *E. elongatum* / *E. elongatum* complex.

***Epidendrum sophronitoides***

**F.Lehm. & Kraenzl.**  
*Epidendrum monanthum* Schltr.,  
*Takulumena sophronitoides*  
(F.Lehm. & Kraenzl.) Szlach.  
Hágsater & Santiago 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700-3400 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Lehmann 6245* (HT: K-L; IT: K-L, LE).  
NOTA: el registro de Antioquia (Idárraga *et al.* 2011) requiere verificación / the record from Antioquia (Idárraga *et al.* 2011) needs verification.

***Epidendrum spathatum***  
**Schltr.**

*Epidendrum embreei* Dodson  
Santiago & Hágsater 2010.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2900 m.  
CAL, CAU, NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 6086* (K, LE).

***Epidendrum spilotum* Garay & Dunst.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 700 m.  
CAQ. No evaluada.  
Venezuela, Colombia, Ecuador.  
*Escobar 5270* (AMO).

***Epidendrum splendens***  
**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
NOTA: la presencia en Colombia requiere verificación / its presence in Colombia needs verification.

***Epidendrum stamfordianum***  
**Bateman**

Jiménez & Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe, Pacífico. 200-500 m.  
ANT, GUJ, MAG. No evaluada.  
México a Colombia.  
*Purdie s.n.* (K-L).

***Epidendrum stangeanum***  
**Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0 m.  
VAL. No evaluada.  
Guatemala a Ecuador.  
*Lehmann 441* (K).

***Epidendrum stanhopeanum*****Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 2400 m.  
 NSA. No evaluada.  
 Cordillera Oriental.  
*Stanhope s.n.* (?).

***Epidendrum stellidiforme*****Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa. Andes. 1395-1500 m.  
 VAL. No evaluada.  
 Colombia, Ecuador, Costa Rica.  
*Folsom 10441* (AMO).

***Epidendrum stenopetaloides*****Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 3160 m.  
 ANT. No evaluada.  
 Cordillera Central.  
*Kalbreyer 1596* (B, destruido?).  
 NOTA: conocida solo del tipo /  
 known only from the type.

***Epidendrum stenostachyum*****Hágsater & E.Santiago**

Santiago 2004.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes, SN Santa  
 Marta. 2600-3140 m.  
 CUN, MAG. No evaluada.  
 Colombia.  
*Barclay 6627* (HT: AMES; IT:  
 MO).

***Epidendrum sterroanthum*****Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 3500 m.  
 CAU. No evaluada.  
 Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

***Epidendrum sterrophyllum*****Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 1000 m.  
 ANT. No evaluada.  
 Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

***Epidendrum steyermarkii*****A.D.Hawkes**

*Epidendrum matutinum* Rchb.f.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa. Andes. 2450-3250 m.  
 CUN, SAN. No evaluada.  
 Colombia y Venezuela.  
*Haught 5905* (COL, JAUM, US).

***Epidendrum strictum* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 2000-2500 m.  
 CUN. No evaluada.  
 Cordillera Oriental.  
*Schnitter s.n.* (HT: B, destruido).

***Epidendrum strobiliferum*****Rchb.f.**

*Epidendrum verecundum* Schltr.,  
*Spathiger strobilifer* (Rchb.f.)  
 Small  
 Idárraga *et al.* 2011.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa. Amazonia, Orinoquia,  
 Pacífico. 400-490 m.  
 ANT, MET. No evaluada.  
 Neotrópico.  
*Idrobo 2040* (COL).

***Epidendrum suaveolens*****Ames**

Santiago & Hágsater 2009.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa. Andes. 2700-3510 m.  
 CAU, NAR. No evaluada.  
 Colombia y Ecuador.  
*Pittier 1066* (HT: US; IT: AMES).

***Epidendrum subadnatum*****Rchb.f.**

Santiago & Hágsater (inérito).  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes.  
 ANT. No evaluada.  
 Colombia.  
*Roezl s.n.* (HT: W-R).  
 NOTA: conocida solo del tipo /  
 known only from the type.

***Epidendrum subfloribundum*****Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 3300 m.  
 NAR. No evaluada.  
 Colombia.  
*Hopp 60* (HT: B, destruido).

***Epidendrum suborbiculare*****Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 3300 m.  
 NAR. No evaluada.  
 Colombia.  
*Hopp 51* (HT: B, destruido).

***Epidendrum subpurum*****Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
 Nativa. Andes. 2000 m.  
 TOL. No evaluada.  
 Colombia y Venezuela.  
*Albert 4199* (HUA).  
 NOTA: la identidad del  
 espécimen requiere verificación  
 / specimen identity needs  
 verification.

***Epidendrum sucumbiense*****Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa. Andes. 2100-2350 m.  
 NAR? No evaluada.  
 Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en Sucumbíos (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Sucumbíos (Ecuador), near the border.

***Epidendrum sulcatum* Ames**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-3000 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Pittier 1060* (HT: US).

***Epidendrum sumapacense***

**Hágsater & E.Santiago**  
Santiago 2004.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3300-3600 m.  
MET. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Cleef 977* (HT: U; IT: SEL, U).

***Epidendrum susannae***

**Hágsater et al.**  
Hágsater *et al.* 2013c.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
BOY. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Pérez 1105* (HT: VALLE).

***Epidendrum sympetalosteale***

**Hágsater & L.Sánchez**  
Hágsater & Sánchez 1993;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 100-1500 m.  
ANT, CHO, NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 603* (HT: HPUJ).

***Epidendrum sympodiale***  
**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.

CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

***Epidendrum tacarcunense***

**Hágsater**  
Hágsater 1999.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 1500-1700 m.  
CHO? No evaluada.  
Colombia?, Panamá.  
NOTA: esperada; descrita del cerro Tacarcuna, en la serranía del Darién (Panamá), cerca de la frontera / expected; described from Cerro Tacarcuna in Darién (Panama), near the border.

***Epidendrum tamaense***

**Foldats**  
Hágsater 2006.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2350-2700 m.  
BOY. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Ortiz 4176* (HPUJ).

***Epidendrum tandapianum***

**Dodson & Hágsater**  
Hágsater & Santiago 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2600-2900 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 6171* (AMES, NY).

***Epidendrum tenax* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.

***Epidendrum tequendamae***

**F.Lehm. & Kraenzl.**  
Santiago & Hágsater (inérito).  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2400 m.

CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Uribe 4784* (COL, MO, NY).  
NOTA: a veces confundida con *E. acuminatum* / sometimes confused with *E. acuminatum*.

***Epidendrum tetragonioides***  
**Hágsater & Dodson**

Santiago 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3300-3600 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Epidendrum tigriphyllum***

**Hágsater**  
Hágsater 1999; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 5339* (HT: AMO).

***Epidendrum timbiquiense***

**Hágsater & E.Santiago**  
Hágsater & Santiago 2013f.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 50 m.  
CAU, VAL. No evaluada.  
O Colombia.  
*Gentry 40350* (HT: COL).

***Epidendrum tolimense* Lindl.**

*Epidendrum rubioi* Hágsater & Dodson  
Santiago & Hágsater 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400-3200 m.  
RIS, TOL. No evaluada.  
Costa Rica a Venezuela y Ecuador.  
*Linden 1272* (HT: K-L).

***Epidendrum torquatum*****Lindl.**

Santiago &amp; Hágsater 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2800-3500 m.

NAR? No evaluada.

Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Epidendrum torraense*****Hágsater & Silverst.**

Hágsater &amp; Silverstone-Sopkin 2001.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-2550 m.

CHO. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Silverstone 4358* (HT: CUVC, IT: AMO, MO).

**[*Epidendrum trachysepalum* Hágsater]**Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en identificación errónea / record based on a misidentification.

***Epidendrum transversovatum* Hágsater & Dodson**

Hágsater &amp; Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 750 m.

NAR. No evaluada.

Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; descrita de Esmeraldas (Ecuador), cerca de la frontera / expected; described from Esmeraldas (Ecuador), near the border.

**[*Epidendrum tricarinatum* Rolfe]**Idárraga *et al.* 2011.

NOTA: registro basado en identificación errónea; endémica

de Perú / record based on a misidentification; endemic to Peru.

***Epidendrum tridens* Poepp. & Endl.**

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 50-260 m.

CHO, VAL. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

*Senghas 12/T.12* (HT: Herb.

Bock; IT: JAUM, AMO).

*Epidendrum tridens* var. *briegeri*

I.Bock

NOTA: la var. *briegeri* es endémica de Colombia / var. *briegeri* is endemic to Colombia.

***Epidendrum trifidum* Schltr.***Epidendrum cylindristachys*

Lindl.

Sánchez &amp; Hágsater (inédito).

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2200 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

***Epidendrum trilobochilum* Hágsater & Dodson**

Hágsater &amp; Dodson 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2700-3250 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Ewan 16620* (US).***Epidendrum tropidioides* Garay**

Santiago &amp; Hágsater 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2700-2760 m.

PUT. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Bristol 388* (HT: AMES; IT: COL, US).

***Epidendrum tropinectarium* Hágsater & E.Santiago**

Santiago 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Central.

*Silverstone 973* (HT: CUVC; IT: MO).

***Epidendrum trulliforme* Garay & Dunst.**

Santiago &amp; Hágsater (inédito).

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3360 m.

CAU, MET. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Escobar 1277* (AMES, AMO).***Epidendrum tulcanense* Hágsater & Dodson**

Hágsater 2013.

Hierba.

Nativa. Andes. 2300-3200 m.

NAR, PUT. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

*Cortés 70* (CUVC, VALLE).**[*Epidendrum umbelliferum* J.F.Gmel.]**Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: endémica de Perú; registro basado en sinonimia dudosa / endemic to Peru; record based on questionable synonymy.

***Epidendrum unguiculatum* (C.Schweinf.) Garay & Dunst.***Epidendrum paniculatum* var. *unguiculatum* C.Schweinf.

Santiago &amp; Hágsater (inédito).

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y

Macarena, Caribe. 100-300 m.

CES, MAG, VAU. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil,

Guyana Francesa, Perú.

*Kirkbride 2510* (COL, HB, NY, US).

***Epidendrum uribei***

**A.D.Hawkes**

*Epidendrum cebolleta* Schltr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-3100 m.  
ANT, CUN, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Hartman 616* (CUVC).

***Epidendrum urichianum***

**Carnevali et al.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700 m.  
CUN, MAG. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Jaramillo 5151* (COL).

***Epidendrum urraoense***

**Hágsater**

Hágsater 1999; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2440 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Hágsater 11551* (COL).

***Epidendrum vareschii***

**Foldats**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700 m.  
NSA? No evaluada.  
Colombia y NO Venezuela.

**[*Epidendrum vernixium***

**Rchb.f. & Warsz.]**

Idárraga *et al.* 2011.  
NOTA: registro basado en identificación errónea. Endémica de Perú / record based on a misidentification; endemic to Peru.

***Epidendrum veroreveloi***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 2001.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000 m.

NAR? No evaluada.

Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en Sucumbíos (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Sucumbíos (Ecuador), near the border.

***Epidendrum vesicicaule***

**L.O.Williams**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 526* (HPUJ).

***Epidendrum vexillum***

**Hágsater**

Hágsater 1999.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 50-1000 m.  
CHO, RIS. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Misas 280* (ilustración).

***Epidendrum vieirae* Hágsater**

Hágsater 1993.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-1750 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Haught 4727* (AMES, COL).

***Epidendrum vigiaense***

**I.Bock**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 50 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Bock 11* (AMO).

***Epidendrum villotae***

**Hágsater & Dodson**

Hágsater & Dodson 1999.  
Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 0-250 m.

VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Killip 5323* (AMES, COL, HPUJ).

***Epidendrum vincentinum***

**Lindl.**

*Epidendropsis vincentina* (Lindl.) Garay & Dunst.  
Jiménez & Hágsater 2008;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1365 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Venezuela a Perú; Costa Rica; Antillas.  
*Cogollo 2665* (JAUM).

***Epidendrum viridibrunneum***

**Rchb.f.**

*Epidendrum centropetalum* Rchb.f., *Neolehmannia viridibrunnea* (Rchb.f.) Garay & Dunst.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
MAG, NSA. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Ortiz-V. s.n.* (HPUJ).

***Epidendrum viviparum***

**Lindl.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 300 m.  
MET, VAU. No evaluada.  
Colombia, Brasil, Guyana, Perú, Ecuador.  
*Múnera 385B* (AMO).

***Epidendrum vulcanicum***

**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 4000 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.

***Epidendrum wallisii* Rchb.f.**

*Epidendrum pseudowallisii* Schltr., *Oerstedella pseudowallisii* (Schltr.) Hágsater, *Oerstedella wallisii* (Rchb.f.) Hágsater Santiago & Hágsater 2006; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-2100 m.  
ANT, CHO, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Colombia.  
*Wallis s.n.* (HT: W-R).

***Epidendrum weerakitianum* Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013k.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1770-2050 m.  
ANT, QUI, VAL. No evaluada.  
*Pérez 1106* (HT: VALLE).

***Epidendrum werffii* Dodson & Hágsater**

Dodson 1989.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 250-850 m.  
NAR? No evaluada.  
Ecuador.  
NOTA: esperada; conocida de áreas vecinas, en Ecuador / expected; known from neighboring areas in Ecuador.

***Epidendrum wernerii* Schltr.**

Hierba.  
Endémica. Andes. 2400-3000 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp 147* (B, destruido).  
NOTA: no se examinó ningún material / no material was examined.

***Epidendrum williamsii* Dodson**

*Neolehmannia williamsii* (Dodson) Dodson  
Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 30 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Idrobo 1485* (COL, US).

***Epidendrum wolffi* Hágsater & E.Santiago**

Hágsater & Santiago 2013g.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3370 m.  
RIS. No evaluada.  
*Wolf 792* (HT: SEL; IT: COL).

**[*Epidendrum xanthinum* Lindl.]**

NOTA: endémica de Brasil; algunos registros colombianos se basan en especímenes de *E. melinanthum* / endemic to Brazil; some Colombian records based on specimens of *E. melinanthum*.

***Epidendrum xanthoanthinum* Hágsater**

*Epidendrum pseudepidendrum* var. *auratum* Rchb.f.  
Hágsater 1993.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 50-1800 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Hágsater 11709* (AMO).

***Epidendrum xantholeucum* Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2200 m.  
NSA? No evaluada.  
NO Colombia?, O Venezuela.  
NOTA: esperada; tipo de Mérida (Venezuela) / expected; type from Merida (Venezuela).

***Epidendrum xylostachyum* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-3460 m.

ANT, CAU, CUN, HUI, NAR, PUT, RIS, SAN, TOL. No evaluada.  
Colombia.  
*Espinal 997* (COL, US).

***Epidendrum yarumalense* Hágsater & E.Santiago**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Hágsater 11682* (HT: AMO).

***Epidendrum yumboëense* Hágsater et al.**

Hágsater *et al.* 2013m.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2300 m.  
VAL. No evaluada.  
*Pérez 831* (HT: VALLE; IT: CUVC).

***Epidendrum zipaquiranum* Schltr.**

Santiago & Hágsater 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 3000-3500 m.  
ARA, BOY, CUN, MET, NSA, PUT, SAN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Lehmann 7616* (LT: AMES; ILT: K, L, NY).  
NOTA: tratada por Govaerts *et al.* (2012) como sinónimo de *E. chioneum* / treated by Govaerts *et al.* (2012) as a synonym of *E. chioneum*.

***Epistephium* Kunth**

10 especies, 2 especies endémicas

***Epistephium amplexicaule* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**

*Sobralia amplexicaulis* Ruiz & Pav.  
Ortiz 1995.

Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Orinoquia.  
20-1200 m.  
BOY, GUV, MET, TOL, VAU. No  
evaluada.  
Colombia, Perú, Bolivia, Guyana.  
*Cuatrecasas 7173* (COL).

***Epistephium brevicristatum***  
**R.E.Schult.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Amazonia. 132-184  
m.  
VAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Schultes 14269* (AMES).

***Epistephium duckei* Huber**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes. 200-  
1800 m.  
AMA, CUN. No evaluada.  
Amazonia y vertientes andinas.  
*Uribe 4839* (AMES, COL, HPUJ).

***Epistephium elatum* Kunth**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 400-1500 m.  
CUN, SAN, TOL. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Ortiz 784* (HPUJ).

***Epistephium frederici-***  
***augusti* Rchb.f. & Warsz.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1200 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Warszewicz s.n.* (T: W).

***Epistephium hernandii***

**Garay**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 120-290 m.  
GUV, VAU. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Cárdenas 6511* (COAH, MO).

***Epistephium lamprophyllum***  
**Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1450 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Schultze 32* (HT: B, destruido).

***Epistephium parviflorum***  
**Lindl.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia. 100-200 m.  
AMA, CAQ, VAU. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
*Palacios 2437* (COL, MO).

***Epistephium sessiliflorum***  
**Lindl.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. SN Santa Marta. 1350  
m.  
MAG. No evaluada.  
*Linden s.n.* (HT: K).

***Epistephium subrepens***  
**Hoehne**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 184 m.  
VAU. No evaluada.  
Amazonia, Trinidad-Tobago.  
*Garay 110* (AMES).

***Eriopsis* Lindl.**

3 especies

***Eriopsis biloba* Lindl.**

*Eriopsis mesae* Kraenzl.,  
*Pseuderisopsis schomburgkii*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena. 240-1500  
m.  
AMA, ANT, CAQ, GUI, SAN.  
No evaluada.  
América tropical.  
*Schultes 12369* (AMO, COL,  
JAUM).

***Eriopsis rutidobulbon* Hook.**

*Eriopsis colombiana* Schltr.  
Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.

***Eriopsis sceptrum* Rchb.f. &**  
**Warsz.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 250-300 m.  
AMA, VAU. No evaluada.  
Amazonia.  
*Schultes 12629* (COL).

***Erycina* Lindl.**

4 especies

***Erycina crista-galli* (Rchb.f.)**  
**N.H. Williams & M.W. Chase**

*Oncidium crista-galli* Rchb.f.,  
*Psygmorhis crista-galli* (Rchb.f.)  
Dodson  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 950-1800 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Centroamérica a N Suramérica.  
*Callejas 6672* (HUA, MO).

***Erycina glossomystax***  
(Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase

*Oncidium glossomystax* Rchb.f.,  
*Psycmorchis glossomystax*  
(Rchb.f.) Dodson & Dressler  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico, SN Santa  
Marta. 50-1400 m.  
ANT, CHO, CUN, MAG, SAN.  
No evaluada.  
Centroamérica a N Suramérica.  
*Cuatrecasas 10691* (COL).

***Erycina pumilio* (Rchb.f.)**  
N.H.Williams & M.W.Chase

*Erycina gnomus* (Kraenzl.)  
N.H.Williams & M.W.Chase,  
*Oncidium gnomus* Kraenzl.,  
*Oncidium pumilio* Rchb.f.,  
*Psycmorchis gnomus* (Kraenzl.)  
Dodson & Dressler, *Psycmorchis*  
*pumilio* (Rchb.f.) Dodson &  
Dressler  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
ANT. No evaluada.  
Centroamérica a N Suramérica.  
*Henaio 301* (HUA).

***Erycina pusilla* (L.)**  
N.H.Williams & M.W.Chase

*Epidendrum pusillum* L.,  
*Erycina allemanii* (Barb.Rodr.)  
N.H.Williams & M.W.Chase,  
*Oncidium allemanii* Barb.  
Rodr., *Oncidium pusillum* (L.)  
Rchb.f., *Psycmorchis allemanii*  
(Barb.Rodr.) Garay & Stacy,  
*Psycmorchis pusilla* (L.) Dodson  
& Dressler  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Pacífico. 50-1500 m.  
ANT, CHO, VAU. No evaluada.  
Centroamérica a N Suramérica.  
*Gentry 7257* (AMES, COL).

***Eulophia* Lindl.**

2 especies

***Eulophia alta* (L.) Fawc. & Rendle**

*Cyrtopera longifolia* (Kraenzl.)  
Kraenzl., *Cyrtopera woodfordii*  
(Sims) Lindl., *Cyrtopodium*  
*woodfordii* Sims, *Dendrobium*  
*longifolium* Kunth, *Dendrobium*  
*mexicanum* C.Presl, *Eulophia*  
*longifolia* (Kunth) Schltr.,  
*Eulophia woodfordii* (Sims) Rolfe,  
*Limodorum altum* L.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Orinoquia,  
Pacífico. 5-1550 m.  
ANT, BOY, CAQ, CHO, CUN,  
MET, VAL, VAU. Preocupación  
Menor (Smidt 2007).  
Neotrópico.  
*Jaramillo 3581* (COL).

***Eulophia ecristata* (Fernald)**  
Ames

*Cyrtopodium ecristatum* Fernald,  
*Pteroglossaspis ecristata* (Fernald)  
Rolfe  
Ortiz 1995.  
Hierba.  
Adventicia. V Magdalena. 500 m.  
TOL. No evaluada.  
SE Estados Unidos.  
*Schneider 459* (COL).

***Euryblema* Dressler**

1 especie, 1 especie endémica

***Euryblema andreae* (P.Ortiz)**  
Dressler

*Chondrorhyncha andreae* P.Ortiz  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1055* (HT: HPUJ).

***Eurystyles* Wawra**

4 especies, 1 especie endémica

***Eurystyles ananassocomos***  
(Rchb.f.) Schltr.

*Stenoptera ananassocomos*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Guatemala a Perú y Venezuela;  
Caribe.  
NOTA: esperada / expected.

***Eurystyles colombiana***  
(Schltr.) Schltr.

*Trachelosiphon columbianum*  
Schltr.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Madero s.n.* (T: AMES).  
NOTA: en Colombia se conoce  
solo del tipo. Tratada por algunos  
autores como sinónimo de *E.*  
*cotyledon* / known in Colombia  
only from the type; treated by  
some authors as a synonym of *E.*  
*cotyledon*.

***Eurystyles cotyledon* Wawra**

*Eurystyles auriculata* Schltr.,  
*Stenoptera roehlii* Schnee,  
*Trachelosiphon paranaense* Schltr.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1780-2700 m.  
ANT, CAU, CUN, RIS. No  
evaluada.  
Costa Rica, a Brasil y Bolivia.  
*Galeano 2383* (COL).

***Eurystyles cristata* (Schltr.)**

**Schltr.**

*Trachelosiphon cristatum* Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 1300 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

*Madero s.n.* (T: AMES).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Fernandezia Ruiz & Pav.***

22 especies, 9 especies endémicas

***Fernandezia bryophyta***

**(Schltr.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum bryophytum* Schltr.

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

CUN. No evaluada.

Colombia.

*Hopf s.n.* (HT: B, destruido).

***Fernandezia bucarasicae***

**(Kraenzl.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum bucarasicae*  
Kraenzl.

Ortiz 1995; Christenson 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3300 m.

NSA. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Kalbreyer 918* (HT: W).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Fernandezia crystallina***

**(Lindl.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum crystallinum* Lindl.

Ortiz 1995; Christenson 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3530-4000 m.

ANT, CAU, TOL. No evaluada.

Costa Rica a Perú.

*Barclay 6015* (MO).

***Fernandezia distichoides***

**M.W.Chase**

*Pachyphyllum distichum* Kunth

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2700-2800 m.

CAU. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Cuatrecasas 19188* (MO).

***Fernandezia favosifolia***

**(Kraenzl.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum favosifolium*  
Kraenzl.

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3300 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Kalbreyer 1935* (HT: W?).

NOTA: conocida solo del tipo.  
Identificación genérica dudosa  
/ known only from the type;  
generic identification dubious.

***Fernandezia hagsateri***

**(Dodson) M.W.Chase**

*Pachyphyllum hagsateri* Dodson

Christenson 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 3300-3500 m.

NAR? No evaluada.

N Ecuador y prob. Colombia.

NOTA: esperada; recolectada  
en Ecuador, a pocos kms de la  
frontera / expected; collected in  
Ecuador, a few miles from the  
border.

***Fernandezia hartwegii***

**(Rchb.f.) Garay & Dunst.**

*Centropetalum hartwegii*  
(Rchb.f.) Kraenzl., *Nasonia*  
*hartwegii* Rchb.f.

Kränzlin 1923; Kolanowska &  
Szlachetko 2013.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2900-4200 m.

ANT, CAU, NAR. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Callejas 11597* (HUA, MO).

***Fernandezia hispidula***

**(Rchb.f.) M.W.Chase**

*Dichaea microscopica* Kraenzl.,

*Orchidotypus muscoides*

Kraenzl., *Pachyphyllum*

*hispidulum* (Rchb.f.) Garay &

Dunst., *Pachyphyllum schultesii*  
L.O.Williams

Ortiz 1995; Christenson 2008;

Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.

3450 m.

ANT, MAG. No evaluada.

Centroamérica a Perú.

*Ospina 50* (JAUM).

***Fernandezia lanceolata***

**(L.O.Williams) Garay &**

**Dunst.**

*Centropetalum lanceolatum*

L.O.Williams

Williams 1938; Kolanowska &

Szlachetko 2013.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3500 m.

ANT, CAU, CUN. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Venezuela.

*Fonnegra 3774* (HUA, MO).

***Fernandezia micrangis***

**(Schltr.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum micrangis* Schltr.

Ortiz 1995; Christenson 2008;

Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2970-3000 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Zarucchi 5320* (HUA, MO).

***Fernandezia micrantha***

**(Schltr.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum micranthum*

Schltr.

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Fernandezia myrtilus*  
(Rchb.f.) Garay & Dunst.**

*Centropetalum myrtilus* Pfitzer  
Kränzlin 1923; Kolanowska &  
Szlachetko 2013.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700-3000 m.  
ANT, CAU, NAR, SAN. No  
evaluada.  
Colombia.

*Jameson 442* (HT: W).

***Fernandezia nubivaga*  
(L.O.Williams) M.W.Chase**

*Pachyphyllum nubivagum*  
L.O.Williams

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3300-3400 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Killip 18161* (HT: AMES).

***Fernandezia ortiziana*  
Kolan. & Szlach.**

Kolanowska & Szlachetko 2013.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3150 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Estudiantes MEDEL 459* (HT:  
MEDEL).

***Fernandezia pastii* (Rchb.f.)  
M.W.Chase**

*Pachyphyllum pastii* Rchb.f.  
Christenson 2008; Chase &  
Whitten 2011; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100-4000 m.  
NAR. No evaluada.  
Costa Rica a Perú.  
*Jameson 439* (HT: W; IT: K).

***Fernandezia peperomioides*  
(Kraenzl.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum peperomioides*  
Kraenzl.

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3300 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann s.n.* (HT: W?).

***Fernandezia sanguinea*  
(Lindl.) Garay & Dunst.**

*Centropetalum sanguineum*  
(Lindl.) Kraenzl., *Nasonia*  
*sanguinea* Lindl.

Kränzlin 1923; Kolanowska &  
Szlachetko 2013.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800-3300 m.  
ANT, CUN, NAR, SAN, TOL.  
No evaluada.  
Colombia a Perú y Venezuela.  
*Fonnegra 4575* (HUA, MO).

***Fernandezia squarrosa*  
(Lindl.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum squarrosum* Lindl.

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3690 m.  
ANT, CAL, QUI. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Killip 9786* (AMES).

***Fernandezia stuebelii*  
(Schltr.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum stuebelii* Schltr.  
Christenson 2008; Chase &  
Whitten 2011.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 4000 m.  
TOL. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Stübel 213* (HT: B, destruido;  
dibujo AMES).

***Fernandezia theodorii*  
M.W.Chase**

*Pachyphyllum hartwegii* Rchb.f.

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800-3000 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Hartweg 1710* (HT: W).  
NOTA: en Colombia solo se  
conoce del tipo / known in  
Colombia only from the type.

***Fernandezia tortuosa*  
(Foldats) M.W.Chase**

*Pachyphyllum tortuosum* Foldats

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3150 m.  
NSA. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Luer 10235* (MO).

***Fernandezia vaginata*  
(Schltr.) M.W.Chase**

*Pachyphyllum vaginatum* Schltr.

Ortiz 1995; Christenson 2008;  
Chase & Whitten 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Hopf s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Fronдаря Luer***

1 especie

***Fronitaria caulescens* (Lindl.)**

**Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3040 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Londoño 122* (MEDEL).

***Galeandra* Lindl.**

10 especies, 1 especie endémica

***Galeandra baueri* Lindl.**

*Galeandra funkiana* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
América tropical.

***Galeandra beyrichii* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Caribe,  
Orinoquia, V Magdalena. 350-  
1300 m.  
CES, CUN, MET, RIS. No  
evaluada.  
Costa Rica a Argentina.  
*Fernández 5652* (COL).

***Galeandra devoniana* Lindl.**

*Galeandra devoniana* var.  
*delphina* L.Linden & Rodigas  
Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia. 50-200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Guyana,  
Brasil.

***Galeandra dives* Rchb.f. &  
Warsz.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.

Nativa. Amazonia. 50-200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
N Suramérica.

***Galeandra leptoceras* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Caribe. 20-80 m.  
BOL, CÓR. No evaluada.  
*Callejas 4327* (HUA).

***Galeandra macropectra***

**G.A.Romero & Warford**

Carnevali 2003.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia. 50-200 m.  
AMA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Christman 9175* (SEL).

***Galeandra magnicolumna***

**G.A.Romero & Warford**

Carnevali 2003.  
Hierba.  
Nativa. Orinoquia. 100-200 m.  
MET. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Escobar 886* (AMES).

***Galeandra minax* Rchb.f.**

*Galeandra lacustris* Barb.Rodr.  
Escobar, R. 1990-1998.  
Hierba.  
Nativa. Orinoquia. 50-200 m.  
MET. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Escobar 1990-1998: No. 207.*

***Galeandra stangeana* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 50-200 m.  
VAU. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Schultes 13366* (AMES).

***Galeandra stylomisantha*  
(Vell.) Hoehne**

Carnevali 2003.  
Hierba.  
Nativa. 1200-1400 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Panamá a Bolivia.  
NOTA: esperada / expected

***Galeottia* A.Rich. & Galeotti**

6 especies, 4 especies endémicas

***Galeottia antioquiiana***

**(Kraenzl.) Dressler &  
E.A.Christenson**

*Batemannia antioquiiana*  
Kraenzl., *Mendoncella*  
*antioquiiana* (Kraenzl.) Garay  
Garay 1973a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000 m.  
ANT. No evaluada.

Colombia.  
*Kalbreyer 1813* (HT: B,  
destruido).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Galeottia colombiana***

**(Garay) Dressler &  
Christenson**

*Mendoncella colombiana* Garay  
Garay 1973a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2000 m.  
CAU, CUN. No evaluada.

Colombia.  
*Langlassé 96b* (HT: G; IT: HPUJ).

***Galeottia fimbriata* (Linden  
& Rchb.f.) Schltr.**

*Batemannia fimbriata* Linden &  
Rchb.f., *Mendoncella fimbriata*  
(Linden & Rchb.f.) Garay  
Garay 1973a.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes, Pacífico. 300-1560 m.

CHO, NSA, RIS, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Schlim* 42 (T: K).

***Galeottia grandiflora* A.Rich.**

*Batemannia grandiflora* (A.Rich.) Rchb.f., *Mendoncella grandiflora* (A.Rich.) A.D.Hawkes

Garay 1973a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Colombia.

***Galeottia marginata* (Garay)**

**Dressler & Christenson**

*Mendoncella marginata* (Garay)

Garay

Garay 1973a.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

*Mark s.n.* (HT: AMES).

NOTA: conocida solo del tipo.

Prob. un híbrido natural entre *Galeottia* y *Zygosepalum* / known only from the type; prob. a natural hybrid between *Galeottia* and *Zygosepalum*.

***Galeottia negrensis* Schltr.**

*Mendoncella negrensis* (Schltr.)

A.D.Hawkes

Garay 1973a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 150 m.

VAU. No evaluada.

Colombia y Brasil.

*Allen* 3257 (AMES, MO).

***Gomesa* R.Br.**

3 especies

***Gomesa bicolor* (Lindl.)**

**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Oncidium bicolor* Lindl.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Orinoquia. 400-1200 m.

MET. No evaluada.

N Suramérica.

*Jiménez* (Foto).

***Gomesa pardoglossa***

**(Rchb.f.) M.W.Chase &**

**N.H.Williams**

*Oncidium pardoglossum* Rchb.f.

Kränzlin 1922; Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?

NOTA: conocida solo del tipo.

Véase Kraenzli, *Oncidium* 134 / known only from the type; see Kraenzli, *Oncidium* 134.

***Gomesa pubes* (Lindl.)**

**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Oncidium pubes* Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500 m.

CAU. No evaluada.

Colombia, Brasil a Argentina.

***Gomphichis* Lindl.**

18 especies, 5 especies endémicas

***Gomphichis adnata* (Ridl.)**

**Schltr.**

*Gomphichis costaricensis* (Schltr.)

Ames *et al.*, *Stenoptera adnata* Ridl.

Steyermark *et al.* 2003.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2200-3600 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, NAR.

No evaluada.

Costa Rica a Guyana a Perú.

*Galeano* 304 (COL).

***Gomphichis alba* F.Lehm. & Kraenzl.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 1700-3000 m.

CAU, VAL. No evaluada.

Colombia, Perú, Venezuela.

*Lehmann* 6034 (T: K?).

NOTA: conocida en Colombia

solo del tipo / known in

Colombia only from the type.

***Gomphichis altissima* Renz**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 2070-2800 m.

CAU, CUN, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Silverstone-Sopkin* 3948 (CUVC).

***Gomphichis bogotensis* Renz**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 2500-3800 m.

BOY, CAU, CES, CUN, GUJ. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Dueñas* 3129 (COL).

***Gomphichis caucana* Schltr.**

*Gomphichis foliosa* Ames

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 2600-3800 m.

ANT, BOY, CAL, CAU, CHO, CUN, HUI, NAR, PUT, RIS, TOL. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Madero* 100 (HT: AMES).

***Gomphichis cladotricha* Renz**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 2800 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

Renz 4167 (T: ?).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Gomphichis cundinamarcae***

**Renz**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
2500-3700 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, HUI,  
MAG, NAR, NSA, RIS, TOL. No  
evaluada.

Colombia y Venezuela.

Echeverri 1190 (COL).

***Gomphichis goodyeroides***

**Lindl.**

*Stenoptera goodyeroides* (Lindl.)  
Rchb.f.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 1050-3800 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, MAG,  
NAR, NSA, QUI. No evaluada.

Colombia a Perú.

Etter 907 (COL).

***Gomphichis gracilis* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 1700 m.

HUI. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

Barbosa 15600 (FMB).

NOTA: conocida en Colombia  
de una sola colección / known  
in Colombia from a single  
collection.

***Gomphichis hetaeroides***

**Schltr.**

*Gomphichis cranichoides* Schltr.,

*Gomphichis sodiroi* Schltr.,

*Stenoptera cranichoides* (Schltr.)

L.O.Williams

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 1850-2700 m.

ANT, CAU, CHO, CUN, HUI.

No evaluada.

Panamá a Ecuador.

Rivera 3176 (COL).

***Gomphichis huilaensis***

**(Garay) H.Dueñas & Fern.**

**Alonso**

*Stenoptera huilaensis* Garay

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 2600 m.

HUI. No evaluada.

Von Sneidern 2028 (HT: AMES).

***Gomphichis lancipetala***

**Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 3500 m.

CAU. No evaluada.

Madero s.n. (T: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Gomphichis longiscapa***

**(Kraenzl.) Schltr.**

*Cranichis longiscapa* Kraenzl.

Schneider 1955; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 2000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Perú.

NOTA: el único registro de  
Colombia (Schneider 1955)  
requiere verificación / the

only record from Colombia  
(Schneider 1955) needs  
verification.

***Gomphichis scaposa* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 2200-3100 m.

ANT, CUN, VAL. No evaluada.

Madero s.n. (T: AMES).

***Gomphichis traceyae* Rolfe**

*Gomphichis brachystachys*

Schltr., *Gomphichis montana*

L.O.Williams, *Stenoptera*

*brachystachys* (Schltr.)

L.O.Williams

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 2600-3900 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, MET,

NAR, NSA, SAN, VAL. No

evaluada.

Venezuela a Ecuador.

Franco 399 (COL).

***Gomphichis viscosa* (Rchb.f.)**

**Schltr.**

*Stenoptera viscosa* Rchb.f.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 2100-3000 m.

BOY, CAU, CUN, HUI, RIS,

TOL. No evaluada.

Guyana a Perú.

Bernal 1599 (COL).

***Gomphichis* sp. 1**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 3250 m.

CUN. No evaluada.

Acosta 94 (COL).

NOTA: aún no identificada, pero  
diferente de las demás conocidas

en Colombia / not yet identified but distinct from others known in Colombia.

***Gomphichis* sp. 2**

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3100 m.

CUN. No evaluada.

*Barclay* 4190 (COL).

NOTA: aún no identificada, pero diferente de las demás conocidas en Colombia / not yet identified but distinct from others known in Colombia.

***Gongora* Ruiz & Pav.**

24 especies, 11 especies endémicas

***Gongora aceras* Dressler**

*Gongora colombiana* Jenny

Gerlach 1999b.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Caribe, Pacífico. 10-1000 m.

CHO, MAG. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cogollo* 4207 (JAUM).

***Gongora arcuata* G.Gerlach & Toulem.**

Jenny 2003b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800 m.

BOY, MET. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Franke s.n.* (HT: JAUM).

***Gongora atropurpurea* Hook.**

*Gongora pseudoatropurpurea*

Jenny

Gerlach 1999b.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes,

Pacífico. 0-600 m.

ANT, CAL, CAQ, CHO, VAL. No evaluada.

Colombia a Perú y Brasil; Trinidad.

*Schmidt* 35 (COL).

***Gongora catilligera* R.Rice**

Jenny 2003b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000 m.

HUI, TOL. No evaluada.

Colombia.

*Escobar* RE8059 (M).

***Gongora charontis* Rchb.f.**

*Gongora dylaniana* R.Rice

Gerlach 1999b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, Pacífico.

ANT, CHO. No evaluada.

Colombia.

*Lehmann* 745 (K).

***Gongora chocoensis* Jenny**

Gerlach 2000a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, Pacífico. 20-900 m.

CHO. No evaluada.

Colombia.

*Forero* 7476 (COL).

***Gongora escobariana***

**Whitten**

*Gongora garayana* R.Rice

Gerlach 1999b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000-1200 m.

ANT, CÓR. No evaluada.

Colombia.

*Escobar* 3981 (HT: FLAS; IT:

JAUM, AMES).

***Gongora fulva* Lindl.**

*Gongora herrenhusana* Jenny

Gerlach 2000b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 900 m.

CHO, VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Waldvogel* 06/1533 (M).

***Gongora gibba* Dressler**

Gerlach 2000a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 250 m.

CHO. No evaluada.

Costa Rica a Colombia.

*Zuluaga* 1325 (COL).

NOTA: especímenes colombianos no se ajustan bien a *G. gibba*; no se puede resolver el problema solo con material seco / Colombian specimens do not match well *G. gibba* but dry material alone is not enough to solve the problem.

***Gongora gratulabunda* Rchb.f.**

*Gongora flaveola* Rchb.f.,

*Gongora hennisiana* Schltr.,

*Gongora similis* Rchb.f.

Gerlach 1999b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800-1800 m.

ANT, CAL, CHO, PUT, VAL. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz* 659 (HPUJ).

***Gongora grossa* Rchb.f.**

*Gongora nigropunctata* Schltr.

Gerlach 2000a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico.

NAR. No evaluada.

Colombia a Perú.

NOTA: registro dudoso; no se examinó material de herbario; solo existen reportes personales / dubious record; no herbarium material examined; there are only personal reports.

***Gongora hirtzii* Dodson & N.H. Williams**

Gerlach 2000a; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 950-1060 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.  
*Cogollo* 3293 (JAUM).  
NOTA: no se examinó el único espécimen (JAUM). Puede tratarse de *G. irmgardiae*, también con cuernos gruesos en la base del hipoquilo / the only specimen (JAUM) was not examined; it may be *G. irmgardiae*, which also has thick horns at the base of the hypochile.

***Gongora irmgardiae* Jenny**  
Gerlach 2000a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 10 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Misas* 316a (COL).

***Gongora latisepala* Rolfe**  
Gerlach 2000a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico.  
CAU, CHO. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Misas* 303 (COL).

***Gongora longipes* Schltr.**  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar* 98/3208 (M).

***Gongora minax* Rchb.f.**  
Jenny 1994.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 100 m.  
AMA. No evaluada.  
Colombia y Brasil.  
NOTA: no se examinó material de herbario. Solo existen reportes personales, aunque muy confiables / no herbarium material examined; there are only personal reports, but very reliable.

***Gongora passiflorolens***  
**R.Rice**  
Rice 2002.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 800-1000 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Rice s.n.* (HT: NSW).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Gongora pleiochroma* Rchb.f.**  
Jenny 1991.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia.  
CAQ, MET, PUT. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela.  
*Cuatrecasas* 11108 (COL).  
NOTA: este nombre agrupa actualmente a todas las *Gongoras* parecidas que no se pueden determinar. Anteriormente, estas especies eran reunidas bajo *G. quinquenervis*, actualmente reconocida como una especie andina del Perú / this name currently groups all similar *Gongoras* that cannot be determined. These species were formerly called *G. quinquenervis*, recognized today as an Andean species of Peru.

***Gongora portentosa* Linden & Rchb.f.**  
*Gongora ecornuta* Jenny, *Gongora portentosa* var. *rosea* Cogn., *Gongora rosea* (Cogn.) R.Rice Jenny 1994.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1000 m.  
BOY, CAQ, CUN, MET. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Taggesell* O-21504 (M).

***Gongora powellii* Schltr.**  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 600 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Escobar* 98/3262 (M).

***Gongora rufescens* Jenny**  
Gerlach 2000b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1800 m.  
NAR, PUT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Waldvogel s.n.* (HT: G).

***Gongora scaphephorus* Rchb.f. & Warsz.**  
*Gongora beyrodtiana* Schltr., *Gongora charlesworthii* Rolfe, *Gongora incarum* Kraenzl., *Gongora truncata* var. *warszewiczii* Regel Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Guayana y Macarena, Pacífico. 1100 m.  
ANT, CUN, MET. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Franke s.n.* (M).

***Gongora sphaerica* Jenny**  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar* RE8159 (M).  
NOTA: no se sabe con certeza de qué parte de Colombia proviene esta rara especie / not certainly known whence in Colombia this rare species comes.

***Gongora tracyana* Rolfe**  
*Gongora dressleri* Jenny Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico.  
ANT, CAL, CHO, RIS. No evaluada.  
Colombia y Panamá.

*Escobar 98/3251 (M).*

NOTA: Rolfe citó el tipo como proveniente de Perú, pero la especie nunca se ha confirmado en esta zona. Muy prob. el tipo es de Colombia, porque material de Panamá es dudoso / Rolfe cited the type as coming from Peru but the species has never been confirmed there; the type is prob. from Colombia, as Panamanian material is dubious.

### **Govenia Lindl.**

5 especies

#### ***Govenia fasciata* Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 2000-2700 m.

BOY, CUN, MAG, SAN. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Uribe 1973 (COL).*

#### ***Govenia latifolia* (Kunth)**

**Garay & G.A.Romero**

*Dendrobium latifolium* Kunth,  
*Govenia stictoglossa* Schltr.

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes. 1600-2000 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Humboldt 2137 (AMES).*

#### ***Govenia superba* (Lex.)**

**Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1600-2670 m.

CUN, HUI, SAN. No evaluada.

Centroamérica.

*Cortés 490 (COL).*

NOTA: registro dudoso; la identidad de los especímenes colombianos requiere verificación / dubious record;

identity of Colombian specimens needs verification.

#### ***Govenia tingens* Poepp. & Endl.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 2000-2600 m.

MAG, QUI. No evaluada.

Venezuela a Argentina.

*Triana 1376 (COL).*

NOTA: registro dudoso; la identidad de los especímenes colombianos requiere verificación / dubious record; identity of Colombian specimens needs verification.

#### ***Govenia utriculata* (Sw.)**

**Lindl.**

*Govenia platyglossa* Schltr.

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 750-1100 m.

MAG, VAL. No evaluada.

Colombia a Argentina.

*Smith 2450 (GH, T de G. platyglossa).*

#### ***Guarianthe* Dressler & W.E.Higgins**

1 especie

#### ***Guarianthe patinii* (Cogn.)**

**Dressler & W.E.Higgins**

*Cattleya patinii* Cogn.

Calderón-Sáenz 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico, V Magdalena. 0-500 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Costa Rica a Venezuela.

*Patin s.n.* (T: P?).

### ***Habenaria* Willd.**

34 especies, 3 especies endémicas

#### ***Habenaria alata* Hook.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes. 1900 m.

CUN. No evaluada.

Centroamérica a Bolivia.

*Schneider 364 (COL).*

#### ***Habenaria amalfitana***

**F.Lehm. & Kraenzl.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes. 1800 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Guyana y a Ecuador; Antillas Menores.

*Lehmann 4210 (HT: W).*

#### ***Habenaria armata* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.

1200-2800 m.

CES, CUN. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil.

*Haught 4339 (COL).*

#### ***Habenaria avicula* Schltr.**

Batista *et al.* 2008.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Panamá a Brasil.

NOTA: esperada / expected.

#### ***Habenaria bractescens* Lindl.**

*Habenaria pringlei* B.L.Rob.

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes, Pacífico. 70-700 m.

CHO. No evaluada.

México a Argentina.

*Idrobo 1799 (COL).*

***Habenaria caldensis***

**Kraenzl.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 2400 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Brasil y Bolivia.

*Ospina 121* (JAUM).

NOTA: la identidad del espécimen colombiano requiere verificación / identity of Colombian specimen needs verification.

***Habenaria conopsea* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil.

*Wagner s.n.* (HT: W).

***Habenaria corydophora***

**Rchb.f.**

Fernández-Pérez 1964b; Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1300-2200 m.

CUN. No evaluada.

Colombia, Perú, Bolivia.

***Habenaria distans* Griseb.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes?, Islas caribeñas? 190-1800 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Ecuador; Caribe.

NOTA: esperada / expected.

***Habenaria entomantha***

**(Lex.) Lindl.**

*Habenaria moritzii* Ridl.

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes. 1200-3050 m.

ANT, BOY, NAR. No evaluada.

México a Guyana.

*Grubb 597* (COL).

***Habenaria filifera* S. Watson**

Hierba.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México, Colombia.

*Smith 2358* (COL, MO).

NOTA: la identidad del espécimen colombiano requiere verificación / identity of Colombian specimen needs verification.

***Habenaria floribunda* Lindl.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 2000 m.

ANT. No evaluada.

México a Brasil; Caribe.

*Ospina 61-19* (JAUM).

***Habenaria gollmeri* Schltr.**

*Habenaria maderoi* Schltr.

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1300-2950 m.

CAU. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

*Madero s.n.* (T: B, destruido).

***Habenaria guentheriana***

**Kraenzl.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes? 300-2300 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

NOTA: esperada / expected.

***Habenaria heptadactyla***

**Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Orinoquia. 90-700 m.

MET, VIC. No evaluada.

América tropical.

*Haught 2798* (COL).

***Habenaria herminioides***

**Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

**[*Habenaria hexaptera***

**Lindl.]**

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se encontraron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Habenaria lehmanniana***

**Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes. 1200-2200 m.

CAU. No evaluada.

Colombia a Guayana Francesa.

*Lehmann 3689* (G).

***Habenaria leprieurii* Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 825 m.

SAN. No evaluada.

Venezuela a Paraguay.

*Langenheim s.n.* (COL).

***Habenaria linguicruris***

**Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Habenaria longicauda* Hook.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes, Pacífico. 200-800 m.

NAR. No evaluada.  
Colombia?, Venezuela, Guayanas y Brasil.  
*García-Barriga 13183* (COL).  
NOTA: la identidad del espécimen colombiano requiere verificación / identity of Colombian specimens needs verification.

***Habenaria ludibundiciata*  
J.A.N.Bat. & Bianch.**

Batista *et al.* 2008.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 200 m.  
VAU. No evaluada.  
Colombia y Brasil.  
*Garay 103* (AMES).

***Habenaria macroceratitis*  
Willd.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Islas caribeñas?, Caribe? SAP? No evaluada.  
México a Colombia, Venezuela y Guayanas; Antillas.

***Habenaria monorrhiza* (Sw.)  
Rchb.f.**

*Habenaria latifolia* Kunth  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes, Pacífico, SN Santa Marta. 320-2410 m.  
ANT, BOY, CAL, CAU, CHO, CUN, HUI, MAG, NAR, NSA, PUT, RIS, SAN, TOL, VAL.  
Preocupación Menor (propuesta aquí).  
América tropical.  
*Zarucchi 7027* (HUA, MO).

***Habenaria obtusa* Lindl.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1050-2500 m.

ANT, CUN, SAN. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
*Ortiz 796* (HPUJ).

***Habenaria parviflora* Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1100-2800 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia a Argentina.  
*García-Barriga 17404* (COL).

***Habenaria petalodes* Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Orinoquia. 250 m.  
CAS. No evaluada.  
Panamá a Brasil.  
*Haught 3701* (COL).

***Habenaria pygmaea***

**C.Schweinf. & R.E.Schult.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 100-220 m.  
AMA, VAU. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Schultes 12446* (HT: AMES).

***Habenaria quinqueseta*  
(Michx.) Eaton**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Caribe? 100 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Caribe, N Suramérica.  
NOTA: esperada / expected.

***Habenaria repens* Nutt.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2550-2900 m.  
CUN. No evaluada.  
América tropical.  
*Schneider 244/1* (COL).  
*Habenaria repens* var. *maxillaris* (Lindl.) Garay, *Habenaria repens* var. *repens*

***Habenaria sartor* Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia?, Andes? 220-1600 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Paraguay.  
NOTA: esperada; recolectada en Sucumbíos (Ecuador) / expected; collected in Sucumbíos (Ecuador).

***Habenaria schultzei* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schultze 31* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Habenaria schwackei* Barb.**

**Rodr.**

Batista *et al.* 2008; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia. 100-200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Guayanas, Brasil y Paraguay.

***Habenaria secundiflora***

**Barb.Rodr.**

Batista *et al.* 2008; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Guayanas y Brasil.  
NOTA: esperada / expected.

***Habenaria trifida* Kunth**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta. 300-1900 m.  
ANT, CAU, CES, CUN, MAG.  
No evaluada.

México a Argentina.  
*Gogollo 2484* (JAUM).

***Hapalorchis* Schltr.**

3 especies, 3 especies endémicas

**[*Hapalorchis cheirostyloides* Schltr.]**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

NOTA: señalada como esperada, sin indicios de su presencia en áreas cercanas a Colombia. Es endémica de Venezuela / cited as expected, but there is no evidence of its presence in areas near Colombia; endemic to Venezuela.

**[*Hapalorchis lineata* (Lindl.) Schltr.]**

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: citada de Colombia pero no reportada por Dueñas & Fernández (2007) / cited from Colombia but not recorded by Dueñas & Fernández (2007).

***Hapalorchis longirostris* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.  
Endémica.

CAU. No evaluada.

*Lehmann 2207* (HT: AMES).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Hapalorchis piesikii* Szlach. & Rutk.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Endémica. Guayana y Macarena.  
1500 m.

MET. No evaluada.

Serranía de La Macarena.

*Philipson 2067* (HT: BM).

***Hapalorchis trilobata* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica.

CAU. No evaluada.

*Madero s.n.* (HT: AMES).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Helonoma* Garay**

1 especie

***Helonoma peruviana* (Szlach.) Salazar et al.**

*Wallnoeferia peruviana* Szlach.

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 840 m.

PUT. No evaluada.

Colombia y Perú.

*Ramírez 15520* (CAUP, COL).

NOTA: conocida en Colombia de una sola colección / known in Colombia from a single collection.

***Heterotaxis* Lindl.**

11 especies, 1 especie endémica

***Heterotaxis angelae***

**(Christenson) M.A. Blanco**

*Maxillaria angelae* Christenson  
Misas-Urreta 2005; Christenson 2009.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 100 m.

CHO. No evaluada.

*Misas 169* (HT: HPUJ).

NOTA: conocida solo del tipo.

Ilustrada por Misas Urreta (2005: 395) como *Maxillaria* sp. / known only from the type; illustrated by Misas Urreta (2005: 395) as *Maxillaria* sp.

***Heterotaxis discolor* (Lindl.)**

**Ojeda & Carnevali**

*Dicrypta discolor* Lindl.,  
*Maxillaria discolor* (Lindl.)

Rchb.f.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Amazonia,  
Guayana y Macarena, Orinoquia,  
Pacífico. 0-1000 m.

AMA, ANT, CHO, GUI, GUV,  
VAU. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Cogollo 2932* (COL, JAUM).

***Heterotaxis equitans* (Schltr.)**

**Ojeda & Carnevali**

*Camaridium equitans* Schltr.,  
*Camaridium vandiforme* Schltr.,  
*Marsupiarium vandiformis* (Schltr.)

Hoehne, *Maxillaria equitans*

(Schltr.) Garay, *Maxillaria vandiformis* (Schltr.) C.Schweinf.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 40-  
1050 m.

CAU, QUI, VAL. No evaluada.

Colombia, Brasil, Perú.

*Silverstone 2575* (CUVC, MO).

***Heterotaxis fritzii* Ojeda & Carnevali**

Ojeda *et al.* 2005; Blanco *et al.* 2007b.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1400-1500 m.

VAL. No evaluada.

*Whitten 2672* (FLAS).

NOTA: descrita a partir de una planta de vivero cultivada en Cali, de origen incierto. Origen erróneamente citado como Ecuador / described from a nursery plant grown in Cali, of uncertain origin; origin erroneously cited as Ecuador.

***Heterotaxis maleolens***

**(Schltr.) Ojeda & Carnevali**

*Maxillaria maleolens* Schltr.

Ojeda *et al.* 2005.

Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Pacífico.  
0-100 m.  
CHO. No evaluada.  
O Colombia a Costa Rica.  
*Warner 37* (MO).

***Heterotaxis schultesii* Ojeda & G.A.Romero**

Ojeda *et al.* 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 150 m.  
VAU. No evaluada.  
Amazonia.  
*Schultes 17488* (AMES, CICY).

***Heterotaxis sessilis* (Sw.)**

**F.Barros**  
*Maxillaria crassifolia* (Lindl.) Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Caribe, Orinoquia, Pacífico, SN Santa Marta. 100-1000 m.  
CAL, CES, CHO, HUI, MET, VAU. No evaluada.  
SE Estados Unidos a Perú y Brasil.  
*Romero-Castañeda 3481* (COL).

***Heterotaxis superflua* (Rchb.f.) F.Barros**

*Dicrypta longifolia* Barb.Rodr., *Maxillaria longifolia* Lindl., *Maxillaria superflua* Rchb.f., *Maxillaria tarumaensis* Hoehne  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia. 115-500 m.  
AMA, VAU. No evaluada.  
Colombia a Guayanas y Brasil.  
*Garay 108* (COL, AMES).

***Heterotaxis valenzuelana* (A.Rich.) Ojeda & Carnevali**

*Dicrypta iridifolia* Rchb.f., *Dicrypta irisphyta* Barb.

Rodr., *Marsupiarina iridifolia* (Rchb.f.) Hoehne, *Marsupiarina valenzuelana* (A.Rich.) Garay, *Maxillaria iridifolia* (Rchb.f.) Rchb.f., *Maxillaria valenzuelana* (A.Rich.) Nash, *Pleurothallis valenzuelana* A.Rich.

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 1050-1100 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Guatemala a N Suramérica; Cuba.  
*Callejas 8900* (JAUM).

***Heterotaxis villosa* (Barb.**

**Rodr.) F.Barros**  
*Dicrypta villosa* Barb.Rodr., *Maxillaria villosa* (Barb.Rodr.) Cogn.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia, Andes. 240-1000 m.  
AMA, CAL. No evaluada.  
Colombia a Guayanas y Brasil.  
*Schneider 472* (COL).

***Heterotaxis violaceopunctata* (Rchb.f.) F.Barros**

*Maxillaria violaceopunctata* Rchb.f.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia, Pacífico. 0-120 m.  
CHO, VAU. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Garay 122* (COL).

***Hirtzia Dodson***

1 especie, 1 especie endémica

***Hirtzia barrerana* Kolan. & Szlach.**

Kolanowska & Szlachetko 2014.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100-2300 m.  
PUT. No evaluada.  
SO Colombia.

*Kolanowska 407* (HT: COL; IT: UGDA).

***Hofmeisterella Rchb.f.***

2 especies, 1 especie endémica

***Hofmeisterella eumicroscopica* (Rchb.f.) Rchb.f.**

*Hofmeistera eumicroscopica* Rchb.f.  
Ortiz 1975.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2800 m.  
CUN. No evaluada.  
N Andes.  
*Uribe 6900* (COL).

***Hofmeisterella falcata* (Linden & Rchb.f.) Nauray & A.Galán**

*Telipogon falcatus* Linden & Rchb.f.  
Nauray Huari & Galán de Mera 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
NSA, SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Linden 1192* (LT: W).

***Homalopetalum Rolfe***

1 especie

***Homalopetalum pumilio* (Rchb.f.) Schltr.**

*Homalopetalum costaricense* Schltr., *Homalopetalum lehmannianum* (Kraenzl.) Schltr., *Pinelia lehmanniana* Kraenzl.  
Withner 1998.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

**Houlletia Brongn.**

7 especies, 2 especies endémicas

***Houlletia conspersa* P.Ortiz**

Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400-1700 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1060* (HT: HPUJ).

***Houlletia lowiana* Rchb.f.**

*Houlletia kalbreyeriana* Kraenzl.,  
*Jennyella lowiana* (Rchb.f.)  
Lückel & Fessel  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-2000 m.  
ANT, NSA, SAN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Arango s.n.* (M).

***Houlletia odoratissima***

**Lindl. & Paxton**

*Houlletia antioquiensis* (André)  
*Ames & Nash, Houlletia*  
*boliviana* Schltr., *Houlletia*  
*buchtienii* Kraenzl., *Houlletia*  
*juruenensis* Hoehne, *Houlletia*  
*odoratissima* var. *antioquiensis*  
André, *Houlletia odoratissima*  
var. *macrosepala* Regel, *Houlletia*  
*odoratissima* var. *xanthina*  
Rchb.f., *Houlletia picta* Linden &  
Rchb.f.  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1300-2000 m.  
ANT, NSA, RIS, SAN, VAL. No  
evaluada.

Panamá a Bolivia y Brasil.

*Pérez 0233* (VALLE).

*Houlletia odoratissima* var.  
*antioquiensis* André, *Houlletia*  
*odoratissima* var. *macrosepala*  
Regel

***Houlletia sanderi* Rolfe**

*Houlletia clarae* Schltr., *Jennyella*  
*sanderi* (Rolfe) Lückel & Fessel

Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 900-1500 m.  
NAR, PUT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Neudecker s.n.* (M).

***Houlletia tigrina* Lindl.**

*Houlletia landsbergii* Linden &  
Rchb.f.  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1600 m.  
CAU, CHO, MET, NAR, NSA,  
RIS. No evaluada.  
Guatemala a Ecuador y  
Venezuela.  
*Escobar 1190* (AMES).

***Houlletia unguiculata* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Lehmann 5046* (T: K).

***Houlletia wallisii* Linden &  
Rchb.f.**

*Houlletia chrysantha* Linden &  
André, *Houlletia wallisii* var.  
*odontoptera* Rchb.f.  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1780 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Vieira 98/3229* (M).  
*Houlletia wallisii* var. *hennisiana*  
Schltr.

***Huntleya* Lindl.**

9 especies, 3 especies endémicas

***Huntleya albidofulva* Lem.**

Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Escobar 506* (AMES).

NOTA: especie dudosa; no se  
sabe si se trata de una especie  
o una variedad de *H. wallisii* o  
*H. burtii* / dubious species; it is  
not known if it is a species, or a  
variety of *H. wallisii* or *H. burtii*.

***Huntleya apiculata* (Rchb.f.)  
Rolfe**

*Batemannia apiculata* Rchb.f.,  
*Huntleya citrina* Rolfe, *Huntleya*  
*waldvogelii* Jenny  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 300-500 m.  
CHO, NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Jenny 42* (G).

***Huntleya brevis* Schltr.**

*Huntleya caroli* P.Ortiz  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 250 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1140* (HPUJ).

***Huntleya burtii* (Endres &  
Rchb.f.) Pfitzer**

*Batemannia burtii* Endres &  
Rchb.f., *Zygopetalum burtii*  
(Endrés & Rchb.f.) Hemsl.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-1200  
m.  
CHO. No evaluada.  
Centroamérica a Bolivia.  
*Misas 140* (COL).

***Huntleya fasciata* Fowlie**

Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-1200  
m.  
CHO. No evaluada.

Panamá a Ecuador.

*Escobar 370* (AMES).

NOTA: prob. sinónimo de *H. lucida*, conocida de Venezuela y las Guayanas / prob. a synonym of *H. lucida*, known from Venezuela and the Guianas.

***Huntleya grandiflora* Lam.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1200 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: descrita de material cultivado en Europa, proveniente de Colombia, sin datos de localidad / described from material cultivated in Europe, originating in Colombia, without locality data.

***Huntleya gustavi* (Rchb.f.)**

**Rolfe**

*Batemannia gustavi* Rchb.f.

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 650-1800 m.

CAL, CHO, RIS. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

NOTA: a veces erróneamente citada como *gustavii* / sometimes erroneously cited as *gustavii*.

***Huntleya meleagris* Lindl.**

*Batemannia burtii* var. *wallisii*

Rchb.f., *Batemannia wallisii*

Rchb.f., *Zygopetalum burtii* var.

*wallisii* (Rchb.f.) J.H.Veitch

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500-1000 m.

ANT, RIS, VAL. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia y Brasil.

*Uribe 319* (COL).

***Huntleya wallisii* (Rchb.f.)**

**Rolfe**

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 300-800 m.

CAL, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Gentry 59561* (MO).

***Hylaeorchis Carnevali* & G.A.Romero**

1 especie

***Hylaeorchis petiolaris***

(Schltr.) Carnevali &

**G.A.Romero**

*Bifrenaria minuta* Garay,

*Bifrenaria petiolaris* (Schltr.)

G.A.Romero & Carnevali,

*Bifrenaria rudolfii* Carnevali

& G.A.Romero, *Maxillaria*

*perparva* Garay & Dunst.,

*Maxillaria petiolaris* Schltr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena.

200 m.

VAU. No evaluada.

Venezuela a Perú, N Brasil.

*Cárdenas 6124* (COAH).

***Inti* M.A.Blanco**

4 especies, 1 especie endémica

***Inti bicallosa* (Rchb.f.)**

**M.A.Blanco**

*Maxillaria bicallosa*

(Rchb.f.) Garay, *Ornithidium*

*dolichophyllum* Schltr.,

*Zygopetalum bicallosum* Rchb.f.

Misas-Urreta 2005; Idárraga *et*

*al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes,

Pacífico. 300-1375 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Cogollo 2690* (JAUM, MO).

NOTA: la identidad de los

especímenes colombianos

requiere verificación / identity of

the Colombian specimens needs verification.

***Inti chartacifolia* (Ames & C.Schweinf.) M.A.Blanco**

*Maxillaria chartacifolia* Ames

& C.Schweinf., *Trigonidium*

*equitans* Garay

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 50-1400 m.

CAU, CHO. No evaluada.

Costa Rica a Perú.

*Juncosa 1899* (MO).

***Inti foetida* (D.E.Benn. & Christenson) M.A.Blanco**

*Maxillaria foetida* D.E.Benn. & Christenson

Christenson 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Perú.

*Escobar 3982* (JAUM).

NOTA: ilustrada por Escobar (1991: 319) como *Maxillaria* sp. / illustrated by Escobar (1991: 319) as *Maxillaria* sp.

***Inti janiceae* (Christenson)**

**M.A.Blanco**

*Maxillaria janiceae* Christenson

Misas-Urreta 2005; Christenson

2009.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 700 m.

CHO. No evaluada.

Serranía del Baudó.

*Misas 153* (HT: HPUJ).

NOTA: conocida solo del tipo.

Ilustrada por Misas Urreta (2005: 391) como *Maxillaria* sp. / known only from the type; illustrated by Misas Urreta (2005: 391) as *Maxillaria* sp. (page 391).

### ***Ionopsis* Kunth**

3 especies, 1 especie endémica

#### ***Ionopsis satyrioides* (Sw.)**

##### **Rchb.f.**

*Epidendrum satyrioides* Sw.,

*Ionopsis teres* Lindl.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Orinoquia, Pacífico. 10-400 m.

AMA, CAQ, CHO, MET, NAR, SAN, VAL. No evaluada.

N Suramérica, Antillas.

Ortiz 965 (HPUJ).

#### ***Ionopsis utricularioides* (Sw.)**

##### **Lindl.**

*Epidendrum utricularioides* Sw.,

*Ionopsis pulchella* Kunth

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Orinoquia, Pacífico. 120-500 m.

ANT, ARA, CAQ, CHO, MET, NAR, VAL, VAU. No evaluada.

SE Estados Unidos a Brasil y Paraguay.

Romero-Castañeda 6289 (COL, HUA, AMES).

*Ionopsis utricularioides* var. *virginalis* Menezes

#### ***Ionopsis zebrina* Kraenzl.**

Kränzlin 1920b.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700-2000 m.

NSA. No evaluada.

Cordillera Oriental.

Kalbreyer 777 (T: ?).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

### ***Isochilus* R.Br.**

1 especie

### ***Isochilus linearis* (Jacq.)**

##### **R.Br.**

*Cymbidium lineare* (Jacq.) Sw.,

*Epidendrum lineare* Jacq.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Paraguay y Argentina.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se encontraron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

### ***Ixyophora* Dressler**

1 especie, 1 especie endémica

#### ***Ixyophora carinata* (P.Ortiz)**

##### **Dressler**

*Chondrorhyncha carinata* P.Ortiz

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia. 100-200 m.

AMA. No evaluada.

Colombia.

Escobar 5433 (HT: HPUJ).

### ***Jacquiiniella* Schltr.**

4 especies, 1 especie endémica

#### ***Jacquiiniella colombiana***

##### **Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: espécimen tipo no localizado / no type specimen located.

#### ***Jacquiiniella globosa* (Jacq.)**

##### **Schltr.**

*Cymbidium globosum* (Jacq.)

Sw., *Epidendrum globosum* Jacq.,

*Isochilus globosus* (Jacq.) Lindl

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena, Pacífico. 4-1150 m.

CAU, CUN, HUI, MET, PUT. No evaluada.

México a Perú y Brasil.

Cárdenas 7219 (COAH).

#### ***Jacquiiniella pedunculata***

##### **Dressler**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Panamá.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se encontraron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

#### ***Jacquiiniella teretifolia* (Sw.)**

##### **Britton & P.Wilson**

*Cymbidium teretifolium* (Sw.)

Sw., *Epidendrum teretifolium* Sw.,

*Isochilus teretifolius* (Sw.) Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Colombia, Venezuela y Brasil.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se encontraron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

### ***Kefersteinia* Rchb.f.**

16 especies, 6 especies endémicas

#### ***Kefersteinia chocoensis***

##### **G.Gerlach & Senghas**

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 100 m.

CHO. No evaluada.

Colombia.

Seeger *s.n.* (HT: HEID).

***Kefersteinia elegans* Garay**

*Kefersteinia niesseniae* P.Ortiz  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 500-1000 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 507* (HT: AMES).

***Kefersteinia gemma* Rchb.f.**

*Zygopetalum gemma* Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 600 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador; Venezuela?  
*Wallis s.n.* (HT: W-R).

***Kefersteinia graminea*****(Lindl.) Rchb.f.**

*Zygopetalum gramineum* Lindl.  
Gerlach 1994b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1300-2200 m.  
ANT, CUN, VAL. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Schneider 387* (COL).

***Kefersteinia klabochii*****(Rchb.f.) Schltr.**

*Zygopetalum klabochii* Rchb.f.  
Harding 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
BOY. No evaluada.  
Colombia.  
*Klaboch s.n.* (HT: W-R).

***Kefersteinia laminata* Rchb.f.**

*Zygopetalum laminatum* Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
NOTA: especie dudosa, prob.  
sinónimo de *K. gemma* / dubious  
species; prob. a synonym of *K.*  
*gemma*.

***Kefersteinia mystacina*****Rchb.f.**

*Kefersteinia lacerata* Fowlie,  
*Zygopetalum mystacinum* Rchb.f.  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Pacífico. 100-1700 m.  
ANT, CHO, PUT, VAL. No  
evaluada.  
Panamá a Bolivia y Brasil.  
*Escobar 74* (AMES).

***Kefersteinia ocellata* Garay**

Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 500-  
1400 m.  
ANT, NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 8602* (K).

***Kefersteinia oscarii* P.Ortiz**

Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1039* (HT: HPUJ).  
NOTA: conocida solo del tipo.  
Prob. sinónimo de *K. gemma*  
/ known only from the type;  
prob.a synonym of *K. gemma*.

***Kefersteinia parvilabris*****Schltr.**

*Chondrorhyncha parvilabris*  
(Schltr.) L.O.Williams  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 150-500  
m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
*Escobar 544* (AMES, HPUJ).

***Kefersteinia perlonga*****Dressler**

*Senghasia perlonga* (Dressler)  
Szlach.

Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 500  
m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 4003* (HT: MO).

***Kefersteinia pusilla*****(C.Schweinf.) C.Schweinf.**

*Chondrorhyncha pusilla*  
C.Schweinf., *Kefersteinia*  
*benvenathar* D.E.Benn. &  
Christenson, *Kefersteinia*  
*bertoldii* Jenny, *Kefersteinia*  
*jarae* D.E.Benn. & Christenson,  
*Kefersteinia licethyae* D.E.Benn.  
& Christenson, *Kefersteinia*  
*vollesii* Jenny  
Gerlach 1994b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 950-2000 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Neudecker s.n.* (G).

***Kefersteinia sanguinolenta*****Rchb.f.**

*Zygopetalum sanguinolentum*  
(Rchb.f.) Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 100-  
2000 m.  
CHO. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Ortiz 209* (HPUJ).

***Kefersteinia taurina* Rchb.f.**

*Kefersteinia lehmannii* P.Ortiz,  
*Kefersteinia taggesellii* Neudecker,  
*Zygopetalum taurinum* Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-2250 m.  
ANT, CAL, CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Álvarez 179* (JAUM).

***Kefersteinia tolimensis***

**Schltr.**

Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400-2100 m.  
ANT, CUN, HUI, TOL, VAL. No  
evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*García-Barriga 17248* (COL,  
HPUJ).

***Kefersteinia trullata* Dressler**

*Senghasia trullata* (Dressler)  
Szlach.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 1000-  
1500 m.  
ANT, CHO, NAR, VAL. No  
evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Escobar 4023* (HT: JAUM).

***Kegeliella* Mansf.**

1 especie

***Kegeliella kupperi* Mansf.**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
*Seeger s.n.* (M).

***Koellensteinia* Rchb.f.**

4 especies, 1 especie endémica

***Koellensteinia elegantula***

**Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. 300 m.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Koellensteinia graminea***

**(Lindl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Orinoquia,  
Pacífico. 0-760 m.  
AMA, CAU, GUI, GUV, NAR,  
VAL, VAU. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Schultes 12523* (AMES, COL).

***Koellensteinia hyacinthoides***

**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Guayana y Macarena.  
300 m.  
GUI. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Madriñán 935* (COL).

***Koellensteinia kellneriana***

**Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1350 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Guayana Francesa y  
Brasil.  
*Ospina 602* (AMES, JAUM).

***Kraenzlinella* Kuntze**

3 especies, 1 especie endémica

***Kraenzlinella anfracta* (Luer)**

**Luer**

*Pleurothallis anfracta* Luer  
Luer 1994; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
TOL. No evaluada.  
*Lehmann 2388* (HT: G).

***Kraenzlinella erinacea***

**(Rchb.f.) Solano**

*Kraenzlinella erinacea* (Rchb.f.)  
Luer, *Pleurothallis erinacea*  
Rchb.f.  
Luer 1994; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200 m.  
NSA. No evaluada.  
SE México a Bolivia; Guyana y  
Bolivia.  
*Wagner s.n.* (HT: W).

***Kraenzlinella tunguraguae***

**(F.Lehm. & Kraenzl.) Kuntze**

*Kraenzlinella otopetalum* (Schltr.)  
Luer, *Otopetalum tungurahuae*  
F.Lehm. & Kraenzl., *Pleurothallis*  
*otopetalum* Schltr.  
Luer 1994; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2000 m.  
CAU. No evaluada.  
SO Colombia a Perú.  
*Von Sneidern 1103* (AMES, S).  
NOTA: a veces citada como  
*tunguraguae* / sometimes  
referred to as *tunguraguae*.

***Kreodanthus* Garay**

2 especies, 1 especie endémica

***Kreodanthus elatus***

**(L.O.Williams) Garay**

*Erythrodes elata* L.O.Williams  
Dueñas 2002; Ormerod 2005;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 3180 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Rangel 2490* (COL).  
NOTA: conocida en Colombia  
de una sola colección / known  
in Colombia from a single  
collection.

***Kreodanthus myrmex*****Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas &amp; Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 2700 m.

PUT. No evaluada.

*Luer 3145* (HT: SEL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lacaena* Lindl.**

1 especie

***Lacaena bicolor* Lindl.***Acineta longiscapa* (A.Rich. & Galeotti) Rchb.f., *Peristeria longiscapa* A.Rich. & Galeotti Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a México.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se encontraron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Laelia* Lindl.**

9 especies, 2 especies endémicas

***Laelia colombiana*****J.M.H.Shaw***Schomburgkia wallisii* Rchb.f. Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y cultivada.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Wallis s.n.* (T:?).

NOTA: la localidad original se desconoce / the original locality is unknown.

***Laelia elata* (Schltr.)****J.M.H.Shaw***Schomburgkia elata* Schltr.

Withner 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

CUN. No evaluada.

Colombia.

NOTA: identidad incierta; prob. sinónimo de *L. undulata* / identity uncertain; prob. a synonym of *L. undulata*.**[*Laelia gloriosa* (Rchb.f.)****L.O.Williams]**Govaerts *et al.* 2014a.NOTA: registro basado en especímenes de *L. marginata* / record based on specimens of *L. marginata*.***Laelia heidii* (Carnevali) Van den Berg & M.W.Chase***Schomburgkia heidii* CarnevaliGovaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Venezuela.

NOTA: esperada; no hay especímenes de Colombia; no obstante, al ser un híbrido de dos especies que crecen en el país, puede encontrarse en Orinoquia / expected; no specimens from Colombia, but being a hybrid of two species occurring in the country, it might be found, prob. in the Orinoco.

***Laelia lueddemanii* (Prill.)****L.O.Williams***Schomburgkia lueddemanii* Prill.

Withner 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 0-200 m.

CHO. No evaluada.

Colombia y Panamá.

*Bernal 90* (COL).***Laelia marginata* (Lindl.)****L.O.Williams***Schomburgkia crispera* Lindl.,*Schomburgkia marginata* Lindl.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 200-280 m.

AMA. No evaluada.

Colombia a Guayana Francesa y Brasil.

*Van Dulmen avd203* (COAH).***Laelia rosea* (Lindl.)****C.Schweinf.***Schomburgkia rosea* Lindl.

Withner 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Orinoquia. 150 m.

VIC. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana.

*Vincelli 1270* (COL).***Laelia schultzei* (Schltr.)****J.M.H.Shaw***Schomburgkia schultzei* Schltr.

Withner 1993.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-3000 m.

CUN, NAR, PUT. No evaluada.

*Krauss 73* (COL).***Laelia splendida* (Schltr.)****L.O.Williams***Schomburgkia splendida* Schltr.

Withner 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700-1800 m.

CUN. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Uribe 6979* (COL).***Laelia undulata* (Lindl.)****L.O.Williams***Schomburgkia undulata* Lindl.

Withner 1993.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Orinoquia. 150-1700 m.

CUN, MET, NSA. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Trinidad;  
Costa Rica.  
*Fernández-Pérez 7170 (COL).*

***Lankesterella* Ames**

1 especie

***Lankesterella orthantha*  
(Kraenzl.) Garay**

*Cladobium costaricense* Schltr.,  
*Lankesterella costaricensis* Ames,  
*Spiranthes orthantha* Kraenzl.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
RIS. No evaluada.  
Costa Rica a Perú y Venezuela;  
Caribe.  
NOTA: señalada por de Wilde  
(1994) / recorded by de Wilde  
(1994).

***Leochilus* Knowles & Westc.**

2 especies

***Leochilus labiatus* (Sw.)  
Kuntze**

*Epidendrum labiatum* Sw.  
Chase 1986.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-2000 m.  
VAL. No evaluada.  
Centroamérica, N Suramérica,  
Antillas.  
*Allen 2295 (F, SEL).*

***Leochilus scriptus* (Scheidw.)  
Rchb.f.**

*Cryptosanus scriptus* Scheidw.  
Chase 1986.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Magdalena.  
0-600 m.  
ANT, CÓR. No evaluada.  
Centroamérica, N Suramérica,  
Antillas.  
*Ortiz 1004 (HPUJ).*

***Lepanthes* Sw.**

302 especies, 214 especies  
endémicas

***Lepanthes abortiva* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Luer 14221 (HT: MO).*  
NOTA: sin datos de localidad;  
recolectada en cultivo en  
Colomborquídeas / without  
locality data, collected at  
Colomborquídeas.

***Lepanthes acarina* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003;  
Viveros & Higgins 2007; Luer &  
Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2800 m.  
ANT, CAU, NAR, NSA. No  
evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Luer 8810 (SEL).*

***Lepanthes aciculifolia* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
NAR, VAL. No evaluada.  
*Luer 15536 (HT: MO).*

NOTA: sin datos de localidad;  
pos. recolectada en los Andes,  
por encima de 2000 m / without  
locality data; poss. collected in  
the Andes above 2000 m.

***Lepanthes acrogenia* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Hirtz 4624 (HT: SEL).*

***Lepanthes acutissima* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16831 (HT: MO).*

***Lepanthes aduncata* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 4060 (HT: JAUM; IT:  
MO).*

***Lepanthes affinis* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2250 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10331 (HT: MO).*

***Lepanthes aggeris* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5244 (HT: JAUM; IT:  
MO).*  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Lepanthes agglutinata* Luer**

*Lepanthes porphyrea* Luer & R.Escobar  
Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2700 m.  
ANT, CAQ, CHO, NAR, SAN, VAL. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 10071* (MO, SEL, T de *Lepanthes porphyrea*).

***Lepanthes aguirrei* Luer**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba.  
Nativa.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Aguirre 1296-536* (HT: MO).  
NOTA: sin datos de localidad; recolectada en cultivo de J & L Orchids (Connecticut) / without locality data; collected from plants cultivated at J & L Orchids (Connecticut).

***Lepanthes alcornis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1730-2320 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2646* (HT: SEL).

***Lepanthes alkaia* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2150 m.  
SAN. No evaluada.  
*Luer 10142* (HT: MO).

***Lepanthes alvarezii* P.Ortiz**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
CUN. No evaluada.  
*Álvarez 1247* (HT: HPUJ).

***Lepanthes amplior* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2850 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10267* (HT: MO).

***Lepanthes amplisepala* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3150 m.  
CAU. No evaluada.  
Páramo de Guanacas.  
*Luer 32* (HT: SEL).

***Lepanthes anatina* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1630 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16847* (HT: MO).

***Lepanthes anchorifera* Luer**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
RIS. No evaluada.  
*Niessen 87* (HT: MO).

***Lepanthes andrenoglossa* Rchb.f.**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3300 m.  
PUT, QUI. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Luer 16746* (MO).

***Lepanthes anemica* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1300 m.  
ANT. No evaluada.  
*Thorerle 142* (HT: MO).

***Lepanthes anserina* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2060-2120 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 8920* (HT: SEL; IT: COL, JAUM).

***Lepanthes antennata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2100 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
*Escobar 5064* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes antennifera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-3150 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10288* (HT: MO; IT: JAUM).

**[*Lepanthes antioquiensis* Schltr.]**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

NOTA: especie dudosa, pobremente entendida y excluida por Luer & Thorerle (2012) / dubious species; poorly understood; excluded by Luer & Thorerle (2012).

***Lepanthes aperta* Luer**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Luer 19668* (HT: MO).  
NOTA: sin datos de colección; descrita de un ejemplar cultivado en Ecuagenera (Ecuador) / without data collection; described from a specimen grown at Ecuagenera (Ecuador).

***Lepanthes aquila-borussiae* Rchb.f.**

*Lepanthes rabei* Foldats  
Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2550-3130 m.  
NSA, SAN. No evaluada.  
NE Colombia a NO y N Venezuela.  
*Luer 10202* (MO).

***Lepanthes arbuscula* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2900 m.  
CAU. No evaluada.  
*Escobar 5009* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes argentata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
NSA. No evaluada.  
*Escobar 274* (HT: MO).

***Lepanthes aries* Luer**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Thorerle 138* (MO).

***Lepanthes aristata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050-2250 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10332* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes athena* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-1820 m.  
NAR. No evaluada.  
S Colombia a N Ecuador.  
*Dodson 18050* (MO).

***Lepanthes atomifera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1830-2050 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 8965* (HT: SEL).

***Lepanthes auditor* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 3417* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes aures-asini* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2570 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2540* (HT: SEL).

***Lepanthes auriculata* Luer**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2250 m.  
VAL. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador, Bolivia.  
*Silverstone-Sopkin 3786* (CUVC).

***Lepanthes ballatrix* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900-3300 m.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia a Ecuador.  
*Luer 14102* (MO).

***Lepanthes barclaya* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3375 m.  
CAU. No evaluada.  
*Barclay 6070* (HT: MO; IT: US).

***Lepanthes beatriziae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
NSA. No evaluada.  
*Escobar 5382* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes biglomeris* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
SAN. No evaluada.  
*Escobar 5122* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes biloba* Lindl.**

*Lepanthes metaxy* Luer & Hirtz,  
*Lepanthes otostalix* Rchb.f.,  
*Lepanthes peniculus* Luer  
Luer 1996; Farfán *et al.* 2003;  
Viveros & Higgins 2007; Luer &  
Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800-3280 m.  
CAU, NAR, PUT, RIS. No  
evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 14224* (MO).

***Lepanthes binaria* Luer & Hirtz**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3200 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a N Ecuador.  
*Luer 4651* (SEL).

***Lepanthes bipinnatula* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 17653* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Lepanthes bitriangularis* Luer & R.Escobar**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Escobar 5220* (HT: MO).

***Lepanthes boyacensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Luer & Thorerle  
2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2500 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
*Luer 8777* (HT: SEL).

***Lepanthes brevipedicellata* Luer**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10041* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Lepanthes cacique-tone* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 17641* (HT: JAUM; IT:  
MO).

***Lepanthes cactoura* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Luer & Thorerle  
2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 3399* (HT: MO).

***Lepanthes caesariata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CHO. No evaluada.  
*Luer 16733* (HT: MO).

***Lepanthes calimae* P.Ortiz**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
VAL. No evaluada.  
*Ortiz 1090* (HT: HPUJ).

***Lepanthes callisto* Luer & Hirtz**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000-3400 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a N Ecuador.  
*Luer 17949* (MO).

***Lepanthes calodictyon* Hook.**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003;  
Viveros & Higgins 2007; Luer &  
Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1400 m.  
ANT, CAU, VAL. No evaluada.  
Colombia a O Ecuador.  
*Escobar 5166* (MO).

***Lepanthes canaliculata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros &  
Higgins 2007; Govaerts *et al.*  
2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
CHO. No evaluada.  
*Luer 16739* (HT: MO).

***Lepanthes carrilloi* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
CUN. No evaluada.  
*Thorerle 104* (HT: MO).

***Lepanthes carunculigera* Rchb.f.**

Luer 1996; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2100 m.  
RIS. No evaluada.  
Colombia (Ecuador?).  
*Luer 13017* (MO).

***Lepanthes caudata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia a Ecuador.  
*Luer 8345* (HT: SEL).

***Lepanthes caudatisepala* C.Schweinf.**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3000 m.  
CUN, NAR. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Luer 140101* (MO).

***Lepanthes cerambyx* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.  
ANT. No evaluada.

*Escobar 3382* (HT: JAUM; IT: COL, MO).

***Lepanthes cercion* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900-2000 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia a Venezuela.  
*Luer 11355* (HT: MO).

***Lepanthes chelonion* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
NSA, SAN. No evaluada.  
*Luer 10215* (HT: MO).

***Lepanthes chimaera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3200-3240 m.  
NAR, PUT. No evaluada.  
SO Colombia a N Ecuador.  
*Luer 4633* (HT: SEL).

***Lepanthes chocoensis* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1920 m.  
CHO. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin 1636* (HT: MO; IT: CUVU).

***Lepanthes cincinnata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
RIS, VAL. No evaluada.  
*Escobar 5081* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes cingens* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1950-2400 m.  
ANT, CHO, RIS. No evaluada.  
*Luer 16783* (HT: MO).

***Lepanthes clausa* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2850 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10274* (HT: JAUM).

***Lepanthes climax* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2850 m.  
SAN. No evaluada.  
*Luer 7870* (HT: SEL).

***Lepanthes cocculifera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2850 m.  
SAN. No evaluada.  
*Luer 7866* (HT: SEL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes cogolloi* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1090-1215 m. ANT. No evaluada.

*Cogollo* 3593 (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes conchylia* Luer**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Luer* 19658 (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo, sin datos de colección. Se cree que fue recolectada en S Colombia.

Descrita de un ejemplar cultivado en Ecuagenera (Ecuador) / known only from the type, without collection data; prob. collected in S Colombia; described from a specimen grown at Ecuagenera (Ecuador).

***Lepanthes confusa* Ames & C.Schweinf.**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 100-200 m.

ANT. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

*Escobar* 5084 (MO).

***Lepanthes contingens* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-3200 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia a Ecuador.

*Luer* 4637 (SEL).

***Lepanthes cordata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2050 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer* 11371 (HT: MO).

***Lepanthes cornualis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3450 m.

PUT, VAL. No evaluada.

Colombia a C Ecuador.

*Luer* 12525 (HT: MO).

***Lepanthes corrugata* Luer & Dalström**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia a N Ecuador.

*Ortiz* 1414 (HPUJ).

***Lepanthes costata* Rchb.f.**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: especie dudosa. No tratada por Luer y Thorerle (2012). No hay datos del tipo; solo se conoce del protólogo / dubious species; not treated by Luer & Thorerle (2012); type without data; only known from the protologue.

***Lepanthes cuatrecasasii* Luer**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3250 m.

VAL. No evaluada.

*Cuatrecasas* 20601 (HT: AMES).

***Lepanthes cucullata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2850 m.

NSA. No evaluada.

*Luer* 10282 (HT: MO).

***Lepanthes culex* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1850-2700 m.

ANT, VAL. No evaluada.

*Escobar* 3189 (HT: MO; IT: JAUM, SEL).

***Lepanthes cuneiformis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2150 m.

NSA. No evaluada.

*Luer* 7943 (HT: SEL).

***Lepanthes cunicularis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

RIS. No evaluada.

*Escobar* s.n. (HT: JAUM).

***Lepanthes cyclochila* Viveros & W.E.Higgins**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5241* (HT: JAUM; IT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes cymbium* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3200 m.  
NAR, QUI. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Escobar 4016* (HT: MO).

***Lepanthes darioi* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 17638* (HT: MO; IT: JAUM).

***Lepanthes dasyura* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 900 m.  
ANT. No evaluada.  
*Cogollo 365* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes debedoutii* P.Ortiz**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
CUN. No evaluada.  
*Ortiz 1248* (HT: HPUJ).

***Lepanthes debilis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 3465* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes declivis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1860 m.  
VAL. No evaluada.  
*Luer 17713* (HT: MO).

***Lepanthes deficiens* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2580 m.  
ANT, BOY. No evaluada.  
*Escobar 3270* (HT: MO).

***Lepanthes deformis* Luer & Hirtz**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 18421* (MO).

***Lepanthes deliciosensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3150-3380 m.

CAU. No evaluada.  
*Luer 8473* (HT: SEL).

***Lepanthes deuthera* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
CHO. No evaluada.  
*Escobar 5347* (HT: COL).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes dewildei* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050-2100 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
*Luer 16848* (HT: MO).

***Lepanthes diabolica* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
SAN. No evaluada.  
*Luer 10158* (HT: MO).

***Lepanthes dicyrtopetala* Luer & Hirtz**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Hirtz 8670* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo, sin datos de colección; descrita de un ejemplar cultivado en Ecuagenera (Ecuador) / known only from the type; type without data collection; described a specimen cultivated in Ecuagenera (Ecuador).

***Lepanthes didactyla* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1650 m.

NSA. No evaluada.

*Luer 7715* (HT: SEL).

***Lepanthes discolor* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400-2500 m.

ANT, NAR. No evaluada.

Colombia, Panamá.

*Escobar 3359* (HT: JAUM; IT: COL, MO).

***Lepanthes dodsonii* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1460-2100 m.

ANT, RIS. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer 16641* (MO).

***Lepanthes dolabrata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 17642* (HT: MO).

**[*Lepanthes dolichopus* Schltr.]**

NOTA: pobremente entendida.

Exluída por Luer & Thorerle

(2012) / poorly understood,

and excluded by Luer & Thorerle

(2012).

***Lepanthes dryades* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2150 m.

SAN. No evaluada.

*Luer 10137* (HT: MO; IT: SEL).

***Lepanthes dumba* Luer**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica.

NAR. No evaluada.

*Aguirre s.n.* (HT: MO).

***Lepanthes dunstervilleorum* Foldats**

Luer 1996; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600-2930 m.

ANT, BOY, CUN, NSA, QUI, SAN, TOL. No evaluada.

NO Venezuela a Ecuador.

*Escobar 5189* (MO).

***Lepanthes echidion* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1880-2100 m.

NSA. No evaluada.

*Luer 7953* (HT: SEL).

***Lepanthes ectopa* Luer**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200 m.

VAL. No evaluada.

*Silverstone-Sopkin 7967* (HT: CUV; IT: MO).

***Lepanthes edwardsii* Ames**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 0 m.

CHO. No evaluada.

Guatemala a N Colombia.

*Misas 74* (HPUJ).

NOTA: similar a *L. johnsonii*, exclusiva de Centroamérica.

Conocida para Colombia solo de dos colecciones / similar to *L. johnsonii* of Central America; known in Colombia only from two collections.

***Lepanthes effusa* Schltr.**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2780-3120 m.

ANT, CUN. No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

*Callejas 7795* (HUA).

***Lepanthes elata* Rchb.f.**

*Lepanthes oteroi* Luer

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600-2100 m.

ANT, NAR, NSA, VAL. No evaluada.

Costa Rica a O Colombia.

*Luer 10318* (MO).

***Lepanthes elephantina* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3200 m.

NAR, PUT. No evaluada.

SO Colombia a N Ecuador.

*Luer 3470* (HT: SEL).

***Lepanthes elongata* Luer & Hirtz**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2950-3000 m.  
NAR, PUT. No evaluada.  
SO Colombia a NC Ecuador.  
*Luer 14225* (MO).

***Lepanthes equicalceolata*  
Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CHO. No evaluada.  
NO Colombia.  
*Escobar 4059* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes eros* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2150 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
*Luer 8869* (HT: SEL).

***Lepanthes erythrocles* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700 m.  
CUN. No evaluada.  
*Luer 12808* (HT: MO).

***Lepanthes escifera* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400-2150 m.  
ANT, RIS, SAN. No evaluada.  
*Luer 8986* (HT: SEL; IT: COL).

***Lepanthes escobariana* Garay**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 531* (HT: AMES).

***Lepanthes eucerca* Luer &  
Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3150 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10232* (HT: MO).

***Lepanthes exaltata* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2670 m.  
NSA. No evaluada.  
NO Colombia.  
*Luer 6640* (HT: SEL).

***Lepanthes felis* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1940-2450 m.  
ANT, CHO, VAL. No evaluada.  
*Escobar 2605* (HT: SEL).

***Lepanthes ferax* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600-3120 m.  
ANT, CHO, CUN. No evaluada.  
*Luer 10376* (HT: MO).

***Lepanthes fibulifera* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1730-2050 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2604* (HT: SEL).

***Lepanthes filamentosa* Luer  
& Hirtz**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400 m.  
VAL. No evaluada.  
O Colombia a NO Ecuador.  
*Thorerle 141* (MO).

***Lepanthes focalis* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400 m.  
RIS. No evaluada.  
Colombia a SE Ecuador.  
*Luer 16830* (MO).

***Lepanthes fonnegrae* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5181* (HT: MO).

***Lepanthes forceps* Luer &  
R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 800-1730 m.  
ANT, MET, NSA. No evaluada.  
NO Colombia.  
*Luer 6680* (HT: SEL).

***Lepanthes foreroi* P.Ortiz et al.**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1860 m.  
VAL. No evaluada.  
*Canizales 244* (HT: VALLE).

***Lepanthes foveata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050-2100 m.  
NSA. No evaluada.  
NO Colombia.  
*Luer 10308* (HT: MO; IT: SEL).

***Lepanthes furcata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
*Escobar 5055* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes gargantua* Rchb.f.**

Luer 1996; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600-2970 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador y Perú.  
*Luer 14135* (MO).

***Lepanthes gelata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16837* (HT: MO).

***Lepanthes gemina* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2150 m.  
NSA. No evaluada.  
NO Colombia.  
*Luer 10340* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes georgii* Luer & R.Escobar**

*Lepanthes bifurcata* Luer & R.Escobar  
Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 16639* (HT: MO; IT: JAUM).

***Lepanthes giraldoi* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
VAL. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Giraldo 169* (HT: TULV; IT: MO).

***Lepanthes golondrina* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 1171* (HT: JAUM; IT: SEL).

***Lepanthes gildrig* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10356* (HT: MO).

***Lepanthes guanacasensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3150 m.  
CAU. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Luer 8419* (HT: SEL).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes gustavoi* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2680 m.  
CHO. No evaluada.  
*Luer 17677* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes guttula-sanguinis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 3460* (HT: JAUM; IT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes habenifera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900-2700 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
*Luer 8966* (HT: SEL).

***Lepanthes helgae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2250 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 14261* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes helicocephala* Rchb.f.**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Guayanas y Brasil a Ecuador y Perú.  
NOTA: esperada por su distribución global / expected; expected because of its global distribution.

***Lepanthes hemirhoda* Garay**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2200 m.  
NSA. No evaluada.  
NO Colombia.  
*Cuatrecasas 12478* (HT: US; IT: COL).

***Lepanthes heptapus* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2601* (HT: SEL).

***Lepanthes heteroloba* Luer**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 3421* (HT: MO).

***Lepanthes hexapus* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2100 m.  
CHO, NAR, RIS. No evaluada.  
O Colombia a C Ecuador.  
*Luer 4619* (HT: SEL).

***Lepanthes hirpex* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1920-2500 m.  
ANT, CHO, VAL. No evaluada.  
O Colombia a NO Ecuador.  
*Escobar 3264* (HT: JAUM; IT: COL, MO).

***Lepanthes hirsutula* Luer & Hirtz**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia a NO Ecuador.  
*Thorerle 130* (MO).

NOTA: sin datos de elevación, ni localidad específica / without specific locality or elevation data.

***Lepanthes hirtzii* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 3118* (SEL).

***Lepanthes hortensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2727* (HT: MO).

***Lepanthes hubeinii* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Luer 11422* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo, sin datos de localidad / known only from the type; no locality data.

***Lepanthes hurgo* Luer & Béhar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Behar 154* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo, sin datos de localidad / known only from the type; no locality data.

***Lepanthes hyphosa* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1820 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar* 3272 (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes ictalurus* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000 m.

PUT. No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

*Luer* 12530 (MO).

***Lepanthes illex* Luer**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

NAR. No evaluada.

S Colombia a N Ecuador.

NOTA: esperada; se encuentra en Carchi (Ecuador), muy cerca de la frontera / expected; found in Carchi (Ecuador), near the border.

***Lepanthes imbricans* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica.

CAU? No evaluada.

*Luer* 17855 (HT: MO).

NOTA: sin datos de localidad específica / no specific locality data.

***Lepanthes imposita* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2750 m.

NSA. No evaluada.

*Luer* 7671 (HT: SEL).

***Lepanthes impotens* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

RIS. No evaluada.

*Luer* 16842 (HT: MO).

***Lepanthes insolita* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar* 3354 (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes intonsa* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2800 m.

CAU. No evaluada.

SO Colombia a Ecuador; Bolivia.

*Escobar* 5205 (MO).

***Lepanthes ionoptera* Rchb.f.**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300-2570 m.

NSA, SAN. No evaluada.

NO Colombia, Bolivia y

Venezuela.

*Luer* 10290 (MO).

***Lepanthes isochila* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Behar* 36 (HT: MO).

NOTA: descrita de un espécimen de cultivo comprado a un vendedor ambulante en Medellín, sin datos de localidad / described from a cultivated specimen purchased from a street vendor in Medellín, without locality data.

***Lepanthes isosceles* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. SN Santa Marta. 2500 m.

MAG. No evaluada.

*Luer* 8740 (HT: SEL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes janitor* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1730-2700 m.

ANT, NAR, RIS. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Escobar* 3197 (HT: MO; IT: COL, JAUM, SEL).

***Lepanthes jardinensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2800 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 2696* (HT: JAUM; IT: MO, SEL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes juan-felipei* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

NAR. No evaluada.

*Thorerle 136* (HT: MO).

***Lepanthes jubata* Luer**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer 21050* (MO).

NOTA: sin datos de localidad específica; espécimen cultivado, obtenido de Orquídeas del Valle / no specific locality data; specimen obtained cultivated at Orquídeas del Valle.

***Lepanthes labiata* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico, V Cauca. 50 m.

VAL. No evaluada.

*Otero 1004* (HT: CUVC; IT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes lacera* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1380 m.

ANT. No evaluada.

*Cogollo 2639* (HT: MO).

***Lepanthes larvina* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-1820 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Luer 8984* (HT: SEL).

***Lepanthes lasiopetala* Garay & Dunst.**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500-2900 m.

NSA, SAN. No evaluada.

NE Colombia a NO Venezuela.

*Luer 10219* (MO).

**[*Lepanthes lehmannii* Schltr.]**

NOTA: pobremente entendida. Exluída por Luer & Thorerle (2012) / poorly understood; excluded by Luer & Thorerle (2012).

***Lepanthes ligiae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500-2600 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 10389* (HT: MO).

***Lepanthes lilliputae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3150 m.

NSA. No evaluada.

Colombia, Ecuador (Carchi).

*Luer 10230* (HT: MO).

***Lepanthes limbata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2050 m.

CHO, VAL. No evaluada.

*Luer 16807* (HT: MO).

***Lepanthes linealis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3280-3300 m.

QUI, TOL. No evaluada.

*Luer 14223* (HT: MO).

***Lepanthes lingulosa* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2620 m.

CUN. No evaluada.

*Ruiz 5481* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes lycocephala* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600-2700 m.

ANT, CHO, NAR, VAL. No evaluada.

O Colombia a Ecuador.

*Luer 4626* (HT: SEL).

***Lepanthes macdougallii* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3320-3500 m.

ANT. No evaluada.  
*Macdougal 4389* (HT: MO).

***Lepanthes macrantha* Garay**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2200 m.  
NSA. No evaluada.  
NO Colombia.  
*Cuatrecasas 12403* (HT: US; IT: COL).

***Lepanthes macrostylis* Luer & R.Escobar**

*Lepanthes guaduasensis* Luer & R.Escobar  
Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050-2400 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
*Luer 17672* (HT: MO).

***Lepanthes manabina* Dodson**

*Lepanthes mastodon* Luer  
Luer 1996; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2430 m.  
ANT, NAR, RIS. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 17695* (MO).

**[*Lepanthes marginata* Schltr.]**

NOTA: pobremente entendida. Excluida por Luer & Thorerle (2012) / poorly understood; excluded by Luer & Thorerle (2012).

***Lepanthes maria-victoriae* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Thorerle 139* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes marthae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
*Múnera 160* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes matisii* Luer et al.**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-3000 m.  
CUN. No evaluada.  
*Thorerle 106* (HT: HPUJ).

***Lepanthes medinae* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
PUT. No evaluada.  
*Thorerle 114* (HT: MO).

***Lepanthes medusa* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 14098* (HT: MO; IT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo. Sin datos de localidad específica / known only from the type; no specific locality data.

***Lepanthes mefueensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10296* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes meleagris* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100-2430 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
*Luer 167821* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes micellilabia* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5191* (HT: JAUM; IT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes micronyx* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 17648* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes microscopica* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2598* (HT: SEL).

***Lepanthes mirabilis* Ames**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 30-100 m.  
CAU. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Pittier 592* (HT: US).

***Lepanthes mirador* Luer & Hirtz**

Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2650 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Thoele 123* (MO).

***Lepanthes monilia* Luer & R.Escobar**

*Brachycladium monilium* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2600 m.  
ANT, BOY, SAN. No evaluada.  
*Luer 8036* (HT: SEL).

***Lepanthes monitor* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
ANT, QUI. No evaluada.  
O Colombia a Bolivia.  
*Luer 14335* (MO).

***Lepanthes monoptera* Lindl.**

*Lepanthes roseola* Rchb.f.  
Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600-3470 m.  
CAU, CUN, NSA, QUI. No evaluada.  
Colombia a Ecuador, Bolivia.  
*Luer 10301* (MO).

***Lepanthes mucronata* Lindl.**

*Lepanthes macroura* Schltr.,  
*Lepanthes mesochlora* Rchb.f.,  
*Lepanthes tricuspis* Schltr.  
Luer 1996; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2350-3300 m.  
ANT, BOY, CAU, CHO, CUN, NAR, PUT, QUI, SAN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Luer 16753* (MO).

***Lepanthes muscula* Luer & R.Escobar**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800-3240 m.  
CAU, PUT. No evaluada.  
S Colombia a N Ecuador.  
*Pasmíño 43* (MO).

***Lepanthes myoxophora* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1850 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2621* (HT: SEL).

**[*Lepanthes nanegalensis* Rchb.f.]**

Viveros & Higgins 2007.  
NOTA: endémica de Ecuador; no incluida para Colombia por Luer & Thoele (2012) / endemic to Ecuador; not cited for Colombia by Luer & Thoele (2012).

***Lepanthes nautilus* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2550 m.  
SAN. No evaluada.  
*Luer 10203* (HT: MO; IT: SEL).

***Lepanthes nematodes* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100-2200 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 13018* (HT: MO).

***Lepanthes nicolasii* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5452* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes niesseniae* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
VAL. No evaluada.  
*Niessen 88* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo, sin datos de localidad específica / known only from the type; no specific locality data.

***Lepanthes niphias* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2100-2200 m.

ANT, RIS. No evaluada.

*Luer 13019* (HT: MO; IT: JAUM).

***Lepanthes norae* Foldats**

*Lepanthes janus* Luer & Escobar

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600-2750 m.

NSA. No evaluada.

NE Colombia a NO Venezuela.

*Luer 10220* (MO).

**[*Lepanthes nubicola* Rchb.f.]**

NOTA: pobremente entendida.

Excluida por Luer & Thorerle (2012) / poorly understood; excluded by Luer & Thorerle (2012).

***Lepanthes nulla* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3300 m.

QUI. No evaluada.

*Luer 16748* (HT: MO).

***Lepanthes obovata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1650 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 3195* (HT: MO; IT: JAUM, SEL).

***Lepanthes octavioi* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1650-2100 m.

PUT. No evaluada.

SO Colombia.

*Luer 12548* (HT: MO; IT: JAUM).

***Lepanthes octopus* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

SAN. No evaluada.

NE Colombia.

*Luer 17531* (HT: JAUM; IT: MO).

NOTA: recolectada en Virolín (Santander); cultivada en Colomborquídeas / collected in Virolín (Santander); grown at Colomborquídeas.

***Lepanthes ollaris* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2050-2300 m.

ANT, VAL. No evaluada.

O Colombia a NO Ecuador.

*Luer 8954* (HT: SEL).

***Lepanthes opetidion* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia.

*Luer 12504* (HT: MO).

***Lepanthes ophelma* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 3380* (HT: JAUM; IT: COL, MED, MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes oreibates* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2960 m.

CUN. No evaluada.

*Luer 14227* (HT: MO).

NOTA: conocida en Colombia solo del tipo / known in Colombia only from the type.

***Lepanthes orion* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2150 m.

ANT, SAN. No evaluada.

E Colombia a EC Ecuador.

*Luer 10120* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes ortiziana* Pérez et al.**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1960 m.  
VAL. No evaluada.  
*Pérez 752* (HT: VALLE).

***Lepanthes oscillifera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1850-2700 m.  
ANT, CUN. No evaluada.  
*Escobar 2669* (HT: SEL).

***Lepanthes osiris* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3380 m.  
CAU. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Luer 8470* (HT: SEL).

***Lepanthes ostraconopetala* Luer & Hirtz**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3200 m.  
NAR. No evaluada.  
*Luer 4630* (HT: SEL).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes oxybaphon* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2570-2600 m.  
NSA. No evaluada.  
SE Colombia.  
*Luer 10228* (HT: JAUM; IT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes oxypetala* Luer & Hirtz**

Luer 1996; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2900-3000 m.  
NAR, PUT. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
*Luer 12528* (MO).

***Lepanthes pachoi* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5015* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes palaga* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1850-2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2651* (HT: SEL).

***Lepanthes panope* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia.  
*Luer 10317* (HT: MO).

***Lepanthes parmata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1300-2400 m.

ANT, RIS. No evaluada.  
*Cogollo 4044* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes pastoensis* Schltr.**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300-2750 m.  
CAU, HUI, NAR. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador (?).  
*Gentry 53974* (MO).

***Lepanthes penicillifera* Luer**

*Lepanthes scopulifera* Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
CAU. No evaluada.  
*Niessen 036A* (HT: MO).  
NOTA: sin datos de localidad específica; espécimen cultivado, obtenido de Orquídeas del Valle / no specific locality data; specimen obtained from Orquídeas del Valle.

***Lepanthes perdita* Luer & Hirtz**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50 m.  
VAL. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador.  
*Otero 1005* (CUVC, MO).

***Lepanthes petalolenta* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1240-1420 m.  
ANT. No evaluada.  
*Cogollo 3907* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes petalopteryx* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600 m.

CHO. No evaluada.

*Escobar 5061* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes phalloides* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2990 m.

BOY. No evaluada.

*Luer 16728* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes pictoris* Luer & Thorerle**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2800 m.

NSA. No evaluada.

*Thorerle 122A* (HT: MO).

NOTA: espécimen tipo tomado de cultivo / type specimen taken from cultivation.

***Lepanthes pilosiaures* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 2663* (HT: SEL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes pinnatula* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2680 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Luer 17676* (HT: MO).

***Lepanthes planadensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-1820 m.

NAR. No evaluada.

*Luer 12487* (HT: MO).

***Lepanthes plectilis* Luer & Hirtz**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer 16254* (MO).

NOTA: sin datos de localidad específica / no specific locality data.

***Lepanthes pleurorachis* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-1460 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer 13027* (MO).

***Lepanthes pleurothallopsis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2800 m.

QUI. No evaluada.

*Escobar 5007* (HT: MO).

***Lepanthes popayanensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1870 m.

CAU. No evaluada.

*Luer 16531* (HT: MO).

***Lepanthes porracea* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1270 m.

RIS. No evaluada.

*Luer 17721* (HT: JAUM; IT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes posadae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1300-2700 m.

CAU, CHO. No evaluada.

SO Colombia a Ecuador.

*Luer 8746* (HT: SEL).

***Lepanthes praemorsa* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

ANT, PUT. No evaluada.

*Luer 14207* (HT: MO).

***Lepanthes profusa* Luer & Hirtz**

Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3400 m.  
MET. No evaluada.  
*Díaz-Piedrahita 2785* (MO).

***Lepanthes prolifera* Foldats**

Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2900 m.  
ARA. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 7996* (SEL).

***Lepanthes pterygion* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700-2100 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2618* (HT: SEL).

***Lepanthes pyramidalis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050-2700 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
*Luer 8964* (HT: SEL).

***Lepanthes quadricornis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-1800 m.  
NAR, VAL. No evaluada.  
*Dodson 18060* (HT: MO).

***Lepanthes quandi* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2650 m.  
ANT, PUT. No evaluada.  
*Luer 10059* (HT: MO).

***Lepanthes ramosii* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-1950 m.  
CHO. No evaluada.  
*Ramos 1176* (HT: CUCV; IT: MO).

***Lepanthes reburra* Luer & Thoele**

Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 7801* (HT: SEL).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Lepanthes refracta* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
NAR, VAL. No evaluada.  
*Niessen 071A* (HT: MO).  
NOTA: sin datos de localidad  
específica / no specific locality  
data.

***Lepanthes renzii* Luer**

Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3400 m.  
CUN. No evaluada.  
*Renz 3527* (HT: BAS; IT: MO).

***Lepanthes repens* Luer**

Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3200 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 3748* (SEL).

***Lepanthes reticulata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1730-2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2650* (HT: SEL).

***Lepanthes rhombipetala* Schltr.**

Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2800 m.  
ANT, CAU, NAR. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador.  
*Luer 16710* (MO).

***Lepanthes rhynchion* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3300 m.  
ANT, CHO, NAR, PUT, QUI. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Luer 3158* (SEL).

***Lepanthes ribes* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoele 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
VAL. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador.  
*Escobar 8075* (JAUM).

***Lepanthes ricourtensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600 m.

NAR. No evaluada.

*Luer 4622* (HT: SEL).

***Lepanthes rodrigoii* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Escobar s.n.* (HT: JAUM).

***Lepanthes roezliana* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 9093* (HT: SEL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes rutrum* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1350 m.

VAL. No evaluada.

*Escobar 4005* (HT: MO; IT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes saccata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2550-2680 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Escobar 3405* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes saltatrix* Luer & Hirtz**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 400-1300 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia a NO Ecuador.

NOTA: esperada; crece en Esmeraldas (Ecuador), cerca de la frontera / expected; found in Esmeraldas (Ecuador), near the border.

***Lepanthes satyrica* Luer & Hirtz**

*Lepanthes auspicata* Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2050-2300 m.

NAR, VAL. No evaluada.

SO Colombia a Ecuador.

*Luer 16806* (MO).

***Lepanthes scalaris* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3200-3240 m.

NAR, PUT. No evaluada.

SO Colombia a N Ecuador.

*Luer 3738* (SEL).

**[*Lepanthes schnitteri* Schltr.]**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

NOTA: especie dudosa, pobremente entendida; excluida por Luer & Thorerle (2012) / dubious species; poorly understood; excluded by Luer & Thorerle (2012).

***Lepanthes scopulifera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 17664* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes sericinifera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 10032* (HT: MO; IT: SEL).

***Lepanthes setifera* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a O Ecuador.

*Escobar 3190* (JAUM, MO, SEL).

***Lepanthes silverstonei* Luer**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300 m.

VAL. No evaluada.

*Silverstone-Sopkin 2864* (HT: CUVIC; IT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes sinuosa* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2000 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16846* (HT: MO).

***Lepanthes skeleton* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1850-2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 3231* (HT: MO; IT: COL, JAUM, SEL).

***Lepanthes smaragdina* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5083* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes solicator* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1850-2250 m.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia (prob.NO Venezuela).  
*Luer 10328* (HT: MO; IT: JAUM).

***Lepanthes spelynx* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2250 m.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 10329* (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes stelidilabia* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2430 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 14229* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes stellaris* Luer & Hirtz**

Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. V Cauca. 600 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Pérez 240* (VALLE).

**[*Lepanthes stenoscleros* Schltr.]**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007.  
NOTA: pobremente entendida. Excluida por Luer & Thorerle (2012) / poorly understood; excluded by Luer & Thorerle (2012).

***Lepanthes steyermarkii* Foldats**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 10297* (MO).

***Lepanthes strumosa* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1820-2880 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Escobar 2625* (HT: SEL).  
NOTA: conocida en Colombia solo del tipo / known in Colombia only from the type.

***Lepanthes stupenda* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia a NO Ecuador.  
*Escobar 5023* (MO).

***Lepanthes subulata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1850 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2624* (HT: SEL).

***Lepanthes superposita* Schltr.**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800-3200 m.  
CAU, CUN, NAR. No evaluada.  
*Luer 12523* (MO).

***Lepanthes tachirensis* Foldats**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2580-3300 m.  
ANT, CHO, NAR, NSA, QUI. No evaluada.  
NO Venezuela a Ecuador.  
*Luer 17682* (MO).

***Lepanthes tamaensis* Foldats**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500-2850 m.

ANT, NSA. No evaluada.

Colombia, Venezuela.

Luer 14268 (MO).

***Lepanthes tanekes* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-1800 m.

NAR. No evaluada.

Hirtz 4625 (HT: SEL).

***Lepanthes telipogoniflora* Schuit. & A.de Wilde**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. V Cauca. 500 m.

RIS. No evaluada.

De Wilde 5010 (HT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes tetracola* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-2700 m.

ANT. No evaluada.

Luer 16875 (HT: MO).

***Lepanthes tibouchinicola* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2650-2850 m.

ANT, CAL. No evaluada.

Escobar 2660 (HT: SEL).

***Lepanthes tomentosa* Luer**

*Lepanthes dapaensis* P.Ortiz *et al.*

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2100 m.

CAU, CUN, VAL. No evaluada.

Luer 13086 (HT: MO).

***Lepanthes tracheia* Rchb.f.**

*Lepanthes caucana* Schltr.

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

CAU, SAN? No evaluada.

Colombia a Perú; NO Venezuela.

Lehmann 3562 (BM, IT de

*Lepanthes caucana*).

NOTA: sin datos de localidad específica / no specific locality data.

***Lepanthes transparens* Luer**

Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3150 m.

CAU, NAR. No evaluada.

SO Colombia a N Ecuador.

Luer 8381 (SEL).

***Lepanthes trichocaulis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1820 m.

ANT. No evaluada.

Escobar 3245 (HT: MO).

***Lepanthes trifurcata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3400 m.

ANT. No evaluada.

Luer 16720 (HT: MO).

***Lepanthes trimerinx* Luer**

Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

VAL. No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

Ramos 954 (MO).

***Lepanthes trinararia* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

ANT. No evaluada.

Luer 17530 (HT: MO).

***Lepanthes troglodytes* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico, V

Magdalena. 0-500 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Luer 10031 (HT: JAUM; IT: MO).

***Lepanthes troxis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thoerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

CUN, RIS. No evaluada.

Luer 10366 (HT: MO; IT: JAUM).

***Lepanthes tsubotae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1950 m.

VAL. No evaluada.

*Luer 15261* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes umbonata* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2000 m.

ANT, NAR. No evaluada.

*Escobar 3206* (HT: MO; IT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes uncifera* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2650-2700 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Escobar 3209* (HT: MO).

***Lepanthes uribei* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica.

VAL. No evaluada.

*Niessen 95* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo.

Sin datos de localidad específica / known only from the type; no specific locality data.

***Lepanthes valenciae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2050-2200 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 3185A* (HT: MO).

***Lepanthes vellicata* Luer & Hirtz**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

CHO. No evaluada.

Colombia a O Ecuador.

*Luer 16735* (MO).

***Lepanthes venusta* Luer & R.Escobar**

*Lepanthes arethusa* Luer & R.Escobar

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400-2750 m.

ANT, RIS. No evaluada.

*Luer 16839* (HT: MO).

***Lepanthes viahoensis* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 17719* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthes vibrissa* Luer & Hirtz**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1240-2700 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a N Ecuador.

*Luer 17666* (MO).

***Lepanthes vieirae* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 50-200 m.

CHO. No evaluada.

*Luer 10393* (HT: MO).

***Lepanthes volvox* Luer & R.Escobar**

Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2800 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 3194* (HT: MO; IT: JAUM, SEL).

***Lepanthes wagneri* Rchb.**

*Lepanthes dalstroemii* Luer  
Luer 1996; Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2050-2800 m.

ANT, BOY, CUN, NSA, PUT, SAN. No evaluada.

Colombia a Bolivia; NO y N Venezuela.

*Luer 13073* (MO).

NOTA: Luer sinonimizó *L. dalstroemii* con *L. wagneri*.

Recientes investigaciones sugieren que pueden ser consideradas especies diferentes (Luer & Thorerle 2012), pero a la fecha se mantienen como una sola entidad / Luer synonymized *L. dalstroemii* with *L. wagneri*; recent research shows that they could be considered different

species (Luer & Thorerle 2012), but to date they are kept as a one entity.

***Lepanthes yubarta***

**E. Calderón**

Luer & Thorerle 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900-2100 m.

RIS, VAL. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Calderón 602* (HT: HPUJ).

***Lepanthes zapatae* Luer &**

**R. Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;

Farfán *et al.* 2003; Viveros &

Higgins 2007; Luer & Thorerle

2012.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400-1600 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 16724* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lepanthopsis* (Cogn.) Ames**

12 especies, 4 especies endémicas

***Lepanthopsis abbreviata***

**Luer & Hirtz**

Luer 1986; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Luer 2176* (SEL).

***Lepanthopsis acetabulum***

**Luer**

Luer 1991; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

CUN. No evaluada.

O Colombia a N Bolivia.

*Luer 14270* (MO).

NOTA: sin datos de localidad específica / no specific locality data.

***Lepanthopsis acuminata***

**Ames**

Luer 1991; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 700-2200 m.

ANT, NSA, VAL. No evaluada.

NO Venezuela a Ecuador.

*Killip 11208* (HT: AMES).

***Lepanthopsis apoda* (Garay**

**& Dunst.) Luer**

*Expedicula apoda* (Garay &

Dunst.) Luer, *Trichosalpinx*

*apoda* (Garay & Dunst.) Luer

Luer 2005; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

ANT, SAN. No evaluada.

Colombia a Bolivia; NO

Venezuela.

*Luer 14333* (MO).

***Lepanthopsis astrophora***

**(Kraenzl.) Garay**

*Pleurothallis astrophora* Kraenzl.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900 m.

ANT. No evaluada.

Colombia, Venezuela.

*Ospina 82* (JAUM).

***Lepanthopsis dewildei* Luer**

**& R. Escobar**

*Expedicula dewildei* (Luer &

R. Escobar) Luer

Luer 2005; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3000 m.

BOY. No evaluada.

*De Wilde 4436* (HT: MO).

***Lepanthopsis floripecten***

**(Rchb.f.) Ames**

*Lepanthes floripecten* (Rchb.f.)

Ames, *Lepanthes secunda*

Barb.Rodr., *Lepanthopsis*

*secunda* (Barb.Rodr.) Hoehne,

*Lepanthopsis unilateralis* (Cogn.)

Porto & Brade, *Pleurothallis*

*unilateralis* Cogn.

Luer 1991; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1580-2000 m.

ANT. No evaluada.

SE México a Centroamérica y

Suramérica tropical.

*Luer 13049* (MO).

***Lepanthopsis hirtzii* Luer**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

PUT. No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

*Luer 14217* (MO).

***Lepanthopsis obliquipetala***

**(Ames & C. Schweinf.) Luer**

*Physosiphon obliquipetalus* Ames

& C. Schweinf., *Pleurothallis*

*connata* Luer, *Stelis obliquipetala*

(Ames & C. Schweinf.)

L.O. Williams

Viveros & Higgins 2007; Idárraga

*et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Centroamérica a Ecuador.

*Duque 1637* (MO).

***Lepanthopsis peniculus***

**(Schltr.) Garay**

Luer 1991; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

CAU, CUN. No evaluada.

*Luer 14262* (MO).

***Lepanthopsis pristis* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1650 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 3383* (HT: MO).

***Lepanthopsis prolifera* Garay**

Luer 1991; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1650-2200 m.  
NSA. No evaluada.  
*Cuatrecasas 12537* (HT: US, IT: AMES).

***Ligeophila* Garay**

5 especies, 1 especie endémica

***Ligeophila jamesonii* Garay**

*Erythrodes jamesonii* (Garay) Dodson  
Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007; Ormerod 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Pacífico, V Cauca. 20-900 m.  
ANT, CAQ, CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Forero 4916* (COL).

***Ligeophila juruenensis* (Hoehne) Garay**

*Erythrodes juruenensis* (Hoehne) Ames, *Erythrodes santensis* (Kraenzl.) C.Schweinf., *Physurus juruenensis* Hoehne, *Physurus santensis* Kraenzl.  
Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007; Ormerod 2007.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Pacífico. 50-300 m.  
AMA, VAL. No evaluada.  
Suramérica.  
*Galeano 1496* (COL).

***Ligeophila macarenae* Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007; Ormerod 2007.  
Hierba.  
Endémica. Guayana y Macarena. 450 m.  
MET. No evaluada.  
*Philipson 1733* (HT: BM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

**[*Ligeophila peteriana* (Cogn.) Garay]**

Ortiz 1995.  
NOTA: registro basado en identificación errónea; es de Surinam y Guayana Francesa / record based on a misidentification; from Suriname and French Guiana.

***Ligeophila rosea* (Lindl.)**

**Garay**  
*Erythrodes bifalcis* (Lindl.) Ames, *Erythrodes rosea* (Lindl.) Ames, *Erythrodes valida* (Rolfe) Ames, *Microchilus bifalcis* (Lindl.) D.Dietr., *Physurus bifalcis* Lindl., *Physurus roseus* Lindl., *Physurus validus* Rolfe  
Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico, V Magdalena. 100-770 m.  
AMA, ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia a Bolivia y Argentina.  
*Ramírez 1362* (COL, JAUM).

***Ligeophila stigmatoptera* (Rchb.f.) Garay**

*Erythrodes stigmatoptera* (Rchb.f.) Pabst, *Physurus stigmatopterus* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa. Guayana y Macarena?

GUI? No evaluada.  
Venezuela y Guayanas.  
NOTA: esperada; registrada de Amazonas (Venezuela); prob. se encuentre en Guainía / expected; recorded from Amazonas (Venezuela); prob. occurs in Guainía.

***Liparis* Rich.**

10 especies, 2 especies endémicas

***Liparis aphylla* G.A.Romero & Garay**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2800 m.  
BOY. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ospina 1487* (HT: AMES).

***Liparis brachystalix* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2450-3150 m.  
CAU, CUN. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Haught 2783* (MO).

***Liparis caloglossa* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 3300 m.  
PUT. No evaluada.  
*Hopp 167* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Liparis jamaicensis* Griseb.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1300-1600 m.  
CAU. No evaluada.  
Costa Rica a N Argentina; Antillas.  
*Lehmann 8862* (K).

***Liparis lindeniana* (A.Rich. & Galeotti) Hemsl.**

*Liparis vexillifera* subsp.  
*lindeniana* (A.Rich. & Galeotti)  
Dressler  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 100-1350 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Argentina; Antillas.  
NOTA: esperada / expected.

***Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena. 180-1250  
m.  
ANT, SAN, VAU. No evaluada.  
Pantropical.  
*Ortiz 345* (HPUJ).  
*Liparis nervosa* subsp. *nervosa*

***Liparis ramosa* Poepp. & Endl.**

Fernández-Pérez 1969; Ortiz  
1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1500-2800 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Fernández-Pérez 1969:t.55 (?)*.

***Liparis serpens* Garay**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2700-2800 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schneider 95* (HT: AMES).

***Liparis wagneri* (Rchb.f.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
NSA. No evaluada.

Colombia y Venezuela.  
*Wagner s.n.* (HT: W).

***Liparis wendlandii* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300 m.  
CUN. No evaluada.  
México a Venezuela.  
*Ortiz 986* (HPUJ).

***Lockhartia* Hook.**

9 especies, 1 especie endémica

***Lockhartia acuta* (Lindl.) Rchb.f.**

*Fernandezia acuta* Lindl.,  
*Lockhartia pallida* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia,  
Caribe, Orinoquia, SN Santa  
Marta. 30-500 m.  
MAG, MET. No evaluada.  
Costa Rica a Venezuela y  
Trinidad y Tobago.  
*Philipson 1434* (COL, HPUJ).

***Lockhartia chocoensis* Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Perú.  
*Escobar 682* (AMES).

***Lockhartia hercodonta* Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Belice a Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

**[*Lockhartia imbricata* (Lam.) Hoehne]**

Govaerts *et al.* 2014a.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea / record  
based on a misidentification.

***Lockhartia longifolia* (Lindl.) Schltr.**

*Fernandezia longifolia* Lindl.,  
*Lockhartia hologlossa* Schltr.,  
*Lockhartia platyglossa* Rchb.f.,  
*Lockhartia unicornis* Schltr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes,  
Pacífico. 1400-2200 m.  
ANT, CAU, CHO, MAG, VAL.  
No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Cogollo 2737* (JAUM).

***Lockhartia micrantha* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Nicaragua a Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Lockhartia niesseniae* M.Kolan. & O.Pérez**

Kolanowska & Pérez E. 2012.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1360-1370 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Kolanowska 89* (HT: UGDA).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Lockhartia obtusata* L.O.Williams**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 500 m.  
CHO. No evaluada.

Colombia y Panamá.  
Misas 306 (HPUJ).

**[*Lockhartia oerstedii* Rchb.f.]**

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en identificación errónea / record based on a misidentification.

***Lockhartia parthenocomos* (Rchb.f.) Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Lockhartia parthenocomos* var. *crispula* Regel

NOTA: el tipo de *L.*

*parthenocomos* var. *crispula* provenía de Colombia pero aparentemente ya no existe; no es posible determinar la identidad exacta de este taxón a partir del protólogo / the type of *L. parthenocomos* var. *crispula* came from Colombia, but apparently it no longer exists; taxon identity cannot be determined from the protologue.

***Lockhartia parthenoglossa* Rchb.f.**

*Lockhartia integra* Ames & C.Schweinf., *Lockhartia pittieri* Schltr.

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 40-200 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Colombia a Belice.

León 656 (COL, MO).

NOTA: identificada como *L. chochoensis* en Misas Urreta (2005) / identified as *L. chochoensis* in Misas Urreta (2005).

***Lophiaris* Raf.**

5 especies, 1 especie endémica

***Lophiaris carthagenensis* (Jacq.) Braem**

*Epidendrum carthagenense* Jacq., *Oncidium carthagenense* (Jacq.) Sw.

Foldats 1979; Dodson 1992.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Caribe, V

Magdalena. 0-1100 m.

ATL, BOL, CAU, CUN, MAG,

MET, TOL. No evaluada.

Costa Rica a Venezuela.

*Holton* 166 (AMES).

***Lophiaris ×haematochila* (Lindl. & Paxton) Braem**

*Oncidium haematochilum* Lindl. & Paxton, *Trichocentrum carthagenense* (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams, *Trichocentrum haematochilum* (Lindl. & Paxton) M.W.Chase & N.H.Williams  
Dodson 1992.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia. 150 m.

CAU, GUI. No evaluada.

Colombia.

NOTA: la localidad original es incierta. Híbrido de *L. lanceana* × *L. lurida* / the original locality is uncertain; a hybrid of *L. lanceana* × *L. lurida*.

***Lophiaris lanceana* (Lindl.) Braem**

*Lophiaris fragrans* Raf., *Oncidium lanceanum* Lindl., *Trichocentrum lanceanum* (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Dunsterville & Garay 1959; Dodson 1992.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia?, Guayana y Macarena? 150 m.

GUI? No evaluada.

Colombia?, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Trinidad y Tobago, Jamaica.

NOTA: esperada; crece en áreas vecinas en Venezuela y Brasil / expected; grows in neighboring areas in Venezuela and Brazil.

***Lophiaris lurida* (Lindl.) Braem**

*Oncidium luridum* Lindl., *Trichocentrum luridum* (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams  
Dunsterville & Garay 1966; Dodson 1992; Carnevali *et al.* 2001.

Hierba, epífita.

Nativa. Caribe, V Cauca. 0-1070 m.

VAL. No evaluada.

SE México a Colombia y Venezuela.

*Ramos* 2287 (MO).

***Lophiaris nana* (Lindl.) Braem**

*Oncidium nanum* Lindl., *Oncidium patulum* Schltr., *Trichocentrum nanum* (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams  
Vásquez & Dodson 1982; Dodson & Bennett 1989; Dodson 1992.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500 m.

MET. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Bolivia, Perú.

*Renz* 3345 (RENZ).

***Lueddemannia* Rchb.f.**

1 especie

***Lueddemannia pescatorei* (Lindl.) Linden & Rchb.f.**

*Acineta glauca* Lindl., *Cycnoches lindleyi* Linden, *Cycnoches pescatorei* Lindl., *Lueddemannia lehmannii* (Rchb.f.) Rchb.f.,

*Lueddemannia triloba* Rolfe,  
*Lueddemannia vyvereana* Schltr.  
Gerlach 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1900 m.  
CUN, MET, NAR, PUT. No  
evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Lehmann 27* (G).

### ***Lycaste* Lindl.**

10 especies, 1 especie endémica

#### ***Lycaste campbellii***

##### **C.Schweinf.**

Oakeley 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0-120 m.  
ANT, CHO. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
NO Colombia, Panamá.  
*Misas 143* (COL).

#### ***Lycaste deppei* (Lindl.) Lindl.**

*Maxillaria deppei* Lindl.  
Oakeley 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
México a Honduras, Colombia?  
NOTA: una planta de esta especie  
fue vista por Oakeley en la  
Exposición Internacional de  
Orquídeas, en Pereira, en 2006,  
supuestamente recolectada en la  
frontera con Panamá / a plant of  
this species seen by Oakeley at  
the International Orchid Expo  
2006 in Pereira allegedly had  
been collected on the border  
with Panama.

#### ***Lycaste macrobulbon* (Hook.) Lindl.**

*Lycaste youngii* B.S.Williams,  
*Maxillaria macrobulbon* Hook.  
Oakeley 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-1600 m.

MAG. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
N Colombia, O Venezuela, SE  
Brasil.

#### ***Lycaste macrobulbon* var. *youngii* Rolfé**

NOTA: señalada de Colombia por  
Oakeley (2008), sin indicación de  
especimen. La localidad podría  
ser Cesar, y no Magdalena /  
recorded by Oakeley (2008) from  
Colombia without indication  
of specimen; the locality in  
Magdalena might actually be  
Cesar.

#### ***Lycaste measuresiana* (B.S.Williams) Oakeley**

Oakeley 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0 m.  
CHO. No evaluada.  
NO Colombia a Costa Rica.  
NOTA: ilustrada por Misas Urreta  
(2005) como *L. macrophylla*  
/ illustrated by Misas Urreta  
(2005) as *L. macrophylla*.

#### ***Lycaste ×niesseniae* Oakeley**

*Lycaste × niesseniae* var. *rosea*  
Oakeley  
Oakeley 2008.  
Hierba.  
Endémica. Andes.  
VAL. No evaluada.  
*Oakeley Col97-4/1* (HT: K-HFO).  
NOTA: híbrido natural de *L.*  
*schilleriana* × *L. occulta* / a  
natural hybrid of *L. schilleriana* ×  
*L. occulta*.

#### ***Lycaste occulta* Oakeley**

Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Guyana a Ecuador.  
NOTA: en cultivo en Cali y  
Medellín. Sin datos de origen.  
La elevación es la conocida en

Ecuador / cultivated in Cali  
and Medellín; no origin data;  
elevation range from Ecuador.

#### ***Lycaste panamanensis* (Fowlie) Archila**

Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa. Pacífico. 1250 m.  
CHO. No evaluada.  
NO Colombia (Serranía del  
Darién) a Costa Rica.

#### ***Lycaste powellii* Schltr.**

Misas-Urreta 2005; Oakeley  
2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50 m.  
CHO. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
O Colombia a C Panamá.

#### ***Lycaste schilleriana* Rchb.f.**

Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1400 m.  
DESCONOCIDO. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a O Panamá.  
*Lycaste schilleriana* var. *alba*  
Oakeley  
NOTA: en cultivo en colecciones  
en Cali y Medellín. Sin datos  
de procedencia / cultivated in  
collections in Cali and Medellín,  
without origin data.

#### ***Lycaste xytriophora* Linden & Rchb.f.**

Oakeley 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 600-1800 m.  
DESCONOCIDO. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Costa Rica a Ecuador.  
NOTA: señalada de Colombia por  
Escobar (1991), sin indicación de  
especimen. El rango de elevación  
es de Ecuador / recorded from

Colombia by Escobar (1991), with no indication of specimen; the elevation range is from Ecuador.

***Lycomormium Rchb.f.***

2 especies, 1 especie endémica

***Lycomormium fiskei***

**H.R.Sweet**

Sweet 1974.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-2000 m.

CAQ. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

Ortiz 1365 (HPUJ).

NOTA: especie dudosa. Se cuenta con fotografías de la especie, muy probablemente de Colombia / dubious species; there are photographs of this species, most likely from Colombia.

***Lycomormium schmidtii***

**A.Fernández**

Sweet 1974.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

CAQ. No evaluada.

Colombia.

Fernández-Pérez 7248 (HT: COL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Lyroglossa Schltr.***

1 especie

***Lyroglossa grisebachii*  
(Cogn.) Schltr.**

*Lyroglossa bicolor* (Griseb.) Schltr., *Spiranthes bicolor* Griseb., *Spiranthes grisebachii* Cogn., *Stenorrhynchos bicolor* (Griseb.) Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

CAL. No evaluada.

Colombia a Guayanas, Brasil y Paraguay; Nicaragua, Caribe.

Fernández 19206 (COL).

NOTA: conocida en Colombia solo de una colección, prob. cultivada / known in Colombia for a single collection, prob. cultivated.

***Macradenia R.Br.***

3 especies

***Macradenia brassavolae***

**Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Caribe, Pacífico. 5-300 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Centroamérica, N Suramérica.

Ortiz 895 (HPUJ).

***Macradenia lutescens R.Br.***

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Florida a N Suramérica; Antillas.

***Macradenia***

***purpureorostrata G.Gerlach***

*Macradenia brassavolae* var.

*albiflora* Senghas & Seeger

Gerlach 2012.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 100-500 m.

AMA, CAQ, PUT. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

Jaramillo 8003 (COL).

***Malaxis Sw.***

13 especies, 2 especies endémicas

***Malaxis andicola* (Ridl.)**

**Kuntze**

*Microstylis andicola* Ridl.

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 1420-2000 m.

ANT, CUN. No evaluada.

Venezuela a Perú.

Cogollo 2572 (JAUM, MO).

***Malaxis caracasana* (Ridl.)**

**Kuntze**

*Microstylis caracasana* Ridl.

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1000-2200 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

Karsten *s.n.* (BM).

***Malaxis crispifolia* (Rchb.f.)**

**Kuntze**

*Malaxis juliani* Foldats,

*Microstylis crispifolia* Rchb.f.

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 2350-2800 m.

ANT, CUN. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

Correa 456 (JAUM).

***Malaxis excavata* (Lindl.)**

**Kuntze**

*Epidendrum umbellatum*

G.Forst., *Microstylis excavata*

Lindl.

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba.

Nativa. Andes. 1500-3000 m.

ANT, CES, CUN, RIS. No

evaluada.

Venezuela a Ecuador.

Benavides 18 (HUA).

***Malaxis fastigiata* (Rchb.f.)**

**Kuntze**

*Microstylis fastigiata* Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 2580-3050 m.

BOY, CUN. No evaluada.

México a Perú.

Aguirre 460 (COL).

***Malaxis histionantha* (Link et al.) Garay & Dunst.***Microstylis histionantha* Link et al.

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1100-2400 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Ecuador.

***Malaxis hoppii* (Schltr.)****Løjtnant***Microstylis hoppii* Schltr.

Ortiz 1995; Dodson (manuscrito).

Hierba.

Nativa. Andes. 2500 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

***Malaxis lobulata*****L.O. Williams**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.

2700-3000 m.

CUN, MAG. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Martin* 3321 (IT: MO).***Malaxis moritzii* (Ridl.)****Kuntze***Microstylis moritzii* Ridl.

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1400-2400 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

***Malaxis mucronulata*****(Schltr.) P.Ortiz***Microstylis mucronulata* Schltr.

Ortiz 1995.

Hierba.

Endémica. Andes. 1400-1700 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

***Malaxis parthonii* C.Morren***Microstylis parthonii* (C.Morren)

Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1600 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Perú.

***Malaxis quadrata*****L.O. Williams**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes. 1900-2100 m.

HUI. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cuatrecasas* 8658 (COL).***Malaxis sneidernii* (Garay)****P.Ortiz***Microstylis sneidernii* Garay

Ortiz 1991; Ortiz 1995.

Hierba.

Endémica. Andes. 1700 m.

CAU. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Von Sneidern* 118 (HT: S).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Mapinguari Carnevali* & R.B.Singer**

2 especies

***Mapinguari desvauxianus*****(Rchb.f.) Carnevali &****R.B.Singer***Maxillaria desvauxiana*Rchb.f., *Maxillaria huebneri*Schltr., *Maxillaria verrucifera*

C.Schweinf.

Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Amazonia,

Andes, Guayana y Macarena.

150-2250 m.

AMA, CAL, RIS, VAU. No

evaluada.

N Suramérica hasta Perú.

*Garay* 90 (AMES, HUI).

NOTA: la identidad de los especímenes de los Andes requiere verificación / identity of the Andean specimens needs verification.

***Mapinguari longipetiolatus* (Ames & C.Schweinf.)****Carnevali & R.B.Singer**

Govaerts et al. 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico.

CHO. No evaluada.

Costa Rica a NO Venezuela y Perú.

*Misas* 248 (HPUJ).NOTA: Ilustrada por Misas Urreta (2005) como *Maxillaria neophylla* / Illustrated by Misas Urreta (2005) as *Maxillaria neophylla*.**[*Mapinguari neophyllus* (Rchb.f.) Baumbach]**

Misas-Urreta 2005; Govaerts et al. 2014a.

NOTA: registro basado en un espécimen de *M. longipetiolatus* / record based on a specimen of *M. longipetiolatus*.***Masdevallia Ruiz* & Pav.**

152 especies, 91 especies endémicas

***Masdevallia aenigma* Luer & R.Escobar***Alaticaulia aenigma* (Luer & R.Escobar) Luer

Luer 2006a; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2450-2500 m.

BOY, CUN, NSA. Casi

Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer* 7571 (HT: SEL; IT: COL).

***Masdevallia aguirrei* Luer & R.Escobar**

*Alaticaulia aguirrei* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
CAU, VAL. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 17988* (HT: MO).

***Masdevallia akemiana* Königler & Sijm**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. 1400 m.  
RIS. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
*Königler WK-112* (HT: M; IT: JAUM).

***Masdevallia alismifolia* Kraenzl.**

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2870-3300 m.  
NAR, PUT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia.  
*Lehmann s.n.* (HT: W).

***Masdevallia ×alvaroi* Luer & R.Escobar**

*Spilotantha alvaroi* (Luer & R.Escobar) Luer  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2280 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 434* (HT: JAUM).  
NOTA: híbrido de *M. amanda* × *M. picturata* / a hybrid of *M. amanda* × *M. picturata*.

***Masdevallia amanda* Rchb.f. & Warsz.**

*Masdevallia gustavii* Rchb.f.,  
*Masdevallia oligantha* Schltr.,  
*Masdevallia remotiflora* Kraenzl.,  
*Spilotantha amanda* (Rchb.f.) Luer  
Luer 2002; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-3000 m.  
ANT, BOY, CAQ, CAU, CHO, CUN, NAR, NSA, SAN, TOL.  
Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
NO Venezuela a Ecuador.  
*Pennell 7589* (AMES, K, US).

***Masdevallia angulata* Rchb.f.**

*Masdevallia burfordiensis* O'Brien  
Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
NAR. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia a O Ecuador.  
*Escobar 3213* (MO).

***Masdevallia angulifera* Kraenzl.**

*Masdevallia olivacea* Kraenzl.  
Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2000 m.  
ANT, CAL, CAU. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Wallis s.n.* (HT: W).

***Masdevallia anisomorpha* Garay**

*Rodrigoa anisomorpha* (Garay) Luer  
Luer 2003; Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-2650 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 446* (HT: AMES).

***Masdevallia apparitio* Luer & R.Escobar**

Luer 2002; Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2200 m.  
ANT. En Peligro Crítico (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 1490* (HT: JAUM).

***Masdevallia arangoi* Luer & R.Escobar**

*Acinopetala arangoi* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700-2000 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 1391* (HT: JAUM).

***Masdevallia arminii* Linden & Rchb.f.**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1850-2600 m.  
BOY, CUN, NSA, SAN. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
*Schlim 740* (HT: W).

***Masdevallia assurgens* Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3380-3600 m.  
CAU, TOL. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 830* (HT: JAUM).

***Masdevallia bicolor* Poepp. & Endl.**

*Alaticaulia bicolor* (Poepp. & Endl.) Luer, *Masdevallia aureo-rosea* Weberb., *Masdevallia auropurpurea* Rchb.f. & Warsz., *Masdevallia biflora* E.Morren, *Masdevallia herzogii* Schltr., *Masdevallia peruviana* Rolfe, *Masdevallia subumbellata* Kraenzl., *Masdevallia xanthura* Schltr.

Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1400-2500 m. ANT, CAL, CAU, NSA, SAN, VAL. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Bolivia; NO Venezuela.

Luer 7802 (MO).

***Masdevallia bonplandii*****Rchb.f.**

*Masdevallia coriacea* subsp. *bonplandii* (Rchb.f.) Luer, *Masdevallia endotrachys* Kraenzl., *Masdevallia porcelliceps* var. *sulphurea* (F.Lehm. & Kraenzl.) Kraenzl., *Masdevallia sulphurea* F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia uniflora* Kunth Luer 2000c; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2900-3750 m. BOY, CUN, SAN. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

E Colombia a C Perú.

Luer 7879 (SEL).

***Masdevallia brockmuelleri*****Luer**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

Luer 10409 (HT: MO).

NOTA: sin datos de localidad específica; obtenida de Brockmüller, quien pos. obtuvo el espécimen de B. Malo, 1979. Cultivada por W. Königer en Munich / no specific locality data; obtained from Brockmüller, who poss. got the specimen from B. Malo, 1979; cultivated by W. Königer in Munich.

***Masdevallia buccinator*****Rchb.f. & Warsz.**

*Alaticaulia buccinator* (Rchb.f. & Warsz.) Luer Luer 2002; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-2600 m. SAN. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

Schlim 1181 (HT: W).

***Masdevallia bulbophyllopsis* Kraenzl.**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003.

Hierba, epífita.

Nativa.

NAR? No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

NOTA: esperada / expected.

***Masdevallia cacodes* Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2000 m.

ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

Luer 1841 (HT: SEL).

***Masdevallia caesia* Roezl**

*Masdevallia deorsum* Rolfe, *Masdevallia metallica* F.Lehm. & Kraenzl.

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700-2000 m.

CAU, RIS, VAL. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Lehmann s.n.* (K, HT de *M. deorsum*).

***Masdevallia campyloglossa* Rchb.f.**

*Masdevallia campyloglossa* subsp. *ortgiesiana* (Rolfe) Luer, *Masdevallia dermatantha* Kraenzl., *Masdevallia fertilis* Kraenzl., *Masdevallia heterotepala* Rchb.f., *Masdevallia ortgiesiana* Rolfe, *Masdevallia sarcophylla* Kraenzl.

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600-2600 m.

ANT, CAL, CAU, CUN, PUT, SAN. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Perú.

Veitch 47 (HT: W).

***Masdevallia caudata* Lindl.**

*Masdevallia caudata* var. *gudotii* Rchb.f., *Masdevallia caudata* var. *shuttleworthii* (Rchb.f.)

Rchb.f., *Masdevallia caudata* var. *xanthocorys* (Rchb.f.) H.J.Veitch, *Masdevallia cucutillensis* Kraenzl., *Masdevallia expansa* Rchb.f., *Masdevallia shuttleworthii* Rchb.f., *Masdevallia shuttleworthii* var. *xanthocorys* Rchb.f., *Masdevallia tricolor* Rchb.f.

Luer 2002; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1670-2800 m.

CUN, NSA, QUI, SAN. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007). Colombia a NO y N Venezuela.

*Goudot s.n.* (HT: K).

***Masdevallia caudivolvula***

**Kraenzl.**

*Streptoura caudivolvula*

(Kraenzl.) Luer

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2480 m.

ANT. Casi Amenazada

(Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 681* (JAUM).

***Masdevallia cerastes* Luer &**

**R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán

2003; Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2600 m.

PUT. En Peligro (Calderón-

Sáenz 2007).

*Luer 2785* (HT: JAUM).

[***Masdevallia chimboensis***

**Kraenzl.**]

Calderón-Sáenz 2007.

NOTA: especie de Ecuador, señalada de Colombia, con base en un espécimen cultivado / a species from Ecuador recorded from Colombia based on a cultivated specimen.

***Masdevallia civilis* Rchb.f. &**

**Warsz.**

*Masdevallia aequiloba* Regel,

*Masdevallia fragrans* Woolward

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-3750 m.

ANT, SAN. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Ospina 578* (JAUM).

***Masdevallia clandestina***

**Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

NE Colombia a NO Venezuela.

*Luer 7975* (HT: SEL).

***Masdevallia coccinea* Lindl.**

*Masdevallia coccinea* var.

*coerulensis* B.S.Willia.,

*Masdevallia coccinea* var. *lindenii*

Stein, *Masdevallia coccinea* var.

*versicolor* Veitch, *Masdevallia*

*denisonii* Dombrain, *Masdevallia*

*harryana* Rchb.f., *Masdevallia*

*harryana* var. *enisoniana* hort.,

*Masdevallia harryanavar. laeta*

Rchb.f., *Masdevallia harryana*

var. *sanguinea* hort., *Masdevallia*

*lindenii* André, *Masdevallia*

*lindenii* var. *harryana* (Rchb.f.)

André, *Masdevallia militaris*

Rchb.f. & Warsz.

*Luer 2002*; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2900 m.

SAN. En Peligro (Calderón-

Sáenz 2007).

NE Colombia.

*Linden 1262* (HT: K).

***Masdevallia copiosa* Kraenzl.**

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

SAN. No evaluada.

NE Colombia.

*Kalbreyer 736* (HT: ?).

NOTA: sin datos de localidad específica / no specific locality data.

***Masdevallia coriacea* Lindl.**

*Masdevallia bogotensis* Gentil,

*Masdevallia bruckmuelleri* Lind.

& André, *Masdevallia ochracea*

Burb.

*Luer 2000c*; Calderón-Sáenz &

Farfán 2003; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600-3350 m.

BOY, CUN, NSA, PUT.

Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Perú.

*Hartweg s.n.* (HT: K).

***Masdevallia corniculata***

**Rchb.f.**

*Masdevallia calyprata* Kraenzl.,

*Masdevallia corniculata* var.

*inflata* (Rchb.f.) H.J.Veitch,

*Masdevallia inflata* Rchb.f.

*Luer 2003*; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2150-2480 m.

BOY, SAN. Casi Amenazada

(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a E Ecuador.

*Backhouse s.n.* (HT: W).

***Masdevallia crescenticola***

**F.Lehm. & Kraenzl.**

*Acinopetala crescenticola*

(F.Lehm. & Kraenzl.) Luer

*Luer 2006a*; Govaerts *et al.*

2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 150-300 m.

CHO. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

O Colombia a O Ecuador.

*Escobar 1459* (JAUM).

***Masdevallia cucullata***

**Rchb.f.**

*Luer 2003*; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2800 m.

ANT, CAU, CUN, PUT, TOL.

Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Ecuador.

*Linden 869* (HT: K).

***Masdevallia discolor* Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2600 m.  
BOY, CUN. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 1915* (HT: JAUM).

***Masdevallia dryada* Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1850 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 14161* (HT: MO).

***Masdevallia elephanticeps* Rchb.f. & Warsz.**

*Byrsella elephanticeps* (Rchb.f. & Warsz.) Luer  
Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1980-2900 m.  
NSA, SAN. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
EC Colombia a NO Venezuela.  
*Warszewicz s.n.* (HT: W).

***Masdevallia encephala* Luer & R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2150-2600 m.  
BOY, SAN. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
NE Colombia.  
*Escobar 1082* (HT: JAUM).

***Masdevallia ensata* Rchb.f.**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 2000 m.  
PUT? Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
NO Venezuela, Colombia y Ecuador.  
NOTA: esperada; su presencia es reportada por Calderón & Farfán 2003, en comunicación personal con P. Ortiz / expected; occurrence reported by Calderón & Farfán (pers. comm. with P. Ortiz in 2003).

***Masdevallia estradae* Rchb.f.**

*Masdevallia estradae* var. *delicata* Rchb.f.  
Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2200 m.  
ANT, BOY, CUN. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Wallis s.n.* (HT: W).

***Masdevallia falcago* Rchb.f.**

*Masdevallia trionyx* Kraenzl.  
Luer 2001; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-3000 m.  
NSA, SAN. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Purdie s.n.* (HT: K).

***Masdevallia fasciata* Rchb.f.**

*Masdevallia bathyschista* Schltr., *Masdevallia palmensis* Kraenzl., *Masdevallia restrepiodea* Kraenzl., *Masdevallia trinemoides* Kraenzl., *Rodrigoa fasciata* (Rchb.f.) Braas  
Luer 2003; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2890 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Giraldo 1699* (HUA, JAUM).

***Masdevallia filaria* Luer & R.Escobar**

*Masdevallia ventricularia* subsp. *filaria* (Luer & R.Escobar) Luer, *Masdevallia ventricularia* var. *longicaudata* F.Lehm.  
Luer 2002; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2400 m.  
ANT, CAU, VAL. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
O Colombia y N Ecuador.  
*Escobar 456e* (HT: JAUM).

***Masdevallia foetens* Luer & R.Escobar**

Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2400 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 1072* (HT: JAUM).

***Masdevallia gargantua* Rchb.f.**

Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
*Wallis s.n.* (HT: W).  
NOTA: espécimen no tiene la elevación (en Frontino, Antioquia) / specimen does not give elevation (in Frontino, Antioquia).

***Masdevallia geminiflora***

**P.Ortiz**  
*Acinopetala geminiflora* (P.Ortiz) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1280-1800 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
(Calderón-Sáenz 2007).  
O Colombia a O Ecuador.  
*Ortiz 607* (HT: COL).

***Masdevallia gilbertoi* Luer & R.Escobar**

Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2300 m.  
RIS. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 440* (HT: JAUM).

***Masdevallia herraduræ* F.Lehm. & Kraenzl.**

*Acinopetala herraduræ* (F.Lehm. & Kraenzl.) Luer, *Masdevallia frontinoensis* Kraenzl.  
Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, V Magdalena. 400-1600 m.  
ANT, RIS. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
*Lehmann 4139* (K).

***Masdevallia heteroptera* Rchb.f.**

*Masdevallia fissa* Kraenzl., *Rodrigoa heteroptera* (Rchb.f.) Braas  
Luer 2003; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-2680 m.  
ANT, CHO. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 17678* (MO).

***Masdevallia hians* Linden & Rchb.f.**

Luer 2001; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300-3700 m.  
BOY, NSA, SAN. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
NE Colombia.  
*Schlim 1163* (HT: W).

***Masdevallia hieroglyphica* Rchb.f.**

Luer 2001; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2300-2600 m.  
NSA, SAN. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Arnold 82* (W).

***Masdevallia hortensis* Luer & R.Escobar**

*Rodrigoa hortensis* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2003; Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 2707* (HT: SEL; IT: COL, JAUM).

***Masdevallia hubeinii* Luer & Würstle**

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
*Wurstle 1324* (HT: MO).  
NOTA: sin datos de colección / no collection data.

***Masdevallia hylodes* Luer & R.Escobar**

Luer 2001; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2900-3100 m.  
CAU, NAR. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia.  
*Escobar 1899* (HT: JAUM).

***Masdevallia ignea* Rchb.f.**

Luer 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2900-3700 m.  
BOY, NSA. En Peligro Crítico (Calderón-Sáenz 2007).  
*Veitch 78* (HT: W).

***Masdevallia impostor* Luer & R.Escobar**

*Alaticaulia impostor* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1900 m.  
ANT, CAU. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
O Venezuela a SE Ecuador.  
*Segura s.n.* (HT: JAUM; IT: SEL).

***Masdevallia indecora* Luer & R.Escobar**

Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 15265* (HT: JAUM; IT: MO).

***Masdevallia klabochorum* Rchb.f.**

*Masdevallia aops* Luer & Malo, *Masdevallia paisbambæ* F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia xanthina* subsp. *klabochorum* (Rchb.f.) Luer

Luer 2002; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300-2900 m. ANT, BOY, CAU, NAR. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Perú.

*Klaboch s.n.* (HT: W).

***Masdevallia laevis* Lindl.**

*Masdevallia affinis* Lindl., *Masdevallia affinis* subsp. *maculigera* (Schltr.) Luer, *Masdevallia affinis* subsp. *petiolaris* (Schltr.) Luer, *Masdevallia chlorotica* Kraenzl., *Masdevallia confusa* Kraenzl., *Masdevallia gomeziana* F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia lepida* Rchb.f., *Masdevallia maculigera* Schltr., *Masdevallia pantherina* F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia petiolaris* Schltr.

Luer 2001; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600-3800 m. ARA, CAU, NAR, NSA, PUT, TOL. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

NO Venezuela a N Ecuador.

*Lehmann 8506* (HT: G).

***Masdevallia lehmannii***

**Rchb.f.**

*Masdevallia densiflora* Schltr., *Spilotantha densiflora* (Schltr.) Luer, *Spilotantha lehmannii* (Rchb.f.) Luer

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2100 m.

CAU. No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

*Madero s.n.* (HT: B).

NOTA: conocida en Colombia solo del tipo / known in Colombia only from the type.

***Masdevallia leontoglossa***

**Rchb.f.**

Luer 2000c; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600-3150 m.

NSA. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

*Wagner s.n.* (W).

***Masdevallia leptoura* Luer**

*Masdevallia pachyura* subsp. *leptoura* (Luer) Luer, *Spilotantha leptoura* (Luer) Luer

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

NAR. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Perú.

*Luer 17982* (?).

NOTA: recolectada en Nariño, sin datos de localidad específica o elevación. Cultivada en Colomborquideas. Recolectada como *Luer 17982* (sin herbario) / collected in Nariño without specific locality or elevation data; cultivated at Colomborquideas; collected as *Luer 17982* (no herbarium).

***Masdevallia ×ligiae* Luer &**

**R.Escobar**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

ANT. No evaluada.

*Luer 6727* (HT: JAUM, IT: SEL).

NOTA: sin dato específico de elevación, en Abejorral (Antioquia) / without specific locality data, in Abejorral (Antioquia).

***Masdevallia livingstoneana***

**Rchb.f.**

*Acinopetala livingstoneana* (Rchb.f.) Luer, *Masdevallia livingstoneana* (Schltr.) Ames,

*Masdevallia panamensis* (Schltr.) Ames, *Scaphosepalum panamense* Schltr.

Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 100 m.

CHO. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Costa Rica a NO Colombia. *Duke 9911* (NY).

***Masdevallia ludibunda***

**Rchb.f.**

*Masdevallia estradae* var. *ludibunda* (Rchb.f.) Woolward Luer 2002; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2100 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Lawrence s.n.* (HT: W).

***Masdevallia ludibundella***

**Luer & R.Escobar**

Luer 2002; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 16881* (HT: MO).

NOTA: sin datos de colección / no collection data.

***Masdevallia macrogenia* (Arango) Luer & R.Escobar**

*Masdevallia collina* var. *macrogenia* Arango, *Petalodon macrogenius* (Arango) Luer Luer 2000c; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, Pacífico. 150-1500 m.

ANT, CHO. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

*Arango 160* (HT: JAUM).

***Masdevallia macroglossa***

**Rchb.f.**

*Masdevallia gerlachii* Königer,  
*Masdevallia porcelliceps* Rchb.f.

Luer 2000c; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3150-3200 m.

NSA, SAN. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).

NE Colombia a NO y N

Venezuela.

*Luer 10244* (MO).

***Masdevallia macrura* Rchb.f.**

*Megema macrura* (Rchb.f.) Luer

Luer 2000c; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1850-2600 m.

ANT, CHO. En Peligro

(Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 438* (JAUM, SEL).

***Masdevallia mandarina***

**(Luer & R.Escobar) Luer**

*Masdevallia xanthina* subsp.

*mandarina* Luer & R.Escobar

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600-2350 m.

ANT, CES. Vulnerable

(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Ecuador.

*Luer 11383* (HT: MO).

***Masdevallia marthae* Luer &**

**R.Escobar**

Luer 2002; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400 m.

ANT, RIS. Vulnerable (Calderón-

Sáenz 2007).

*Escobar 452* (HT: JAUM).

***Masdevallia mastodon***

**Rchb.f.**

Luer 2001; Calderón-Sáenz &

Farfán 2003; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1830-2850 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-

Sáenz 2007).

*Wagner s.n.* (HT: W).

***Masdevallia medusa* Luer &**

**R.Escobar**

*Alaticaulia medusa* (Luer &

R.Escobar) Luer

Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros

& Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3360 m.

BOY. En Peligro (Calderón-

Sáenz 2007).

*Luer 8025* (HT: SEL).

***Masdevallia mejiana* Garay**

Luer 2000c; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, V Magdalena.

500-2050 m.

ANT. En Peligro (Calderón-

Sáenz 2007).

*Escobar 426* (HT: AMES).

***Masdevallia melanoxantha***

**Linden & Rchb.f.**

*Alaticaulia melanoxantha*

(Linden & Rchb.f.) Luer,

*Masdevallia asperrima* Kraenzl.

Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros

& Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400-2800 m.

BOY, NSA, SAN. Vulnerable

(Calderón-Sáenz 2007).

*Schlim 1166* (HT: W).

***Masdevallia meleagris* Lindl.**

*Rodrigoa meleagris* (Rchb.f.)

Braas

Luer 2003; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700 m.

BOY, CAU, CUN. Vulnerable

(Calderón-Sáenz 2007).

*Hartweg s.n.* (HT: K).

***Masdevallia minuta* Lindl.**

*Acinopetala minuta* (Lindl.)

Luer, *Masdevallia surinamensis*

H.Focke

Luer 2006a; Govaerts *et al.*

2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia.

AMA. Datos Insuficientes

(Calderón-Sáenz 2007).

N Suramérica a Bolivia y Brasil.

*Dawe 243* (K).

***Masdevallia misasii* Braas**

*Masdevallia reflexa* Misas

Luer 2000c; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400 m.

SAN. En Peligro (Calderón-

Sáenz 2007).

*De Laserna s.n.* (HT: JAUM).

***Masdevallia molossus***

**Rchb.f.**

*Masdevallia antioquiensis*

F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia*

*schmidtchenii* Kraenzl.

Luer 2003; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2100 m.

ANT, RIS, VAL. Casi Amenazada

(Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 8816* (SEL).

***Masdevallia mooreana***

**Rchb.f.**

*Byrsella mooreana* (Rchb.f.)

Luer, *Masdevallia atrovioleacea*

Kraenzl., *Masdevallia sororcula*

Rchb.f.

Luer 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2550-2800 m.  
NSA, SAN. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 1844* (SEL).

***Masdevallia mutica* Luer & R.Escobar**

*Fissia mutica* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2300 m.  
RIS, VAL. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 1483* (HT: JAUM).

***Masdevallia ×mystica* Luer**

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 13793* (HT: MO).  
NOTA: sin datos específicos de localidad / no specific locality data.

***Masdevallia navicularis* Garay & Dunst.**

Calderón-Sáenz 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2000 m.  
NSA. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
NE Colombia, NO Venezuela.

***Masdevallia nidifica* Rchb.f.**

*Masdevallia cyathogastra* Schltr.,  
*Masdevallia tenuicauda* Schltr.  
Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Luer 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1300-2260 m.  
ANT, CAU, NSA, VAL.  
Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Nicaragua a N Perú.  
*Luer 10346* (MO).

***Masdevallia niesseniae* Luer**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-1600 m.  
VAL. En Peligro Crítico (Calderón-Sáenz 2007).  
O Colombia.  
*Luer 18189* (HT: MO).

***Masdevallia nivea* (Luer & R.Escobar) Luer & R.Escobar**

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2840 m.  
SAN. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 12960* (HT: MO).

***Masdevallia norae* Luer**

*Alaticaulia norae* (Luer) Luer  
Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 200 m.  
AMA. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
E Colombia a N Suramérica y Brasil (Roraima).  
*Plowman 2430* (AMES).

***Masdevallia odontocera* Luer & R.Escobar**

Luer 2001; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2050 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 7933* (HT: SEL).

***Masdevallia oscarii* Luer & R.Escobar**

Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2000 m.  
CHO. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 849* (HT: JAUM).

***Masdevallia os-draconis* Luer & R.Escobar**

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2200 m.  
ANT, RIS. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 1766* (HT: JAUM).

***Masdevallia pachyantha* Rchb.f.**

*Byrsella pachyantha* (Rchb.f.)  
*Luer, Masdevallia hoppii* Schltr.,  
*Masdevallia pachyantha* var.  
*hoppii* (Schltr.) Kraenzl.  
Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2750-3500 m.  
CAU, NAR. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
NO Colombia.  
*Cross s.n.* (HT: W).

***Masdevallia pachysepala* (Rchb.f.) Luer**

Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2100-3170 m.  
NSA. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Schlim 410* (HT: W).

***Masdevallia pardina* Rchb.f.**

*Masdevallia aequatorialis*  
F.Lehm. & Kraenzl.  
Luer 2000c; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2900-3300 m.  
NAR, PUT. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia a N Ecuador.  
*Chesterton s.n.* (HT: W).

***Masdevallia parvula* Schltr.**

*Masdevallia diversifolia* Kraenzl.,  
*Rodrigoa parvula* (Schltr.) Luer  
Luer 2003; Idárraga *et al.* 2011;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 2000-  
2500 m.  
ANT. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a Bolivia.  
*Escobar 8344* (JAUM, MO).  
NOTA: cultivada en Antioquia /  
cultivated in Antioquia.

***Masdevallia pastinata* Luer**

*Alaticaulia pastinata* (Luer) Luer  
Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros  
& Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 100 m.  
ANT, CHO. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
O Colombia.  
*Luer 18425* (HT: MO).

***Masdevallia peristeria***

**Rchb.f.**

*Byrsella peristeria* (Rchb.f.)  
Luer, *Masdevallia ellipes* Rchb.f.,

*Masdevallia haematosticta*  
Rchb.f., *Masdevallia peristeria*  
subsp. *haematosticta* (Rchb.f.)  
Luer  
Luer 2000c; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1250-2280 m.  
ANT, NAR, RIS. Preocupación  
Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a NO Ecuador.  
*Wallis s.n.* (HT: W).  
*Masdevallia peristeria* subsp.  
*peristeria*

***Masdevallia pescadoensis***

**Luer & R.Escobar**

*Acinopetala pescadoensis* (Luer &  
R.Escobar) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 600-800 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Escobar 1092* (HT: JAUM).

***Masdevallia picturata***

**Rchb.f.**

*Fissia picturata* (Rchb.f.) Luer,  
*Masdevallia cryptocopis* Kraenzl.,  
*Masdevallia meleagris* Rchb.f.,  
*Masdevallia ocanensis* Kraenzl.,  
*Masdevallia picturata* subsp.  
*minor* (Cogn.) Luer, *Masdevallia*  
*picturata* var. *minor* Cogn.,  
*Rodrigoa cryptocopis* (Kraenzl.)  
Braas  
Luer 2003; Luer 2006a; Govaerts  
*et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2800 m.  
ANT, BOY, CAL, CUN, NAR,  
NSA, QUI, RIS, SAN, TOL, VAL.  
Preocupación Menor (Calderón-  
Sáenz 2007).  
Costa Rica a Bolivia; Guyana y  
Venezuela.  
*Viveros 782* (HUQ).

***Masdevallia pileata* Luer &  
Würstle**

Luer 2002; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. Datos  
Insuficientes (Calderón-Sáenz  
2007).  
*Luer 8132* (HT: SEL).  
NOTA: sin datos de colección / no  
collection data.

***Masdevallia planadensis***

**Luer & R.Escobar**

*Rodrigoa planadensis* (Luer &  
R.Escobar) Luer  
Luer 2003; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
NAR. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
S Colombia a C Ecuador.  
*Luer 12488* (HT: MO).

***Masdevallia platyglossa***

**Rchb.f.**

*Byrsella platyglossa* (Rchb.f.)  
Luer, *Lothiania bilabiata*  
Kraenzl., *Masdevallia bilabiata*  
(Kraenzl.) Garay, *Rodrigoa*  
*bilabiata* (Kraenzl.) Braas  
Luer 2000c; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1380-2050 m.  
ANT, SAN. Preocupación Menor  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a Ecuador.  
*Lawrence s.n.* (HT: W).

***Masdevallia posadae* Luer &  
R.Escobar**

*Alaticaulia posadae* (Luer &  
R.Escobar) Luer, *Masdevallia*  
*sijmiana* Königer  
Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros  
& Higgins 2007.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1465 m.  
ANT. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Luer 2936* (HT: SEL; IT: JAUM).

***Masdevallia pteroglossa*  
Schltr.**

*Masdevallia wagneriana* var.  
*colombiana* Braas, *Masdevallia*  
*xerophila* F.Lehm. & Kraenzl.  
Luer 2002; Viveros & Higgins  
2007; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1380-2050 m.  
ANT, CAU. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 10450* (NT: MO).

***Masdevallia pumila* Poepp.  
& Endl.**

*Masdevallia filamentosa*  
Kraenzl., *Masdevallia grandiflora*  
C.Schweinf.  
Luer 2001; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700 m.  
CAU, PUT. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
S Colombia a C Bolivia.  
*Ortiz 442* (COL).

***Masdevallia purpurella* Luer  
& R.Escobar**

Luer 2002; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200-2600 m.  
BOY, SAN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
*Escobar 1469* (HT: JAUM).

***Masdevallia racemosa* Lindl.**

*Masdevallia racemosa* var. *crossii*  
auct., *Spectaculum racemosum*  
(Lindl.) Luer  
Luer 2003; Luer 2006a; Govaerts  
*et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3050-4420 m.  
CAU. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Hartweg 1432* (HT: K).

***Masdevallia renzii* Luer**

Luer 2002; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
CUN. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Renz 8461* (HT: Herb Renz).

***Masdevallia rhinophora* Luer  
& R.Escobar**

Luer 2002; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
NSA. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Luer 16879* (HT: MO).

***Masdevallia rosea* Lindl.**

*Masdevallia echinata* Luer  
& Andreetta, *Masdevallia*  
*rosea* J.H.Veitch, *Masdevallia*  
*rosea* Woolward, *Masdevallia*  
*rosea* subsp. *echinata* (Luer &  
Andreetta) Luer  
Luer 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2550-3200 m.  
NAR. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia a Ecuador.  
*Lehmann 203* (AMES, BM, G, K,  
LE, NY).

***Masdevallia saltatrix* Rchb.f.**

Luer 2002; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1820-2000 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Roezl s.n.* (HT: W).

***Masdevallia sanctae-fidei*  
Kraenzl.**

*Alaticaulia sanctae-fidei*  
(Kraenzl.) Luer, *Masdevallia*  
*dispar* Luer  
Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros  
& Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Magdalena.  
420-1800 m.  
CUN, MET, NSA. Casi  
Amenazada (Calderón-Sáenz  
2007).  
Colombia a Venezuela.  
*Man 1015* (HT: W).

***Masdevallia sanctae-rosae*  
Kraenzl.**

*Pleurothallis sanctae-rosae*  
(Kraenzl.) Garay  
Luer 2000c; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2800 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
*Lehmann 7269* (HT: K).

***Masdevallia sceptrum*  
Rchb.f.**

*Alaticaulia sceptrum* (Rchb.f.)  
Luer, *Masdevallia rechingiana*  
Kraenzl., *Masdevallia schlimii*  
var. *sceptrum* (Rchb.f.)  
Woolward, *Masdevallia*  
*urostachya* Rchb.f.  
Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros  
& Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3900 m.  
BOY, NSA, SAN. Preocupación  
Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
NE Colombia a NO y N  
Venezuela.  
*Schlim 1200* (HT: W).

***Masdevallia schizantha*  
Kraenzl.**

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2100 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

NE Colombia.

*Luer 10327* (NT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Masdevallia schizopetala*  
Kraenzl.**

*Masdevallia morenoi* Luer  
Luer 2000c; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-2000 m.

CAL, RIS, VAL. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Costa Rica a Bolivia.

*Lehmann 3836* (HT: K).

***Masdevallia schlimii* Lindl.**

*Alaticaulia schlimii* (Lindl.)  
*Luer, Masdevallia polyantha*  
Lindl., *Masdevallia schlimii* var.  
*polyantha* (Lindl.) Woolward  
Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400-3200 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

NE Colombia a NO Venezuela.

*Luer 2328* (SEL).

***Masdevallia schmidt-  
mummii* Luer & R.Escobar**

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2600 m.

ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1822* (HT: JAUM).

***Masdevallia scobina* Luer &  
R.Escobar**

*Alaticaulia scobina* (Luer & R.Escobar) Luer

Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2200 m.

ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 1904* (HT: SEL; IT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Masdevallia segurae* Luer &  
R.Escobar**

*Rodrigoa segurae* (Luer & R.Escobar) Braas

Luer 2003; Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2200 m.

ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1601* (HT: JAUM).

***Masdevallia ×senghasiana*  
Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

*Senghas 524* (HT: HEID).

NOTA: sin datos de colección / no collection data.

***Masdevallia sernae* Luer &  
R.Escobar**

*Alaticaulia sernae* (Luer & R.Escobar) Luer, *Masdevallia carolloi* Luer & Andreetta  
Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 700 m.

PUT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

S Colombia a SE Ecuador.  
*Escobar 1820* (HT: JAUM).

***Masdevallia siphonantha*  
Luer**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 17981* (MO).

***Masdevallia stenorhynchos*  
Kraenzl.**

*Alaticaulia stenorhynchos* (Kraenzl.) Luer

Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2100 m.

ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 1682* (NT: SEL).

***Masdevallia ×strumella* Luer**

Luer 2001; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2950 m.

SAN. No evaluada.

*Luer 10180* (HT: MO).

NOTA: híbrido de *M. strumifera* × *M. tubulosa* / a hybrid of *M. strumifera* × *M. tubulosa*.

***Masdevallia strumifera*  
Rchb.f.**

*Masdevallia chrysochaete* F.Lehm. & Kraenzl., *Masdevallia maxillariiformis* F.Lehm. & Kraenzl.

Luer 2001; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3440-3750 m.

ANT, NSA. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

NE Colombia a NO Venezuela;  
N Ecuador.

*Lehmann 2720* (HT: W).

***Masdevallia strumosa***

**P.Ortiz & E.Calderón**

Calderón-Sáenz & Farfán  
2003; Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3190-3200 m.

VAL. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

SO Colombia.

*Calderón 110C* (HT: FMB).

***Masdevallia sumapazensis***

**P.Ortiz**

Luer 2000c; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3200-3300 m.

CUN. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Ortiz 314* (HT: SEL).

***Masdevallia thienii* Dodson**

*Alaticaulia thienii* (Dodson) Luer  
Luer 2000a; Luer 2006a; Idárraga  
*et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 100-800  
m.

ANT?, CHO. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).

Costa Rica a NC Ecuador.

*Haught 5446* (US).

***Masdevallia torta* Rchb.f.**

Luer 2000c; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, V Magdalena.  
100-2500 m.

ANT. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Peláez 251* (HUA).

NOTA: pos. endémica de  
Antioquia, pero se desconoce  
la localidad del tipo / poss.  
endemic to Antioquia but type  
locality is unknown.

***Masdevallia triangularis***

**Lindl.**

Luer 2002; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2590-2800 m.

SAN. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

NO y N Venezuela a Ecuador.

*Schlim 1704* (K, LE).

***Masdevallia tridens* Rchb.f.**

Calderón-Sáenz 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

VAL? Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia, Ecuador.

***Masdevallia trigonopetala***

**Kraenzl.**

Luer 2001; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700 m.

PUT. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).

S Colombia a E Ecuador.

*Lehmann 345* (HT: K).

***Masdevallia trochilus* Linden**

**& André**

*Alaticaulia trochilus* (Linden  
& André) Luer, *Masdevallia*  
*acrochordonia* Rchb.f.,  
*Masdevallia colibri* Burb.,  
*Masdevallia ehippium* Rchb.f.,  
*Masdevallia ehippium* var.  
*acrochordonia* (Rchb.f.)

Woolward

Luer 2000a; Luer 2006a; Viveros  
& Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1750-2500 m.

ANT, CAU. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

C Colombia a C Perú.

*Wallis s.n.* (HT: W).

***Masdevallia tsubotae* Luer**

*Alaticaulia tsubotae* (Luer) Luer  
Luer 2006a; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000 m.

CUN, RIS. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 15515* (HT: MO).

***Masdevallia tubulosa* Lindl.**

*Masdevallia casta* Kraenzl.,  
*Masdevallia stenantha* F.Lehm. &  
Kraenzl., *Masdevallia syringodes*  
Luer & Andreetta, *Masdevallia*  
*tubulosa* subsp. *syringodes* (Luer  
& Andreetta) Luer

Luer 2001; Calderón-Sáenz &  
Farfán 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2900 m.

ANT, CAU, NSA, SAN.

Preocupación Menor (Calderón-  
Sáenz 2007).

NO y N Venezuela a C Perú.

*Luer 7797* (AMES, SEL).

***Masdevallia uncifera* Rchb.f.**

*Masdevallia chrysoneura* F.Lehm.  
& Kraenzl., *Masdevallia flaccida*  
Kraenzl., *Masdevallia pastensis*  
Kraenzl.

Calderón-Sáenz & Farfán 2003;  
Luer 2003; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3500 m.

CAU, NAR, PUT. Casi  
Amenazada (Calderón-Sáenz  
2007).

SO Colombia a N Ecuador.

*Jameson s.n.* (HT: K).

***Masdevallia urceolaris***

**Kraenzl.**

*Masdevallia kalbreyeri* Kraenzl.  
Luer 2001; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2300-3000 m.  
NSA. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Kalbreyer 545* (HT: B, destruido?).

***Masdevallia ustulata* Luer**

Luer 2001; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400-2700 m.  
PUT, SAN. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
NO Colombia a N Perú.  
*Luer 14131* (MO).

***Masdevallia valenciae* Luer & R.Escobar**

Luer 2002; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2900 m.  
NSA. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
NE Colombia.  
*Luer 11309* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Masdevallia vargasii***

**C.Schweinf.**

*Alaticaulia vargasii* (C.Schweinf.) Luer, *Masdevallia megaloglossa* Luer & R.Escobar, *Masdevallia richteri* Pabst  
Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 200-800 m.  
PUT, VAU. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

S Colombia a C Bolivia y Guyana.

*Escobar 1984* (JAUM).

***Masdevallia veleva* Luer**

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 0-100 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Rao 85* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Masdevallia velifera* Rchb.f.**

*Masdevallia valifera* Sphalm, *Masdevallia vilifera* Sphalm.  
Luer 2000c; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2130 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 11303* (MO).

***Masdevallia ventricularia* Rchb.f.**

*Masdevallia ventricularia* var. *brevicaudata* Kraenzl.  
Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2000 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a NO Ecuador.  
*Luer 14209* (MO).

***Masdevallia vieirana* Luer & R.Escobar**

Luer 2000c; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 500 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Luer 13055* (HT: MO).

***Masdevallia villegasii***

**Königer**

Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).  
*Königer WK-96* (HT: M).  
NOTA: sin datos de colección / no collection data.

***Masdevallia virgo-cuencae* Luer & Andretta**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia, Ecuador.

***Masdevallia vittatula* Luer & R.Escobar**

*Spilotantha vittatula* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2002; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1300 m.  
NAR. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia a NO Ecuador.  
*Luer 17983* (HT: MO).

***Masdevallia wendlandiana* Rchb.f.**

*Acinopetala wendlandiana* (Rchb.f.) Luer, *Masdevallia rodrigueziana* Mansf., *Masdevallia ulei* Schltr., *Masdevallia yauaperyensis* Barb. Rodr.  
Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia, Andes. 150-1800 m.  
CAU, VAU. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Bolivia, Venezuela y Brasil.

*Wendland s.n.* (HT: W).

***Masdevallia wuellneri***

**P.Ortiz**

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300-2400 m.

TOL. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Ortiz 1182* (HT: HPUJ).

***Masdevallia wuerstlei* Luer**

*Alaticaulia wuerstlei* (Luer) Luer Luer 1999; Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 8129* (HT: SEL).

NOTA: sin datos de colección / no collection data.

***Masdevallia xanthina***

**Rchb.f.**

*Masdevallia estradae* var. *xanthina* (Rchb.f.) H.J.Veitch, *Masdevallia pallida* (Woolward) Luer, *Masdevallia xanthina* subsp. *pallida* (Woolward) Luer, *Masdevallia xanthina* var. *pallida* Woolward

Luer 2002; Calderón-Sáenz & Farfán 2003; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700-2400 m.

ANT, CAU, NAR. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Ecuador.

*Veitch 165* (HT: W).

***Masdevallia xylina* Rchb.f.**

*Alaticaulia xylina* (Rchb.f.) Luer Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. SN Santa Marta. 600 m.

MAG. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

*Roetzl 717* (HT: W).

***Masdevallia zahlbruckneri***

**Kraenzl.**

*Masdevallia humilis* Luer, *Zahleria zahlbruckneri* (Kraenzl.) Luer

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 785-880 m.

DESCONOCIDO. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Centroamérica a O Ecuador.

*Cogollo 3271* (JAUM).

***Masdevallia zapatae* Luer & R.Escobar**

Luer 2000c; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400-1600 m.

ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 4054* (HT: JAUM).

***Maxillaria Ruiz & Pav.***

144 especies, 63 especies endémicas

***Maxillaria acervata* Rchb.f.**

Hierba.

Nativa. Andes. 1400 m.

CHO, HUI, PUT. No evaluada.

Nicaragua a Colombia.

*Betancur 5255* (COL).

***Maxillaria adscendens* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

CAU. No evaluada.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta; Schlechter la comparó con *M. (Maxillariella) variabilis* / known only from the type; identity uncertain; Schlechter compared it with *M. (Maxillariella) variabilis*.

***Maxillaria aequiloba* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1875-3100 m.

CHO, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Lehmann 3898* (IT: BM, G).

NOTA: hay una acuarela de Lehmann, basada en la colección tipo en K / there is a watercolor by Lehmann based on the type at K.

***Maxillaria albata* Lindl.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 1500-3000 m.

NSA? No evaluada.

Colombia? Venezuela, NO Brasil.

NOTA: esperada; el tipo fue recolectado en Mérida (Venezuela). No hay ejemplares de Colombia / expected; type was collected in Merida (Venezuela); no specimens from Colombia.

***Maxillaria amblyantha* Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600-2700 m.

ANT. No evaluada.

*Kalbreyer 1453* (HT: W).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria anatomorum* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes?

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia?, Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria angustissima*  
Ames et al.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 900 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Nicaragua.  
*Cogollo* 3356 (JAUM, MO).

***Maxillaria antioquiána*  
Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
ANT. No evaluada.  
*Kalbreyer 1531* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria arachnites* Rchb.f.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1860 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Zarucchi 7080* (HUA, MO).  
NOTA: la identidad de los  
especímenes colombianos  
requiere verificación; en  
cualquier caso es esperada,  
pues se encuentra en Venezuela  
y Ecuador / identity of the  
Colombian specimens needs  
verification; in any case, it  
is expected, as it occurs in  
Venezuela and Ecuador.

***Maxillaria attenuata* Ames  
& C.Schweinf.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1650-1800 m.  
CUN, PUT. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.

*Garay 64* (COL).  
NOTA: pos. sinónimo de *M.*  
*guadalupensis* / poss. a synonym  
of *M. guadalupensis*.

***Maxillaria betancurii*  
Christenson**

Christenson 2013.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
CAU, No evaluada

***Maxillaria bolivarensis***

**C.Schweinf.**  
Misas-Urreta 2005; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 700-800 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Perú y Guyana.  
*Cogollo* 2961 (JAUM, MO).  
NOTA: Misas Urreta (2005)  
ilustró esta especie como *M.*  
*marmoliana* / illustrated by  
Misas Urreta (2005) as *M.*  
*marmoliana*.

***Maxillaria bolleoides* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Amazonia. 300 m.  
CAQ. No evaluada.  
*Hopp 104* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria brachybulbon*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Orinoquia? 100 m.  
VIC? No evaluada.  
Honduras a Ecuador y Brasil.  
NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria brachypoda*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del  
tipo; identidad incierta; pos.  
coespecífica o emparentada  
con *Mapinguari longipetiolatus*  
/ known only from the type;  
identity uncertain; pos.  
conspécific or related to  
*Mapinguari longipetiolatus*.

***Maxillaria breviscapa*  
Poepp. & Endl.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Ortiz 395* (HUJ).

***Maxillaria calendulina*  
Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 750 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 93* (B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo,  
de cerca de Barbacoas, Nariño /  
known only from the type, from  
near Barbacoas, Nariño.

***Maxillaria callichroma*  
Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria caloglossa* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: identidad incierta /  
identity uncertain.

***Maxillaria camaridioides***

**Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta; pos. una  
*Maxillariella* / known only from  
the type; identity uncertain.,  
poss. a *Maxillariella*.

***Maxillaria caquetana* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3000 m.

CAQ. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Hopp 53* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria carolii***

**Christenson**

Christenson 2013.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200 m.

CAU, No evaluada.

*Ortiz 478* (HT: HPUJ)

***Maxillaria carrilloi***

**Christenson**

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

***Maxillaria caucae* Garay**

*Maxillaria parvula* Schltr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

CAU. No evaluada.

*Lehmann 103* (HT: B, destruido).

NOTA: identidad incierta; pos.  
*Maxillariella* / identity uncertain,  
poss. *Maxillariella*.

***Maxillaria caulina* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800 m.

NAR. No evaluada.

*Hopp 91* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria chlorantha* Lindl.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes?

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria colombiana***

**Christenson**

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

***Maxillaria colorata* Rchb.f.**

*Maxillaria portillae* Christenson  
& McIlm.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 150 m.

VAU. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Garay 87* (AMES).

***Maxillaria confusa* Ames &**

**C.Schweinf.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, V Magdalena.

100-880 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Belice.

*Hoyos 143* (HUA, MO).

***Maxillaria convencionis***

**Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600 m.

NSA. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Kalbreyer 1006* (HT: W).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria cryptobulbon***

**Carnevali & J.T.Atwood**

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Pacífico.

CHO. No evaluada.

*Misas 334* (HPUJ).

***Maxillaria curvicolonna***

**M.A.Blanco & Neubig**

Blanco *et al.* 2007a.

Hierba, epífita.

Nativa. V Magdalena. 400-700  
m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Panamá.

*Shepherd 440-14* (K).

***Maxillaria cyperifolia***

**(Schltr.) P.Ortiz**

*Ornithidium cyperifolium* Schltr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia. 300 m.

CAQ. No evaluada.

*Hopp 101* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo.  
Identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

**[*Maxillaria densa* Lindl.]**

Misas-Urreta 2005.

NOTA: registro basado en  
identificación errónea; la planta  
ilustrada por Misas Urreta  
(2005), bajo este nombre,  
corresponde a *Camaridium*  
*misasii* / record based on a  
misidentification; the plant  
illustrated by Misas Urreta  
(2005) under this name

corresponds to *Camaridium misasii*.

***Maxillaria deuterocaquetana***

**P.Ortiz**

*Camaridium caquetanum* Schltr.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia, Andes.  
500-530 m.

CAQ. No evaluada.

*Hopp 75 y 106* (ST: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo.  
Identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria deuteropastensis***

**P.Ortiz**

*Ornithidium pastoense* Schltr.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2970-3520 m.

ANT, CAU, HUI, NAR. No  
evaluada.

*Zarucchi 5319* (HUA, MO).

NOTA: identidad incierta /  
identity uncertain.

***Maxillaria diamantensis***

**Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300-2700 m.

SAN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Kalbreyer 1088 y 1121* (ST: W).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria dichotoma***

**(Schltr.) L.O.Williams**

*Camaridium dichotomum* Schltr.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1300-1350 m.

ANT. No evaluada.

Costa Rica a Perú.

*Ramírez 4069* (JAUM, MO).

NOTA: la identidad del  
especimen requiere verificación  
/ voucher identity needs  
verification.

***Maxillaria ecuadorensis***

**Schltr.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes. 1800-  
2700 m.

ANT, CHO, NAR, VAL. No  
evaluada.

*Silverstone-Sopkin 3850* (CUVC,  
MO).

***Maxillaria elata* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia, Andes.  
2500 m.

CAQ. No evaluada.

*Hopp 34* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria elegans* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 530 m.

CAQ. No evaluada.

*Hopp 87* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria elegantula* Rolfe**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 1600-2600 m.

NAR? No evaluada.

S Colombia?, Ecuador, Perú.

NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi y Sucumbíos (Ecuador),  
cerca de la frontera / expected;  
collected in Carchi and  
Sucumbíos (Ecuador), near the  
border.

***Maxillaria embreei* Dodson**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1250-2700 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Callejas 7188* (HUA, MO).

NOTA: pos. coespecífica con *M.*  
*exaltata* / poss. conspecific with  
*M. exaltata*.

***Maxillaria erecta***

**Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

***Maxillaria errata***

**Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-3200 m.

NAR. No evaluada.

Colombia, Perú.

*Lehmann 6155* (HT: K; IT: US).

***Maxillaria erubescens***

**Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Kalbreyer s.n.* (HT: W).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria exaltata***

**(Kraenzl.) C.Schweinf.**

*Camaridium exaltatum* Kraenzl.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 800-2700 m.

ANT, BOY, CAU, CHO, NAR,

PUT, VAL. No evaluada.

Costa Rica a Perú.

*Escobar 2361* (HUA, MO).

***Maxillaria farinifera* Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

CAU. No evaluada.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria farinosa* Arévalo & Christenson**Arévalo *et al.* 2013.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1350-1600 m.

CHO. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Arévalo 734* (HT: COL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Maxillaria fimbriatiloba*****Carnevali & G.A.Romero**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

NSA. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Foster 1763* (COL).***Maxillaria floribunda* Lindl.**Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Sánchez 1664* (MEDEL).***Maxillaria fractiflexa* Rchb.f.**Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes. 1700-2150 m.

ANT, CAU, CHO, NAR? No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Maas 2105* (COL).***Maxillaria friderici-caroli*****P.Ortiz***Ornithidium lehmannii* Kraenzl.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

QUI. No evaluada.

*Lehmann 5197* (HT: HBG).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Maxillaria fucata* Rchb.f.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2200-3000 m.

PUT. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Bristol 1220* (COL).***Maxillaria gentryi* Dodson**

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 50 m.

VAL. No evaluada.

O Colombia y O Ecuador.

*Gentry 35254* (COL, MO).***Maxillaria grandiflora*****(Kunth) Lindl.***Dendrobium grandiflorum*Kunth, *Lycaste grandiflora*

(Kunth) Beer

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes. 2000-3200 m.

CAU, MET, NAR, PUT. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

*Bristol 989* (COL; HUJ).***Maxillaria grandis* Rchb.f.**

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Escobar 1192* (AMES).

NOTA: la identidad del espécimen requiere verificación / voucher identity needs verification.

***Maxillaria grobyoides* Garay & Dunst.**

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Venezuela, Guyana, Brasil, Perú.

NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria guadalupensis* Cogn.**

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes?

DESCONOCIDO. No evaluada.

N Suramérica; Antillas.

NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria gymnochila* Kraenzl.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300 m.

SAN. No evaluada.

*Kalbreyer 901 y 1180* (ST: W).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria hennisiana* Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes,

Pacífico. 0-540 m.

CHO, RIS, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Killip 38950* (COL).***Maxillaria hoppii* Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800 m.

CAQ. No evaluada.

*Hopp 36 y 38* (ST: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria huebschii* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 2200-3000 m.  
CAU, NAR. No evaluada.  
*Ortiz 478* (HPUJ).

***Maxillaria irrorata* Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes? 2600 m.  
NAR? No evaluada.  
S Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en Sucumbíos (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Sucumbíos (Ecuador), near the border.

***Maxillaria jenischiana* (Rchb.f.) C.Schweinf.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Orozco 871* (COL, MEDEL).

***Maxillaria kegelii* Rchb.f.**

*Maxillaria amazonica* Schltr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia? a Guayanas y Brasil.  
NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria lamprochlamys* (Schltr.) P.Ortiz**

*Camaridium lamprochlamys* Schltr.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria lehmannii* Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 2000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
S Colombia a Perú.  
*Lehmann 325* (HT: G; IT: MO).

***Maxillaria lepidota* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 1350-2700 m.  
ANT, CAU, CHO, CUN, NAR, PUT, SAN. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Romero-Castañeda 6800* (COL, HUA).

***Maxillaria leptosepala* Hook.**

Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada, Endémica y cultivada. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
*Misas 165* (HPUJ).

***Maxillaria litensis* Dodson**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 500 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Misas 166* (HPUJ).  
NOTA: ilustrada por Misas Urreta (2005) como *M. confusa* / illustrated by Misas Urreta (2005) as *M. confusa*.

***Maxillaria longissima* Lindl.**

*Maxillaria langlassei* Schltr.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 1350-2750 m.  
ANT, CAU, NAR, VAL. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Cogollo 3688* (JAUM, MO).

***Maxillaria lueri* Dodson**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?, Pacífico?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria luteoalba* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes, Orinoquia. 490-1750 m.  
ANT, BOY, CAS, CHO, CUN, MET, NSA. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Fernández 5917a* (COL).

***Maxillaria luteobrunnea* (Kraenzl.) P.Ortiz**

*Camaridium luteobrunneum* Kraenzl.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
NSA. No evaluada.  
*Kalbreyer 1028* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria macrura* Rchb.f.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2600 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*McPherson 13456* (HUA, MO).

***Maxillaria maderoii* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria marmoliana*****Dodson**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 700-2300 m.

CHO, VAL. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Silverstone-Sopkin 2857* (CUVC, MO).

***Maxillaria melina* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500-1650 m.

ANT, CUN. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Schneider 565* (COL).

***Maxillaria meridensis* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-2725 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, HUI,

NAR, PUT, SAN. No evaluada.

Costa Rica a Venezuela y Bolivia;  
Guadalupe.

*Cuatrecasas 9121* (AMES, COL, HUA).

***Maxillaria microblephara*****Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

ANT. No evaluada.

*Madero s.n.* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria miniata* (Lindl.)****L.O. Williams**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.

1300-2800 m.

MAG, MET, NSA, SAN. No

evaluada.

*Kirkbride 2332* (COL).

***Maxillaria mirabilis* Cogn.**

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: identidad incierta /

identity uncertain.

***Maxillaria modesta* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 530 m.

CAQ. No evaluada.

*Hopp 163* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria muelleri* Regel**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Mueller s.n. ex Hort.* (HT: LE).

NOTA: identidad incierta /  
identity uncertain.

***Maxillaria nanegalensis*****Rchb.f.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 800-2900 m.

ANT, BOY, CAU, CHO, CUN,

HUI, NAR, PUT, RIS, VAL. No  
evaluada.

Colombia a Perú.

*Uribe-Uribe 6654* (COL).

***Maxillaria neophylla* Rchb.f.**

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes. 500-  
2500 m.

ANT, RIS. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Arévalo 651* (COL).

***Maxillaria niesseniae*****Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y  
cultivada. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Phillips s.n.* (HT: CUVC, IT: K).

NOTA: descrita de material  
en cultivo, supuestamente de  
Colombia / described from  
cultivated material, presumably  
from Colombia.

***Maxillaria nigrescens* Lindl.**

*Maxillaria rubrofusca* Klotzsch

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes. 1700  
m.

BOY. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

*García-Barriga 4842* (COL).

***Maxillaria nigrolabia*****Christenson**

Christenson 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

CHO. No evaluada.

***Maxillaria nymphopolitana*****Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: identidad incierta;  
presuntamente de Colombia /  
identity uncertain; presumably  
from Colombia.

***Maxillaria ochroglossa*****Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

NAR. No evaluada.

*Lehmann 115* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria ochroleuca* Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Perú y Brasil.  
*Maxillaria ochroleuca* var.  
*ochroleuca*  
NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria olivacea*  
(Kraenzl.) P.Ortiz**

*Ornithidium olivaceum* Kraenzl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800-3000 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Kalbreyer 1551* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria ortizii*  
Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.

***Maxillaria pachyacron*  
Schltr.**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 1700-  
1900 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
O Colombia a Nicaragua.  
*Misas 354* (HPUJ).  
NOTA: crece a menores  
elevaciones en la serranía del  
Baudó / grows at lower elevations  
in Serranía del Baudó.

***Maxillaria pamplonensis*  
Linden & Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400 m.  
NSA. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schlim 1175* (HT: W).

***Maxillaria parkeri* Hook.**

*Maxillaria hirtilabia* Lindl.,  
*Maxillaria lorifolia* Rchb.f.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia,  
Guayana y Macarena. 150-250 m.  
CAQ, VAU. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Gentry 65290* (MO).

***Maxillaria patens* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida en Colombia  
solo del tipo; identidad incierta  
/ known in Colombia only from  
the type; identity uncertain.

***Maxillaria pentura* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
NO Venezuela a Ecuador.  
*Ospina 73* (JAUM).

***Maxillaria pleiantha* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria pleuranthoides*  
(Schltr.) Garay**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1350-3100 m.

CAU, HUI, MET, NAR, NSA,  
RIS. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Idrobo 3435* (COL).

***Maxillaria plicata* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
CAU. No evaluada.  
*Langlassé 95* (LT: K, IT: AMES,  
G, US).

***Maxillaria podochila*  
Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700 m.  
SAN. No evaluada.  
*Kalbreyer 865* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria porrecta* Lindl.**

*Maxillaria aurantiaca* Schltr.,  
*Maxillaria brunnea* Linden  
& Rchb.f., *Maxillaria glauca*  
W.Baxter  
Misas-Urreta 2005; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Amazonia,  
Andes, Pacífico. 0-2200 m.  
ANT, CAU, CHO, NSA, PUT. No  
evaluada.  
Guatemala a N Suramérica.  
*Cogollo 3044* (JAUM, MO).  
NOTA: Ilustrada por Misas  
Urreta (2005) bajo el sinónimo  
*M. brunnea* / Illustrated by  
Misas Urreta (2005) under the  
synonym *M. brunnea*.

***Maxillaria procurrens* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1870-2200 m.  
ANT, CUN. No evaluada.

*Uribe-Uribe 3477* (COL, MO).  
 NOTA: la identidad del espécimen de Antioquia (1870 m) requiere verificación / identity of the specimen Antioquia (1870 m) needs verification.

***Maxillaria pseudoreichenheimiana* Dodson**

Hierba, epífita.  
 Nativa y cultivada. Andes. 1350-2473 m.  
 CHO, RIS. No evaluada.  
 Colombia y Ecuador.  
*Bernal 954* (COL, MO).

***Maxillaria pulla* Linden & Rchb.f.**

*Maxillaria dalstromii* Dodson  
 Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa y cultivada. Andes.  
 NSA. No evaluada.  
 Venezuela a Bolivia.  
*Schlim 33* (HT: W; IT: K, G).

***Maxillaria quelchii* Rolfe**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa. Andes. 1400 m.  
 CAU. No evaluada.  
 Colombia y Ecuador a Brasil y Surinam.  
*Haught 5180* (COL).

***Maxillaria quercicola* (Schltr.) P.Ortiz**

*Camaridium quercicola* Schltr.  
 Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 1400-1800 m.  
 CUN. No evaluada.  
 Cordillera Oriental.  
*Schultze 21* (HT: B, destruido).  
 NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria quitensis* (Rchb.f.) C.Schweinf.**

Hierba, epífita.  
 Nativa. Andes. 1600-1800 m.  
 CUN, SAN. No evaluada.  
 Colombia a Perú.  
*Lozano 4094* (COL).

**[*Maxillaria ramosa* Ruiz & Pav.]**

Blanco *et al.* 2008.  
 NOTA: nombre mal aplicado a *Ornithidium pendulum* / misnomer for *Ornithidium pendulum*.

***Maxillaria reichenheimiana* Endres & Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa y cultivada. Andes. 800-1200 m.  
 DESCONOCIDO. No evaluada.  
 Costa Rica a Venezuela y Ecuador.  
*Misas 333* (HPUJ).

***Maxillaria rhodoleuca* (Schltr.) P.Ortiz**

*Ornithidium rhodoleucum* Schltr.  
 Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Amazonia. 300 m.  
 CAQ. No evaluada.  
*Hopp 105* (HT: B, destruido).  
 NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria ringens* Rchb.f.**

*Maxillaria shephardii* Rolfe  
 Hierba, epífita.  
 Nativa y cultivada. Pacífico. 80 m.  
 CHO. No evaluada.  
*Shepherd s.n.* (K).

***Maxillaria rubioi* Dodson**

Hierba, epífita.  
 Nativa y cultivada. Pacífico. 50-100 m.  
 VAL. No evaluada.  
 Colombia y Ecuador.  
*Croat 61337* (MO).

***Maxillaria saxicola* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 1500 m.  
 CAQ. No evaluada.  
*Hopp 63 y 193* (ST: B, destruido).  
 NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria schnitteri* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes. 2000 m.  
 CUN. No evaluada.  
 Cordillera Oriental.  
*Schnitter s.n.* (HT: B, destruido).  
 NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria schultzei* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Endémica. Andes, Orinoquia. 500 m.  
 MET. No evaluada.  
*Schultze 8* (HT: B, destruido).  
 NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria setigera* Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
 Hierba, epífita.  
 Nativa. Andes. 650 m.  
 BOY, CHO. No evaluada.  
 N Suramérica.  
*Lung 130* (JAUM, K).  
*Maxillaria setigera* var. *carolii*  
 I.Bock

***Maxillaria silvana* Campacci**

Blanco *et al.* 2007a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 900 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.

*Cogollo* 3356 (JAUM, MO).

NOTA: nuevo registro para Colombia / new record for Colombia.

***Maxillaria speciosa* Rchb.f.**

*Maxillaria scurrilis* Rolfe

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2800 m.

ANT, CAU, CHO, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Ortiz* 4137 (HPUJ, HUA).

***Maxillaria splendens* Poepp. & Endl.**

*Maxillaria buchtienii* Schltr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes? 1600 m.

NAR? No evaluada.

N y C Suramérica.

NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Maxillaria sterrocaulos***

**(Schltr.) P.Ortiz**

*Camaridium sterrocaulon* Schltr.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 530 m.

CAQ. No evaluada.

*Hopp* 132 (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria striata* Rolfe**

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes. 700 m.

PUT. No evaluada.

S Colombia a Perú.

*Fernández* 11476 (COL).

***Maxillaria strictifolia* P.Ortiz**

*Maxillaria angustifolia* Schltr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

CAU. No evaluada.

*Lehmann* 4233 (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo. Pos. coespecífica con *M. variabilis* / known only from the type; poss.conspecific with *M. variabilis*.

***Maxillaria strictissima* (Kraenzl.) P.Ortiz**

*Ornithidium strictissimum* Kraenzl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300 m.

ANT. No evaluada.

*Kalbreyer* 1324 (HT: W).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria subpandurata* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-1800 m.

ANT. No evaluada.

*Lehmann* 4126 (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria sulfurea* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Schultze* 10 (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillaria tectasepala* Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

***Maxillaria tenebrifolia* Arévalo & Christenson**

Arévalo *et al.* 2013.

Hierba.

Endémica. Andes. 1900-2500 m.

RIS. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Arévalo* 454 (HT: COL).

***Maxillaria tenuis* C.Schweinf.**

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Amazonia, Guayana y Macarena. 180-500 m.

GUV, VAU. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil, Perú.

*Mora* APA-131 (COL).

***Maxillaria tocotana* Schltr.**

*Maxillaria stenophylla* F.Lehm. & Kraenzl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500 m.

BOY, CUN, VAL. No evaluada.

*Lehmann* 4533 (HT: W, IT: US, LE).

***Maxillaria torifera* (Schltr.) P.Ortiz**

*Ornithidium toriferum* Schltr.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria triloris* E.Morren**

Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: esperada; conocida de  
Venezuela y Ecuador / expected;  
Venezuela and Ecuador known.

***Maxillaria tristis* Schltr.**

*Maxillaria steyermarkii* Foldats  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 137* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Maxillaria truncatilabia*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 1996* (HT: B,  
destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria unguiculata*  
Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria unguilabia* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 125a* (HT: B,  
destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria vallisnerioides*  
Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.

***Maxillaria venusta* Linden &  
Rchb.f.**

*Maxillaria kalbreyeri* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes? 1800  
m.  
NSA? No evaluada.  
Colombia?, N Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Maxillaria verecunda* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Amazonia, Andes.  
550 m.  
CAQ. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Hopp 84* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria vestita* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 800 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 92* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Maxillaria virguncula*  
Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1800 m.  
CAU, CUN, PUT. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Betancur 5541* (COL).

***Maxillaria wojii* Christenson**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada, Endémica y  
cultivada. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Klikunas s.n.* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
descrita de material en cultivo,  
supuestamente de Colombia  
/ known only from the type;  
described from cultivated  
material, presumably from  
Colombia.

***Maxillaria xylobiiflora*  
Schltr.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 50-500 m.  
CHO, GUV. No evaluada.  
*Arévalo 228* (COL).

***Maxillariella* M.A.Blanco &  
Carnevali**

17 especies, 1 especie endémica

***Maxillariella alba* (Hook.)  
M.A.Blanco & Carnevali**

*Dendrobium album* Hook.,  
*Maxillaria alba* (Hook.) Lindl.  
Misas-Urreta 2005; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Amazonia, Andes, Orinoquia, Pacífico. 0-1850 m.  
ANT, CHO, GUI, MET. No evaluada.  
Neotrópico.  
*Marulanda* 702 (HUA, MO).

***Maxillariella brevifolia* (Lindl.) M.A.Blanco & Carnevali**

*Camaridium brevifolium* Lindl., *Maxillaria brevifolia* (Lindl.) Rchb.f.  
Atwood 2003b; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-3000 m.  
ANT, CAU, HUI, PUT, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Escobar* 5278 (HUA, MO).

***Maxillariella caespitifica* (Rchb.f.) M.A.Blanco & Carnevali**

*Maxillaria caespitifica* Rchb.f.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Nicaragua, Ecuador, Surinam, Guayana Francesa.  
NOTA: esperada / expected.

***Maxillariella cassapensis* (Rchb.f.) M.A.Blanco & Carnevali**

*Maxillaria cassapensis* Rchb.f.  
Atwood 2003b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1300-2500 m.  
ANT, CAL, CAU, CUN, HUI, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Zarucchi* 6124 (MO).

***Maxillariella caucana* (Schltr.) M.A.Blanco & Carnevali**

*Maxillaria caucana* Schltr.  
Blanco *et al.* 2007b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo; identidad incierta / known only from the type; identity uncertain.

***Maxillariella densifolia* (Poepp. & Endl.) M.A.Blanco & Carnevali**

*Dicrypta densifolia* Poepp. & Endl., *Maxillaria densifolia* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 1050 m.  
NAR?, PUT? No evaluada.  
S Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en Sucumbíos (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Sucumbíos (Ecuador), near the border.

***Maxillariella funicaulis* (C.Schweinf.) M.A.Blanco & Carnevali**

*Maxillaria funicaulis* C.Schweinf.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 2050-2600 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Gómez* 194 (HUA, MO).

***Maxillariella graminifolia* (Kunth) M.A.Blanco & Carnevali**

*Camaridium graminifolium* (Kunth) Rchb.f., *Isochilus graminifolius* Kunth, *Maxillaria graminifolia* (Kunth) Rchb.f., *Maxillaria polyphylla* Rchb.f.

Atwood 2003b; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700-3300 m.  
ANT, CAU, CUN, SAN, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Allen* 2996 (MO).

***Maxillariella guareimensis* (Rchb.f.) M.A.Blanco & Carnevali**

*Maxillaria guareimensis* Rchb.f., *Maxillaria heraldica* Rchb.f.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 1590 m.  
ANT. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Betancur* 922 (HUA, MO).

***Maxillariella lawrenceana* (Rolfe) M.A.Blanco & Carnevali**

*Maxillaria lawrenceana* (Rolfe) Garay & Dunst.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2620-2800 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Schneider* 73/1 (COL, HPUJ).

***Maxillariella longibracteata* (Lindl.) M.A.Blanco & Carnevali**

*Camaridium caucanum* Schltr., *Maxillaria deuterocaucana* P.Ortiz, *Maxillaria longibracteata* (Lindl.) Rchb.f.  
Atwood 2003b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2200 m.  
CAU. No evaluada.  
S Colombia a Perú.  
*Linden* 633 (G).

***Maxillariella pastensis*  
(Rchb.f.) M.A.Blanco &  
Carnevali**

*Maxillaria pastensis* Rchb.f.  
Reichenbach 1855.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Jameson 496* (HT: W; IT: K, LE).

***Maxillariella ponerantha*  
(Rchb.f.) M.A.Blanco &  
Carnevali**

*Maxillaria ponerantha* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Perú y Guayana  
Francesa.  
*Misas 156* (HPUJ).

***Maxillariella procurrens*  
(Lindl.) M.A.Blanco &  
Carnevali**

*Idárraga et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 1870-  
2800 m.  
ANT, BOY, CAS, CUN. No  
evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Cuatrecasas 1823* (COL).

***Maxillariella spilotantha*  
(Rchb.f.) M.A.Blanco &  
Carnevali**

*Maxillaria spilotantha* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 2700 m.  
NAR? No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Sucumbíos (Ecuador), cerca de  
la frontera / expected; collected  
in Sucumbíos (Ecuador), near  
the border.

***Maxillariella stenophylla*  
(Rchb.f.) M.A.Blanco &  
Carnevali**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700-2780 m.  
NAR? No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Lehmann 4533* (MO).  
NOTA: la identidad del  
especimen requiere verificación;  
en cualquier caso es esperada,  
pues ha sido recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / voucher identity needs  
verification; in any case it is  
expected, as it has been collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Maxillariella variabilis*  
(Lindl.) M.A.Blanco &  
Carnevali**

*Maxillaria variabilis* Lindl.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

***Mesadenella Pabst & Garay***  
1 especie

***Mesadenella cuspidata*  
(Lindl.) Garay**

*Cyclopogon albopunctatus* Barb.  
Rodr., *Cyclopogon cuspidatus*  
(Lindl.) Schltr., *Gyrostachys*  
*cuspidata* (Lindl.) Kuntze,  
*Mesadenella esmeraldae* (Linden  
& Rchb.f.) Pabst & Garay,  
*Spiranthes cuspidata* Lindl.,  
*Spiranthes esmeraldae* Linden  
& Rchb.f., *Stenorrhynchos*  
*esmeraldae* (Linden & Rchb.f.)  
Cogn.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.

Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Caribe,  
Orinoquia, V Magdalena. 200-  
1465 m.  
CUN, GUJ, MET, PUT. No  
evaluada.  
Suramérica.  
*Jaramillo 7742* (COL).

***Microchilus C.Presl***

59 especies, 47 especies  
endémicas

***Microchilus aguindae*  
Ormerod**

Ormerod 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 900 m.  
NAR?, PUT? No evaluada.  
S Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Sucumbíos (Ecuador), cerca de  
la frontera / expected; collected  
in Sucumbíos (Ecuador), near  
the border.

***Microchilus alzatei* Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes, V Cauca. 800-  
1300 m.  
ANT. No evaluada.  
*Cogollo 2265* (HT: MO; IT: HUA,  
JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus andrei* Ormerod**

Ormerod 2009b.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1300 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia.  
*André 3305* (HT: K, la planta de  
la derecha).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus aspidogynoides*

**Ormerod**

Ormerod 2009b.  
Hierba.  
Endémica. Pacífico. 200-500 m.  
VAL. No evaluada.  
*Lehmann s.n.* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus boyacanus*

**Ormerod**

Ormerod 2013.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
BOY. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Lawrance 324* (HT: AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus bravocollinus*

**Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1770-2050 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Fonnegra 4385* (HT: NY; IT:  
COL, HUA, NY).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus callejasii*

**Ormerod**

Ormerod 2013.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Callejas 6357* (HT: GH; IT:  
HUA?).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus canaliculatus*

**Ormerod**

Ormerod 2009b.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1430 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Hugh-Jones 117* (HT: US; IT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus caucanus*

**(Schltr.) Ormerod**

*Erythrodes caucana* (Schltr.)  
Ames, *Physurus caucanus* Schltr.  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (T: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus chicalensis*

**Ormerod**

Ormerod 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 1200 m.  
NAR? No evaluada.  
S Colombia, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

*Microchilus constrictus*

**Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 300-600  
m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia, Brasil, Perú.  
*Lehmann 8169* (AMES, K, NY).  
NOTA: conocida en Colombia  
solo de una colección / known

in Colombia from a single  
collection.

*Microchilus cundinamarcae*

**Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007;  
Ormerod 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schneider 567* (HT: S; IT: COL).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus dolichostachys*

**(Schltr.) Ormerod**

*Erythrodes dolichostachys*  
(Schltr.) Ames, *Physurus*  
*dolichostachys* Schltr.  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (T: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus dryanderae*

**Ormerod**

Ormerod 2009a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
VAL. No evaluada.  
*Dryander 286* (HT: US).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

*Microchilus erythrodooides*

**(Schltr.) Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1090-1215 m.  
ANT, TOL. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Cogollo 3567* (JAUM, MO).  
*Microchilus erythrodooides* subsp.  
*venadosae* Ormerod

*Microchilus fosbergii***Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 2200 m.

HUI. No evaluada.

*Fosberg 19627* (HT: AMES).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus frontinoensis***Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 1990 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Zarucchi 7216* (HT: MO; IT: COL, HUA).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus gentryi* Ormerod

Ormerod 2008; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 1950-2050 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Gentry 48150* (HT: MO; IT: COL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus giraldo-gensinii***Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 1900 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Giraldo-Gensini 277* (HT: MO; IT: TULV).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus globosus***Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 2000-2300 m.

SAN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Killip 16654* (HT: AMES).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus haughtii***Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 1700 m.

CES. No evaluada.

Serranía de Perijá.

*Haught 4076* (HT: AMES; IT: COL, K).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus huangobioensis***Ormerod**

Ormerod 2009b.

Hierba.

Endémica. Andes. 1700 m.

CAU. No evaluada.

*Lehmann 77* (HT: AMES; IT: AMES, G, K, NY).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus hughjonesii***Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 610 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Hugh-Jones 159* (HT: K; IT: COL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus ibaguensis***Ormerod**

Ormerod 2009b.

Hierba.

Endémica. Andes. 1200-1280 m.

TOL. No evaluada.

Cordillera Central.

*Linden 1282* (HT: K; IT: P).

*Microchilus kuduyariensis***Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes, Guayana y Macarena. 200-1750 m.

BOY, VAU. No evaluada.

*Barclay 636* (HT: AMES).

*Microchilus libanoensis***Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 1200-1500 m.

TOL. No evaluada.

Cordillera Central.

*Pennell 3255* (HT: AMES; IT: NY, US).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

*Microchilus longiflorus***Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes? 1330 m.

NAR? No evaluada.

S Colombia?, Ecuador.

NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Microchilus madrinanii***

**Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. SN Santa Marta. 700-1400 m.

MAG. No evaluada.

*Madrián 168* (HT: AMES; IT: COL).

***Microchilus major* C.Presl**

*Erythodes major* (C.Presl) Ames, *Erythodes preslii* Dodson & P.M.Dodson, *Physurus major* (C.Presl) Schltr., *Physurus preslii* Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico, SN Santa Marta, V Cauca, V Magdalena. 300-2250 m.

ANT, CAL, CAU, CHO, CUN, HUI, MAG, NAR, QUI, VAL. No evaluada.

Venezuela a Perú y a Surinam. *Idrobo 8719* (COL).

***Microchilus marulandae***

**Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 1950 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Marulanda 102* (HT: MO; IT: HUA).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Microchilus micayvallis***

**Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 1400-1500 m.

CAU. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Killip 7725* (HT: AMES).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Microchilus microcalcar***

**Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 2130-2400 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Central.

*Luer 11316* (HT: MO).

***Microchilus nugax* Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007; Ormerod 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 1800-2100 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Central.

*Killip 6134* (HT: AMES; IT: GH, NY).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Microchilus ortgiesii***

**(Rchb.f.) Ormerod**

Ormerod 2002; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

*Van Houtte s.n.* (T: ?).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Microchilus ovalis* Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007; Ormerod 2007.

Hierba.

Nativa. Pacífico?

CHO? No evaluada.

NO Colombia?, Panamá.

NOTA: esperada; recolectada en Darién (Panamá), cerca de la frontera / expected; collected

in Darién (Panama), near the border.

***Microchilus paleaceus***

**(Schltr.) Ormerod**

*Erythodes paleacea* (Schltr.) Ames, *Physurus paleaceus* Schltr.

Dueñas 2002; Ormerod 2002; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 1680-1720 m.

CAU. No evaluada.

Guyana a Perú.

*Pennell 8295* (NT: AMES; INT: K).

***Microchilus paraisoensis***

**Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007; Ormerod 2007.

Hierba.

Endémica. Andes. 1400 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Køie 4583* (HT: C).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Microchilus perijanus***

**Ormerod**

Ormerod 2009a.

Hierba.

Nativa. Andes. 2375 m.

CES. No evaluada.

NE Colombia y prob.O

Venezuela.

*Grant 10766* (HT: US).

NOTA: conocida solo del tipo; recolectada en la sierra de Perijá, a 5 km de la frontera con Venezuela / known only from the type; collected in Sierra de Perijá, 5 km from the border with Venezuela.

***Microchilus platysepalus***

**Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.  
Endémica. Andes. 2600-3000 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Killip 15956* (HT: AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus procerus*****(Schltr.) Ormerod**

*Erythodes procerus* (Schltr.)  
Ames, *Physurus procerus* Schltr.  
Ormerod 2004; Dueñas &  
Fernández 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes, SN Santa  
Marta. 1420-2200 m.  
ANT, CES, HUI, MAG, VAL. No  
evaluada.  
Colombia.  
*Smith 2278* (IT: MO).

***Microchilus pseudocaucanus*****Ormerod**

Ormerod 2009b.  
Hierba.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Lehmann 6498* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo, sin  
datos de localidad / known only  
from the type, without locality  
data.

***Microchilus pseudominor*****Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas &  
Fernández 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1750-2100 m.  
BOY, SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Killip 19451* (HT: AMES).

***Microchilus putumayoensis*****Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas &  
Fernández 2007.

Hierba.  
Endémica. Andes. 850-1420 m.  
PUT. No evaluada.  
*Ospina-Hernández 119* (HT:  
AMES).

***Microchilus quadratus*****(Garay) Ormerod**

*Erythodes quadrata* Garay  
Dueñas 2002; Ormerod 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1700-2100 m.  
CES. No evaluada.  
Serranía de Perijá.  
*Cuatrecasas 25336* (COL).

***Microchilus queremalensis*****Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1450-1480 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Croat 80441* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus quetamensis*****Ormerod**

Ormerod 2013.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1550 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schneider 415* (HT: AMES; IT:  
AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus rioesmeraldae*****Ormerod**

Ormerod 2005; Dueñas &  
Fernández 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 500 m.  
CÓR. No evaluada.

Colombia.  
*Pennell 4498* (HT: AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus schneideri*****Ormerod**

Ormerod 2013.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1650 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schneider 430* (HT: AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus scrotiformis*****(C.Schweinf.) Ormerod**

*Erythodes scrotiformis*  
C.Schweinf.  
Dueñas 2002; Ormerod 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1450-2900 m.  
ANT, NSA, QUI. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Cuatrecasas 12750* (HT: COL).

***Microchilus sparreorum*****(Garay) Ormerod**

*Erythodes sparreorum* Garay  
Dueñas 2002; Ormerod 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa. Pacífico. 20-30 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Cabrera 16217* (CUVC).

***Microchilus subquadratus*****Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007;  
Ormerod 2007.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 730-900  
m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Forero 7166* (COL).

***Microchilus tequendamae***

**Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007;  
Ormerod 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2400-2500 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schneider 156* (HT: S; IT: NY,  
COL).

***Microchilus trianae***

**Ormerod**

Ormerod 2009b.  
Hierba.  
Endémica. Andes.  
NAR. No evaluada.  
*Triana 1547* (HT: P).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus valdivianus***

**Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Callejas 11082* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus ventosus***

**Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1650-1810 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Callejas 8281* (HT: NY).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus vilnerae***

**Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas &  
Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes, V Cauca.  
1600-2200 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Lehmann 2925* (HT: BM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus xeranthum***

**Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007;  
Ormerod 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 900 m.  
CAU. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Von Sneidern 369* (HT: S).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus zeuxinoides***

**(Schltr.) Ormerod**

*Erythrodus zeuxinoides* (Schltr.)  
Ames, *Physurus zeuxinoides*  
Schltr.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Microchilus zingarae***

**Ormerod**

Ormerod 2008; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Giraldo-Gensini 361* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Miltoniopsis* God.-Leb.**

4 especies, 1 especie endémica

***Miltoniopsis phalaenopsis*  
(Linden & Rchb.f.) Garay &  
Dunst.**

*Miltonia phalaenopsis* (Linden  
& Rchb.f.) G.Nicholson,  
*Odontoglossum phalaenopsis*  
Linden & Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 100-2000 m.  
BOY, CUN, NSA, SAN.  
Vulnerable (Calderón-Sáenz  
2007).  
Colombia.  
*Chaparro 223* (COL).

***Miltoniopsis roezlii* (Rchb.f.)  
God.-Leb.**

*Miltoniopsis santanae* Garay &  
Dunst., *Odontoglossum roezlii*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-1000  
m.  
ANT, CHO, VAL. Preocupación  
Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Panamá a Ecuador.  
*Fernández 326* (COL).

***Miltoniopsis vexillaria*  
(Rchb.f.) God.-Leb.**

*Odontoglossum vexillarium*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1060-1950 m.  
ANT, CAL, CUN, HUI, NAR,  
RIS, VAL. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 4227* (HPUJ).

***Miltoniopsis warszewiczii***  
**(Rchb.f.) Garay & Dunst.**

*Miltonia endresii* G.Nicholson,  
*Odontoglossum warszewiczii*  
Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-2000 m.

ANT, CHO. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Costa Rica.

*Uribe 318* (COL).

***Monophyllorchis* Schltr.**

1 especie

***Monophyllorchis***  
***microstyloides* (Rchb.f.)**

**Garay**

*Monophyllorchis maculata* Garay  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes. 200-1200 m.

CAU, NAR. No evaluada.

Nicaragua a O Ecuador.

*Idrobo 2330* (COL).

***Mormodes* Lindl.**

19 especies, 11 especies  
endémicas

***Mormodes andreettae***

**Dodson**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 700-1500 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

***Mormodes buccinator* Lindl.**

*Mormodes lentiginosa* Hook.

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes,

Orinoquia. 450-2550 m.

BOY, MET. No evaluada.

México a Venezuela.

*Idrobo 884/1* (AMO, COL).

***Mormodes cartonii* Hook.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Caribe. 40 m.

MAG. No evaluada.

Panamá a Venezuela.

*Purdie s.n.* (HT: K).

***Mormodes chrysantha***

**Salazar**

Ortiz, P. 2000; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000 m.

BOY. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Lawrance 518* (F, MO).

***Mormodes claesiana* Pabst**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

*Claes 143* (HT: K?).

***Mormodes convoluta* Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. SN Santa Marta.

MAG. No evaluada.

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Mormodes dayana* Rchb.f.**

*Mormodes cogniauxii* L.Linden,  
*Mormodes schultzei* Schltr.

Ortiz, P. 2000.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500-2300 m.

BOY, CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Lawrance 430* (AMES).

***Mormodes escobarii* Pabst**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Escobar 528* (HT: HB).

***Mormodes ignea* Lindl. &  
Paxton**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Centroamérica a Colombia.

***Mormodes lawrenceana***  
**Rolfe**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800 m.

CAL. No evaluada.

Colombia.

***Mormodes mejiae* Pabst**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

*Escobar 355* (HT: HB).

***Mormodes oberlanderiana***  
**F.Lehm. & Kraenzl.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 500 m.

BOY, MET. No evaluada.

***Mormodes orinocoensis***  
**Salazar & G.A.Romero**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena?

GUI? No evaluada.

NOTA: esperada / expected.

***Mormodes rolfeana* L.Linden**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Escobar 318* (AMES).

***Mormodes speciosa* Lindl. & Paxton**

*Mormodes ocaanae* Linden & Rchb.f., *Mormodes ocaanae* var. *brachylobum* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 100-2000 m.  
CHO, HUI, NSA, SAN. No evaluada.  
*Ortiz 472* (HPUJ).

***Mormodes theiochlora* (Rchb.f.) Salazar**

*Mormodes buccinator* var. *theiochlora* Rchb.f.  
Ortiz, P. 2000; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, V Magdalena. 500-1000 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5260* (AMES, MO).  
NOTA: tratada por Govaerts *et al.* (2012) como sinónimo de *M. buccinator* / treated by Govaerts *et al.* (2012) as a synonym of *M. buccinator*.

***Mormodes tibicen* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 419* (AMES).

***Mormodes variabilis* Rchb.f.**

*Mormodes holochrysa* Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 100-1100 m.  
ANT, CAL, CHO. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Ortiz 736* (HPUJ).

***Mormodes vinacea* Hoehne**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Misas 192* (HPUJ).

***Mormolyca Fenzl***

9 especies, 3 especies endémicas

***Mormolyca acutifolia* (Lindl.) M.A.Blanco**

*Maxillaria acutifolia* Lindl.  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
*Misas 171* (HPUJ).

***Mormolyca aureoglobula* (Christenson) M.A.Blanco**

*Maxillaria aureoglobula* Christenson  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Hort. Orquideas del Valle s.n.* (HT: CUVU).  
NOTA: conocida solo del tipo; descrita de material en cultivo, supuestamente de Colombia / known only from the type; described from cultivated material, presumably from Colombia.

***Mormolyca gracilipes* (Schltr.) Garay & Wirth**

*Cyrtoglottis gracilipes* Schltr.

Garay & Wirth 1959.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 1200 m.  
CAU. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Lehmann 813* (AMES).

***Mormolyca hedwigiae* (Hamer & Dodson)**

**M.A.Blanco**  
*Maxillaria hedwigiae* Hamer & Dodson  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes, Pacífico. 500 m.  
CHO. No evaluada.  
O Colombia a México.  
*Misas 173* (HPUJ).

***Mormolyca lehmanii* (Rolfe) M.A.Blanco**

*Chrysocycnis lehmanii* Rolfe  
Sweet 1971; Blanco *et al.* 2007b; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2060-2600 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Zarucchi 6133* (HUA, MO).

***Mormolyca rufescens* (Lindl.) M.A.Blanco**

*Maxillaria abelei* Schltr., *Maxillaria rufescens* Lindl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes, Guayana y Macarena, Pacífico. 0-1750 m.  
CHO, CUN, GUI, HUI, NSA. No evaluada.  
México a Guayana Francesa y Bolivia.  
*Romero-Castañeda 6610* (COL).

***Mormolyca sanantonioensis* (Christenson) M.A.Blanco***Maxillaria sanantonioensis*

Christenson

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

VAL. No evaluada.

*Orquideas del Valle s.n.* (HT: CUVIC).

NOTA: conocida solo del tipo; descrita de material en cultivo, supuestamente de Colombia / known only from the type; described from cultivated material, presumably from Colombia.

***Mormolyca schlimii* (Linden & Rchb.f.) M.A.Blanco***Chrysocynis schlimii* Linden & Rchb.f.Sweet 1971; Blanco *et al.* 2007b.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-2640 m.

ANT, CAU, NSA, SAN, VAL. No evaluada.

NO Venezuela a Ecuador.

*González 800* (AMES, COL).***Mormolyca tenuibulba* (Christenson) M.A.Blanco***Maxillaria tenuibulba*

Christenson

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada, Endémica y cultivada. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Christenson 1998* (HT: K).

NOTA: conocida solo del tipo; descrita de material en cultivo, supuestamente de Colombia / known only from the type; described from cultivated material, presumably from Colombia.

***Myoxanthus Poepp. & Endl.***

14 especies, 4 especies endémicas

***Myoxanthus affinis* (Lindl.)****Luer***Humboldtia affinis* (Lindl.)Kuntze, *Humboldtia rigidifolia*(Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis**affinis* Lindl., *Pleurothallis**furfuracea* F.Lehm. & Kraenzl.,*Pleurothallis rigidifolia* Rchb.f.

Luer 1992; Viveros &amp; Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Panamá a Bolivia.

*Core 1312* (NY).***Myoxanthus ceratohallii* (Rchb.f.) Luer***Dubois-reymondia lancipetala*H.Karst., *Humboldtia**ceratohallii* (Rchb.f.) Kuntze,*Myoxanthus herzogii* (Schltr.)Luer, *Pleurothallis ceratohallii*Rchb.f., *Pleurothallis herzogii*Schltr., *Pleurothallis lancipetala*(H.Karst.) Schltr., *Pleurothallis**longipes* Körn.

Luer 1992; Viveros &amp; Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2200-3200 m.

CAU, NAR, NSA, SAN. No

evaluada.

Colombia a Bolivia; Guyana y

Venezuela.

*Pennell s.n.* (AMES, K).***Myoxanthus cimex* (Luer & R.Escobar) Luer***Pleurothallis cimex* Luer &

R.Escobar

Luer 1992; Viveros &amp; Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2300 m.

CAU, RIS. No evaluada.

*Luer 2321* (HT: JAUM).***Myoxanthus epibator* Luer & R.Escobar**

Luer 1992; Viveros &amp; Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 14312* (HT: MO).***Myoxanthus exasperatus* (Lindl.) Luer***Anathallis parahybunensis* Barb.Rodr., *Humboldtia exasperata*(Lindl.) Kuntze, *Humboldtia**peduncularis* (Lindl.) Kuntze,*Myoxanthus parahybunensis*(Barb.Rodr.) Luer, *Pleurothallis**exasperata* Lindl., *Pleurothallis**macropus* Schltr., *Pleurothallis**peduncularis* Lindl.

Luer 1992; Viveros &amp; Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-1850 m.

ANT, BOY, CAU. No evaluada.

Centroamérica a Suramérica tropical.

*De Escobar 3400* (MO).***Myoxanthus hirtipes* (Schltr.)****Luer***Pleurothallis hirtipes* Schltr.

Viveros &amp; Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

CAU. No evaluada.

*Madero s.n.* (?).

NOTA: tipo no localizado / type not located.

***Myoxanthus hystrix* (Rchb.f.)****Luer***Humboldtia hystrix* (Rchb.f.)Kuntze, *Pleurothallis hystrix*Rchb.f., *Pleurothallis lonchophylla*

Rchb.f.

Luer 1992; Viveros &amp; Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300-2500 m.  
CAU, NSA. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela.  
*Lehmann 3613 (G).*

***Myoxanthus melittanthus***  
**(Schltr.) Luer**

*Pleurothallis melittantha* Schltr.  
Luer 1992; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2900-3200 m.  
CAU, CUN, NAR. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Hernández 882 (COL).*

***Myoxanthus monophyllus***  
**Poepp. & Endl.**

*Humboldtia poeppigii* (Lindl.)  
Kuntze, *Pleurothallis myoxanthus*  
Schltr., *Pleurothallis poeppigii*  
Lindl.  
Luer 1992; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
CAU, VAL. No evaluada.  
SO Colombia a N Perú.  
*André 2553 (K).*

***Myoxanthus montanus***  
**P.Ortiz**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1750 m.  
CUN. No evaluada.  
*Ortiz 937 (HT: HPUJ).*

***Myoxanthus reymondii***  
**(H.Karst.) Luer**

*Duboisia reymondii* H.Karst.,  
*Dubois-reymondia palpigera*  
H.Karst., *Humboldtia reymondii*  
(H.Karst.) Kuntze, *Pleurothallis*  
*palpigera* (H.Karst.) Schltr.,  
*Pleurothallis reymondii*  
(H.Karst.) Rchb.f.  
Luer 1992; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1740-2400 m.  
ANT, CAU, MAG, NSA. No  
evaluada.  
Colombia a Perú; Venezuela.  
*Luer 9056 (MO, SEL).*

***Myoxanthus speciosus* (Luer)**  
**Luer**

*Pleurothallis speciosa* Luer  
Luer 1992; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800-2900 m.  
CUN. No evaluada.  
Costa Rica a Venezuela.  
*Schneider 168 (AMES).*

***Myoxanthus trachychlamys***  
**(Schltr.) Luer**

*Pleurothallis cymbicalli* Pabst,  
*Pleurothallis trachychlamys*  
Schltr.  
Luer 1992; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Pacífico. 200-  
600 m.  
AMA, CAU, VAL. No evaluada.  
Centroamérica a Suramérica  
tropical.  
*Schultes 8584 (AMES).*

***Myoxanthus uxorius* (Luer)**  
**Luer**

*Pleurothallis uxoria* Luer  
Luer 1992; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Teague s.n. (MO).*

***Myrmecophila Rolfe***  
2 especies

***Myrmecophila brysiana***  
**(Lem.) G.C.Kenn.**

*Schomburgkia brysiana* Lem.  
Carnevali *et al.* 2001.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Islas Caribeñas. 0-50 m.  
SAP. No evaluada.  
Guatemala a Costa Rica;  
Colombia.  
*Lowy 211 (COL).*

***Myrmecophila humboldtii***  
**(Rchb.f.) Rolfe**

Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe. 250-432 m.  
GUJ. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Aruba.  
*Bernal 4 (COL).*

***Myrosmodes Rchb.f.***

9 especies, 2 especies endémicas

***Myrosmodes cleefii* Szlach.**  
**et al.**

Mytnik-Ejsmont *et al.* 2012;  
Szlachetko *et al.* 2014.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 4300 m.  
MET. En Peligro Crítico  
(Mytnik-Ejsmont *et al.* 2012).  
Cordillera Oriental.  
*Cleef 1298 (HT: COL).*  
NOTA: conocida solo del tipo.  
Erróneamente descrita como  
*cleefii* / known only from the  
type; erroneously described as  
*cleefii*.

***Myrosmodes cochleare* Garay**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007;  
Szlachetko *et al.* 2014.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 3650 m.  
ANT. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Ospina 56 (JAUM).*

***Myrosmodes nubigenum*****Rchb.f.**Szlachetko *et al.* 2014.

Hierba.

Nativa. Andes?

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela, Ecuador, Perú.

NOTA: esperada / expected.

***Myrosmodes paludosum*****(Rchb.f.) P.Ortiz***Aa paludosa* (Rchb.f.) Schltr.,*Altensteinia paludosa* Rchb.f.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007;

Szlachetko *et al.* 2014.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.

3017-4350 m.

ANT, ARA, BOY, CAU, CES,

MAG, MET, SAN. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

Aguirre 889 (COL).

NOTA: a veces erróneamente escrito *paludosa* / erroneously cited as *paludosa*.***Myrosmodes reticulatum*****Szlach. et al.**Mytnik-Ejsmont *et al.* 2012;Szlachetko *et al.* 2014.

Hierba.

Endémica. Andes. 4400-4450 m.

RIS. En Peligro Crítico (Mytnik-Ejsmont *et al.* 2012).

Cordillera Central.

Jaramillo 5655 (HT: COL).

NOTA: conocida solo del tipo.

Erróneamente descrita como *reticulata* / known only from the type; erroneously described as *reticulata*.***Myrosmodes rhynchocarpum*****(Schltr.) Garay***Aa rhynchocarpa* Schltr.,*Altensteinia rhynchocarpa*

(Schltr.) A.D.Hawkes

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007;

Szlachetko *et al.* 2014.

Hierba, Saprófitas.

Nativa. Andes. 2900-3050 m.

CUN. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Cuatrecasas 8016* (COL).***Myrosmodes rostratum*****(Rchb.f.) Garay***Aa rostrata* (Rchb.f.) Schltr.,*Altensteinia rostrata* Rchb.f.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007;

Szlachetko *et al.* 2014.

Hierba.

Nativa. Andes. 4000-4450 m.

CAL, RIS, TOL. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.

*Jaramillo 5655* (COL).***Myrosmodes subnivale*****Szlach. et al.**Mytnik-Ejsmont *et al.* 2012;Szlachetko *et al.* 2014.

Hierba.

Nativa. Andes. 3900-4500 m.

SAN. En Peligro (Mytnik-Ejsmont *et al.* 2012).

Colombia, Ecuador.

Aguirre 889 (HT: COL).

NOTA: alcanza la mayor elevación registrada para cualquier orquídea en el Neotrópico. Descrita erróneamente como *subnivalis* / reaches the highest elevation recorded for any orchid in the Neotropics; erroneously described as *subnivalis*.***Myrosmodes ustulatum*****(Schltr.) Garay***Aa ustulata* Schltr., *Altensteinia**ustulata* (Schltr.) A.D.Hawkes

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2007;

Szlachetko *et al.* 2014.

Hierba.

Nativa. Andes. 4000-4200 m.

NAR. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Hernández 374* (PSO).***Nemaconia Knowles & Westc.***

1 especie

***Nemaconia australis* (Cogn.)****Van den Berg et al.***Ponera australis* Cogn.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1150-1620 m.

CUN, QUI. Preocupación Menor (propuesta aquí).

Colombia, Ecuador, Venezuela,

Brasil.

*Vargas 4074* (AMES, COL).***Neomoorea Rolfe***

1 especie

***Neomoorea wallisii* (Rchb.f.)****Schltr.***Lueddemannia wallisii* Rchb.f.,*Neomoorea irrorata* (Rolfe) Rolfe

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Andes,

Pacífico. 50-1470 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Panamá a Ecuador.

*Ospina 747* (JAUM).***Neoreophilus Archila***

17 especies, 10 especies endémicas

***Neoreophilus cardiochilus* (Luer & R.Escobar) Archila***Brachycladium cardiochilum*

(Luer &amp; R.Escobar) Luer,

*Lepanthes cardiochila* Luer &

R.Escobar

Luer 2005; Viveros &amp; Higgins

2007; Archila-Morales 2009.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16773* (HT: MO de  
*Lepanthes cardiocheila* Luer & R.  
Escobar).  
NOTA: aceptada  
provisionalmente / provisionally  
accepted.

***Neoreophilus catellus* (Luer & R.Escobar) Archila**

*Brachycladium catellum* (Luer & R.Escobar) Luer, *Lepanthes catella* Luer & R.Escobar  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
BOY. No evaluada.  
*Luer 7554* (HT: SEL de  
*Lepanthes catella* Luer & R.  
Escobar).  
NOTA: aceptada  
provisionalmente / provisionally  
accepted.

***Neoreophilus compositus* (Luer & R.Escobar) Archila**

*Brachycladium compositum* (Luer & R.Escobar) Luer, *Lepanthes composita* Luer & R.Escobar  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
RIS. No evaluada.  
*De Wilde 397* (HT: COL).

***Neoreophilus dactylus* (Garay) Archila**

*Brachycladium dactylum* (Garay) Luer, *Lepanthes dactyla* Garay  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100-2500 m.  
ANT, BOY, NSA. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela (?).  
*Escobar 645* (HT: AMES).

***Neoreophilus destitutus* (Luer & R.Escobar) Archila**

*Brachycladium destitutum* (Luer & R.Escobar) Luer, *Lepanthes destituta* Luer & R.Escobar  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2150 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10342* (HT: MO).

***Neoreophilus hippocrepicus* (Luer & R.Escobar) Archila**

*Brachycladium hippocrepicum* (Luer & R.Escobar) Luer, *Lepanthes hippocrepica* Luer & R.Escobar  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100-2500 m.  
ANT, BOY. No evaluada.  
Colombia a Ecuador (?).  
*Luer 11343* (HT: MO).

***Neoreophilus irrasus* (Luer & R.Escobar) Archila**

*Brachycladium irrasum* (Luer & R.Escobar) Luer, *Lepanthes irrasa* Luer & R.Escobar  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2150 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 10341* (HT: MO de  
*Lepanthes irrasa* Luer & R.  
Escobar).

***Neoreophilus lunaris* (Luer) Archila**

*Brachycladium lunare* (Luer) Luer, *Lepanthes lunaris* Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
PUT. No evaluada.

S Colombia a N Ecuador (?).  
*Lehmann 277* (HT: G).

***Neoreophilus micropetalus* (L.O.Williams) Archila**

*Brachycladium micropetalum* (L.O.Williams) Luer, *Lepanthes micropetala* L.O.Williams  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2150-2700 m.  
ANT, CAU, CUN, SAN. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador.  
*Luer 11332* (MO).

***Neoreophilus montis-rotundi* (P.Ortiz) Archila**

*Lepanthes montis-rotundi* P.Ortiz, *Oreophilus montis-rotundi* (P.Ortiz) Luer, *Penducella montis-rotundi* (P.Ortiz) Luer  
Farfán *et al.* 2003; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200-2900 m.  
CUN. No evaluada.  
*Ortiz 705* (HT: HPUJ).  
NOTA: erróneamente citada como *montis-rotundus*; el epíteto *montis-rotundi* es un genitivo (“de Monte Redondo”) y por tanto es invariable / erroneously cited as *montis-rotundus*; the epithet *montis-rotundi* is a genitive (“from Monte Redondo”), and is, therefore, unchangeable.

***Neoreophilus nummularius* (Rchb.f.) Archila**

*Brachycladium nummularium* (Rchb.f.) Luer, *Lepanthes ospinae* Garay, *Lepanthes polygonoides* L.B.Sm. & S.K.Harris  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2400 m.  
ANT, BOY, CAU. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 7554* (MO).

***Neoreophilus pendens***  
**(Garay) Archila**

*Brachycladium pendens* (Garay)  
Luer, *Lepanthes pendens* Garay  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2515 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
*Grant 9770* (HT: US; IT: AMES,  
WIS de *Lepanthes pendens*  
Garay).

***Neoreophilus pilosellus***  
**(Rchb.f.) Archila**

*Brachycladium pilosellum*  
(Rchb.f.) Luer, *Lepanthes*  
*peperomioides* Schltr., *Lepanthes*  
*pilosella* Rchb.f., *Lepanthes*  
*saccosepala* L.B.Sm. & S.K.Harris  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2650 m.  
ANT, CAU, CUN, NAR, TOL,  
VAL. No evaluada.  
O Suramérica.  
*Lehmann 3217* (HT: W).

***Neoreophilus platysepalus***  
**(Luer & R.Escobar) Archila**

*Brachycladium platysepalum*  
(Luer & R.Escobar) Luer,  
*Lepanthes platysepala* Luer &  
R.Escobar  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-2400 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 11354* (HT: MO).

***Neoreophilus pseudocaulescens***  
**(L.B.Sm. & S.K.Harris) Archila**

*Brachycladium pseudocaulescens*  
(L.B.Sm. & S.K.Harris) Luer,  
*Lepanthes pseudocaulescens*  
L.B.Sm. & S.K.Harris  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400-1800 m.  
CAU, NAR, VAL. No evaluada.  
SO Colombia a N Ecuador.  
*Lehman 352* (HT: GH; IT:  
AMES).

***Neoreophilus triangularis***  
**(Luer) Archila**

*Brachycladium triangulare* (Luer)  
Luer, *Lepanthes triangularis* Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. SN Santa Marta. 2300  
m.  
MAG. No evaluada.  
*Barclay 6809* (HT: MO).

***Neoreophilus ursula*** **(Luer**  
**& R.Escobar) Archila**

*Brachycladium ursulum* (Luer  
& R.Escobar) Luer, *Lepanthes*  
*ursula* Luer & R.Escobar  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Archila-Morales 2009.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
BOY. No evaluada.  
*Luer 8034* (HT: SEL).  
NOTA: erróneamente citada  
como *ursulus*; el epíteto *ursula*  
es un sustantivo (“osita”) usado  
en aposición, y por tanto es  
invariable / erroneously cited as  
*ursulus*; the epithet *ursula* is a  
noun (“little female bear”) used  
in apposition, and is, therefore,  
unchangeable.

***Nidema Britton & Millsp.***

2 especies

***Nidema boothii*** **(Lindl.)**  
**Schltr.**

*Epidendrum auritum* Lindl.,  
*Epidendrum boothii* (Lindl.)  
L.O.Williams, *Maxillaria boothii*  
Lindl.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Orinoquia, Pacífico, V  
Magdalena. 400 m.  
MET. Preocupación Menor  
(propuesta aquí).  
Nicaragua a Brasil y Bolivia;  
Antillas.  
*Schmidt 25* (COL).

***Nidema ottonis*** **(Rchb.f.)**  
**Britton & Millsp.**

*Encyclia ottonis* (Rchb.f.) Pabst,  
*Epidendrum ottonis* Rchb.f.  
*Idárraga et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 80-700  
m.  
ANT. Preocupación Menor  
(propuesta aquí).  
México a O Colombia.  
*Rentería 4956* (HUA, JAUM).

***Nitidobulbon Ojeda et al.***

1 especie

***Nitidobulbon nasutum***  
**(Rchb.f.) Ojeda & Carnevali**

*Maxillaria brevipedunculata*  
Ames & C.Schweinf., *Maxillaria*  
*glumacea* Rolfe, *Maxillaria*  
*nasuta* Rchb.f.  
Ojeda *et al.* 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 750-  
2500 m.  
BOY, CUN, SAN. No evaluada.  
Nicaragua a Venezuela y Bolivia.  
*Jaramillo 2766a* (COL).

**Notylia Lindl.**

12 especies, 3 especies endémicas

**Notylia albida Klotzsch**

*Notylia panamensis* Ames,  
*Notylia venezuelana* Schltr.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
*Misas 212* (HPUJ).

**Notylia aromatica Lindl.**

Escobar 1998.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
N Suramérica.  
NOTA: registro dudoso / dubious  
record.

**Notylia bungerothii Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela, Guyana, Brasil,  
Ecuador, Colombia?  
NOTA: esperada / expected.

**Notylia fragrans H.Focke**

Escobar 1990-1998.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe.  
CÓR. No evaluada.  
Venezuela a Guayana Francesa;  
Colombia?  
NOTA: registro dudoso. Citada  
como *N. venezuelana* / dubious  
record; cited as *N. venezuelana*.

**Notylia incurva Lindl.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 500 m.  
CUN? No evaluada.  
Panamá a Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

**Notylia lehmanniana**

**Kraenzl.**

Kränzlin 1921.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
TOL. No evaluada.  
Colombia.  
*Lehmann 2296* (HT: B  
destruido).

**Notylia microchila Cogn.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
N Suramérica.  
NOTA: esperada / expected.

**Notylia obtusa Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Caribe. 400 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.

**Notylia pentachne Rchb.f.**

*Notylia gracilispica* Schltr.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Caribe. 200-520 m.  
ANT, CUN, GUJ. No evaluada.  
Panamá a Venezuela.  
*Haught 4213* (COL).

**Notylia platyglossa Schltr.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Guayana y Macarena?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela, Brasil, Colombia?  
NOTA: esperada / expected.

**Notylia sagittifera (Kunth)**

**Link et al.**

*Notylia multiflora* Lindl.,  
*Pleurothallis sagittifera* Kunth  
*Idárraga et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2000 m.

ANT. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Schmidt 57* (COL).

**Notylia stenoglossa Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Pittier 1602* (B, destruido).

**Notyliopsis P.Ortiz**

1 especie, 1 especie endémica

**Notyliopsis beatricis P.Ortiz**

Ortiz 1996.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1300 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1062* (HT: HPUJ).

**Octomeria R.Br.**

13 especies, 1 especie endémica

**Octomeria amazonica Pabst**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 476 m.  
CAQ. No evaluada.  
*Trujillo 1039* (COAH).  
NOTA: tratada por algunos  
autores (Funck *et al.* 2007, Luer  
2010) como sinónimo de *O.*  
*colombiana* / treated by some  
authors (Funck *et al.* 2007,  
Luer 2010) as a synonym of *O.*  
*colombiana*.

**Octomeria colombiana**  
**Schltr.**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
CAU. No evaluada.

O Colombia, prob. Bolivia.  
*Madero s.n.* (HT: B).

***Octomeria erosilabia***

**C.Schweinf.**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 150 m.

AMA, CAQ. No evaluada.

S Venezuela a Guyana y Perú.  
*Duivenvoorden 1379* (COAH).

***Octomeria exigua***

**C.Schweinf.**

*Octomeria deltoglossa* Garay

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena.  
500 m.

CAQ. No evaluada.

N Suramérica a NE Brasil.

*Arévalo 356* (COL).

NOTA: conocida en Colombia de  
un solo espécimen, recolectado  
en 2002 / known in Colombia  
from a single specimen collected  
in 2002.

***Octomeria gemmula***

**Carnevali & I.Ramírez**

Viveros & Higgins 2007; Luer  
2010; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena.

VAU. No evaluada.

SE Colombia a SO Venezuela.

NOTA: reportada por Viveros &  
Higgins (2007), sin indicación de  
especimen / reported by Viveros  
& Higgins (2007) without  
indication of specimen.

***Octomeria graminifolia* (L.)**

**R.Br.**

*Octomeria longerepens* Schltr.

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 500-  
530 m.

PUT. No evaluada.

Antillas menores a Centro y  
Suramérica tropical.

*Hopp 80* (B: destruido).

NOTA: el único espécimen  
de Colombia, el tipo de *O.*  
*longerepens*, fue destruido en  
Berlín / the only Colombian  
specimen, the type of *O.*  
*longerepens*, was destroyed in  
Berlin.

***Octomeria grandiflora* Lindl.**

*Octomeria boliviensis* Rolfe,

*Octomeria robusta* Barb.Rodr.,

*Octomeria robusta* Rchb.f. &

Warm., *Octomeria ruthiana*

Hoehne, *Octomeria seegeriana*

Kraenzl., *Octomeria similis*

Schltr., *Octomeria surinamensis*

H.Focke

Viveros & Higgins 2007; Idárraga  
*et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena, V  
Magdalena. 500-1000 m.

ANT, CAQ. No evaluada.

Trinidad a Centro y Suramérica  
tropical.

*Arévalo 367* (COL).

***Octomeria harantiana***

**I.Bock**

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 50-500 m.

CHO. No evaluada.

*Bock 10* (HT: K).

***Octomeria longifolia* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes,

Guayana y Macarena. 300-600 m.

AMA, PUT, VAU. No evaluada.

Colombia a Perú; Venezuela.

*Schultes 19785* (NT: GH).

***Octomeria mocoana* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 530  
m.

CAQ, PUT. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Bolivia.

*Hopp 76* (B: destruido).

NOTA: conocida en Colombia  
solo del tipo / known in  
Colombia only from the type.

***Octomeria schultesii* Pabst**

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena.  
150 m.

VAU. No evaluada.

SE Colombia a N Brasil.

*Schultes 10148* (HT: IAN).

***Octomeria scirpoidea***

**(Poepp. & Endl.) Rchb.f.**

*Octomeria brachypetala* Schltr.,

*Octomeria brevifolia* Cogn.

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 50 m.

VAL. No evaluada.

Suramérica tropical.

*Gentry 56714* (MO).

***Octomeria taracuana* Schltr.**

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena. 97  
m.

GUI. No evaluada.

Colombia (Pto. Colombia), S  
Venezuela, N Brasil.

*Cárdenas 24493* (COAH).

[***Odontoglossum* Kunth**]

[***Odontoglossum subuligerum* Rchb.f.**]

Calderón-Sáenz 2007.

NOTA: registro basado en identificación errónea (= *Oncidium subuligerum*). Categorizada como VU por Calderón-Sáenz (2006), aunque es endémica de Perú / record based on a misidentification; (= *Oncidium subuligerum*); categorized as VU by Calderón-Sáenz (2006), but is endemic from Peru.

***Oeceoclades* Lindl.**

1 especie

***Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl.**

*Eulophia maculata* (Lindl.) Rchb.f., *Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitzer, *Limodorum maculatum* (Lindl.) Lodd. Idárraga *et al.* 2011. Hierba, epífita. Naturalizada. Andes. 500-1200 m. ANT, NSA. No evaluada. CO África; naturalizada en el neotrópico. *Callejas 5856* (HUA).

***Oestlundia* W.E.Higgins**

1 especie

***Oestlundia luteorosea* (A.Rich. & Galeotti) W.E.Higgins**

*Encyclia luteorosea* (A.Rich. & Galeotti) Dressler & G.E.Pollard, *Epidendrum luteoroseum* A.Rich. & Galeotti Hierba, epífita. Nativa. Andes? DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, México, Costa Rica, Perú, Venezuela.

NOTA: esperada; no hay especímenes de Colombia pero se encuentra en Perú, Venezuela y Costa Rica / expected; no specimens from Colombia but occurs in Peru, Venezuela and Costa Rica.

***Oliveriana* Rchb.f.**

4 especies, 2 especies endémicas

***Oliveriana brevilabia* (C.Schweinf.) Dressler & N.H. Williams**

Ortiz 1995. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 2000-2500 m. PUT. No evaluada. Colombia, Ecuador, Perú. *Ortiz 546* (HPUJ).

***Oliveriana egregia* Rchb.f.**

Ortiz 1995. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 2860-3100 m. ANT. No evaluada. Colombia a Guyana. *Ortiz 76* (HPUJ).

***Oliveriana lehmannii* Garay**

Ortiz 1995. Hierba, epífita. Endémica. Andes. 2200-2800 m. HUI, PUT. No evaluada. *Ospina 147* (HT: AMES).

***Oliveriana ortizii* A.Fernández**

Ortiz 1995. Hierba, epífita. Endémica. Andes. 2500-2700 m. BOY, SAN. No evaluada. *Ortiz 101* (HT: COL).

***Oncidium* Sw.**

140 especies, 59 especies endémicas

***Oncidium abortivoides***

**M.W.Chase & N.H.Williams**  
*Sigmatostalix abortiva*  
L.O.Williams  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008; Ortiz & Uribe 2008. Hierba, epífita. Nativa. Pacífico. 30 m. CHO. No evaluada. Colombia y Panamá.

***Oncidium abortivum* Rchb.f.**

Ortiz 1995. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 1800 m. ANT, CUN, VAL. No evaluada. NO Suramérica. *Ortiz 906* (HPUJ).

***Oncidium abruptum* Kraenzl.**

Ortiz 1995. Hierba, epífita. Nativa. Andes, Pacífico. 10-1000 m. CHO. No evaluada. Colombia y Ecuador. *Misas 269* (HPUJ).

***Oncidium acinaceum* Lindl.**

Ortiz 1995. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 2500-3000 m. ANT. No evaluada. NO Suramérica. *Hübsch s.n.* (W).

***Oncidium adamsii* (Dodson)**

**M.W.Chase & N.H.Williams**  
*Sigmatostalix adamsii* Dodson  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008; Ortiz & Uribe 2008. Hierba, epífita. Nativa. Andes, Pacífico. 530-900 m.

VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.

***Oncidium adelaidae* König**

Königer 1995a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400-1900 m.  
CHO, RIS, VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
Königer *K-190c* (HT: M).

***Oncidium alberti* (P.Ortiz)  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum alberti* P.Ortiz  
Ortiz, P. 2005; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000-3200 m.  
BOY. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Ortiz 1219* (HT: HPUJ).

***Oncidium alexandrae*  
(Bateman) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Odontoglossum bluntii* Rchb.f.,  
*Odontoglossum crispum*  
Lindl., *Odontoglossum*  
*reichenbachianum* F.Lehm.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700-3200 m.  
BOY, CAU, CUN, HUI, NAR,  
PUT, SAN. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 22* (HPUJ).

***Oncidium alvarezii* (P.Ortiz)  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum alvarezii* P.Ortiz  
Ortiz 2001; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700-2800 m.  
CUN. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Ortiz 2130* (HT: COL).

***Oncidium amazonicum*  
(Schltr.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Sigmatostalix amazonica* Schltr.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
100-350 m.  
AMA, MET. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
*Ohba 68* (Ortiz foto).

***Oncidium ansiferum* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Centroamérica.

***Oncidium anthocrene* Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 140-  
1000 m.  
ANT. No evaluada.  
Panamá a Ecuador.  
*Escobar 1154* (AMES, HUA).

***Oncidium antioquiense*  
Kraenzl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Kalbreyer 1766* (HT: B).

***Oncidium arangoi* (Königer)  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix arangoi* König  
Königer 2001; Chase *et al.* 2008;  
Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.

***Oncidium aristuliferum*  
(Kraenzl.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Sigmatostalix aristulifera* Kraenzl.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 565* (HPUJ).

***Oncidium armatum* (Rchb.f.)  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum armatum* Rchb.f.,  
*Odontoglossum portmannii*  
subsp. *cohriae*, *Odontoglossum*  
*portmannii* var. *cohriae*  
(Bockemühl) O.Gruss & M.Wolff  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2700 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Bockemühl 5241-79* (HEID).

***Oncidium aspidorhinum*  
(F.Lehm.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Odontoglossum aspidorhinum*  
F.Lehm.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2600 m.  
ANT, CAU, NAR. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Bochemühl 5240-122* (HEID).

***Oncidium auriculatoides*  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix auriculata* Garay  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1310-1550 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Escobar 60* (HT: AMES).

***Oncidium auriculatum***

**(Rolfe) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum auriculatum* Rolfe

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, SN Santa Marta. 1800-2700 m.

MAG, NSA. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Bockemühl 5223-102* (HEID).

***Oncidium baueri* Lindl.**

*Oncidium caucanum* Schltr.,  
*Oncidium hebraicum* Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 130-2700 m.

CUN, NAR. No evaluada.

América tropical.

*Schlim 27* (G, MO).

***Oncidium befortianum***

**Königer**

Königer 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

*Königer 136* (HT: M).

NOTA: descrita de material cultivado / described from cultivated material.

***Oncidium blandum* (Rchb.f.)**

**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum blandum* Rchb.f.

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-2700 m.

NSA, SAN. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Perú.

*Bockemühl 5208-47* (HEID).

***Oncidium boothianum***

**Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 400-1500 m.

NAR, VAL. No evaluada.

N Suramérica.

*Franco 4875* (COL).

***Oncidium bracteatum* Warsz.**

**& Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-2700 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

***Oncidium brevilabrum* Rolfe**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Oncidium bryocladium***

**Schltr.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia, Andes. 530 m.

CAQ. No evaluada.

Colombia.

*Hopp 157* (HT: B, destruido).

***Oncidium caquetanum***

**(Schltr.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix caquetana* Schltr.

Schlechter 1924; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia, Andes. 530 m.

PUT. No evaluada.

Colombia.

*Hopp 162* (HT: B, destruido).

***Oncidium cheiroporum***

**Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500-2000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a México.

*Ortiz s.n.* (Foto).

*Oncidium cheiroporum* var. *exauriculatum* Hamer & Garay

***Oncidium chrysomorphum***

**Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, V Cauca. 1000-2000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NO Suramérica.

*Ortiz 520* (HPUJ).

***Oncidium cinnamomeum***

**(R.Warner & B.S.Williams)**

**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum schillerianum*

Rchb.f.

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2700 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a NO Venezuela.

***Oncidium cirrhosum* (Lindl.)**

**Beer**

*Odontoglossum cirrhosum* Lindl.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2400 m.

CUN, NAR. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Ecuador.

*Schneider 128* (COL).

***Oncidium citrinum* Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 400-800 m.

CAQ. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Trinidad.  
Ortiz 550 (HPUJ).

***Oncidium constrictum***  
(Lindl.) Beer

*Odontoglossum boddaertianum*  
Rchb.f., *Odontoglossum*  
*constrictum* Lindl.,  
*Odontoglossum sanderianum*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3000 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia a N Venezuela.

***Oncidium crescentilabium***  
(C.Schweinf.) M.W.Chase &  
N.H.Williams

*Sigmatostalix crescentilabia*  
C.Schweinf.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008;  
Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-1600 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia, Perú.

***Oncidium crinitum* (Rchb.f.)**  
**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum crinitum* Rchb.f.,  
*Odontoglossum popayanense*  
F.Lehm. & Kraenzl.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-3100 m.  
ANT, CAL, CAU, CUN,  
NAR, PUT, QUI. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Escobar 1055* (AMES, COL,  
HUA, JAUM).

***Oncidium cristatum* (Lindl.)**  
**Beer**

*Odontoglossum cristatum* Lindl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1300-2000 m.  
NAR. No evaluada.  
S Colombia a Perú.  
*Benavides 9831* (PSO).

***Oncidium crocidipterum***  
(Rchb.f.) M.W.Chase &  
N.H.Williams

*Odontoglossum crocidipterum*  
Rchb.f., *Odontoglossum*  
*dormanianum* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400-2300 m.  
CUN, SAN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia y Venezuela.  
*Bruckmüller s.n.* (W).  
*Oncidium crocidipterum* subsp.  
*crocidipterum*

***Oncidium cruentoides***  
**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum hrubyanum*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Dodson D433* (?).

***Oncidium cuculligerum***  
(Schltr.) M.W.Chase &  
N.H.Williams

*Roezliella cuculligera* Schltr.,  
*Sigmatostalix cuculligera* (Schltr.)  
Garay  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1430-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Cogollo 3943* (JAUM).

***Oncidium cultratum* Lindl.**

*Oncidium cuencanum* Rchb.f.,  
*Oncidium formosissimum*  
Rchb.f., *Oncidium jamiesonii*  
Lindl.

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-3500 m.  
ANT, CAU, CUN. No evaluada.  
NO Suramérica.  
*Ortiz 187* (HPUJ).

***Oncidium dactyliferum***  
**Garay & Dunst.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3320-3450 m.  
ANT. No evaluada.  
NO Suramérica.  
*MacDougal 4478* (HUA, MO).

***Oncidium dactylopterum***  
**Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia.  
*Bruchmüller s.n.* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium decorum* König**

Königer 1995a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Guayana y Macarena.  
1300-1500 m.  
MET. No evaluada.  
Colombia.  
*Königer 41* (HT: M).

***Oncidium dichromaticum***  
**Rchb.f.**

*Oncidium andreae* König,  
*Oncidium cabagrae* Schltr.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 20-1500  
m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
*Misas 267* (HPUJ).

***Oncidium dilatatum***  
**(Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix dilatata* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
Ortiz 1010 (HPUJ).

***Oncidium eliae* (Rolfe)**  
**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix eliae* Rolfe  
Escobar 1998; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-1800 m.  
ANT, SAN. No evaluada.  
Colombia a Perú.

***Oncidium endocharis* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a México.

***Oncidium epidendroides***  
**(Kunth) Beer**

*Odontoglossum epidendroides*  
Kunth  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2300 m.  
PUT. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia a Perú.  
Asplund 19229 (AMES).

***Oncidium fuscatum* Rchb.f.**

*Miltonia warscewiczii* Rchb.f.,  
*Miltonioides warscewiczii*  
(Rchb.f.) Brieger & Lückel,  
*Oncidium weltonii* (Rchb.f.)  
Rollisson  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 250-  
1000 m.

ANT, CHO. No evaluada.  
NO Suramérica.  
Bernal 1043 (COL).

***Oncidium gloriosum* (Linden & Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum gloriosum* Linden & Rchb.f., *Odontoglossum gloriosum* var. *flaviflorum* Bockemühl  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3000 m.  
BOY, CUN, NSA, SAN.  
Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
Ortiz 524 (HPUJ).

***Oncidium gramineum***  
**(Poepp. & Endl.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Petalocentrum angustifolium* Schltr., *Petalocentrum bicornutum* (Rolfe) Schltr., *Petalocentrum pusillum* (Schltr.) Schltr., *Sigmatostalix aurosanguinea* Rchb.f., *Sigmatostalix bicornuta* Rolfe, *Sigmatostalix graminea* (Poepp. & Endl.) Rchb.f., *Sigmatostalix peruviana* Rolfe, *Specklinia graminea* Poepp. & Endl.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1900 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
México a Ecuador.

***Oncidium hallii* (Lindl.) Beer**

*Odontoglossum chaetostroma* O'Brien, *Odontoglossum hallii* Lindl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-4000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.  
Dodson D15585 (?).

***Oncidium hapalotyle* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400-3500 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
Garay 1054 (AMES).  
NOTA: tipo en B destruido / B type destroyed.

***Oncidium harryanum***  
**(Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum harryanum*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2500 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
Trenche *s.n.* (MEDEL).

***Oncidium hastilabium***  
**(Lindl.) Beer**

*Odontoglossum hastilabium*  
Lindl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2000 m.  
BOY. No evaluada.  
NO Suramérica.  
Linden 1376 (HT: K).

***Oncidium hermansianum***  
**(Königer) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix hermansiana*  
Königer  
Chase *et al.* 2008; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.

***Oncidium heteranthum*****Poepp. & Endl.***Oncidium zonatum* Cogn.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2000 m.

ANT. No evaluada.

N Suramérica.

*Brant 1541* (HUA).***Oncidium huebneri* (Mansf.)****M.W.Chase & N.H.Williams***Sigmatostalix huebneri* Mansf.Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 120-1950 m.

ANT, GUI. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil.

*Escobar 828* (AMES).***Oncidium hymenanthum*****(Schltr.) M.W.Chase &****N.H.Williams***Sigmatostalix hymenantha* Schltr.Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 700 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Costa Rica a Colombia.

*Escobar 2655* (JAUM).***Oncidium hyphaematicum*****Rchb.f.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500-1000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Perú.

***Oncidium ibis* (Schltr.)****M.W.Chase & N.H.Williams***Roezliella ibis* Schltr.Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2400 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia.

*Kapuller 123* (COL).***Oncidium isthmi* Schltr.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 200-1200 m.

VAL. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

*Ortiz s.n.* (Foto).***Oncidium kegeljanii*****(E.Morren) M.W.Chase &****N.H.Williams***Odontoglossum kegeljanii*E.Morren, *Odontoglossum**polyxanthum* Rchb.f.Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2600-2900 m.

NSA. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Cuatrecasas 12753* (COL).***Oncidium lancifolium* Lindl.**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500-3000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

***Oncidium lehmannianum*****(Kraenzl.) M.W.Chase &****N.H.Williams***Sigmatostalix lehmanniana*

Kraenzl.

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 10-600 m.

CHO, VAL. No evaluada.

*Misas 219* (HPUJ).***Oncidium lehmannii*****(Rchb.f.) M.W.Chase &****N.H.Williams***Odontoglossum cristatellum*Rchb.f., *Odontoglossum**cristatellum* subsp. *lehmannii*

(Rchb.f.) Bockemühl

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400-3500 m.

CAL, CAU, NAR, PUT, QUI. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Pérez-Arbeláez 6195* (COL,

JAUM).

***Oncidium lentiginosum*****Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500-1200 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Ortiz s.n.* (Foto).***Oncidium ligiae* König**

Königer 1995a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Central.

*Königer 53* (HT: M; IT: JAUM).***Oncidium lindleyoides*****M.W.Chase & N.H.Williams***Odontoglossum lindleyanum*Rchb.f. & Warsz., *Odontoglossum**lindleyanum* var. *parviflorum*

Bockemühl

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2300 m.

ANT, CUN, NSA, SAN.

Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Ecuador.

*Bockemühl 5212* (HEID).***Oncidium lineoligerum*****Rchb.f. & Warsz.***Oncidium stenotis* Rchb.f.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a Perú.  
*Ortiz s.n.* (Foto).

***Oncidium luteopurpureum*  
(Lindl.) Beer**

*Odontoglossum hystrix* Bateman,  
*Odontoglossum luteopurpureum*  
Lindl., *Odontoglossum radiatum*  
Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2500 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, HUI,  
PUT, QUI. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Ortiz 184* (HPUJ).

***Oncidium luteum* Rolfe**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-2000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Perú.

***Oncidium magdalenae*  
Rchb.f.**

*Cyrtochilum magdalenae*  
(Rchb.f.) Kraenzl.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2100 m.

CUN. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Wagner s.n.* (HT: W).

***Oncidium maizifolium* Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800 m.

NSA. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Schlim 27* (W).

***Oncidium malleiferum*  
(Rchb.f.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Sigmatostalix malleifera* Rchb.f.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz 1022* (HPUJ).

***Oncidium massangei***

**E.Morren**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. 2100-3200 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia? Centroamérica.

NOTA: véase Belgique Horticole  
27: pl. 6-7. 1877 / see Belgique  
Horticole 27: pl. 6-7. 1877.

***Oncidium millianum* Rchb.f.**

Kränzlin 1922; Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?

***Oncidium mirandoides***

**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix miranda* Kraenzl.

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Sander s.n.* (HT: K).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium mirandum*  
(Rchb.f.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Odontoglossum mirandum*  
Rchb.f.

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2800 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

Colombia.

*Ortiz 570* (HPUJ).

***Oncidium morganii*  
(Dodson) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Sigmatostalix morganii* Dodson  
Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

***Oncidium naevium* (Lindl.)  
Beer**

*Odontoglossum naevium* Lindl.  
Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1300-2000 m.

MAG, NSA. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Venezuela.

*Schlim s.n.* (BR).

***Oncidium nebulosum* Lindl.**

*Oncidium hoppii* Schltr.,  
*Oncidium klotzschianum* Rchb.f.,  
*Oncidium meliosmum* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 530-1800 m.

ANT, PUT. No evaluada.

Costa Rica a Perú.

*Hopp 157* (?).

***Oncidium nevadense*  
(Rchb.f.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Odontoglossum nevadense* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, SN Santa  
Marta. 1800-2000 m.

MAG. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

Colombia.  
*Schmidt-Mumm s.n.* (M).

***Oncidium niesseniae* König**

König 1996.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 600 m.  
VAL. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*König 66* (HT: M; IT: JAUM).

***Oncidium nigratum* Lindl. & Paxton**

*Cyrtorchilum nigratum* (Lindl.)  
Kraenzl., *Oncidium uaipanense*  
Schnee  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 500 m.  
VAU. No evaluada.  
N Suramérica.

***Oncidium nobile* (Rchb.f.)  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum nobile* Rchb.f.,  
*Odontoglossum pescatorei* Lindl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1300-2400 m.  
NSA, SAN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Ortiz 888* (HPUJ).

***Oncidium obryzatoides*  
Kraenzl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1500 m.  
NAR. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Gentry 26414* (MO, SEL).

***Oncidium obryzatum* Rchb.f.  
& Warsz.**

*Oncidium floribundum* Kraenzl.  
Ortiz 1995.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1240-1880 m.  
BOY, PUT. No evaluada.  
NO Suramérica.  
*Betancur 223* (COL, HUA,  
JAUM).

***Oncidium odoratum* (Lindl.)  
Beer**

*Odontoglossum glonerianum*  
Linden, *Odontoglossum*  
*odoratum* Lindl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2500 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.

***Oncidium orbatum* Kraenzl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2150 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Kalbreyer 314* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium ornithocephalum*  
Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-2200 m.  
CAU, CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Schlim 296* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium ornithopodum*  
Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Reichenbach s.n.* (HT: W).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium ornithorhynchum*  
Kunth**

*Oncidium pyramidale* Lindl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3400 m.  
ANT, BOY, CUN. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú.  
*Ortiz 139* (HPUJ).

***Oncidium orthotis* Rchb.f.**

*Cyrtorchilum orthotis* (Rchb.f.)  
Kraenzl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-2860 m.  
BOY. No evaluada.  
NO Suramérica.  
*Ortiz 712* (HPUJ).

***Oncidium panamense* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 20-50 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.

***Oncidium panchrysum*  
Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200-1300 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Lindley 1432* (HT: K).

***Oncidium pandurataoides*  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix pandurata* Schltr.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2200 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 1094* (AMES).

***Oncidium panduratum* Rolfe**

Kränzlin 1922; Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Millican s.n.* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium papilioides*  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix papilio* Königer &  
R.Escobar  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Salgado 108* (CAUP, COL).

***Oncidium peltiforme*  
Königer**

Wüllner (com. pers.).  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Cauca. 1500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Wüllner, s.n.* (?).

***Oncidium pentadactylon*  
Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Cauca. 1000-  
3500 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 6763* (W).

***Oncidium perpusillum*  
(Kraenzl.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Sigmatostalix perpusilla* Kraenzl.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 400-1900 m.  
ANT, SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 1175* (AMES).

***Oncidium pictum* Kunth**

*Oncidium reichenbachii* Lindl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-2000 m.  
ANT, CAU, TOL, VAL. No  
evaluada.  
NO Suramérica.  
*Lehmann 8377* (W).

***Oncidium picturatissimum*  
(Kraenzl.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Sigmatostalix picturatissima*  
Kraenzl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 990-2100 m.  
ANT, SAN, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Ortiz 767* (HPUJ).

***Oncidium picturatum*  
Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Escobar 728* (AMES).

***Oncidium platyphilum*  
Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-2300 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Hopp 97* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium poikilostalix*  
(Kraenzl.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Oncidium guatemalenooides*  
M.W.Chase & N.H.Williams,  
*Sigmatostalix guatemalensis*

Schltr., *Sigmatostalix lunata*  
Schltr., *Sigmatostalix picta*  
Rchb.f., *Sigmatostalix*  
*poikilostalix* Kraenzl.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1240-1500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia, Costa Rica.  
*Ortiz 945* (HPUJ).

***Oncidium posadaroides*  
M.W.Chase & N.H.Williams**  
*Sigmatostalix posadarum* Königer  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Königer WK-106* (IT: JAUM).

***Oncidium posadarum*  
Königer**

Königer 1995b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Königer 54* (HT: JAUM).

***Oncidium povedanum*  
(P.Ortiz) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Odontoglossum povedanum*  
P.Ortiz  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2300 m.  
SAN. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Ortiz 1070* (HT: HPUJ).

***Oncidium praenitens*  
(Rchb.f.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Odontoglossum praenitens* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2700 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Escobar 1240* (AMES).

***Oncidium putumayense*  
(P.Ortiz) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Sigmatostalix putumayensis*

P.Ortiz

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia. 310 m.

PUT. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz 990* (HT: JAUM).

***Oncidium reversoides*  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum reversum*

Bockemühl

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2800 m.

ANT, CAU, PUT. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Bockemühl 5250* (HT: HEID).

***Oncidium reversum* (Rchb.f.)  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix reversa* Rchb.f.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Wallis s.n.* (HT: W, destruido?).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium rhynchanthum*  
(Rchb.f.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Odontoglossum rhynchanthum*  
Rchb.f.

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2500 m.

ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Bockemühl 5264* (JAUM).

***Oncidium rodrigoii* König**

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300-2700 m.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Königer 83* (HT: M; IT: JAUM).

***Oncidium xrolfeii***

**J.M.H.Shaw**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: híbrido de *O. auriculatum*  
× *O. spectatissimum* / a hybrid  
of *O. auriculatum* × *O.*  
*spectatissimum*.

***Oncidium roseum* (Lindl.)**

**Beer**

*Cochlioda rosea* (Lindl.) Benth.

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3100 m.

ANT. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú.

*Fonnegra 4593* (HUA, MO).

***Oncidium sarahforsythiae***

**J.M.H.Shaw**

*Sigmatostalix ligiae* König &

R.Escobar

Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia, Guayana y

Macarena. 600-700 m.

GUV, VAU. No evaluada.

*Königer s.n.* (JAUM).

***Oncidium sathishkumarii***

**J.M.H.Shaw**

*Sigmatostalix adelaidae* König

Königer 1995a; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 200 m.

VAL. No evaluada.

Colombia.

*Königer 42* (HT: M; IT: JAUM).

***Oncidium saxicola* Schltr.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Endémica. Andes. 2300 m.

NAR. No evaluada.

Colombia.

*Hopp 14* (HT: B, destruido).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Oncidium sceptrum* (Rchb.f.  
& Warsz.) M.W.Chase &  
N.H.Williams**

*Odontoglossum sceptrum* Rchb.f.

& Warsz., *Odontoglossum*

*sceptrum* var. *facetum*

Bockemühl, *Odontoglossum*

*schlimii* Linden & Rchb.f.

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900-3300 m.

ANT, CAL, CAU, NSA, RIS,  
SAN. Preocupación Menor  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Restrepo s.n.* (MEDEL).

***Oncidium schillerianum*  
Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300-2600 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia y Perú.

***Oncidium sergii* (P.Ortiz)  
M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix sergii* P.Ortiz

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1650 m.

VAL. No evaluada.

Colombia.  
*Ortiz 242* (HT: JAUM).

***Oncidium sessile* Lindl. & Paxton**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. SN Santa Marta. 2710 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Perú.

***Oncidium spectatissimum* (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum spectatissimum* Lindl., *Odontoglossum spectatissimum* var. *cinctum* (Rchb.f.) Bockemühl, *Odontoglossum triumphans* Rchb.f. & Warsz.

Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3000 m.  
CUN, NSA, QUI, SAN. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia y Venezuela.  
*Ortiz 955* (HPUJ).

***Oncidium tectum* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Wallis s.n.* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Oncidium tenuirostre* (Kraenzl.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix tenuirostris* Kraenzl.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1016* (HPUJ).

***Oncidium tenuoides* M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum tenue* Cogn.  
Chase *et al.* 2008; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú.  
*Monsalve 1* (JAUM).

***Oncidium tetrotis* Rchb.f. & Warsz.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1650 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Warszewicz s.n.* (HT: W).

***Oncidium tigratum* Rchb.f. & Warsz.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Escobar 1016* (AMES).

***Oncidium toachicum* Dodson**

Escobar 1998.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-1400 m.  
CHO, NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 1102* (HPUJ).

***Oncidium trachycaulon* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Oncidium tripudians* (Rchb.f. & Warsz.)**

**M.W.Chase & N.H.Williams**  
*Odontoglossum tripudians* Rchb.f. & Warsz.  
Ortiz 1995; Chase *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
BOY, NSA, SAN. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Kalbreyer 110* (W).

***Oncidium tsubotae* König**

König 1996.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*König 67* (HT: M; IT: JAUM).

***Oncidium vernixium* Linden & Rchb.f.**

Kränzlin 1922; Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.

***Oncidium vulcanicum* (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Cochlioda vulcanica* (Rchb.f.) Rolfe, *Mesospinidium vulcanicum* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 1800-2400 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
NOTA: esperada / expected.

***Oncidium wallisii* (Linden & Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Odontoglossum purum* Rchb.f., *Odontoglossum wallisii* Linden & Rchb.f.

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2300 m.  
ANT, CAU, CUN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia.  
*Sarmiento s.n.* (COL).

***Oncidium wallisoides***  
**M.W.Chase & N.H.Williams**

*Sigmatostalix wallisii* Rchb.f.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1040* (HPUJ).

***Oncidium xanthornis***  
**Kraenzl.**

*Cyrtochilum xanthornis* (Rchb.f.)  
Kraenzl.  
Kränzlin 1922; Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.

***Orleanesia* Barb.Rodr.**

3 especies

***Orleanesia maculata* Garay**

Carnevali & Ramírez-Morillo  
2003.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
100-300 m.  
MET, VIC. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Renz 3952* (RENZ).

***Orleanesia pleurostachys***  
**(Linden & Rchb.f.) Garay & Dunst.**

*Orleanesia pradei* C.Schweinf.  
& Garay, *Ponera pleurostachys*  
Linden & Rchb.f.,  
*Pseudorleanesia pleurostachys*  
(Linden & Rchb.f.) Rauschert

Foldats 1970.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, V Magdalena.  
100-700 m.  
CAU, CES, NSA, SAN. No  
evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Haught 1876* (AMES, US).

***Orleanesia yauaperyensis***  
**Barb.Rodr.**

*Huebneria yauaperyensis* (Barb.  
Rodr.) Schltr.  
Carnevali & Ramírez-Morillo  
2003.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Guayana y Macarena?  
100-200 m.  
GUI?, VIC? No evaluada.  
SO Venezuela, NO Brasil, E  
Colombia?  
NOTA: esperada; conocida de  
áreas vecinas, en Venezuela y  
Brasil / expected; known from  
neighboring areas in Venezuela  
and Brazil.

***Ornithidium* R.Br.**

28 especies, 7 especies endémicas

***Ornithidium adendrobium***  
**(Rchb.f.) M.A.Blanco & Ojeda**

*Maxillaria adendrobium*  
(Rchb.f.) Dressler, *Ponera*  
*adendrobium* Rchb.f.  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador, Antillas.  
*Misas 170* (HPUJ).

***Ornithidium affine* (Poepp. & Endl.) M.A.Blanco & Ojeda**  
**M.A.Blanco & Ojeda**  
*Maxillaria affinis* (Poepp. & Endl.) Garay, *Scaphyglottis affinis*  
Poepp. & Endl.

Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Orinoquia.  
180-1300 m.  
MET, VAU. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Garay 93* (AMES, COL).

***Ornithidium aggregatum***  
**(Kunth) Rchb.f.**

*Dendrobium aggregatum* Kunth,  
*Maxillaria aggregata* (Kunth)  
Lindl., *Ornithidium pfizerianum*  
Kraenzl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2800 m.  
ANT, CAU, CUN, MET, NAR,  
RIS, TOL. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Fonnegra 4116* (HUA).

***Ornithidium aureum* Poepp. & Endl.**

*Camaridium aureum* (Poepp. & Endl.) Hoehne, *Maxillaria aurea*  
(Poepp. & Endl.) L.O.Williams,  
*Ornithidium bolivianum* Schltr.  
*Idárraga et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1100-2430 m.  
ANT, BOY, CAU, CHO, CUN,  
HUI, MAG, NAR, NSA, PUT,  
SAN, VAL. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Callejas 6814* (HUA, MO).

***Ornithidium compactum***  
**Schltr.**

*Maxillaria compacta* (Schltr.)  
P.Ortiz  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Ornithidium fulgens* Rchb.f.**

*Maxillaria fulgens* (Rchb.f.)  
L.O.Williams  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes,  
Pacífico. 0-1150 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Centroamérica a N Venezuela y  
Perú.  
*White* 38 (HUA, MO).

***Ornithidium giganteum*  
Lindl.**

*Maxillaria gigantea* (Lindl.)  
Dodson  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa y cultivada, Endémica y  
cultivada. Andes. 1600-2500 m.  
ANT, CUN. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Schneider* 114 (COL).

***Ornithidium heterobulbon*  
Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100-2200 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Kalbreyer* 1182 (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Ornithidium histrionicum*  
Rchb.f.**

*Maxillaria histrionica* (Rchb.f.)  
L.O.Williams  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-1500 m.  
CUN, SAN. No evaluada.  
*Murillo* 123 (COL).

***Ornithidium lasallei*  
(Foldats) M.A.Blanco &  
Ojeda**

*Maxillaria lasallei* Foldats

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1310-1365 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Guyana.  
*Cogollo* 2661 (JAUM, MO).

***Ornithidium maldonadoense*  
(J.T.Atwood) M.A.Blanco &  
Ojeda**

*Maxillaria maldonadoensis*  
J.T.Atwood  
Atwood 2003a; Idárraga *et al.*  
2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1500 m.  
ANT, PUT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Cogollo* 3014 (JAUM, MO).

***Ornithidium mapiriense*  
Kraenzl.**

*Maxillaria condensata*  
C.Schweinf., *Maxillaria*  
*mapiriensis* (Kraenzl.)  
L.O.Williams  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes, SN  
Santa Marta. 100-3000 m.  
BOY, CAU, CES, CUN, GUI. No  
evaluada.  
Surinam a Perú.  
*Schneider* 565 (COL, HUA).

***Ornithidium miniatum*  
Lindl.**

*Maxillaria rolfei* P.Ortiz,  
*Ornithidium bicolor* Rolfe  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes, SN  
Santa Marta. 2600-2800 m.  
MAG. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Romero-Castañeda* 7793 (COL,  
MO).

***Ornithidium montezumae*  
Arévalo & Christenson**

Arévalo *et al.* 2013.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1600-2500 m.  
CHO, RIS. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Arévalo* 590 (HT: COL; IT:  
ANDES).

***Ornithidium multicaule*  
(Poepp. & Endl.) Rchb.f.**

*Maxillaria multicaulis* (Poepp. &  
Endl.) C.Schweinf., *Ornithidium*  
*fragrans* Rolfe, *Siagonanthus*  
*multicaulis* Poepp. & Endl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
NOTA: esperada / expected.

***Ornithidium nicaraguense*  
(Hamer & Garay)  
M.A.Blanco & Ojeda**

*Maxillaria nicaraguensis* (Hamer  
& Garay) J.T.Atwood  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a Nicaragua.  
*Misas* 172 (HPUJ).

***Ornithidium niveum* Lindl.**

*Maxillaria nivea* (Lindl.)  
L.O.Williams  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. SN Santa Marta.  
MAG. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Smith* 2492 (MO, NY).

***Ornithidium nubigenum*  
Rchb.f.**

*Maxillaria nubigena* (Rchb.f.)  
C.Schweinf.

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700-3300 m.  
NSA, PUT, SAN. No evaluada.  
N Colombia a Perú.  
*Lozano 5565* (COL, MO).

***Ornithidium pendens* (Pabst)  
Senghas**

*Maxillaria pendens* Pabst  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela, Ecuador, Brasil,  
Bolivia.  
NOTA: esperada / expected.

***Ornithidium pendulum*  
(Poepp. & Endl.) Cogn.**

*Maxillaria ochracea* (Rchb.f.)  
Garay, *Maxillaria tafallae*  
(Rchb.f.) C.Schweinf.,  
*Ornithidium dichotomum* Schltr.,  
*Ornithidium ochraceum* Rchb.f.,  
*Ornithidium tafallae* (Rchb.f.)  
Rchb.f., *Scaphyglottis tafallae*  
Rchb.f.  
Blanco *et al.* 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
CAU. No evaluada.  
S Colombia a Perú.  
*Lehmann 8114* (K).  
NOTA: a menudo citada con  
el nombre erróneo *Maxillaria*  
*ramosa* / often cited with the  
wrong name *Maxillaria ramosa*.

***Ornithidium*  
*pseudonubigenum*  
(J.T.Atwood) M.A.Blanco &  
Ojeda**

*Maxillaria pseudonubigena*  
J.T.Atwood  
Atwood 2003a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400-2800 m.  
ANT, CAU, CUN, PUT. No  
evaluada.

Colombia a Perú.  
*Barclay 9442* (MO).

***Ornithidium ruberrimum*  
(Lindl.) Rchb.f.**

*Maxillaria ruberrima* (Lindl.)  
Garay, *Scaphyglottis ruberrima*  
Lindl.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes. 800-  
2700 m.  
ANT, BOY, SAN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Betancur 4183* (COL, MO).

***Ornithidium scullianum*  
(J.T.Atwood) M.A.Blanco &  
Ojeda**

*Maxillaria sculliana* J.T.Atwood  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1875-1905 m.  
CHO. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Silverstone-Sopkin 1575* (HT:  
MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Ornithidium semiscabrum*  
Lindl.**

*Maxillaria fasciculata*  
C.Schweinf., *Maxillaria*  
*semiscabra* (Lindl.) P.Ortiz  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-2600 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Uribe-Uribe 4195* (COL, HPUJ).

***Ornithidium serrulatum*  
Lindl.**

*Maxillaria alticola* C.Schweinf.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1450-3000 m.  
ANT, CUN, VAL. No evaluada.

Venezuela a Perú.  
*Zarucchi 7280* (HUA, MO).

***Ornithidium sophronitis*  
Rchb.f.**

*Maxillaria sophronitis* (Rchb.f.)  
Garay  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada. Andes,  
Guayana y Macarena, SN Santa  
Marta. 650-750 m.  
GUI, MAG. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Sudgen 39* (COL, UTMIC).

***Ornithidium vagans* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 4225* (HT: B,  
destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Ornithidium virescens* Schltr.**

Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 120 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 98* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
identidad incierta / known only  
from the type; identity uncertain.

***Ornithocephalus* Hook.**

16 especies, 8 especies endémicas

***Ornithocephalus bicornis*  
Lindl.**

*Ornithocephalus stenoglottis*  
Rchb.f., *Zygostates costaricensis*  
Nash  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Orinoquia,  
Pacífico. 0-1000 m.

ANT, BOY, CHO, GUV, MET.  
No evaluada.  
Centroamérica y Suramérica  
tropical.  
*Cogollo* 1482 (JAUM, MO).

***Ornithocephalus ciliatus*  
Lindl.**

*Ornithocephalus kruegeri* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia?, Orinoquia?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
NOTA: esperada / expected.

***Ornithocephalus cochleariformis* C.Schweinf.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Misas* 185 (HPUJ).

***Ornithocephalus dolabratus*  
Rchb.f.**

*Ornithocephalus estradae*  
Dodson  
Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.

***Ornithocephalus ecuadorensis* (Garay)  
Toscano & Dressler**

*Sphyrastylis ecuadorensis* Garay  
Toscano & Dressler 2000.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2000 m.  
RIS. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz* 717 (HPUJ).

***Ornithocephalus escobarianus* (Garay)  
Toscano & Dressler**

*Sphyrastylis escobariana* Garay  
Toscano & Dressler 2000.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar* 104 (HT: AMES).

***Ornithocephalus gladius*  
Hook.**

*Ornithocephalus bonplandii*  
Rchb.f., *Ornithocephalus inflexus*  
Lindl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Orinoquia. 150-  
900 m.  
ANT, VIC. No evaluada.  
Suramérica tropical y Antillas.  
*Giraldo-Cañas* 775 (HUA).

***Ornithocephalus hoppii*  
(Schltr.) Toscano & Dressler**

*Sphyrastylis hoppii* Schltr.  
Toscano & Dressler 2000.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp* 209 (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Ornithocephalus kalbreyerianus* Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Kalbreyer* 1763 (HT: B).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Ornithocephalus lehmannii*  
Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2640 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Lehmann* 1657 (HT: B  
destruido).

***Ornithocephalus micranthus*  
Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 700 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Ornithocephalus minimiflorus* Senghas**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1100 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Seeger* 0-21958 (HT: HEID).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Ornithocephalus oberonioides* (Schltr.)  
Toscano & Dressler**

*Sphyrastylis oberonioides* Schltr.  
Toscano & Dressler 2000.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Ornithocephalus polyodon*  
Rchb.f.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 130-1000 m.  
CAQ. No evaluada.  
N Suramérica.

***Ornithocephalus tsubotae***  
**(P.Ortiz) Toscano & Dressler**

*Sphyrastylis tsubotae* P.Ortiz  
Toscano & Dressler 2000.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 250 m.

PUT. No evaluada.

Colombia.

Ortiz 1071 (HT: HPUJ).

***Ornithocephalus urceilabris***  
**(P.Ortiz & R.Escobar)**

**Toscano & Dressler**

*Ornithocephalus bisaccoglossus*  
A.Fernández, *Sphyrastylis urceilabris* P.Ortiz & R.Escobar  
Toscano & Dressler 2000.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600 m.

CAU. No evaluada.

Colombia.

Escobar 4048 (HT: JAUM).

***Otoglossum* (Schltr.) Garay & Dunst.**

11 especies, 2 especies endémicas

***Otoglossum arminii* (Rchb.f.)**  
**Garay & Dunst.**

*Odontoglossum arminii* Rchb.f.  
Ortiz 1995.

Hierba, trepadora.

Nativa. Andes. 2100 m.

ANT, NSA. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia, Venezuela y N Brasil.

*Monsalve 45b* (JAUM).

***Otoglossum brevifolium***  
**(Lindl.) Garay & Dunst.**

*Odontoglossum brevifolium*  
Lindl., *Odontoglossum miniatum*  
Linden

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, trepadora.

Nativa. Andes. 1700-2000 m.

DESCONOCIDO. Datos  
Insuficientes (Calderón-Sáenz  
2007).

Costa Rica a N Brasil.

*Otoglossum brevifolium* var.  
*brevifolium*

***Otoglossum candelabrum***  
**(Linden) Jenny & Garay**

*Odontoglossum coronarium*  
Lindl., *Otoglossum coronarium*  
(Lindl.) Garay & Dunst.

Ortiz 1995.

Hierba, trepadora.

Nativa. Andes. 2100 m.

ANT, CUN, SAN. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Hoyos 1235* (HUA).

***Otoglossum chiriquense***  
**(Rchb.f.) Garay & Dunst.**

*Odontoglossum chiriquense*  
Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba, trepadora.

Nativa. Andes. 2100-2700 m.

ANT. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Panamá.

*Lehmann s.n.* (W).

***Otoglossum globuliferum***  
**(Kunth) N.H. Williams &**

**M.W.Chase**

*Oncidium convolvulaceum* Lindl.  
& Paxton, *Oncidium globuliferum*  
Kunth

Ortiz 1995.

Epífita.

Nativa. Andes. 1400-2600 m.

ANT, BOY, CAU, CHO, CUN,  
MET, SAN. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia.

*Fernández 14350* (COL, JAUM,  
P).

***Otoglossum hoppii* (Schltr.)**

**Garay & Dunst.**

*Odontoglossum hoppii* Schltr.

Ortiz 1995.

Hierba, trepadora.

Endémica. Andes. 2000 m.

NAR. No evaluada.

Colombia.

*Hopp 126* (HT: B, destruido).

***Otoglossum palaciosii***  
**(Dodson) M.W.Chase &**

**N.H. Williams**

*Oncidium palaciosii* Dodson

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900-2000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Fonnegra 3606* (HUA, MO).

***Otoglossum sancti-pauli***  
**(Kraenzl.) N.H. Williams &**

**M.W.Chase**

*Oncidium sancti-pauli* Kraenzl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1300 m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

***Otoglossum scansor* (Rchb.f.)**  
**Carnevali & I.Ramírez**

*Oncidium scansor* Rchb.f.

Hierba, epífita.

Nativa. SN Santa Marta. 1000 m.

MAG. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

*Torrijos 13* (UTMC).

***Otoglossum serpens* (Lindl.)**  
**N.H. Williams & M.W.Chase**

*Oncidium serpens* Lindl.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-2050 m.

CUN. No evaluada.

NO Suramérica.  
*Ortiz 69* (HPUJ).

***Otoglossum virolinense***

**P.Ortiz & Jenny**

Ortiz, P. 2011a.  
Trepadora.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Ortiz 1385* (HT: HPUJ).

***Otostylis* Schltr.**

1 especie

***Otostylis brachystalix*  
(Rchb.f.) Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Orinoquia. 150 m.  
VIC. No evaluada.  
Colombia a Trinidad, Guyana, N  
Brasil y Perú.  
*Haught 2783* (COL).

***Pabstiella* Brieger &  
Senghas**

4 especies, 1 especie endémica

***Pabstiella aryter* (Luer)**

**F.Barros**

*Anthereon aryter* (Luer) Pridgeon  
& M.W.Chase, *Pleurothallis*  
*aryter* Luer, *Ronaldella aryter*  
(Luer) Luer, *Specklinia aryter*  
(Luer) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-990 m.  
ANT. No evaluada.  
Costa Rica a Perú.  
*Luer 13095* (MO).

***Pabstiella parvifolia* (Lindl.)**

**Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a Brasil y Bolivia.  
NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se encontraron  
especímenes / recorded from  
Colombia but no specimens were  
seen for this work.

***Pabstiella syringodes* (Luer)**

**F.Barros**

*Anthereon syringodes* (Luer)  
Pridgeon & M.W.Chase,  
*Gyalanthos syringodes* (Luer)  
Szlach. & Marg., *Pleurothallis*  
*syringodes* Luer, *Specklinia*  
*syringodes* (Luer) Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
NAR. No evaluada.  
*Luer 19186* (HT: MO).

***Pabstiella tripterantha***

**(Rchb.f.) F.Barros**

*Pleurothallis tripterantha* Rchb.f.,  
*Specklinia tripterantha* (Rchb.f.)  
Luer  
Luer 2000b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1520-1830 m.  
ANT. No evaluada.  
Costa Rica a Argentina  
(Misiones).  
*Lehmann 134* (W).

***Palmorchis* Barb.Rodr.**

10 especies, 2 especies endémicas

***Palmorchis colombiana***

**Garay**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Pacífico. 30-40 m.  
VAL. No evaluada.  
*Schultes 7370* (HT: AMES).

***Palmorchis deceptoria* Veyret  
& Szlach.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Pacífico. 50-100 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*León 1431* (HT: U).  
NOTA: a menudo erróneamente  
escrita *deceptorius* / often  
misspelled *deceptorius*.

***Palmorchis lobulata* (Mansf.)**

**C.Schweinf. & Correll**

Schweinfurth & Correll 1940;  
Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes. 250-  
800 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Perú, Ecuador.  
NOTA: citada de Colombia por  
Schweinfurth & Correll (1940:  
113), sin citación de espécimen  
/ recorded from Colombia by  
Schweinfurth & Correll (1940:  
113) without specimen citation.

***Palmorchis nitida* Dressler**

Escobar, R. 1990-1998.  
Hierba.  
Nativa. Pacífico. 50-200 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a NO Colombia.  
NOTA: recolectada en Puerto  
Obaldía (Panamá), a 2 km de  
la frontera / collected in Puerto  
Obaldía (Panama), 2 km from  
the border.

***Palmorchis powellii* (Ames)**

**C.Schweinf. & Correll**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Colombia.  
*Misas 4* (HPUJ).

***Palmorchis puber* (Cogn.)****Garay**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, V Magdalena.  
0-500 m.  
AMA, ANT. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil,  
Bolivia.  
*Schneider 438* (COL, JAUM).

***Palmorchis pubescens* Barb.****Rodr.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 150 m.  
VAU. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Romero-Castañeda 3843* (COL).  
NOTA: a menudo erróneamente  
escrita *pubescentis* / often  
wrongly spelled *pubescentis*.

***Palmorchis sobralioides*****Barb.Rodr.**

Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 270 m.  
VAU. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Brasil.  
*Schultes 15207* (AMES).

***Palmorchis trilobulata*****L.O.Williams**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Pacífico. 1-2 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a N Suramérica.  
*White 105* (COL).

***Palmorchis trinotata*****Dressler**

Hierba.  
Nativa. Pacífico. 5 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Misas 6* (HPUJ).

***Paphinia* Lindl.**

7 especies, 3 especies endémicas

***Paphinia cristata* (Lindl.)  
Lindl.**

*Lycaste cristata* (Lindl.) Lindl.,  
*Lycaste randii* (L.Linden  
& Rodigas) G.Nicholson,  
*Maxillaria cristata* Lindl.,  
*Paphinia randii* Linden &  
Rodigas  
Dodson & Neudecker 1990.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 0-1200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Guatemala a Bolivia.  
NOTA: esperada / expected.

***Paphinia dunstervillei*****Dodson & G.A.Romero**

Dodson & Neudecker 1990.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Guayana y Macarena?  
120 m.  
GUI? No evaluada.  
O Venezuela.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Venezuela, justo al otro lado del  
río Guainía / expected; collected  
in Venezuela, just across the  
Guainía River.

***Paphinia lindeniana* Rchb.f.**

*Lycaste lindeniana* (Rchb.f.)  
Nichols  
Dodson & Neudecker 1990.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 50-600 m.  
CAQ, VAU. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil,  
Perú.  
*Schultes 15232* (AMES).

***Paphinia neudeckeri* Jenny**

*Paphinia neudeckeri* var.  
*mocoaensis* Jenny  
Dodson & Neudecker 1990.  
Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 400-  
1200 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Jenny 43* (G).  
*Paphinia neudeckeri* var.  
*mocoaensis* Jenny

***Paphinia posadarum*****Dodson & R.Escobar**

Dodson & Neudecker 1990.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
CHO, NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Dodson 19014* (HT: RPSC; IT:  
JAUM).

***Paphinia rugosa* Rchb.f.**

*Paphinia rugosa* var. *kalbreyeri*  
Rchb.f., *Paphinia rugosa* var.  
*sanderiana* Rchb.f.  
Dodson & Neudecker 1990.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 600-2100 m.  
CAU, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 470* (AMES).

***Paphinia seegeri* G.Gerlach**

*Paphinia seegeri* var. *semialba*  
G.Gerlach  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Seeger s.n.* (HT: HEID).

***Pelexia* Lindl.**

16 especies, 7 especies endémicas

***Pelexia adnata* (Sw.) Rich.**

*Neottia adnata* (Sw.) Sw.,  
*Satyrium adnatum* Sw.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Caribe.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
SE Estados Unidos a México;  
Venezuela, Colombia, Caribe.  
NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron  
especímenes / recorded from  
Colombia but no specimens were  
seen for this work.

***Pelexia asinus* Szlach.**

Szlachetko 1993.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schneider 679/2* (HT: COL).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pelexia callifera*  
(C.Schweinf.) Garay**

*Spiranthes callifera* C.Schweinf.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Panamá a Ecuador y a Guayana  
Francesa.  
NOTA: esperada / expected.

***Pelexia caucae* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 500 m.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (T: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pelexia cundinamarcae*  
Szlach.**

Szlachetko 1993.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2800-2900 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schneider 679/1* (HT: COL).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pelexia decora* (Garay)  
Garay**

*Spiranthes decora* Garay  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1150 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Killip 15318* (IT: US).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pelexia funkiana* (A.Rich. &  
Galeotti) Schltr.**

*Pelexia guatemalensis* Schltr.,  
*Pelexia hondurensis* Ames,  
*Pelexia subaequalis* Ames,  
*Spiranthes funkiana* A.Rich. &  
Galeotti  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-1950 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Centroamérica a Perú.  
*Lozano 6715* (COL, FMB, MA).

***Pelexia hamata* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (T: ?).

***Pelexia hirta* (Lindl.) Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Mora 155* (COL).

***Pelexia laxa* (Poepp. &  
Endl.) Lindl.**

*Pelexia longipetiolata* (Rchb.f.)  
Schltr., *Pelexia maculata* Rolfe,  
*Spiranthes laxa* (Poepp. &  
Endl.) C.Schweinf., *Spiranthes*  
*longipetiolata* Rchb.f., *Spiranthes*  
*maculata* (Rolfe) C.Schweinf.,  
*Stenorrhynchos laxum* Poepp. &  
Endl.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Nicaragua a Brasil y Bolivia.  
NOTA: esperada / expected.

***Pelexia leucosticta* (Rchb.f.)  
Garay & Dunst.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Bolivia.  
NOTA: registro dudoso; señalada  
de Colombia por Dodson (1992),  
pero no hay especímenes /  
dubious species; dubious record;  
recorded from Colombia by  
Dodson (1992) but no specimens  
cited.

***Pelexia olivacea* Rolfe**

*Centrogenium olivaceum* (Rolfe)  
Schltr., *Pelexia lehmanniana*  
Kraenzl., *Pelexia wendlandiana*  
Kraenzl., *Spiranthes funkiana*  
var. *olivacea* (Rolfe) Ames &  
Correll, *Spiranthes wendlandiana*  
(Kraenzl.) Garay  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. V Cauca. 1000 m.  
CAU, VAL. No evaluada.  
Centroamérica a Ecuador y  
Venezuela; Argentina.  
*Silverstone-Sopkin 3502* (CUVC).

***Pelexia orobanchoides*  
(Kraenzl.) Schltr.**

*Stenorhynchos orobanchoides*  
Kraenzl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2200-2900 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
Colombia y Brasil.  
*Schneider 679/1* (COL).

***Pelexia palmorchidis* Szlach.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1120-1700 m.  
QUI, TOL. No evaluada.  
Colombia.  
*García-Barriga 8336* (HT: COL).

***Pelexia sinuosa* Szlach.**

Szlachetko 1993.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1700-1950 m.  
CHO. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Lozano 3193* (HT: COL).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pelexia weberbaueriana*  
(Schltr.) Schltr.**

*Spiranthes weberbaueriana* Schltr.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2200-2520 m.  
ANT, CES, SAN. No evaluada.  
Colombia, Perú, Bolivia.  
*García 493* (COL).  
NOTA: citada por Dueñas  
& Fernández (2009) como  
*weberbauerii* / cited by Dueñas  
& Fernández (2009) as  
*weberbauerii*.

***Peristeria* Hook.**

7 especies, 3 especies endémicas

***Peristeria cerina* Lindl.**

*Lycomormium cerinum* (Lindl.)  
*Benth.*, *Lycomormium minus*  
Kraenzl., *Lycomormium*  
*serronianum* Barb.Rodr.,  
*Peristeria guttata* Knowles  
& Westc., *Peristeria guttata*  
var. *violacea* Josst, *Peristeria*  
*serroniana* (Barb.Rodr.) Garay,  
*Peristeria violacea* (Josst) Foldats  
Gerlach 2000c.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 30-  
1200 m.  
AMA, BOY. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Guyana,  
Brasil, Perú, Ecuador.  
*Renz 3896* (RENZ), Schultes  
6198b (AMES).

***Peristeria cochlearis* Garay**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 300 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 915* (HT: AMES).

***Peristeria elata* Hook.**

Gerlach 2000c.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-1120  
m.  
ANT, CAL, TOL, VAL. No  
evaluada.  
Panamá a Venezuela.  
*García-Barriga 8300* (COL).

***Peristeria ehippium* Rchb.f.**

*Peristeria lindenii* Rolfe  
Gerlach 2000c.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Guayana y Macarena.  
VAU. No evaluada.  
Colombia a Perú, Guayana  
Francesa.  
*Seeger O-21024* (M).

***Peristeria esperanzae* P.Ortiz**

Ortiz 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Amazonia. 200 m.  
GUV. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1249* (HT: HPUJ).

***Peristeria leucoxantha* Garay**

Gerlach 2000c.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Von Sneidern 1081* (IT: AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Peristeria pendula* Hook.**

*Peristeria lentiginosa* W.H.Baxter,  
*Peristeria maculata* Loudon,  
*Peristeria rossiana* Rchb.f.  
Gerlach 2000c.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Panamá a Perú y Venezuela.  
NOTA: esperada; conocida de los  
países vecinos pero todavía no  
hallada en Colombia / expected;  
known from neighboring  
countries but not yet found in  
Colombia.

***Pescatoria* Rchb.f.**

18 especies, 8 especies endémicas

***Pescatoria bella* Rchb.f.**

*Zygopetalum bellum* (Rchb.f.)  
B.D.Jacks.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
NOTA: especie dudosa, prob. un  
hibrido natural. Origen exacto  
desconocido / dubious species;

prob. a natural hybrid; exact origin unknown.

***Pescatoria cerina* (Lindl. & Paxton) Rchb.f.**

*Huntleya cerina* Lindl. & Paxton, *Pescatoria costaricensis* Schltr., *Zygopetalum cerinum* (Lindl. & Paxton) Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 400-1200 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.

***Pescatoria cochlearis* Rolfe**

*Zygopetalum backhousianum* Rchb.f., *Zygopetalum cochleare* Lindl.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
NOTA: la presencia en Colombia requiere verificación / presence in Colombia needs verification.

***Pescatoria coelestis* (Rchb.f.)**

**Dressler**  
*Bollea coelestis* Rchb.f., *Zygopetalum coeleste* (Rchb.f.) Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000-2100 m.  
CAU, NAR, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Lehmann 8036* (AMES).

***Pescatoria coronaria* Rchb.f.**

*Zygopetalum coronarium* Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 500-1900 m.  
ANT, CAL, CHO, RIS, VAL. No evaluada.

Colombia.  
*Franco 1324* (COL).

***Pescatoria dayana* Rchb.f.**

*Pescatoria dayana* var. *rhodacra* Rchb.f., *Zygopetalum dayanum* (Rchb.f.) G.Nicholson  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 300-1200 m.  
ANT, CAL, CHO, RIS, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Colombia.  
*Silverstone-Sopkin 7333* (CUVC).

***Pescatoria hemixantha* (Rchb.f.) Dressler**

*Bollea cardonae* Schnee, *Bollea hemixantha* Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Orinoquia. 100-1300 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia, S Venezuela.  
*Escobar 1193* (AMES).

***Pescatoria hirtzii* (Waldv.) Dressler**

*Bollea hirtzii* Waldvogel  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1300-1500 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
NOTA: especie dudosa; el tipo se perdió; solo existe el reporte de un matero (Orquideología 26(1), 67) / dubious species; type is lost; only a record by a plant hunter (Orquideología 26(1): 67).

***Pescatoria klabochiorum* Rchb.f.**

*Pescatoria fimbriata* Regel, *Pescatoria vervaetii* T.Moore, *Zygopetalum fimbriatum* (Regel) N.E.Br., *Zygopetalum*

*klabochorum* (Rchb.f.) G.Nicholson  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 400-1300 m.  
CAU, CHO, RIS, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 8039* (AMES).

***Pescatoria lalindei* (Linden) Dressler**

*Batemannia lalindei* Linden, *Bollea lalindei* (Linden) Rchb.f., *Bollea patinii* (Rchb.f.) Rchb.f., *Zygopetalum lalindei* (Linden) Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000-2000 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.

***Pescatoria lamellosa* Rchb.f.**

*Zygopetalum lamellosum* (Rchb.f.) B.D.Jacks.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 450-2000 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Escobar 1376* (AMES).

***Pescatoria lawrenceana* (Rchb.f.) Dressler**

*Bollea lawrenceana* Rchb.f., *Zygopetalum lawrenceanum* Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 50-1500 m.  
CHO, RIS, VAL. No evaluada.  
Colombia y N Ecuador.  
*Galeano 2631* (COL).

***Pescatoria lehmannii* Rchb.f.**

*Pescatoria dormaniana* Rchb.f.,  
*Zygopetalum dormanianum*  
(Rchb.f.) G.Nicholson,  
*Zygopetalum lehmannii* (Rchb.f.)  
G.Nicholson  
Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500-1400 m.

CAU, NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Lehmann 25* (AMES, K).

***Pescatoria pulvinaris*  
(Rchb.f.) Dressler**

*Bollea pulvinaris* Rchb.f.,  
*Zygopetalum pulvinare* Rchb.f.  
Harding 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, Pacífico. 500-  
1300 m.

ANT, CHO, RIS, VAL. No  
evaluada.

Colombia.

*Sánchez 1538* (MEDEL).

NOTA: el espécimen  
representativo requiere revisión /  
voucher needs revision.

***Pescatoria rueckeriana*****Rchb.f.**

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

NOTA: especie dudosa, conocida  
solo del tipo (un dibujo);  
híbrido natural?; origen exacto  
desconocido / dubious species  
known only from the type (a  
drawing); a natural hybrid?;  
exact origin unknown.

***Pescatoria triumphans*****Rchb.f. & Warsz.**

*Zygopetalum triumphans* Rchb.f.  
Harding 2008.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.

NOTA: especie dudosa, conocida  
solo del tipo; origen exacto  
desconocido / dubious species,  
known only from the type; exact  
origin unknown.

***Pescatoria wallisii* Linden &  
Rchb.f.**

*Pescatoria euglossa* Rchb.f.,  
*Pescatoria roezlii* Rchb.f.,  
*Zygopetalum euglossum* (Rchb.f.)  
N.E.Br., *Zygopetalum roezlii*  
(Rchb.f.) Rchb.f., *Zygopetalum*  
*wallisii* (Linden & Rchb.f.) Van  
Houtte

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 70-1000  
m.

NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

***Pescatoria whitei* (Rolfe)  
Dressler**

*Bollea whitei* (Rolfe) Schltr.,  
*Zygopetalum whitei* Rolfe  
Harding 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia.

NOTA: especie dudosa, conocida  
solo del tipo; tal vez una forma  
'alba' de *P. lalindei*? / dubious  
species, known only from the  
type; perhaps a form 'alba' of *P.*  
*lalindei*?

***Phloeophila Hoehne &  
Schltr.***

3 especies, 2 especies endémicas

***Phloeophila cunabulum*  
(Luer & R.Escobar) Pridgeon  
& M.W.Chase**

*Ophidion cunabulum* (Luer &  
R.Escobar) Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 2165* (HT: SEL).

***Phloeophila dasyglossa* (Luer  
& R.Escobar) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Ophidion dasyglossum* (Luer &  
R.Escobar) Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 100 m.

CHO. No evaluada.

*Escobar 1627* (HT: JAUM).

***Phloeophila pleurothallopsis*  
(Kraenzl.) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Ophidion pleurothallopsis*  
(Kraenzl.) Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1250-2400 m.

ANT. No evaluada.

Panamá a Bolivia; S Venezuela.

*Lehmann 7272* (HT: K).

***Phragmipedium Rolfe***

7 especies, 2 especies endémicas

***Phragmipedium caudatum*  
(Lindl.) Rolfe**

Garay 1978; Garay 1979;  
Calderón-Sáenz 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 2000-2500 m.

ANT, VAL. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).

Costa Rica a Perú; Venezuela,  
Guyana.

*Ospina 145* (JAUM).

*Phragmipedium caudatum* subsp.  
*caudatum*

***Phragmipedium hirtzii***

**Dodson**

*Paphiopedilum hirtzii* (Dodson)  
V.A. Albert & Borge Pett.  
Calderón-Sáenz 2007.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 500-1000 m.  
NAR. Datos Insuficientes  
(Calderón-Sáenz 2007).  
SO Colombia, NO Ecuador.

***Phragmipedium lindenii***

**(Lindl.) Dressler &  
N.H. Williams**

*Paphiopedilum lindenii* (Lindl.)  
V.A. Albert & Borge Pett.,  
*Uropedium lindenii* Lindl.  
Garay 1979; Calderón-Sáenz  
2007.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1500-2100 m.  
ANT, BOY, CHO, CUN, NSA,  
PUT, SAN, VAL. Preocupación  
Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Venezuela a Perú.  
*McPherson 13489* (HUA, COL).

***Phragmipedium longifolium***

**(Warsz. & Rchb.f.) Rolfe**

*Phragmipedium*  
*christiansenianum* O. Gruss &  
Roeth, *Phragmipedium dariense*  
(Rchb.f.) Garay, *Phragmipedium*  
*hartwegii* (Rchb.f.) Pfitzer,  
*Phragmipedium roezlii* (Rchb.f.)  
Garay  
Dressler 2003; Calderón-Sáenz  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico, V Cauca,  
V Magdalena. 0-2000 m.  
ANT, CAU, CHO, CUN, MET,  
NAR, TOL, VAL. Preocupación  
Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Costa Rica a Ecuador y Perú.  
*Forero 6108* (COL, HUA, BH).

***Phragmipedium manzurii***

**W.E. Higgins & Viveros**  
Higgins & Viveros 2008.

Hierba.  
Endémica. Andes.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Manzur 1501* (HT: FAUC).  
NOTA: especímenes provenientes  
de cultivo, recolectados en  
Santander, sin localidad definida  
/ specimens from cultivation  
collected in Santander, without  
definite locality.

***Phragmipedium schlimii***  
**(Rchb.f.) Rolfe**

Garay 1979; Calderón-Sáenz  
2007.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1200-2500 m.  
ANT, CAQ, MET, NSA, PUT,  
SAN, VAL. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
*Cogollo 3372* (JAUM).

***Phragmipedium***  
***warszewiczianum* (Rchb.f.)**

**Schltr.**  
*Phragmipedium wallisii* (Rchb.f.)  
Garay  
Braem *et al.* 2004; Jacobsen 2008;  
Govaerts *et al.* 2010.  
Epífita, hemiepífita.  
Nativa. Pacífico.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.

***Pityphyllum* Schltr.**

3 especies, 1 especie endémica

***Pityphyllum amesianum***  
**Schltr.**

Sweet 1972; Whitten *et al.* 2006.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 240-  
2400 m.  
CUN, NAR, VAU. No evaluada.  
Colombia y NO Venezuela.  
*Schultes 20070* (AMES, COL).

***Pityphyllum antioquiense***  
**Schltr.**

Sweet 1972; Whitten *et al.* 2006.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1780-2000 m.  
ANT, HUI. No evaluada.  
*Garay 288* (AMES).

***Pityphyllum laricinum***  
**(Kraenzl.) Schltr.**

*Maxillaria laricina* Kraenzl.  
Sweet 1972; Whitten *et al.* 2006.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2180 m.  
CAU, CUN, SAN. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Espinal 3601* (COL).

***Platystele* Schltr.**

34 especies, 15 especies  
endémicas

***Platystele acutilingua***  
**Kapuler & Hascall**

Luer 1990; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 131-  
1375 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Kapuler 268* (HT: COL).

***Platystele alucitae* Luer**

*Platystele cuculligera* P. Ortiz  
Luer 1990; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1850-2500 m.  
ANT, CHO, RIS, SAN. No  
evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 16821* (MO).

***Platystele argentosa* Luer &  
R. Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1250-1375 m.  
ANT. No evaluada.  
*Cogollo 3137* (HT: JAUM; IT: MO).

***Platystele beatricis* P.Ortiz**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. V Cauca. 780 m.  
VAL. No evaluada.  
*Ortiz 1095* (HT: COL).  
NOTA: localidad original desconocida; cultivada en Buga / original location unknown; cultivated in Buga.

***Platystele calantha* P.Ortiz**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2050 m.  
ANT. No evaluada.  
O Colombia a E Ecuador.  
*Escobar 1414* (HT: COL).

***Platystele caudatisepala* (C.Schweinf.) Garay**

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400 m.  
VAL. No evaluada.  
México a Ecuador.  
*Escobar 4001* (MO).

***Platystele consobrina* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100-2350 m.  
ANT, CAU, RIS, VAL. No evaluada.  
O Colombia, prob. Ecuador.  
*Luer 14769* (HT: MO).

***Platystele dasyglossa* P.Ortiz**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 150 m.  
CHO. No evaluada.  
*Escobar 1857* (HT: COL).

***Platystele densiflora* P.Ortiz**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
ANT. No evaluada.  
*Ortiz 909* (HT: COL).

***Platystele dewildei* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1950 m.  
RIS. No evaluada.  
*De Wilde 3908* (HT: MO).

***Platystele examen-culicum* Luer**

*Platystele culex* Luer & R.Escobar  
Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1650-2700 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia a N Perú.  
*Luer 10084* (MO).

***Platystele filamentosa* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1820 m.  
NAR. No evaluada.  
S Colombia a N Ecuador.  
*Dodson 18051* (HT: MO).

***Platystele gyroglossa* Luer**

*Platystele porphyroglossa* P.Ortiz  
Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 720 m.

PUT. No evaluada.  
S Colombia a Ecuador.  
*Ortiz 971* (COL).

***Platystele lehmannii* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400-1700 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 7090* (HT: K).

***Platystele londonoana* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Luer 14301* (HT: MO).  
NOTA: sin datos de colección; recolectada de cultivo / without collection data; collected in cultivation.

***Platystele megaloglossa* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 11374* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Platystele microglossa* P.Ortiz**

*Platystele gemmula* Luer  
Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a O Ecuador.  
*Escobar 1748* (HT: COL).

***Platystele microscopica* Luer**

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a N Ecuador.  
*Luer 4608* (HT: SEL).

***Platystele misasiana* P.Ortiz**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
ANT. No evaluada.  
*Ortiz 960* (HT: COL).

***Platystele orchestris* P.Ortiz**

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.  
*Misas 10* (HT: COL).

***Platystele orectoglossa***

**P.Ortiz**

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1750-2500 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Escobar 1053* (HT: COL).

***Platystele ortiziana* Luer & R.Escobar**

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Panamá a Colombia.  
*Luer 13092* (HT: MO).  
NOTA: sin datos de colección; recolectada de cultivo / without collection data; collected in cultivation.

***Platystele oxyglossa* (Schltr.)**

**Garay**

*Platystele brasiliensis* Brade,  
*Platystele pygmaea* (Hoehne) Pabst,  
*Platystele schulzeana* (Schltr.) Garay,  
*Pleurothallis pygmaea* Hoehne,  
*Pleurothallis schulzeana* Schltr.  
Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1850 m.  
ANT. No evaluada.  
México a Suramérica tropical.  
*Luer 14175* (MO).

***Platystele papillosa* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000-3500 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann s.n.* (HT: K).

***Platystele pisifera* (Lindl.)**

**Luer**

*Humboldtia pisifera* (Lindl.) Kuntze,  
*Platystele hypsitera* Luer & R.Escobar  
Luer 1990; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO Venezuela.  
*Luer 7898* (SEL).

***Platystele posadarum* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700 m.  
RIS. No evaluada.  
Colombia prob. Ecuador.  
*Luer 7451* (HT: SEL).

***Platystele pyriformis* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
*Luer 676* (HT: SEL).

***Platystele rhinocera* Luer & Hirtz**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1800 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a NO Ecuador.  
*Luer 12493* (HT: MO).

***Platystele risaraldae* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1950-2000 m.  
RIS. No evaluada.  
*De Wilde 326* (HT: MO).

***Platystele schmidtchenii* Schltr.**

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador y Bolivia.  
*Escobar 155* (AMES).

***Platystele schneideri* P.Ortiz**

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2750 m.  
ANT, CUN. No evaluada.  
*Ortiz 48* (HT: COL).

***Platystele stenostachya* (Rchb.f.) Garay**

*Humboldtia dubia* (A.Rich. & Galeotti) Kuntze,  
*Humboldtia stenostachya* (Rchb.f.) Kuntze,  
*Pleurothallis dubia* A.Rich. &

Galeotti, *Pleurothallis dubia* var. *myriantha* (F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr., *Pleurothallis lankesteri* Rolfe, *Pleurothallis minutiflora* S.Watson, *Pleurothallis myriantha* F.Lehm. & Kraenzl., *Pleurothallis stenostachya* var. *lankesteri*

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 785-1400 m.

ANT, CHO. No evaluada.

México a Suramérica tropical.

*Cuatrecasas 15642* (AMES).

### ***Platystele stonyx* Luer**

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2100-3240 m.

NAR, PUT. No evaluada.

S Colombia a Bolivia.

*Luer 12519* (HT: MO).

### ***Platystele umbellata* P.Ortiz**

Luer 1990; Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 600-2000 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Ortiz 916* (HT: COL).

## ***Platythelys* Garay**

2 especies, 1 especie endémica

### ***Platythelys debilis* (Lindl.)**

**Garay**

*Erythrodes debilis* (Lindl.) Ames, *Physurus debilis* Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes.

NAR. No evaluada.

Colombia, Bolivia, Paraguay.

*Triana 1547[2]* (COL).

### ***Platythelys pachysepala***

**Ormerod**

Dueñas & Fernández 2007;

Ormerod 2007.

Hierba.

Endémica. Andes.

CAU. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Hulten 3* (HT: S).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

## ***Plectrophora* H.Focke**

1 especie

### ***Plectrophora alata* (Rolfe)**

**Garay**

*Trichocentrum alatum* Rolfe

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1300 m.

CUN, VAL. No evaluada.

Centroamérica a Colombia.

*Forero 365* (COL).

## ***Pleurothallis* R.Br.**

193 especies, 105 especies endémicas

### ***Pleurothallis abortiva* Luer**

*Vestigium abortivum* (Luer) Luer

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1950 m.

NAR. No evaluada.

*Luer 4547* (HT: SEL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

### ***Pleurothallis acutilabia* Luer**

*Acronia acutilabia* (Luer) Luer

Luer 2005; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900 m.

CHO. No evaluada.

O Colombia.

*Ramos 1225* (HT: CUVC, MO).

### ***Pleurothallis adonis* Luer**

*Acronia adonis* (Luer) Luer,

*Zosterophyllanthos adonis* (Luer)

Szlach. & Kulak

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-3400 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

NOTA: señalada de Colombia,

pero no se examinaron

especímenes / recorded from

Colombia but no specimens were

seen for this work.

### ***Pleurothallis aggeris* Luer**

*Rhynchopora aggeris* (Luer)

Szlach. & Marg.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2000 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a N Perú.

*Ospina 64* (JAUM).

## ***Pleurothallis aguirrei* Luer & R.Escobar**

*Acronia aguirrei* (Luer &

R.Escobar) Luer

Luer 2005; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia.

*Escobar 8310* (HT: MO).

## ***Pleurothallis altimonile* Luer & R.Escobar**

*Acronia altimonile* (Luer &

R.Escobar) Luer

Luer 2005; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2650 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 2339* (HT: JAUM).

***Pleurothallis alvaroi* Luer & R.Escobar**

*Acronia alvaroi* (Luer & R.Escobar) Luer  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1840-2000 m.  
ANT, QUI. No evaluada.  
*Luer* 2088 (HT: SEL).

***Pleurothallis ambyx* Luer & R.Escobar**

*Acronia ambyx* (Luer & R.Escobar) Luer,  
*Zosterophyllanthos ambyx* (Luer & R.Escobar) Szlach. & Marg.  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 600-1100 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer* 2045 (HT: SEL).  
NOTA: los datos de elevación son  
de Ecuador / elevation data are  
from Ecuador.

***Pleurothallis amphigya* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2500 m.  
CUN. No evaluada.  
*Luer* 2047 (HT: SEL).

***Pleurothallis anceps* Luer**

*Ancipitia anceps* (Luer) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1820 m.  
NAR, VAL. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer* 2056 (SEL).

***Pleurothallis antennifera* Lindl.**

*Humboldtia antennifera* (Lindl.)  
Kuntze, *Humboldtia cyclochila*

(Lindl.) Kuntze, *Humboldtia incurva* (Lindl.) Kuntze,  
*Pleurothallis cyclochila* Lindl.,  
*Pleurothallis incurva* Lindl.  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO  
Venezuela.  
*Luer* 14239 (MO).

***Pleurothallis anthrax* Luer & R.Escobar**

*Ancipitia anthrax* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia.  
*Luer* 3724 (HT: SEL).

***Pleurothallis ascera* Luer & R.Escobar**

*Acronia ascera* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
VAL. No evaluada.  
*Escobar* 5052 (HT: JAUM; IT:  
MO).

***Pleurothallis baudoensis* Luer & R.Escobar**

*Acronia baudoensis* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa y cultivada, Endémica y  
cultivada. Andes, Pacífico. 400-  
1000 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*De Wilde* 3915 (HT: MO).

***Pleurothallis belocardia* Schltr.**

*Acronia belocardia* (Schltr.) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
CUN. No evaluada.  
*Hopf s.n.* (HT: ?).

***Pleurothallis beyrodtiana* Kraenzl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*s.c.* (HBG501882).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pleurothallis bicochlearis* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2500 m.  
CHO. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Silverstone-Sopkin* 4282 (CUVC,  
MO).

***Pleurothallis bicornis* Lindl.**

Luer 1999; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2950 m.  
ANT, CHO, NSA. No evaluada.  
Colombia a Perú; NO Venezuela.  
*Luer* 10266 (MO).

***Pleurothallis bivalvis* Lindl.**

*Acronia bivalvis* (Lindl.) Luer,  
*Humboldtia bivalvis* (Lindl.)  
Kuntze, *Humboldtia cardium*  
(Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis*  
*angusta* Ames & C.Schweinf.,  
*Pleurothallis antonensis*  
L.O.Williams, *Pleurothallis*  
*archidiaconi* Ames, *Pleurothallis*

*cardiantha* Rchb.f., *Pleurothallis cardium* Rchb.f., *Pleurothallis chanchamayoensis* Schltr., *Pleurothallis fuscata* Braid, *Pleurothallis harlingii* Garay, *Pleurothallis ignivomi* Schltr., *Pleurothallis lansbergiana* Regel, *Pleurothallis lansbergii* Regel, *Pleurothallis lilianiae* Luer, *Pleurothallis phaeantha* Schltr., *Pleurothallis pichincae* Schltr., *Pleurothallis sigsigensis* Schltr., *Pleurothallis stenocardium* Schltr. Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 1900 m. ANT. No evaluada. México, Costa Rica a Trinidad y Perú. *Fonnegra* 3492 (HUA, MO).

***Pleurothallis bovilinqua* Luer & R.Escobar**

*Acronia bovilinqua* (Luer & R.Escobar) Luer Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. DESCONOCIDO. No evaluada. Colombia. *Escobar* 986 (HT: AMES). NOTA: sin datos de elevación o departamento / without elevation or department data.

***Pleurothallis bulbosa* (Luer & R.Escobar) Pfahl**

*Acronia bulbosa* Luer & R.Escobar Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. Andes. 2060 m. ANT, VAL. No evaluada. Cordillera Central. *Luer* 17617 (MO).

***Pleurothallis calamifolia***

**Luer & R.Escobar**

*Acronia calamifolia* (Luer & R.Escobar) Luer Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 2100 m. NSA. No evaluada. NE Colombia a NO Venezuela. *Luer* 10325 (HT: MO).

***Pleurothallis calceolaris***

**Rchb.f.**

*Acronia calceolaris* (Rchb.f.) Luer, *Pleurothallis fornix* Luer & R.Escobar, *Zosterophyllanthos fornix* (Luer & R.Escobar) Szlach. & Marg. Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. Andes. 2180 m. ANT. No evaluada. *Roezl s.n.* (HT: W).

***Pleurothallis calogramma***

**Luer**

*Acronia calogramma* (Luer) Luer Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. Andes. 2440 m. ANT. No evaluada. *Luer* 2115 (HT: SEL).

***Pleurothallis calolalax* Luer**

**& R.Escobar**

*Acronia calolalax* (Luer & R.Escobar) Luer Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. Andes. 2430 m. ANT. No evaluada. *Luer* 17693 (HT: JAUM; IT: MO).

***Pleurothallis calvariola* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 3070 m. CAU. No evaluada. SO Colombia a N Ecuador. *Luer* 3056 (HT: SEL).

***Pleurothallis canaligera***

**Rchb.f.**

*Acronia canaligera* (Rchb.f.) Luer, *Pleurothallis scaphioglottis* Schltr., *Pleurothallis syringifolia* Kraenzl. Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 2350-2800 m. ANT, RIS. No evaluada. Costa Rica a O Perú. *Roezl s.n.* (HT: W).

***Pleurothallis canidentis* Luer**

**& R.Escobar**

*Acronia canidentis* (Luer & R.Escobar) Luer Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. Andes. 2400 m. ANT. No evaluada. *Escobar* 5228 (HT: JAUM).

***Pleurothallis capitonis* Luer**

**& R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 2150 m. SAN. No evaluada. *Luer* 10110 (HT: MO).

***Pleurothallis caprina* Luer & R.Escobar**

**R.Escobar**

*Ancipitia caprina* (Luer & R.Escobar) Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2200 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 226* (HT: JAUM).

***Pleurothallis cardiophylax*  
Rchb.f.**

*Acronia cardiophylax* (Rchb.f.)  
Luer, *Zosterophyllum*  
*cardiophylax* (Rchb.f.) Szlach. &  
Kulak  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a N Perú.  
NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron  
especímenes / recorded from  
Colombia but no specimens were  
seen for this work.

***Pleurothallis cardiostola*  
Rchb.f.**

*Acronia cardiostola* (Rchb.f.)  
Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2280 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia, N  
Venezuela; Paraguay.  
*Luer 6549* (SEL).

***Pleurothallis cardiothallis*  
Rchb.f.**

*Acronia cardiothallis* (Rchb.f.)  
Luer, *Humboldtia cardiothallis*  
(Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis*  
*acutipetala* Schltr., *Pleurothallis*  
*costaricensis* Schltr., *Pleurothallis*  
*schlechteriana* Ames,  
*Pleurothallis subulata* Rolfe  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
México a Ecuador.  
*Luer 1994* (SEL).

***Pleurothallis carnosa* Braid**

*Acronia carnosa* (Braid) Luer,  
*Zosterophyllum carnosus*  
(Braid) Szlach. & Kulak  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
VAL. No evaluada.  
NOTA: cultivada en Kew, sin  
datos de origen / cultivated in  
Kew, no source data.

***Pleurothallis cassidata* Luer  
& R.Escobar**

*Acronia cassidata* (Luer &  
R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
BOY. No evaluada.  
*Escobar 8289* (HT: JAUM).

***Pleurothallis cernua* Luer**

Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1970 m.  
CHO. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador.  
*Silverstone-Sopkin 1678* (CUVC,  
MO).

***Pleurothallis chloroleuca*  
Lindl.**

*Humboldtia chloroleuca* (Lindl.)  
Kuntze, *Humboldtia ventricosa*  
(Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis*  
*reichenbachiana* Schltr.,  
*Pleurothallis rhomboglossa*  
Rchb.f., *Pleurothallis*  
*ventricosa* Lindl., *Pleurothallis*  
*wendlandiana* Rchb.f.

Luer 1998b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2440 m.  
ANT, CAU, CUN, NAR. No  
evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Linden 1269* (HT: K).

***Pleurothallis chuscalica* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-2800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Lehmann 7134* (HT: K).

***Pleurothallis circinata* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2070-2430 m.  
VAL. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin 3951* (HT:  
CUVC).

***Pleurothallis colossus* Kerch.**

*Pleurothallis hirtzii* Luer,  
*Pleurothallis praegrans* Ames,  
*Pleurothallis saccata* Ames  
Luer 1999; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2425 m.  
CAU, NAR, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a NO Ecuador.  
*Lehmann 6929* (LT: LE; ILT:  
AMES, K).

***Pleurothallis constricta* Luer  
& R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
SAN. No evaluada.  
*Escobar 5297* (HT: JAUM).

***Pleurothallis cordata* (Ruiz & Pav.) Lindl.**

*Acronia cordata* (Ruiz & Pav.) Luer, *Humboldtia monocardia* (Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis cardiophylla* Schltr., *Pleurothallis cordifolia* var. *rhopalocarpa* (Schltr.) T.Hashim., *Pleurothallis monocardia* Rchb.f., *Pleurothallis rachyblephara* Schltr., *Pleurothallis rhopalocarpa* Schltr., *Stelis cordata* (Ruiz & Pav.) Willd., *Zosterophyllanthos monocardius* (Rchb.f.) Szlach. & Marg.  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1310-2400 m.  
ANT, RIS, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; Venezuela.  
Cogollo 2687 (JAUM, MO).

***Pleurothallis cordifolia* Rchb.f. & H. Wagoner**

*Acronia cordifolia* (Rchb.f. & Wagoner) Luer, *Humboldtia cordifolia* (Rchb.f. & Wagoner) Kuntze  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1370-2700 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Perú; N Venezuela.  
*Hutchison* 3133 (F, K, MO, M, MICH, NY, P, UC, US).

***Pleurothallis coriacardia* Rchb.f.**

*Acronia coriacardia* (Rchb.f.) Luer, *Humboldtia coriacardia* (Rchb.f.) Kuntze, *Zosterophyllanthos coriacardia* (Rchb.f.) Szlach. & Kulak  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-3500 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Zarucchi* 6859 (HUA).

***Pleurothallis cornualis* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Pleurothallis cosmetron* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800-3100 m.  
BOL, CÓR. No evaluada.  
*Pennell* 4352 (HT: NY).

***Pleurothallis cotyligera* Luer & R. Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer* 16765 (HT: MO).

***Pleurothallis crocodiliceps* Rchb.f.**

Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1650 m.  
NSA. No evaluada.  
S México a Perú; Venezuela.  
*Wagoner s.n.* (HT: W).

***Pleurothallis cunabularis* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1940-2450 m.  
CHO. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin* 4909 (HT: CUV).

***Pleurothallis cyanea* Luer & R. Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2180 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer* 8758 (HT: SEL).

***Pleurothallis cymbisepala* Schltr.**

Luer 1999; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700-3000 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a S Ecuador.  
*Luer* 3078 (NT: K).

***Pleurothallis deflexa* Luer**

*Acronia deflexa* (Luer) Luer, *Zosterophyllanthos deflexus* (Luer) Szlach. & Kulak  
*Idárraga et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Luer* 16870 (MO).

***Pleurothallis depressa* Luer & R. Escobar**

*Acronia depressa* (Luer & R. Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
CHO. No evaluada.  
NO Colombia.  
*Luer* 17569 (HT: MO).

***Pleurothallis dewildei* Luer & R. Escobar**

*Acronia dewildei* (Luer & R. Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2430 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16854* (HT: MO).

***Pleurothallis diabolica* Luer & R.Escobar**

*Acronia diabolica* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1300-1800 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 2161* (HT: SEL).

***Pleurothallis discoidea* Lindl.**

*Acronia discoidea* (Lindl.) Luer,  
*Pleurothallis sugdenii* Luer  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Caribe, Pacífico.  
300-1100 m.  
ANT, CHO, CUN, GUJ. No evaluada.  
América tropical.  
*Luer 13093* (MO).

***Pleurothallis divaricans* Schltr.**

Luer 1999; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
VAL. No evaluada.  
Panamá a Bolivia.  
*Hartman 62* (CUVC).

***Pleurothallis dunstervillei* Foldats**

*Ancipitia dunstervillei* (Foldats) Luer  
Luer 1989; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
NAR. No evaluada.

Colombia a Perú; NO Venezuela.  
*Luer 2744* (SEL).

***Pleurothallis duplex* Luer & R.Escobar**

*Ancipitia duplex* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 6684* (HT: SEL).

***Pleurothallis erythrium* Luer**

*Acronia erythrium* (Luer) Luer,  
*Zosterophyllum erythrium* (Luer) Szlach. & Kulak  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Pleurothallis forceps-cancri* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
CHO. No evaluada.  
*Luer 612a* (HT: SEL).

***Pleurothallis fossulata* Luer & R.Escobar**

*Acronia fossulata* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
HUI. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Escobar 5203* (HT: JAUM).

***Pleurothallis fugax* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2520 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia (prob. Panamá).  
*Luer 2325* (HT: JAUM).

***Pleurothallis ganymedes* Luer & R.Escobar**

*Acronia ganymedes* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Luer 4086* (HT: SEL).

***Pleurothallis garayana* (Ospina) Luer**

*Colombiana garayana* Ospina  
Luer 1989; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Ospina 752* (Herb Mariano Ospina).

***Pleurothallis giraldoi* Luer**

*Acronia giraldoi* (Luer) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
VAL. No evaluada.  
*Giraldo 97* (HT: TULV).

***Pleurothallis glabra* Luer & R.Escobar**

*Acronia glabra* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1450-1850 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 14187* (HT: MO).

***Pleurothallis globosa* Luer & R.Escobar**

*Acronia globosa* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5012* (HT: JAUM).

***Pleurothallis glochis* Luer & R.Escobar**

Luer 1998b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
*Luer 3735* (HT: SEL).

***Pleurothallis glossopogon* Rchb.f.**

*Humboldtia biserrula* (Rchb.f.) Kuntze, *Humboldtia glossopogon* (Rchb.f.) Kuntze, *Humboldtia insignis* (Rolfe) Kuntze, *Lindleyalis glossopogon* (Rchb.f.) Luer, *Pleurothallis birchenallii* Rolfe, *Pleurothallis biserrula* Rchb.f., *Pleurothallis hoppii* Schltr., *Pleurothallis insignis* Rolfe  
Luer 2000b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2130 m.  
SAN. No evaluada.  
NE Colombia a NO y N Venezuela.  
*Wagner 339* (HT: W).

***Pleurothallis gomezii* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16789* (HT: MO).

***Pleurothallis gracilipedunculata* Foldats**

Luer 1998b; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800 m.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 7581* (SEL).

***Pleurothallis grandiflora* Lindl.**

*Acronia grandiflora* (Lindl.) Luer, *Humboldtia grandiflora* (Lindl.) Kuntze, *Zosterophyllanthos grandiflorus* (Lindl.) Szlach. & Marg.  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.  
VAL. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador.  
*Escobar 5026* (MO).

***Pleurothallis habenula* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700 m.  
NAR, PUT. No evaluada.  
S Colombia a N Ecuador.  
*Luer 3119* (HT: SEL).

***Pleurothallis hartwegii* Lindl.**

*Humboldtia hartwegii* (Lindl.) Kuntze  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
CAU. No evaluada.

NO Venezuela a Ecuador.  
*Hartweg 1406* (K).

***Pleurothallis hemisphaerica* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2520 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 2520* (HT: SEL).

***Pleurothallis hippocrepica* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Escobar 2704* (HT: SEL).

***Pleurothallis hitchcockii* Ames**

*Talpinaria hitchcockii* (Ames) Luer  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Guayana y Macarena. 410-560 m.  
MET. No evaluada.  
N Suramérica a Ecuador.  
*Callejas 6030* (HUA, MO).

***Pleurothallis holtonii* Luer**

*Elongatia holtonii* (Luer) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
CUN. No evaluada.  
*Holton s.n.* (HT: NY).

***Pleurothallis imber-florum* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
CHO. No evaluada.  
*Escobar 2541* (HT: SEL).

***Pleurothallis incongrua* Luer**

*Mixis incongrua* (Luer) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
VAL. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin 2686* (HT:  
CUVC).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pleurothallis index* Luer**

*Acronia index* (Luer) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1950 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
*Luer 4582* (HT: SEL).

***Pleurothallis inflata* Rolfe**

*Pleurothallis lindenii* var. *pumila*  
Rchb.f.  
Luer 1999; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
BOY. No evaluada.  
NO Venezuela a Ecuador.  
*Luer 7533* (SEL).

***Pleurothallis jaculifera* Luer  
& R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
RIS. No evaluada.  
*Luer 16843* (HT: JAUM).

***Pleurothallis jaramilloi* Luer**

*Acronia jaramilloi* (Luer) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
BOY. No evaluada.  
*Jaramillo 20254* (HT: COL).

***Pleurothallis kateora* (Garay)  
Luer**

*Apoda-prorepentia kateora*  
(Garay) Luer  
Garay & Sweet 1974; Luer 2004;  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 400 m.  
CHO. No evaluada.  
O Colombia.  
*Escobar 1078* (HT: AMES).

***Pleurothallis killipii* Garay**

*Acronia killipii* (Garay) Luer,  
*Zosterophyllum killipii*  
(Garay) Szlach. & Marg.  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3250 m.  
CUN. No evaluada.  
*Killip 34061* (HT: US).

***Pleurothallis lacera* Luer**

*Acronia lacera* (Luer) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
*Lehmann 6283* (K).

***Pleurothallis lamellaris*  
Lindl.**

*Humboldtia lamellaris* (Lindl.)  
Kuntze, *Pleurothallis loxensis*  
Luer & Hirtz  
Luer 1999; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
C Colombia a Bolivia.  
*Escobar 8393* (MO).

***Pleurothallis languida* Luer  
& R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
CAU. No evaluada.  
*Luer 17564* (HT: MO).

***Pleurothallis latipetala*  
Garay**

*Acronia latipetala* (Garay) Luer,  
*Pleurothallis northenae* Luer,  
*Zosterophyllum northenae*  
(Luer) Szlach. & Marg.  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
ANT. No evaluada.  
*Von Sneidern 1602* (HT: S).

***Pleurothallis lehmanniana*  
Schltr.**

*Crocodelanthe lehmanniana*  
(Schltr.) Luer, *Pleurothallis*  
*endotrachys* F.Lehm. & Kraenzl.  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700-3400 m.  
CAU, NAR, PUT. No evaluada.  
SO Colombia a N Ecuador.  
*Luer 12552* (NT: MO).

***Pleurothallis lilijae* Foldats**

*Acronia lilijae* (Foldats) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400-3200 m.  
PUT. No evaluada.

NO Venezuela a O Suramérica.  
*Luer 12540* (MO).

***Pleurothallis lindenii* Lindl.**

Luer 1999; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
ANT, CAU, CUN, SAN. No evaluada.  
Colombia a Perú; Venezuela.  
*Luer 10189* (MO).

***Pleurothallis linguifera* Lindl.**

*Acronia linguifera* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis boliviana* Schltr., *Pleurothallis buchtienii* Schltr., *Zosterophyllanthos linguifer* (Lindl.) Szlach. & Marg.  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2700 m.  
ANT, BOY, CHO, CUN, NAR. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; Venezuela.  
*Luer 7561* (SEL).

***Pleurothallis litotes* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2750 m.  
CAU. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
*Luer 2997* (SEL).

***Pleurothallis lobata* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 200-2300 m.  
ANT. No evaluada.  
*Lehmann s.n.* (HT: K).

***Pleurothallis londonoi* Luer**

*Ancipitia londonoi* (Luer) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3150 m.  
ANT. No evaluada.  
*Londoño 83* (HT: HUA).

***Pleurothallis lopezii* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 8291* (HT: JAUM).

***Pleurothallis loranthophylla* Rchb.f.**

*Humboldtia subpellucida* (Klotzsch) Kuntze, *Pleurothallis intermedia* Schltr., *Pleurothallis navicularis* Lindl., *Pleurothallis punctata* Ker Gawl., *Pleurothallis spathata* Schltr., *Pleurothallis subpellucida* Klotzsch, *Pleurothallis violaceo-rosea* Schltr., *Rhynchopera punctata* H.Karst.  
Luer 1998a; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2400 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Costa Rica a Perú; Guyana y Venezuela.  
*Luer 13121* (MO).

***Pleurothallis luctuosa* Rchb.f.**

*Humboldtia luctuosa* (Rchb.f.) Kuntze  
Luer 1998b; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50-100 m.  
NAR. No evaluada.  
Nicaragua a Ecuador.  
*Killip 33162* (COL, US).

***Pleurothallis lunaris* Luer & R.Escobar**

*Acronia lunaris* (Luer & R.Escobar) Luer

Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 1156* (HT: JAUM).

***Pleurothallis macrocardia* Rchb.f.**

*Pleurothallis pulvinipes* Schltr.  
Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1770-1800 m.  
CUN, NAR. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO Venezuela.  
*Salazar 8965* (MO).

***Pleurothallis magnifica* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3150 m.  
CAU. No evaluada.  
Macizo Colombiano.  
*Luer 8374* (HT: SEL).

***Pleurothallis manicosa* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
VAL. No evaluada.  
*Luer 17554* (HT: JAUM).

***Pleurothallis marthae* Luer & R.Escobar**

*Acronia marthae* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000-3500 m.  
VAL. No evaluada.  
*Luer 16689* (HT: JAUM).

***Pleurothallis matudana***

**C.Schweinf.**

*Acronia matudana* (C.Schweinf.) Luer, *Zosterophyllanthos matudanus* (C.Schweinf.) Szlach. & Marg.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2300 m.  
ANT, CHO, HUI, RIS, SAN, VAL. No evaluada.  
México a Bolivia.  
*Franco 7968* (COL).

***Pleurothallis megalorhina***

**Luer & R.Escobar**

*Acronia megalorhina* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2350-2650 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 11389* (HT: MO).

***Pleurothallis***

***membracidoides* Luer**

*Ancipitia membracidoides* (Luer) Luer  
Luer 1989; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.  
NAR. No evaluada.  
S Colombia.  
*Luer 4580* (HT: SEL).

***Pleurothallis microcardia***

**Rchb.f.**

*Pleurothallis chachatoynsis* Schltr., *Pleurothallis cundinamarcae* Schltr., *Pleurothallis stenosepala* Rolfe  
Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1770-2400 m.  
CUN, NAR. No evaluada.

Colombia a Bolivia.  
*Espinal 2502* (MO).

***Pleurothallis mocoana***

**Schltr.**

*Specklinia mocoana* (Schltr.) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 530 m.  
PUT. No evaluada.  
*Hopp 69* (?).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Pleurothallis mundula* Luer**

**& R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2930 m.  
TOL. No evaluada.  
Nevado del Tolima.  
*Luer 7502* (HT: SEL).

***Pleurothallis navilinguis***

**Rchb.f.**

*Humboldtia navilinguis* (Rchb.f.) Kuntze  
Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1520 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: especie dudosa, conocida solo de la publicación original; tipo no localizado / dubious species, known only from the original publication; type not located.

***Pleurothallis nellyae* P.Ortiz**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200-1700 m.  
VAL. No evaluada.  
*Ortiz 1081* (HT: HUJ).

***Pleurothallis niesseniae* Luer**

*Specklinia niesseniae* (Luer) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. V Cauca. 750 m.  
VAL. No evaluada.  
*Niessen 121* (HT: MO).

***Pleurothallis nossax* Luer &**

**R.Escobar**

*Acronia nossax* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2150 m.  
CAU. No evaluada.  
*Escobar 1520* (HT: JAUM).

***Pleurothallis notabilis* Luer**

**& R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-2800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 2085* (HT: SEL).

***Pleurothallis nox-media* Luer**

**& R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2700 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
*Luer 17987* (HT: MO).

***Pleurothallis nuda***

**(Klotzsch) Rchb.f.**

*Lindleyalis hemirhoda* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis hemirhoda* Lindl. & Paxton  
Luer 2000b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Bolivia; N  
Venezuela.

*Linden s.n.* (HT: K).

NOTA: sin datos de localidad  
específica / no specific locality  
data.

***Pleurothallis nutans* Schltr.**

Luer 1999; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

CUN, NSA. No evaluada.

*Luer 7922* (NT: SEL).

***Pleurothallis octavioi* Luer &  
R.Escobar**

*Acronia octavioi* (Luer &  
R.Escobar) Luer

Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-2380 m.

HUI, PUT. No evaluada.

*Luer 3725* (HT: SEL).

***Pleurothallis odobeniceps***

**Luer**

*Ancipitia odobeniceps* (Luer) Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1900-2600 m.

ANT, CHO, VAL. No evaluada.

*Zarucchi 5950* (HT: MO).

***Pleurothallis orecta* Luer &  
R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.

RIS. No evaluada.

*Escobar 5106* (HT: JAUM).

***Pleurothallis orthostachys*  
Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1850 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Escobar 2622* (HT: SEL).

***Pleurothallis pedunculata*  
(Klotzsch) Rchb.f.**

*Rhynchopera pedunculata*  
Klotzsch

Luer 1998; Idárraga *et al.* 2011;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400-2600 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a N Venezuela.

*Escobar 8270* (MO).

***Pleurothallis penduliflora*  
Kraenzl.**

Luer 1999; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2400 m.

ANT. No evaluada.

C Colombia a C Perú.

*Lehmann 7158* (K).

***Pleurothallis penicillata* Luer**

*Colombiana penicillata* (Luer)  
Luer

Luer 1989; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600 m.

NAR. No evaluada.

*Luer 4610* (HT: SEL).

***Pleurothallis perijaensis*  
Dunst.**

*Acronia perijaensis* (Dunst.) Luer,  
*Zosterophyllanthos perijaensis*  
(Dunst.) Szlach. & Marg.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200 m.

CES, NSA. No evaluada.

NO Venezuela a Ecuador.

*Luer 7778* (COL).

***Pleurothallis phalangifera*  
(C.Presl) Rchb.f.**

*Acronia phalangifera* C.Presl,  
*Humboldtia decurva* (Lindl.)

Kuntze, *Humboldtia mathewsii*

Kuntze, *Humboldtia phalangifera*

(C.Presl) Kuntze, *Pleurothallis*

*bogotensis* Lindl., *Pleurothallis*

*decurva* Lindl., *Pleurothallis*

*ineziae* Schltr., *Pleurothallis*

*mathewsii* Lindl., *Pleurothallis*

*nasuta* Schltr., *Pleurothallis*

*schnitteri* Schltr., *Pleurothallis*

*wernerii* Schltr.

Luer 1998b; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2650 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Perú; NO Venezuela.

*Luer 14139* (MO).

***Pleurothallis*  
*phyllocardioides* Schltr.**

*Acronia phyllocardioides* (Schltr.)

Luer, *Pleurothallis acostaei*

Schltr., *Pleurothallis graciliscapa*

C.Schweinf., *Pleurothallis*

*rhapidopus* Schltr.

Luer 2005; Viveros & Higgins

2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. 50-1560 m.

ANT, VAL. No evaluada.

Centroamérica a Bolivia.

*Gentry 56778* (MO).

***Pleurothallis pileata* Luer &  
R.Escobar**

*Acronia pileata* (Luer &  
R.Escobar) Luer

Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 600-800 m.

CHO. No evaluada.

O Colombia.

*Luer 6723* (HT: SEL).

***Pleurothallis platypetala***

**Luer & R.Escobar**

*Acronia platypetala* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2350 m.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia.  
*Luer 12539* (HT: MO).

***Pleurothallis platysepala***

**Schltr.**

*Acronia platysepala* (Schltr.)  
Luer, *Pleurothallis granularis*  
Luer & R.Escobar  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2000 m.  
CAU. No evaluada.  
SO Colombia.  
*Luer 8183* (SEL).

***Pleurothallis poculifera* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
CAU. No evaluada.  
*Luer 3008* (HT: SEL).

***Pleurothallis polysticta* Luer**

Luer 1998b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Panamá a Colombia.  
*Luer 16889* (MO).

***Pleurothallis portilloi* Luer & R.Escobar**

*Apoda-proreptentia portilloi* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1730 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 6688* (HT: SEL).

***Pleurothallis possoae* Luer**

*Crocodelanthe possoae* (Luer)  
Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3240 m.  
PUT. No evaluada.  
*Pasmíño 22* (HT: PSO; IT: MO).

***Pleurothallis pruinosa* Lindl.**

*Humboldtia pruinosa* (Lindl.)  
Kuntze, *Pleurothallis flavida*  
(H.Focke) Lindl., *Pleurothallis pauciflora* Schltr., *Stelis flavida*  
H.Focke  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 5-20 m.  
VAL. No evaluada.  
América tropical, Antillas.  
*Cuatrecasas 14049* (AMES).

***Pleurothallis pulvinaris* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2350-2800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 2685* (HT: SEL).

***Pleurothallis punctulata* Rolfe**

*Talpinaria punctulata* (Rolfe)  
Luer  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2820 m.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Veitch s.n.* (HT: K).

***Pleurothallis quadricaudata* Schltr.**

*Pleurothallis arachnion* Luer  
Luer 1998b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.  
ANT, CHO, NAR. No evaluada.  
SO Colombia a NO Ecuador.  
*Luer 4606* (SEL, HT de *P. arachnion*).

***Pleurothallis quaternaria***

**Luer**

Luer 1998b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
VAL. No evaluada.  
*Luer 18418* (MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pleurothallis questionis* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
CHO. No evaluada.  
*Luer 16803* (HT: MO).

***Pleurothallis ramificans* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
*Luer 4649* (SEL).

***Pleurothallis ramosii* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-1900 m.  
CHO. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Ramos 1224* (HT: CUVC).

***Pleurothallis reginae* Garay**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 800 m.  
CAU. No evaluada.  
*Von Sneidern 811* (HT: S).

***Pleurothallis revoluta* (Ruiz & Pav.) Garay**

*Elongatia macrophylla* (Kunth) Luer, *Humboldtia diffusa* Kuntze, *Humboldtia semipellucida* (Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis complicata* Rusby, *Pleurothallis diffusa* Poepp. & Endl., *Pleurothallis macrophylla* Kunth, *Pleurothallis semipellucida* Rchb.f.  
Luer 1999; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1450 m.  
CAU, CUN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia, Venezuela; Trinidad.  
*Schneider 580* (S).

***Pleurothallis rhodoglossa* Schltr.**

*Acronia rhodoglossa* (Schltr.) Luer, *Zosterophyllanthos rhodoglossus* (Schltr.) Szlach. & Marg.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1800 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Pleurothallis rowleei* Ames**

*Pleurothallis cucullata* Ames, *Pleurothallis rhodocardia* Garay  
Luer 1998b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 250 m.  
CAU, CHO, NAR. No evaluada.  
Costa Rica a O Ecuador.  
*Escobar 5229* (MO).

***Pleurothallis rubella* Luer**

*Platystele aurea* Garay, *Rubellia rubella* (Luer) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400 m.  
QUI. No evaluada.  
Panamá a Ecuador.  
*Escobar 886* (AMES).

***Pleurothallis ruberrima* Lindl.**

*Acronia ruberrima* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis opeatorhyncha* Schltr., *Pleurothallis yungasensis* Rolfe  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO y N Venezuela.  
*Schneider 404* (S).

***Pleurothallis rugosa* Luer & R.Escobar**

*Acronia rugosa* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3070 m.  
CAU. No evaluada.  
*Luer 3053* (HT: SEL).

***Pleurothallis ruscaria* Luer**

*Colombiana ruscaria* (Luer) Luer  
Luer 1989; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.

NAR. No evaluada.  
SO Colombia a N Ecuador.  
*Luer 4611* (HT: SEL).

***Pleurothallis ruscifolia* (Jacq.) R.Br.**

*Dendrobium ruscifolium* (Jacq.) Sw., *Humboldtia ruscifolia* (Jacq.) Kuntze, *Humboldtia succosa* Lindl., *Pleurothallis glomerata* Ames, *Pleurothallis multicaulis* Poepp. & Endl., *Pleurothallis ruscifolia* var. *caquetana* Schltr., *Pleurothallis succosa* Lindl.  
Luer 1999; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta. 600-2400 m.  
ANT, CHO, MAG. No evaluada.  
México a Suramérica tropical; islas del Caribe.  
*Luer 11379* (MO).

***Pleurothallis sagittilabia* Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 900-1900 m.  
VAL. No evaluada.  
*Giraldo 557* (HT: TULV).

***Pleurothallis sandemanii* Luer**

*Talpinaria sandemanii* (Luer) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Orinoquia. 500 m.  
MET. No evaluada.  
*Sandeman 5872* (HT: K).

***Pleurothallis sanluisii* Foldats**

*Pleurothallis stalkyi* Luer  
Luer 1998b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 18560A* (MO).  
NOTA: espécimen sin datos de  
localidad o elevación / specimen  
without locality or elevation  
data.

***Pleurothallis sannio* Luer &  
R.Escobar**

*Acronia sannio* (Luer &  
R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
CHO. No evaluada.  
*Luer 17624* (HT: MO).

***Pleurothallis scabrilinguis*  
Lindl.**

*Acronia scabrilinguis* (Lindl.)  
Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2730 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Wilde 4317* (MO).

***Pleurothallis secunda* Poepp.  
& Endl.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3500 m.  
ANT, ARA, BOY, CAU, CHO,  
CUN, HUI, MAG, MET, QUI,  
RIS, SAN. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Idrobo 3578* (COL).

***Pleurothallis semiscabra*  
Lindl**

*Acronia semiscabra* (Lindl.) Luer,  
*Humboltia semiscabra* (Lindl.)

Kuntze, *Zosterophyllanthos  
semiscaber* (Lindl.) Szlach. &  
Kulak  
Dodson 1992; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, NO Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Pleurothallis sergioi* Luer &  
R.Escobar**

*Acronia sergioi* (Luer &  
R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 700 m.  
PUT. No evaluada.  
*Luer 2958* (HT: SEL).

***Pleurothallis serpens* Luer &  
R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
NSA, SAN. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 7625* (HT: SEL).

***Pleurothallis serricardia*  
Schltr.**

*Acronia serricardia* (Schltr.) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2900 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 172* (HT: destruido B).

***Pleurothallis sextonii* Luer**

*Acronia sextonii* (Luer) Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
VAL. No evaluada.

Colombia.  
*Luer 20050* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pleurothallis sigynnes* Luer**

*Acronia sigynnes* (Luer) Luer,  
*Zosterophyllanthos sigynnes* (Luer)  
Szlach. & Kulak  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100 m.  
CAU, NSA. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Escobar 8303* (MO).

***Pleurothallis silverstonei*  
Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-2500 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin 2667* (HT:  
CUVC).

***Pleurothallis siphoglossa*  
Luer & R.Escobar**

*Acronia siphoglossa* (Luer &  
R.Escobar) Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2500 m.  
ANT, NSA, SAN. No evaluada.  
*Luer 10104* (HT: MO).

***Pleurothallis sirene* Rchb.f.**

*Humboldtia sirene* (Rchb.f.)  
Kuntze, *Lindleyalis sirene*  
(Rchb.f.) Luer, *Pleurothallis  
scapha* Rchb.f.  
Luer 2000b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2130 m.  
CUN, NSA, VAL. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela.  
*Wagener 558* (HT: W).

***Pleurothallis somnolenta*****Luer**Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2400 m.

CHO. No evaluada.

*Silverstone-Sopkin 4334* (IT: MO).***Pleurothallis sotarae* Schltr.***Acronia sotarae* (Schltr.) Luer,  
*Zosterophyllanthos sotarae*  
(Schltr.) Szlach. & KulakGovaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2800-3000 m.

CAU. No evaluada.

Colombia, Macizo Colombiano.

*Lehmann 6219* (HT: AMES).NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.***Pleurothallis spathulipetala*****Luer***Ancipitia spathulipetala* (Luer)

Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

CUN. No evaluada.

*Lehmann s.n.* (HT: K).NOTA: sin datos de colección / no  
collection data.***Pleurothallis stricta* Luer**Luer 1998b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2500 m.

CUN, TOL. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer 2937* (SEL).***Pleurothallis strobilifera*****F.Lehm. & Kraenzl.**Luer 1999; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1840-2400 m.

ANT, QUI. No evaluada.

*Viveros 792* (HUQ).***Pleurothallis supervacanea*****Rchb.f.***Pleurothallis apoxys* Luer &  
R.EscobarLuer 1998b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000-3000 m.

ANT. No evaluada.

*Patin s.n.* (HT: W).***Pleurothallis talpinaria*****Rchb.f.***Pleurothallis trimeroglossa* Schltr.,*Talpinaria bivalvis* H.Karst.Luer 1998a; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2700 m.

CUN?, QUI. No evaluada.

Colombia a Perú; Venezuela y  
Brasil.*Arbeláez 2628* (HUQ).***Pleurothallis tanyrhina* Luer****& R.Escobar**Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-2800 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 2082* (HT: SEL).***Pleurothallis taurus* Luer**Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2700-3070 m.

CAU, PUT. No evaluada.

S Colombia a Ecuador.

*Luer 3077* (HT: SEL).***Pleurothallis tentaculata*****(Poepp. & Endl.) Lindl.***Humboltia tentaculata* (Poepp.  
& Endl.) Kuntze, *Lindleyalis*  
*tentaculata* (Poepp. & Endl.)Luer, *Restrepia tentaculata*

Poepp. &amp; Endl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 900-1400 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Perú.

NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron  
especímenes / recorded from  
Colombia but no specimens were  
seen for this work.***Pleurothallis tetragona* Luer****& R.Escobar***Ancipitia tetragona* (Luer &  
R.Escobar) LuerLuer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2500-2600 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 983* (HT: JAUM).***Pleurothallis tetroxys* Luer***Colombiana tetroxys* (Luer) LuerLuer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

NAR. No evaluada.

*Luer 12497* (HT: MO).***Pleurothallis titan* Luer***Acronia titan* (Luer) LuerLuer 2005; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 800-1200 m.

CHO. No evaluada.

Panamá a O Colombia.

*Paz 643* (COL, MO).

***Pleurothallis torrana* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1920-1950 m.  
CHO. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin 4334* (HT:  
CUVC).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Pleurothallis trachysepala*  
Kraenzl.**

*Acroniacordata* subsp.  
*trachysepala* (Kraenzl.) Luer,  
*Zosterophyllanthos trachysepalus*  
(Kraenzl.) Szlach. & Kulak  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
NOTA: señalada de Colombia,  
sin indicaciones de especímenes  
/ recorded from Colombia but  
no specimens were seen for this  
work.

***Pleurothallis tridentata*  
Klotzsch**

*Acronia tridentata* (Klotzsch)  
Luer  
Luer 2005; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 630-730 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Venezuela a E Ecuador.  
*Forero 6820* (COL, MO).

***Pleurothallis tryssa* Luer**

Luer 1998b; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia O Ecuador.  
*Luer 12500* (SEL).

***Pleurothallis tuzae* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-2800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Lehmann s.n.* (HT: K).

***Pleurothallis uvifera* Luer &  
R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
NSA, SAN. No evaluada.  
*Luer 6634* (HT: SEL).

***Pleurothallis variabilis* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron  
especímenes / recorded from  
Colombia but no specimens were  
seen for this work.

***Pleurothallis vieirae* Luer &  
R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 200-300 m.  
CHO. No evaluada.  
Bahía Solano.  
*Luer 2037* (HT: SEL).

***Pleurothallis vinealis* Luer &  
R.Escobar**

*Acronia vinealis* (Luer &  
R.Escobar) Luer  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700 m.  
CUN. No evaluada.

Colombia a Ecuador.  
*Luer 10364* (HT: MO).

***Pleurothallis xanthochlora*  
Rchb.f.**

*Humboldtia xanthochlora*  
(Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis*  
*dolichocaulon* Schltr.,  
*Pleurothallis huanucoensis* Schltr.  
Luer 1999; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO  
Venezuela.  
*Schneider 44* (AMES, S).

***Pleurothallis xenion* Luer &  
R.Escobar**

*Xenosia xenion* (Luer &  
R.Escobar) Luer  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3100-3200 m.  
BOY. No evaluada.  
*Luer 7981A* (HT: SEL).

***Pleurothallopsis* Porto &  
Brade**

12 especies, 5 especies endémicas

***Pleurothallopsis clausa* (Luer  
& R.Escobar) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Restrepiella clausa* (Luer &  
R.Escobar) Braas & H.Mohr,  
*Restrepiopsis clausa* Luer &  
R.Escobar  
Luer 1991; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2079 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a NO Ecuador.  
*Luer 2330* (HT: JAUM; IT: SEL).

***Pleurothallopsis inaequalis*  
(Luer & R.Escobar) Pridgeon  
& M.W.Chase**

*Restrepiopsis inaequalis* Luer & R.Escobar  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400 m.  
NSA, SAN. No evaluada.  
NO Venezuela a Ecuador.  
*Luer 14266* (MO).

***Pleurothallopsis insons* (Luer  
& R.Escobar) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Restrepiopsis insons* Luer & R.Escobar  
Luer 1991; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 7437* (HT: SEL).

***Pleurothallopsis lehmannii*  
(Luer) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Restrepiopsis lehmannii* Luer  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
VAL. No evaluada.  
*Lehmann s.n.* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo, sin  
datos de localidad o elevación  
/ known only from the type,  
without locality or elevation  
data.

***Pleurothallopsis microptera*  
(Schltr.) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Restrepiella grandiflora* Garay,  
*Restrepiella microptera* (Schltr.)  
Garay & Dunst., *Restrepiopsis*  
*grandiflora* (Garay) Luer,  
*Restrepiopsis microptera* (Schltr.)  
Luer

Luer 1991; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1930 m.  
QUI. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Viveros 801* (HUQ).

***Pleurothallopsis niesseniae*  
(Luer) Luer**

*Restrepiopsis niesseniae* Luer  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
CAU. No evaluada.  
*Niessen 114* (HT: MO).  
NOTA: espécimen sin datos de  
localidad o elevación / specimen  
without locality or elevation  
data.

***Pleurothallopsis norae*  
(Garay & Dunst.) Pridgeon  
& M.W.Chase**

*Restrepiella bicallosa* (Luer &  
R.Escobar) Braas & H.Mohr,  
*Restrepiopsis bicallosa* Luer &  
R.Escobar, *Restrepiopsis norae*  
(Garay & Dunst.) Luer  
Luer 1991; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1960 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
N Venezuela a Ecuador.  
*Luer 13047* (MO).

***Pleurothallopsis powersii*  
(Luer) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Restrepiella powersii* (Luer) Braas  
& H.Mohr, *Restrepiopsis powersii*  
Luer  
Luer 1991; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
ANT. No evaluada.  
*Powers s.n.* (SEL).

***Pleurothallopsis rinkei* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia, Cordillera  
Central-Occidental.  
*Rinke s.n.* (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
descrita de una planta en cultivo  
/ known only from the type;  
described from a cultivated  
plant.

***Pleurothallopsis striata* (Luer  
& R.Escobar) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Restrepiopsis striata* Luer &  
R.Escobar  
Luer 1991; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400 m.  
NSA. No evaluada.  
NE Colombia a NO Venezuela.  
*Luer 7734* (HT: SEL).

***Pleurothallopsis tubulosa*  
(Lindl.) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Humboldtia tubulosa* (Lindl.)  
Kuntze, *Humboldtia viridula*  
(Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis*  
*caliensis* Schltr., *Pleurothallis*  
*flavescens* Schltr., *Pleurothallis*  
*viridula* Lindl., *Restrepiella*  
*tubulosa* (Lindl.) Garay &  
Dunst., *Restrepiella viridula*  
(Lindl.) Garay & Dunst.,  
*Restrepiopsis tubulosa* (Lindl.)  
Luer, *Restrepiopsis viridula*  
(Lindl.) Luer  
Luer 1991; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2850 m.  
ANT, NSA, TOL. No evaluada.  
Centroamérica a Venezuela y  
Ecuador.  
*Killip 9558* (AMES).

***Pleurothallopsis ujarensis***  
**(Rchb.f.) Pridgeon &**  
**M.W.Chase**

*Pleurothallis ujarensis* (Rchb.f.)  
Lindl., *Restrepia ujarensis*  
Rchb.f., *Restrepiella ujarensis*  
(Rchb.f.) Garay & Dunst.,  
*Restrepiopsis ujarensis* (Rchb.f.)  
Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2040 m.  
ANT. No evaluada.  
Guatemala a Ecuador.  
*Escobar 2579* (COL).

***Polycycnis* Rchb.f.**

9 especies, 4 especies endémicas

***Polycycnis aurita* Dressler**

*Polycynopsis aurita* (Dressler)  
Szlach.  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 100-  
1060 m.  
ANT, CAU, CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Misas 199* (COL).

**[*Polycycnis barbata* (Lindl.)  
Rchb.f.]**

Idárraga *et al.* 2011.  
NOTA: registro prob. basado  
en un espécimen de *P. lepida*  
/ record prob. based on a  
specimen of *P. lepida*.

***Polycycnis escobariana***  
**G.Gerlach**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 900-1450 m.  
PUT, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Mora 6111* (COL).

***Polycycnis lehmannii* Rolfe**

Dressler 1977.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 900-2000 m.  
TOL, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Cuatrecasas 15024* (VALLE).

***Polycycnis lepida* Linden &  
Rchb.f.**

*Polycycnis gratiosa* Endres &  
Rchb.f.  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1100 m.  
CHO, RIS. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
*Sin colector O-20590* (M).

***Polycycnis muscifera* (Lindl.)  
& Paxton) Rchb.f.**

*Cynoches musciferum* Lindl.  
& Paxton, *Polycycnis acutiloba*  
Schltr.  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2000 m.  
ANT, BOY, CUN, HUI, MET,  
TOL. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Renz 3241* (RENZ).

***Polycycnis ornata* Garay**

Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Panamá, cerca a la frontera, y en  
O Ecuador / expected; collected  
in Panama, near the border, and  
in W Ecuador.

***Polycycnis pfisteri* Senghas  
et al.**

Senghas 2000.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 700 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia.  
*Taggesell s.n.* (HT: HEID).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Polycycnis surinamensis***  
**C.Schweinf.**

*Polycynopsis surinamensis*  
(C.Schweinf.) Szlach.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 900 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Panamá a Ecuador y Guayanas.  
NOTA: señalada de Colombia,  
sin indicaciones de especímenes  
/ recorded from Colombia but  
no specimens were seen for this  
work.

***Polycycnis villegasiana***

**G.Gerlach**  
Gerlach 2001b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200-1400 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Serna s.n.* (HT: JAUM; IT: M).

***Polyotidium* Garay**

1 especie

***Polyotidium huebneri***  
**(Mansf.) Garay**

*Hybochilus huebneri* Mansf.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 150-300 m.  
AMA, VAU. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil.  
*Cortés 770* (COL, AMES).

***Polystachya* Hook.**

6 especies

***Polystachya altilamellata***  
**Schltr.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 900-1800 m.  
ANT, CUN. No evaluada.

Colombia a Brasil.

*Pennell* 1851 (NY).

NOTA: solo conocida de unas pocas colecciones en toda su área de distribución / known only from a few collections throughout its range.

***Polystachya caracasana***

**Rchb.f.**

*Polystachya cingulata* Rchb.f.,  
*Polystachya costaricensis* Schltr.,  
*Polystachya cubensis* Schltr.,  
*Polystachya guatemalensis* Schltr.,  
*Polystachya panamensis* Schltr.,  
*Polystachya pinicola* Barb.Rodr.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena, Caribe, Pacífico, SN Santa Marta, V Cauca, V Magdalena. 0-2000 m.

ANT, BOL, CAQ, CAU, MAG, SAN. No evaluada.

México a Brasil.

*Betancur* 943 (F).

NOTA: poblaciones de esta especie fueron tratadas en el pasado como *P. foliosa* / populations of this species formerly referred to as *P. foliosa*.

***Polystachya cavanayensis***

**Garay & Dunst.**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes?, Orinoquia? 66-1400 m.

ARA? No evaluada.

Nicaragua a Panamá y Venezuela.

*Croat* 13993 (MO).

NOTA: esperada; conocida de Venezuela, en áreas vecinas a Arauca / expected; known from neighboring areas in Venezuela, near Arauca.

***Polystachya concreta* (Jacq.)**

**Garay & H.R.Sweet**

*Epidendrum concretum* Jacq.,  
*Epidendrum minutum* Aubl.,  
*Polystachya colombiana* Schltr.,

*Polystachya dagremondiana*

Kraenzl.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 0-1600 m.

CAU, CHO. No evaluada.

Antillas a Brasil y Colombia a Perú.

*Dodson* 74 (F).

NOTA: pos. se encuentre también en Amazonia y Orinoquia / poss. occurs also in Amazonia and the Orinoco.

**[*Polystachya foliosa* (Hook.)**

**Rchb.f.]**

Ortiz 1995.

NOTA: registro basado en identificación errónea. Se encuentra únicamente en las Antillas y las Guayanas / record based on a misidentification; found only in the West Indies and the Guianas.

***Polystachya masayensis***

**Rchb.f.**

*Polystachya masayensis* var. *elatior* Rchb.f.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 0-1200 m.

CHO. No evaluada.

México a Colombia.

*Ignacio* 4683 (K).

NOTA: conocida en Colombia de una sola colección / known in Colombia from a single collection.

**[*Polystachya nana* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.]**

Ortiz 1995.

NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *Polystachya peruviana*, de Ecuador, Perú y Bolivia / record based on a misidentification; corresponds

to *Polystachya peruviana*, from Ecuador, Peru and Bolivia.

***Polystachya stenophylla***

**Schltr.**

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 0-450 m.

VAU. No evaluada.

Colombia a Brasil.

*Schultes* 13243 (NY).

NOTA: ampliamente distribuida en la cuenca amazónica, aunque conocida de pocas localidades en Colombia / widespread in Amazonia but known from a few localities in Colombia.

***Ponthieva* R.Br.**

15 especies, 2 especies endémicas

***Ponthieva andicola* Rchb.f.**

*Ponthieva grandiflora* Ridl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia? y Ecuador.

NOTA: registro dudoso; citada para Colombia por Dodson (1992), pero no se examinaron especímenes / dubious record; recorded from Colombia by Dodson (1992) but no specimens were found.

***Ponthieva appendiculata***

**Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 1884-2551 m.

CES. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Rivera* 2849 (COL).

***Ponthieva diptera* Linden & Rchb.f.**

*Ponthieva dicliptera* Rchb.f.,  
*Ponthieva elata* Schltr., *Ponthieva harrisii* Cogn.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1500-3050 m.  
ANT, BOY, CAU, CUN, MAG,  
NAR, RIS, SAN, VAL. No  
evaluada.  
Costa Rica a Guyana y Perú;  
Caribe.  
Dueñas 3082 (COL).

***Ponthieva fertilis* (F.Lehm. & Kraenzl.) Salazar**

*Cranichis fertilis* (F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr., *Cranichis koehleri* Schltr., *Cranichis pycnantha* Schltr., *Goodyera fertilis* F.Lehm. & Kraenzl., *Ophrys parviflora* C.Presl  
Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009; Salazar *et al.* 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes, V Magdalena.  
762-3048 m.  
ANT, CAL, CAU, CHO, CUN,  
HUI, NAR, NSA, PUT, QUI,  
SAN, TOL, VAL. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
Lozano 4296 (COL).

***Ponthieva gracilis* Renz**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 600 m.  
MET. No evaluada.  
Colombia.  
Renz 4097 (ST: RENZ).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Ponthieva inaudita* Rchb.f.**

Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2300-2500 m.  
CAU, TOL. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
Lehmann 2150 (G).

***Ponthieva maculata* Lindl.**

*Ponthieva wallisii* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2700 m.  
ANT, CAU, CUN. No evaluada.  
Centroamérica a Venezuela y  
Bolivia.  
González 3136 (COL).

***Ponthieva microglossa* Schltr.**

Hierba.  
Endémica. Andes. 2300-2700 m.  
CAU, TOL. No evaluada.  
*Madero s.n.* (T: ?).  
NOTA: no se ha vuelto a  
recolectar desde 1920 / not  
collected since 1920.

***Ponthieva parvilabris* (Lindl.) Rchb.f.**

*Cranichis parvilabris* Lindl.,  
*Ponthieva disema* Schltr.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1800-2650 m.  
BOY, CAU, CES, TOL. No  
evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
Linden 1470 (T: G).

***Ponthieva pulchella* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Guatemala, México.  
NOTA: registro dudoso; especie  
de Guatemala, citada por  
Dodson para Colombia; no  
se examinaron especímenes /  
dubious record; a species from  
Guatemala, cited by Dodson for  
Colombia; no specimens were  
examined.

***Ponthieva racemosa* (Walter)**

**C.Mohr**

*Arethusa racemosa* Walter,  
*Neottia glandulosa* Sims,  
*Ponthieva glandulosa* (Sims)  
*R.Br.*, *Ponthieva glandulosa*  
var. *rostrata* (Lindl.) Rchb.f.,  
*Ponthieva orchroides* Schltr.,  
*Ponthieva rostrata* Lindl.,  
*Ponthieva rostrata* var. *spicata*  
Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1250-3200 m.  
ANT, CAU, CES, CUN, NAR,  
NSA, SAN, VAL. No evaluada.  
S Estados Unidos a Venezuela y  
Bolivia; Caribe.  
Fernández-Pérez 40000 (AFP).

***Ponthieva similis***

**C.Schweinf.**

*Ponthieva ochreatea* Renz  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2650-3000 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
Fernández-Alonso 18916 (COL).

***Ponthieva sylvicola* Rchb.f.**

*Pleurothallis chuquiribambae*  
Kraenzl., *Ponthieva*  
*chuquiribambae* (Kraenzl.) Ames  
& C.Schweinf.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
NOTA: registro dudoso;  
especie de Ecuador, citada por  
Dodson para Colombia; no  
se examinaron especímenes /  
dubious record; a species from  
Ecuador cited by Dodson for

Colombia; no specimens were examined.

***Ponthieva venusta* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1200-2500 m.  
CES, HUI, NAR. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
Ramírez 1294 (?).

***Ponthieva villosa* Lindl.**

*Ponthieva crinita* Garay  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2070-2200 m.  
BOY, CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
Silverstone-Sopkin 3830 (CUVC).

***Porroglossum* Schltr.**

11 especies, 7 especies endémicas

***Porroglossum actrix* Luer & R.Escobar**

Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
PUT. No evaluada.  
Escobar 4050 (HT: MO; IT: JAUM).

***Porroglossum agile* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
S Colombia a Perú.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Porroglossum echidna***

**(Rchb.f.) Garay**

*Masdevallia echidna* Rchb.f.,  
*Scaphosepalum echidna* (Rchb.f.) Schltr.  
Luer 1987; Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600-3200 m.  
ANT, NSA, SAN. No evaluada.  
Wagner *s.n.* (HT: W).  
NOTA: a menudo erróneamente escrita *echidnum*; no obstante, el epíteto es un sustantivo usado en aposición y, por tanto, es invariable / often misspelled *echidnum* but the epithet is a noun used in apposition and is therefore invariable.

***Porroglossum eduardi***

**(Rchb.f.) H.R.Sweet**

*Masdevallia eduardi* Rchb.f.  
Luer 1987; Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900-2800 m.  
CHO, NAR, VAL. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
Klaboch *s.n.* (W).

***Porroglossum mordax***

**(Rchb.f.) H.R.Sweet**

*Lothiania mordax* (Rchb.f.) Kraenzl., *Masdevallia colombiana* (Schltr.) P.H.Allen, *Masdevallia mordax* Rchb.f., *Porroglossum colombianum* Schltr., *Scaphosepalum antioquiense* Kraenzl.  
Luer 1987; Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700-2400 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Lehmann 3620 (HT: G).

***Porroglossum mucosum***

**(Rchb.f.) Schltr.**

*Masdevallia mucosum* Rchb.f.,  
*Masdevallia xiphères* Rchb.f.,  
*Porroglossum xiphères* (Rchb.f.) Garay, *Scaphosepalum xiphères* (Rchb.f.) Schltr.  
Luer 1987; Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2700 m.  
ANT, CAU, NSA, PUT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador; NO Venezuela.  
Shuttleworth *s.n.* (HT: W; IT: K).

***Porroglossum nutibara* Luer**

**& R.Escobar**

Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
Escobar *s.n.* (HT: JAUM; IT: MO).

***Porroglossum olivaceum***

**H.R.Sweet**

Luer 1987; Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a NO Ecuador.  
Luer 4616 (SEL).

***Porroglossum parsonsii* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Luer 20985 (HT: MO).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Porroglossum rodrigo***

**H.R.Sweet**

Luer 1987; Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700 m.

ANT. No evaluada.

*Escobar 1055* (HT: AMES; IT: JAUM).

***Porroglossum sergii* P.Ortiz**

Luer 1987; Luer 1991; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2050-2500 m.

ANT. No evaluada.

*Ortiz 689* (HT: COL).

NOTA: citada como *sergioi*; no obstante, el epíteto está basado en la forma latina del nombre, *Sergius* / sometimes cited as *sergioi*, but epithet based on the Latin form of the name, *Sergius*.

***Prescottia* Lindl.**

4 especies, 1 especie endémica

[***Prescottia carnosa***

**C.Schweinf.]**

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Steyermark *et al.* 2003; Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: señalada de Colombia por Dodson (1992), sin indicación de especímenes / recorded from Colombia by Dodson (1992) but no specimens were found.

***Prescottia cordifolia* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2007; de Azevedo *et al.* 2014.

Hierba.

Endémica. Andes.

NSA. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Wagner s.n.* (T: ?).

NOTA: conocida solo del tipo; pobremente conocida; prob.

sinónimo de *P. stachyodes* / known only from the type; poorly known, prob. a synonym of *P. stachyodes*.

***Prescottia oligantha* (Sw.)**

**Lindl.**

*Cranichis micrantha* Spreng.,  
*Cranichis oligantha* Sw.,  
*Prescottia densiflora* Lindl.,  
*Prescottia filiformis* Schltr.,  
*Prescottia gracilis* Schltr.,  
*Prescottia micrantha* Lindl.,  
*Prescottia tenuis* Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.

Nativa. Andes. 1700-2000 m.

ANT, BOY, CAU, MET. No evaluada.

S Estados Unidos a Suramérica y Caribe.

*Lehmann 1856* (G).

***Prescottia stachyodes* (Sw.)**

**Lindl.**

*Cranichis stachyodes* Sw.,  
*Prescottia colorans* Lindl.,  
*Prescottia longipetiolata* Schltr.,  
*Prescottia petiolaris* Lindl.,  
*Prescottia schlechteri* Hoehne,  
*Prescottia smithii* Schltr.,  
*Prescottia tepuyensis* Carnevali & C.Vargas

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2007; de Azevedo *et al.* 2014.

Hierba.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena, SN Santa Marta, V Cauca. 120-2900 m.

ANT, CAQ, CAU, CUN, GUI?, HUI, MAG, MET, NAR, NSA, SAN, VAL. Preocupación Menor (de Azevedo *et al.* 2014).

Neotrópico.

*Idrobo 1047* (COL).

NOTA: recolectada en Amazonas (Venezuela), justo en la frontera con Guainía / collected in Amazonas (Venezuela), right on the border with Guainía.

***Prescottia tepuyensis***

**Carnevali & C.A.Vargas**

Hierba.

Nativa. Guayana y Macarena? 120 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

E Colombia?, O Venezuela.

NOTA: esperada; el tipo es de Amazonas (Venezuela), justo en la frontera con Guainía / expected; is the type of Amazonas (Venezuela), right on the border with Guainía.

***Prosthechea* Knowles & Westc.**

28 especies, 5 especies endémicas

***Prosthechea abbreviata* (Schltr.) W.E.Higgins**

*Anacheilium abbreviatum* (Schltr.) Withner & P.A.Harding,  
*Encyclia abbreviata* (Schltr.) Dressler, *Epidendrum abbreviatum* Schltr.

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 0 m.

CHO. Preocupación Menor (propuesta aquí).

México a Ecuador.

*Misas 26* (COL).

***Prosthechea aemula* (Lindl.) W.E.Higgins**

*Anacheilium aemulum* (Lindl.) Withner & P.A.Harding, *Encyclia aemula* (Lindl.) Carnevali & I.Ramírez, *Epidendrum aemulum* Lindl., *Epidendrum lineatum* Salisb.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 150-1080 m.

AMA, CAQ, GUV, MET, VAU.

Preocupación Menor (propuesta aquí).

N y C Suramérica; Trinidad.

*Cárdenas 5764* (COAH).

***Prosthechea arminii*  
(Rchb.f.) Withner &****P.A.Harding***Encyclia arminii* (Rchb.f.)

Carnevali &amp; I.Ramírez

Withner &amp; Harding 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 800-1250 m.

NSA? No evaluada.

Colombia?, Venezuela.

NOTA: esperada; citada en la literatura, sin datos de localidad / expected; cited in the literature without locality data.

***Prosthechea baculus*  
(Rchb.f.) W.E.Higgins***Encyclia baculus* (Rchb.f.)

Dressler &amp; G.E.Pollard,

*Epidendrum baculus* Rchb.f.

Withner &amp; Harding 2004;

Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 400-2500 m.

ANT. Preocupación Menor (propuesta aquí).

Colombia a México.

Ospina 582 (JAUM).

***Prosthechea brachychila*  
(Lindl.) W.E.Higgins***Encyclia brachychila* (Lindl.)

Carnevali &amp; I.Ramírez,

*Epidendrum brachychilum* Lindl.

Withner &amp; Harding 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. SN Santa Marta. 2000 m.

MAG. No evaluada.

Colombia y Venezuela.

Jaramillo 5350A (COL).

***Prosthechea chacaoensis*  
(Rchb.f.) W.E.Higgins***Anacheilium chacaoense* (Rchb.f.)Withner & P.A.Harding, *Encyclia**chacaoensis* (Rchb.f.) Dressler& G.E.Pollard, *Epidendrum**chacaoense* Rchb.f.

Withner &amp; Harding 2004; Misas-

Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico? 50 m.

CHO? Preocupación Menor (propuesta aquí).

México a Venezuela.

NOTA: esperada; citada por Withner & Harding, pero no se examinaron especímenes; ilustrada por Misas Urreta (2005: 597) como *P. cochleata* / expected; cited by Withner & Harding but no specimens were examined; illustrated by Misas Urreta (2005: 597) as *P. cochleata*.***Prosthechea chimborazoensis*  
(Schltr.) W.E.Higgins***Encyclia chimborazoensis*(Schltr.) Dressler, *Epidendrum chimborazoense* Schltr.

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena, Pacífico. 0-1780 m.

CAQ, CHO, MET, SAN. No evaluada.

Panamá a Ecuador.

Misas 27 (COL).

***Prosthechea christyana*****(Rchb.f.) Garay & Withner***Epidendrum megahybos* Schltr.,*Prosthechea megahybos* (Schltr.)Dodson & Hágsater, *Prosthechea squamata* (Porto & Brade)

W.E.Higgins

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia?, Andes?

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Brasil, Perú, Ecuador.

NOTA: esperada; registrada en la Amazonia de países limítrofes / expected; recorded from the Amazon in bordering countries.

***Prosthechea cochleata* (L.)  
W.E.Higgins***Encyclia cochleata* (L.) Dressler,*Epidendrum cochleatum* L.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Guayana y Macarena, V Magdalena. 350-1200 m.

CUN, MET. Preocupación Menor (propuesta aquí).

México a N Suramérica; Caribe. *Stevenson 2085* (COL).***Prosthechea crassilabia*  
(Poepp. & Endl.) Carnevali  
& I.Ramírez***Encyclia crassilabia* (Poepp. &Endl.) Dressler, *Epidendrum**crassilabium* Poepp. & Endl.

Hierba.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena. 350-600 m.

CAQ, GUV, MET. Preocupación Menor (propuesta aquí).

Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Brasil, Antillas.

*Stevenson 961* (COAH).***Prosthechea fragrans* (Sw.)  
W.E.Higgins***Encyclia fragrans* (Sw.) Dressler,*Epidendrum fragrans* Sw.

Hierba, epífita.

Nativa. 0 m.

CHO. No evaluada.

Centroamérica a Ecuador y Guyana.

*Fernández 203* (COL).***Prosthechea gilbertoi* (Garay)  
W.E.Higgins***Encyclia gilbertoi* (Garay) P.Ortiz,*Epidendrum gilbertoi* Garay

Withner &amp; Harding 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1940-2000 m.

CAL. No evaluada.

*Escobar 586* (T: AMES, JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Prosthechea grammatoglossa*  
(Rchb.f.) W.E.Higgins**

*Encyclia grammatoglossa*  
(Rchb.f.) Dressler, *Epidendrum  
grammatoglossum* Rchb.f.,  
*Epidendrum quadridentatum*  
F.Lehm. & Kraenzl.  
Withner & Harding 2004;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
750-2130 m.  
CUN, GUJ, HUI, MAG, SAN,  
VAL. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Uribe 1253* (COL).

***Prosthechea hartwegii*  
(Lindl.) W.E.Higgins**

*Encyclia hartwegii* (Lindl.)  
R. Vásquez & Dodson,  
*Epidendrum fuscum* Schltr.,  
*Epidendrum hartwegii* Lindl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1970-2740 m.  
BOY, CUN, MAG, NSA, PUT,  
SAN. Preocupación Menor  
(propuesta aquí).  
Colombia y Ecuador.  
*Haught 6547* (COL).

***Prosthechea lambda* (Linden  
& Rchb.f.) W.E.Higgins**

*Encyclia lambda* (Linden &  
Rchb.f.) Dressler, *Epidendrum  
lambda* Rchb.f.  
Withner & Harding 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2100 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Schlim 744* (HT: G?).  
NOTA: Dressler (1971) sugiere  
que esta especie podría ser un  
híbrido natural entre *P. baculus*  
y *P. chacaoense*, pero *P. baculus*  
no crece en esta región / Dressler  
(1971) suggests that this species  
may be a natural hybrid between

*P. baculus* and *P. chacaoense*  
but *P. baculus* not occur in this  
region.

***Prosthechea leopardina*  
(Rchb.f.) Dodson & Hágsater**

Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Wallis 60* (HT: W).  
NOTA: conocida en Colombia  
solo del tipo / known in  
Colombia only from the type.

***Prosthechea lindenii* (Lindl.)  
W.E.Higgins**

*Encyclia lindenii* (Lindl.)  
Carnevali & I.Ramírez,  
*Epidendrum lindenii* Lindl.  
Withner & Harding 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2400 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Fernández-Alonso 11786* (COL).

***Prosthechea livida* (Lindl.)  
W.E.Higgins**

*Encyclia livida* (Lindl.) Dressler,  
*Epidendrum lividum* Lindl.  
Withner & Harding 2004.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1280-1600 m.  
CUN. Preocupación Menor  
(propuesta aquí).  
México a Perú.  
*García-Barriga 20153* (COL).

***Prosthechea macrothyrsodes*  
(Rchb.f.) Christenson**

*Anacheilium santanderense*  
D.G.Hunt *et al.*, *Epidendrum  
macrothyrsoides* Rchb.f.  
Withner & Harding 2004.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200-1600 m.  
SAN. No evaluada.

Cordillera Oriental.  
*Hunt s.n.* (US).

***Prosthechea mejia* (Withner  
& P.A.Harding) W.E.Higgins**

*Anacheilium mejia* Withner &  
P.A.Harding  
Withner & Harding 2004.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Hort. Mejia de Moreno s.n.* (US).  
NOTA: conocida solo del tipo,  
tomado de una planta exhibida  
en una exposición; el dibujo  
sugiere que se trata de un híbrido  
mal esclarecido / known only  
from the type, taken from a plant  
at an exhibition; the drawing  
suggests that it is a poorly  
elucidate hybrid.

***Prosthechea pamplonensis*  
(Rchb.f.) W.E.Higgins**

*Encyclia pamplonense* (Rchb.f.)  
Carnevali, *Epidendrum  
pamplonense* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
NSA. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Schlim 1435* (G?).  
NOTA: los especímenes  
identificados en herbarios  
colombianos como *P.  
pamplonensis* a menudo son *P.  
tigrina* / specimens identified as  
*P. pamplonensis* in Colombian  
herbaria often correspond to *P.  
tigrina*.

***Prosthechea pygmaea*  
(Hook.) W.E.Higgins**

*Coelogyne triptera* Brongn.,  
*Encyclia pygmaea* (Hook.)  
Dressler, *Epidendrum pygmaeum*  
Hook., *Epidendrum uniflorum*  
Lindl., *Hormidium pygmaeum*

(Hook.) Hemsl., *Hormidium tripterum* (Brongn.) Cogn., *Microstylis humilis* Cogn.

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 600-770 m.

ANT, CUN. Preocupación Menor (propuesta aquí).

SE Estados Unidos a Brasil y Bolivia.

Ramírez 1238 (COL, HUA, JAUM).

***Prosthechea sceptrata* (Lindl.)**

**W.E.Higgins**

*Encyclia sceptrata* (Lindl.)

Carnevali & I.Ramírez,

*Epidendrum sceptrum* Lindl.,

*Epidendrum sphenoglossum*

F.Lehm. & Kraenzl., *Hormidium uniflorum* (Lindl.) Heynh.

Withner & Harding 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-2300 m.

BOY, CUN. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

Fernández-Pérez 5919 (COL).

***Prosthechea sima* (Dressler)**

**W.E.Higgins**

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico? 1380 m.

CHO? No evaluada.

NO Colombia?, Panamá.

NOTA: esperada; recolectada en la serranía del Darién (Panamá), a 1 km de la frontera / expected; collected in Serranía del Darién (Panama), 1 km from the border.

***Prosthechea tigrina* (Lindl.)**

**W.E.Higgins**

*Encyclia tigrina* (Lindl.)

Carnevali & I.Ramírez,

*Epidendrum tigrinum* Lindl.

Withner & Harding 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

ANT, BOY, CHO, PUT, TOL, VAL. Preocupación Menor (propuesta aquí).

Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Perú, Ecuador.

Arévalo 803 (COL).

***Prosthechea venezuelana***

**(Schltr.) W.E.Higgins**

*Encyclia venezuelana* (Schltr.)

Dressler, *Epidendrum*

*venezuelanum* Schltr.

Withner & Harding 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1250-1600 m.

CUN, RIS, VAL. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

Uribe 7015 (COL).

**[*Prosthechea vespa* (Vell.)**

**W.E.Higgins]**

Idárraga *et al.* 2011.

NOTA: endémica de Brasil; especímenes bajo este nombre, en herbarios colombianos, son *P. tigrina* o *P. crassilabia* / endemic to Brazil; specimens under this name in Colombian herbaria are *P. tigrina* or *P. crassilabia*.

***Prosthechea villae-rosae***

**P.Ortiz**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2800 m.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

Ortiz 1292 (HT: HPUJ).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Prosthechea* sp.**

*Epidendrum trachypus* F.Lehm. & Kraenzl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500 m.

CAU. No evaluada.

Cordillera Central.

Lehmann 6849 (T: K?).

NOTA: pertenece a *Prosthechea*, pero todavía no hay combinación bajo ese género / belongs to *Prosthechea* but still no combination under that genus.

***Pseudocentrum Lindl.***

6 especies, 1 especie endémica

***Pseudocentrum bursarium***

**Rchb.f.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 1750-3050 m.

MET, NAR, NSA. No evaluada.

Colombia a Perú.

Díaz 2843 (COL).

***Pseudocentrum***

***macrostachyum Lindl.***

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2070-2800 m.

QUI, VAL. No evaluada.

Colombia a Perú.

Silverstone-Sopkin 3894 (CUVC, MO).

***Pseudocentrum purdii* Garay**

Dodson 1992; Govaerts *et al.*

2014a.

Hierba.

Endémica.

GUJ. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

***Pseudocentrum sylvicola***

**Rchb.f.**

*Pseudocentrum sphaerocorys* Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2050-3050 m.

CAU, NAR, PUT, SAN. No

evaluada.

Colombia, Ecuador, Bolivia.  
*Lozano 3464* (COL).

***Pseudocentrum* sp. 1**

Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 3050-3100 m.

ARA, CUN, QUI. No evaluada.

*Cleef 10150* (COL).

***Pseudocentrum* sp. 2**

Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes.

ANT. No evaluada.

*Sánchez 5698* (HUA).

***Psilochilus* Barb.Rodr.**

5 especies, 3 especies endémicas

***Psilochilus antioquiensis***

**Kolan.**

Kolanowska *et al.* 2014.

Hierba.

Endémica. Andes. 2000-2400 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Pérez-Zabala 2619* (HT: MEDEL).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Psilochilus carinatus* Garay**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a; Kolanowska *et al.* 2014.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 850-1400 m.

CUN, MAG. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

*Purdie s.n.* (HT: K).

***Psilochilus macrophyllus* (Lindl.) Ames**

Ortiz 1995; Kolanowska *et al.* 2014.

Hierba.

Nativa. Andes, Guayana y Macarena. 600-2200 m.

CUN, MET, PUT. No evaluada.

Centroamérica y N Suramérica.

*Schneider 485* (COL).

***Psilochilus madero* (Schltr.)**

**Schltr.**

*Pogonia madero* Schltr.

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011;

Kolanowska *et al.* 2014.

Hierba.

Endémica. Andes. 1500-2000 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia.

*Escobar 1059* (AMES).

NOTA: un registro de Nicaragua (Dodson ined.) requiere verificación / a record from Nicaragua (Dodson ined.) needs verification.

***Psilochilus vallecaucanus***

**Kolan. & Szlach.**

Kolanowska *et al.* 2014.

Hierba.

Endémica. Andes. 1875-2000 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Kolanowska 201* (HT: COL; IT: COL).

***Psychopsis* Raf.**

4 especies

***Psychopsis krameriana***

**(Rchb.f.) H.G.Jones**

*Oncidium kramerianum* Rchb.f.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 200-1000 m.

CHO, CUN, VAL. Casi

Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Nicaragua a Ecuador.

*Ortiz 287* (?).

***Psychopsis papilio* (Lindl.)**

**H.G.Jones**

*Oncidium papilio* Lindl.

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 800-1200 m.

DESCONOCIDO. Datos

Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

Panamá a Brasil y Perú.

***Psychopsis sanderae* (Rolfe)**

**Lückel & Braem**

*Oncidium sanderae* Rolfe

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 300-800 m.

CAQ, PUT. No evaluada.

Colombia y Perú.

***Psychopsis versteegiana***

**(Pulle) Lückel & Braem**

*Oncidium versteegianum* Pulle

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 600-1200 m.

DESCONOCIDO. Datos

Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Bolivia.

***Pterichis* Lindl.**

9 especies, 3 especies endémicas

***Pterichis colombiana***

**G.Morales**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 3300-3820 m.

BOY. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Cleef 7469* (HT: COL).

***Pterichis fernandezii*****G.Morales**Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Endémica. Andes. 2750-4120 m.

CUN, HUI. No evaluada.

*Morales 194* (HT: COL).***Pterichis galeata* Lindl.***Prescottia barbifrons* Kraenzl.,*Pterichis acuminata* Schltr.,*Pterichis barbifrons* (Kraenzl.)

Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2600-3625 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, HUI,

NAR, PUT, VAL. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia y Venezuela.

*Fernández-Alonso 14867* (COL).*Pterichis galeata* var.*quilinsayacoana* G.Morales***Pterichis habenarioides*****(F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr.***Goodyera habenarioides* F.Lehm.& Kraenzl., *Pterichis costaricensis*

Ames &amp; C.Schweinf.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2970-3600 m.

BOY, CAU, CUN, HUI, MET,

NAR, PUT, QUI. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador y

Venezuela.

*Dueñas 3107* (COL).***Pterichis multiflora* (Lindl.)****Schltr.***Acraea multiflora* Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 3100-3600 m.

BOY, CAU, HUI, NSA. No

evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Cuatrecasas 12632* (COL).***Pterichis parvifolia* (Lindl.)****Schltr.***Acraea parvifolia* Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 3000-3700 m.

CAU, CUN, NAR. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Stančík 2687* (COL, PSO, PRC).***Pterichis pauciflora* Schltr.**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 2970-3700 m.

ANT, BOY, CAU, CUN, HUI,

MET. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Díaz 2472* (COL).***Pterichis tomentosula* Schltr.**

Dueñas &amp; Fernández 2009.

Hierba.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: citada por Dueñas & Fernández como *tomentulosa* / cited by Dueñas & Fernández as *tomentulosa*.***Pterichis triloba* (Lindl.)****Schltr.***Acraea triloba* Lindl., *Pterichis**seleniglossa* Schltr.

Ortiz 1995; Dueñas 2002;

Dueñas &amp; Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Andes. 3180 m.

CUN. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Fernández-Alonso 11850* (COL).***Pteroglossa* Schltr.**

1 especie

***Pteroglossa roseoalba*****(Rchb.f.) Salazar &****M.W.Chase***Eltroplectris roseoalba* (Rchb.f.)Hamer & Garay, *Pelexia**roseoalba* Rchb.f.Salazar *et al.* 2009; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Andes. 800-1400 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Brasil y N Argentina.

NOTA: señalada de Colombia,

pero no se examinaron

especímenes / recorded from

Colombia but no specimens were

seen for this work.

***Pterostemma* Kraenzl.**

3 especies, 2 especies endémicas

***Pterostemma antioquiense*****F.Lehm. & Kraenzl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2400 m.

ANT, BOY. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz 270* (HPUJ).***Pterostemma benzingii*****(Dodson) M.W.Chase &****N.H.Williams***Hirtzia benzingii* Dodson

Dodson 1991.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

PUT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Medina 469* (HPUJ).***Pterostemma escobarii*****(Dodson) M.W.Chase &****N.H.Williams***Hirtzia escobarii* Dodson

Dodson 1991.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500-2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Dodson 15258a* (RPSC).

### ***Restrepia* Kunth**

30 especies, 18 especies  
endémicas

#### ***Restrepia antennifera* Kunth**

*Pleurothallis ospinae* R.E.Schult.,  
*Restrepia antennifera* subsp.  
*hemsleyana* (Schltr.) H.Mohr,  
*Restrepia antennifera* subsp.  
*klabochorum* H.Mohr, *Restrepia*  
*hemsleyana* Schltr.

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700-3500 m.

ANT, CAU, NAR, NSA.

Preocupación Menor (Calderón-  
Sáenz 2007).

Colombia a Bolivia; NO y N  
Venezuela.

*Humboldt s.n.* (HT: P).

#### ***Restrepia aristulifera* Garay & Dunst.**

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300-2500 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

NE Colombia a NO Venezuela.

*Luer 7796* (SEL).

#### ***Restrepia aspasicensis* Rchb.f.**

*Restrepia dentata* Rolfe

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

NSA. En Peligro Crítico  
(Calderón-Sáenz 2007).

NE Colombia a NO y N  
Venezuela.

*Wagner s.n.* (HT: W; IT: K).

NOTA: sin localidad específica /  
no specific locality.

#### ***Restrepia brachypus* Rchb.f.**

*Pleurothallis hawkesii* Flickinger,  
*Restrepia antennifera* subsp.  
*striata* (Rolfe) H.Mohr, *Restrepia*  
*striata* Rolfe

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2600 m.

ANT, CAU, CHO, CUN, RIS,  
VAL. Preocupación Menor  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Bolivia; NO  
Venezuela.

*Lehmann 3215* (HT: W).

#### ***Restrepia chameleon* Luer & R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

NSA. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 13130* (HT: JAUM).

#### ***Restrepia chocoensis* Garay**

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2000 m.

ANT, CHO. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1054* (HT: AMES).

#### ***Restrepia chrysoglossa* Luer & R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2100 m.

VAL. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 17874* (HT: JAUM; IT: MO).

#### ***Restrepia citrina* Luer & R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600 m.

NSA. No evaluada.

*Luer 6624* (HT: SEL; IT: JAUM).

#### ***Restrepia contorta* (Ruiz & Pav.) Luer**

*Humboldtia contorta* Ruiz &  
Pav., *Pleurothallis fimbrilabia*  
C.Schweinf., *Restrepia apiculata*  
Luer, *Restrepia caucana* Schltr.,  
*Restrepia ecuadorensis* Rolfe,  
*Restrepia maculata* Lindl.,  
*Restrepia maculata* subsp.  
*ecuadoriensis* (Rolfe) H.Mohr,  
*Restrepia pardina* Lem., *Restrepia*  
*punctulata* Lindl., *Stelis contorta*  
(Ruiz & Pav.) Pers.

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1400-2000 m.

ANT, CAU, CHO, CUN, NAR,  
NSA, SAN, VAL. Preocupación  
Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Perú; NO Venezuela.  
*Luer 3169* (SEL).

#### ***Restrepia cuprea* Luer & R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-1700 m.

ANT. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 16677* (HT: MO).

#### ***Restrepia echinata* Luer & R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros &  
Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1730 m.

NSA, SAN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

E Colombia a Perú.  
Luer 16660 (HT: MO).

***Restrepia echo* Luer &  
R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2000 m.  
ANT. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
Luer 16702 (HT: JAUM; IT: MO).

***Restrepia elegans* H.Karst.**

*Restrepia antennifera* subsp. *erythroxantha* (Rchb.f.) H.Mohr, *Restrepia erythroxantha* Rchb.f., *Restrepia leopardina* Rolfe Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
SAN. No evaluada.  
Colombia, N Venezuela.  
Luer 14445 (MO).

***Restrepia escobariana* Luer**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
RIS. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
Luer 16656 (HT: JAUM, IT: MO).

***Restrepia falkenbergii*  
Rchb.f.**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1066-2000 m.  
ANT. En Peligro (Calderón-Sáenz 2007).  
*Falkenberg s.n.* (LT: W).

***Restrepia flosculata* Luer**

*Restrepia flosculata* subsp. *picta* (H.Mohr & Herzum) H.Mohr,

*Restrepia flosculata* var. *pallens* H.Mohr & Herzum, *Restrepia flosculata* var. *picta* H.Mohr & Herzum

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
VAL. Casi Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).  
O Colombia a NO Ecuador.  
*Escobar s.n.* (JAUM).

***Restrepia fritillina* Luer &  
V.N.M.Rao**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia, Cordillera Central-Occidental.  
Rao 299 (MO).  
NOTA: recolectada de un cultivo en Estados Unidos / collected from cultivation in the United States.

***Restrepia guttulata* Lindl.**

*Restrepia maculata* subsp. *robledorum* (Braas & Braem) H.Mohr, *Restrepia robledorum* Braas & Braem  
Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta. 1700-2800 m.  
ANT, CAL, CAU, CHO, CUN, MAG, SAN, TOL. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
NO Venezuela a Ecuador.  
Luer 1883 (SEL).

***Restrepia limbata* Luer &  
R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2200 m.

RIS. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).

*Escobar 1187* (HT: SEL; IT: JAUM).

***Restrepia metae* Luer**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Guayana y Macarena. 550 m.  
MET. Vulnerable (Calderón-Sáenz 2007).  
*Renz 3610* (HT: Herb Renz).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Restrepia muscifera* (Lindl.)  
Lindl.**

*Pleurothallis dayana* (Rchb.f.) L.O.Williams, *Pleurothallis muscifera* Lindl., *Pleurothallis xanthophthalma* (Rchb.f.) L.O.Williams, *Restrepia dayana* Rchb.f., *Restrepia lansbergii* Hook., *Restrepia muscifera* subsp. *shuttleworthii* (Rolfe) H.Mohr, *Restrepia powellii* Schltr., *Restrepia shuttleworthii* Rolfe, *Restrepia tonduzii* Schltr., *Restrepia xanthophthalma* Rchb.f. Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 300-2400 m.  
ANT, CHO. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
S México a Ecuador.  
*Escobar 2593* (SEL).

***Restrepia nittiorhyncha*  
(Lindl.) Garay**

*Humboldtia nittiorhyncha* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis nittiorhyncha* Lindl., *Restrepia schlimii* Rchb.f. Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200-3050 m.  
NSA, SAN. En Peligro  
(Calderón-Sáenz 2007).  
*Schlim s.n.* (HT: K).

***Restrepia pandurata* Rchb.f.**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica.

CUN. En Peligro Crítico  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Sander s.n.* (HT: W).

NOTA: conocida solo del tipo, sin  
datos de localidad o elevación  
/ known only from the type,  
without locality or elevation  
data.

***Restrepia pelyx* Luer &  
R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

ANT, SAN. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Venezuela.

*Escobar 241* (HT: SEL; IS;  
JAUM).

***Restrepia purpurea* Luer &  
R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1650 m.

NAR. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 17545* (HT: MO).

**[*Restrepia roseola* Luer &  
R.Escobar]**

Calderón-Sáenz 2007.

NOTA: registro basado en  
identificación errónea / record  
based on a misidentification.

***Restrepia sanguinea* Rolfe**

*Pleurothallis antioquiensis*  
(Schltr.) P.H.Allen, *Restrepia*  
*antioquiensis* Schltr.

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

NAR. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 16664* (NT: MO).

***Restrepia seketii* Luer &  
R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. SN Santa Marta. 600  
m.

MAG. Vulnerable (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 16658A* (HT: JAUM; IT:  
MO).

***Restrepia tabeae* H.Mohr**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2150 m.

NSA, SAN. Vulnerable  
(Calderón-Sáenz 2007).

*Luer 7938* (SEL).

***Restrepia trichoglossa* Sander**

*Restrepia subserrata* Schltr.,  
*Restrepia trichoglottis* Gentil

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-2000 m.

ANT, CAU. Preocupación Menor  
(Calderón-Sáenz 2007).

México a Perú.

*Lehmann 1312* (LT: K, AMES;  
ISL: W).

***Restrepia tsubotae* Luer &  
R.Escobar**

Luer & Escobar 1996; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. V Magdalena. 600 m.

ANT. En Peligro (Calderón-  
Sáenz 2007).

*Luer 17976* (HT: JAUM; IT:  
MO).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Restrepiella* Garay & Dunst.**

1 especie

***Restrepiella ophiocephala*  
(Lindl.) Garay & Dunst.**

*Pleurothallis ophiocephala* Lindl.,  
*Restrepia ophiocephala* (Lindl.)  
Rchb.f.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a SE Estados Unidos.

*Ospina 81* (JAUM).

***Rhetinantha* M.A.Blanco**

9 especies

***Rhetinantha aciantha*  
(Rchb.f.) M.A.Blanco**

*Maxillaria aciantha* Rchb.f.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Pacífico.

CHO. No evaluada.

México a Perú.

*Misas 261* (HPUJ).

NOTA: ilustrada por Misas  
Urreta (2005) como *Maxillaria*  
*scorpioidea* / illustrated by Misas  
Urreta (2005) as *Maxillaria*  
*scorpioidea*.

***Rhetinantha acuminata*  
(Lindl.) M.A.Blanco**

*Lycaste acuminata* (Lindl.)

Rchb.f., *Maxillaria acuminata*  
Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 250-2900 m.  
ANT, CAU, CHO, CUN, HUI, NAR, NSA, QUI, SAN, VAL. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*McPherson 12926* (HUA, MO).

***Rhetinantha cerifera* (Barb. Rodr.) M.A.Blanco**

*Maxillaria cerifera*  
Rchb.f., *Ornithidium ceriferum* (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100 m.  
CUN. No evaluada.  
N y C Suramérica.  
*Uribe 5245* (MO).  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Rhetinantha encyclioides* (J.T.Atwood & Dodson) M.A.Blanco**

*Maxillaria encyclioides*  
J.T.Atwood & Dodson  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 240 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Croat 70885* (MO).  
NOTA: pos. coespecífica con *Maxillaria ochroglossa* / poss. conspecific with *Maxillaria ochroglossa*.

***Rhetinantha friedrichsthalii* (Rchb.f.) M.A.Blanco**

*Maxillaria friedrichsthalii* Rchb.f.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico, V Cauca. 950 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Nicaragua a Perú.  
*Silverstone-Sopkin 6466* (CUVC, MO).

***Rhetinantha monacensis* (Kraenzl.) M.A.Blanco**

*Maxillaria monacensis* Kraenzl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
NSA? No evaluada.  
Colombia?, NO Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Rhetinantha notylioglossa* (Rchb.f.) M.A.Blanco**

*Maxillaria divaricata* (Barb. Rodr.) Cogn., *Maxillaria fallax* Schltr., *Maxillaria notylioglossa* Rchb.f., *Ornithidium divaricatum* Barb.Rodr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Guayana y Macarena. 850-2100 m.  
CUN, MET. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Idrobo 2102* (COL).

***Rhetinantha scorpioidea* (Kraenzl.) M.A.Blanco**

*Maxillaria scorpioidea* Kraenzl.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-1060 m.  
BOY, CHO, VAL. No evaluada.  
México a Brasil y Bolivia.  
*White 43* (HUA, MO).  
NOTA: ilustrada por Misa Urreta (2005) como *Maxillaria friedrichsthalii* / illustrated by Misa Urreta (2005) as *Maxillaria friedrichsthalii*.

***Rhetinantha witsenioides* (Schltr.) M.A.Blanco**

*Maxillaria witsenioides* Schltr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 530-2130 m.  
CAQ, CAU, CUN, NSA. No evaluada.

Colombia a Perú.  
*Chaparro 270/1* (COL, SEL).

***Rodriguezia Ruiz & Pav.***

11 especies, 3 especies endémicas

***Rodriguezia antioquiiana* Kraenzl.**

Kränzlin 1920a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Kalbreyer 1764* (T: ?).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Rodriguezia batemanii* Poepp. & Endl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 0-1000 m.  
CAQ, NAR. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).  
Venezuela a Perú y N Brasil.

***Rodriguezia bracteata* (Vell.) Hoehne**

*Rodriguezia arevaloi* Schltr., *Rodriguezia caloplectron* Rchb.f., *Rodriguezia venusta* (Lindl.) Rchb.f.  
Waldvogel 1983.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 0-1000 m.  
CAQ, HUI. No evaluada.  
Suramérica tropical.  
*Ortiz 457* (HPUJ).

***Rodriguezia bungerothii* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.

NOTA: señalada de Colombia por Govaerts *et al.* (2012), sin indicación de espécimen / recorded from Colombia by Govaerts *et al.* (2012) without indication of specimen.

[**Rodriguezia candida Lindl.**]

Calderón-Sáenz 2007.

NOTA: registro basado en identificación errónea / record based on a misidentification.

**Rodriguezia cuentillensis Kraenzl.**

Kränzlin 1920a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400 m.

SAN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Kalbreyer 841* (T: ?).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

**Rodriguezia granadensis (Lindl.) Rchb.f.**

*Rodriguezia macrantha* Schltr.

Waldvogel 1983; Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1350-2500 m.

ANT, CAU, CUN, NAR, NSA,

TOL. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia.

*Uribe-Uribe 3349* (COL, TOLI).

**Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav.**

*Rodriguezia carnea* Lindl.,

*Rodriguezia secunda* Kunth

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes, Pacífico, V Magdalena. 250-1400 m.

ANT, CHO, CUN, GUI, NSA, QUI, VAL, VAU. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

América tropical.

*Cogollo 660* (JAUM, MO).

**Rodriguezia leeana Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Orinoquia. 100-1000 m.

MET, VIC. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

Suramérica tropical.

*Ortiz 967* (HPUJ).

**Rodriguezia lehmannii Rchb.f.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 250-1400 m.

ANT, CAU, VAL. Casi

Amenazada (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia y Ecuador.

**Rodriguezia obtusifolia (Lindl.) Rchb.f.**

Bock 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 100-500 m.

AMA. Datos Insuficientes (Calderón-Sáenz 2007).

Amazonia.

**Rodriguezia refracta (Linden) Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta. 1300-2000 m.

ANT, CUN, HUI. Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 2007).

Colombia a Perú.

*Uribe 1582* (COL).

[**Rodriguezia rigida (Lindl.) Rchb.f.**]

Calderón-Sáenz 2007.

NOTA: registro basado en identificación errónea / record based on a misidentification.

**Rossioglossum (Schltr.)**

**Garay & G.C.Kenn.**

2 especies

**Rossioglossum ampliatum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Oncidium ampliatum* Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Caribe, Orinoquia. 1-500 m.

MET. No evaluada.

Centroamérica, N Suramérica.

*Idrobo 1338* (COL).

**Rossioglossum pardoii (Carnevali & G.A.Romero) J.M.H.Shaw**

*Chelyorchis pardoii* Carnevali & G.A.Romero

Carnevali *et al.* 2009.

Hierba, epífita.

Nativa. Orinoquia. 100-500 m.

MET. No evaluada.

E Colombia, Venezuela, Trinidad-Tobago.

*Idrobo 1338* (COL).

NOTA: el género *Chelyorchis* ha sido incluido en *Rossioglossum* (Chase *et al.* 2008), pero todavía no hay una combinación bajo *Rossioglossum* para *Chelyorchis pardoii* / the genus *Chelyorchis* has been included in *Rossioglossum* (Chase *et al.* 2008) but there is still no combination under *Rossioglossum* for *Chelyorchis ampliata*.

**Rudolfiella Hoehne**

4 especies

**Rudolfiella aurantiaca (Lindl.) Hoehne**

*Bifrenaria aurantiaca* Lindl.

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 180-200 m.  
VAU. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Zarucchi 2040* (COL).

***Rudolfiella bicornaria***

**(Rchb.f.) Hoehne**

*Bifrenaria bicornaria* Rchb.f.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia?, Brasil, Surinam.  
NOTA: señalada de Colombia (Govaerts *et al.* 2014a), sin citación de espécimen / recorded from Colombia (Govaerts *et al.* 2014a), without specimen citation.

***Rudolfiella floribunda***

**(Schltr.) Hoehne**

*Lindleyella floribunda* Schltr.,  
*Rudolfiella saxicola* (Schltr.)  
Hoehne  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes, V Magdalena. 350-925 m.  
ANT, PUT. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil.  
*Cárdenas 2445* (JAUM, MO).

***Rudolfiella picta* (Schltr.)**

**Hoehne**

*Lindleyella picta* Schltr.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 10-30 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Panamá a Ecuador.  
*Misas 137* (HPUJ).

***Sacoila* Raf.**

2 especies

***Sacoila lanceolata* (Aubl.)**

**Garay**

*Gyrostachys aphylla* (Hook.)  
Kuntze, *Gyrostachys lanceolata*  
(Aubl.) Kuntze, *Limodorum lanceolatum* Aubl., *Neottia aphylla* Hook., *Neottia lanceolata* (Aubl.) Willd., *Neottia orchioides* (Sw.) Willd., *Satyrium orchioides* Sw., *Spiranthes lanceolata* (Aubl.) León, *Stenorrhynchos aphyllus* (Hook.) Lindl., *Stenorrhynchos lanceolatum* (Aubl.) Spreng.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.

Nativa. Andes, Caribe, Orinoquia, Pacífico, V Cauca, V Magdalena. 20-1500 m.  
ANT, BOY, CAS, CAU, CES, CHO, CUN, GUJ, MET, SAN.  
No evaluada.

S Estados Unidos a neotrópico.  
*Fernández-Alonso 20468* (COL, HUA).

*Sacoila lanceolata* var.  
*squamulosa* (Kunth) Szlach.

***Sacoila squamulosa* (Kunth)**

**Garay**

*Neottia squamulosa* Kunth  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
SE Estados Unidos, Caribe, Colombia.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Santanderella* P.Ortiz**

1 especie, 1 especie endémica

***Santanderella amado-***

***rinconiana* P.Ortiz**

Ortiz, P. 2011b.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-1850 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Ortiz 1329* (HPUJ).

***Sarcoglottis* C.Presl**

9 especies, 1 especie endémica

***Sarcoglottis acaulis* (Sm.)**

**Schltr.**

*Gyrostachys picta* (Sims) Kuntze,  
*Neottia acaulis* Sm., *Neottia picta*  
Sims, *Sarcoglottis picta* (Sims)  
Klotzsch, *Sarcoglottis picta* var.  
*variegata* Klotzsch, *Sarcoglottis speciosa* C.Presl, *Spiranthes acaulis* (Sm.) Cogn., *Spiranthes picta* Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba, Parásita.

Nativa. Amazonia, Andes, Orinoquia, V Cauca. 240-1850 m.

AMA, ANT, CAS, CUN, PUT, VAL. No evaluada.

Centroamérica a Bolivia; Caribe.  
*McPherson 13475* (HUA, MO).

***Sarcoglottis grandiflora***

**(Hook.) Klotzsch**

*Spiranthes grandiflora* Lindl.

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.

Nativa. Pacífico, V Magdalena. 545 m.

CHO, HUI, PUT, VAL. No evaluada.

N Suramérica y Argentina.

*Dueñas 3304* (COL, SURCO).

***Sarcoglottis homalogastra***

**(Rchb.f. & Warm.) Schltr.**

*Spiranthes homalogastra* Rchb.f. & Warm.

Ortiz 1995; Dueñas 2002; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia?, Perú, Brasil,  
Argentina.  
NOTA: conocida solo de una  
lámina de la Real Expedición  
Botánica, presuntamente  
dibujada a partir de material  
colombiano / known only from  
a plate of the Real Expedición  
Botánica, allegedly drawn from  
Colombian material.

***Sarcoglottis lehmannii* Garay**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Endémica. Pacífico.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann s.n.* (HT: K).

***Sarcoglottis maroaensis*  
G.A.Romero & Carnevali**

Romero-González *et al.* 2010.  
Hierba.  
Nativa. Guayana y Macarena?  
95 m.  
GUI? No evaluada.  
E Colombia?, SO Venezuela.  
NOTA: esperada; el tipo es de  
Maroa (Venezuela), a 3 km de la  
frontera con Guainía / expected;  
type from Maroa (Venezuela),  
3 km from the border with  
Guainía.

***Sarcoglottis metallica* (Rolfe)  
Schltr.**

*Sarcoglottis maasorum* Pabst  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2600-2800 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia a Guyana.  
*García-Barriga 18025* (COL).

***Sarcoglottis neglecta*  
Christenson**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
*Misas 301* (COL, HPUJ).

***Sarcoglottis stergiosii*  
Carnevali & I.Ramírez**

Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa. Guayana y Macarena.  
120-250 m.  
AMA, GUI, VAU. No evaluada.  
Colombia, Venezuela.  
*Schultes 14031* (AMES).

***Sarcoglottis* sp.**

Dueñas 2002; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2000-2100 m.  
NAR. No evaluada.  
*Fernández-Alonso 19948* (COL).

***Sauroglossum* Lindl.**

2 especies

***Sauroglossum elatum* Lindl.**

*Sauroglossum nitidum* Schltr.,  
*Sauroglossum nitidum* var.  
*andinum* Hauman, *Serapias*  
*nitida* P.Vell.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Argentina, Brasil, Ecuador.  
NOTA: citada de Colombia por  
Ortiz (1995), sin mención de  
especimen / cited from Colombia  
by Ortiz (1995), without  
specimen.

***Sauroglossum longiflorum*  
(Schltr.) Garay**

*Brachystele longiflora* Schltr.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa. Andes.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Madero 53* (T: AMES).  
NOTA: conocida en Colombia  
solo del tipo / known in  
Colombia only from the type.

***Sauvetrea* Szlach.**

5 especies, 1 especie endémica

***Sauvetrea alpestris* (Lindl.)  
Szlach.**

*Maxillaria alpestris* Lindl.,  
*Maxillaria baumanniana* Schltr.,  
*Maxillaria xantholeuca* Schltr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2160 m.  
ANT, CUN. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Zarucchi 6183* (HUA, HPUJ,  
MO).

***Sauvetrea chlorochila*  
(F.Lehm. & Kraenzl.)**

**M.A.Blanco**

*Maxillaria chlorochila* F.Lehm. &  
Kraenzl.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-1800 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 8150* (HT: K; IT: LE,  
US).  
NOTA: tratada por algunos  
autores como sinónimo de  
*S. alpestris* / treated by some  
authors as a synonym of *S.*  
*alpestris*.

***Sauvetrea laevilabris* (Lindl.)****M.A. Blanco**Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Sauvetrea mathewsii* (Lindl.)****Szlach.***Maxillaria mathewsii* Lindl.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia. 150 m.

VAU. No evaluada.

*Garay 86* (AMES).***Sauvetrea sessilis* (Lindl.)****M.A. Blanco***Maxillaria sessilis* Lindl.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 870 m.

CUN. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

*Allen 569* (MO).

NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Scaphosepalum* Pfitzer**

16 especies, 7 especies endémicas

***Scaphosepalum antenniferum* Rolfe***Scaphosepalum reversum* Kraenzl.

Luer 1988; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700-2150 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

*Luer 8861* (SEL).***Scaphosepalum bicolor* Luer & R. Escobar**Luer 1991; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1200 m.

CHO. No evaluada.

*Escobar 1650* (HT: JAUM).***Scaphosepalum bicristatum* Luer**

Viveros &amp; Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Hirtz 7629* (HT: MO).

NOTA: conocida en Colombia solo del tipo, sin datos de localidad exacta / known in Colombia only from the type, without exact locality data.

***Scaphosepalum breve* (Rchb.f.) Rolfe***Masdevallia brevis* Rchb.f.,*Pleurothallis verrucosa* (Rchb.f.)Rchb.f., *Scaphosepalum nutans*Kraenzl., *Scaphosepalum trachypus* Schltr., *Scaphosepalum**verrucosum* (Rchb.f.) Pfitzer

Luer 1988; Viveros &amp; Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500-2600 m.

ANT, SAN. No evaluada.

Colombia a Bolivia; Guyana y Venezuela.

*Wallis 343* (W).***Scaphosepalum decorum* Luer & R. Escobar**

Luer 1988; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

CAU, NAR. No evaluada.

*Luer 3459* (HT: SEL; IT: JAUM).***Scaphosepalum gibberosum* (Rchb.f.) Rolfe**

Luer 1988; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2440 m.

ANT. No evaluada.

*Wallis 387* (HT: W; IT: K).***Scaphosepalum grande* Kraenzl.***Scaphosepalum escobarianum* Garay

Luer 1988; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400-1500 m.

ANT. No evaluada.

*Kalbreyer 1846* (LT: W).***Scaphosepalum lima* (F. Lehm. & Kraenzl.) Schltr.**

Luer 1988; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2000 m.

ANT. No evaluada.

*Lehmann 8238* (HT: K; IT: G).***Scaphosepalum macrodactylum* (Rchb.f.) Rolfe***Masdevallia macrodactyla* Rchb.f.

Luer 1988; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Veitch 202* (HT: W).***Scaphosepalum microdactylum* Rolfe***Scaphosepalum elasmatopus* Schltr., *Scaphosepalum*

*longirepens* Ames,  
*Scaphosepalum pittieri* Schltr.,  
*Scaphosepalum standleyi* Ames  
Luer 1988; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0 m.  
CHO. No evaluada.  
México a NO Ecuador.  
Luer 3461 (SEL).

***Scaphosepalum  
odontochilum* Kraenzl.**

*Scaphosepalum sneidernii* Garay  
Luer 1988; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-2400 m.  
CAU, CHO, RIS. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador.  
Lehmann 172 (HT: K; IT:  
AMES).

***Scaphosepalum ophidion***

**Luer**  
Luer 1988; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.  
CAU, NAR. No evaluada.  
SO Colombia a NO Ecuador.  
Luer 4607 (SEL).

***Scaphosepalum panduratum***

**Luer & R.Escobar**  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400-1700 m.  
ANT. No evaluada.  
Escobar 8226 (HT: MO).

***Scaphosepalum pulvinare*  
(Rchb.f.) Rolfe**

*Masdevallia pulvinaris* Rchb.f.,  
*Scaphosepalum rolfeanum*  
Kraenzl.  
Luer 1988; Viveros & Higgins  
2007.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400-1600 m.  
ANT, TOL. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Calvert s.n.* (W).

***Scaphosepalum swertiifolium*  
(Rchb.f.) Rolfe**

*Masdevallia swertiifolia* Rchb.f.,  
*Scaphosepalum platypetalum*  
Schltr.  
Luer 1988; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2560 m.  
ANT, CAU, NAR, RIS. No  
evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
Lehmann 544 (W).  
*Scaphosepalum swertiifolium*  
subsp. *exiguum* Luer &  
R.Escobar, *Scaphosepalum*  
*swertiifolium* subsp. *swertiifolium*

***Scaphosepalum tiaratum***

**Luer**  
Luer 1988; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
Luer 5255 (HT: SEL).

***Scaphyglottis Poepp. &  
Endl.***

33 especies, 7 especies endémicas

***Scaphyglottis aurea* (Rchb.f.)  
Foldats**

Adams 1993; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2700 m.  
ANT, CAL, CAQ, CAU, CUN,  
HUI, NSA, SAN, TOL. No  
evaluada.  
Suramérica.  
Lehmann 7285 (AMES, US).

***Scaphyglottis behrii* (Rchb.f.)  
Hemsl.**

*Scaphyglottis sanctae-martae*  
Schltr.  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 20-500 m.  
CHO. No evaluada.  
Neotropical.  
Cárdenas 1098 (MO).

***Scaphyglottis bicornis*  
(Lindl.) Garay**

*Hexadesmia bicornis* Lindl.  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700 m.  
ANT. No evaluada.  
Suramérica.  
Zarucchi 4442 (HUA, MO).

***Scaphyglottis bilineata*  
(Rchb.f.) Schltr.**

*Ponera bilineata* Rchb.f.,  
*Scaphyglottis lueckelii* I.Bock  
Adams 1993; Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50-100 m.  
CHO. No evaluada.  
Neotropical.  
*Juncosa* 1890 (MO).

***Scaphyglottis boliviensis*  
(Rolfe) B.R.Adams**

*Hexadesmia boliviensis* Rolfe,  
*Scaphyglottis huebneri* Schltr.  
Adams 1993; Misas-Urreta 2005;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Caribe,  
Pacífico. 100 m.  
AMA, ANT, CAU, CHO, GUJ.  
No evaluada.  
Neotropical.  
*Plowman* 2306 (AMES).

***Scaphyglottis caricalensis*  
(Kraenzl.) Correll**

*Ponera caricalensis* Kraenzl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
SAN. No evaluada.  
Colombia, Cordillera Oriental.  
*Kalbreyer 1053* (HT: B?).  
NOTA: conocida solo del tipo;  
datos obtenidos del protólogo  
pero herbario no confirmado /  
known only from the type; data  
obtained from the protologue  
but herbarium not confirmed.

***Scaphyglottis chocoana*****I. Bock**

Adams 1993; Misas-Urreta 2005;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 10-40 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
*Brand 662* (COL, HUA, JAUM).

***Scaphyglottis coriacea*  
(L.O. Williams) Dressler**

*Platyglottis coriacea* L.O. Williams  
Adams 1993; Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 750-800 m.  
CHO. No evaluada.  
O Colombia, Panamá.  
*Misas 285* (HPUJ).

***Scaphyglottis cuniculata*  
(Schltr.) Dressler**

*Fractunguis cuniculatus* Schltr.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 570-770 m.  
ANT. No evaluada.  
Costa Rica a Colombia.  
*Ramírez s.n.* (MO).

***Scaphyglottis exilis* Schltr.**

Adams 1993.  
Hierba, epífita.

Endémica. Amazonia, Andes.  
530 m.  
CAQ. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp 68* (B, destruido).

***Scaphyglottis fusiformis*  
(Griseb.) R.E. Schult.**

*Hexadesmia brachyphylla* Rchb.f.,  
*Scaphyglottis brachyphylla*  
(Rchb.f.) C. Schweinf.  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Neotropical.  
*Escobar 676* (AMES).

***Scaphyglottis gentryi* Dodson  
& Monsalve**

Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 50 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Espina 1808* (CHOCO, MO).

***Scaphyglottis genychila*  
Schltr.**

Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Ospina 133* (JAUM).

***Scaphyglottis graminifolia*  
(Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**

*Fernandezia graminifolia* Ruiz &  
Pav., *Ponera graminifolia* Lindl.,  
*Scaphyglottis antonii* Schltr.,  
*Scaphyglottis loretoensis* Schltr.  
Adams 1993; Misas-Urreta 2005;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe, Pacífico. 10-20 m.  
ANT, CHO, GUJ. No evaluada.  
Neotropical.  
*Brand 778* (JAUM, MO).

***Scaphyglottis imbricata*  
(Lindl.) Dressler**

*Diothonea imbricata* Lindl.,  
*Diothonea oppositifolia* (A. Rich. &  
Galeotti) Rchb.f., *Epidendrum*  
*oppositifolium* A. Rich. &  
Galeotti, *Euothonaea imbricata*  
(Lindl.) Rchb.f., *Euothonaea*  
*oppositifolia* (A. Rich. & Galeotti)  
Rchb.f., *Hexisea imbricata*  
(Lindl.) Rchb.f., *Hexisea*  
*oppositifolia* (A. Rich. & Galeotti)  
Rchb.f.  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 0-1200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Nicaragua a Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Scaphyglottis isochiloides*  
(Regel) Foldats**

*Tetragamestus isochiloides* Regel  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Suramérica.  
NOTA: esperada / expected.

***Scaphyglottis leucantha*  
Rchb.f.**

*Scaphyglottis esuriens* (Rchb.f.)  
Schltr.  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
0-1100 m.  
MAG, SAN. No evaluada.  
Suramérica.  
*Kirkbride 1992* (HB, US).

***Scaphyglottis lindeniana*  
(A. Rich. & Galeotti)****L.O. Williams**

*Hexadesmia fasciculata* Brongn.,  
*Hexadesmia lindeniana* A. Rich.  
& Galeotti  
Adams 1993.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes?  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Neotropical.  
NOTA: esperada / expected.

**Scaphyglottis livida (Lindl.)**

**Schltr.**

*Hexadesmia reedii* Rchb.f.,  
*Hexadesmia sessilis* Rchb.f.,  
*Isochilus lividus* Lindl.,  
*Scaphyglottis reedii* (Rchb.f.)  
Ames, *Scaphyglottis sessilis*  
(Rchb.f.) Foldats  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Orinoquia. 500 m.  
MET. No evaluada.  
Neotropical.  
Ortiz 953 (HUAJ).

**Scaphyglottis longicaulis**

**S. Watson**

Adams 1993; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico, V  
Magdalena. 5-770 m.  
ANT, CHO, SAN. No evaluada.  
Neotropical.  
*Forero* 4475 (COL, HUA).

**Scaphyglottis minutiflora**

**Ames & Correll**

Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 0-1200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Neotropical.  
NOTA: esperada / expected.

**Scaphyglottis modesta**

**(Rchb.f.) Schltr.**

*Ponera modesta* (Rchb.f.) Rchb.f.,  
*Tetragamestus modestus* Rchb.f.  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
CAU, VAL. No evaluada.

Neotropical.  
*Croat* 70343 (MO).

**Scaphyglottis prolifera**

**(R.Br.) Cogn.**

*Isochilus proliferus* R.Br.,  
*Ponera mapiriensis* Kraenzl.,  
*Scaphyglottis cuneata* Schltr.,  
*Tetragamestus gracilis* Schltr.  
Adams 1993; Misa-Urreta 2005;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Pacífico.  
5-1000 m.  
ANT, CAU, CHO, PUT, VAU. No  
evaluada.  
Neotropical.  
*Forero* 4746 (AMES, COL, HUA,  
JAUM).

**Scaphyglottis propinqua**

**C.Schweinf.**

Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500 m.  
CAU, VAL. No evaluada.  
Suramérica.  
*Gentry* 53653 (MO).

**Scaphyglottis punctulata**

**(Rchb.f.) C.Schweinf.**

*Helleriella punctulata* (Rchb.f.)  
Garay & H.R.Sweet, *Ponera*  
*punctulata* Rchb.f., *Scaphyglottis*  
*arundinacea* Regel  
Adams 1993; Misa-Urreta 2005;  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
2250 m.  
ANT, CHO, GUJ, NAR, SAN. No  
evaluada.  
Panamá y Suramérica.  
*Luer* 10339 (MO).

**Scaphyglottis reflexa Lindl.**

*Reichenbachanthus reflexus*  
(Lindl.) Brade

Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 100 m.  
CHO. No evaluada.

**Scaphyglottis sickii Pabst**

Adams 1993; Misa-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena, Pacífico. 120-500 m.  
AMA, CHO, GUI, GUV, VAU.  
No evaluada.  
Suramérica.  
*Liesner* 9029 (COL).

**Scaphyglottis signata I.Bock**

Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Pacífico. 20-  
1100 m.  
CHO. No evaluada.  
*Schultes s.n.* (AMES).

**Scaphyglottis stellata Lindl.**

*Ponera amethystina* Rchb.f.,  
*Ponera stellata* (Lindl.) Rchb.f.,  
*Scaphyglottis amethystina*  
(Rchb.f.) Schltr.  
Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 0-500  
m.  
AMA, CAQ. No evaluada.  
Neotropical.  
*Cárdenas* 6932 (COAH, MO).

**Scaphyglottis stricta Schltr.**

Adams 1993.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
CAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B, destruido).  
NOTA: identidad incierta /  
identity uncertain.

**Scaphyglottis summersii**

**L.O. Williams**

Adams 1993.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 900-2500 m.  
ANT, BOL, CAU, CUN, NAR.  
No evaluada.  
Suramérica.  
*Lehmann 3893* (BM, K, US).

***Scaphyglottis triloba***

**B.R.Adams**

Adams-B. 1993.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
CAU. No evaluada.  
*Dodson 3128* (SEL).

***Scaphyglottis violacea*  
(Lindl.) Lindl.**

*Cladobium violaceum* Lindl.,  
*Ponera violacea* (Lindl.) Rchb.f.,  
*Scaphyglottis rosea* Hook.  
Adams-B. 1993.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 20-  
2000 m.  
CUN, VAU. No evaluada.  
Suramérica.  
*Fernández 1904* (COL).

***Schlimmia Linden***

1 especie

***Schlimmia jasminodora*  
Planch. & Linden**

*Schlimmia alpina* Rchb.f. &  
Warsz., *Schlimmia garayana*  
H.R.Sweet, *Schlimmia jennyana*  
Lückel, *Schlimmia pandurata*  
Schltr., *Schlimmia stevensonii*  
Dodson, *Schlimmia trifida*  
Rchb.f.  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1100-2600 m.  
ANT, CAL, CAU, CHO, NSA,  
SAN, VAL. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Schlim 773* (HT: K-L; IT: P).  
NOTA: las plantas  
correspondientes a los diversos

nombres tienen mínimas  
diferencias en su labelo y su  
perfume es casi idéntico; no se  
justifica separar varias especies /  
plants under the various names  
have minor differences in their  
lip, and scent is almost identical;  
there is no reason to separate  
several species.

***Scuticaria Lindl.***

1 especie

***Scuticaria steelei* (Hook.)  
Lindl.**

*Maxillaria flagellifera* Rchb.f.,  
*Maxillaria steelei* Hook.,  
*Scuticaria keyseriana* hort.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia. 250-307 m.  
GUI, VAU. Preocupación Menor  
(propuesta aquí).  
Colombia a Ecuador y a Guayana  
Francesa y Brasil.  
*Schultes 13103* (AMES, COL).

***Selenipedium Rchb.f.***

1 especie

***Selenipedium chica* Rchb.f.**

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 870 m.  
NAR. Casi Amenazada  
(Calderón-Sáenz 2007).  
Colombia y Panamá.  
*Fernández 12452* (COL).

***Sertifera Lindl. & Rchb.f.***

8 especies, 3 especies endémicas

***Sertifera aurantiaca*  
C.Schweinf.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia, Venezuela?

*Cuatrecasas 12852* (HT: COL).  
NOTA: recolectada a 20 km  
de la frontera con Venezuela /  
collected 20 km from the border  
with Venezuela.

***Sertifera colombiana* Schltr.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700-3200 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Cuadros 5065* (MO).  
NOTA: la identidad del  
especimen requiere verificación  
/ voucher identity needs  
verification.

***Sertifera gracilis* Rchb.f.**

Szlachetko & Baranow 2014.  
Hierba.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Klobuach 80* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo,  
sin datos de localidad / known  
only from the type, without any  
locality data.

***Sertifera grandifolia***

**L.O.Williams**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2800 m.  
RIS. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Pennell 10362* (AMES).

***Sertifera major* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a;  
Szlachetko & Baranow 2014.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300-2900 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Triana s.n.* (NT: W).

***Sertifera parviflora* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3300 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
Garay 448 (NT: AMES).

**Sertifera purpurea Lindl. & Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 650-3000 m.  
ANT, CHO, CUN, HUI, NAR,  
PUT. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
Bristol 550 (COL).

**Sertifera risaraldana Szlach. & Baranow**

Szlachetko & Baranow 2014.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 650-2450 m.  
CHO, NAR, RIS. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
Arévalo 772 (HT: COL).

**Sievekingia Rchb.f.**

5 especies, 2 especies endémicas

**Sievekingia colombiana**

**Garay**

*Sievekingia herklotziana* Jenny  
Gerlach 1999b; Idárraga *et al.*  
2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 900-1200 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia.  
Jenny JE-52 (G, T de S.  
*herklotziana*).

**Sievekingia cristata Garay**

*Sievekingia herrenhusana* Jenny,  
*Sievekingia marsupialis* Dodson  
Gerlach 1999b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 600-1200 m.  
CAQ, PUT. No evaluada.

Colombia y Ecuador.  
Jenny 36 (herb. pers.).

**Sievekingia filifera Dressler**

Gerlach 1999b; Idárraga *et al.*  
2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1100 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
Escobar 1347 (HT: US; IT:  
JAUM, SEL).

**Sievekingia reichenbachiana Rolfe**

*Gorgoglossum reichenbachiana*  
F.Lehm., *Gorgoglossum*  
*reichenbachianum* (Rolfe) Schltr.  
Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 200-300 m.  
CAU, CHO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
Ospina-H. 1472 (AMES, JAUM).

**Sievekingia suavis Rchb.f.**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0-500 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
Misas 202 (COL, JAUM).

**Sobralia Ruiz & Pav.**

55 especies, 21 especies  
endémicas

**Sobralia anceps Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Amazonia. 300 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia.  
Hop 103 (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

**Sobralia andreae Dressler**

Dressler 2006; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 700 m.  
CUN, TOL. No evaluada.  
Colombia.  
Dressler 6419 (HT: MO).

**Sobralia antioquiensis Schltr.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 400-2000 m.  
ANT, CAU, TOL, VAL. No  
evaluada.  
Pérez 5735 (COL).

**Sobralia atropubescens Ames & C.Schweinf.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 50-800  
m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.

**Sobralia biflora Ruiz & Pav.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes. 200  
m.  
AMA. No evaluada.  
Colombia, Perú, Brasil.  
Escobar 1990-1998: No. 615 (?).

**Sobralia bimaculata Garay**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1720 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
Escobar 1211 (HT: AMES).

**Sobralia bletiae Rchb.f.**

*Sobralia suaveolens* Rchb.f.  
Ortiz 1955; Dressler & Pupulin  
2010.

Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 100-1500 m.  
CHO. No evaluada.  
Nicaragua a Venezuela y prob. a Ecuador.  
*Gentry 17314* (MO).

***Sobralia candida* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1000-1850 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Callejas 9903* (HUA).

***Sobralia carazoi* Lank. & Ames**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1430 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador.  
*Croat 56674* (MO).

***Sobralia cattleya* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1000-2200 m.  
CUN, MET, NSA, SAN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Ortiz 1100* (HPUJ).

***Sobralia chrysantha* Lindl.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schlim 6* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Sobralia ciliata* (C.Presl)**

**Foldats**  
Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.

Hierba.  
Nativa. Andes. 1600-2700 m.  
BOY. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.

***Sobralia crocea* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.**

*Sobralia gracilis* Schltr.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Amazonia, Andes. 0-2300 m.  
AMA, ANT, CUN, HUI, PUT, VAL. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Garay 65* (COL).

***Sobralia decora* Bateman**

*Sobralia fenzliana* Rchb.f.,  
*Sobralia sessilis* Lindl.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Pacífico. 50-1550 m.  
CHO, CUN, NAR?, VAU. No evaluada.  
México a N Suramérica.  
*Gentry 3377* (MO).

***Sobralia densifoliata* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 100-500 m.  
ANT, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Reina s.n.* (CUVC).

***Sobralia dichotoma* Ruiz & Pav.**

*Sobraliamandonii* f. *coerulea*  
Christenson  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1650 m.  
TOL, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Devia 1000* (MO).

***Sobralia ecuadorana* Dodson**

Hierba.  
Nativa. Andes. 1800-2000 m.  
NAR. No evaluada.  
S Colombia y Ecuador.  
*Orejuela s.n.* (PSO).

***Sobralia exilis* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Madero s.n.* (HT: B destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Sobralia fimbriata* Poepp. & Endl.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes? 450-2100 m.  
NAR? No evaluada.  
S Colombia? a Bolivia.  
NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Sobralia fragrans* Lindl.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Orinoquia, Pacífico. 200-630 m.  
ANT, CAQ, CHO, MET. No evaluada.  
México a Colombia.  
*Sánchez 3013* (COL, JAUM).

***Sobralia gentryi* Dodson**

Hierba.  
Nativa. Andes. 600-1700 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Orejuela s.n.* (PSO).

***Sobralia gloriosa* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 990-1990 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Forero 2014* (COL).

***Sobralia granitica***

**G.A.Romero & Carnevali**

Romero-Castañeda 2000;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia? 120-250 m.  
GUI?, GUV? No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Córdoba 2191* (COAH).  
NOTA: esperada / expected.

***Sobralia hoppii* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
PUT. No evaluada.  
*Hopp 164* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Sobralia klotzscheana* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Orinoquia, Pacífico. 0-1850 m.  
CAQ, CHO, NAR, VAL. No  
evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Romero-Castañeda 4053* (COL).

***Sobralia lacerata* Dressler &  
Pupulin**

Dressler & Pupulin 2010.  
Hierba.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Dressler 7167* (HT: CR).  
NOTA: descrita de una planta  
cultivada en Costa Rica,

proveniente de Colombia, sin  
datos de localidad. Por mucho  
tiempo fue confundida con *S.*  
*suaveolens* / described from a  
cultivated plant in Costa Rica,  
from Colombia, without locality  
data; for a long time confused  
with *S. suaveolens*.

***Sobralia lancea* Garay**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1850 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Martínez 1391* (HUA, MO).  
NOTA: la identidad del  
especimen representativo  
requiere verificación / voucher  
identity needs verification.

***Sobralia liliastrum* Lindl.**

*Sobralia elisabethae* R.H.Schomb.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena, Orinoquia, Pacífico.  
100-630 m.  
AMA, CAQ, CHO, GUI, GUV,  
MET, VAL, VAU, VIC. No  
evaluada.  
N Suramérica.  
*Vincelli 1006* (AMES, COL).

***Sobralia lowii* Rolfe**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Rolfe s.n.* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Sobralia macrophylla* Rchb.f.**

*Sobralia aurantiaca* Linden &  
Rchb.f.  
Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.

Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Pacífico.  
0-1500 m.  
AMA, ANT, CAQ, CAU, CHO,  
PUT, VAL, VAU. No evaluada.  
Costa Rica a Brasil.  
*Forero 1432* (COL).

***Sobralia madisonii* Dodson**

Ortiz 1995.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1100-1150 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Gentry 36678* (MO).

***Sobralia malmquistiana*  
Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
NOTA: conocida solo de  
la descripción original /  
known only from the original  
description.

***Sobralia mucronata* Ames &  
C.Schweinf.**

Misas-Urreta 2005.  
Epífita.  
Nativa. Pacífico. 5-500 m.  
CHO. No evaluada.  
Centroamérica a Colombia.  
*Misas 12* (HPUJ).

***Sobralia mutisii* P.Ortiz**

Govaerts *et al.* 2014a;  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1500-2500 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Idrobo 5636* (COL).

***Sobralia odorata* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.

Endémica. Andes. 1500-2000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 2007* (Foto).

***Sobralia paludosa* Linden**

*Ortiz 1995; Govaerts et al. 2014a.*  
Hierba.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.

NOTA: conocida solo de la descripción original / known only from the original description.

***Sobralia paradisiaca* Rchb.f.**

*Ortiz, R. 1995; Govaerts et al. 2014a.*  
Hierba.  
Nativa. Andes? 1500 m.  
NSA? No evaluada.  
Colombia, O Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

[*Sobralia parviflora*  
**L.O. Williams**]

*Govaerts et al. 2014a.*  
NOTA: registro basado en identificación errónea. Endémica de Bolivia / record based on a misidentification; endemic to Bolivia.

***Sobralia piedrahitae* P.Ortiz**

Hierba.  
Endémica. V Magdalena. 700 m.  
BOY. No evaluada.  
*Ortiz 1348* (HT: HPUJ).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Sobralia powellii* Schltr.**

*Ortiz 1995.*  
Hierba.  
Nativa. Andes? 600 m.  
NAR? No evaluada.  
Nicaragua a Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

***Sobralia pulcherrima* Garay**

*Ortiz 1995; Idárraga et al. 2011.*  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 200-2000 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Juncosa 1122* (MO).

***Sobralia rhizophorae***

**X.Cornejo & Dodson**

*Cornejo & Dodson 2011.*  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0-5 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia, NO Ecuador.  
NOTA: en manglares. Señalada de Colombia por Cornejo & Dodson, a partir de observaciones de campo / in mangrove swamps; recorded from Colombia by Cornejo & Dodson from field observations.

***Sobralia rigidissima* Rchb.f.**

*Ortiz 1995; Govaerts et al. 2014a.*  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1950-2100 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Schlim 36* (HT: W).

***Sobralia roezlii* Rchb.f.**

*Ortiz 1995; Idárraga et al. 2011.*  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1500-2700 m.  
ANT, QUI, TOL, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 4447* (HPUJ).

***Sobralia rosea* Poepp. & Endl.**

*Ortiz 1995; Idárraga et al. 2011.*  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-2700 m.  
ANT, BOY, CHO, CUN, NAR, VAL. No evaluada.

Venezuela a Bolivia.  
*Callejas 9603* (HUA).

***Sobralia ruckeri* Linden & Rchb.f.**

*Ortiz 1995; Govaerts et al. 2014a.*  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1500-1800 m.  
BOY, CUN, NSA, SAN. No evaluada.  
Colombia, Venezuela.  
*Ortiz 1105* (HPUJ).

***Sobralia schultzei* Schltr.**

*Ortiz 1995; Govaerts et al. 2014a.*  
Hierba.  
Endémica. Andes. 900-1700 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Schultze 14* (HT: B, destruido).

***Sobralia setigera* Poepp. & Endl.**

*Ortiz 1995.*  
Hierba.  
Nativa. Andes. 750-1800 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Escobar 254* (HUA).

***Sobralia sobralioides* (Kraenzl.) Garay**

*Chloraea sobralioides* Kraenzl.,  
*Sobralia kalbreyeri* Schltr.  
*Ortiz 1995.*  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1200-2000 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Ortiz 911* (HPUJ).

***Sobralia splendida* Schltr.**

*Ortiz 1995; Govaerts et al. 2014a.*  
Hierba.  
Endémica. Andes. 500 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.

*Madero s.n.* (HT: B, destr.).  
NOTA: conocida solo de la descripción original / known only from the original description.

***Sobralia uribei* P.Ortiz**

Ortiz 1955; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1500-1600 m.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Uribe 3661* (HT: COL).

***Sobralia valida* Rolfe**

Ortiz 1955; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 70-1850 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Panamá a Guyana y a Ecuador.  
*Escobar 5188* (HUA, MO).

***Sobralia violacea* Lindl.**

Ortiz 1955; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes, Guayana y Macarena, Orinoquia, Pacífico, SN Santa Marta. 200-2046 m.  
AMA, ANT, CAQ, CAS, CUN, GUV, MAG, SAN, TOL, VAU.  
No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Ortiz 313* (HPUJ).

***Sobralia virginalis* Peeters & Cogn.**

Ortiz 1955; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1780 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Sánchez 326* (MEDEL).

***Sobralia wilsoniana* Rolfe**

*Sobralia bouchei* Ames & C.Schweinf.  
Ortiz 1995.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 900 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Escobar 129* (AMES).

***Sobralia yauaperyensis* Barb.**

**Rodr.**  
Ortiz 1955.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia?, Andes? 205-1600 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
NOTA: esperada / expected.

***Solenidium* Lindl.**

2 especies

***Solenidium lunatum* (Lindl.)**

**Schltr.**  
*Oncidium lunatum* Lindl.  
Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Orinoquia. 100-200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
N Suramérica.

***Solenidium racemosum***

**Lindl.**  
*Oncidium racemosum* (Lindl.)  
Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2550 m.  
NSA. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Linden 1264* (AMES, BR, G).

***Solenocentrum* Schltr.**

1 especie

***Solenocentrum asplundii***

**(Garay) Garay**  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.

Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, NE Ecuador.  
NOTA: no hay especímenes confirmados para Colombia / no specimens confirmed for Colombia.

***Soterosanthus* Jenny**

1 especie

***Soterosanthus shephardii* (Rolfe) Jenny**

*Sievekingia shephardii* Rolfe  
Gerlach 1999c.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0-100 m.  
CAU, CHO, VAL. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Misas 203* (COL).

***Specklinia* Lindl.**

36 especies, 11 especies endémicas

***Specklinia acrisepala* (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis acrisepala* Ames & C.Schweinf., *Sarcinula acrisepala* (Ames & C.Schweinf.) Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico? 20-120 m.  
CHO? No evaluada.  
Honduras a Ecuador.  
NOTA: esperada / expected.

***Specklinia areldii* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis areldii* Luer, *Sarcinula areldii* (Luer) Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
VAL. No evaluada.  
Panamá a Colombia.  
*Luer 18443* (MO).

***Specklinia aristata* (Hook.)****Pridgeon & M.W.Chase***Muscarella aristata* (Hook.) Luer  
Luer 2006b; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia, Venezuela,  
Guayana Francesa; Antillas.NOTA: esperada, según Luer y  
Govaerts *et al.* (2012) / expected;  
according to Luer, and Govaerts  
*et al.* (2012).***Specklinia cabellensis*****(Rchb.f.) Pridgeon &****M.W.Chase***Humboldtia cabellensis* (Rchb.f.)  
Kuntze, *Pleurothallis cabellensis*  
Rchb.f., *Pleurothallis fritzii*  
Carnevali & G.A.Romero,  
*Sylphia cabellensis* (Rchb.f.) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-1800 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

E Colombia a O Venezuela.

*Schlim 1021* (W).***Specklinia cactantha* (Luer)****Pridgeon & M.W.Chase***Pleurothallis cactantha* Luer,  
*Sylphia cactantha* (Luer) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

RIS. No evaluada.

Panamá a Colombia.

*Luer 16845* (MO).***Specklinia calderae* (Luer)****Luer***Pleurothallis calderae* Luer,  
*Sarcinula calderae* (Luer) Luer  
Luer 2006a; Idárraga *et al.* 2011;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. V Cauca. 800 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 14273* (HT: MO).NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.***Specklinia campyloyle*****(P.Ortiz) Pridgeon &****M.W.Chase***Acostaea campyloyle* P.Ortiz  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1550 m.

ANT, NAR, VAL. No evaluada.

Colombia a N Ecuador.

*Ortiz 247* (HT: COL).***Specklinia cestrochila*****(Garay) Pridgeon &****M.W.Chase***Muscarella cestrochila* (Garay)  
Luer, *Pleurothallis cestrochila*  
GarayGovaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500 m.

ANT, NAR. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Wallis 715* (HT: AMES).***Specklinia colombiana*****(Garay) Pridgeon &****M.W.Chase***Acostaea colombiana* Garay,  
*Acostaea costaricensis* Schltr.,  
*Acostaea costaricensis* subsp.  
*colombiana* (Garay) Luer,  
*Acostaea costaricensis* subsp.  
*costaricensis*Viveros & Higgins 2007; Pupulin  
2010; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-2000 m.

ANT. No evaluada.

Costa Rica a Ecuador.

*Ortiz-V. 892* (COL).***Specklinia corniculata* (Sw.)****Steud.***Cymbidium corniculatum*  
(Sw.) Spreng., *Dendrobium*  
*corniculatum* (Sw.) Sw.,  
*Epidendrum corniculatum* Sw.,  
*Sarcinula corniculata* (Sw.) Luer,  
*Specklinia emarginata* Lindl.  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 100-  
1000 m.

ANT, CHO, VAL. No evaluada.

Belice a N Suramérica; Antillas.

*Luer 18441* (MO).***Specklinia coronula* (Luer)****Luer***Pleurothallis coronula* Luer,  
*Sarcinula coronula* (Luer) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

NAR. No evaluada.

SO Colombia a Ecuador.

*Luer 18824* (HT: MO).NOTA: conocida en Colombia  
solo del tipo, sin datos de  
localidad exacta o elevación /  
known in Colombia only from  
the type, without exact locality or  
elevation data.***Specklinia costaricensis*****(Rolfe) Pridgeon &****M.W.Chase***Pleurothallis costaricensis* Rolfe,  
*Pleurothallis ehrhartiiflora* Schltr.  
Luer 1977; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-3000 m.

CAU, VAL. No evaluada.

Costa Rica a O Ecuador.

*Luer 14274* (MO).

***Specklinia cycesis* (Luer & R.Escobar) Luer**

*Pleurothallis cycesis* Luer & R.Escobar  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 6 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 14290* (HT: MO).

***Specklinia echinodes* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Muscarella echinodes* (Luer & R.Escobar) Luer, *Pleurothallis echinodes* Luer & R.Escobar Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
NSA. No evaluada.  
*Luer 7675* (HT: SEL; IT: AAU, COL, JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Specklinia gracillima* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis brevicaulis* Schltr., *Pleurothallis gracillima* Lindl., *Pleurothallis humidicola* Garay Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2700 m.  
CAU. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
*Pennell 7588* (AMES, NY).

***Specklinia grobyi* (Lindl.) E.Barros**

*Pleurothallis choconiana* S.Watson, *Pleurothallis grobyi* Lindl., *Pleurothallis marginalis* Rchb.f.  
Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 600-2600 m.

CAQ, VAL. No evaluada.  
S México a Suramérica tropical.  
*Escobar 5051* (MO).

***Specklinia ichthyonekys* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis ichthyonekys* Luer Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2440 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a SE Ecuador.  
*Morales 6008* (HUA).

***Specklinia intonsa* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Muscarella intonsa* (Luer & R.Escobar) Luer, *Pleurothallis intonsa* Luer & R.Escobar Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2550 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 1121* (HT: JAUM).

***Specklinia lanceola* (Sw.) Lindl.**

*Epidendrum lanceola* Sw., *Pleurothallis lanceola* (Sw.) Spreng.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a México; Jamaica.

***Specklinia latilabris* (Foldats) Pridgeon & M.W.Chase**

*Muscarella latilabris* (Foldats) Luer, *Pleurothallis latilabris* Foldats Luer 2006b; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2900-3000 m.  
BOY, CUN. No evaluada.

Colombia a NO Venezuela.  
*Farfán 1147* (FMB).

***Specklinia leptantha* (Schltr.) Luer**

*Pleurothallis leptantha* Schltr., *Sarcinula leptantha* (Schltr.) Luer Luer 2006a; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. SN Santa Marta. 1200 m.  
MAG. No evaluada.  
*Smith 2554* (HT: B; LT: K, IL: AMES, CM, NY, US).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Specklinia macroblepharis* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Masdevallia culex* Rchb.f., *Pleurothallis macroblepharis* Rchb.f.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, V Magdalena. 900-2800 m.  
ANT, CAU, CHO, RIS, SAN. No evaluada.  
Colombia a N Perú.  
*Cuatrecasas 12539C* (COL).

***Specklinia microphylla* (A.Rich. & Galeotti) Pridgeon & M.W.Chase**

*Humboldtia microphylla* (A.Rich. & Galeotti) Kuntze, *Pleurothallis microphylla* A.Rich. & Galeotti Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Ecuador; Jamaica.  
NOTA: esperada / expected.

***Specklinia picta* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis marginata* Lindl., *Pleurothallis picta* Lindl.

Luer 2006a; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-1500 m.  
ANT, CAQ, CAU. No evaluada.  
México a América tropical.  
*Lehmann 130* (W).

***Specklinia purpurella* (Luer)  
Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis purpurella* Luer,  
*Sarcinula purpurella* (Luer) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 900 m.  
VAL. No evaluada.  
*Lehmann 1043* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Specklinia remotiflora*  
Pupulin & Karremans**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 800-1500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NO Colombia a Costa Rica.  
NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron  
especímenes / recorded from  
Colombia but no specimens were  
seen for this work.

***Specklinia samacensis*  
(Ames) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Muscarella samacensis* (Ames)  
Luer, *Pleurothallis samacensis*  
Ames  
Luer 2006b; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Costa Rica a E Ecuador; Brasil.  
*Luer 2311* (SEL).

***Specklinia scolopax* (Luer  
& R.Escobar) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Pleurothallis scolopax* Luer &  
R.Escobar, *Sarcinula scolopax*  
(Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 300 m.  
ANT, CHO. No evaluada.  
*Escobar 1518* (HT: JAUM).  
NOTA: hay un registro de  
Antioquia sin localidad  
específica o elevación / a record  
from Antioquia without exact  
locality or elevation data.

***Specklinia semperflorens*  
(Lindl.) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Humboldtia semperflorens*  
(Lindl.) Kuntze, *Muscarella*  
*sempreflorens* (Lindl.) Luer,  
*Pleurothallis acuminata* H.Focke,  
*Pleurothallis semperflorens* Lindl.  
Luer 2006b; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 200-500 m.  
VAL. No evaluada.  
N Suramérica a Ecuador.  
*Lehmann 8204* (K).

***Specklinia sibatensis*  
(F.Lehm. & Kraenzl.) Luer**

*Muscarella sibatensis* (F.Lehm.  
& Kraenzl.) Luer, *Pleurothallis*  
*sibatensis* F.Lehm. & Kraenzl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
CUN. No evaluada.  
*Lehmann 2553* (HT: K; IT:  
AMES, BM, BR).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Specklinia simmleriana*  
(Rendle) Luer**

*Pleurothallis periodica* Ames,  
*Pleurothallis simmleriana* Rendle,  
*Sarcinula simmleriana* (Rendle)  
Luer, *Specklinia periodica* (Ames)  
Pridgeon & M.W.Chase  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 20-100 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a NO Colombia.  
*Luer 1942* (SEL).

***Specklinia striata* (H.Focke)  
Luer**

*Pleurothallis striata* H.Focke,  
*Sarcinula striata* (H.Focke) Luer  
Luer 2006a; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700 m.  
CAU. No evaluada.  
Panamá a Guayanas; Ecuador.  
*Luer 3007* (SEL).

***Specklinia tamboensis* (Luer  
& R.Escobar) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Muscarella tamboensis* (Luer &  
R.Escobar) Luer, *Pleurothallis*  
*tamboensis* Luer & R.Escobar  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
CAU. No evaluada.  
*Escobar 1828* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Specklinia tenax* (Luer &  
R.Escobar) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Acostaea tenax* Luer & R.Escobar  
Luer 1987; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2550-2840 m.  
SAN. No evaluada.  
*Luer 6603* (HT: SEL).

***Specklinia tsubotae* (Luer & R.Escobar) Luer**

*Pleurothallis ringens* C.Schweinf.,  
*Pleurothallis tsubotae* Luer & R.Escobar

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1400 m.  
RIS. No evaluada.

*Luer 16763* (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Specklinia zephyrina* (Rchb.f.) Luer**

*Humboldtia zephyrina* (Rchb.f.)  
Kuntze, *Muscarella zephyrina*  
(Rchb.f.) Luer, *Pleurothallis*  
*arachmantha* Rchb.f., *Pleurothallis*  
*fimbripetala* Schltr., *Pleurothallis*  
*setigera* Lindl., *Pleurothallis*  
*zephyrina* Rchb.f., *Specklinia*  
*setigera* (Lindl.) Pridgeon &  
M.W.Chase, *Trichosalpinx*  
*zephyrina* (Rchb.f.) Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1500-2800 m.

ANT, CAU, CUN, MAG, SAN.  
No evaluada.

Colombia a Bolivia; NO  
Venezuela.

*Schneider 268-2* (COL).

***Stanhopea* Hook.**

20 especies, 8 especies endémicas

***Stanhopea annulata* Mansf.**

Jenny 2003a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 150-  
1000 m.

VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.  
*Dodson 4420* (SEL).

***Stanhopea candida* Barb.**

**Rodr.**

*Stanhopea randii* Rolfe

Jenny 2003a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Orinoquia.  
100-350 m.

AMA, ARA, GUI, MET, PUT,  
VAU. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil,  
Bolivia, Perú, Ecuador.

*Stevenson 2065* (COL).

***Stanhopea connata* Klotzsch**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-2000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Perú.

NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron  
especímenes / recorded from  
Colombia but no specimens were  
seen for this work.

***Stanhopea gibbosa* Rchb.f.**

*Stanhopea impressa* Rolfe

Gerlach & Beeche 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200-2000 m.

BOY, CHO, NAR. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Vierling s.n.* (M).

***Stanhopea ×herrenhusana***

**Jenny**

Jenny 2003a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 400 m.

VAL. No evaluada.

Colombia.

*Hubein s.n.* (HT: G).

NOTA: *S. tricornis* × *S.*  
*reichenbachiana* / *S. tricornis* × *S.*  
*reichenbachiana*.

***Stanhopea jenischiana***

**Rchb.f.**

*Anguloa grandiflora* (Humb.  
& Bonpl.) Kunth, *Epidendrum*  
*grandiflorum* Humb. & Bonpl.,  
*Stanhopea bucephalus* Lindl.,  
*Stanhopea grandiflora* (Bonpl.)  
Rchb.f., *Stanhopea hoppii* Schltr.

Gerlach 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 900-1400 m.

CAU, HUI. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Lehmann 3651* (BM).

**[*Stanhopea maculosa***

**Knowles & Westc.]**

Idárraga *et al.* 2011.

NOTA: registro basado en  
identificación errónea. Especie  
de México no encontrada en  
Colombia / record based on a  
misidentification; a species from  
Mexico not found in Colombia.

***Stanhopea maduroi* Dodson & Dressler**

*Stanhopeaplaticeras* f. *gunnii*

Jenny

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

N Colombia, Panamá.

NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron  
especímenes / recorded from  
Colombia but no specimens were  
seen for this work.

***Stanhopea oculata* (Lodd.)**

**Lindl.**

Dodson 1992; Govaerts *et al.*  
2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-3000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Colombia.

NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron

especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stanhopea ospinae* Dodson**

Gerlach 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

CUN. No evaluada.

Colombia.

*Dodson 3173* (HT: SEL).

***Stanhopea platyceras* Rchb.f.**

*Stanhopea madouxiana* Cogn.

Gerlach 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia.

*Pérez-Arbeláez s.n.* (COL).

***Stanhopea posadae* Jenny & Braem**

Jenny 2003a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

ANT. No evaluada.

Colombia.

*Jenny s.n.* (HT: G).

***Stanhopea pulla* Rchb.f.**

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Pacífico. 10-150 m.

CHO. No evaluada.

Colombia a Costa Rica.

*Misas 203* (COL).

***Stanhopea ×quadricornis* Lindl.**

Dodson 1992; Govaerts *et al.*

2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Guatemala.

NOTA: híbrido de *S. grandiflora* × *S. wardii*. No hay espécimen

de referencia / a hybrid of *S. grandiflora* × *S. wardii*. No reference specimen.

***Stanhopea reichenbachiana* Rchb.f.**

*Stanhopea amesiana* auct.,

*Stanhopea lowii* Rolfe, *Stanhopea suavis* Ospina

Gerlach 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 200-1000 m.

CAU, HUI, PUT, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador.

*Kapuler 121* (COL).

***Stanhopea schilleriana* Rchb.f.**

*Stanhopea maculosa* Knowles & Westc.

*Govaerts et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 500 m.

ANT. No evaluada.

México a Colombia.

*Escobar 331* (AMES).

***Stanhopea shuttleworthii* Rchb.f.**

Gerlach 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 800-1500 m.

NAR, TOL. No evaluada.

Colombia.

*Escobar s.n.* (M).

***Stanhopea stevensonii* Jenny**

Gerlach 2004.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes, Orinoquia.

500 m.

BOY, MET. No evaluada.

Colombia.

*Mejía 2757* (COL).

***Stanhopea tolimensis* G.Gerlach**

Gerlach 2009.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

TOL. No evaluada.

Colombia.

*Escobar 8002* (HT: JAUM; IT: M).

***Stanhopea tricornis* Lindl.**

*Gerlachia tricornis* (Lindl.)

*Szlach.*, *Gerlachia tricornis* var.

*stenochila* (F.Lehm. & Kraenzl.)

*Szlach.*, *Stanhopea convoluta*

Rolfe, *Stanhopea langlasseana*

Cogn., *Stanhopea stenochila*

F.Lehm. & Kraenzl., *Stanhopea*

*tricornis* subsp. *stenochila*

(F.Lehm. & Kraenzl.) Dodson,

*Stanhopea wallisii* Rchb.f.

Gerlach 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico, V

Magdalena. 0-1600 m.

ANT, CAU, CHO, NAR, RIS,

SAN, VAL. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Pérez 0229* (VALLE).

***Stanhopea wardii* Lindl.**

*Stanhopea amoena* Klotzsch,

*Stanhopea inodora* var. *amoena*

(Klotzsch) Lindl.

Gerlach 2004.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, SN Santa Marta,

V Magdalena. 600-1800 m.

BOL, MAG, RIS, TOL. No

evaluada.

Nicaragua a Colombia y

Venezuela.

*Kirkbride 1973* (COL).

***Stelis* Sw.**

218 especies, 109 especies

endémicas

***Stelis acuífera* Lindl.**

Garay 1979; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.

*Goudot s.n.* (?).

NOTA: tipo no localizado; hay un espécimen en K sin datos de localidad, ni colector. Por su distribución en Ecuador, debería encontrarse en Colombia, en la región Andina / type not located. There is a K specimen without collector or locality data. From its distribution in Ecuador, expected in the Andean region of Colombia.

***Stelis alba* Kunth**

*Stelis pentodonta* Rchb.f.

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2560 m.

ANT, CAU. No evaluada.

O Colombia.

*Duque 1625* (JAUM).

NOTA: se desconocen datos del tipo / type data unknown.

***Stelis amaliae* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis amaliae* Luer & R.Escobar, *Unciferia amaliae* (Luer & R.Escobar) Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

CAU. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer 3006* (HT: SEL).

NOTA: tipo sin datos de localidad específica o elevación / type without exact locality or elevation data.

***Stelis amphigena* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 450 m.

ANT. No evaluada.

Urabá.

*Duque s.n.* (HT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis anchorilabia* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700 m.

ANT. No evaluada.

Cordillera Central.

*Duque 2195* (HT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis ancistra* (Luer & Hirtz)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis ancistra* Luer & Hirtz, *Unciferia ancistra* (Luer & Hirtz) Luer

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2500-3000 m.

CAU. No evaluada.

S Colombia a NO Ecuador.

*Lehmann s.n.* (K).

***Stelis andrei* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

NAR. No evaluada.

*André 3366* (HT: K).

***Stelis angustifolia* Kunth**

Garay 1979; Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1840 m.

ANT, CAU. No evaluada.

Colombia a Ecuador; N

Venezuela.

*Duque 1399* (JAUM).

NOTA: se desconocen datos del tipo / type data unknown.

***Stelis anisopetala* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2200 m.

QUI. No evaluada.

Cordillera Central.

*Valencia s.n.* (HT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis antioquiensis* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000-2300 m.

ANT, CAL. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Duque 1386* (JAUM).

NOTA: se desconoce el lugar en el que está depositado el tipo (Lehmann 3175) / type's herbarium unknown (Lehmann 3175).

***Stelis aprica* Lindl.**

*Stelis catharinensis* Lindl., *Stelis crassifolia* Lindl., *Stelis cubensis* Schltr., *Stelis cuspidilabia* Schltr., *Stelis desportesii* Urb., *Stelis domingensis* Cogn., *Stelis eleniglossa* Schltr., *Stelis gutturosa* Rchb.f., *Stelis herzogii* Schltr., *Stelis micrantha* Barb.Rodr., *Stelis microglossa* Rchb.f., *Stelis miersii* Lindl., *Stelis rodriguesii* Cogn., *Stelis tippenhaueri* Urb.

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, V Cauca. 950-2000 m.

ANT, QUI, VAL. No evaluada.

Suramérica tropical; Cuba y Antillas Mayores.

*Viveros 773* (HUQ).

***Stelis argentata* Lindl.**

*Stelis bernoullii* Schltr., *Stelis endresii* Rchb.f., *Stelis glandulosa*

Ames, *Stelis heylidyana*  
H.Focke, *Stelis huebneri* Schltr.,  
*Stelis littoralis* Barb.Rodr.,  
*Stelis parvibracteata* Ames,  
*Stelis pichinchae* Dodson &  
Garay, *Stelis praesecta* Schltr.,  
*Stelis violascens* Schltr., *Stelis*  
*yauaperyensis* Barb.Rodr.

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, V Cauca. 960-  
2000 m.

ANT, QUI, VAL. No evaluada.  
México a Suramérica tropical.  
*Silverstone-Sopkin 8302* (MO).

### ***Stelis ascendens* Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2790 m.

ANT. No evaluada.

Venezuela a Perú.

*Dodson 15281* (MO).

### ***Stelis asseris* O.Duque**

*Pleurothallis purpurea* D.Don,  
*Stelis acutissima* Lindl.,  
*Stelis connata* C.Presl, *Stelis*  
*cordibractea* Schltr., *Stelis*  
*cupuligera* Rchb.f. & Warsz., *Stelis*  
*densiflora* Lindl., *Stelis endocharis*  
Rchb.f., *Stelis fruticulus* Schltr.,  
*Stelis hemicardia* Rchb.f.,

*Stelis huancabambae* Kraenzl.,

*Stelis pachyphylla* Schltr.,

*Stelis pachystele* Schltr., *Stelis*  
*phaeantha* Schltr., *Stelis rusbyi*

Rolfe, *Stelis truncata* Lindl.

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2300-2900 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

*Giraldo 1719* (HUA, JAUM).

### ***Stelis atra* Lindl.**

Dunsterville & Garay 1979;

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3400 m.

QUI. No evaluada.

Colombia a Bolivia; NO  
Venezuela.

*Vélez 1600* (HUQ).

*Stelis atra* var. *atra*.

### ***Stelis atrovioleacea* Rchb.f.**

Dunsterville & Garay 1979;

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3550 m.

QUI. No evaluada.

Venezuela a Ecuador.

*Méndez 3041* (HUQ).

### ***Stelis attenuata* Lindl.**

*Stelis lindleyana* var. *carosior*

C.Schweinf.

Garay 1979; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Purdie s.n.* (K).

NOTA: tipo de Colombia,  
no localizado; espécimen  
representativo, sin datos de  
localidad / type from Colombia,  
not located; voucher without  
locality data.

### ***Stelis auriculata* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.*

2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1300 m.

HUI. No evaluada.

*s.c. s.n.* (HT: JAUM).

NOTA: espécimen tipo tomado  
de cultivo / type specimen taken  
from cultivation.

### ***Stelis aviceps* Lindl.**

*Stelis cryptochila* Garay, *Stelis*

*decipiens* Schltr., *Stelis polycarpa*

Schltr.

Garay 1979; Viveros & Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

QUI. No evaluada.

Colombia a Bolivia; S Venezuela.

*Viveros 396* (HUQ).

### ***Stelis barbuda* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga  
*et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300 m.

ANT. No evaluada.

*Duque 1896* (HT: JAUM).

### ***Stelis batillacea* (Luer)**

#### **Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe batillacea* (Luer)

Luer, *Pleurothallis batillacea* Luer

Luer 1998a; Luer 2004; Viveros &

Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2700 m.

PUT. No evaluada.

S Colombia a N Ecuador.

*Luer 3142* (SEL).

### ***Stelis bigibba* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007;

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1600-2000 m.

VAL. No evaluada.

*Lehmann 6834* (IT: NY).

### ***Stelis biserrula* Lindl.**

Duque 2010; Govaerts *et al.*

2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia.

NOTA: señalada de Colombia,  
pero no se examinaron  
especímenes / recorded from

Colombia but no specimens were  
seen for this work.

***Stelis bogotensis* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2500 m.  
CUN. No evaluada.  
*Hopf s.n.* (?).

***Stelis braccata* Rchb.f. & Warsz.**

*Apatostelis braccata* (Rchb.f. & Warsz.) Garay, *Stelis minimiflora* Schltr., *Stelis pleistantha* Schltr. Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
N Venezuela a Ecuador.  
*Warszewicz s.n.* (AMES).

***Stelis bractescens* Garay**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1604* (JAUM, MO).  
NOTA: tipo de Colombia (*Hopp 58*), no localizado / type from Colombia (*Hopp 58*), not located.

***Stelis brevilabris* Lindl.**

*Stelis serpens* Luer & Hirtz Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
CAU, CUN. No evaluada.  
Colombia a C Perú.  
*Hartweg 1411* (IT: K, LD).

***Stelis bucamangae* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe bucamangae* (Luer & R.Escobar) Luer, *Pleurothallis bucamangae* Luer & R.Escobar

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600-3300 m.  
SAN. No evaluada.  
*Luer 10107* (HT: MO).

***Stelis cairoensis* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2080 m.  
VAL. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin 8000* (HT: CUV; IT: MO).

***Stelis calceolaris* Garay**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2480-2900 m.  
CUN, HUI. No evaluada.  
*Schneider 326-2* (COL).

***Stelis caliensis* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1970 m.  
CAU. No evaluada.  
*André 2642* (HT: K).

***Stelis cassidis* (Lindl.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**  
*Crocodelanthe cassidis* (Lindl.) Luer, *Humboldtia cassidis* (Lindl.) Kuntze, *Humboldtia palmiformis* Kuntze, *Pleurothallis cassidis* Lindl., *Pleurothallis langlassei* Schltr., *Pleurothallis palmiformis* Lindl., *Pleurothallis pleiostachys* Schltr. Luer 1998b; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3050 m.  
BOY, CAU, NAR, PUT, TOL. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú.  
*Hartweg s.n.* (HT: K).

***Stelis caveata* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
QUI. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 2080* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis chocoensis* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1300 m.  
CHO. No evaluada.  
Cordillera Occidental.  
*Serna s.n.* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis choerorhyncha* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe choerorhyncha* (Luer) Luer, *Pleurothallis choerorhyncha* Luer Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600-2870 m.  
VAL. No evaluada.  
*Cuatrecasas 18116* (HT: US).

***Stelis cleistogamoides* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
QUI. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Valencia s.n.* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis clipeus* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000 m.  
VAL. No evaluada.  
*Duque 595* (HT: JAUM).

***Stelis cochlearis* Garay**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2700 m.  
ANT. No evaluada.  
*Johnson 18C804* (HT: US; IT: MEDEL).

***Stelis cocornaensis* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis cocornaensis*  
Luer & R.Escobar, *Specklinia cocornaensis* (Luer & R.Escobar)  
Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 5047* (HT: JAUM).

***Stelis colombiana* Ames**

Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-3000 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
*Pittier 1093* (HT: AMES).

***Stelis colorata* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 2215* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis comica* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1232* (HT: JAUM).

***Stelis concinna* Lindl.**

*Stelis flexuosa* Lindl., *Stelis tolimensis* Schltr.  
Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO Venezuela.  
*Escobar 5145* (JAUM, MO).

***Stelis convoluta* (Lindl.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**  
*Humboldtia convoluta* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis convoluta* Lindl., *Pleurothallis espinalii* Luer, *Pleurothallis papillisejala* Schltr., *Specklinia convoluta* (Lindl.) Luer  
Luer 2000b; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1650 m.  
QUI. No evaluada.  
*Hartweg 1414* (HT: K).

***Stelis crassilabia* Schltr.**

*Stelis simula* Schltr.  
Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2000 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela.  
*Duque 1649* (JAUM).

***Stelis crenulata* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500 m.  
VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.  
*Serna s.n.* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis crescentiicola* Schltr.**

*Apatostelis crescentiicola* (Schltr.) Garay  
Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 0-500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Costa Rica.  
*Duque 2139* (JAUM).

***Stelis cruenta* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Acevedo s.n.* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis cuatrecasasii* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe cuatrecasasii* (Luer) Luer, *Pleurothallis cuatrecasasii* Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2950-3150 m.  
CAU. No evaluada.  
*Cuatrecasas 19264* (HT: NY).

***Stelis cucullata* Ames**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900 m.  
ANT. No evaluada.  
Nicaragua a Venezuela.  
*Ospina 68* (JAUM).

***Stelis cuculligera* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3500 m.

NAR. No evaluada.

*Hopp* 169 (?).

NOTA: conocida solo del tipo; según Duque (2008), se desconoce en qué herbario está depositado; solo se conoce de la descripción original / known only from the type; according to Duque (2008), type's herbarium unknown; known only from the original description.

***Stelis cundinamarcae* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

CUN. No evaluada.

*Schnitter s.n.* (?).

NOTA: conocida solo del tipo. Según Duque (2008), no se encuentra la ubicación del espécimen tipo. Solo se conoce de la descripción original / known only from the type; according to Duke (2008), type's herbarium unknown; known only from the original description.

***Stelis cycloglossa* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2000-2500 m.

NAR. No evaluada.

*Hopf s.n.* (?).

NOTA: conocida solo del tipo; según Duque (2008), se desconoce en qué herbario está depositado; solo se conoce de la descripción original / known only from the type; according to Duque (2008), type's herbarium unknown; known only from the original description.

***Stelis dapsilis* Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthus maxima* (Luer)

Luer, *Pleurothallis maxima* Luer, *Stelis maxima* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase

Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1220-2150 m.

ANT. No evaluada.

C Colombia a C Ecuador.

*Luteyn* 13299 (NY).

***Stelis dialissa* Rchb.f.**

*Pleurothallis pristis* F.Lehm. & Kraenzl.

Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3400-3450 m.

CAU. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Barclay* 5919 (MO).

***Stelis discolor* Rchb.f.**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2000 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

SO Colombia, Ecuador.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis dolichopus* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: según Duque (2008), el tipo es de Colombia, pero no se ha localizado; solo se conoce de la descripción original / according to Duque (2008), the

type is from Colombia, but has not been located; known only from the original description.

***Stelis duquei* P.Ortiz**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1300 m.

HUI. No evaluada.

*Gonzaga s.n.* (HT: JAUM).

***Stelis efsiella* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1000 m.

CAU. No evaluada.

*Lehmann* 3300 (HT: K).

***Stelis elongata* Kunth**

*Stelis lobata* Rchb.f., *Stelis melicoides* Schltr.

Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3400 m.

ANT, CAU, MET. No evaluada.

Colombia a Bolivia; Venezuela.

*Duque* 114 (JAUM).

***Stelis emarginata* (Lindl.)**

**Soto Arenas & Solano**

*Epidendrum emarginatum* Ruiz & Pav.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a Perú.

NOTA: presencia dudosa en Colombia; distribución disyunta (México; Perú-Brasil) / Uncertain presence in Colombia, disjunct distribution (Mexico, Peru-Brazil).

***Stelis erecta* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800-2300 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1677* (HT: JAUM).

***Stelis erucosa* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis erucosa* Luer & R.Escobar, *Specklinia erucosa* (Luer & R.Escobar) Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico. 2 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 2341* (HT: SEL).

***Stelis eublepharis* Rchb.f.**

*Stelis bruchmuelleri* Rchb.f. Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-2100 m.  
ANT, SAN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; Venezuela.  
*Duque 1712* (JAUM, MO).

***Stelis eugenii* Schltr.**

Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 600-1200 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
*Langlassé 104* (LT: US).

***Stelis excelsa* (Garay) Pridgeon & M.W.Chase**

*Elongatia excelsa* (Garay) Luer, *Pleurothallis excelsa* Garay Luer 1994; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Mejía s.n.* (HT: AMES).  
NOTA: el tipo proviene de una planta cultivada en Medellín, sin

datos de localidad / type from a plant cultivated in Medellín, without locality data.

***Stelis expansa* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthus expansa* (Lindl.) Luer, *Pleurothallis expansa* Lindl. Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3960 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a NO Ecuador.  
*Jameson 308* (G).

***Stelis fendleri* Lindl.**

Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1100-2690 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Venezuela.  
*Duque 1720* (JAUM, MO).

***Stelis flacca* Rchb.f.**

*Stelis alismifolia* Lindl. Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800 m.  
QUI. No evaluada.  
Colombia a NO Ecuador.  
*González 2157* (HUQ).

***Stelis flaccida* (Klinge)**

**Pridgeon & M.W.Chase**  
*Pleurothallis flaccida* Klinge Dodson 1992; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: señalada de Colombia, sin indicación de especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis floresii* Luer & Hirtz**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
NAR. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
NOTA: esperada; se encuentra en Carchi (Ecuador), a un kilómetro de la frontera / expected; found in Carchi (Ecuador) to a kilometer from the border.

***Stelis floripendens* O.Duque**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
PUT. No evaluada.  
Andes de Putumayo.  
*Gonzaga s.n.* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis foetida* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-2300 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
*Duque 1760* (HT: JAUM).

***Stelis franciscana* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1890* (HT: JAUM).

***Stelis fredoniensis* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 2281* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis frontinensis* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a SE Ecuador.  
*Duque 1891* (HT: JAUM).

***Stelis furfuracea* F.Lehm. & Kraenzl.**

*Stelis pleurothalloides* Ames  
Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800-3600 m.  
CAU, NSA. No evaluada.  
Colombia (prob. Ecuador).  
*Pittier 1156* (HT: AMES).

***Stelis galeata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe galeata* (Lindl.) Luer, *Humboldtia fraterna* Kuntze, *Humboldtia galeata* Kuntze, *Pleurothallis fraterna* Lindl., *Pleurothallis galeata* Lindl., *Pleurothallis quinquecallosa* Luer, *Pleurothallis sororia* Schltr., *Pleurothallis trianae* Schltr., *Pleurothallis venosa* Rolfe  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300-3200 m.  
ANT, CAU, CUN, NSA, RIS, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; Venezuela.  
*Luer 10245* (MO).

***Stelis galerasensis* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe galerasensis* (Luer) Luer, *Pleurothallis galerasensis* Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3200 m.

NAR. No evaluada.  
S Colombia.  
*Luer 3749* (HT: SEL).

***Stelis gargantua* Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe gigas* (Luer & R.Escobar) Luer, *Pleurothallis gigas* Luer & R.Escobar, *Stelis gigas* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700-2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 14152* (HT: MO).

***Stelis gelida* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Anathallis hebesepala* Barb. Rodr., *Humboldtia gelida* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis chiquindensis* F.Lehm. & Kraenzl., *Pleurothallis chiriquensis* Schltr., *Pleurothallis gelida* Lindl., *Pleurothallis hebesepala* (Barb.Rodr.) Cogn., *Pleurothallis pidax* Luer, *Pleurothallis polylyria* Endrés & Rchb.f., *Pleurothallis puberula* Rolfe, *Pleurothallis tenuispica* Schltr., *Pleurothallis univaginata* Lindl., *Specklinia gelida* (Lindl.) Luer  
Luer 2000b; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1530-2000 m.  
ANT, QUI. No evaluada.  
S Florida a América tropical.  
*Viveros 75a* (HUQ).

***Stelis gemma* Garay**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1700-2300 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Escobar 338* (HT: AMES).

NOTA: sin datos de localidad específica; el rango de elevación es de Ecuador y Perú / no specific locality data; the elevation range is from Ecuador and Peru.

***Stelis genychila* Garay**

Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300 m.  
CAU. No evaluada.  
S Colombia a Ecuador.  
*Von Sneidern 1095* (HT: S).

***Stelis globosa* Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe popayanensis* (F.Lehm. & Kraenzl.) Luer, *Pleurothallis popayanensis* F.Lehm. & Kraenzl., *Stelis popayanensis* (F.Lehm. & Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500-3000 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 4514* (HT: K).

***Stelis gloriae* O.Duque**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 2483* (JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis grossilabris* Rchb.f.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia, Venezuela.  
*Duque 883* (JAUM).

***Stelis guatemalensis* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600-2850 m.  
NAR. No evaluada.  
México a Bolivia.  
*Gentry 30461* (MO).

***Stelis gustavoi* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1835* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo.  
Erróneamente descrita como  
*gustavii* / known only from the  
type; erroneously described as  
*gustavii*.

***Stelis hirsuta* Garay**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
CUN. No evaluada.  
*Grant 9362* (IT: US).

***Stelis hoppii* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 123* (?).  
NOTA: conocida solo del  
tipo; según Duque (2008), se  
desconoce en qué herbario está  
depositado; solo se conoce de  
la descripción original / known  
only from the type; according to  
Duque (2008), type's herbarium  
unknown; known only from the  
original description.

***Stelis huilensis* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
HUI. No evaluada.

Macizo Colombiano.  
*Duque 2160* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stelis hylophila* Rchb.f.**

*Apatostelis hylophila* (Rchb.f.)  
Garay, *Stelis recurvula* Schltr.  
Dunsterville & Garay 1979;  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2300 m.  
ANT, CUN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; NO  
Venezuela.  
*Duque 1715* (JAUM, MO).

***Stelis hymenantha* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1930 m.  
QUI. No evaluada.  
S México a Ecuador.  
*Viveros 805* (HUQ).

***Stelis immersa* (Linden & Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Humboldtia immersa* (Linden & Rchb.f.), *Pleurothallis calerae* Schltr., *Pleurothallis immersa* Linden & Rchb.f., *Pleurothallis krameriana* Rchb.f., *Pleurothallis lasiosepala* Schltr., *Specklinia immersa* (Linden & Rchb.f.) Luer Luer 2000b; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
México a N Venezuela.  
*Linden s.n.* (HT: W).

***Stelis imraei* (Lindl.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**  
*Humboldtia imraei* (Lindl.)  
Kuntze, *Pleurothallis imraei*  
Lindl., *Pleurothallis umbraticola*

Schltr., *Specklinia imraei* (Lindl.)  
Luer  
Luer 2000b; Luer 2004; Viveros  
& Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1280-2000 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
América tropical.  
*Luer 17549* (MO).

***Stelis inclinata* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1914* (HT: JAUM).

***Stelis infundibulosa* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe infundibulosa*  
(Luer) Luer, *Pleurothallis*  
*infundibulosa* Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2590 m.  
SAN. No evaluada.  
*Fassett 25732* (HT: US).

***Stelis jamesonii* (Lindl.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**  
*Crocodelanthe jamesonii*  
(Lindl.) Luer, *Humboldtia foveata*  
Kuntze, *Humboldtia jamesonii*  
Kuntze, *Pleurothallis foveata*  
Lindl., *Pleurothallis jamesonii*  
Lindl., *Pleurothallis sodiroi* Schltr.  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3300 m.  
CAU, NAR. No evaluada.  
S Colombia a Ecuador.  
*Cuatrecasas 18794* (AMES, NY,  
US).  
NOTA: a veces erróneamente  
citada como *jamesonii* /  
sometimes erroneously cited as  
*jamesonii*.

***Stelis jurisdixii* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe jurisdixii* (Luer & R.Escobar) Luer, *Pleurothallis jurisdixii* Luer & R.Escobar Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. Andes. 2100 m. NSA. No evaluada. NE Colombia. Luer 10211 (HT: COL).

***Stelis kefersteiniana* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Humboldtia flexuosa* Kuntze, *Pleurothallis elachopus* Rchb.f., *Pleurothallis flexuosa* (Poepp. & Endl.) Lindl., *Pleurothallis remotiflora* C.Schweinf. Luer 2000b; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 1100 m. ANT. No evaluada. Colombia a Bolivia; N Venezuela. Hodge 6801 (AMES).

***Stelis laevigata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe laevigata* (Lindl.) Luer, *Humboldtia hartwegii* Kuntze, *Humboldtia laevigata* Kuntze, *Pleurothallis conchopetala* Schltr., *Pleurothallis hartwegii* Lindl., *Pleurothallis laevigata* Lindl., *Pleurothallis lamprochlamys* Schltr. Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 1600-3200 m. ANT, CAU, NSA, VAL. No evaluada. Colombia, Ecuador, Perú. Hartweg 1406 (HT: K).

***Stelis lamellata* Lindl.**

*Stelis arevaloi* Schltr. Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 2100-2800 m. ANT, NAR. No evaluada. SO Colombia a Perú. Duque 1613 (JAUM).

***Stelis lanceolata* (Ruiz & Pav.) Willd.**

*Humboldtia lanceolata* Ruiz & Pav., *Pleurothallis lanceolata* (Ruiz & Pav.) Lindl. Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 1500-2660 m. CUN, HUI, RIS, SAN. No evaluada. Venezuela a Perú. Serralde 81 (COL).

***Stelis langlassei* Schltr.**

*Stelis tonsoria* Luer Garay & Sweet 1974; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 1200 m. CAU. No evaluada. Langlassei 101 (HT: MO).

***Stelis latispala* C.Schweinf.**

Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 1600-1800 m. DESCONOCIDO. No evaluada. Colombia a S Venezuela. NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis lehmanneptis* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis lehmanneptis* Luer & R.Escobar, *Specklinia lehmanneptis* (Luer & R.Escobar) Luer Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. VAL. No evaluada. Luer 18449 (HT: MO). NOTA: conocida solo del tipo. Espécimen sin datos de localidad específica / known only from the type; specimen without specific locality data.

***Stelis lehmannii* Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis petiolaris* Luer, *Specklinia petiolaris* (Luer) Luer Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a. Hierba, epífita. Endémica. Pacífico. 200-400 m. CAU. No evaluada. Lehmann 9099 (HT: K).

***Stelis ligulata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe ligulata* (Lindl.) Luer, *Humboldtia ligulata* Kuntze, *Pleurothallis atacasana* Luer, *Pleurothallis chlamydopus* Schltr., *Pleurothallis hopfiana* Schltr., *Pleurothallis ligulata* Lindl., *Pleurothallis nubigena* Schltr., *Pleurothallis patula* Schltr. Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007. Hierba, epífita. Nativa. Andes. 1500-4000 m. CAU, CUN, NAR. No evaluada. Colombia a Bolivia. Cuatrecasas 5712 (COL, US).

***Stelis lindenii* Lindl.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-1683 m.  
VAL. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Silverstone-Sopkin 8301* (MO).

***Stelis londonii* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1424* (HT: JAUM).

***Stelis longipetala* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1903* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis longiracemosa* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 118* (?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis lopezii* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1100 m.  
VAL. No evaluada.  
*López 8391* (HT: COL).

***Stelis lumbricosa* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.

Hierba, epífita.  
Endémica. 2000 m.  
SAN. No evaluada.  
*Duque 585* (HT: JAUM).

***Stelis lutea* Lindl.**

*Stelis hennisiana* Schltr.  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a N Venezuela.

***Stelis maderoii* Schltr.**

Dunsterville & Garay 1979;  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200-2100 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Colombia a Venezuela.  
*Duque 49* (MO).  
NOTA: tipo (Madero s.n.) no localizado / type (Madero s.n.) not located.

***Stelis magdalena* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Humboldtia magdalena* (Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis magdalena* Rchb.f., *Pleurothallis stelidioides* Schltr.  
Luer 1999; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2500 m.  
ANT, CAU, NSA. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Wagener s.n.* (HT: W).

***Stelis magnipetala* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 47* (HT: ?).  
NOTA: tipo de Colombia, no localizado; solo se conoce de la descripción original / type

from Colombia, not located; known only from the original description.

***Stelis major* Rchb.f.**

Dodson 1992; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a N Venezuela.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis maxima* Lindl.**

Dodson 1992; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000 m.  
NAR. No evaluada.  
S Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis megaloglossa* Luer**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800 m.  
NAR. No evaluada.  
S Colombia a Ecuador.  
*Luer 4528* (HT: SEL).

***Stelis melanoxantha* Rchb.f.**

*Stelis caucae* Schltr.  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2300 m.  
SAN, VAL. No evaluada.  
NO Venezuela a Ecuador.  
*Lehman 6923* (IT: K, NY).

***Stelis mesohybos* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2500 m.  
CUN. No evaluada.  
*Hopf s.n.* (HT: ?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis mocoana* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 650 m.  
PUT. No evaluada.  
*Hopp 159* (HT: ?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis mononeura* Lindl.**

*Stelis fasciculata* Luer  
Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3000 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a C Ecuador.  
NOTA: registrada de Colombia, sin indicación de espécimen / recorded from Colombia with no specimen citation.

***Stelis mucronipetala* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 135* (HT: ?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis muscifera* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Venezuela, Trinidad, Colombia, Ecuador, Bolivia.  
*Duque 600* (JAUM).

***Stelis muscosa* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2100 m.  
ANT. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Ospina 61-28* (JAUM).

***Stelis nanegalensis* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1290-1800 m.  
ANT, NAR. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Bolivia.  
*Cogollo 2827* (JAUM, MO).

***Stelis navicularis* Garay**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2835 m.  
CAL. No evaluada.  
*St. John 20875* (HT: St John Herbarium; IT: GH; US).

***Stelis neorubens* Chiron**

*Humboldtia rubens* Kuntze,  
*Pleurothallis amblyopetala* Schltr.,  
*Pleurothallis excisa* C.Schweinf.,  
*Pleurothallis montserratii* Porsch,  
*Pleurothallis rubens* Lindl.,  
*Pleurothallis rubens* var. *latifolia* Cogn.,  
*Pleurothallis rubens* var. *longifolia* Cogn.,  
*Specklinia rubens* (Lindl.) F.Barros  
Luer 1999; Viveros & Higgins 2007; Chiron *et al.* 2012.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1300 m.  
CUN. No evaluada.

Colombia a Bolivia; Brasil.  
*Uribe 4856* (AMES, COL).

***Stelis nitens* Rchb.f.**

Van der Hammen *et al.* 1984; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. SN Santa Marta.  
MAG. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
NOTA: registrada de Colombia, sin indicación de espécimen / recorded from Colombia with no specimen citation.

***Stelis nutans* Lindl.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
QUI. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Rivas 35* (HUQ).

***Stelis oblonga* (Ruiz & Pav.) Willd.**

*Humboldtia oblonga* Ruiz & Pav.,  
*Stelis apiculata* Schltr., *Stelis euspatha* Rchb.f., *Stelis fissa* Lindl., *Stelis floribunda* Kunth, *Stelis insignis* Ames  
Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3950 m.  
ANT, CUN. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; Venezuela.  
*Duque 1728* (JAUM).

***Stelis oligoblephara* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, Guayana y Macarena. 530 m.  
CAQ. No evaluada.  
*Hopp 133* (?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis oxysepala* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2500 m.  
CUN. No evaluada.  
*Schnitter s.n.* (?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis pachypus* F.Lehm. & Kraenzl.**

*Crocodelanthe pachypus* (F.Lehm. & Kraenzl.) Luer, *Pleurothallis quadrata* C.Schweinf.  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2400-2800 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Lehmann 3176* (LT: K).

***Stelis pachystachya* Lindl.**

Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1300-1400 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Purdie s.n.* (K).

***Stelis papilio* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
RIS. No evaluada.  
*Duque 419* (HT: JAUM).

***Stelis papiliopsis* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1366* (HT: JAUM).

***Stelis paraguasensis* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
VAL. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin 7955* (HT: CUVC).

***Stelis pardipes* Rchb.f.**

*Stelis bella* O.Duque  
Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
RIS. No evaluada.  
Centroamérica a Bolivia.  
*Duque 1592* (JAUM).

***Stelis parvilabris* Lindl.**

Dunsterville & Garay 1979;  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800-3000 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela.  
*Hartweg 1411* (HT: F, MO).

***Stelis pastoensis* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 150* (?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis patella* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900-2200 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 196* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo, tomado de cultivo / known

only from the type, taken from cultivation.

***Stelis pendularis* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
RIS. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 2442* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis pendulata* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 2280* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis pennelliana* (Luer)**

**Pridgeon & M.W.Chase**  
*Crocodelanthe pennelliana* (Luer) Luer, *Pleurothallis pennelliana* Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1780-3200 m.  
CUN. No evaluada.  
*Pennell 2043* (HT: US; IT: AMES).

***Stelis petiolaris* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3300 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 48* (?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description

***Stelis pilipapillosa* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 1957* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis pittieri* Knuth**

*Crocodelanthe floribunda* (Poepp. & Endl.) Luer, *Pleurothallis floribunda* Poepp. & Endl.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2780-3200 m.  
ANT, CAU, CUN. No evaluada.  
Costa Rica a Bolivia; Trinidad.  
*Lehmann 3746* (BR).  
NOTA: nombre inédito / unpublished name.

***Stelis platystachya* Garay & Dunst.**

Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT, NSA. No evaluada.  
Colombia a NO Venezuela; SE Ecuador.  
*Foster 1774* (IT: AMES, COL).

***Stelis polybotrya* Lindl.**

*Stelis gonzaleziana* C.Schweinf. Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
NAR. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis popayanensis* F.Lehm. & Kraenzl.**

Garay 1979; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-3000 m.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann 6817* (IT: AMES).

***Stelis pseudocheila* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis pseudocheila* Luer & R.Escobar, *Specklinia pseudocheila* (Luer & R.Escobar) Luer  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1100 m.  
CAU. No evaluada.  
*Luer 8186* (HT: SEL).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis pulchella* Kunth**

*Crocodelanthe pulchella* (Kunth) Luer, *Humboldtia naraniensis* (Rchb.f.) Kuntze, *Humboldtia pulchella* Kuntze, *Humboldtia sphenochila* Kuntze, *Pleurothallis bogotensis* Schltr., *Pleurothallis ecuadorensis* Schltr., *Pleurothallis lloensis* Schltr., *Pleurothallis naraniensis* Rchb.f., *Pleurothallis pteroglossa* Schltr., *Pleurothallis pulchella* (Kunth) Lindl., *Pleurothallis sphenochila* Lindl., *Pleurothallis tepuiensis* Carnevali & I.Ramírez  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3480 m.  
ANT, CUN, NAR, RIS, SAN, TOL. No evaluada.  
Costa Rica a Perú; S Venezuela.  
*André 3612* (K).

***Stelis punctulata* (Rchb.f.)**

**Soto Arenas**  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Colombia.  
NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis purdiaei* Lindl.**

Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900-2500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú; NO Venezuela.  
*Purdie s.n.* (K?).  
NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis purpurea* (Ruiz & Pav.) Willd.**

*Pleurothallis macrorhiza* Lindl., *Pleurothallis rhizomatosa* Schltr., *Stelis dentata* O.Duque, *Stelis robustior* Garay, *Xenosia macrorhiza* (Lindl.) Luer, *Xenosia spiralis* (Ruiz & Pav.) Luer Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-3000 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
Costa Rica a Bolivia.  
*Giraldo 1719* (HUA, JAUM).

***Stelis pusilla* Kunth**

*Stelis apiculata* Lindl., *Stelis callicentrum* Schltr., *Stelis calothea* Schltr., *Stelis citriona* Schltr., *Stelis elegantula* Schltr., *Stelis graminea* Lindl., *Stelis herbiola* Lindl., *Stelis lloensis*

Schltr., *Stelis microphylla* Lindl., *Stelis minuta* C.Schweinf., *Stelis myriantha* Lindl., *Stelis polyclada* Lindl., *Stelis scandens* Schltr., *Stelis tenuis* Schltr.

Dunsterville & Garay 1979; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2900 m.

QUI. No evaluada.

Colombia a Bolivia y Brasil, Venezuela; La Española.

López 91 (HUQ).

***Stelis pyramidalis* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2300 m.

ANT. No evaluada.

Duque 666 (HT: JAUM).

***Stelis quadrifida* (Lex.)**

**Solano & Soto Arenas**

*Dendrobium quadrifidum* Lex.

Carnevali *et al.* 2010 (como *Loddigesia quadrifida*); Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

México a N Venezuela; Antillas Mayores.

NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron

especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis quinquenervia***

**C.Schweinf.**

Dodson 1992; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia?

NOTA: señalada de Colombia, pero no se examinaron

especímenes / recorded from Colombia but no specimens were seen for this work.

***Stelis reptans* Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe scansor* (Luer)

Luer, *Pleurothallis scansor* Luer, *Stelis scansor* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase

Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2950-3200 m.

CAU, NAR. No evaluada.

O Colombia a Ecuador.

*Cuatrecasas 19264* (AMES).

***Stelis restrepioides* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

*Elongatia restrepioides* (Lindl.)

Luer, *Pleurothallis restrepioides* Lindl.

Luer 1994; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

NAR. No evaluada.

SO Colombia a N Perú.

*Escobar 5020* (MO).

***Stelis retroversa* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2100-2300 m.

ANT. No evaluada.

Duque 1308 (HT: JAUM).

***Stelis rhamphosa* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1800 m.

VAL. No evaluada.

Cordillera Occidental.

*Gonzaga s.n.* (HT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Stelis rhodotantha* (Rchb.f.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe rhodotantha* (Rchb.f.) Luer, *Humboldtia rhodotantha* Kuntze, *Pleurothallis potamophila* Schltr., *Pleurothallis procera* Luer & R.Vásquez

Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1000-2740 m.

NAR, SAN. No evaluada.

O Suramérica.

*Schlim 1442* (HT: W).

***Stelis rhomboidea* Garay**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2600-2840 m.

CUN. No evaluada.

*Cuatrecasas 9465* (HT: US).

***Stelis rictoria* (Rchb.f.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe rictoria* (Rchb.f.)

Luer, *Pleurothallis rictoria* Rchb.f. Luer 1998a; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1500 m.

ANT. No evaluada.

*Von Warszewicz s.n.* (HT: W).

***Stelis rictus* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 20 m.

CHO. No evaluada.

*Duque 2468* (HT: JAUM).

***Stelis ringens* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3000 m.

NAR. No evaluada.

*Hopp 49* (?).

NOTA: solo se conoce de la descripción original /

known only from the original description.

***Stelis rodrigoii* (Luer)  
Pridgeon & M.W.Chase**

*Condylago rodrigoii* Luer  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400-1600 m.  
ANT. No evaluada.  
*Luer 1952* (HT: SEL; IT: JAUM).

***Stelis roseopunctata* (Lindl.)  
R.Bernal**

*Crocodelanthe elegans* (Kunth)  
Luer, *Humboldtia elegans*  
(Kunth) Kuntze, *Humboldtia*  
*roseopunctata* (Lindl.)  
Kuntze, *Pleurothallis elegans*  
(Kunth) Lindl., *Pleurothallis*  
*roseopunctata* Lindl., *Specklinia*  
*elegans* (Kunth) Lindl.  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1830-3250 m.  
CAU, MAG, NAR, PUT, RIS. No  
evaluada.  
NO Venezuela a Ecuador.  
*Wolf 886* (COL, MO).

***Stelis rubens* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 400 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
México a Colombia.  
*Duque 1842* (JAUM).

***Stelis ruris* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 2455* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stelis salomonica* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Pacífico.  
CHO. No evaluada.  
*Murillo s.n.* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stelis salpingantha* (Luer  
& Hirtz) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Pleurothallis salpingantha* Luer  
& Hirtz  
Luer 1998 (como *P.*  
*salpingantha*); Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600 m.  
NSA, QUI, SAN. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
NOTA: no se encontraron  
especímenes / no specimens were  
found.

***Stelis sanguinea* Garay**

Garay 1979; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3135 m.  
CAL. No evaluada.  
*St. John 20878* (HT: US).

***Stelis santiagoensis* Mansf.**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. V Magdalena. 517-700  
m.  
ANT, SAN. No evaluada.  
Colombia a Perú; Venezuela,  
Guayanas.  
*Duque 1148* (JAUM).

***Stelis scansor* Rchb.f.**

*Stelis prorepens* Schltr., *Stelis*  
 *trianae* Schltr., *Stelis vegans*  
Ames  
Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
NAR. No evaluada.  
SO Colombia a Ecuador.  
*Jameson 448* (IT: G, BOIS).

***Stelis scaphoides* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007; Duque  
2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1814* (HT: JAUM).

***Stelis schlechteriana* Garay**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2900 m.  
NAR. No evaluada.  
*Hopp 140* (?).  
NOTA: solo se conoce de  
la descripción original /  
known only from the original  
description.

***Stelis schmidtchenii* Schltr.**

Dunsterville & Garay 1979;  
Viveros & Higgins 2007; Duque  
2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
ANT. No evaluada.  
*Schmidtchen s.n.* (?).  
NOTA: tipo de Colombia, no  
localizado (pos. en M; Duque  
2008); solo se conoce de la  
descripción original / type from  
Colombia, not located (poss. at  
M; Duque 2008); known only  
from the original description.

***Stelis schnitteri* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Duque  
2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1550 m.  
CUN. No evaluada.  
*Schnitter s.n.* (?).  
NOTA: solo se conoce de  
la descripción original /

known only from the original description.

***Stelis schomburgkii* Fawc. & Rendle**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2300 m.  
QUI. No evaluada.  
Guyana a Ecuador.  
*Viveros 147* (HUQ).

***Stelis scutella* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2100 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
*Duque 1631* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stelis silverstonei* Luer**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1950 m.  
CHO. No evaluada.  
*Silverstone-Sopkin 4147* (HT:  
CUVC).

***Stelis spathosa* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe spathosa* (Luer & R.Escobar) Luer, *Pleurothallis spathosa* Luer & R.Escobar Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3300 m.  
SAN. No evaluada.  
NE Colombia.  
*Luer 10175* (HT: MO).

***Stelis spathulata* Poepp. & Endl.**

Dunsterville & Garay 1979;  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1720 m.

ANT, NAR, QUI. No evaluada.  
Costa Rica a Perú; NO y N  
Venezuela.  
*Viveros 785* (HUQ).

***Stelis stapedia* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 1376* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stelis striolata* Lindl.**

*Stelis exilipes* Schltr., *Stelis gracilispica* C.Schweinf., *Stelis macropoda* Schltr.  
Dunsterville & Garay 1979;  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1499 m.  
QUI. No evaluada.  
Colombia a Perú; NO Venezuela.  
*Rivas 26* (HUQ).

***Stelis sulcata* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
QUI. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Duque 2448* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stelis superbiens* Lindl.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3050 m.  
ANT. No evaluada.  
México a Perú y Venezuela.  
*Correa 379* (HUA, JAUM).

***Stelis tarantula* (Luer & Hirtz) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis tarantula* Luer & Hirtz, *Specklinia tarantula* (Luer & Hirtz) Luer Luer 2000b; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Luer 14212* (MO).

***Stelis taurina* O.Duque**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. V Cauca. 800 m.  
ANT. No evaluada.  
*Duque 161* (HT: JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stelis tenuilabris* Lindl.**

*Stelis alata* Lindl.  
Duque 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800-2900 m.  
CUN, HUI. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Lozano 4141* (COL).

***Stelis tenuipetala* Garay**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2700 m.  
ANT, CAU. No evaluada.  
*Von Sneidern 1097* (HT: S).

***Stelis tortilis* (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis tortilis* Luer & R.Escobar, *Specklinia tortilis* (Luer & R.Escobar) Luer Luer 2004; Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3070 m.  
CAU. No evaluada.  
O Colombia a N Ecuador.  
*Luer 3021* (HT: SEL).

***Stelis transversalis* Ames**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Guatemala a Ecuador.  
NOTA: esperada por su  
distribución; aún no se han  
encontrado especímenes /  
expected by distribution, has not  
yet found specimens.

***Stelis trichorrhachis* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1290-2600 m.  
CUN, SAN. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Lozano 2460* (COL).

***Stelis tridactylon* Luer**

*Stelis stella* O.Duque  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-1960 m.  
VAL. No evaluada.  
O Colombia a Ecuador.  
*Duque 1143* (HT: JAUM).

***Stelis tridentata* Lindl.**

*Stelis elliptica* Ames &  
C.Schweinf., *Stelis leptophylla*  
Schltr.  
Dunsterville & Garay 1979;  
Viveros & Higgins 2007; Idárraga  
*et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Costa Rica a E Ecuador;  
Venezuela.  
*Duque 1489* (JAUM).

***Stelis trilobata* O.Duque**

Duque 2011; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Villegas s.n.* (JAUM).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stelis trimera* Luer**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
BOY, SAN. No evaluada.  
*García-Barriga s.n.* (HT: US; IT:  
COL).

***Stelis tunguraguae* (F.Lehm.  
& Kraenzl.) Pridgeon &  
M.W.Chase**

*Crocodelanthe tunguraguae*  
(F.Lehm. & Kraenzl.) Luer,  
*Pleurothallis tunguraguae*  
F.Lehm. & Kraenzl.  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2200 m.  
BOY, PUT, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Escobar 8299* (MO).

***Stelis umbelliformis*  
Hespenh. & Dressler**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 240 m.  
NAR. No evaluada.  
Panamá a O Colombia.  
*Benavides 4284* (HT: PSO; IT:  
MO).  
*Stelis umbelliformis* subsp.  
*brevipedunculata* Carnevali &  
I.Ramírez

***Stelis umbriae* Schltr.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600 m.  
CUN. No evaluada.  
*Hernández 739* (COL).

***Stelis velaticaulis* (Rchb.f.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Crocodelanthe velaticaulis*  
(Rchb.f.) Luer, *Humboldtia*  
*crassipes* Kuntze, *Humboldtia*  
*trilineata* Kuntze, *Humboldtia*  
*velaticaulis* Kuntze, *Humboldtia*  
*velatipes* Kuntze, *Pleurothallis*  
*crassipes* Lindl., *Pleurothallis*  
*pichincae* Rchb.f., *Pleurothallis*  
*trilineata* Lindl., *Pleurothallis*  
*velatipes* Rchb.f.  
Luer 1998a; Luer 2004; Viveros &  
Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1500-3000 m.  
ANT, CAL, CAU, CUN, MAG.  
No evaluada.  
Costa Rica a O Suramérica;  
Trinidad.  
*Lozano 3495* (NY).

***Stelis velutina* Lindl.**

*Stelis hians* Schltr.  
Garay 1979; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Ecuador.  
*Duque 1277* (JAUM).

***Stelis verecunda* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Idárraga  
*et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 800-2500 m.  
ANT, CUN. No evaluada.  
*Duque 1802* (JAUM).

**[*Stelis villosa* (Knowles & Westc.) Pridgeon & M.W.Chase]**

Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en identificación errónea; se distribuye solo de México a Costa Rica / record based on a misidentification; is distributed only to Mexico to Costa Rica.

***Stelis violacea* Garay**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2400 m.

CAU. No evaluada.

Colombia a NO Venezuela.

*Von Sneider* 1096 (HT: S; IT: AMES).

***Stelis virgulata* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 3000 m.

NAR. No evaluada.

*Hopp* 44 (?).

NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis vulcani* Rchb.f.**

Dunsterville & Garay 1979;

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1840 m.

QUI. No evaluada.

Colombia a Perú; NO Venezuela.

*Viveros* 793 (HUQ).

***Stelis wagneri* (Schltr.)**

**Pridgeon & M.W.Chase**

*Pleurothallis aguilarii* Ames,

*Pleurothallis falcatiloba* Ames,

*Pleurothallis wagneri* Schltr.,

*Unciferia wagneri* (Schltr.) Luer

Luer 1998b; Luer 2004; Viveros

& Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada. Costa Rica a Ecuador.

NOTA: el registro en Colombia es una fotografía de la planta, cultivada en Colomborquídeas, sin datos de localidad o elevación / Colombian record is a photograph of a plant grown at Colomborquídeas without locality or elevation data.

***Stelis walteri* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007; Duque 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2900 m.

NAR. No evaluada.

*Hopp* 170 (?).

NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stelis wercklei* Schltr.**

Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1400 m.

ANT. No evaluada.

Colombia, Costa Rica.

*Duque* 1791 (JAUM).

***Stelis weneri* Schltr.**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 530 m.

CAQ, PUT. No evaluada.

*Hopp* 158 (?).

NOTA: solo se conoce de la descripción original / known only from the original description.

***Stenia* Lindl.**

2 especies, 1 especie endémica

***Stenia pallida* Lindl.**

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes. 100-2000 m.

PUT. No evaluada.

Colombia a Perú, Venezuela, Brasil.

*Garay* 882 (AMES).

***Stenia uribei* P.Ortiz**

Harding 2008.

Hierba, epífita.

Endémica. Pacífico. 0-500 m.

NAR. No evaluada.

Colombia.

*Ortiz* 1142 (HT: HPUJ).

***Stenoptera* C.Presl**

1 especie

***Stenoptera peruviana* C.Presl**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Perú.

NOTA: sin especímenes registrados para Colombia / no specimens recorded for Colombia.

***Stenorrhynchos* Spreng.**

4 especies

***Stenorrhynchos***

***albidomaculatum***

**Christenson**

Christenson 2005; Dueñas & Fernández 2009.

Hierba, parásita.

Nativa. Andes. 1990-3300 m.

BOY, CUN, SAN. No evaluada.

Guatemala a Venezuela.

*Killip* 18776 (HT: NY).

***Stenorrhynchos speciosum***

**(Jacq.) Rich.**

*Ibidium speciosum* (Jacq.) Salisb.,

*Neottia speciosa* Jacq., *Serapias*

*speciosa* (Jacq.) J.F.Gmel.,  
*Spiranthes speciosa* (Jacq.)  
A.Rich., *Stenorrhynchos millei*  
Schltr.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1450-3900 m.  
ANT, BOY, CAL, CUN, GUJ,  
HUI, NAR, NSA, VAL. No  
evaluada.  
México a Perú y Paraguay.  
*Llanos 3168* (COL, SURCO).

***Stenorrhynchos vaginatum*  
(Kunth) Spreng.**

*Gyrostachys vaginata* (Kunth)  
Kuntze, *Neottia vaginata* Kunth,  
*Spiranthes vaginata* (Kunth)  
B.D.Jacks.  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
2560-3800 m.  
ARA, BOY, CES, CUN, GUJ,  
MAG, NSA, SAN. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Fernández-Alonso 25580* (COL).

***Stenorrhynchos* sp. 1**

Dueñas 2002; Dueñas &  
Fernández 2009.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
950-1800 m.  
CES, GUJ, MAG, NSA. No  
evaluada.  
*Osorio 144* (COL).

***Stephanothelys* Garay**

2 especies, 1 especie endémica

***Stephanothelys colombiana***

**Garay**  
*Aspidogyne colombiana* (Garay)  
Ormerod  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.

Hierba.  
Endémica. Andes. 1000 m.  
CAU. No evaluada.  
*Von Sneidern 743* (HT: S; IT:  
AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Stephanothelys*  
*xystophylloides* (Garay)**

**Garay**  
*Aspidogyne xystophylloides*  
(Garay) Ormerod, *Erythrodes*  
*xystophylloides* Garay  
Ortiz 1995; Dueñas 2002;  
Dueñas & Fernández 2007.  
Hierba.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1600-2300 m.  
CAU, CUN, MAG, RIS. No  
evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Kirkbride 2325* (COL).

***Sudamerlycaste* Archila**

18 especies, 1 especie endémica

***Sudamerlycaste andreettae*  
(Dodson) Archila**

*Ida andreettae* (Dodson)  
Oakeley, *Lycaste andreettae*  
Dodson  
Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 800-1100 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Oakeley H11* (K-HFO, T de la  
var. *pallida*).  
*Sudamerlycaste andreettae* var.  
*andreettae*, *Sudamerlycaste*  
*andreettae* var. *pallida* (Oakeley)  
Archila

***Sudamerlycaste castanea*  
(Oakeley) Archila**

*Ida castanea* Oakeley  
Oakeley 2008.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1400 m.  
PUT. No evaluada.  
S Colombia a Perú.  
NOTA: señalada de Colombia por  
Oakeley (2008), sin indicación de  
especimen / recorded by Oakeley  
from Colombia (2008), with no  
indication of specimen.

***Sudamerlycaste ciliata* (Ruiz  
& Pav.) Archila**

*Ida fragrans* (Oakeley) Oakeley,  
*Lycaste fragrans* Oakeley,  
*Maxillaria ciliata* Ruiz & Pav.,  
*Sudamerlycaste fragrans* (Oakeley)  
Archila  
Oakeley 2008 (como *S. fragrans*).  
Hierba.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.

***Sudamerlycaste cinnabarina*  
(J.C.Stevens) Archila**

*Ida cinnabarina* (J.C.Stevens)  
A.Ryan & Oakeley, *Maxillaria*  
*cinnabarina* J.C.Stevens  
Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1900-2600 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia?, Ecuador, Perú.

***Sudamerlycaste cobbiana*  
(B.S.Williams) Archila**

*Ida cobbiana* (B.S.Williams)  
A.Ryan & Oakeley, *Lycaste*  
*cobbiana* B.S.Williams  
Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2500-2900 m.  
ANT, CAL. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Lehmann s.n.* (K).

***Sudamerlycaste fimbriata*  
(Poepp. & Endl.) Archila**

*Ida fimbriata* (Poepp. & Endl.)  
A. Ryan & Oakeley, *Maxillaria*  
*fimbriata* Poepp. & Endl.

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa. Andes. 1000-2800 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

NOTA: señalada de Colombia por Oakeley (2008), sin indicación de espécimen / recorded by Oakeley from Colombia (2008), with no indication of specimen.

***Sudamerlycaste fulvescens*  
(Hook.) Archila**

*Ida fulvescens* (Hook.) A. Ryan &  
Oakeley, *Lycaste fulvescens* Hook.

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa. Andes. 1700-2000 m.

BOY, CUN, NSA, SAN. No evaluada.

Colombia, Venezuela.

Escobar [1991] 2:t. 288.

***Sudamerlycaste gigantea*  
(Lindl.) Archila**

*Ida gigantea* (Lindl.) A. Ryan &  
Oakeley, *Lycaste gigantea* Lindl.

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa. Andes, SN Santa Marta?

DESCONOCIDO. No evaluada.

NOTA: señalada de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la cordillera Oriental, por el sur, hasta Bogotá; no hay especímenes que permitan confirmar estos registros / recorded from the Sierra Nevada de Santa Marta and the Eastern Cordillera south to Bogota, but no specimens are available to confirm these records.

***Sudamerlycaste grandis*  
Archila**

*Ida grandis* Oakeley, *Ida grandis*  
var. *alba* Oakeley, *Lycaste grandis*

Oakeley

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa. Andes. 2000-2800 m.

CUN. No evaluada.

Venezuela a Perú.

Escobar [1998] 6: 866 fig. B.

***Sudamerlycaste heynderycxii*  
(E. Morren) Archila**

*Ida heynderycxii* (E. Morren)  
A. Ryan & Oakeley, *Maxillaria*  
*heynderycxii* E. Morren

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa. Andes. 1900-2100 m.

PUT, QUI. No evaluada.

Venezuela a Perú.

***Sudamerlycaste hirtzii*  
(Dodson) Archila**

*Ida hirtzii* (Dodson) A. Ryan  
& Oakeley, *Lycaste colombiana*  
Ospina, *Lycaste hirtzii* Dodson

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa. Andes. 2200-2600 m.

CUN. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

*Ospina 1165* (COL, T de *Lycaste colombiana*).

***Sudamerlycaste jamesiorum*  
(Oakeley) Archila**

*Ida jamesiorum* Oakeley

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa. Andes. 1400-2400 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia?, Ecuador?, Perú.

NOTA: presencia en Colombia y Ecuador es incierta / presence in Colombia and Ecuador is uncertain.

***Sudamerlycaste jimenezii*  
(Oakeley) Archila**

*Ida jimenezii* Oakeley

Oakeley 2008.

Hierba.

Endémica. Andes. 1600-2000 m.

VAL. No evaluada.

Oakeley J61/62 (HT: K-HFO).

***Sudamerlycaste laciniata*  
(Oakeley) Archila**

*Ida laciniata* Oakeley

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa. Andes. 1600 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia, Ecuador.

NOTA: ilustrada de Colombia en Warner & Williams Orchid Album (1889) 8: t. 384. No se conoce ninguna localidad precisa. La elevación indicada es de Ecuador / illustrated from Colombia in Warner Williams & Orchid Album (1889) 8: t. 384; no precise locality is known; elevation range is from Ecuador.

***Sudamerlycaste lionetii*  
(Oakeley) Archila**

*Ida lionetii* Oakeley, *Lycaste*  
*gigantea* var. *lionetii* Cogn. &  
Goossens

Oakeley 2008.

Hierba.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Oakeley 975 (K-HFO).

NOTA: se desconoce el país de origen; no obstante, plantas en cultivo en Medellín permiten inferir que podría ser de Colombia / country of origin unknown but plants growing in Medellín suggest Colombia.

***Sudamerlycaste reichenbachii*  
(Rchb.f.) Archila**

*Ida reichenbachii* (Rchb.f.)

A. Ryan & Oakeley, *Lycaste*  
*reichenbachii* Rchb.f.

Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
CAU, QUI. No evaluada.  
Colombia, Perú.  
*Triana 575* (BM).

***Sudamerlycaste rikii*  
(Oakeley) Archila**

*Ida rikii* Oakeley  
Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Ecuador?  
*Oakeley 179, 80* (HT: K-HFO).  
NOTA: descrita de plantas  
en cultivo, provenientes de  
Colombia, sin datos de localidad  
/ described from cultivated  
plants originating in Colombia,  
without locality data.

***Sudamerlycaste uribei*  
(Oakeley) Archila**

*Ida uribei* Oakeley  
Oakeley 2008.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 1280 m.  
NAR. No evaluada.  
S Colombia, Perú?  
*Oakeley Col13* (HT: K-HFO).  
NOTA: descrita de una planta  
cultivada en Cali, prob. traída  
de Perú. Hallada silvestre en S  
Nariño / described from a plant  
grown in Cali, prob. brought  
from Peru; found wild in S  
Nariño.

***Systemoglossum* Schltr.**

1 especie

***Systemoglossum ecuadorensis*  
(Garay) Dressler &  
N.H. Williams**

*Diadenium ecuadorensis* Garay  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1800-2500 m.  
RIS. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 690* (HPUJ).

***Teagueia* Luer & Hirtz**

3 especies, 3 especies endémicas

***Teagueia lehmannii* Luer**

Viveros & Higgins 2007;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica.  
CAU. No evaluada.  
*Lehmann s.n.* (HT: K).  
NOTA: conocida solo del tipo,  
sin datos de localidad precisa o  
elevación / known only from the  
type, without precise locality or  
elevation data.

***Teagueia phasmida* (Luer  
& R.Escobar) O.Gruss &  
M.Wolff**

*Platystele phasmida* Luer &  
R.Escobar  
Luer 1990; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2430 m.  
ANT. No evaluada.  
*Escobar 3404* (HT: JAUM; IT:  
MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Teagueia rex* (Luer &  
R.Escobar) O.Gruss &  
M.Wolff**

*Platystele rex* Luer & R.Escobar,  
*Teagueia rex* (Luer & R.Escobar)  
Luer  
Luer 1990; Viveros & Higgins  
2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
PUT. No evaluada.  
*Luer 3133* (HT: SEL; IT: JAUM).

***Telipogon* Kunth**

56 especies, 37 especies  
endémicas

***Telipogon albertii* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700-2100 m.  
CUN, NSA. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 87* (HPUJ).

***Telipogon alticola* (Dodson &  
R.Escobar) N.H. Williams &  
Dressler**

*Stellilabium alticola* Dodson &  
R.Escobar  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2800 m.  
CUN, SAN, VAL. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Schneider 401/1* (COL).

***Telipogon alvarezii* P.Ortiz**

Ortiz 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1287* (HT: HPUJ).

***Telipogon andicola* Rchb.f.**

Escobar, R. 1990-1998; Ortiz  
1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3000-3500 m.  
CAU. No evaluada.  
Venezuela a Perú.

***Telipogon antioquianus*  
Rchb.f.**

*Telipogon andinus* Dodson  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2126-3000 m.  
ANT, CAL, CUN, NSA. No  
evaluada.

Venezuela a Perú.  
*Alvear 309* (COL).

***Telipogon berthae* P.Ortiz**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-2620 m.  
CUN, SAN. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1058* (HT: HPUJ).

***Telipogon bowmanii* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3200 m.  
CUN, SAN. No evaluada.  
Colombia, Perú, Bolivia.  
*Sarmiento s.n.* (COL).

***Telipogon caucanus* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000-3600 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Lehmann 6030* (HT: K).

***Telipogon chrysocrates*  
Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2550 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Roezl s.n.* (HT: W, destruido?).

***Telipogon cristinae* P.Ortiz**

Ortiz, P. 2011c.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3400 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1353* (HT: HPUJ).

***Telipogon dubius* Rchb.f.**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600 m.

ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Wallis s.n.* (HT: W, destruido?).

***Telipogon eberhardtii* Braas**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia.  
*Braas 41* (herb. pers.).

***Telipogon esperanzae* P.Ortiz**

Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
QUI. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Ortiz 1313* (HT: HPUJ).

***Telipogon felinus* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. SN Santa Marta. 2800 m.  
MAG. No evaluada.  
Colombia.  
*Romero-Castañeda 4591* (COL).

***Telipogon gracilis* Schltr.**

Escobar, R. 1990-1998; Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.

***Telipogon hastatus* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia.  
*Bruchmüller s.n.* (HT: W, destruido?).

***Telipogon hausmannianus*  
Rchb.f.**

*Telipogon croesus* Rchb.f.  
Ortiz 1995.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2900-2950 m.  
BOY, PUT, QUI. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Ortiz 598* (HPUJ).

***Telipogon hemimelas* Rchb.f.**

*Telipogon gustavi* Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3300 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Kalbreyer 17216* (HT: W, destruido).

***Telipogon hercules* Kraenzl.**

Kränzlin 1920a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2800 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Lehmann s.n.* (W).

***Telipogon kalbreyerianus*  
Kraenzl.**

Kränzlin 1920a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Kalbreyer 1721c* (HT: W, destruido?).

***Telipogon klotzscheanus*  
Rchb.f.**

Kränzlin 1920a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 1800-2400 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia?, Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Telipogon lagunae* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800 m.  
NAR. No evaluada.

Colombia.  
*Hopp 204* (HT: B destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Telipogon lankesteri* Ames**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Costa Rica.  
NOTA: señalada de Colombia  
por Govaerts *et al.* (2012),  
sin indicación de espécimen  
/ recorded from Colombia by  
Govaerts *et al.* (2012) without  
indication of specimen.

***Telipogon latifolius* Kunth**

*Telipogon bruchmuelleri* Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2800 m.  
ANT, BOY, CAU, CUN, HUI,  
VAL. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Ortiz 787* (HPUJ).

***Telipogon lehmannii* Schltr.**

Ortiz 1995; Ortiz & Uribe 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3300 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia a Perú.

***Telipogon mariae* P.Ortiz**

Ortiz, P. 2011c.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1378* (HT: HPUJ).

***Telipogon microglossus*  
(Schltr.) N.H. Williams &  
Dressler**

*Stellilabium microglossum*  
(Schltr.) Dodson  
Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2700-2800 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Ortiz 1270* (HPUJ).

***Telipogon morganiae*  
(Dodson) N.H. Williams &  
Dressler**

*Stellilabium morganiae* Dodson  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
S Colombia a Ecuador.  
NOTA: señalada de Colombia  
por Govaerts *et al.* (2012),  
sin indicación de espécimen  
/ recorded from Colombia by  
Govaerts *et al.* (2012) without  
indication of specimen.

***Telipogon musaicus* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Roezl s.n.* (HT: W, destruido).

***Telipogon nervosus* (L.)  
Druce**

*Telipogon angustifolius* Kunth,  
*Telipogon auritus* Rchb.f.,  
*Telipogon hoppii* Schltr.,  
*Telipogon ochraceus* Garay,  
*Telipogon pachensis* Rchb.f.,  
*Tradescantia nervosa* L.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2200-3300 m.  
BOY, CUN, SAN. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Sarmiento 1159* (COL).

***Telipogon nigropurpureus*  
P.Ortiz**

*Stellilabium atropurpureum*  
P.Ortiz, *Telipogon ortizii*  
N.H. Williams & Dressler

Ortiz 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2330 m.  
BOY. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1133* (HT: HPUJ).

***Telipogon nitens* Rchb.f.**

Kränzlin 1920a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1400 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Roezl s.n.* (HT: W, destruido?).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Telipogon octavioi* Dodson &  
R.Escobar**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3150 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 17018* (HT: RPSC).

***Telipogon ortizii* Dodson &  
R.Escobar**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2900-3000 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1288* (HPUJ).

***Telipogon ospinae* Dodson &  
R.Escobar**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2550 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Ospina 231* (HT: JAUM).

***Telipogon pamplonensis*  
Rchb.f.**

*Telipogon steyermarkii* Foldats  
Ortiz 1995.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2550 m.  
SAN. No evaluada.  
ME Colombia y O Venezuela.  
*Schlim 127* (HT: W, destruido?).

***Telipogon pastoanus* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Lehmann 6875* (HT: B destruido).

***Telipogon patinii* Rchb.f.**

*Telipogon suffusus* Kraenzl.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Lehmann s.n.* (K).

***Telipogon polymerus* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700-1900 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 618* (HPUJ).  
NOTA: a veces erróneamente citada como una especie diferente, bajo el nombre *T. polyneuros*; se trata de un error ortográfico de Kränzlin / sometimes erroneously cited as a distinct species under the name *T. polyneuros*, which was actually a misspelling by Kränzlin.

***Telipogon povedanus* P.Ortiz**

Ortiz, P. 2011c.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Ortiz 1355* (HT: HPUJ).

***Telipogon pulcher* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1780-2700 m.  
CAU, NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Cuatrecasas 19506* (MO).

***Telipogon putumayensis* Dodson & R.Escobar**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2200 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 3756* (HT: RPSC).

***Telipogon roezlii* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. SN Santa Marta.  
MAG. No evaluada.  
Colombia.  
*Roezl s.n.* (HT: W, destruido?).

***Telipogon roseus* Garay**

Garay 1956.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2050 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Grant 9743* (IT: US).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Telipogon schmidtchenii* Kraenzl.**

Kränzlin 1920a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Schmidtchen s.n.* (HT: W).

***Telipogon semipictus* Kraenzl.**

*Telipogon cycloglossus* Schltr.  
Ortiz 1995.

Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2600 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Karsten s.n.* (HT: W, destruido?).

***Telipogon tabanensis* Dodson & R.Escobar**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2800-3250 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 3734* (HT: RPSC).

***Telipogon uribei* P.Ortiz**

Ortiz, P. 2011c.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3400 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1352* (HT: HPUJ).

***Telipogon valenciae* Dodson & R.Escobar**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2930-3200 m.  
QUI. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 4015* (HT: JAUM).

***Telipogon venustus* Schltr.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.

***Telipogon vieirae* Dodson & R.Escobar**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2450 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 3378* (HT: RPSC).

***Telipogon vollesii* Dodson & R.Escobar**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 3300 m.  
NAR. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Escobar 3727* (HT: JAUM).

***Telipogon wallisii* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2600-3300 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Wallis s.n.* (HT: W, destruido, Ortiz foto).

***Telipogon williamsii* P.Ortiz**

*Cordanthera andina*  
L.O.Williams, *Stellilabium andinum* (L.O.Williams) Garay & Dunst.  
Ortiz 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1600 m.  
VAL. No evaluada.  
Venezuela a Ecuador.  
*Díaz 2294* (COL).

***Telipogon yolandae* P.Ortiz**

Ortiz, P. 2011c.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 3000 m.  
CUN. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1354* (HT: HPUJ).

***Telipogon zephyrinus* Rchb.f.**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
NSA. No evaluada.  
Colombia.  
*Bruchmüller s.n.* (HT: W, destruido?).

***Teuscheria* Garay**

4 especies, 1 especie endémica

***Teuscheria cornucopia* Garay**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 900-1500 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), cerca de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), near the border.

***Teuscheria elegans* Garay**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 900-1000 m.  
ANT, NAR. No evaluada.  
*Escobar 308* (HT: AMES).  
NOTA: señalada de Costa Rica por Dodson (ined.), sin indicación de espécimen / recorded from Costa Rica by Dodson (ined.) without specimen.

***Teuscheria pickiana* (Schltr.) Garay**

*Bifrenaria pickiana* Schltr.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 100-1180 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
México a Ecuador.  
*Misas 293* (HPUJ).

***Teuscheria wagneri* (Rchb.f.) Garay**

Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1800 m.  
NAR, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Ecuador y Venezuela.  
*Orejuela s.n.* (PSO).

***Tolumnia* Raf.**

1 especie

***Tolumnia guttata* (L.) Nir**

*Epidendrum guttatum* L.,  
*Oncidium guttatum* (L.) Fawc. & Rendle, *Tolumnia tetrapetala* (Jacq.) Braem  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe. 0-300 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Zona del Caribe.  
*Lobb s.n.* (hb Hooker K).

***Trevoria* F.Lehm.**

4 especies, 3 especies endémicas

***Trevoria chloris* Lehm.**

Garay 1970b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000-1700 m.  
CAU, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Seeger s.n.* (M).

***Trevoria escobariana* Garay**

Garay 1970b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1000 m.  
VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 615* (HT: AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo; aparentemente se trata de *T. lehmannii* / known only from the type; apparently *T. lehmannii*.

***Trevoria glumacea* Garay**

Garay 1970b.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-1500 m.  
NAR. No evaluada.  
Nicaragua a Bolivia.  
*Neudecker s.n.* (M).

***Trevoria lehmannii* Rolfe**

Garay 1970b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
NAR, VAL. No evaluada.  
Colombia.  
*Lehmann s.n.* (K).

***Trichocentrum Poepp. & Endl.***

6 especies, 2 especies endémicas

***Trichocentrum brachyceras* Schltr.**

Pupulin 1995.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
CAU. No evaluada.  
*Madero s.n.* (B, destruido).

***Trichocentrum capistratum* Linden & Rchb.f.**

*Trichocentrum panamense* Rolfe,  
*Trichocentrum pusillum* Pupulin  
Pupulin 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico.  
ANT, BOY. No evaluada.  
Costa Rica a Venezuela.  
*Escobar 487* (AMES).

**[*Trichocentrum cornucopiae* Lindl. & Rchb.f.]**

Ortiz 1995.  
NOTA: registro basado en material de Venezuela; corresponde a *T. fuscum* / record based on Venezuelan material; corresponds to *T. fuscum*.

**[*Trichocentrum leeanum* Rchb.f.]**

Ortiz 1995.  
NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *T. albo-coccineum* / record based on a misidentification; corresponds to *T. albo-coccineum*.

***Trichocentrum longicalcaratum* Rolfe**

*Trichocentrum brandtiae* Kraenzl., *Trichocentrum verruciferum* Schltr.  
Pupulin 1995; Pupulin 1998.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes.  
CAU, RIS. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Lehmann 3330* (AMES).

**[*Trichocentrum orthoplectron* Rchb.f.]**

Ortiz 1995.  
NOTA: registro basado en identificación errónea; corresponde a *T. albo-coccineum* / record based on a misidentification; corresponds to *T. albo-coccineum*.

***Trichocentrum pulchrum* Poepp. & Endl.**

*Orchis punctata* Pupulin,  
*Trichocentrum maculatum* Lindl., *Trichocentrum speciosum* Pupulin  
Pupulin 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
CUN, GUJ, NSA. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Linden 1666* (K, BR, P, W).

***Trichocentrum undulatum* (Sw.) Ackerman & M.W.Chase**

*Epidendrum undulatum* Sw.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Caribe a N Suramérica.  
NOTA: esperada por distribución; no hay especímenes registrados para Colombia / expected by distribution. No specimens recorded for Colombia.

***Trichocentrum viridulum***

**Pupulin**  
Pupulin 1998.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
SAN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Pupulin 388* (HT: SEL, IT: MO).

***Trichoceros Kunth***

3 especies, 1 especie endémica

***Trichoceros antennifer* (Humb. & Bonpl.) Kunth**

*Epidendrum antenniferum* Bonpl., *Trichoceros parviflorus* Kunth  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-3000 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Humboldt s.n.* (P).

***Trichoceros cristinae* P.Ortiz & C.Uribe**

Ortiz 2009b.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000-3000 m.  
NSA. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Ortiz 1312* (HT: HPUJ).

***Trichoceros platyceros* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Dodson (manuscrito).  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Perú.  
NOTA: registro dudoso / dubious record.

***Trichopilia Lindl.***

15 especies, 3 especies endémicas

***Trichopilia aenigma* Garay**

Garay 1996; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-1000 m.  
HUI. No evaluada.  
Colombia, Venezuela.  
*Escobar 948* (AMES).

***Trichopilia backhousiana***

**Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2000 m.  
MET. No evaluada.  
*Backhouse s.n.* (HT: K).

***Trichopilia brevis* Rolfe**

*Helcia brevis* (Rolfe) Dodson  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1000-1800 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Escobar 1990-1998: No. 224* (?).  
NOTA: ilustrada en Escobar (1990-1998) como *Helcia brevis* / illustrated in Escobar (1990-1998) as *Helcia brevis*.

***Trichopilia callichroma***

**Rchb.f.**

*Helcia callichroma* (Rchb.f.)  
Dodson, *Neoescobaria callichroma* (Rchb.f.) Garay  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1500-1600 m.  
RIS. No evaluada.  
*Escobar 946* (AMES).

***Trichopilia conceptionis***

**Kraenzl.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-1700 m.  
ANT. No evaluada.  
Cordillera Central.  
*Escobar 706* (AMES).

***Trichopilia fragrans* (Lindl.)**

**Rchb.f.**

*Trichopilia nobilis* (Rchb.f.)  
Rchb.f., *Trichopilia wagneri*  
Rchb.f.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta.  
1150-1800 m.  
ANT, CAU, MAG, NSA? No evaluada.  
Caribe, Venezuela a Bolivia.  
*Jaramillo 2430* (COL).

***Trichopilia hennisiana***

**Kraenzl.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia, Ecuador.  
*Ortiz 856* (HPUJ).

***Trichopilia juninensis***

**C.Schweinf.**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-1800 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Perú.  
*Escobar 156* (AMES).

***Trichopilia laxa* (Lindl.)**

**Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2000 m.  
CAU, CUN, MET. No evaluada.  
Venezuela a Bolivia.  
*Ortiz 173* (HPUJ).

***Trichopilia maculata* Rchb.f.**

Misas-Urreta 2005.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Pacífico. 15-20 m.  
CHO. No evaluada.  
Centroamérica a Colombia.  
*Misas 221* (HPUJ).

***Trichopilia marginata* Henfr.**

Williams & Allen 1980; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 800-1500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Centro América a Colombia.  
NOTA: citada de Colombia por Williams & Allen (1980), sin datos de localidad / recorded from Colombia by Williams & Allen (1980) without locality data.

***Trichopilia rostrata* Rchb.f.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2230 m.  
NAR? No evaluada.  
Colombia?, Ecuador.  
NOTA: esperada; recolectada en Carchi (Ecuador), a menos de 1 km de la frontera / expected; collected in Carchi (Ecuador), less than 1 km from the border.

***Trichopilia suavis* Lindl. & Paxton**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1200 m.  
CHO. No evaluada.  
Costa Rica a NO Colombia.  
NOTA: citada de Colombia por Williams & Allen (1980) / recorded from Colombia by Williams & Allen (1980).

***Trichopilia subulata* (Sw.)**

**Rchb.f.**

*Leucohyle subulata* (Sw.) Schltr.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe, SN Santa Marta.  
70-1000 m.  
MAG. No evaluada.  
Nicaragua a Bolivia.  
*Ortiz 949* (HPUJ).

***Trichopilia turialbae* Rchb.f.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 500-600 m.

CHO. No evaluada.

Nicaragua a Colombia.

*Misas* 236 (HPUJ).***Trichosalpinx* Luer**

35 especies, 15 especies endémicas

***Trichosalpinx acestrochila*****Luer**Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. V Magdalena. 800 m.

ANT. No evaluada.

*Luer* 16908 (HT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Trichosalpinx acremona*****(Luer) Luer***Pleurothallis acremona* Luer

Luer 1997; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1700 m.

ANT. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

*Luer* 14111 (MO).***Trichosalpinx alabastra*****(Luer & R.Escobar) Luer***Pleurothallis alabastra* Luer & R.Escobar

Luer 1997; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2370-2600 m.

ANT, SAN, TOL. No evaluada.

*Luer* 7614 (HT: SEL).***Trichosalpinx amygdalodora* (Kraenzl.) Luer***Pleurothallis amygdalodora*Kraenzl., *Pleurothallis pyxos* Luer & R.Escobar, *Trichosalpinx pyxos* (Luer & R.Escobar) Luer

Luer 1997; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3000-3400 m.

CAU. No evaluada.

S Colombia a N Perú.

*Luer* 3047 (SEL).***Trichosalpinx arbuscula*****(Lindl.) Luer***Humboldtia arbuscula* (Lindl.)Kuntze, *Humboldtia dinotherii*

(Rchb.f. &amp; Warsz.) Kuntze,

*Humboldtia diptera* (Lindl.)Kuntze, *Pleurothallis arbuscula*Lindl., *Pleurothallis dinotherii*Rchb.f. & Warsz., *Pleurothallis**diptera* Lindl., *Pleurothallis lepanthoides* Schltr., *Pleurothallis**moschata* Rchb.f., *Pleurothallis**tricaudata* Schltr., *Trichosalpinx**dinotherii* (Rchb.f. & Warsz.)Luer, *Trichosalpinx moschata* (Rchb.f.) Luer

Luer 1997; Viveros &amp; Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2580-3800 m.

ANT, CAU, CUN. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia.

*Luer* 14150 (MO).***Trichosalpinx ballatrix* Luer & R.Escobar**

Luer 1997; Viveros &amp; Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2380-2500 m.

ANT. No evaluada.

*Luer* 8748 (HT: SEL).***Trichosalpinx berlineri*****(Luer) Luer**

Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Bolivia; NO

Venezuela.

NOTA: esperada; según Viveros & Higgins (2007), no hay colecciones reportadas para Colombia; se encuentra citada dentro del rango de distribución de la especie (Govaerts *et al.* 2013) / expected; according to Viveros & Higgins (2007) no collections recorded from Colombia; within the species' distribution range (Govaerts *et al.* 2013).***Trichosalpinx bricenoensis*****Luer & R.Escobar**Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1850 m.

ANT. No evaluada.

*Luer* 14196 (HT: MO; IT:

JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Trichosalpinx calceolaris*****Luer & R.Escobar**Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700 m.

ANT, CHO. No evaluada.

*Luer* 17634 (HT: MO).***Trichosalpinx caudata* Luer & R.Escobar**

Luer 1997; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 100-1500 m.

ANT, CHO. No evaluada.

Panamá a Colombia.  
*Luer* 16907 (HT: MO).

***Trichosalpinx cedralensis*  
(Ames) Luer**

Dodson 1992; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Guatemala a Bolivia.

NOTA: esperada por distribución.

Sin especímenes registrados para Colombia / expected by distribution. No specimens recorded for Colombia.

***Trichosalpinx chamaelepanthes* (Rchb.f.) Luer**

*Humboldtia chamaelepanthes* (Rchb.f.) Kuntze, *Lepanthes corazonis* Schltr., *Pleurothallis chamaelepanthes* Rchb.f., *Pleurothallis microcharis* Schltr.

*Luer* 1997; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1850-3600 m.

ANT, CAL, CAU, CUN, NAR, PUT, SAN, VAL. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Dodson* 15295 (MO).

***Trichosalpinx decorata* Luer & R.Escobar**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2100 m.

CHO, VAL. No evaluada.

*Luer* 16738 (HT: MO).

***Trichosalpinx dependens* (Luer) Luer**

*Pleurothallis dependens* Luer, *Pleurothallis flexibilis* Luer & R.Vásquez, *Trichosalpinx flexibilis* (Luer & R.Vásquez) Luer

*Luer* 1997; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1500-2100 m.

ANT, CAU, CHO, SAN. No

evaluada.

Colombia a Bolivia; Venezuela y Guayana Francesa.

*Lehmann* 7055 (AMES, K).

***Trichosalpinx dura* (Lindl.) Luer**

*Humboldtia dura* (Lindl.) Kuntze, *Humboldtia foliata* (Griseb.) Kuntze, *Pleurothallis amygdalina* Schltr., *Pleurothallis anomala* Hoehne, *Pleurothallis broadwayi* Ames, *Pleurothallis broadwayi* subsp. *anomala* (Hoehne) Garay, *Pleurothallis corazonica* F.Lehm. & Kraenzl., *Pleurothallis dura* Lindl., *Pleurothallis foliata* Griseb., *Pleurothallis guadalupensis* Cogn., *Pleurothallis lepanthopsis* Schltr., *Pleurothallis williamsii* Ames, *Trichosalpinx foliata* (Griseb.) Luer

*Luer* 1997; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1280-2050 m.

ANT, CHO, NAR, VAL. No evaluada.

México a América tropical.

*Luer* 13194 (MO).

***Trichosalpinx ectopa* Luer**

*Luer* 1997; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1850-2700 m.

ANT, VAL. No evaluada.

*Luer* 14202 (HT: MO).

***Trichosalpinx escobarii* Luer**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2880 m.

CUN. No evaluada.

*Múnera* 607 (HT: JAUM; IT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Trichosalpinx hypocrita* (Garay & Dunst.) Luer**

*Pleurothallis hypocrita* Garay & Dunst.

*Luer* 1997; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 2700-3300 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

NE Colombia, NO Venezuela.

NOTA: esperada por distribución; sin especímenes registrados para Colombia / expected by distribution. No specimens recorded for Colombia.

***Trichosalpinx intricata* (Lindl.) Luer**

*Humboldtia intricata* (Lindl.) Kuntze, *Pleurothallis intricata* Lindl.

*Luer* 1997; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1900-3000 m.

ANT, CAU, CHO, CUN, NSA, SAN, VAL. No evaluada.

Suramérica tropical.

*Silverstone* 1740 (CUVC, MO).

***Trichosalpinx memor* (Rchb.f.) Luer**

*Humboldtia memor* (Rchb.f.) Kuntze, *Pleurothallis brevis* Schltr., *Pleurothallis gnomonifera* Ames, *Pleurothallis memor* Rchb.f., *Pleurothallis minutipetala* Ames & C.Schweinf., *Trichosalpinx greenwoodiana* Soto Arenas, *Trichosalpinx minutipetala* (Ames & C.Schweinf.) Luer, *Trichosalpinx nageliana* Soto Arenas

*Luer* 1997; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
América tropical.  
*Forkel s.n.* (HT: W).  
NOTA: conocida solo del tipo,  
sin datos de localidad específica  
o elevación / known only from  
the type; no specific locality or  
elevation data.

***Trichosalpinx multicuspidata*  
(Rchb.f.) Luer**

*Pleurothallis multicuspidata*  
Rchb.f.  
Luer 1997; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2000-3350 m.  
ANT, BOY, CUN, NAR, TOL.  
No evaluada.  
NO Venezuela a S Ecuador.  
*Wallis s.n.* (HT: W; IT: AMES).

***Trichosalpinx orbicularis*  
(Lindl.) Luer**

*Humboldtia biflora* (H.Focke)  
Kuntze, *Humboldtia orbicularis*  
(Lindl.) Kuntze, *Lepanthes*  
*orbiculata* Rchb.f., *Pleurothallis*  
*biflora* H.Focke, *Pleurothallis*  
*lancifera* Schltr., *Pleurothallis*  
*orbicularis* (Lindl.) Lindl.,  
*Pleurothallis trachythea* F.Lehm.  
& Kraenzl., *Specklinia orbicularis*  
Lindl., *Trichosalpinx oxychilos*  
Carnevali & G.A.Romero  
Luer 1997; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Pacífico.  
200-800 m.  
ANT, CAQ, CHO, PUT, RIS,  
VAL, VAU. No evaluada.  
Costa Rica a Perú y Brasil;  
Trinidad.  
*Arévalo 341* (COL).

***Trichosalpinx pergrata*  
(Ames) Luer**

*Pleurothallis falcipetala* Schltr.,  
*Pleurothallis pergrata* Ames,  
*Trichosalpinx falcipetala* (Schltr.)  
Luer  
Luer 1997; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2100 m.  
ANT, CAU, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a Colombia.  
*Luer 2951* (SEL).

***Trichosalpinx*  
*pseudolepanthes* Luer &  
R.Escobar**

Luer 1997; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1600-2050 m.  
ANT, CAU, CHO. No evaluada.  
*Escobar 2623* (HT: SEL; IT:  
JAUM).

***Trichosalpinx pusilla*  
(Kunth) Luer**

*Dendrobium pusillum* Kunth,  
*Humboldtia pusilla* (Kunth)  
Kuntze, *Pleurothallis pusilla*  
(Kunth) Lindl., *Pleurothallis*  
*roraimensis* Rolfe, *Specklinia*  
*pusilla* (Kunth) Lindl.,  
*Trichosalpinx roraimensis* (Rolfe)  
Luer  
Luer 1997; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-2900 m.  
ANT, CUN, NSA, SAN. No  
evaluada.  
Costa Rica a Perú.  
*Luer 14347* (MO).

***Trichosalpinx quitensis*  
(Rchb.f.) Luer**

*Pleurothallis quitensis* Rchb.f.,  
*Trichosalpinx montana* (Barb.  
Rodr.) Luer

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a Bolivia y Brasil.  
*Ospina 86* (JAUM).  
NOTA: espécimen bajo *T.*  
*montana* / specimen under *T.*  
*montana*.

***Trichosalpinx ramosii* Luer**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1900 m.  
CHO. No evaluada.  
*Ramos 1306* (HT: CUVC; IT:  
MO).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Trichosalpinx robledorum*  
(Luer & R.Escobar) Luer**

Luer 1997; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1800-2200 m.  
ANT, NAR. No evaluada.  
Colombia a N Ecuador.  
*Luer 2293* (HT: SEL; IT: JAUM).

***Trichosalpinx semilunata*  
(Luer) Luer**

*Pleurothallis semilunata* Luer,  
*Trichosalpinx dithele* Luer &  
R.Escobar  
Luer 1997; Viveros & Higgins  
2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1600-2060 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia a SO Ecuador.  
*Luer 8792* (SEL).

***Trichosalpinx silverstonei*  
Luer**

Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1920-1950 m.  
CHO. No evaluada.

*Silverstone 4324* (HT: CUCV; IT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Trichosalpinx spathulata***

**Luer**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1920-1950 m. CHO. No evaluada.

*Silverstone 4323* (HT: CUCV; IT: MO).

***Trichosalpinx tenuis***

**(C.Schweinf.) Luer**

*Pleurothallis tenuis* C.Schweinf.,

*Trichosalpinx vertex* Luer &

R.Escobar

Luer 1997; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 3500 m.

TOL. No evaluada.

Colombia a Bolivia.

*Luer 8488* (COL, JAUM, SEL).

***Trichosalpinx uvaria* Luer**

Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1920-1950 m.

CHO. No evaluada.

*Silverstone-Sopkin 4322* (HT: CUCV; IT: MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Trichosalpinx vagans* (Garay & Dunst.) Luer**

*Pleurothallis vagans* Garay & Dunst.

Luer 1997; Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2400-2800 m.

ANT. No evaluada.

*Garay 1066* (HT: AMES).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Trichosalpinx webbiae* Luer & R.Escobar**

Luer 1997; Viveros & Higgins 2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2700-2800 m.

ANT. No evaluada.

*Luer 8765* (HT: SEL).

***Trigonidium* Lindl.**

6 especies

***Trigonidium acuminatum* Lindl.**

*Trigonidium peruvianum* Schltr.,

*Trigonidium subrepens* Rolfe,

*Trigonidium tenue* Lindl.

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia. 184-500 m.

GUV, VAU. No evaluada.

N Suramérica.

*Arévalo 87* (AMES, COL).

***Trigonidium egertonianum* Lindl.**

*Trigonidium seemannii* Rchb.f.,

*Trigonidium spatulatum* Linden & Rchb.f.

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Amazonia, Caribe, Pacífico. 20-300 m.

CHO, GUJ, MAG. No evaluada.

México a Ecuador y Guyana.

*Haught 4223* (COL).

***Trigonidium insigne* Benth. & Hook.f.**

*Trigonidium grande* Garay

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1210 m.

CAU, CHO. No evaluada.

Colombia a Perú.

*García 174* (MO).

NOTA: ilustrada por Misas Urreta (2005) como *T. lankesteri* / illustrated by Misas Urreta (2005) as *T. lankesteri*.

***Trigonidium lankesteri* Ames**

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Perú.

NOTA: esperada. La especie ilustrada por Misas Urreta (2005) como *T. lankesteri* es en realidad *T. insigne* / expected; the species illustrated by Misas Urreta (2005) as *T. lankesteri* is actually *T. insigne*.

***Trigonidium obtusum* Lindl.**

Misas-Urreta 2005.

Hierba, epífita.

Nativa y cultivada. Amazonia, Guayana y Macarena, Orinoquia, Pacífico. 0-650 m.

CAQ, CHO, GUV. No evaluada.

Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú.

*Franco 3814* (COL, MO).

***Trigonidium riopalenquense* Dodson**

Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 50-1060 m.

BOY, CHO, VAL. No evaluada.

Colombia y Ecuador; Costa Rica. *Gentry 17721* (COL, HUA, MO).

NOTA: Christenson (2002) la puso en la sinonimia de *T. seemannii*, cuyo tipo es ambiguo; es más probable que *T. seemannii* sea sinónimo de *T. egertonianum* / Christenson (2002) placed it in synonymy of *T. seemannii*, whose type is ambiguous; *T. seemannii* is most likely a synonym of *T. egertonianum*.

***Triphora* Nutt.**

3 especies

***Triphora foldatsii* Carnevali**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes, Pacífico, SN Santa Marta. 10-1500 m.

MAG, SAN, VAL. No evaluada.

Colombia, Venezuela.

*Killip 15406* (NY).***Triphora gentianoides* (Sw.)****Ames & Schltr.**Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. 10-100 m.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Caribe, SE Estados Unidos a Ecuador y Venezuela.

NOTA: esperada / expected.

***Triphora miserrima* (Cogn.)****Acuña**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Andes, Orinoquia. 500 m.

MET. No evaluada.

Colombia, Caribe.

*Idrobo 2569* (COL).**[*Triphora surinamensis*****(Benth.) Britton]**Govaerts *et al.* 2014a.

NOTA: registro basado en identificación errónea. No hay registros de Colombia o de áreas limítrofes / record based on a misidentification; no records from Colombia or neighboring areas.

***Trisetella* Luer**

5 especies, 2 especies endémicas

***Trisetella escobarii* Luer**

Luer 1989; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 2100 m.

NSA. No evaluada.

*Luer 10324* (HT: MO).***Trisetella gemmata* (Rchb.f.)****Luer***Triaristella gemmata* (Rchb.f.)Luer, *Triaristellina gemmata*

(Rchb.f.) Rauschert

Luer 1989; Viveros &amp; Higgins

2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes. 1700-1900 m.

ANT. No evaluada.

*O'Brien s.n.* (HT: W).***Trisetella tenuissima*****(C.Schweinf.) Luer**

Luer 1989; Viveros &amp; Higgins

2007; Idárraga *et al.* 2011.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200 m.

ANT. No evaluada.

Panamá a Colombia.

*Luer 13087* (MO).***Trisetella triaristella*****(Rchb.f.) Luer***Triaristella reichenbachii* Brieger,*Triaristellina triaristella* (Rchb.f.)

Rauschert

Luer 1989; Viveros &amp; Higgins

2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Bolivia.

*Luer 2190* (SEL).

NOTA: espécimen representativo sin datos de localidad específica o elevación / voucher without specific location or elevation data.

***Trisetella triglochis* (Rchb.f.)****Luer***Masdevallia allenii* L.O. Williams,*Masdevallia huebneri* Schltr.,*Masdevallia trichaete* Rchb.f.,*Masdevallia tridactylites* Rchb.f.,*Masdevallia tripeta* Rchb.f.,*Masdevallia triseta* Kraenzl.,*Triaristella huebneri* (Schltr.)Luer, *Triaristella trichaete*(Rchb.f.) Luer, *Triaristella**tridactylites* (Rchb.f.) Luer,*Triaristella triglochis* (Rchb.f.)Luer, *Triaristellina huebneri*(Schltr.) Rauschert, *Triaristellina**trichaete* (Rchb.f.) Rauschert,*Triaristellina tridactylites*(Rchb.f.) Rauschert, *Triaristellina**triglochis* (Rchb.f.) Rauschert,*Trisetella huebneri* (Schltr.) Luer,*Trisetella trichaete* (Rchb.f.) Luer,*Trisetella tridactylites* (Rchb.f.)

Luer

Luer 1989; Viveros &amp; Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600 m.

ANT. No evaluada.

Costa Rica a Suramérica tropical.

*Luer 8783* (SEL).***Trizeuxis* Lindl.**

1 especie

***Trizeuxis falcata* Lindl.**

Ortiz 1995.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Andes, Orinoquia, Pacífico. 80-1700 m.

ANT, CAU, CHO, CUN, MET.

No evaluada.

América tropical.

*Kapuller 248* (AMES, COL,

HUA, JAUM).

***Tropidia* Lindl.**

1 especie

***Tropidia polystachya* (Sw.)****Ames***Serapias polystachya* Sw.Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Caribe.

MAG. No evaluada.

México a Venezuela y Ecuador;  
Antillas.  
*Allen 621* (MO).

### ***Uleiorchis* Hoehne**

1 especie

#### ***Uleiorchis ulei* (Cogn.)**

##### **Handro**

*Wulfschlaegelia ulei* Cogn.  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, saprófita.  
Nativa. Pacífico. 50-60 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia a Guayana Francesa,  
Brasil y Perú.  
*Forero 8869* (COL).

### ***Valdiviesoa* Szlach. & Kolan.**

1 especie, 1 especie endémica

#### ***Valdiviesoa debedoutii* (P.Ortiz) Szlach. & Kolan.**

*Fernandezia debedoutii* (P.Ortiz)  
M.W.Chase, *Pachyphyllum*  
*debedoutii* P.Ortiz  
Ortiz 2009b; Chase & Whitten  
2011; Kolanowska & Szlachetko  
2014.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 2400-3500 m.  
BOY, CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Ortiz 1298* (HT: HPUJ).

### ***Vanilla* Mill.**

14 especies, 2 especies endémicas

#### **[*Vanilla bicolor* Lindl.]**

Govaerts *et al.* 2014a.  
NOTA: señalada de Colombia por  
Govaerts *et al.* (2012), pero no  
hay evidencia de su presencia en  
el país / recorded from Colombia  
by Govaerts *et al.* (2012) but  
there is no evidence of its  
presence in the country.

#### ***Vanilla calyculata* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. Andes. 1000 m.  
CAU, HUI, TOL, VAL. No  
evaluada.  
Colombia, Centroamérica.  
*Dryander 2379* (BM).

#### ***Vanilla columbiana* Rolfe**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. V Cauca, V Magdalena.  
40-1000 m.  
CUN, VAL. No evaluada.  
*Goudot s.n.* (HT: K).

#### ***Vanilla dressleri* Soto Arenas**

Soto Arenas & Dressler 2010;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. Pacífico. 0-100 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
Costa Rica a O Colombia.  
*Cuatrecasas 16550* (AMES).

#### ***Vanilla espondae* Soto Arenas**

Soto Arenas 2010; Govaerts *et al.*  
2014a.  
Hierba, trepadora.  
Endémica. V Magdalena. 50-100  
m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Pérez 563* (HT: K).

NOTA: descrita a partir de un  
especimen recolectado en la  
cuenca del río Magdalena, en  
N Colombia, sin más datos /  
described from a specimen  
collected in the Magdalena River  
basin in N Colombia, without  
more data.

#### ***Vanilla hostmannii* Rolfe**

Soto Arenas & Cribb 2010;  
Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, trepadora.

Nativa. Amazonia. 50-150 m.  
AMA. No evaluada.  
Colombia a Guayanas y Brasil.  
*Schultes 3809* (AMES).

#### ***Vanilla methonica* Rchb.f. & Warsz.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. Andes. 1800-2400 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Perú.  
*Lehmann HK1181* (K).

#### ***Vanilla odorata* C.Presl**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Orinoquia, Pacífico. 150-2000 m.  
AMA, ANT, CAU, MET. No  
evaluada.  
México a Brasil y Bolivia.  
*Fonnegra 1784* (CUVC, MO).

#### ***Vanilla palmarum* (Lindl.) Lindl.**

Ortiz 1995.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. Amazonia. 200 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Amazonia.  
*Schultes 24294* (COL).

#### ***Vanilla penicillata* Garay & Dunst.**

Hierba, trepadora.  
Nativa. Amazonia. 300 m.  
VAU. No evaluada.  
E Colombia, O Venezuela, NO  
Brasil.  
*Franco 4240* (COL).

#### ***Vanilla pompona* Schiede**

Ortiz 1995; Soto Arenas & Cribb  
2010.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. Andes, Caribe, SN Santa  
Marta, V Magdalena. 184-1700  
m.

CUN, MAG, SUC, TOL. No evaluada.  
México a Costa Rica y prob. O Colombia, O Ecuador.  
*Uribe 5236* (COL, AMES).  
NOTA: la identidad de los especímenes colombianos requiere verificación / identity of the Colombian specimens needs verification.

***Vanilla ribeiroi* Hoehne**

Soto Arenas & Cribb 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. Amazonia. 150 m.  
VAU. No evaluada.  
Colombia, Brasil, Guyana.  
*Schultes 15961* (AMES).

***Vanilla rivasii* Molineros et al.**

Molineros-Hurtado *et al.* 2014.  
Hierba.  
Endémica. Pacífico. 0-50 m.  
CHO, VAL. No evaluada.  
O Colombia.  
*González 1118* (HT: CUVC).

***Vanilla sprucei* Rolfe**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, trepadora.  
Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 30-50 m.  
VAU. No evaluada.  
Colombia, Brasil?  
*Schultes 12497* (AMES).  
NOTA: conocida solo del tipo; recolectada cerca de la frontera con Brasil / known only from the type; collected near the border with Brazil.

***Vanilla trigonocarpa* Hoehne**

Soto Arenas & Cribb 2010; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, trepadora.  
Nativa.  
DESCONOCIDO. No evaluada.

Costa Rica a Colombia; E Brasil.  
NOTA: citada de Colombia por Soto Arenas & Cribb (2010), sin datos de espécimen o localidad / recorded from Colombia by Soto Arenas & Cribb (2010) with no data of specimen or locality.

***Veyretia Szlach.***

3 especies

***Veyretia aphylla* (Ridl.) Szlach.**

*Pelexia aphylla* Ridl., *Sarcoglottis aphylla* (Ridl.) Schltr., *Spiranthes aphylla* (Ridl.) Cogn.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba.  
Nativa.  
VIC. No evaluada.  
Colombia a Guyana y NO Brasil.  
NOTA: señalada de Colombia, sin indicación de espécimen / recorded from Colombia with no indication of specimen.

***Veyretia neuroptera* (Rchb.f. & Warm.) Szlach.**

*Spiranthes neuroptera* Rchb.f. & Warm.  
Hierba.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina.  
NOTA: señalada de Colombia por Govaerts *et al.* (2012), sin indicación de espécimen / recorded from Colombia by Govaerts *et al.* (2012), with no indication of specimen.

***Veyretia szlachetkoana* Mytnik**

Hierba.  
Nativa. Orinoquia. 150 m.  
VIC. No evaluada.  
E Colombia, SO Venezuela.  
*Haught 2773* (HT: COL).

***Vitekorchis Romowicz & Szlach.***

2 especies

***Vitekorchis aurifera* (Rchb.f.)**

**J.M.H.Shaw**

*Oncidium armillare* Lindl.,  
*Oncidium auriferum* Rchb.f.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2400 m.  
CHO. No evaluada.  
NO Suramérica.  
*Gentry 24192* (HUA).

***Vitekorchis excavata* (Lindl.) Romowicz & Szlach.**

*Oncidium aurosum* Rchb.f. & Warsz., *Oncidium excavatum* Lindl.  
Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 2500-3000 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NO Suramérica.

***Warczewiczella* Rchb.f.**

7 especies, 2 especies endémicas

***Warczewiczella amazonica* Rchb.f. & Warsz.**

*Chondrorhyncha amazonica* (Rchb.f. & Warsz.) A.D.Hawkes,  
*Cochleanthes amazonica* (Rchb.f. & Warsz.) R.E.Schult. & Garay,  
*Warczewiczella lindenii* (Rolfe) auct., *Zygopetalum amazonicum* (Rchb.f. & Warsz.) Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia? 100-500 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Amazonia Central.  
NOTA: esperada; presente en la Amazonia de Ecuador, Perú y Brasil / expected; occurs in the Amazon of Ecuador, Peru and Brazil.

***Warczewiczella discolor***

**(Lindl.) Rchb.f.**

*Cochleanthes discolor* (Lindl.) R.E.Schult. & Garay, *Warrea discolor* Lindl., *Warszewiczella discolor* (Lindl.) Rchb.f., *Zygopetalum discolor* (Lindl.) Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 1700-2300 m.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Honduras a Perú y Venezuela; Cuba.  
NOTA: esperada; presente en Zulia (Venezuela), cerca de la frontera, y en Panamá / expected; occurs in Zulia (Venezuela), near the border, and also in Panama.

***Warczewiczella ionoleuca***

**(Rchb.f.) Schltr.**

*Cochleanthes ionoleuca* (Rchb.f.) R.E.Schult. & Garay, *Zygopetalum ionoleucum* Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Pacífico. 100-900 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.  
*Blunt s.n.* (HT: W-R).

***Warczewiczella lipscombiae***

**(Rolfe) Fowlie**

*Chondrorhyncha lipscombiae* Rolfe, *Cochleanthes lipscombiae* (Rolfe) Garay  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Caribe, Pacífico. 0-500 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia y Panamá.  
*Peláez s.n.* (M).

***Warczewiczella lobata***

**(Garay) Dressler**

*Cochleanthes lobata* Garay  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.

DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Mejía s.n.* (HT: AMES).

***Warczewiczella marginata***

**Rchb.f.**

*Cochleanthes marginata* (Rchb.f.) R.E.Schult. & Garay, *Zygopetalum marginatum* (Rchb.f.) Rchb.f.  
Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, SN Santa Marta. 900-1800 m.  
ANT, MAG, SAN, VAL. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Renz 3883* (RENZ).

***Warczewiczella timbiensis***

**P.Ortiz**

Harding 2008.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1700 m.  
CAU. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1229* (HT: HPUJ).

***Warmingia* Rchb.f.**

1 especie

***Warmingia zamorana***

**Dodson**

*Warmingia margaritacea* B.Johansen  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500 m.  
CHO. No evaluada.  
Colombia, Ecuador, Costa Rica.  
*Ortiz 1108* (HPUJ).

***Warrea* Lindl.**

1 especie

***Warrea warreana* (Lindl.)**

**C.Schweinf.**

*Maxillaria warreana* Lindl., *Phaius hookerianus* Rchb.f.,

*Warrea bidentata* Lindl., *Warrea hookeriana* (Rchb.f.) Rolfe, *Warrea lindeniana* Henfr., *Warrea speciosa* Schltr., *Warrea tricolor* Lindl., *Warrea unijugata* Regel  
Senghas & Gerlach 1993.  
Hierba.  
Nativa. Andes, Pacífico. 0-1000 m.  
CHO, TOL, VAL. No evaluada.  
Colombia a Brasil y N Argentina.  
*Guarín 34* (COL).

***Warreella* Schltr.**

2 especies, 1 especie endémica

***Warreella cyanea* (Lindl.)**

**Schltr.**

*Maxillaria cyanea* (Lindl.) Beer, *Warrea cyanea* Lindl., *Warrea medellinensis* Kraenzl., *Warreella medellinensis* (Kraenzl.) Garay  
Senghas & Gerlach 1993.  
Hierba.  
Nativa. Andes. 800-2400 m.  
ANT, NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Schlim 29* (W-R).

***Warreella patula* Garay**

Senghas & Gerlach 1993;  
*Idárraga et al.* 2011.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 1000-2000 m.  
ANT. No evaluada.  
Colombia.  
*Escobar 983* (HT: AMES).

***Warreopsis* Garay**

3 especies, 1 especie endémica

***Warreopsis colorata* (Linden & Rchb.f.) Garay**

*Zygopetalum coloratum* Linden & Rchb.f.  
Senghas & Gerlach 1993.  
Hierba.

Nativa. Andes. 1500 m.  
NSA. No evaluada.  
Colombia y Venezuela.  
*Schlim 51* (HT: W-R).

***Warreopsis pardina* (Rchb.f.)**

**Garay**

*Zygopetalum pardinum* Rchb.f.  
Senghas & Gerlach 1993.  
Hierba.  
Nativa. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia y Ecuador.

***Warreopsis purpurea* P.Ortiz**

Ortiz 1994a.  
Hierba.  
Endémica. Andes. 2300 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 927* (HT: HPUJ).  
NOTA: conocida solo del tipo /  
known only from the type.

***Wulschlaegelia* Rchb.f.**

2 especies

***Wulschlaegelia aphylla* (Sw.)**

**Rchb.f.**

*Cranichis aphylla* Sw.  
Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, saprófita.  
Nativa. Pacífico, V Magdalena.  
80-500 m.  
ANT, CHO. Preocupación  
Menor (propuesta aquí).  
México a S Brasil.  
*Cogollo 9030* (JAUM).

***Wulschlaegelia calcarata***

**Benth.**

Hierba, saprófita.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena, Orinoquia, Pacífico.  
30-450 m.  
AMA, ARA, CHO, MET, VAL,  
VAU. Preocupación Menor  
(propuesta aquí).

Costa Rica a Guayana Francesa y  
Brasil; Antillas.  
*Forero 8868* (COL).

***Xerorchis* Schltr.**

2 especies

***Xerorchis amazonica* Schltr.**

Hierba.  
Nativa. Amazonia, Guayana y  
Macarena. 200-300 m.  
AMA, VAU. No evaluada.  
N Suramérica.  
*Londoño 660* (COAH).

***Xerorchis trichorhiza***

**(Kraenzl.) Garay**

*Epidendrum trichorhizum*  
Kraenzl.  
Hierba.  
Nativa. Amazonia, Andes,  
Guayana y Macarena, Orinoquia,  
Pacífico. 60-550 m.  
CAQ, CAU, GUV, SAN. No  
evaluada.  
N Suramérica.  
*Franco 4240* (COL, US).

***Xylobium* Lindl.**

12 especies, 4 especies endémicas

**[*Xylobium bractescens***

**(Lindl.) Kraenzl.]**

Govaerts *et al.* 2014a.  
NOTA: registro basado en  
identificación errónea. No  
hay indicios de su presencia  
en Colombia. S Ecuador a  
Bolivia / record based on a  
misidentification; no evidence  
of its presence in Colombia; S  
Ecuador to Bolivia.

***Xylobium coelia* (Rchb.f. &**

**Warsz.) Rolfe**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes? 2800-3200 m.  
NSA? No evaluada.  
Colombia?, NO Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Xylobium colleyi* (Lindl.)**

**Rolfe**

*Maxillaria rebellis* Rchb.f.,  
*Xylobium rebelle* (Rchb.f.) Schltr.  
Ortiz 1995.  
Hierba, epífita.  
Nativa. 200-1100 m.  
AMA? No evaluada.  
Panamá a Ecuador y Perú.  
NOTA: *Maxillaria rebellis*  
fue descrita de una planta  
cultivada en Europa, de origen  
incierto, atribuido a Colombia /  
*Maxillaria rebellis* was described  
from a plant cultivated in  
Europe, of uncertain origin,  
attributed to Colombia.

***Xylobium corrugatum***

**(Lindl.) Rolfe**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 1800 m.  
NSA? No evaluada.  
Colombia?, Venezuela.  
NOTA: esperada / expected.

***Xylobium elongatum* (Lindl.**

**& Paxton) Hemsl.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes? 1200 m.  
NAR? No evaluada.  
México a Perú.  
NOTA: esperada; recolectada en  
Carchi (Ecuador), cerca de la  
frontera / expected; collected  
in Carchi (Ecuador), near the  
border.

***Xylobium foveatum* (Lindl.)**

**G.Nicholson**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.

Nativa. Andes, Pacífico. 10-500 m.  
NAR? No evaluada.  
México a Ecuador.  
*Ortiz 595* (HPUJ).

***Xylobium hypocritum***  
**(Rchb.f.) Rolfe**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
NOTA: conocida solo de la descripción original, sin datos de localidad / known only from the original description, no locality data.

***Xylobium leontoglossum***  
**(Rchb.f.) Rolfe**

Ortiz 1995; Idárraga *et al.* 2011.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1500-2740 m.  
ANT, CAU, CUN, QUI, TOL. No evaluada.  
Venezuela a Perú.  
*Cuatrecasas 19366* (COL, NY).

***Xylobium modestum* Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1200 m.  
CUN. No evaluada.  
Cordillera Oriental.  
*Schultze 25* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Xylobium pallidiflorum***  
**(Hook.) G.Nicholson**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes, SN Santa Marta. 1255-2200 m.  
CUN, MAG, PUT. No evaluada.  
Caribe, Venezuela a Bolivia.  
*Kirkbride 1974* (COL, NY).

***Xylobium stanhopeifolium***  
**Schltr.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 550 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia.  
*Hopp 79* (HT: B, destruido).  
NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Xylobium subpulchrum***  
**Dressler**

Escobar, R. 1990-1998.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 500-550 m.  
PUT. No evaluada.  
Colombia, Perú.  
*Escobar 1990-1998: No. 700* (?).

***Xylobium variegatum* (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.**

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Amazonia, Andes. 450-1750 m.  
PUT, VAL. No evaluada.  
Colombia a Bolivia.  
*Killip 5581* (COL, NY).

***Zelenkoa* M.W.Chase & N.H.Williams**

1 especie

***Zelenkoa onusta* (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams**

*Oncidium onustum* Lindl.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes, Caribe. 30-1200 m.  
BOL. No evaluada.  
Panamá a Perú.  
*Cuming 1208* (HT: K).

***Zootrophion* Luer**

10 especies, 4 especies endémicas

***Zootrophion aguirrei* P.Ortiz**

Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes.  
DESCONOCIDO. No evaluada.  
Colombia.  
*Ortiz 1374* (HPUJ).  
NOTA: espécimen tipo tomado de cultivo / type specimen taken from cultivation.

***Zootrophion alvaroi* (Garay) Luer**

Viveros & Higgins 2007; Govaerts *et al.* 2014a.  
Hierba, epífita.  
Nativa.  
ANT. No evaluada.  
O Colombia a O Ecuador.  
*Escobar 372* (HT: AMES).  
NOTA: conocida en Colombia solo del tipo, sin datos de localidad o elevación / known in Colombia only from the type, without locality or elevation data.

***Zootrophion argus* (Kraenzl.) Luer**

*Masdevallia argus* Kraenzl.  
Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Endémica. Andes. 1650 m.  
ANT, NSA. No evaluada.  
Colombia (prob. Ecuador).  
*Schlim 762* (LT: K; ILT: W, N).

***Zootrophion dayanum* (Rchb.f.) Luer**

*Cryptophoranthus dayanum* (Rchb.f.) Rolfe, *Cryptophoranthus lehmannii* Rolfe  
Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.  
Hierba, epífita.  
Nativa. Andes. 1900 m.  
ANT, RIS. No evaluada.  
Colombia a Bolivia; Venezuela.  
*Luer 4313* (SEL).

***Zootrophion dodsonii* (Luer)****Luer**

Luer 1982; Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

CAU. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Luer 2965* (SEL).

NOTA: espécimen sin datos de localidad específica o elevación / specimen without specific location or elevation data.

***Zootrophion endresianum*****(Kraenzl.) Luer**

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1600-1800 m.

VAL. No evaluada.

Nicaragua a Ecuador.

*Luer 2350* (SEL).

***Zootrophion hypodiscus*****(Rchb.f.) Luer**

*Cryptophoranthus hypodiscus* (Rchb.f.) Rolfe, *Cryptophoranthus moorei* Rolfe, *Cryptophoranthus rolfeanus* Kraenzl.

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 1200 m.

VAL. No evaluada.

Colombia a Ecuador.

*Lehmann s.n.* (HT: W).

***Zootrophion lappaceum* Luer****& R.Escobar**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica. Andes.

CUN. No evaluada.

Cordillera Oriental.

*Luer 14289* (MO).

NOTA: conocida solo del tipo / known only from the type.

***Zootrophion oblongifolium*****(Rolfe) Luer**

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Nativa.

DESCONOCIDO. No evaluada.

Colombia a Perú.

*Charlesworth s.n.* (HT: K; IT: BR).

NOTA: conocida en Colombia solo del tipo, sin datos de localidad o elevación / known in Colombia only from type, without locality or elevation data.

***Zootrophion trivalve* (Luer &****R.Escobar) Luer**

Luer 2004; Viveros & Higgins 2007.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Escobar 1658* (HT: JAUM).

NOTA: conocida solo del tipo, sin datos de localidad o elevación / known only from the type; no locality or elevation data.

***Zygosepalum* Rchb.f.**

4 especies, 1 especie endémica

***Zygosepalum labiosum*****(Rich.) C.Schweinf.**

*Zygosepalum rostratum* (Hook.) Rchb.f.

Ortiz 1995; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba.

Nativa. Amazonia?, Orinoquia?, Pacífico. 0-400 m.

NAR. No evaluada.

N Suramérica.

*Romero-Castañeda 5136* (COL).

***Zygosepalum lindeniae*****(Rolfe) Garay & Dunst.**

Ortiz 1995.

Hierba.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 200 m.

VAU. No evaluada.

N Suramérica E Andes.

*Escobar 1990-1998: No. 707* (?).

***Zygosepalum marginatum*****Garay**

Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Endémica.

DESCONOCIDO. No evaluada.

*Clifford s.n.* (HT: AMES).

NOTA: descrita de una planta cultivada en Florida, Estados Unidos, originaria de Colombia, sin datos de localidad / described from a plant grown in Florida, USA, originally from Colombia, without locality data.

***Zygosepalum revolutum*****Garay & G.A.Romero**

Garay 1999; Govaerts *et al.* 2014a.

Hierba, epífita.

Nativa. Amazonia, Guayana y Macarena. 200 m.

VAU. No evaluada.

Colombia, Brasil.

*Escobar s.n.* (HT: AMES).

***Zygostates* Lindl.**

1 especie

***Zygostates apiculata* (Lindl.)****Toscano**

*Ornithocephalus apiculatus* Lindl., *Zygostates planifolia* (Rchb.f.) Toscano

Hierba, epífita.

Nativa. Andes. 500-1600 m.

ANT, DESCONOCIDO. No evaluada.

Venezuela a Perú.