

GOBIIDAE gobios

GOBIIDAE 1:

Elacatinus tenox, gorgo robusto – Cabeza y cuerpo robusto. Cuerpo y aletas uniformemente oscuros, gris pizarra; una franja azul postorbital (Böhlke & Robins 1968).

Elacatinus illecebrosus, gorgo seductor – Dos franjas negras longitudinales, una a lo largo de la base de la aleta dorsal, otra desde el extremo del morro, pasa por el ojo y hasta el extremo de la aleta caudal; una franja amarillo brillante desde la parte superior del ojo a la aleta caudal (UCR 1128-19).

Elacatinus multifasciatus, bobo lineado – Cuerpo gris oscuro con 19 anillos gris pálido, una franja anaranjada desde el extremo del morro, pasando por el ojo y hasta la parte posterior de la cabeza (van Tassell 2006).

Gobiosoma spes, gorgo jaspeado – Coloración amarillo pálido en vida con 5 bandas oscuras distintivas que cruzan desde el lomo a los costados, diseño de coloración continuo en el pedúnculo caudal, o color pardo oscuro uniforme; bandas oscuras cubiertas con puntos y manchas vermiculares amarillentas. Radios de la aleta anal 9 a 11 (Van Tassell 2006).

Gobiosoma spilotum, gorgo punteado – Cabeza amarilla con manchas oblicuas oscuras debajo del ojo y parte inferior de la cabeza; cuerpo color canela con series de manchitas cortas oscuras conspicuas a lo largo de la línea media de los costados; manchas oscuras en las bases de las aletas dorsales y en la base de la aleta caudal (van Tassell 2006).

Gobiosoma hildebrandi, gorgo bocón – Color pardo con 6 ó 7 bandas negras a través de los costados; franjas negras oblicuas debajo del ojo y en la parte inferior de la cabeza; aletas oscuras (van Tassell 2006).

Psilotris batrachoides, gorgo sapito – Sin escamas. Barras color café en las aletas dorsal, caudal y pectorales; costados con manchas oscuras moteadas (Böhlke & Chaplin 1968).

Psilotris kaufmani, gorgo chingo – Sin escamas. Aleta pectoral bicolor, pardo oscuro a negro los 9 a 11 radios superiores, blanco en la parte inferior de la misma; rayos oscuros en la cabeza y manchas irregulares dispersadas en el cuerpo (Greenfield 1993).

Barbulifer ceuthoeucus, gorgo barbudo – Barbillas presentes en el mentón y el labio superior; una barbilla debajo del ojo. Cuerpo verdusco con bandas pálidas arriba y debajo de la línea media del costado y una banda negra en la base de la aleta caudal (UCR 1353-27).

GOBIIDAE gobios

GOBIIDAE 1:

Elacatinus tenox, robust goby – Head and body robust. Body and fins uniformly dark, slate grey; a postorbital blue stripe.

Elacatinus illecebrosus, barsnout goby – Two longitudinal black stripes, 1 along base of dorsal fin, another from tip of snout, through eye to tip of caudal fin; a bright yellow stripe from upper eye to caudal fin.

Elacatinus multifasciatus, greenbanded goby – Body dark green with 19 pale green rings, an orange stripe from snout tip through eye to rear of head.

Gobiosoma spes, variegated goby – In life ground color pale yellow with 5 distinct dark bands crossing back and sides, continuous dark pattern on caudal peduncle or uniform dark brown; dark bands covered with scattered yellowish spots and vermiculations. Anal-fin rays 9 to 11.

Gobiosoma spilotum, stippled goby – Head yellow with oblique dark markings below eye and lower head; body tan with conspicuous series of short dark dashes along midsides; dark spots on bases of dorsal fins and on base of caudal fin.

Gobiosoma hildebrandi, banded goby – Color brown with 6 or 7 black bands across sides; oblique black stripes below eye and on lower head; fins dusky.


Psilotris batrachoides, toadfish goby – Scales absent. Brown bars on dorsal, caudal and pectoral fins; sides with mottled dark markings.

Psilotris kaufmani, naked goby – Scales absent. Pectoral fin bicolored, dark brown to black on upper 9 to 11 rays and membranes and white below; dark markings radiating from eyes and scattered irregular blotches on body.

Barbulifer ceuthoeucus, bearded goby – Barbels present on chin and upper lip; one barbel below eye. Body greenish with pale bands above and below midside and a black band on base of caudal fin.

Apuntes / Notes:

GOBIIDAE 1



Elacatinus tenox




Elacatinus illecebrosus




Elacatinus multifasciatus




Gobiosoma spes




Gobiosoma spilotum




Gobiosoma hildebrandi



Psilotris batrachoides



Psilotris kaufmani



Barbulifer ceuthoecus

GOBIIDAE 2:

Gobulus myersi, gobio bicolor – Sin escamas. Cabeza depresión dorsoventralmente, más ancha que alta. Color canelo arriba, café abajo; 2 manchas oscuras difusas en forma de montura en el dorso (van Tassell 2006).

Nes longus, gobio cameronícola – Sin escamas. Cabeza y cuerpo color gris a canelo, con bandas cafés y 5 a 7 manchas café oscuro a lo largo de la línea media de los costados; manchitas irregulares anaranjadas en el cuerpo y las aletas, pero formando bandas angostas verticales en la aleta caudal (Böhlke & Chaplin 1968).

Ginsburgellus novemlineatus, gobio nueve rayas – Cuerpo color café oscuro a negro; con 9 líneas angostas azules cruzando los costados, cabeza color naranja; bases de las aletas mediales oscuras (UCR 75-17).

Palatogobius paradoxus, gobio celeste – Coloración del cuerpo separada por una línea difusa en azul pálido en la parte superior y violeta en la parte inferior; cabeza principalmente violeta; aletas amarillentas (van Tassell 2006).

Microgobius signatus, gobio transparente – Cabeza y cuerpo muy transparentes; ojo grande. Una mancha negra pequeña en la parte superior del pedúnculo caudal; manchas oscuras a lo largo de la base de las aletas dorsales; franjas oblicuas azul y anaranjado en la parte inferior de la cabeza (van Tassell 2006).

Bollmannia boquerensis, gobio ojiblanco – Cuerpo blanco, cabeza amarilla; un ocelo pequeño en la parte superior del pedúnculo caudal; aleta dorsal con puntos y franjas amarillas o anaranjado (Evermann & Marsh 1900).

Coryphopterus dircrus, gobio dos puntos – Cuerpo color canelo con puntos y manchas esparcidas color café rojo; 2 manchas conspicuas café oscuro en la base de la aleta pectoral; una barra oscura en la base de la aleta caudal (UCR 207-22).

Coryphopterus glaucofraenum gobio de riendas – Cabeza y cuerpo casi transparentes. Manchas oscuras variables en los costados; una mancha negra triangular arriba del opérculo, otra mancha difusa debajo del opérculo; una barra oscura en la base de la aleta caudal (UCR 207-23).

Coryphopterus lipernes, gobio lindo – Cabeza y cuerpo casi transparentes. Opérculo anaranjado, manchas azules en el morro, alrededor del ojo y en la aleta pectoral; una rayita negra debajo del ojo, 2 franjas longitudinales, una oscura a lo largo de la parte superior, otra amarilla en la parte inferior (van Tassell 2006).

GOBIIDAE 2:

Gobulus myersi, paleback goby – Scales absent. Head depressed, broader than deep. Tan above, brown below; 2 diffuse dark saddles on back.

Nes longus, orangespotted goby – Scales absent. Head and body gray to tan, with brown bands and 5 to 7 dark brown blotches along midside; small, irregular orange spots on body and fins, but forming narrow vertical bands on caudal fin.

Ginsburgellus novemlineatus, ninelined goby – Body dark brown to black, with 9 narrow bluelines crossing the sides; head orange; bases of median fins dusky.

Palatogobius paradoxus, mauve goby – Body separated by a blackish streak into pale blue upper body and lavender lower parts; head mostly lavender; fins yellowish.

Microgobius signatus, transparent goby – Head and body highly transparent; eye large. A small black dot on upper caudal peduncle; 7 dark blotches along base of dorsal fins; oblique blue and orange stripes on lower head.

Bollmannia boquerensis, white-eye goby – Body white, head yellow; a small black *ocellus* on first dorsal fin, second dorsal fin with yellow or orange spots and stripes.


Coryphopterus dircrus, colon goby – Body tan with a sprinkling of red-brown spots and blotches; 2 conspicuous dark brown spots on base of pectoral fin; a dark bar at caudal-fin base.

Coryphopterus glaucofraenum bridled goby – Head and body nearly transparent. Variable dark markings on sides; a black triangular spot above opercle, another diffuse blotch below on opercle; a dark bar at caudal-fin base.


Coryphopterus lipernes, peppermint goby – Head and body nearly transparent. Opercle orange, blue markings on snout, around eyes and base of pectoral fin; a black streak below eye; 2 longitudinal stripes, a dusky stripe along upper sides, a yellow stripe along lower sides.

Apuntes / Notes:

GOBIIDAE 2




Gobulus myersi




Nes longus




Ginsburgellus novemlineatus




Palatogobius paradoxus




Microgobius signatus



Bollmannia boquerensis



Coryphopterus dicrus



Coryphopterus glaucofraenum



Coryphopterus lipernes

GOBIIDAE 3:

Lophogobius cyprinoides, gocio gallo – Una cresta carnosa arriba de la cabeza. Coloración de la cabeza y cuerpo café oliva con manchas y franjas más oscuras; una mancha grande anaranjada en la primera aleta dorsal (van Tassell 2006).

Lythrypnus phorellus, gocio reo – Cuerpo pálido con alrededor de 10 barras gris azul que cruzan el cuerpo, cada barra dividida por interespacios amarillos; 2 barras oscuras debajo del ojo (van Tassell 2006).

Lythrypnus mowbrayi, gocio herido – Cuerpo café oscuro con 12 a 13 barras angostas blancas que cruzan el cuerpo, cada barra dividida por una línea negra; parte inferior de la cabeza pálida con barras y manchas cafés; una mancha oscura distintiva en la base de la aleta pectoral (UCR 207-19).

Lythrypnus nesiotes, gocio insular – Cuerpo café oscuro con 10 a 11 barras blancas que cruzan el cuerpo, cada barra dividida por una línea negra; parte inferior de la cabeza blanca con manchas café oscuro; un mancha oscura conspicua en la base de la aleta pectoral (Böhlke & Chaplin 1968).

Priolepis hipoliti, gocio oxidado – Color pardo con cerca de 8 barras pálidas verticales; aletas verticales con manchitas. Aletas pectoral y verticales con manchitas anaranjado brillante en vida (Böhlke & Chaplin 1968).

Gobiodoides broussonetti, gocio violeta – Cuerpo alargado. Aletas dorsales unidas o la dorsal espinosa separada en machos. Cabeza y cuerpo pardo púrpura oscuro con 25 a 30 manchas en forma de escudos a lo largo de los costados (Cervigón 1966).

Sicydium altum, tití – Cabeza y cuerpo gris verdoso con la parte ventral amarillenta, individuos pequeños con 5 barras verticales en los costados, aletas oscuras, márgenes de las aletas dorsal y anal rojos. Un a fila de papilas en forma en forma de flecos carnosos que sobresalen la superficie externa de los dientes (Bussing 1998).

Sicydium adelum, chupapiedra escondida – Cabeza y cuerpo gris o café; aletas dorsal y anal con franjas submarginales. No presentan papilas carnosas que sobrepasan los dientes (Bussing 1998).

Bathygobius mystacium, gocio bandeados – Coloración gris o café uniformalmente con cerca de 8 manchas oscuras o barras en la mitad inferior del cuerpo; con frecuencia puntos blancos brillantes en el cuerpo. Radios de la aleta pectoral 18 a 20, raramente 18 (van Tassell 2006).

Bathygobius soporator, mapo aguado – Coloración gris café o gris; generalmente coloración uniforme con 5 manchas oscuras en forma de montura y manchas oscuras en la cabeza (UCR 211-4).

Apuntes / Notes:

GOBIIDAE 3:

Lophogobius cyprinoides, crestado gocio – A fleshy crest on top of head. Head and body olive-brown with darker blotches and stripes; a large orange blotch on first dorsal fin.

Lythrypnus phorellus, convict gocio – Body pale with about 10 blue-gray bars crossing the body, each bar divided by yellow interspaces; 2 dark bars below eye.

Lythrypnus mowbrayi, herido gocio – Body dark brown with 12 to 13 narrow white bars crossing the body, each bar divided by a black line; lower head pale with brown bars and blotches; a distinct dark spot on pectoral-fin base.

Lythrypnus nesiotes, isla gocio – Body dark brown with 10 or 11 white bars crossing the body, each bar divided by a black line; lower head white with dark brown spots; a conspicuous dusky spot on pectoral-fin base.

Priolepis hipoliti, gocio oxidado – Brown ground color with about 8 paler vertical bars; vertical fins spotted. Vertical and pectoral fins with bright orange spots in life.

Gobiodoides broussonetti, violeta gocio – Body elongate. Dorsal fins united or separate spinous dorsal on males. Head and body dark purplish brown with 25 to 30 dark chevrons along sides.


Sicydium altum, tití gocio – Head and body greenish-gray with a yellowish belly, small individuals have 5 black crossbars on sides; fins dark, margin of dorsal and anal fins red. A row of finger-like papillae overlying outer surface of teeth.

Sicydium adelum, oculto gocio – Head and body uniform gray or brown; dorsal and anal fins with submarginal stripes. Teeth not overlain with finger-like papillae.


Bathygobius mystacium, isla frillfin – Uniform gray or brown with about 8 dark blotches or bars on lower half of body; often with bright white dots on body. Pectoral-fin rays 18 to 20, rarely 18.

Bathygobius soporator, frillfin gocio – Drab brown or gray ground color, often uniform in color or with 5 dark saddles and dark blotches on head. Pectoral-fin rays 18 to 21, almost always 19 or 20.


GOBIIDAE 3




Lophogobius cyprinoides




Lythrypnus phorellus




Lythrypnus mowbrayi



Lythrypnus nesiotes



Priolepis hipoliti




Gobioides broussonetti




Sicydium altum



Sicydium adelum



Bathygobius mystacium



Bathygobius soporator

GOBIIDAE 4:

Awaous banana, lamearena – Morro largo y labios carnosos; ojos muy arriba de la cabeza. Coloración paja con matices verdosos y manchas negras irregulares en el dorso y partes superiores de los costados; una barra diagonal entre la parte superior del opérculo y la base de la aleta pectoral; puntos negros formando franjas en las aletas dorsal y caudal (Bussing 1998).

Evorthodus lyricus, tismiche – Morro muy corto, empinado. Cuerpo color canelo con barras oscuras angostas irregulares; una mancha oscura en forma de “U” en base aleta caudal. Machos con las 4 primeras espinas alargadas y 2 franjas rosadas en la aleta caudal (UCR 1823-3).

Gnatholepis thompsoni, gobio enmascarado – Una mancha anaranjada dorada en el hombro con un anillo parcial negro; una línea café debajo del ojo; cuerpo canela con puntos bermejos en la parte superior de los costados y manchas oscuras a lo largo de la parte inferior (UCR 1300-12).

Gobionellus oceanicus, madrejuile flecha – Radios de la primera aleta dorsal alargados; cuerpo y aleta caudal alargados. Cabeza y cuerpo color bronce con alrededor de siete manchas oscuras a lo largo de la parte superior de los costados, la primera mancha es un ocelo negro, la última en la base de la aleta caudal; 6 manchas pequeñas a lo largo de la base de la aleta dorsal; una barra negra debajo del ojo (Evermann & Marsh 1900).

Ctenogobius smaragdus, gobio tranquilo – Gris azulado pálido; puntos verdes en la cabeza y el cuerpo, 2 manchas oscuras en base de cola; 5 manchas negras a lo largo de la línea media de los costados; franjas oscuras en las aletas dorsal, caudal y pectoral. Dos manchas oscuras en la base de la cola. Cola alargada (Cervigón 1973).

Ctenogobius boleosoma, madrejuile – Una mancha negra ovalada arriba de la base de la aleta pectoral, punto negro en base superior de aleta pectoral; cerca de 5 manchas oscuras redondas o alargadas a lo largo de la parte media de los costados, algunas con extensiones diagonales en forma de “V”; una mancha negra en la base de la aleta caudal.

Ctenogobius fasciatus, gobiio pintado – Margen preopercular oscuro. Gris pálido con 5 manchas negras a lo largo de la línea media de los costados; manchas pequeñas irregulares en la parte superior de los costados; una mancha oscura en forma de luna en la base de la aleta pectoral; aletas mediales con puntos formando franjas (UCR 1067-17).

Ctenogobius stigmaticus, gobio marcado – Tres barras oscuras en la mejilla; una mancha oscura arriba de la aleta pectoral; 3 a 4 manchas alargadas a lo largo de la línea media de los costados (Cervigón 1966).

Ctenogobius pseudofasciatus, gobio imitador – Una banda negra oblicua ancha debajo del ojo; 5 manchas negras a lo largo de la línea media de los costados; coloración en la parte superior de los costados veteado negro-salpicado; aletas verticales con manchitas formando rayas (van Tassell 2006).

GOBIIDAE 4:

Awaous banana, river goby – Snout long and fleshy lips; eyes set high on head. Straw-colored with greenish hues and irregular black blotches on back and upper sides; a diagonal bar between upper opercle to base of pectoral fin; black dots forming stripes on dorsal and caudal fins.

Evorthodus lyricus, lyre goby – Snout very short, steep. Body tan with irregular, narrow dark bars; a distinctive U-shaped dark marking on caudal base. Males with first 4 dorsal spines elongate and 2 pink stripes on caudal fin.

Gnatholepis thompsoni, goldspot goby – A golden orange shoulder spot partially rimmed in black; a brown streak below eye; body tan with russet spots above and diffuse dusky blotches along lower sides.

Gobionellus oceanicus, highfin goby – First dorsal-fin rays elongated; body and caudal fin elongate. Head and body bronze with about 7 dusky blotches along upper sides, first blotch a black *ocellus*, last on base of caudal fin; 6 small blotches along dorsal-fin base; a black bar below eye.

Ctenogobius smaragdus, emerald goby – Pale bluish gray; green spots on head and body, 2 dark blotches on tail base; 5 black blotches along midsides; 2 dark blotches on tail base; dark stripes on dorsal, caudal and pectoral fins. Tail elongate.

Ctenogobius boleosoma, darter goby – A black oval blotch above pectoral-fin base, a minute black dot on upper base of pectoral fin; about 5 round or elongate dark blotches along midsides, some with diagonal V-shaped extensions; a black spot on base of caudal fin.

Ctenogobius fasciatus, blotchcheek goby – Dark preopercular margin; pale gray with 5 black blotches along midsides; small irregular spots on uppers sides; a crescentic dark blotch on base of pectoral fin; median fins with spots forming stripes.

Ctenogobius stigmaticus, marked goby – Three dark bars on cheek; a dark blotch above pectoral fin; 3 or 4 elongate markings along midsides.

Ctenogobius pseudofasciatus, slashcheek goby – A broad oblique black band below eye; 5 black blotches along midsides; black stippling on upper body; median fins with spots forming stripes.

Ctenogobius saepepalens, dash goby – Pale bluish gray; 5 elongate black blotches along midsides; a short black bar below eye and a triangular blotch on opercle; dorsal fin with rows of brown spots, caudal fin with 5 vertical bars.

Ctenogobius saepepallens, gobio listado – Gris azulado pálido; 5 manchas negras alargadas en la línea media de los costados; una barra negra corta debajo del ojo y una mancha triangular en el opérculo; aleta dorsal con filas de puntos cafés, aleta caudal con 5 barras verticales (Gilbert & Randall 1968).

GOBIIDAE 4

