

ANTECKNINGAR ÖFVER HEMIPTERER

AF

ISIDOR NORDIN.

III.*

Förteckning öfver i Lofö socken observerade Hemiptera
Heteroptera:

Sehirus morio L. 2 ex. på *Lamium album* i Slottsparken vid Drottningholm.

Tritomegas biguttatus L. 1 ex. på *Lamium*. Ridhusplanen.

Tritomegas bicolor L. ej sällsynt.

Eurygaster maurus L. 1 ex. på *Scirpus*. Berga torp. (I viken vid Svartsjö slott förekommer den ganska allmänt.)

Aelia acuminata L. allmän.

Neottiglossa inflexa WOLFF ej sällsynt tillsammans med föregående. Bryggargården. (I O. M. REUTERS afhandling: Finlands och den skandinaviska halföns Hemiptera Heteroptera, finnes om denna art ett tryckfel. Det heter: antennernas andra led är tydligt kortare än den tredje, skall vara: tydligt längre än den tredje.)

Peribalus vernalis WOLFF på *Cruciferer*, isynnerhet *Alliaria officinalis*. Slottsparken.

Palomena prasina L. Svanholmen m. fl. st.

Carpocoris nigricornis FABR. Berga, i trädgården, m. fl. ställen.

Pentatoma juniperina L. sparsamt. Smedgården, Berga.

Tropicoris rufipes L. allmän. 1880 förekom den i an-

* Se Entomol. Tidskr. Årg. 4 p. 133 och Årg. 7 p. 51.

märkningsvärd mängd på *Tilia*. Nymfan öfvervintrar under barken och mossan på trädstammar.

Eurydema oleracea L. allmän på *Nasturtium armoracia*. Slottsparken. 1882 förekom härstädes en färgvarietet, som sedermera ej visat sig. De hos arten hvita eller röda fläckarna på pronotum, scutell, hemielytra och ben voro hos denna gula.

Picromerus bidens L. sparsamt på *Acer* i Slottsparken. Pronoti sidotagg kännetecknas icke hos nymfan.

Jalla dumosa L. 1 ex. bland gräs. Ängsholmen.

Troilus luridus FABR. 1 ex. som nymfa, på *Betula*. Slottsparken.

Zicrona coerulea L. På gräs bland *Calluna* erhöles 1885 en nymfa och en imago. Svanteberg. Nymfan lifnärde sig med animalisk spis och imago kläcktes på 17:de dagen efter fångsten.

Acanthosoma hæmorrhoidale L. sparsamt. 1883 förekom den i stor mängd på *Prunus Padus* såväl på Kersön som Lofön.

Elasmostethus dentatus DE GEER. Allmän, isynnerhet på svanholmen i Slottsparken.

Clinocoris ferrugatus FABR. Vår och höst på *Myrtillus*, som växer under *Abies*. Kinaskogen.

Clinocoris griseus L. allmän.

Verlusia quadrata FABR. sparsamt på *Saponaria* i Bryggargården.

Syromastes marginatus L. ej sparsamt. Den uppehåller sig gerna på de mogna frukterna hos *Rubus idæus* i trädgårdar. Orangeriet, Hvilan och Ängsholmen.

Dasycoris pilicornis BURM. här och där sparsamt. På vägen till kyrkan bland *Medicago*, i Smedgården bland *Trifolium* och i Bryggargården bland *Ervum* och *Trifolium*.

Alydus calcaratus L. förekommer bland *Ervum* och *Trifolium*. Solvarma dagar är man säker om att få se den flyga omkring, och sätter den sig då gerna på bergväggar att hvila. Den myrliknande nymfan uppehåller sig under stenar.

Corizus Hyoscyami L. förekommer där *Hyoscyamus* växer. Drottningholmsmalmen, Hvilan; Prestgården m. fl. st. I fångenskap håller den tillgodo med andra växter som föda, men blir då till färgen tegelröd.

Rhopalus abutilon ROSSI. Här och där.

Rhopalus crassicornis L. 1 ex. i Smedgården.

Rhopalus parumpunctatus SCHILL. ej sällsynt bland gräs. Smedgården.

Rhopalus maculatus H. SCH. ej sällsynt. Svanholmen.

Rhopalus capitatus FABR. 2 ex. i Bryggargården, på *Cynanchum vincetoxicum*.

Myrmus miriformis FALL. Allmän som kortvingad. Den långvingade formen är mycket sällsynt, 1 ex. i Smedgården. (På Nordön i Lycke socken, Bohus län förekommer den långvingade formen ej sällsynt.)

Lygæus equestris L. ganska allmän på *Cynanchum* i Bryggargården, Smedgården m. fl. st. Förekommer mycket tidigt om våren; den $\frac{20}{5}$ 84 observerades den på bar mark, in copula.

Nysius thymi WOLFF, FIEB allmän på torra backar bland *Fragaria*. Svanteberg, Smedgården.

Nysius helveticus H. SCH. Sparsamt. Svanteberg.

Nysius punctipennis H. SCH. Sparsamt. Bryggargården.

Cymus glandicolor HAHN ej sparsamt på fuktiga ställen bland halfgräs. Svanholmen.

Ischnorrhynchus Resedæ PANZ. på samma lokal som föregående samt på *Betula*. Ännu sedan frost utan snö inträdt finner man den blida dagar, som nymf eller imago i okt.—dec.

Neides tipularius L. sällsynt. Smedgården. (1886 erhöles arten på Nordön i Bohus län på *Verbascum Thapsus*. Dagligen granskades samma växt under mer än en veckas tid och erhöles för hvarje dag 1 à 2 ex.; inalles 14 ex.)

Berytus clavipes FABR., FALL., 1 ex. på buskar. Nedre terrassen vid Drottningholms slott.

Berytus minor H. SCH. 1 ex. på gräs. Hvilan.

Geocoris gryphoides L. en nymf erhöles den $\frac{14}{7}$ 1884. Smedgården. Imago utkläcktes den $\frac{20}{7}$.

Diplonotus fracticollis SCHILL. 1 ex. bland gräs. Ridhusplanen.

Drymus sylvaticus FIEB. Här och där under stenar, bland mossor och vid växtrötter.

Eremocoris erraticus FABR. ej sparsamt. Kersö skog bland gräs under *Abies*.

Eremocoris plebejus FALL. 1 ex. på gräs. Ängsholmen.

Scolopostethus pilosus REUTER. Här och där.

Scolopostethus affinis SCHIN. Alphyddan.

Gastrodes Abietis L. ej sällsynt på *Abies*, der den öfvervintrar under kottefjällen. Slottsparken.

Gastrodes ferrugineus L. sparsamt i barkspringorna på *Pinus* och *Abies*. Kinaskogen.

Rhyparochromus chiragra FABR. sparsamt. Kinaskogen.

Pterotmetus staphylinoides BURM. 1 ex. bland *Calluna*. Svanteberg.

Macrodema micropterum CURT. sparsamt vid rötterna och bland affallna barr af *Calluna*, under stenar och mossor. Kersöskog, Svanteberg.

Ischnocoris angustulus BOH. som föregående. Svanteberg.

Plinthisus pusillus SCHOLTZ under lafvar på berghällar. Kinaskogen.

Stygnocoris rusticus FALL. Munckens Kulle m. fl. st.

Stygnocoris pedestris FALL. Klockberget.

Peritrechus geniculatus HAHN. Bryggargården.

Trapezonotus anorus FLOR. 2 ex. planen vid Koppartältet.*

Trapezonotus agrestis FALL. allmän.

Pachymerus Pini L. allmän.

Aradus depressus FABR. 1 ex. på gräs. Svanholmen.

Piesma maculata LAP. ej sällsynt Orangeriet.

Piesma capitata WOLFF. ej sällsynt. Orangeriet.

Orthostira nigrina FALL. 2 ex. Klockberget.

Orthostira macropthalma FIEB. 2 ex. Smedgården.

Orthostira gracilis FIEB. sparsamt. Alphyddan.

Orthostira parvula FALL. Här och där under mossor och lafvar på berghällar. Klockberget, Kinaskogen.

Derephysia foliacea FALL. bland gräs. Svanholmen. (1886 erhöles flere ex. af arten under stenar vid hafsstranden. Lycke socken Bohus län.**))

* På samma plats erhöles en Lepidopter: *Sesia Ichneumoniformis*.

** Samma dag och flere dagar efteråt erhöles, på tre à sex decimeters vatten, mellan fastlandet och en holme, under räkfiske, en coleopter: *Haemonia Gyllenhalli* på *Zostera* och *Ruppia*. Närmare 100 ex. erhöles.

Stephanitis Oberti KOL. ej sällsynt på *Myrtillus*. Kinas-
skogen, skogen vid Berga Torp.

Tingis Cardui L. Här och där. Bryggargården.

Gerris rufoscutellata LATR. allmän på dammarna i parken.

Gerris lacustris L. som föregående, i Mälarens vikar.

Ploiaria vagabunda L. 1 ex. på *Abies*. Floras kulle.

Opsicoetus personatus L. Sällsynt. Den $\frac{27}{6}$ och $\frac{4}{7}$
1886 erhöles tvänne ex. i apotekshuset (stenhus). De följande
åren hafva enstaka ex. erhållits på samma ställe.

Coranus subapterus DE GEER ej sällsynt bland gräs och
Calluna. Svanteberg, Hvilan m. fl. st.

Nabis limbatus DAHLB. Här och där bland gräs.

Nabis flavo-marginatus SCHOLTZ. Svanholmen på *Carices*.

Nabis ferus L. allmän.

Nabis ericetorum SCHOLTZ 2 ex. på *Calluna*. Kersön.

Acanthia elegantula FABR. 1 ex. på vattenväxter vid dam-
marna i parken.

Acanthia saltatoria L. under stenar vid sjöstranden.
Kersön.

Cimex lectularius L.

Ceratocombus coleoptratus ZETT i *Sphagnum*-tufvor.
Svanholmen.

Microphysa pselaphiformis WESTW. 1 ex. i fuktig mossas.
Svanholmen.

Myrmedobia coleoptrata FALL. ej sällsynt under mossas
vid trädrötter (*Betula*). Svanholmen.

Triphleps minutus L. i springorna på barken af *Abies*.
Svanteberg m. fl. st.

Anthocoris sylvestris L. allmän.

(Forts.)

Drottningholm i oktober 1890.