



**Herpes circinado:** del latín *circinus*, círculo. Lesión en anillo o fragmento de círculo con centro indemne, observada en infecciones de la piel lampiña producidas por hongos zoofílicos o antropofílicos, o más raramente geofílicos. Muestra crecimiento centrífugo, con borde escamoso, y en ocasiones vesiculoso o pustuloso.

**Imagen en pradera segada:** lengua con lesiones depapiladas y contagiosas que se presentan en la sífilis secundaria.

**Lesiones de Janeway:** máculas hemorrágicas indoloras en palmas y plantas; se producen en la endocarditis infecciosa.

**Levúrides:** reacción alérgica a distancia en pacientes con candidiasis focal. Es una reacción ecematomiforme, pruriginosa, en la que no se puede detectar el hongo.



**Nevo en cockade:** nevo pigmentado con morfología en escarapela o cocarda. Se produce por una especial distribución de las tecas de células névicas.

**Niños rojos:** piel eritematosa, xerótica y liquenificada, que se observa en el Kwashiorkor.



**Pelo en espiral:** se presenta en abdomen o muslos de varones obesos, con pelos de menor grosor, que al no poder penetrar la capa córnea se enroscan.

**Picor del ácaro de la rata:** dermatosis pruriginosa que se presenta en trabajadores de almacenes o fábricas, producida por el ácaro de la rata, *Ornithonyssus bacoti*.

**Ribete de Douget:** en la argiria se produce una banda pigmentada de color azul-grisáceo a nivel de las encías.



**Signo de los dos pies una mano:** corresponde a una infección micótica superficial de ambos pies y una mano.

**Síndrome de reconstitución inmunitaria:** al mejorar el estado inmunitario algunas infecciones pueden empeorar. En el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando asciende el valor de CD4 puede manifestarse como una infección, como por ejemplo, un brote de herpes zoster.