

Glosario semiológico en Dermatología

Ester Avayú¹, Francisco Urbina², Margarita Enberg³, Justo Ibaceta⁴

¹Dermatóloga CRS Cordillera Oriente Peñalolén, Clínica Indisa, Docente Universidad de Chile, Sede Oriente. ²Dermatólogo en práctica privada, Santiago. ³Médico Internista, centro médico MEDNOR, Antofagasta. ⁴Becado de Dermatología, Universidad de Chile.

El glosario semiológico en Dermatología es la recopilación de una gran cantidad de signos, analogías y comparaciones con las que se describen las diversas lesiones y procesos de nuestra especialidad. En esta sección presentaremos en

forma parcelada este recuento, esperando que sea un aporte para recordar o descubrir pistas útiles que nos orienten a un diagnóstico certero.



Empedrado digital (*pebble fingers*): engrosamiento del dorso de los dedos y de los nudillos en forma de pápulas irregulares del color de la piel. Se ve en fase temprana de diabetes *mellitus*.



Escama en oblea: escama blanquecina adherente en su parte central y fácilmente desprendible en la periferia. Se presenta en la pitiriasis liquenoide crónica.

Facies hipocrática: se observa en enfermedades graves como peritonitis o *shock*. El paciente muestra una cara delgada con los ojos hundidos y aparece pálido y sudoroso.



Fenómeno de Meyerson: halo eccematoso que aparece rodeando a lesiones cutáneas névicas o no névicas, tales como léntigo, picaduras de insecto, carcinoma basocelular o espinocelular, queratosis seborreica, queloides o nevo flámeo.

Fuego de San Antonio: nombre popular dado a la erisipela, y también al herpes zoster, debido a la creencia que la intercesión de San Antonio podría curarla.

Hombre naranja: infiltración porcelánica, cérea o anaranjada y en ocasiones esclerodermiforme, que se observa en la amiloidosis difusa sistémica primaria.

Oleoma o eleidoma: granuloma a cuerpo extraño provocado por la penetración de grasa en la piel (aceite vegetal).



Piel en rallador de nuez moscada: denominación descriptiva para la pitiriasis *folliculorum*, variedad de demodicidosis caracterizada por una infestación abundante de ácaros de *Demodex folliculorum*. Se presenta con una piel áspera a nivel de la cara, descrita como papel de lija o en rallador de nuez moscada.

Pléyade: grupo de personas famosas, especialmente en las letras, que viven en la misma época. En dermatología, se emplea para describir la presencia de adenopatías pequeñas rodeando un ganglio central más grande; se presenta en la sífilis primaria.

Puntos pruriginosos (*puncta prurítica*): aparición de picazón en dos o tres zonas de piel normal, donde posteriormente se desarrollan queratosis seborreicas.

Queratosis en estrella de mar: sobre superficies extensoras de codos, rodillas y nudillos se observan queratosis peculiares con dicha forma; se produce en la queratodermia palmoplantar de Vohwinkel.

Signo cervical o del cuello: formación de un surco en la piel del cuello al extender la cabeza. Se ve en la mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica progresiva.

Signo de Groove: aparición de adenopatías por encima y por debajo del ligamento de Poupart a nivel inguinal. Es característico del linfogranuloma venéreo.

Signo de la hombrera: infiltración amiloidea de las articulaciones escápulo-humerales semejante a las "hombreras" de los jugadores de fútbol americano. Este signo, junto al síndrome del túnel carpiano y aparición de púrpura en los pliegues cutáneos induce a la sospecha de amiloidosis primaria.

Signo de Trousseau: tromboflebitis migratoria que se presenta como un signo paraneoplásico, asociado principalmente a carcinoma de páncreas.

Tanorexia: obsesión extrema de obtener y mantener un tono bronceado de la piel, bien por exposición solar o en solarío

Tétrada del acné: procesos caracterizados por oclusión folicular entre los que se incluyen el acné inverso, la celulitis disecante de cuero cabelludo, el acné *conglobata* y el quiste pilonidal.

Tríada de las tres D: dermatitis, diarrea y demencia, producidas por déficit de vitamina B3 en la pelagra.

Tricobezoar: cuadro de obstrucción intestinal producido por deglución de pelos.

Vainillismo: dermatosis pruriginosa que aparece en personas que manipulan cañas de vainilla, producida por picaduras del *Acarus siro*.