

**МІНІСТЕРСТВО  
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF ECONOMY, TRADE  
AND AGRICULTURE OF UKRAINE

**УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ  
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН**  
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

# **ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН**

*PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION*

**Офіційне видання**  
Official publication

**Бюлетень**  
Bulletin

**1**  
**2020**

Вінниця  
2020



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF ECONOMY, TRADE AND AGRICULTURE OF UKRAINE  
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН  
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

# ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

*PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION*

Бюлетень  
Свідоцтво КВ № 22460-1236 ПР  
від 01.03.2017

Видається  
6 разів на рік

Заснований  
24 січня 2003 р.

Випуск 1, 2020



Український інститут  
експертизи сортів рослин  
UKRAINIAN INSTITUTE FOR  
PLANT VARIETY EXAMINATION

**Головний редактор**  
Мельник С. І.

**Editor-in-chief**  
S. Melnyk

**Редакційна колегія**  
Лещук Н. В.  
(заступник головного редактора)  
Павлюк Н. В.  
(відповідальний секретар)  
Барбан О.Б.  
(технічний секретар)

**Editorial board**  
N. Leshchuk  
(deputyies editor-in-chief)  
N. Pavlyuk  
(executive secretary)  
O. Barban  
(technical secretary)

Ткачик С. О.	S. Tkachyk
Києнко З. Б.	Z. Kyienko
Васьківська С. В.	S. Vaskivska
Гринів С. М.	S. Gryniv
Стариченко Є. М.	Y. Starychenko
Хоменко Т. М.	T. Khomenko
Попова О. П.	O. Popova
Якубенко Н. Б.	N. Yakubenko

# 1 2020

м. Вінниця  
ТОВ «ТВОРИ»  
2020

УДК 347.77:633(055)

0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ» – 2020. – Вип. 1. – 784 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Поширюється для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів. Представляє також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

**Адреса видавця:**

Український інститут експертизи сортів рослин,  
вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,  
тел.: +38 044 258-34-56, факс: +38 044 257-99-63  
e-mail: [sops@sops.gov.ua](mailto:sops@sops.gov.ua),  
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

## ЗМІСТ

<b>Відомості, внесені до Реєстру заявок</b>	7				
Заявки на сорти рослин, за якими запропонована інша назва сорту	7				
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	9				
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	12				
<b>Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин</b>	13				
<b>Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин</b>	16				
<b>Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів рослин України)</b>	23				
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Реєстру сортів рослин України	23				
<b>Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні</b>	41				
Відомості про сорти рослин, які включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	41				
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	64				
<b>Сільськогосподарські:</b>					
<b>злаки</b>					
<i>Жито посівне (озиме) – батьківський компонент</i>					
Лo1018П Лo1015Н					
Лo1019П Лo1059Н					
<b>Кукурудза звичайна</b>					
Алькор					
Амелло					
Б2190					
Віра					
ВІРЖІЛІО					
Галардо					
ДКС5075					
ЕС БРОДВЕЙ					
ЕС ГЕДЕОН					
ЕС ДЕКАРТ					
ЕС ДЖЕНТЛЬМЕН					
ЕС ЛЕГОЛАС					
ЕС ПЕРСПЕКТИВ					
ЕС РАНВЕЙ					
ЕС ХЕТТРИК					
ЕС ЯКАРІ					
Жаклін					
ЗУР204					
ЗУР307					
КВС ГРАНАДОС					
КВС КАШЕМІР					
Кіянті КС					
КОЛЕТІС					
Кунео					
Ламасан					
Ліворно					
МАС 308А					
МАС 34Б					
МАС 48Л					
МАС 49П					
МАСТОР	96	СХ 250	137	КВ 5Ф1731	174
Мегаліто	97	СХ 300	138	КВ 7Р1104	175
Мейфлавер	98	СХ 320	139	КВ 9Д1533	176
Меттью	99	Тавричанка	140	КВ 9ЕЙ0015	177
МОНСТР	100	Філмено	141	КЮВІ504	178
Олешківський	101	Чорномор	142	ЛЖР2038 ЛМР3185	179
Остін	102			ЛІМІВВ957С	
П0268	103	<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</b>	143	ФБВ1130	180
П0312	104			ЛІН2248	181
П0349	105			ЛІФ2184	182
П0362	106	156ЛА337	143	ЛЛР2961	
П7515	107	156ЛА337Х 14Б001	144	ЛМР3185	183
П8358	108	223ДХ002	145	ЛМХ3164	184
П8707	109	227ВБ025	146	ЛНР3495	185
П8834	110	262БХ503	147	ЛОР3690	186
П9071	111	3МГ6403	148	ЛОР3696	187
П9074Е	112	441ХФ006	149	М 242 ЗС	188
П9170	113	443УК319	150	МАС385	189
П9363	114	444СХ118	151	МБС4300	190
П9537	115	483ЮХ037	152	ММЛ525	191
П9757	116	ССС3996	153	МС 150	192
П9874	117	СМС3999	154	МС 200	193
Палізі КС	118	АВ01236Ц	155	МС 262 ЗС	194
Пітч	119	АІІ574	156	МС 264 СВ	195
Поезі КС	120	АІО1881АІО1884	157	НПАКс4072	196
РЖТ АТТРАККСІОН	121	Анапа С	158	ПХ43МВ	197
РЖТ ДАМІККСУС	122	ГД47ГД48	159	Р15021	198
РЖТ ЕККЗЕМПЛЯР	123	ДАКс3360	160	Р15037	199
РЖТ ЕККСКІ ДУО	124	ДІД3464	161	Р16089	200
РЖТ ЗАНЕТІККС	125	ДП32 ДЛ26	162	РВІ442 РВІ441	201
РЖТ ЛІЖЕТТІККС	126	ЕАКс5121	163	СМС2311 ЛЖР2038	202
РЖТ МАККСАТАК	127	ЕГ2363	164	ССС2121	203
РЖТ РЕАККСІОН	128	ЕГ3036	165	ССС3157	204
Селеніа	129	ЕГ7471	166	ФІІ422 ФІІ424	205
СИ МАРІМБА	130	ЕГ7А97	167	ХІД3347	206
СИ ОКТЕОН	131	ЕС3556	168	ЦАЛ2261	207
СИ ПРЕМЕО	132	ЕС4585	169	ЦАФ3362	208
СИ ТОРІНО	133	ЕС4604	170	ЦІД2108	209
СИ ТРІВІУС	134	ІАКс3300	171	ЦІД2268	210
Стардаст	135	ІФА4226	172	ЦІД2457	211
СХ 200	136	КВ 4ЕХ1630	173	Ш1135	212



Ш3637	213	КВС Кріссі	246	<b>Льон низький</b>	<b>Соняшник</b>	
Ш6210	214	Кларінетте	247	<b>(олійний, кудряш)</b>	<b>однорічний</b>	336
		Маріан	248	Дунай	АВСТРАЛІЯ	336
<b>Пшениця</b>		МІП Девіз	249		Аламбра КС	338
<b>м'яка (озима)</b>	215	МІП Захисник	250	<b>Ріпак (озимий)</b>	АН20ЛЕ01	340
Лаваль	215	МІП Титул	251	Абсолют	АН20ЛМ01	342
Мауріціо	216	МІП Шарм	252	АВАЛ	АН20ЛМ02	344
МІП Лада	217	СБ Комфорт	253	Арканзас	АН20ЛМ03	346
МІП Фортуна	218			Аспект	Анастасія ОР	348
МІП Ювілейна	219	<b>Сільськогосподарські:</b>		Атракція	Аргенсол 72 КЛ	350
Мірастар	220	<b>бобові</b>		Берні	АЯКС	352
РЖТ Преміант	221	<b>Горох посівний</b>		ГІМАЛАЇ КЛ	Балу	354
Саласар	222	<b>(зерновий)</b>	255	ДК Експіро	Бонасол ЖМР	356
Соборна	223	Люмп	255	ДК Експрешн	ВОЛВЕРІН	358
СОРРІАЛ	224			ДК Екстрайм	Драган ОР	360
СОФІ КС	225	<b>Нут звичайний</b>	257	ДК Екстракт	ДСХ415КЛ	362
СОФРУ	226	Степовий велет	257	ДК Імпеллер КЛ	ЕС АКСОН СУ	364
Топкапі	227			Домінатор	ЕС Альфа	366
Хліб Аріїв	228	<b>Соя культурна</b>	258	Домінік	ЕС АРМОНІКА	368
ШТРУ 080150с5	229	Албенга	258	ІМАНІ	ЕС Берекет	370
		Алтона	259	КВС КЕРРІ КЛ	ЕС ВІЛЛІС КЛП	372
<b>Пшениця</b>		Астор	260	КВС КИРИЛ КЛ	ЕС ЕЛЕКТРИК КЛП	374
<b>м'яка (яра)</b>	230	Ауреліна	261	Келтор	ЕС КОЛОРИС КЛ	376
Лікамеро	230	Балатон	262	КЛАВІР КЛ	ЕС Саксон	378
ПС Петра	231	Беттіна	263	КРИСТАЛ	ЖИРАЛ	380
ШТРУ 093736с4	232	Браун	264	Лексіон	Зурфер КЛ	382
		Віолетта	265	Принц	Інесол	384
<b>Пшениця</b>		ЕС ГОВЕРНОР	266	ПТ274	КАМПБЕЛЛ	386
<b>спельта (озима)</b>	233	ЕС ДИРЕКТОР	267	ПТ275	КВС АХІЛЛЕС КЛП	388
Аттергауер Дінкель	233	Нептун	268	ПХ128	КВС ЛОГОС КЛ	390
		Ольвія	269	Ренді	Княжий	392
<b>Пшениця</b>		Регіна	270	СТЕФАНО КВС	КС Браво	394
<b>тверда (озима)</b>	234	СВХ15Т1С1	271	Темптейшн	КС Цорба	396
Кораловий	234	СВХ16Т00С2	272	ФРАНКЛІН	Латітуда ОР	398
Людмила	235	СВХ17Т00С15	273		ЛГ50480	400
МІП Лакомка	236	Сіпресс	274	<b>Ріпак (озимий) –</b>	ЛГ50510	402
Надійний	237	СІРЕЛІЯ	275	<b>батьківський</b>	ЛГ50521 КЛП	404
		Тала	276	<b>компонент</b>	ЛГ50609 СХ	406
<b>Пшениця</b>				ВНІС 1	ЛГ50662	408
<b>тверда (яра)</b>	238	<b>Сільськогосподарські:</b>		ГО 44	ЛГ50797 КЛП	410
ОДІССЕО	238	<b>круп'яні</b>		ГО 67	ЛНЗ 01	412
Ремарка	239	<b>Рис посівний</b>	278	ДС1993	ЛС ГЛОБСАН	414
ФУЕГО	240	Морячок	278	ІСС659	М96КЛ02	416
		Фагот	279	МЕЛ 1	М96С33	418
<b>Ячмінь</b>				МЕЛ 2	М98КЛ88	420
<b>звичайний</b>		<b>Сорго звичайне</b>		МО 62	МАНХЕТТЕН КЛП	422
<b>(озимий)</b>	241	<b>(двокольорове)</b>	280	РММС9686А	МАС 805А	424
ЛГ Тріумф	241	341Х120	280	РММС9695Р	МАС 83СУ	426
МІП Статус	242	419Х124	281	СКМО 193	МАС 870Г	428
СИ ГАЛІЛЕО	243	АРЕЛЬДО	282	СС250Д	МАС 880СУ	430
		Бенггал	283	СС317	МАС 90ІР	432
<b>Ячмінь</b>		ЕУГ542Ф	284	СС398	МЕНДЕЛЬ	434
<b>звичайний (озимий) –</b>		КВС ФОБОС	285	СС403	Міранда ЗУ	436
<b>батьківський</b>				ССР219	НС КОНСТАНТІН ОР	438
<b>компонент</b>	244	<b>Сільськогосподарські:</b>			П64ГГ132	440
РЕ29	244	<b>олійні та прядивні</b>		<b>Ріпак (ярий)</b>	П64ГЕ144	442
		<b>Коноплі посівні</b>	287	Клеопатра	П64ЛЕ136	444
<b>Ячмінь</b>		Мрія	287	САОКЕР КЛ	П64ЛЛ138	446
<b>звичайний (ярий)</b>	245				ПОВЕРСАН	448
Елінор	245				РЖТ БЕЛЛОНА	450

РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР	452	КТ 22 А	534	ФДР18Б1089	591	<b>Дворядник</b>	
РЖТ ДОНАТЕЛЛО	454	КТ 22 Б	535	ФДР18Б4020	592	<b>тонколистий</b>	617
РЖТ КАСТЕЛЛАНО		КТ 24 Б	536			Летіція	617
КЛП	456	ЛГ71234МІА	537	<b>Сільськогосподарські:</b>			
РЖТ САЛЛЬВАДОР	458	ЛГ7512340А	538	<b>картопля</b>		<b>Диня звичайна</b>	618
РЖТ ФРАНКЛІН	460	МР7314	539	<b>Картопля</b>	594	Санвісенте	618
Річард	462	Р1119ЖІ	540	Джолі	594		
САБВЕЙ	464	Р11СТ6М2І	541	Сагіта	595	<b>Кабачок</b>	620
САЙБЕРІК	466	Р1307І	542	Таурас	596	ГОЛДЕН ГЛОРІ	620
САКСЕСС	468	Р1359МЖ	543	Торнадо	597		
Салвасол	470	Р13ГВ1МЖК	544			<b>Кавун звичайний</b>	622
САНБРЕЛА	472	Р469МЖКО	545	<b>Сільськогосподарські:</b>		БАРХАН	622
СИ ДАКСТОН	474	Р4НП8МЖС	546	<b>кормові</b>		ВМХ4746	623
СИ КУПЕР КЛП	476	Р5ПЕ4МС	547	<b>Боби кінські</b>	599	Морган	624
СУДОКУ	478	Р6ПХ4ЖМ	548	Сіріус	599	Оранж Кінг	625
СХ 2321	480	Р78033Ж	549			Тамтам	626
СХ 2563	482	РХАНМ17РФІМІ	550	<b>Грястиця</b>			
СХ 5220	484	СР1087МСО	551	<b>збірна</b>	600	<b>Капуста</b>	
Тайлер	486	ТРІ4387Р	552	Альдебаран	600	<b>білоголова</b>	627
Терасан КЛ	488	ТРІ4495Р	553			Бухарест	627
Тібо	490	ТРІ5018Р	554	<b>Костриця</b>		ГАЛЛІКАН	628
ФЛОРМАСТЕР ІР	492	ТРС5017Р	555	<b>овеча</b>	601	Грін Флеш	629
Фолк	494	ТРХ5019Р	556	Думас 1	601	Заказ	630
Хайсан 180 ІТ	496	ТФІ4494А	557			Канто	631
Хайсан 218	498	ТФС3769А	558	<b>Костриця</b>		ПРОДІКОС	632
Хайсан 228	500	ТФХ4746А	559	<b>очеретяна</b>	602	ТОРЕАДОР	633
Хелесан СУ	502	У14ЛГЦЛЛМ	560	Томкет 1	602		
ХФ16611	504	УН 715 РХА	561			<b>Капуста</b>	
		Ф1316ГФ	562	<b>Костриця</b>		<b>броколі</b>	634
<b>Соняшник однорічний –</b>		Ф5ДЦ5МСА	563	<b>червона</b>	603	Сігно	634
<b>батьківський</b>		Ф754271МА	564	ГРІНМІЛ	603		
<b>компонент</b>	506	Ф7АХ2МЖА	565	Корейл	604	<b>Капуста</b>	
113 Р	506	Ф7АХ2МЖКА	566	ПІНАФОР	605	<b>кольрабі</b>	635
2603Х1093	507	Ф9ЕС4МІОА	567			Лех	635
49Ц01А	508	Х09951Р	568	<b>Люцерна</b>			
56Ц20Р	509	Х11050Р	569	<b>мінлива</b>	606	<b>Капуста</b>	
639 Р	510	ХА1АСУ	570	Луїза	606	<b>пекінська</b>	636
63Г13іс	511			Одрі	607	Пікаліна	636
67К23Р	512	<b>Сільськогосподарські:</b>					
7ПГЛК23Р	513	<b>буряк</b>		<b>Люцерна</b>		<b>Капуста</b>	
АГ 238 АКЛ	514	<b>Буряк цукровий</b>	572	<b>посівна</b>	608	<b>цвітна</b>	637
АГ 438 РКЛ	515	АННАМІРА КВС	572	Мілкі Макс	608	Аквата	637
АР 002 Б	516	БТС 1730	573	Оксітан	609	Ількар	638
АР 003 Б	517	БТС 4905 Н	574	Радослава	610	Овіндолі	639
ВЛ 1120А	518	БТС 5735	575				
ВЛ 1240Б	519	БТС 7160	576	<b>Просо</b>		<b>Кукурудза</b>	
ВН 1080А	520	БТС 9975	577	<b>африканське</b>	611	<b>цукрова</b>	640
ВН 2821В	521	ІГУАНА	578	Нутріфід	611	Мірза	640
ВН 3040А	522	КОНЦЕРТІНА КВС	579			Турбін	641
ВН 6045А	523	ЛІВІОЛА КВС	580	<b>Сільськогосподарські:</b>			
ВН 6079В	524	МАНІТУ	581	<b>овочеві</b>		<b>Кукурудза</b>	
ВН 6531В	525	ПРЕЦІОЗА КВС	582	<b>Баклажан</b>	613	<b>цукрова –</b>	
ВН 7050А	526	САНТОРІНА КВС	583	МОДАР	613	<b>батьківський</b>	
ВН 7152В	527	СІУ	584			<b>компонент</b>	642
ДС 58 Б	528	СМАРТ БРІГА КВС	585	<b>Буряк столовий</b>	614	Багнет	642
ДС 87 В	529	СМАРТ ДАНУТА КВС	586	Маноло	614	МС 736	643
ЕХ935	530	СМАРТ НАРНІЯ КВС	587	Ред Бул	615	МС 880	644
ІМІ 3 ДМ	531	СТЕПАНКА КВС	588			МС 999	645
КС 501 В	532	Фантазія	589	<b>Вігна промениста</b>	616	ОС 711	646
КС 505 В	533	ФДР18Б1086	590	Заратустра	616		

<b>Морква</b>	647	Пінкшайн	691	Веродіта	727	<b>Лохина</b>	
Волін	647	ПРАЙД	693	Мунред	728	<b>високоросла</b>	749
Лес Саїнтес	648	Саворина	695	Тотана	729	Ласка	749
Нарина	649	Саймон	697	Тудела	730	Мавка	750
Новара	650	Сентоса	699				
		СІК1504	701	<b>Холодок</b>		<b>Малина</b>	751
<b>Огірок посівний</b>	651	Страбена	703	<b>лікарський</b>		Глен Файн	751
БАЗИС	651	Стромболіно	705	<b>(спаржа)</b>	731	Дрісколл Маравілла	752
Мадейра	652	Філовіта	707	Бахус	731		
Міф	653	Фуджімару	709	Кумулюс	732	<b>Ожина</b>	753
Северін	654			Пріус	733	Лох Тей	753
УБЕДА	655	<b>Редька</b>		Сігнулс	734		
УНІКУМ	656	<b>посівна</b>				<b>Персик</b>	
		<b>(редиска)</b>	711	<b>Цибуля городня</b>	735	<b>звичайний</b>	754
<b>Перець</b>		Бодіам	711	Монделла	735	Мостиський	754
<b>однорічний</b>		ФІЛІПАР	712	Орленда	736	Мостиський	
<b>(солодкий)</b>	657			Поконо	737	діамант	756
Арбалет	657	<b>Салат</b>		Сонома	738		
Венера	658	<b>посівний</b>				<b>Слива домашня</b>	758
Декстер	659	<b>головчастий</b>	713	<b>Цикорій</b>		Янтарна мліївська	758
Джіалте	660	Алессо	713	<b>салатний</b>			
Драгоні	661	Брайтон	714	<b>(ендивій)</b>	739	<b>Чорниця</b>	760
Мавера	662	Джойс	715	Бенефайн	739	ВВ006	760
Ньютон	663	Едуардо	716	Калафайн	740	ВВ008	761
Раптор	664	Лектріс	717			РЕКА	762
Сардінеро	665	Топацио	718	<b>Плодові та ягідні</b>			
ТОМ	666	Ферлі	719	<b>Вишня звичайна</b>	742	<b>Яблуна домашня</b>	763
				Пам'ять Артеменка	742	СКЮ 159	763
<b>Помідор</b>		<b>Салат</b>					
<b>їстівний</b>	667	<b>посівний</b>		<b>Горіх грецький</b>	743		
Бірікіно	667	<b>листяковий</b>	720	ГЕТЬМАН	743	<b>Декоративні</b>	
Вігго	669	Біондонна	720	КРАСЕНЬ	744	<b>та лікарські</b>	
Джорней	671	Екстемп	721	ТАІСІЯ	745	<b>Троянда</b>	765
ДРЦ 564	673	Кодекс	722			РЮІЦЛ 1632А	765
Камі	675	Лалік	723	<b>Груша</b>			
Компліс	677	Лока	724	<b>звичайна</b>	746		
Куртіно	679	Солос	725	Новинка мліївська	746	<b>Інші</b>	
Нуксі	681					<b>Павловнія</b>	768
Органза	683	<b>Салат</b>		<b>Калина</b>		Котевіса 1	768
Панамера	685	<b>посівний</b>		<b>звичайна</b>	748	Котевіса 2	769
ПІНК СВІТНЕС	687	<b>ромен</b>	726	Аня	748		
ПІНКІД	689	Армілья	726				
<b>Інші відомості</b>							770
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників сортів, володільців патенту							770
Загальноновживані скорочення термінів							782

# Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

## Заявки на сорти рослин, за якими запропонована інша назва сорту

Plant varieties applications, for which proposed other variety denomination

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Запропонована інша назва сорту Other proposed variety denomination	Заявник Applicant	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
<b>Кукурудза звичайна</b>					
18009105	03.12.2018	ЛЗМ36808 LZM36808	ЛГ31330 LG31330	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18009129	04.12.2018	ЕС38309 ESZ8309	ЕС МІЛЕДІ ES MYLEDY	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18009155	03.12.2018	ОС 3114 OS 3114	Спартан Spartan	2537	ПС, РС PBR, NLI
<b>Соняшник однорічний</b>					
16039032	29.09.2016	ХФ16611 XF16611	П64ЛП140 P64LP140	9	РС NLI
18039024	08.10.2018	ХФ16728 XF16728	П64ГГ150 P64HH150	9	РС NLI
18039026	08.10.2018	ХФ16730 XF16730	П63ГГ142 P63HH142	9	РС NLI
18039050	28.11.2018	КХБ8311 KHB8311	КВС ЦЕЗАРЕС КЛ KWS CESARES CK	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039052	28.11.2018	КХБ8611 KHB8611	КВС АМОРЕС КЛ KWS AMORES CL	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039053	28.11.2018	КХБ8511 KHB8511	КВС АВГУСТЕС КЛ KWS AUGUSTES CL	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039074	29.11.2018	ЕСХ8040 ESH8040	ЕС ЯНКІС КЛП ES YANKIS CLP	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039079	29.11.2018	ЕСХ8016 ESH8016	ЕС ДОНАТЕЛА ES DONATELA	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039080	29.11.2018	ЕСХ7042 ESH7042	ЕС АНТЕМІС КЛП ES ANTHEMIS CLP	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039081	29.11.2018	ЕСХ9138 ESH9138	ЕС БЕЛФІС ES BELFIS	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039084	29.11.2018	ЕСХ9133 ESH9133	ЕС ГУДЗОН СУ ES HUDSON SU	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039085	29.11.2018	ЕСХ8039 ESH8039	ЕС АГРАРІС КЛП ES AGRARIS CLP	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039087	29.11.2018	ЕСХ9153 ESH9153	ЕС ЕЛЕНІС ES ELLENIS	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039088	29.11.2018	ЕСХ8007 ESH8007	ЕС ПРОКСІМА ES PROXIMA	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039089	03.12.2018	КСФ 18108 CSF 18108	КС Клерія КЛ CS Cleria CL	2534	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039090	03.12.2018	КСФ 18907 CSF 18907	КС Канарія СУ CS Canaria SU	2534	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039115	03.12.2018	ЗУ РО 16-2 СУ SU RO 16-2 SU	Алекса СУ Alexa SU	2537	ПС, РС PBR, NLI
18039116	03.12.2018	ЗУ РО 16-1 СУ SU RO 16-1 SU	Даверо СУ Davero SU	2537	ПС, РС PBR, NLI
18039133	17.12.2018	Агат Agat	Опал Opal	2548	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039159	27.12.2018	ОБ 19 OB 19	Маестро Maestro	2555	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18039160	27.12.2018	ОБ 18 OB 18	Санні Sanni	2555	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
19039015	08.02.2019	ЗУ РО 16-2 ОРО SU RO 16-2 ORO	ЗУРО 162 SURO 162	2537	РС NLI
<b>Соя культурна</b>					
18045003	10.01.2018	ПАМ2800 PAM2800	Джейд Jade	2264	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18045033	04.12.2018	ЕСГ1722 ESG1722	ЕС ПРОФЕСОР ES PROFESSOR	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18045036	04.12.2018	ЕСГ1812 ESG1812	ЕС ЧЕНСЕЛОП ES CHENCELLOR	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18045040	04.12.2018	ЕСГ161 ESG161	ЕС ДЕКОР ES DECOR	806	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
<b>Сорго звичайне (двокольорове)</b>					
18018001	27.11.2018	РХС1822 RHS1822	РЖТ АЛІГАТОР RGT ALIGGATOR	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18018005	10.12.2018	КСХ7Г19 KSH7G19	КВС РАСМУС KWS RASMUS	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Запропонована інша назва сорту Other proposed variety denomination	Заявник Applicant	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
<b>Пшениця м'яка (дворучка)</b>					
18140001	05.12.2018	ЛВ07СВ017-03 LW07SW017-03	Едда Edda	2524	РС NLI
<b>Пшениця м'яка (яра)</b>					
18013002	26.12.2018	ВПБ 09СВ064-20 WPB 09SW064-20	ВПБ Трой WPB Troy	2513	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
<b>Ріпак (озимий)</b>					
17040009	02.02.2017	ДК Імпеллер КЛ DK Impeller CL	Вестал КЛ Vestal CL	844	ПС, РС PBR, NLI
18040039	07.06.2018	ВРХ 497 WRH 497	Людгер Ludger	807	РС NLI
18040041	07.06.2018	ВРХ 511 WRH 511	Батис Batis	807	РС NLI
18040043	07.06.2018	ВРХ 521 WRH 521	Дайнемік Dynamic	807	РС NLI
18040044	07.06.2018	ДМХ 364 DMH 364	Донат Donut	807	РС NLI
18040045	07.06.2018	ДМХ 401 DMH 401	Докер Docker	807	РС NLI
18040046	07.06.2018	ДМХ 435 DMH 435	Сімплекс КЛ Simplex CL	807	РС NLI
<b>Пшениця м'яка (озима)</b>					
17012051	21.12.2017	ЛГВД144469СА LGWD144469SA	ЛГ КЕРАМІК LG KERAMIK	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
17012052	21.12.2017	ЛГВД143055А LGWD143055A	ЛГ ЕГМОНТ LG EGMONT	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18012043	07.06.2018	ЛЕУ 50218 LEU 50218	Архітект Architekt	807	ПС, РС PBR, NLI
18012044	07.06.2018	ЛЕУ 50307 LEU 50307	Аскабан Askaban	807	ПС, РС PBR, NLI
<b>Жито посівне (озиме)</b>					
18015005	09.01.2018	КВС Х188 KWS H188	КВС Мотиватор KWS Motivator	824	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
<b>Огірок посівний</b>					
18110014	26.11.2018	12-311 12-311	Бридж Bridge	1730	РС, АС NLI, AC
<b>Костриця несправжньоовеча</b>					
19660001	27.03.2019	Тонга Тонга	Інгела Інгела	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
<b>Ячмінь звичайний (ярий)</b>					
18020011	26.12.2018	НОРД 16/2320 NORD 16/2320	НОРД 16 2320 NORD 16 2320	1223	ПС, РС PBR, NLI
18020012	26.12.2018	НОРД 16/2321 NORD 16/2321	НОРД 16 2321 NORD 16 2321	1223	ПС, РС PBR, NLI
<b>Буряк цукровий</b>					
05013030	22.12.2005	Тарім Tarim	Тарім Tarim	796	ПС, РС PBR, NLI
11013041	22.12.2011	Гоеланд Goeland	Гоеланд Goeland	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
13069020	24.12.2013	ШЕВАЛЬЕ CHEVALIER	Шевальє Chevalier	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
13069021	24.12.2013	БЕРНАШ BERNACHE	Бернаш Bernache	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
17069033	13.12.2017	ФДР18Б1089 FDR18B1089	ФД Сокол FD Sokol	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
17069034	13.12.2017	ФДР18Б1086 FDR18B1086	ФД Форсаж FD Forsage	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
17069035	13.12.2017	ФДР18Б4020 FDR18B4020	ФД Хокей FD Khokkey	796	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18069015	10.12.2018	9К903 9К903	СМАРТ ЛАТОРІЯ КВС SMART LATORIA KWS	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18069016	10.12.2018	9К910 9К910	СМАРТ ЯСНА КВС SMART JASNA KWS	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18069018	10.12.2018	9К975 9К975	МАРГАРИТА КВС MARGARITA KWS	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18069019	10.12.2018	9К911 9К911	СМАРТ ДЖІНЕВРА SMART GINEVRA KWS	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18069020	10.12.2018	9К906 9К906	АЛЬВЕРІНА КВС ALVERINA KWS	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18069021	10.12.2018	9К900 9К900	СМАРТ ІБЕРІЯ КВС SMART IBERIA KWS	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC
18069025	10.12.2018	9К902 9К902	СМАРТ ЛЕОНА КВС SMART LEONA KWS	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC

**Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними****Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn**

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) a: Applicant (code) в: Представник (код) v: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>					
09004727	30.11.2009	ЕС Флато ES Flato	a: 806 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
12004224	12.12.2012	Валледо Valledo	a: 2011 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
17009170	06.12.2017	ДС1901С DS1901C	a: 2094 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
17009171	06.12.2017	ДС1902С DS1902C	a: 2094 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
17009173	06.12.2017	ДС1811С DS1811C	a: 2094 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
17009174	06.12.2017	ДС1889В DS1889B	a: 2094 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
18009113	30.11.2018	КСМ 18370 CSM 18370	a: 2534 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
18009114	30.11.2018	КСМ 18266 CSM 18266	a: 2534 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
18009121	30.11.2018	КСМ 18576 CSM 18576	a: 2534 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
18009122	30.11.2018	КСМ 18472 CSM 18472	a: 2534 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
18009123	30.11.2018	КС Панорамі CS Panorami	a: 2534 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
19009079	03.10.2019	Х08М594 X08M594	a: 9 в:	РС NLI	28.02.2020
19009090	03.10.2019	Х90Н374 X90N374	a: 9 в:	РС NLI	28.02.2020
19009154	27.11.2019	Р8329 P8329	a: 1688 в:	ПС PBR	26.02.2020
19009191	06.12.2019	РХ19025 RH19025	a: 1783 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
<b>Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)</b>					
17012030	07.06.2017	ББ 672913 BB 672913	a: 926 в:	ПС, РС PBR, NLI	26.02.2020
19012065	19.06.2019	АКСАР0 AXARO	a: 1498 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	17.02.2020
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>					
17020007	24.11.2017	Віланда Wylanda	a: 1223 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	27.02.2020
19020012	13.12.2019	Айрвей Airway	a: 2313 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
19020013	13.12.2019	Іствей Eastway	a: 2313 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
<b>Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea</b>					
19023004	13.12.2019	Мікка Mikka	a: 2313 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
19023005	13.12.2019	Грінвей Greenway	a: 2313 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>					
16039036	29.09.2016	Р63ГГ135 P63HH135	a: 9 в:	РС NLI	28.02.2020
17039043	17.01.2017	СУЗЕТТА SUZETTA	a: 2011 в:	РС NLI	28.02.2020
17039122	05.12.2017	НХ82235 NX82235	a: 1219 в:	РС, АС NLI, AC	28.02.2020
17039131	07.12.2017	САМАРА SAMARA	a: 2256 в:	РС NLI	28.02.2020
18039029	25.10.2018	МЖТ98269 MGT98269	a: 924 в:	РС, АС NLI, AC	28.02.2020
19039026	01.10.2019	МЖТ98279 MGT98279	a: 924 в:	РС, АС NLI, AC	28.02.2020

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) a: Applicant (code) в: Представник (код) v: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
<b>Ріпак (озимий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter)</b>					
06016038	15.11.2006	Клеопатра	a: 350 169 538	ПС, РС PBR, NLI	26.02.2020
16040001	01.02.2016	ДК Сектор	a: 844	ПС, РС PBR, NLI	26.02.2020
16040020	06.04.2016	СІЛЬВЕР	a: 1793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	27.02.2020
17040010	02.02.2017	ДК Секрет	a: 844	ПС, РС PBR, NLI	26.02.2020
17040019	21.04.2017	ВАМПІР	a: 912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	27.02.2020
17040025	21.04.2017	6EВ0175	a: 2196	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
18040019	03.05.2018	7EВ0211	a: 2196	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
18040022	03.05.2018	7EВ0215	a: 2196	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
18040023	03.05.2018	ІНВ2000 ПС	a: 2196	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
18040025	03.05.2018	7EВ0193	a: 2196	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
<b>Ріпак (ярий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Spring)</b>					
18041001	26.12.2018	ДЛЕ19817С11	a: 912	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
<b>Соя культурна <i>Glycine max (L.) Merrill</i> Soya Bean</b>					
14045014	24.11.2014	Парадіс	a: 2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	28.02.2020
16045011	23.12.2016	Санрайз	a: 2258	ПС, РС PBR, NLI	17.02.2020
<b>Цибуля городня <i>Allium cepa L.</i> Onion, Echalion</b>					
18106008	23.04.2018	Ялтинська солодка	a: 2200 2485	РС, АС NLI, AC	26.02.2020
<b>Огірок посівний <i>Cucumis sativus L.</i> Cucumber</b>					
18110012	14.11.2018	24-275	a: 1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	27.02.2020
18110014	26.11.2018	Бридж	a: 1730	РС, АС NLI, AS	28.02.2020
18110015	21.12.2018	20-814	a: 1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	26.02.2020
<b>Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum L.</i> Sweet Pepper, Paprika</b>					
18113004	11.06.2018	БарніF1	a: 1601	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.01.2020
18113005	27.06.2018	Фаундейшн	a: 1730	РС, АС NLI, AC	27.02.2020
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum L.</i> Tomato</b>					
18115014	21.05.2018	Лекері	a: 1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	27.02.2020
18115016	11.06.2018	Агора F1	a: 1601	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.01.2020
<b>Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris L.</i> French Bean</b>					
16127001	20.12.2016	МОМЕНТУМ	a: 1959	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	08.01.2020
<b>Горіх грецький <i>Juglans regia L.</i> Walnut</b>					
19284006	05.11.2019	Скарб	a: 1940	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	25.02.2020
<b>Суниця садова <i>Fragaria ananassa Duch.</i> Strawberry</b>					
16294004	02.03.2016	ДрісСтроуСьортіФайв	a: 2419	РС, АС NLI, AC	25.02.2020
17294014	03.11.2017	ДрісСтроуФортіЕйт	a: 2419	ПС, АС PBR, AC	26.02.2020
17294015	03.11.2017	ДрісСтроуСьорті	a: 2419	ПС, АС PBR, AC	25.02.2020

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) a: Applicant (code) в: Представник (код) v: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
17294018	03.11.2017	ДрісСтроуФортіСікс DrisStrawFortySix	a: 2419 в:	ПС, АС PBR, АС	25.02.2020
17294023	04.12.2017	ДрісСтроуФіфтіФайв DrisStrawFiftyFive	a: 2419 в:	ПС, АС PBR, АС	25.02.2020
17294024	04.12.2017	ДрісСтроуФіфтіСікс DrisStrawFiftySix	a: 2419 в:	ПС, АС PBR, АС	27.02.2020
18294002	06.08.2018	СВІТ ІВ 2 SWEET EVE 2	a: 1971 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	26.02.2020
<b>Ложина високоросла <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry, Highbush Blueberry</b>					
16501001	21.01.2016	ДрісБлюСікс DrisBlueSix	a: 2419 в:	ПС, АС PBR, АС	25.02.2020
16501002	21.01.2016	ДрісБлюФайв DrisBlueFive	a: 2419 1282 в:	ПС, АС PBR, АС	25.02.2020
16501003	21.01.2016	ДрісБлюФор DrisBlueFour	a: 2419 в:	ПС, АС PBR, АС	25.02.2020
16501004	21.01.2016	ДрісБлюЕйт DrisBlueEight	a: 2419 в:	ПС, АС PBR, АС	25.02.2020
16501005	21.01.2016	ДрісБлюСевен DrisBlueSeven	a: 2419 в:	ПС, АС PBR, АС	25.02.2020
<b>Ожина <i>Rubus subgenus Eubatus</i> sect. <i>Moriferi</i> &amp; <i>Ursini</i> Blackberry, Loganberry, Boysenberry</b>					
18631002	19.09.2018	ДрісБлекСевентін DrisBlackSeventeen	a: 2419 в:	ПС, АС PBR, АС	25.02.2020
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component</b>					
14909137	24.11.2014	x2a0165 h2a0165	a: 2011 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	28.02.2020
14909139	24.11.2014	модд005 modd005	a: 2011 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	28.02.2020
14909141	24.11.2014	зе0570 ze0570	a: 2011 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	28.02.2020
19909201	10.12.2019	ПХ1ГФБ2 PH1HFB2	a: 1690 в:	ПС PBR	26.02.2020
19909215	10.12.2019	ПХ1ГФБ2 PH1HFB2	a: 9 в:	РС NLI	26.02.2020
<b>Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component</b>					
16915001	28.04.2016	ЛСР137 LSR137	a: 824 в:	РС, АС NLI, АС	17.02.2020
17915006	20.04.2017	Ло1019П Ло1060Н Lo1019P Lo1060N	a: 824 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI, АС	17.02.2020
<b>Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component</b>					
19940001	04.02.2019	ДССЛ2 DSCL2	a: 844 в:	ПС, РС PBR, NLI	26.02.2020
19940003	04.02.2019	ДС2586 DS2586	a: 844 в:	ПС, РС PBR, NLI	26.02.2020



## Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

### Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17.02.2020 № 258 внесено зміну до Реєстру заявок, а саме: у документах заявки на сорт тритикале (дворучка) 'Підзимок харківський' (номер заявки 15622001, дата подання 28.12.2015) змінено назву ботанічного таксона тритикале (дворучка) на тритикале (озиме).

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2020 № 288 внесено зміну до Реєстру заявок, а саме:

1) змінено склад авторів у документах заявки на сорт кукурудзи звичайної 'Порумбені 310' (заявка № 18009012, дата подання 05.02.2018), шляхом заміни слів та цифр «Lebediuc Gheorghe Victor (Лебедюк Георгій Вікторович), 4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova», «Spinu Angela Petru (Спіну Анжела Петрівна), 4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova» та «Gribincea Vladimir Nicolae (Грібінча Володимир Миколайович), 4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova» словами та цифрами «Stirbu Valentin Ion (Стірбу Валентин Іванович), 4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova», «Bruma Serghei Grigorie (Брума Сергій Григорович), 4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova» та «Rotari Eugen Alexandru (Потарі

Євген Олександрович), 4834, s. Pascani, raionul Criuleni, Republica Moldova»;

2) змінено склад авторів у документах заявки на сорт павловнії 'Квінерджи' (заявка № 16649002, дата подання 24.10.2016), шляхом видалення слів та цифр «Павленко Павло Миколайович (с. Медвин, Богуславський р-н, Київська обл.)» та «Черненко Володимир Володимирович (вул. Пушкіна, буд. 80, смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл.)».

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17.02.2020 № 2 внесено зміну до Реєстру заявок, а саме: змінено найменування представника та адресу для листування «Представництво «Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ» (вул. С. Струтинського 8, оф. 23-26, 7-ий поверх, м. Київ, 01014)» на «ТОВ «НПЦ УКРАЇНА» (вул. Болсуновська, 8, 7-й поверх, м. Київ, 01014)» у документах заявок на сорти ріпаку (озимого): ВІОЛІН (номер заявки 18040010, дата подання 29 березня 2018 року), ШУКЕР (номер заявки 18040007, дата подання 29 березня 2018 року), ЧЕЛЛО КЛ (номер заявки 18040012, дата подання 29 березня 2018 року), ТЕМПО (номер заявки 18040011, дата подання 29 березня 2018 року) та ПАРКУРС (номер заявки 18040006, дата подання 29 березня 2018 року).

## Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

### Notification on change and approved denomination of plant variety

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination	Запропонована назва сорту при поданні заявки Proposed variety denomination during filling application
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>				
17009063	844	24.02.2020	ДКС4792 DKC4792	ЕС4725
17009068	844	24.02.2020	ДКС3108 DKC3108	ЕС3160
17009069	844	24.02.2020	ДКС3893 DKC3893	ЕС3932
17009073	844	24.02.2020	МАС220В MAS220V	ЕР3721
17009086	2092	21.02.2020	КВС РІКАРДО KWS RICARDO	КХБ 7271
17009094	485	21.02.2020	Аденора Adenora	КСМ 17437
17009098	485	21.02.2020	Наомі КС Naomi CS	КСМ 17438
17009099	485	21.02.2020	Гріґрі КС Grigri CS	КСМ 17232
17009100	485	21.02.2020	Алісса Alyssa	КСМ 17333
17009104	844	24.02.2020	ДКС3609 DKC3609	ЕС3649
17009106	844	24.02.2020	СЕКЕНЦЕ SEKENCE	ЕС4726
17009107	844	24.02.2020	ІНІЦІ INICI	ЕС4650
17009109	844	24.02.2020	КОЛЕКТОР KOLEKTOR	ЕР3476
17009133	2092	21.02.2020	КВС АКУСТИКА KWS AKUSTIKA	КХБ 7275
17009135	2092	21.02.2020	КВС АГРЕЛІО KWS AGRELIO	КХБ 7266
17009141	2092	21.02.2020	КВС АГГРО KWS AGGRO	КХБ 8264
17009143	2092	21.02.2020	КВС АЛЛЕГРО KWS ALLEGRO	КХБ 8232
17009177	2092	21.02.2020	КВС ФЕРНАНДО KWS FERNANDO	КХБ 8238
18009042	9	26.02.2020	Р9300 P9300	Х95М761
18009049	924	26.02.2020	МАС 443Д MAS 443D	МЖМ341988
18009050	924	26.02.2020	АМАЗОН AMAZON	МЖМ348264
18009051	924	26.02.2020	МАС 16Б MAS 16B	МЖМ335117
18009052	924	26.02.2020	ЛУКАКУ LUKAKU	МЖМ392367
18009053	924	26.02.2020	МАС263Ф MAS263F	МЖМ366202
18009054	924	26.02.2020	МАС 222Д MAS 222D	МЖМ326953
18009055	924	26.02.2020	СКАНДИНАВ SCANDINAV	МЖМ326444
18009056	844	26.02.2020	ДКС5182 DKC5182	ЕР5241
18009057	844	26.02.2020	ДКС3796 DCS3796	ЕС3725
18009059	844	26.02.2020	ДКС4391 DKC4391	ЕС4241
18009060	844	26.02.2020	МАЙВЕЙ MYWAY	ЕС4826
18009062	844	26.02.2020	ФАСТРАК FASTRAC	ЕС4434
18009070	844	26.02.2020	МАГАН MAGAN	НКу4274
18009089	2092	26.02.2020	КВС КАЛАФУНА KWS KALAFUNA	КХБ 7344
18009115	2534	26.02.2020	КС Кавані CS Savani	КСМ 18369

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination	Запропонована назва сорту при поданні заявки Proposed variety denomination during filling application
18009119	2534	26.02.2020	КС Луксурі CS Luxuri	КСМ 18161
18009120	2534	26.02.2020	Дефіні КС Defini CS	КСМ 17435
18009123	2534	26.02.2020	КС Панорамі CS Panoramі	КСМ 18265
18009127	806	26.02.2020	РОУДІ ROWDY	ЕС38407
18009128	806	26.02.2020	ЕС КАТАМАРАН ES KATAMARAN	ЕС37107
18009131	844	26.02.2020	ДКС4598 DKC4598	ЕС4648
18009133	844	26.02.2020	ДКС4302 DKC4302	ЕТ4322
18009135	844	26.02.2020	ДКС5685 DKC5685	ЕР5725
18009159	2264	24.02.2020	ЮНІ3510 UNI3510	ЕХПМ015
18009160	2264	24.02.2020	ЮНІ3310 UNI3310	ЕХПМ014
18009161	2264	24.02.2020	ЮНІ3410 UNI3410	ЕХПМ013
19009002	2558	26.02.2020	ДМС Медеу DMS Medeu	ДМС Авалон
<b>Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)</b>				
18012042	807	26.02.2020	Емблем Emblem	ЛЕУ 50322
<b>Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)</b>				
18015003	824	26.02.2020	КВС Тьютор KWS Tutor	КВС Х191
<b>Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum</b>				
16018007	806	21.02.2020	ЕС ВІЛЛІ ES WILLY	ЕУГ514
18018001	1783	27.02.2020	РЖТ АЛІГГАТОР RGT ALIGGATOR	РХС1822
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>				
17039101	485	24.02.2020	Фієста КЛП Fiesta CLP	КСФ 17105
17039117	1219	24.02.2020	ВОЛЛТЕР СУ VOLLTER SU	СУАВЕ
17039208	2445	26.02.2020	СУЛІКО 777 SULIKO 777	СУЛІКО
18039050	2092	27.02.2020	КВС ЦЕЗАРЕС КЛ KWS CESARES CL	КХБ8311
18039052	2092	27.02.2020	КВС АМОРЕС КЛ KWS AMORES CL	КХБ8611
18039053	2092	27.02.2020	КВС АВГУСТЕС КЛ KWS AUGUSTES CL	КХБ8511
18039092	2092	24.02.2020	КВС ПЕРСЕУС КЛ KWS PERSEUS CL	КВС ПЕРСЕЙ КЛ
18039159	2555 2556	26.02.2020	ОБ 19 OB 19	ОБ-19
18039160	2555 2556	26.02.2020	ОБ 18 OB 18	ОБ-18
<b>Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)</b>				
17040044	807	26.02.2020	ДК Іммершн КЛ DK Immersion CL	ДМХ 363
<b>Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)</b>				
17041012	912	24.02.2020	Лавіна Lavina	ДЛЕ18814С11
17041014	912	24.02.2020	Лакріц Lakritz	ДЛЕ18813С11
18041004	912	24.02.2020	Караміно КЛ Caramino CL	ДЛЕ18815С21
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean</b>				
17045010	2484	21.02.2020	Граф Graf	Кардінал

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination	Запропонована назва сорту при поданні заявки Proposed variety denomination during filling application
17045035	2061	21.02.2020	Елада Elada	СВХ17Т000С1
17045038	2061	21.02.2020	Еліна Elina	СВХ17Т0С12
18045001	2264	24.02.2020	Аделайн Adelain	ДАМ2500
18045002	2264	24.02.2020	Аніса Anisa	ДАА2500
18045004	2264	21.02.2020	Даліда Dalida	БІБ2800
18045005	2264	21.02.2020	Дара Dara	ДОМ2800
18045006	2264	21.02.2020	Мавра Mavra	ПББ2800
18045007	2264	21.02.2020	Даміра Damira	БКІ2800
18045008	2264	21.02.2020	Марієм Mariem	ДМА3000
18045009	2264	21.02.2020	Дженніфер Jennifer	ВОМ2800
18045010	2264	21.02.2020	Аманда Amanda	БЛК2500
<b>Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber</b>				
18110014	1730	28.02.2020	Бридж Bridge	12-311
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato</b>				
18115019	1902	28.02.2020	КЛАДРІЗ KLADRES	КЛАД
19115008	840	26.02.2020	Роялпінк Royalpink	Розалін
19115013	2507	26.02.2020	Дінеро082 Dinero082	ТС 02-0082
<b>Пшениця м'яка (дворучка) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (spring and winter compatible)</b>				
18140001	2524	26.02.2020	Едда Edda	ЛВ07СВ017-03
<b>Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L. Grape, Grapevine</b>				
19304003	1904	26.02.2020	Кардишак таїровський Kardyshakh tairovskiy	Кардишак надранній
19304006	1904	26.02.2020	Кобера 5ББ 9191 Kobera 5BB 9191	Берландієрі Х Рипарія Кобера 5 ББ 9191
19304007	1904	26.02.2020	Кобера 5ББ 211161 Kobera 5BB 211161	Берландієрі Х Рипарія Кобера 5 ББ 211161
<b>Лілійник <i>Heimerocallis</i> L. Daylily</b>				
17326006	827	26.02.2020	Фенікс Feniks	Жар-Птиця
<b>Костриця несправжньоовеча <i>Festuca pseudovina</i> Hack. ex Wiesb.</b>				
19660001	1669	28.02.2020	Інгела Inhela	Тонга
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component</b>				
18909052	2459 2460	28.02.2020	АС 587МС AS 587 MS	АС 587М стерильна
18909053	2459 2460	28.02.2020	ФЛАВІА МС FLAVIA MS	ФЛАВІА М стерильна
18909054	2459 2460	28.02.2020	МК 262 МС MK 262 MS	МК 262 М стерильна
18909058	2459 2460	28.02.2020	МКІ 2494 МС MKI 2494 MS	МКІ 2494 М стерильна
18909081	2530	26.02.2020	МТВ 236 ЗС MTV 236 ZS	М 236 ЗС
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component</b>				
18939002	1581 1702	26.02.2020	ХЗ 1701 А KhZ 1701 A	Сх ЗЛ 1701 А

# Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

## Notification on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>			
14009157	844	03.02.2020	Блекрок Blackrock
15009054	844	03.02.2020	Мітинг Meeting
17009110	806	13.02.2020	ЕС КАТМАНДУ ES KATMANDU
17009126	793	05.02.2020	ЛГ31284 LG31284
17009128	793	05.02.2020	ЛГ31272 LG31272
17009129	793	05.02.2020	ЛГ31388 LG31388
17009130	793	06.02.2020	ЛГ31479 LG31479
17009140	2092	05.02.2020	КВС БОЛІВІО KWS BOLIVIO
17009195	1783	05.02.2020	РЖТ ІНЕДІККС RGT INEDIXX
17009196	1783	05.02.2020	ПАТАГОНІЯ PATAGONIA
18009001	2264	13.02.2020	ЮНІ3513 UNI3513
18009002	2264	13.02.2020	ЮНІ3511 UNI3511
18009005	2264	13.02.2020	ЮНІ3313 UNI3313
18009006	2264	13.02.2020	ЮНІ3210 UNI3210
18009007	2264	26.02.2020	ЮНІ3312 UNI3312
18009080	2092	04.02.2020	КВС БУРІТО KWS BURITO
18009082	2092	04.02.2020	КВС БЕНВЕНІДО KWS BENVENIDO
18009088	2092	05.02.2020	КВС ГЕНДАЛЬФ KWS GANDALF
18009107	1783	05.02.2020	РЖТ КОКСІНЕЛЛЬ RGT COXXINELLE
18009117	1265	04.02.2020	АР 18101 К AR 18101 K
18009118	1265	06.02.2020	АР 18102 К AR 18102 K
18009137	1591	04.02.2020	Атлас 347 Atlas 347
18009138	1591	04.02.2020	Новела 250 Novela 250
18009143	1219	13.02.2020	СИ НІАГАРА SY NIAGARA
18009144	1219	13.02.2020	СИ МІНЕРВА SY MINERVA
18009185	2260	05.02.2020	ДН Пульсація DN Pulsatsiia
19009001	2558	11.02.2020	ДМС Крок DMS Krok
19009003	2558	11.02.2020	ДМС Альянс DMS Alians
19009004	2558	11.02.2020	ДМС Тонус DMS Tonus
19009005	2558	11.02.2020	ДМС Ефес DMS Efes
19009006	2558	11.02.2020	ДМС Галант DMS Halant
19009008	2558	11.02.2020	ДМС Алюр DMS Aliur
19009021	2257	11.02.2020	КМ 3260 KM 3260
19009022	2257	11.02.2020	КМ 4100 KM 4100

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
19009023	2257	11.02.2020	КМ 3310
19009047	2576	12.02.2020	КМ 3310 Синдикат Syndykat
<b>Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)</b>			
18012030	1571 736	07.02.2020	Фрея Freia
18012031	1571 736	07.02.2020	Уманська царівна Umanska tsarivna
18012035	1698	06.02.2020	Аквілегія Akvillehiiia
18012037	1698	04.02.2020	Херсонська Фортеця Khersonska Fortetsia
<b>Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)</b>			
17019003	807	06.02.2020	Еталон Etalon
17019004	807	06.02.2020	Непал Nepal
<b>Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea</b>			
18028012	2547	13.02.2020	Кіра Kira
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>			
17039105	806	13.02.2020	ЕС АГОРА ES AGORA
17039106	806	13.02.2020	ЕС РОЗІС КЛ ES ROSIS CL
17039110	806	13.02.2020	ЕС ЮРАСІК СУ ES JURASSIC SU
17039111	806	13.02.2020	ДРАКАРІС КЛП DRACARIS CLP
17039118	1219	13.02.2020	ДУНКАН КЛП DUNCAN CLP
17039124	1219	06.02.2020	СУЛФОНОР SULFONOR
17039127	1219	13.02.2020	СУФІКС SUFFIX
18039015	1581 1702	06.02.2020	Коляда Koliada
18039027	9	12.02.2020	ХФ17455 XF17455
18039040	1702	26.02.2020	Мирний Murnyi
18039045	2232	12.02.2020	Реасан Reasun
18039046	2232	13.02.2020	Флорасан Florasun
18039050	2092	12.02.2020	КВС ЦЕЗАРЕС КЛ KWS CESARES CL
18039052	2092	12.02.2020	КВС АМОРЕС КЛ KWS AMORES CL
18039053	2092	12.02.2020	КВС АВГУСТЕС КЛ KWS AUGUSTES CL
18039056	1783	11.02.2020	РА1028158
18039058	1783	12.02.2020	РА1028158 РА1028136
18039059	793	21.02.2020	РА1028136 ЛХА326741
18039060	793	21.02.2020	ЛНА326741 ЛХА526351
18039061	793	21.02.2020	ЛНА526351 ЛХА636452
18039062	793	24.02.2020	ЛНА636452 ЛХА5316030
18039065	1783	11.02.2020	ЛНА5316030 РА1028138
18039069	1985	12.02.2020	РА1028138 Н4Х302 Е
18039070	1985	12.02.2020	Н4Н302 Е Х9767
			Х9767

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
18039092	2092	12.02.2020	КВС ПЕРСЕУС КЛ KWS PERSEUS CL
18039093	2092	12.02.2020	КВС АПАЧІ КЛ KWS APACHE CL
18039097	1219	13.02.2020	СИ НЕКСУС КЛП SY NEXUS CLP
18039101	1219	13.02.2020	СУНАТО SUNATO
18039104	2537	24.02.2020	Вікторі КЛ Victory CL
18039105	2587	12.02.2020	ГК Мілія GK Milia
18039106	2267	12.02.2020	Барон BARON
18039107	2267	12.02.2020	Фортасол Fortasol
18039108	2267	12.02.2020	Батолі Batoli
18039114	2534	12.02.2020	КСФ 19901 CSF 19901
18039117	1978 2549	12.02.2020	НС Х 7969 NS H 7969
18039118	1978 2549	12.02.2020	КОНФІДЕНС KONFIDENS
18039119	1978 2549	12.02.2020	НС Х 8063 NS H 8063
18039120	1978 2549	12.02.2020	НС Х 7746 NS H 7746
18039121	2011	12.02.2020	Уносан Unosan
18039122	2256	24.02.2020	СІДНЕЙ SYDNEY
18039132	2267	12.02.2020	Гуара Guara
18039138	1978 2549 2204	12.02.2020	НА Іміленд NA Imilend
18039141	1978 2549 2204	12.02.2020	НА Грінвіч NA Greenwich
18039151	2554	26.02.2020	Хайсан 195 ІТ Hysun 195 IT
18039152	2554	26.02.2020	Хайсан 268 ІТ Hysun 268 IT
18039153	2554	26.02.2020	Хайсан 189 СУ Hysun 189 SU
18039155	1581	06.02.2020	Вирій Vurii
19039013	2576	13.02.2020	Егіда Ehida
19039014	2576	13.02.2020	Катрін Katrin
19039016	2629	12.02.2020	Рона Rona
19039017	2629	12.02.2020	Ново Альє Novo Ale
19039018	2629	11.02.2020	Обріон Obrion
<b>Ріпак (озимий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter)</b>			
18040001	1783	26.02.2020	РЖТ ЖАКУЗІ RGT JAKUZZI
18040002	1783	26.02.2020	РЖТ ЖАЗЗЕТТА RGT GAZZETTA
18040008	793	28.02.2020	Карлтон КЛ Carlton CL
18040009	793	28.02.2020	Аляско Alasco
18040024	2196	26.02.2020	ІНВ1266 КЛ INV1266 CL
18040037	2011	26.02.2020	ВРХ500 WRH 500
18040038	2011	26.02.2020	АСТАНА ASTANA
18040042	807	26.02.2020	ВРХ 528 WRH 528

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
18040047	2524	27.02.2020	Галілеус
18040052	1783	26.02.2020	Galileus РЖТ КВІ33 RGT QUIZZ
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merrill</b> <b>Soya Bean</b>			
18045015	142	04.02.2020	Віста
18045017	142	04.02.2020	Vista
18045018	142	06.02.2020	Азюра
18045019	142	11.02.2020	Azura
18045023	2475	21.02.2020	Сіберія Siberia
			Езра Ezra
			ДХ4173 DH4173
<b>Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt.</b> <b>Sweet Corn</b>			
18103006	273	27.02.2020	Хан
18103007	273	27.02.2020	Khan
18103008	273	27.02.2020	Карамело Caramelo
			Барон BARON
<b>Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L.</b> <b>Onion, Echalion</b>			
19106005	840	13.02.2020	Ногал
			Nogal
<b>Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L.</b> <b>Cucumber</b>			
19110008	1708	11.02.2020	Еней
			Enei
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L.</b> <b>Tomato</b>			
18115037	1601	04.02.2020	Довіра
18115038	1601	04.02.2020	Dovira
18115048	1730	05.02.2020	Владіслав Vladislav
			Едвенчер Adventure
<b>Салат посівний листовий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i></b> <b>Lettuce</b>			
19120007	753	12.02.2020	Бартімер
19120008	753	12.02.2020	Bartimer
			Елсол Elsol
<b>Часник <i>Allium sativum</i> L.</b> <b>Garlic</b>			
19129001	2594 2595 2596	12.02.2020	Айдер
			Aider
<b>Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L.</b> <b>Melon</b>			
19147001	840	13.02.2020	Дейра
			Deyra
<b>Цибуля запашна <i>Allium odorum</i> L.</b> <b>Sweet-scented onion</b>			
19167001	1708	12.02.2020	Вишукана
			Vyshukana
<b>Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh.</b> <b>Apple</b>			
18263005	348	04.02.2020	Видубицька
18263006	348	05.02.2020	Vudubyt'ska
			Мілана Milana
<b>Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L.</b> <b>Walnut</b>			
19284004	2623 2466	21.02.2020	Стрижавський Паперовий
			Stryzhavskiy Paperoviy
<b>Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn</b> <b>Hybrid Lucerne</b>			
18364001	1591	13.02.2020	Південна красуня
			Pivdenna krasunia



## Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
<b>Цибуля слизун <i>Allium nutans</i> L. Dwarf Alp</b>			
19444001	1708	11.02.2020	Удай Udai
<b>Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat</b>			
18539003	1635 1097	06.02.2020	Вишиванка білоцерківська Vyshyvanka bilotserkivska
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component</b>			
19909016	2257	11.02.2020	ПК 210 PK 210
19909017	2257	11.02.2020	ПК 114 PK 114
19909018	2257	11.02.2020	ПК 155 PK 155
19909019	2257	13.02.2020	ПК 1313 PK 1313
19909020	2257	11.02.2020	ПК 211 PK 211
19909045	9	28.02.2020	ПХ2Ф33 PH2F3Z
19909090	2576	12.02.2020	A5472 A5472
19909091	2576	12.02.2020	A32879 A32879
19909097	9	12.02.2020	ПХ2Ф42 PH2F42
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component</b>			
18939063	924	24.02.2020	TRI4748P TRI4748R
18939064	2202	26.02.2020	IMI 217 P IMI 217 R
18939066	2202	26.02.2020	9999 P 9999 R
18939067	2202	26.02.2020	97251 A 97251 A
18939068	2202	26.02.2020	9728 A 9728 A
18939069	1783	12.02.2020	AT2616 AT2616
18939070	1783	12.02.2020	PT9917 RT9917
18939071	1783	12.02.2020	PT9717 RT9717
18939072	1435	24.02.2020	P10019MI R10019MI
18939073	1435	24.02.2020	P8035MЖС R8035MJS
18939074	1435	24.02.2020	P8035M2Ж R8035M2J
18939075	1435	21.02.2020	P5ХИ3МЖС R5XY3MJS
18939076	1435	20.02.2020	P4НП8МЖІ R4NP8MJI
18939077	1435	20.02.2020	Ф5ДН3МКА F5DN3MKA
18939078	1435	24.02.2020	СФ1561M2СА SF1561M2SA
18939079	793	24.02.2020	ЛГ13013МЖА LG13013MJA
18939080	2534	12.02.2020	69Ж02P 69J02R
18939081	2534	12.02.2020	29I22A 29I22A
18939082	2534	12.02.2020	85P10Pip 85P10Rip
18939083	2534	12.02.2020	16309i 16Z09i
18939084	806	21.02.2020	IA1169ДMP IA1169DMR
18939085	806	21.02.2020	ФТ220PM FT220RM

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
18939090	1959	24.02.2020	ЮР60431
18939091	2534	12.02.2020	UR60431 20M60cy 20M60su
18939092	1959	26.02.2020	ФС76301 FS76301
18939093	1959	26.02.2020	ФС77009 FS77009
18939094	1959	26.02.2020	ФС74122 FS74122
18939095	1959	24.02.2020	ЮР60601 UR60601
18939096	1959	24.02.2020	ЮР60331 UR60331
18939097	1959	24.02.2020	ЮР60921 UR60921
18939098	1959	21.02.2020	ФС71529 FS71529
18939100	1959	21.02.2020	ЮР60721 UR60721
18939103	1959	26.02.2020	ФС76900 FS76900
18939108	1435	21.02.2020	Ф14ХНЗМІА F14HNЗMIA
18939109	1435	21.02.2020	Р4НП8МЖО R4NP8MJ0
18939112	2267	12.02.2020	ЕХ500СУЛ EH500SUL
18939117	2440	24.02.2020	42 P 42 R
18939121	1435	21.02.2020	Ф7АХ2М0А F7AX2MOA
18939122	2256	24.02.2020	ХП3642СОР HP3642SOR
18939141	2551	13.02.2020	АМЛ1В AML1V
18939154	924	12.02.2020	ТФ03188 TF03188
18939155	2537	21.02.2020	Рф1136 Rf1136
18939156	2537	21.02.2020	Рф1010 Rf1010
18939157	2537	21.02.2020	Рф3074 Rf3074
18939158	2537	24.02.2020	Рф1018 Rf1018
19939036	2576	12.02.2020	АС ХДЖ 9 AS KhDZh 9
19939037	2576	12.02.2020	МА РЕ 01 MA RE 01
19939038	2576	12.02.2020	РСЕ ГАД 7 RSE HAD 7
19939039	2576	12.02.2020	МАО ВЕ 100 MAA VE 100
19939042	2629	13.02.2020	НАС8549А NAS8549A
19939043	2629	11.02.2020	СЕМ085А SEM085A
19939044	2629	11.02.2020	СЕМ049Б SEM049B
19939045	2629	13.02.2020	ВОД72В VOD72V
19939046	2629	13.02.2020	НАС4349А NAS4349A
19939047	2629	12.02.2020	СЕМ143А SEM143A
19939048	2629	12.02.2020	ВОД68В VOD68V
19939050	2629	12.02.2020	ВОД35В VOD35V
<b>Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i></b> <b>Rape Seed (Winter) – parental component</b>			
18940001	793	11.02.2020	Р4513САІМ R4513CAIM

## Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин

Номер заявки Application number	Заявник Applicant	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
18940002	793	05.02.2020	P7011AБ R7011AB
18940003	793	11.02.2020	ФОСТД719 FOCTD719
18940007	924	27.02.2020	РЛМ0112А RLM0112A

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів рослин України)

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine (Plant Varieties Register in Ukraine)

## Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and included in the State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
<b>Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)</b>						
17006001	28.12.2019		ФУЕГО FUEGO	1959	1959	
17006002	28.12.2019		ОДІССЕО ODISSEO	1959	1959	
17006008	14.01.2020		Ремарка Remarka	736	736	
<b>Пшениця тверда (озима) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Winter)</b>						
16007001	29.10.2019		Кораловий Koralovyi	1591	1591	
16007002	29.10.2019		Надійний Nadiinyi	1591	1591	
16007003	04.11.2019		Людмила Liudmyla	1123	1123	
17007003	04.12.2019		МІП Лакомка MIP Lakomka	1589	1589	
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>						
15009034	28.12.2019		МАС 34Б MAS 34B	924	924	
15009035	28.12.2019		МАС 48Л MAS 48L	924	924	
16009020	28.12.2019		Чорномор Chornomor	1698 1854 1637	1698 1854 1637	
16009021	28.12.2019		Ламасан Lamasan	1854 1637 1698	1698 1854 1637	
16009022	28.12.2019		Тавричанка Tavrychanka	1698 1854 1637	1698 1854 1637	
16009023	28.12.2019		Олешківський Oleshkivs`kyi	1698 1854 1637	1698 1854 1637	
16009024	28.12.2019		Віра Vira	1698 1854 1637	1698 1854 1637	
16009035	28.12.2019		Р9537 P9537	9	9	
16009048	28.12.2019		Мейфлавер Mayflower	844	844	
16009078	28.12.2019		ДКС5075 DKC5075	844	844	
16009125	28.12.2019		Селенія Selenia	924	924	
17009006	28.12.2019		СИ МАРИМБА SY MARIMBA	1219	1219	
17009046	28.12.2019		Р0312 P0312	9	9	
17009047	28.12.2019		Р9071 P9071	9	9	
17009048	28.12.2019		Р9757 P9757	9	9	
17009049	28.12.2019		Р0349 P0349	9	9	
17009050	28.12.2019		Р9363 P9363	9	9	
17009051	28.12.2019		Р9170 P9170	9	9	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17009052	28.12.2019		P0268	9	9	
17009053	28.12.2019		P0268	9	9	
17009054	28.12.2019		P9874	9	9	
17009055	28.12.2019		P9874	9	9	
17009056	28.12.2019		P8707	9	9	
17009057	28.12.2019		P8707	9	9	
17009058	28.12.2019		P0362	9	9	
17009060	28.12.2019		P0362	9	9	
17009065	28.12.2019		МОНСТР	924	924	
17009074	28.12.2019		MONSTER	924	924	
17009075	28.12.2019		МАС 49П	924	924	
17009088	22.01.2020		MAS 49P	924	924	
17009090	28.12.2019		МАС 308А	924	924	
17009091	28.12.2019		MAS 308A	924	924	
17009092	28.12.2019		Стардаст	924	924	
17009093	28.12.2019		Stardust	924	924	
17009095	28.12.2019		МАСТОР	924	924	
17009096	28.12.2019		MASTHOR	924	924	
17009097	28.12.2019		P8358	9	9	
17009099	28.12.2019		P8358	9	9	
17009111	24.01.2020		B2190	9	9	
17009112	24.01.2020		B2190	9	9	
17009113	24.01.2020		Алькор	966	966	
17009114	24.01.2020		Alkor	966	966	
17009115	24.01.2020		СИ ТРІВІУС	1219	1219	
17009116	24.01.2020		SY TRIVIUS	1219	1219	
17009117	24.01.2020		СИ ОКТЕОН	1219	1219	
17009118	24.01.2020		SY OSTEON	1219	1219	
17009119	24.01.2020		СИ ТОРИНО	1219	1219	
17009120	24.01.2020		SY TORINO	1219	1219	
17009121	24.01.2020		СИ ПРЕМЕО	1219	1219	
17009122	24.01.2020		SY PREMEO	1219	1219	
17009123	14.01.2020		Поезі КС	485	485	
17009124	14.01.2020		POESI CS	485	485	
17009125	14.01.2020		Палізі КС	485	485	
17009126	14.01.2020		PALIZI CS	485	485	
17009127	14.01.2020		Кіянті КС	485	485	
17009128	14.01.2020		Chianti CS	485	485	
17009129	14.01.2020		ЕС РАНВЕЙ	806	806	
17009130	14.01.2020		ES RUNWAY	806	806	
17009131	14.01.2020		ЕС ДЖЕНТЛЬМЕН	806	806	
17009132	14.01.2020		ES GENTLEMAN	806	806	
17009133	14.01.2020		ЕС БРОДВЕЙ	806	806	
17009134	14.01.2020		ES BROADWAY	806	806	
17009135	14.01.2020		ЕС ХЕТТРИК	806	806	
17009136	14.01.2020		ES HATTRICK	806	806	
17009137	14.01.2020		ЕС ДЕКАРТ	806	806	
17009138	14.01.2020		ES DEKART	806	806	
17009139	14.01.2020		ЕС ГЕДЕОН	806	806	
17009140	14.01.2020		ES GEDION	806	806	
17009141	14.01.2020		ЕС ЯКАРІ	806	806	
17009142	14.01.2020		ES YAKARI	806	806	
17009143	14.01.2020		ЕС ЛЕГОЛАС	806	806	
17009144	14.01.2020		ES LEGOLAS	806	806	
17009145	14.01.2020		ЕС ПЕРСПЕКТИВ	806	806	
17009146	14.01.2020		ES PERSPECTIVE	806	806	
17009147	14.01.2020		Жаклін	793	793	
17009148	14.01.2020		Jakleen	793	793	
17009149	14.01.2020		Меттью	793	793	
17009150	14.01.2020		Matthew	793	793	
17009151	28.12.2019		КОЛЕТІС	2092	2092	
17009152	28.12.2019		KOLETIS	2092	2092	
17009153	28.12.2019		КВС КАШЕМІР	2092	2092	
17009154	28.12.2019		KWS KASHMIR	2092	2092	
17009155	21.01.2020		ЗУР307	1694	2537	
17009156	21.01.2020		SUR307	1694	2537	
17009157	13.01.2020		ЗУР204	1694	2537	
17009158	13.01.2020		SUR204	1694	2537	
17009159	28.12.2019		КВС ГРАНАДОС	2092	2092	
17009160	28.12.2019		KWS GRANADOS	2092	2092	
17009161	16.01.2020		Галардо	2291	2291	
17009162	16.01.2020		Halardo	2291	2291	
17009163	16.01.2020		Остін	2291	2291	
17009164	16.01.2020		Ostin	2291	2291	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17009158	28.12.2019		P9074E	9	9	
17009159	28.12.2019		P9074E	9	9	
17009160	28.12.2019		P7515	9	9	
17009161	13.01.2020		P7515	9	9	
17009162	13.01.2020		P8834	1902	1902	
17009163	13.01.2020		P8834	1902	1902	
17009185	28.12.2019		Кунео	1783	1783	
17009186	28.12.2019		Cuneo	1783	1783	
17009187	28.12.2019		Ліворно	1783	1783	
17009188	28.12.2019		Livorno	1783	1783	
17009189	28.12.2019		Пітч	1783	1783	
17009190	28.12.2019		Pitch	1783	1783	
17009191	28.12.2019		РЖТ ДАМІККСУС	1783	1783	
17009192	28.12.2019		RGT DAMIXXUS	1783	1783	
17009194	28.12.2019		РЖТ ЛІЖЕТТІККС	1783	1783	
17009206	28.12.2019		RGT LIGETTIXX	1783	1783	
17009207	28.12.2019		РЖТ ЗАНЕТІККС	1783	1783	
17009212	28.12.2019		RGT ZANETIXX	1783	1783	
17009213	16.01.2020		РЖТ ЕККСКІ ДУО	2444	2444	
17009214	16.01.2020		RGT EXXKI DUO	2444	2444	
17009215	16.01.2020		РЖТ АТТРАККСІОН	2444	2444	
17009216	16.01.2020		RGT ATTRAXXION	2444	2444	
17009217	16.01.2020		РЖТ РЕАККСІОН	2444	2444	
17009218	16.01.2020		RGT REAXXION	2444	2444	
17009219	16.01.2020		РЖТ МАККСАТАК	2444	2444	
17009220	16.01.2020		RGT MAXXATAC	2444	2444	
17009221	16.01.2020		ВІРЖІЛІО	2444	2444	
17009222	16.01.2020		VIRGILIO	2444	2444	
17009223	16.01.2020		РЖТ ЕКХЗЕМПЛЯР	2444	2444	
17009224	16.01.2020		RGT EXXEMPLAIR	2444	2444	
17009225	16.01.2020		Філмено	2444	2444	
17009226	16.01.2020		Filmeno	2444	2444	
17009227	16.01.2020		Амелло	2444	2444	
17009228	16.01.2020		Amello	2444	2444	
17009229	16.01.2020		Мегаліто	2444	2444	
17009230	16.01.2020		Megalito	2444	2444	
17009231	16.01.2020		СХ 200	2444	2444	
17009232	16.01.2020		SKh 200	2444	2444	
17009233	16.01.2020		СХ 300	2444	2444	
17009234	16.01.2020		SKh 300	2444	2444	
17009235	16.01.2020		СХ 250	2444	2444	
17009236	16.01.2020		SKh 250	2444	2444	
17009237	16.01.2020		СХ 320	2444	2444	
17009238	16.01.2020		SKh 320	2444	2444	
<b>Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)</b>						
16012044	28.12.2019		Торкарі	1498	1498	
16012045	28.12.2019		Torcarі	1498	1498	
16012046	28.12.2019		Мірастар	1498	1498	
16012047	28.12.2019		Mirastar	1498	1498	
16012048	28.12.2019		Мауріціо	485	485	
16012049	28.12.2019		Maurizio	485	485	
16012050	28.12.2019		СОФІ КС	485	485	
16012051	28.12.2019		SOPHIE CS	485	485	
16012052	28.12.2019		СОФРУ	485	485	
16012053	28.12.2019		SOFRU	485	485	
16012054	28.12.2019		СОРРІАЛ	485	485	
16012055	28.12.2019		SORRIAL	485	485	
16012056	27.01.2020		Лаваль	1517	1517	
16012057	27.01.2020		Laval	1517	1517	
17012004	30.01.2020		Хліб Аріїв	1998	1998	
17012005	30.01.2020		Khlib Ariiv	1998	1998	
17012025	28.12.2019		РЖТ Преміант	1286	1286	
17012026	15.01.2020		RGT Premiant	2071	2071	
17012027	15.01.2020		ШТРУ 080150с5	2071	2071	
17012028	15.01.2020		STRU 080150s5	2071	2071	
17012029	15.01.2020		Саласар	2071	2071	
17012030	15.01.2020		Salasar	2071	2071	
17012028	28.12.2019		Соборна	1698	1698	
17012029	28.12.2019		Soborna	1698	1698	
17012040	28.12.2019		МІП Ювілейна	1589	1589	
17012041	28.12.2019		MIP IUVileina	1589	1589	
17012041	28.12.2019		МІП Лада	1589	1589	
17012042	28.12.2019		MIP Lada	1589	1589	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17012042	28.12.2019		МІП Фортуна MIP Fortuna	1589	1589	
<b>Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)</b>						
17013003	15.01.2020		ШТРУ 093736с4 STRU 093736s4	2071	2071	
17013004	15.01.2020		ПС Петра PS Petra	2071	2071	
17013007	14.01.2020		Лікамеро Licamero	1797	1797	
<b>Рис посівний <i>Oryza sativa</i> L. Rice</b>						
17017001	14.01.2020		Морячок Moriachok	1715	1715	
17017002	28.12.2019		Фагот Fahot	1715	1715	
<b>Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum</b>						
16018003	24.01.2020		341X120 341X120	1985	1985	
16018005	24.01.2020		АРЕЛЬДО ARALDO	806	806	
16018006	24.01.2020		ЕУГ542Ф EUG542F	806	806	
16018011	28.12.2019		КВС ФОБОС KWS PHOBOS	2092	2092	
17018012	24.01.2020		419X124 419Kh124	1985	1985	
17018013	28.12.2019		Бенггал Benggal	2011	2011	
<b>Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)</b>						
16019017	14.01.2020		ЛГ Триумф LG Triumph	793	793	
16019020	28.12.2019		МІП Статус MIP Status	1589	1589	
17019001	28.12.2019		СИ ГАЛІЛЕО SY GALILEO	1959	1959	
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>						
17020008	23.01.2020		Маріан Marian	1990	1990	
17020010	14.01.2020		Кларінетте Klarinette	1797	1797	
17020012	13.01.2020		Елінор Ellinor	1965	1965	
17020013	28.12.2019		МІП Титул MIP Tytul	1589	1589	
17020014	28.12.2019		МІП Захисник MIP Zakhysnyk	1589	1589	
17020015	28.12.2019		МІП Девіз MIP Deviz	1589	1589	
17020016	28.12.2019		МІП Шарм MIP Sharm	1589	1589	
17020017	28.12.2019		КВС Кріссі KWS Chrissie	824	824	
17020022	13.01.2020		СБ Комфорт SB Comfort	1747	1747	
<b>Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea</b>						
17023003	04.10.2019		Люмп Lump	2076	880	
<b>Сочевиця харчова <i>Lens culinaris</i> Medik. Lentil</b>						
17027003	06.12.2019	14.04.2017	Даринка Darynka	2260	2260	Бюлетень, випуск 3, 2019
<b>Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea</b>						
18028011	09.10.2019		Степовий велет Stepovyi velet	2543	2543	
<b>Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed</b>						
18035001	28.01.2020		Дунай Dunai	2458	2458	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L.</b>						
<b>Sunflower</b>						
16039019	14.01.2020		ЖИРАЛ GIRAL	1356	1356	
16039032	28.12.2019		ХФ16611 XF16611	9	9	
16039042	04.10.2019		Р64ГГ132 P64HH132	9	9	
16039046	28.12.2019		Салвасол Salvasol	1498	1498	
16039114	28.12.2019		МЕНДЕЛЬ MENDEL	924	924	
16039116	28.12.2019		МАС 83СУ MAS 83SU	924	924	
16039128	04.10.2019		КС Цорба QC Zorba	2232	2232	
16039129	21.01.2020		Міранда ЗУ Miranda SU	1694	2537	
16039130	28.12.2019		КС Браво QC Bravo	2232	2232	
17039002	28.12.2019		СИ ДАКСТОН SY DAXTON	1219	1219	
17039003	28.12.2019		СИ КУПЕР КЛП SY COOPER CLP	1219	1219	
17039036	14.01.2020	13.01.2017	Фолк Folk	736	736	
17039042	14.01.2020		Тайлер Tailer	2273	2273	
17039065	14.01.2020		Інесол Inesol	2312	2312	
17039070	20.01.2020		ЛНЗ 01 LNZ 01	2265	2265	
17039071	28.12.2019		Р64ЛЛ138 P64LL138	9	9	
17039073	28.12.2019		Р64ГЕ144 P64HE144	9	9	
17039075	28.12.2019		Р64ЛЕ136 P64LE136	9	9	
17039076	28.12.2019		ВОЛВЕРІН WOLVERINE	924	924	
17039077	28.12.2019		МАС 90ІР MAS 90IR	924	924	
17039079	28.12.2019		МАС 880СУ MAS 880SU	924	924	
17039080	28.12.2019		ПОВЕРСАН POWERSUN	924	924	
17039081	28.12.2019		МАС 805А MAS 805A	924	924	
17039082	28.12.2019		МАС 870Г MAS 870G	924	924	
17039083	27.01.2020		НС КОНСТАНТІН ОР NS KONSTANTIN OR	1978 1210 1517	1978 1210 1517	
17039084	27.01.2020		Анастасія ОР Anastasija OR	1978 1210 1517	1978 1210 1517	
17039085	27.01.2020		Латітуда ОР Latituda OR	1978 1210 1517	1978 1210 1517	
17039086	27.01.2020		Драган ОР Dragan OR	1978 1210 1517	1978 1210 1517	
17039087	14.01.2020		ЛГ50609 СХ LG50609 SX	793	793	
17039088	14.01.2020		ЛГ50662 LG50662	793	793	
17039089	14.01.2020		ЛГ50480 LG50480	793	793	
17039090	14.01.2020		ЛГ50521 КЛП LG50521 CLP	793	793	
17039091	14.01.2020		ЛГ50797 КЛП LG50797 CLP	793	793	
17039092	14.01.2020		ЛГ50510 LG50510	793	793	
17039093	28.12.2019		КВС ЛОГОС КЛ KWS LOGOS CL	2092	2092	
17039094	28.12.2019		КВС АХІЛЛЕС КЛП KWS ACHILLES CLP	2092	2092	



Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17039095	21.01.2020		Зурфер КЛ Surfer CL	1694	2537	
17039097	21.01.2020		Терасан КЛ Terasun CL	1694	2537	
17039100	28.12.2019		Аламбра КС Alambra CS	485	485	
17039102	28.12.2019		ЕС Альфа ES Alfa	2433	2433	
17039103	28.12.2019		ЕС Саксон ES Sakson	2433	2433	
17039104	28.12.2019		ЕС Берекет ES Bereket	2433	2433	
17039108	28.12.2019		ФЛОРМАСТЕР ІР FLORMASTER IR	924	924	
17039109	24.01.2020		ЕС ВІЛЛІС КЛП ES WILLIS CLP	806	806	
17039112	24.01.2020		ЕС АКСОН СУ ES AXON SU	806	806	
17039114	24.01.2020		ЕС ЕЛЕКТРИК КЛП ES ELECTRIC CLP	806	806	
17039115	24.01.2020		ЕС КОЛОРИС КЛ ES COLORIS CL	806	806	
17039116	24.01.2020		ЕС АРМОНІКА ES ARMONICA	806	806	
17039119	28.12.2019		САБВЕЙ SUBWAY	1219	1219	
17039120	28.12.2019		САЙБЕРІК SUBERIC	1219	1219	
17039121	28.12.2019		СУДОКУ SUDOKU	1219	1219	
17039125	16.01.2020		Балу Balu	2291	2291	
17039128	28.12.2019		САКСЕСС SUCCESS	1219	1219	
17039129	14.01.2020		ЛС ГЛОБСАН LS GLOBSUN	1356	1356	
17039132	28.12.2019		ДСХ415КЛ DSH415CL	2094	2094	
17039163	28.12.2019		МАНХЕТТЕН КЛП MANHATTAN CLP	1783	1783	
17039166	28.12.2019		РЖТ БЕЛЛОНА RGT BELLONA	1783	1783	
17039167	28.12.2019		АВСТРАЛІЯ AUSTRALIA	1783	1783	
17039170	28.12.2019		РЖТ ФРАНКЛІН RGT FRANKLLIN	1783	1783	
17039171	28.12.2019		КАМПБЕЛЛ CAMPBELL	1783	1783	
17039172	28.12.2019		АЯКС AJAX	1783	1783	
17039173	28.12.2019		РЖТ КАСТЕЛЛАНО КЛП RGT CASTELLANO CLP	1783	1783	
17039174	28.12.2019		САНБРЕЛА SUNBRELA	1783	1783	
17039175	28.12.2019		РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР RGT BELLVEDER	1783	1783	
17039177	28.12.2019		РЖТ ДОНАТЕЛЛО RGT DONATELLO	1783	1783	
17039178	28.12.2019		РЖТ САЛЛЬВАДОР RGT SALLVADOR	1783	1783	
17039190	28.12.2019		Аргенсол 72 КЛ Argensol 72 CL	2440	2440	
17039191	27.01.2020		М96С33 M96S33	273	273	
17039193	27.01.2020		М96КЛ02 M96CL02	273	273	
17039194	27.01.2020		М98КЛ88 M98CL88	273	273	
17039197	28.12.2019		Хелесан СУ Helesun SU	2232	2232	
17039201	16.01.2020		СХ 5220 SKh 5220	2444	2444	
17039204	16.01.2020		СХ 2563 SKh 2563	2444	2444	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17039205	16.01.2020		CX 2321	2444	2444	
18039002	16.01.2020		SKh 2321	1520	2554	
18039004	16.01.2020		Хайсан 228 Hysun 228	1520	2554	
18039005	16.01.2020		Хайсан 218 Hysun 218	1520	2554	
18039009	14.01.2020		Хайсан 180 IT Hysun 180 IT	1520	2554	
18039011	14.01.2020		Бонасол ЖМР Bonasol JMR	2312	2312	
18039012	14.01.2020		АН20ЛМ03	2451	2451	
18039013	14.01.2020		АН20ЛМ03 АН20ЛМ01	2451	2451	
18039014	14.01.2020		АН20ЛЕ01	2451	2451	
18039017	14.01.2020		АН20ЛЕ01 АН20ЛМ02	2451	2451	
18039021	28.01.2020		АН20ЛМ02 АН20ЛМ02	2451	2451	
18039022	28.01.2020		Тібо	2458	2458	
18039021	28.01.2020		Тібо	2458	2458	
18039022	28.01.2020		Річард Richard	2458	2458	
18039022	28.01.2020		Княжий Kniazhyi	2458	2458	
<b>Ріпак (озимий) <i>Brassica napus L. oleifera</i></b>						
<b>Rape Seed (Winter)</b>						
15040008	11.11.2019		Домінік DominiK	807	807	
15040038	04.10.2019		ПХ128 PKh128	9	9	
15041009	04.10.2019		СТЕФАНО КВС STEFANO KWS	2092	2092	
16040003	10.10.2019		ДК Експрешн DK Expression	844	844	
16040008	21.10.2019		КЛАВІР КЛ CLAVIER CL	912	912	
16040019	04.10.2019		АВАЛ AVAL	1959	1959	
16040031	04.10.2019		Ренді Randy	1498	1498	
16040032	04.10.2019		Берні Berny	1498	1498	
16040035	04.10.2019		КВС КЕРРІ КЛ KWS CARRY CL	2092	2092	
16040036	04.10.2019		КВС КИРИЛ КЛ KWS CYRILL CL	2092	2092	
17040001	10.10.2019		РТ274	9	9	
17040002	10.10.2019		РТ274 РТ275	9	9	
17040005	04.10.2019		ГІМАЛАЇ КЛ HIMALAYA CL	2255	2255	
17040006	10.10.2019		ДК Експіро DK Expiro	844	844	
17040007	10.10.2019		ДК Екстайм DK Extime	844	844	
17040008	10.10.2019		ДК Екстракт DK Extract	844	844	
17040009	10.10.2019		ДК Імпеллер КЛ DK Impeller CL	844	844	
17040011	22.10.2019		Арканзас Arkansas	793	793	
17040012	22.10.2019		Аспект Aspect	793	793	
17040013	22.10.2019		Абсолют Absolut	793	793	
17040014	22.10.2019		Атракція Attraction	793	793	
17040017	09.10.2019		ІМАНІ IMANY	924	924	
17040026	21.10.2019		КРИСТАЛ CRISTAL	912	912	
17040027	21.10.2019		ФРАНКЛІН FRANKLIN	912	912	

## Відомості, внесені до Реєстру сортів рослин України

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17040041	11.11.2019		Лексіон Lexion	807	807	
17040042	11.11.2019		Домінатор Dominator	807	807	
17040043	11.11.2019		Темптейшн Temptation	807	807	
17040045	11.11.2019		Келтор Keltor	807	807	
17040046	11.11.2019		Принц Prince	807	807	
<b>Ріпак (ярий) <i>Brassica napus L. oleifera</i></b> <b>Rape Seed (Spring)</b>						
16041001	28.12.2019		Клеопатра Cleopatra	2011	2011	
17041010	24.01.2020		САОКЕР КЛ SAOKER CL	806	806	
<b>Соя культурна <i>Glycine max (L.) Merrill</i></b> <b>Soya Bean</b>						
15045038	07.11.2019		Ольвія Olvia	2484	2484	
15045039	07.11.2019		Балатон Balaton	2484	2484	
15045040	07.11.2019		Віолетта Violetta	2484	2484	
17045011	07.11.2019		Браун Braun	2484	2484	
17045012	04.10.2019		Регіна Regina	1564	1564	
17045029	16.01.2020		Астор Astor	2061	2061	
17045030	16.01.2020		Нептун Neptune	2061	2061	
17045032	16.01.2020		Тала Tala	2061	2061	
17045033	16.01.2020		СВХ15Т1С1 SVX15Т1S1	2061	2061	
17045036	16.01.2020	21.11.2017	СВХ17Т00С15 SVX17Т00S15	2061	2061	
17045037	16.01.2020		Сіпресс Cypress	2061	2061	
17045039	16.01.2020		СВХ16Т00С2 SVX16Т00S2	2061	2061	
17045046	28.12.2019		Беттіна Bettina	2434	2434	
17045049	24.01.2020		ЕС ГОВЕРНОР ES GOVERNOR	806	806	
17045050	24.01.2020		ЕС ДИРЕКТОР ES DIRECTOR	806	806	
17045051	28.12.2019		Албенга Albenga	1564	1564	
17045052	28.12.2019		Ауреліна Aurelina	1564	1564	
17045053	28.12.2019		Алтона Altona	1564	1564	
17045058	28.12.2019		СІРЕЛІЯ SIRELIA	1783	1783	
<b>Буряк цукровий <i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima</i> Doell</b> <b>Sugar Beet</b>						
15069006	14.01.2020		Фантазія Fantazja	884	884	
17069011	28.12.2019		БТС 7160 BTS 7160	1974	1974	
17069012	28.12.2019		БТС 1730 BTS 1730	1974	1974	
17069013	28.12.2019		БТС 9975 BTS 9975	1974	1974	
17069014	28.12.2019		БТС 4905 Н BTS 4905 N	1974	1974	
17069015	28.12.2019		БТС 5735 BTS 5735	1974	1974	
17069018	14.01.2020		МАНІТУ MANITOU	1628	1628	
17069019	14.01.2020		СІУ SIOUX	1628	1628	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17069020	14.01.2020		ІГУАНА IGUANE	1628	1628	
17069021	28.12.2019		ЛІВІОЛА КВС LIVIOLO KWS	2092	2092	
17069022	28.12.2019		СМАРТ ДАНУТА КВС SMART DANUTA KWS	2092	2092	
17069023	28.12.2019		САНТОРІНА КВС SANTORINA KWS	2092	2092	
17069025	28.12.2019		ПРЕЦІОЗА КВС PREZIOSA KWS	2092	2092	
17069026	28.12.2019		КОНЦЕРТИНА КВС CONCERTINA KWS	2092	2092	
17069027	28.12.2019		СМАРТ БРІГА КВС SMART BRIGA KWS	2092	2092	
17069029	28.12.2019		СМАРТ НАРНІЯ КВС SMART NARNIA KWS	2092	2092	
17069031	28.12.2019		СТЕПАНКА КВС STEPANKA KWS	2092	2092	
17069032	28.12.2019		АННАМІРА КВС ANNAMIRA KWS	2092	2092	
17069033	27.01.2020		ФДР18Б1089 FDR18B1089	796	796	
17069034	27.01.2020		ФДР18Б1086 FDR18B1086	796	796	
17069035	27.01.2020		ФДР18Б4020 FDR18B4020	796	796	
<b>Коноплі посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Нерп</b>						
18080002	22.10.2019	15.08.2018	Мрія MRIIA	2435 2510	2435 2510	
<b>Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato</b>						
16088003	24.07.2019		Таурас Taurus	738	738	
16088005	24.07.2019		Сагіта Sagitta	738	738	
16088013	25.01.2020		Торнадо Tornado	2243	2243	
17088003	24.07.2019		Джолі Joly	738 2600	738 2600	
<b>Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant</b>						
18093001	23.10.2019		МОДАР MODAR	1902	1902	
<b>Боби кінські <i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> Field Bean</b>						
18094004	31.10.2019		Сіріус Sirius	1669	1669	
<b>Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage</b>						
17096007	24.01.2020		Канто Kanto	2281	2281	
17096008	28.12.2019		Бухарест Bucharest	744	744	
17096010	28.12.2019		Заказ Zakaz	1852	1852	
17096011	28.12.2019		Грін Флеш Green Flash	1852	1852	
17096013	28.12.2019		ТОРЕАДОР TOREADOR	1050	1050	
17096014	28.12.2019		ПРОДІКОС PRODIKOS	1050	1050	
17096015	28.12.2019		ГАЛЛІКАН GALLICAN	1959	1959	
<b>Капуста кольрабі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongylodes</i> L. Kohlrabi</b>						
18098001	28.12.2019		Лех Lech	1730	1730	
<b>Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower</b>						
17101003	28.12.2019		Аквата Aquata	2015	2015	
17101004	28.12.2019		Овіндолі Ovindoli	1852	1852	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
18101001	10.10.2019		Ількар Ilkar	1650	1650	
<b>Кукурудза цукрова <i>Zea mays L. ssp. saccharata</i> Sturt. Sweet Corn</b>						
17103009	15.01.2020		Турбін Turbine	2087	2662	
18103005	27.01.2020		Мірза Mirza	273	273	
<b>Цибуля городня <i>Allium cepa L.</i> Onion, Echalion</b>						
17106011	28.12.2019		Поконо Pocopo	1852	1852	
17106013	14.01.2020		Орленда Orlenda	751	751	
17106014	14.01.2020		Монделла Mondella	751	751	
17106015	14.01.2020		Сонома Sonoma	751	751	
<b>Морква <i>Daucus carota L.</i> Carrot</b>						
16109002	23.01.2020		Нарина Naryna	2200 2201	2200 2201	
17109007	28.12.2019		Лес Саянтес Les Saintes	1852	1852	
17109008	14.01.2020		Новара Novara	751	751	
17109009	28.12.2019		Волін Wolin	1730	1730	
<b>Огірок посівний <i>Cucumis sativus L.</i> Cucumber</b>						
15110013	23.01.2020		Міф Mif	1990	1990	
18110004	23.10.2019		БАЗИС BAZIS	1902	1902	
18110005	23.10.2019		УБЕДА UBEDA	1902	1902	
18110006	23.10.2019		УНІКУМ UNIKUM	1902	1902	
18110008	04.10.2019		Северін Severin	840	840	
18110011	28.12.2019		Мадейра Madeira	1852	1852	
<b>Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum L.</i> Sweet Pepper, Paprika</b>						
17113006	23.01.2020		Арбалет Arbalet	2200 2201	2201 2200	
17113007	23.01.2020		Ньютон Niuton	2200 2201	2200 2201	
18113006	23.10.2019		ТОМ TOM	1902	1902	
18113007	16.10.2019		Венера Venega	2507	2507	
18113008	04.10.2019		Драгоні Dragoney	840	840	
18113009	04.10.2019		Джіалте Gialte	840	840	
18113010	04.10.2019		Мавера Mavega	840	840	
18113011	28.12.2019		Сардінеро Sardinero	1852	1852	
18113012	28.12.2019		Раптор Raptor	1852	1852	
18113013	28.12.2019		Декстер Dexter	1852	1852	
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum L.</i> Tomato</b>						
17115008	24.01.2020		Камі Kamı	2281	2281	
17115012	24.01.2020		Нуксі Nuxı	2281	2281	
17115028	28.12.2019		Сентоса Sentosa	1852	1852	
17115031	14.01.2020		Стромболіно Strombolino	1362	1362	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
18115017	23.10.2019		ПРАЙД PRIDE	1902	1902	
18115018	23.10.2019		ПІНК СВІТНЕС PINK SVITNES	2429	2429	
18115020	23.10.2019		СІК1504 SIK1504	2429	2429	
18115021	04.10.2019		Саймон Saimon	840	840	
18115022	04.10.2019		Пінкшайн Pinkshine	840	840	
18115023	04.10.2019		Вірго Veggo	840	840	
18115025	28.12.2019		Куртіно Kurtino	1852	1852	
18115026	28.12.2019		ДРЦ 564 DRC 564	2522	744	
18115027	28.12.2019		ПІНКІД PINKID	1852	1852	
18115028	28.12.2019		Страбена Strabena	1852	1852	
18115030	28.12.2019		Фуджімару Fujimaru	1852	1852	
18115031	28.12.2019		Бірікіно Birikino	1852	1852	
18115032	28.12.2019		Філовіта Philovita	1852	1852	
18115033	28.12.2019		Джорней Journey	1852	1852	
18115034	28.12.2019		Органза Organza	1852	1852	
18115035	28.12.2019		Компліс Complice	1852	1852	
18115046	15.01.2020		Панамера Panamera	2020	2020	
18115047	28.12.2019		Саворина Savoryna	1730	1730	
<b>Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish</b>						
17118003	28.12.2019		ФІЛІПАР FILIPAR	1050	1050	
18118005	28.12.2019		Бодіам Bodiam	1730	1730	
<b>Салат посівний листовий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Lettuce</b>						
18120012	28.10.2019		Біондонна Biondonna	751	751	
18120014	28.10.2019		Солос Solos	751	751	
18120015	28.12.2019		Екстемп Extemp	1730	1730	
18120016	09.10.2019		Лалік Lalique	1730	1730	
18120017	28.12.2019		Кодекс Codex	1730	1730	
19120001	04.10.2019		Лока Loka	840	840	
<b>Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive</b>						
18121001	04.10.2019		Калафайн Calafine	840	840	
18121002	04.10.2019		Бенефайн Benefine	840	840	
<b>Буряк столовий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet</b>						
17122002	14.01.2020		Ред Бул Red Bull	1362	1362	
17122003	14.01.2020		Маноло Manolo	751	751	
<b>Холодок лікарський (спаржа) <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparagus</b>						
18124001	14.01.2020		Сігнул Sugnus	751	751	
18124002	14.01.2020		Кумулюс Cumulus	751	751	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
18124003	14.01.2020		Пріус Prius	751	751	
18124004	14.01.2020		Бахус Bachus	751	751	
<b>Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage</b>						
18135001	18.07.2019		Пікаліна Pikalina	2506	2506	
<b>Капуста броколі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli</b>						
18136003	15.01.2020		Сігно Cigno	2020	2020	
<b>Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon</b>						
17146006	28.12.2019		Морган Morhan	1730	1730	
17146008	28.12.2019		ВМХ4746 WMH4746	1050	1050	
17146011	28.12.2019		Тамтам Tamtam	840	840	
18146001	28.12.2019		БАРХАН BARHAN	1050	1050	
18146004	10.10.2019		Оранж Кінг Orange King	1650	1650	
<b>Дня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon</b>						
18147001	04.10.2019		Санвісенте Sanvicente	1730	1730	
<b>Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash</b>						
17148004	10.10.2019		ГОЛДЕН ГЛОРИ GOLDEN GLORY	1050	1050	
<b>Грястиця збірна <i>Dactylis glomerata</i> L. Cocksfoot</b>						
18182001	17.10.2019		Альдебаран Aldebaran	2222	2222	
<b>Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne</b>						
16196003	28.12.2019		Оксітан Occitane	924	924	
16196004	28.12.2019		Мілкі Макс Milky Max	924	924	
<b>Костриця очеретяна <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. Tall Fescue</b>						
16205006	17.10.2019		Томкет 1 Tomcat 1	2222	2222	
<b>Вишня звичайна <i>Prunus cerasus</i> L. Sour cherry, Tart cherry, Morello</b>						
15257001	19.11.2019		Пам'ять Артеменка Pam'iat' Artemenka	1912	1912	
<b>Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear</b>						
17258002	20.08.2019		Новинка мліївська Novynka mliivska	2314	2314	
<b>Персик звичайний <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch Peach</b>						
18259001	04.10.2019		Мостиський діамант Mostyskyi diamant	2518	2518	
18259002	04.10.2019		Мостиський Mostyskyi	2518	2518	
<b>Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum</b>						
15261001	20.08.2019		Янтарна мліївська Yantarna mliivs`ka	1912	1912	
<b>Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple</b>						
17263005	04.10.2019		СКЮ 159 SQ 159	2417	2417	
<b>Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L. Walnut</b>						
16284004	28.08.2019		ГЕТЬМАН Hetman	1601 1940	1601 1940	
16284005	28.08.2019		КРАСЕНЬ Krasen	1601 1940	1601 1940	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
18284011	04.10.2019		ТАІСІЯ TAISIA	2473	2473	
<b>Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry</b>						
17296004	24.01.2020		Дрісколл Маравілла Driscoll Maravilla	2419	2419	
18296004	04.10.2019		Глен Файн Glen Fyne	2221	2221	
<b>Калина звичайна <i>Viburnum opulus</i> L. Snowball Tree</b>						
18303002	11.10.2019		Аня Ania	1601 2480	1601 2480	
<b>Троянда <i>Rosa</i> L. Rose</b>						
17339003	29.07.2019		РЮІЦЛ 1632A RUICL 1632A	1569	1569	
<b>Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn Hybrid Lucerne</b>						
15364001	14.01.2020		Одрі Odri	736	736	
15364003	28.12.2019	25.11.2015	Луїза Luiza	1698	1698	
<b>Костриця червона <i>Festuca rubra</i> L. Red Fescue, Creeping Fescue</b>						
16377005	17.10.2019		Корейл Corail	2222	2222	
18377002	17.10.2019		ПІНАФОР PINAFORE	2222	2222	
18377003	17.10.2019		ГРІНМІЛ GREENMILE	2222	2222	
<b>Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce</b>						
18421002	28.12.2019		Ферлі Fairly	840	840	
18421003	28.12.2019		Брайтон Brighton	840	840	
18421004	04.10.2019		Алессо Alesso	840	840	
18421005	14.01.2020		Топасіо Topasio	751	751	
18421006	14.01.2020		Джойс Joice	751	751	
18421007	14.01.2020		Лектріс Lectrice	751	751	
19421004	04.10.2019		Едуардо Eduardo	840	840	
<b>Костриця овеча <i>Festuca ovina</i> L. Sheep's Fescue</b>						
16473002	17.10.2019		Думас 1 Dumas 1	2222	2222	
<b>Чорниця <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Highbush Blueberry, Blueberry</b>						
18501001	04.10.2019		ВВ006 VV006	1975	1975	
18501002	04.10.2019		ВВ008 VV008	1975	1975	
18501003	04.10.2019		РЕКА REKA	2516	1975	
<b>Лохина високоросла <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry, Highbush Blueberry</b>						
18519001	23.10.2019		Ласка Laska	2470	2470	
18519002	23.10.2019		Мавка Mavka	2470	2470	
<b>Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat</b>						
16539001	28.12.2019		Аттергауер Дінкель Attergauer Dinkel	1498	1498	
<b>Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Roman Lettuce, Cos Lettuce</b>						
18546002	04.10.2019		Тотана Totana	840	840	
18546003	04.10.2019		Мунред Moonred	840	840	



Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
18546005	28.12.2019		Веродіта Verodita	1730	1730	
18546006	28.12.2019		Тудела Tudela	1730	1730	
18546007	28.12.2019		Армілья Armillia	1730	1730	
<b>Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)</b>						
18582002	04.10.2019		Летіція Letizia	840	840	
<b>Ожина <i>Rubus subgenus Eubatus</i> sect. <i>Moriferi</i> &amp; <i>Ursini</i> Blackberry, Loganberry, Boysenberry</b>						
18631003	04.10.2019		Лох Тей Loch Tay	2221	2221	
<b>Просо африканське <i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R.Br.</b>						
17634001	15.10.2019		Нутріфід Nutrifeed	1520	2554	
<b>Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia</b>						
18649001	30.08.2019		Котевіса 1 Cotevisa 1	2489	2489	
18649002	30.08.2019		Котевіса 2 Cotevisa 2	2489	2489	
<b>Вігна промениста <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek</b>						
16024001	27.11.2019		Заратустра Zaratustra	2218	2218	
<b>Кукурудза цукрова – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn – parental component</b>						
17903001	14.01.2020		МС 999	736	736	
17903002	14.01.2020		MS 999	736	736	
17903003	14.01.2020		МС 880 MS 880	736	736	
17903004	14.01.2020		МС 736 MS 736	736	736	
17903005	14.01.2020		Багнет Bahnet	736	736	
17903005	14.01.2020		ОС 711 OS 711	736	736	
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component</b>						
16909063	10.10.2019		ПХ43МВ PH43MW	9	9	
16909175	28.12.2019		ССС2121 CSC2121	924	924	
17909007	28.12.2019		АІО1881АІО1884 AIO1881AIO1884	1959	1959	
17909105	28.12.2019		ССС3157 CSC3157	924	924	
17909106	28.12.2019		СМС3999 CMS3999	924	924	
17909107	28.12.2019		ССС3996 CSC3996	924	924	
17909108	28.12.2019		ЛЛР2961 ЛМР3185 LLR2961 LMR3185	924	924	
17909109	28.12.2019		СМС2311 ЛЖР2038 CMS2311 LJR2038	924	924	
17909110	28.12.2019		ЛІН2248 LIN2248	924	924	
17909112	28.12.2019	24.10.2017	ЛМХ3164 LMH3164	924	924	
17909113	28.12.2019	24.10.2017	ЛНР3495 LNR3495	924	924	
17909114	28.12.2019	24.10.2017	ЛІФ2184 LIF2184	924	924	
17909115	28.12.2019	24.10.2017	ЛОР3696 LOR3696	924	924	
17909118	28.12.2019		ЛОР3690 LOR3690	924	924	
17909119	28.12.2019		ЛЖР2038 ЛМР3185 LJR2038 LMR3185	924	924	
17909125	22.01.2020		МС 150 MS 150	966	966	
17909126	22.01.2020		МС 200 MS 200	966	966	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17909127	22.01.2020		Анапа С	966	966	
17909128	22.01.2020		Апара S	966	966	
17909129	22.01.2020		МС 262 ЗС MS 262 ZS	966	966	
17909130	22.01.2020		М 242 ЗС M 242 ZS	966	966	
17909131	28.12.2019		МС 264 СВ MS 264 SV	2092	2092	
17909133	28.12.2019		КВ 9Д1533 KW 9D1533	2092	2092	
17909134	28.12.2019		КВ 9ЕЙ0015 KW 9EY0015	2092	2092	
17909135	28.12.2019		КВ 7Р1104 KW 7R1104	2092	2092	
17909137	28.12.2019		КВ 4ЕХ1630 KW 4EX1630	2092	2092	
17909139	28.12.2019		ЦАЛ2261 CAL2261	1959	1959	
17909140	28.12.2019		ЦІД2108 CID2108	1959	1959	
17909141	28.12.2019		ЦІД2457 CID2457	1959	1959	
17909143	28.12.2019		ЦІД2268 CID2268	1959	1959	
17909145	14.01.2020		227ВБ025 227WB025	485	485	
17909146	28.12.2019		ЦАФ3362 CAF3362	1959	1959	
17909147	14.01.2020		262БХ503 262BH503	485	485	
17909148	14.01.2020		156ЛА337Х 14В001 156LA337X 14B001	485	485	
17909149	14.01.2020		156ЛА337 156LA337	485	485	
17909150	14.01.2020		441ХФ006 441XF006	485	485	
17909151	28.12.2019		ХІД3347 HID3347	1959	1959	
17909152	28.12.2019		ДАКс3360 DAX3360	1959	1959	
17909153	28.12.2019		ІФА4226 IFA4226	1959	1959	
17909154	28.12.2019		ІАКс3300 IAX3300	1959	1959	
17909155	28.12.2019		ДІД3464 DID3464	1959	1959	
17909156	28.12.2019		НПАКс4072 NPAH4072	1959	1959	
17909157	28.12.2019		ЕАКс5121 EAX5121	1959	1959	
17909158	14.01.2020		444СХ118 444SH118	485	485	
17909159	14.01.2020		483ЮХ037 483QH037	485	485	
17909160	14.01.2020		223ДХ002 223DH002	485	485	
17909161	14.01.2020		443УК319 443YK319	485	485	
17909167	24.01.2020		ЕГ7А97 EG7A97	806	806	
17909168	24.01.2020		ЕГ2363 EG2363	806	806	
17909169	24.01.2020		ЕГ3036 EG3036	806	806	
17909170	14.01.2020		АІІ574 AII574	793	793	
17909171	24.01.2020		ЕС4585 ES4585	806	806	
17909172	24.01.2020		ЕГ7471 EG7471	806	806	
17909173	24.01.2020		ЕС3556 ES3556	806	806	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17909174	24.01.2020		ЕС4604 ES4604	806	806	
17909175	14.01.2020		ЛІМІВВ957С ФБВ1130 LIMIVV957S FBV1130	793	793	
17909176	14.01.2020		ФІІ422 ФІІ424 FII422 FII424	793	793	
17909177	14.01.2020		КЮВІ504 QVI504	793	793	
17909178	14.01.2020		РВІ442 РВІ441 RVI442 RVI441	793	793	
17909179	14.01.2020		ММЛ525 MML525	793	793	
17909180	14.01.2020		МАС385 MAC385	793	793	
17909181	14.01.2020		АВ01236Ц AVO1236C	793	793	
17909182	14.01.2020		ДП32 ДЛ26 DP32 DL26	793	793	
17909216	28.12.2019		Р15021 R15021	1783	1783	
17909217	28.12.2019		Р15037 R15037	1783	1783	
17909218	28.12.2019		Р16089 R16089	1783	1783	
17909235	24.01.2020		ГД47ГД48 GD47GD48	2264	2264	
18909001	24.01.2020		Ш6210 H6210	2264	2264	
18909002	24.01.2020		Ш3637 H3637	2264	2264	
18909004	24.01.2020		Ш1135 H1135	2264	2264	
18909005	24.01.2020		ЗМГ6403 ZMG6403	2264	2264	
18909009	24.01.2020		МБС4300 MBS4300	2264	2264	
<b>Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component</b>						
17915004	28.12.2019		Ло1018П Ло1015Н Lo1018P Lo1015N	824	824	
17915005	28.12.2019		Ло1019П Ло1059Н Lo1019P Lo1059N	824	824	
<b>Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) – parental component</b>						
17919001	28.12.2019		РЕ29 RE29	1959	1959	
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component</b>						
16939068	28.12.2019		АР 003 Б AR 003 B	1265	1265	
16939069	28.12.2019		АР 002 Б AR 002 B	1265	1265	
16939122	04.10.2019		ХА1АСУ KhA1ASU	2232	2232	
16939123	04.10.2019		РХАНМ17РФІМІ RHANM17RFIMI	2232	2232	
17939005	13.01.2020		ЕХ935 EH935	2267	2267	
17939029	28.12.2019		У14ЛГЦЛЛМ U14LGCLLM	9	9	
17939035	24.01.2020		Ф1316ГФ F1316HF	9	9	
17939039	28.12.2019		7ПГЛК23Р 7PHLQ23R	9	9	
17939044	14.01.2020		2603Х1093 2603Kh1093	2312	2312	
17939045	14.01.2020		113 Р 113 R	2312	2312	
17939046	28.12.2019		ТРХ5019Р TRH5019R	924	924	
17939047	28.12.2019		ТРІ4387Р TRI4387R	924	924	
17939048	28.12.2019		ТРІ5018Р TRI5018R	924	924	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17939050	28.12.2019		ТФІ4494А	924	924	
17939051	28.12.2019	24.10.2017	ТФІ4494А ТФС3769А	924	924	
17939052	28.12.2019	24.10.2017	ТФХ4746А ТФН4746А	924	924	
17939053	28.12.2019	23.10.2017	ТРС5017Р ТРС5017R	924	924	
17939054	27.01.2020		УН 715 РХА UN 715 RKhA	1517	1517	
17939056	14.01.2020		ЛГ71234МІА LG71234MIA	793	793	
17939061	14.01.2020		Ф754271МА F754271MA	793	793	
17939062	14.01.2020		ЛГ751234ОА LG751234OA	793	793	
17939064	28.12.2019		Х11050Р H11050R	2092	2092	
17939065	28.12.2019		Х09951Р H09951R	2092	2092	
17939066	14.01.2020		56Ц20Р 56C20R	485	485	
17939067	14.01.2020		63Г13іс 63G13is	485	485	
17939068	14.01.2020		67К23Р 67K23R	485	485	
17939070	14.01.2020		49Ц01А 49C01A	485	485	
17939071	28.12.2019		КТ 24 Б KT 24 B	2433	2433	
17939072	28.12.2019		КТ 22 А KT 22 A	2433	2433	
17939073	28.12.2019		КТ 22 Б KT 22 B	2433	2433	
17939075	28.12.2019		КС 501 В KS 501 V	2433	2433	
17939076	28.12.2019		КС 505 В KS 505 V	2433	2433	
17939080	24.01.2020		Р469МЖКО R469MJKO	806	806	
17939084	24.01.2020		Ф7АХ2МЖКА F7AX2MJKA	806 1435	806 1435	
17939085	24.01.2020		Ф7АХ2МЖА F7AX2MJA	806 1435	806 1435	
17939086	24.01.2020		Р11СТ6М2І R11ST6M2I	806 1435	806 1435	
17939087	24.01.2020		Р1119ЖІ R1119JI	806 1435	806 1435	
17939089	24.01.2020		Р1307І R1307I	806 1435	806 1435	
17939090	24.01.2020		Ф5ДЦ5МСА F5DC5MSA	806 1435	806 1435	
17939091	24.01.2020		СР1087МСО SR1087MSO	806 1435	806 1435	
17939092	24.01.2020		Р1359МЖ R1359MJ	806 1435	806 1435	
17939093	24.01.2020		Р5ПЕ4МС R5PE4MS	806 1435	806 1435	
17939094	24.01.2020		Ф9ЕС4МІОА F9ES4MIOA	806 1435	806 1435	
17939128	28.12.2019		ІМІ 3 ДМ IMI 3 DM	2440	2440	
17939129	28.12.2019		АГ 438 РКЛ AG 438 RCL	2440	2440	
17939130	28.12.2019		639 Р 639 R	2440	2440	
17939131	28.12.2019		АГ 238 АКЛ AG 238 ACL	2440	2440	
17939132	20.01.2020		ВЛ 1120А VL 1120A	2265	2265	
17939133	20.01.2020		ВН 2821В VN 2821V	2265	2265	
17939134	20.01.2020		ВН 6079В VN 6079V	2265	2265	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак
17939135	20.01.2020		BH 6045A	2265	2265	
17939136	20.01.2020		VN 6045A	2265	2265	
17939137	20.01.2020		BH 1080A	2265	2265	
17939138	20.01.2020		VN 1080A	2265	2265	
17939139	20.01.2020		BH 7152B	2265	2265	
17939140	20.01.2020		VN 7152V	2265	2265	
17939141	20.01.2020		BH 7050A	2265	2265	
17939142	28.12.2019		VN 7050A	2265	2265	
18939010	28.01.2020		ВЛ 1240Б	2265	2265	
18939012	28.01.2020		VL 1240B	2265	2265	
18939017	27.01.2020		BH 6531B	2265	2265	
18939029	14.01.2020		VN 6531V	2265	2265	
18939030	14.01.2020		BH 3040A	2265	2265	
18939031	14.01.2020		VN 3040A	2265	2265	
18939033	14.01.2020		ТРІ4495Р	924	924	
			ТРИ4495R	924	924	
			ДС 87 В	2458	2458	
			DS 87 V	2458	2458	
			ДС 58 Б	2458	2458	
			DS 58 B	2458	2458	
			MP7314	273	273	
			MR7314	273	273	
			P78033Ж	1435	1435	
			R78033J	1435	1435	
			Р6ПХ4ЖМ	1435	1435	
			R6PX4JM	1435	1435	
			P13ГВ1МЖК	1435	1435	
			R13GW1MJK	1435	1435	
			Р4НП8МЖС	1435	1435	
			R4NP8MJS	1435	1435	
<b>Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i></b>						
<b>Rape Seed (Winter) – parental component</b>						
16940001	10.10.2019		ССР219	844	844	
16940002	10.10.2019		SCR219	844	844	
16940004	10.10.2019		СС250Д	844	844	
16940005	08.10.2019		CS250D	844	844	
16940006	08.10.2019		СС317	736	736	
16940007	08.10.2019		CS317	736	736	
16940008	08.10.2019		ГО 67	736	736	
17940001	10.10.2019		НО 67	736	736	
17940002	10.10.2019		ГО 44	736	736	
17940003	10.10.2019		НО 44	736	736	
17940004	10.10.2019		МО 62	736	736	
17940005	09.10.2019		МО 62	736	736	
17940006	09.10.2019		СКМО 193	736	736	
17940007	08.10.2019	20.06.2017	SKMO 193	736	736	
17940008	08.10.2019		СС403	844	844	
17940009	08.10.2019		CS403	844	844	
			ДС1993	844	844	
			DS1993	844	844	
			СС398	844	844	
			CS398	844	844	
			ICC659	844	844	
			ICS659	844	844	
			РММС9686А	924	924	
			RMMC9686A	924	924	
			РММС9695Р	924	924	
			RMMC9695R	924	924	
			МЕЛ 1	736	736	
			MEL 1	736	736	
			ВНІС 1	736	736	
			VNIS 1	736	736	
			МЕЛ 2	736	736	
			MEL 2	736	736	

# Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Catalog of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

## Відомості про сорти рослин, які включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal</b>											
<b>Пшениця м'яка (озима) Triticum aestivum L. (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.; Triticum vulgare Host.; Triticum hybernum L.; Soft Wheat (Winter) Triticum cereale Schrank; Triticum sativum Lam.)</b>											
17012025	РЖТ Преміант RGT Premiant / RGT Premiant	СЗ	1286	1286			2019	ЛП	зерн		цін
17012041	МІП Лада MIP Lada / MIP Lada	СЗ	1589	1589			2019	Л	зерн		ф
16012048	СОФРУ SOFRU / SOFRU	СЗ	485	485			2019	ЛП	зерн		цін
17012028	Соборна Соборна / Soborna	СЗ	1698	1698			2019	ЛП	зерн		слн
16012045	Мірастар Mirastar / Mirastar	СЗ	1498	1498			2019	ЛП	зерн		слн
17012004	Хліб Аріїв Хліб Аріїв / Khlib Ariiv	СЗ	1998	1998			2020	ЛП	зерн		цін
17012027	Саласар Salasar / Salasar	СЗ	2071	2071			2020	ЛП	зерн		цін
17012026	ШТРУ 080150с5 STRU 080150s5 / STRU 080150s5	СЗ	2071	2071			2020	ЛП	зерн		цін
16012046	Мауріціо Maurizio / Maurizio	СЗ	1498	1498			2019	ЛП	зерн		цін
17012040	МІП Ювілейна MIP Ювілейна / MIP IUvileina	СЗ	1589	1589			2019	Л	зерн		слн
17012042	МІП Фортуна MIP Фортуна / MIP Fortuna	СЗ	1589	1589			2019	ЛП	зерн		цін
16012044	Торкарі Торкарі / Torcarі	СЗ	1498	1498			2019	П	зерн		цін
16012051	Лаваль Лаваль / Laval	СЗ	1517	1517			2020	ЛП	зерн		цін
16012049	СОРРІАЛ SORRIAL / SORRIAL	СЗ	485	485			2019	ЛП	зерн		слн
16012047	СОФІ КС SOPHIE CS / SOPHIE CS	СЗ	485	485			2019	П	зерн		цін
<b>Пшениця м'яка (яра) Triticum aestivum L. (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.; Triticum vulgare Host.; Triticum hybernum L.; Triticum cereale Schrank; Soft Wheat (Spring) Triticum sativum Lam.)</b>											
17013007	Лікамеро Licamero / Licamero	СЗ	1797	1797			2020	СЛП	зерн		слн
17013004	ПС Петра PS Petra / PS Petra	П	2071	2071			2020	ЛП	зерн		слн
17013003	ШТРУ 093736с4 STRU 093736s4 / STRU 093736s4	СЗ	2071	2071			2020	СЛП	зерн		цін
<b>Пшениця тверда (озима) Triticum durum Desf. (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.; Triticum turgidum L. subsp. turgidum conv. durum (Desf.) MacKey; Triticum turgidum L.; Triticum sativum durum Pers.; Triticum vulgare durum Alef.; Triticum vulgare Vill. s. str.; Triticum durum Koern.; Triticum sativum durum Hackel; Triticum tenax B durum Asch. et Graebn.; Durum Wheat (Winter) Triticum alatum Peterm.; Triticum dicoccum tenaces Perc.; Triticum pyramidale Pers.)</b>											
16007002	Надійний Надійний / Nadiiniy	СЗ	1591	1591			2019	С	х		
17007003	МІП Лакомка MIP Лакомка / MIP Lakomka	СЗ	1589	1589			2019	С	х		
16007003	Людмила Людмила / Liudmyla	СЗ	1123	1123			2019	С	х		
16007001	Кораловий Кораловий / Koralovyі	СЗ	1591	1591			2019	С	х		

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володіть патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)</b> ( <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.; <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> (Desf.) MacKey; <i>Triticum turgidum</i> L.; <i>Triticum sativum durum</i> Pers.; <i>Triticum vulgare durum</i> Alef.; <i>Triticum vulgare</i> Vill. s. str.; <i>Triticum durum</i> Koern.; <i>Triticum sativum durum</i> Hackel; <i>Triticum tenax</i> B <i>durum</i> Asch. et Graebn.; <i>Triticum alatum</i> Petern.; <i>Triticum dicoccum tenaces</i> Perc.; <i>Triticum pyramidale</i> Pers.)											
17006002	ОДИССЕО ODISSEO / ODISSEO	C3	1959	1959			2019	СЛ	x		
17006001	ФУЕГО FUEGO / FUEGO	C3	1959	1959			2019	СЛ	x		
17006008	Ремарка Remarka / Remarka	C3	736	736			2020	Л	x		
<b>Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat</b>											
16539001	Аттергауер Дінкель Attergauer Dinkel / Attergauer Dinkel	C3	1498	1498			2019	СЛП	зерн		ф
<b>Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component</b> ( <i>Triticum secale</i> Link; <i>Triticum cereale</i> Salisb.)											
17915004	Ло1018П Ло1015Н Lo1018P Lo1015N / Lo1018P Lo1015N	F1	824	824			2019				
17915005	Ло1019П Ло1059Н Lo1019P Lo1059N / Lo1019P Lo1059N	F1	824	824			2019				
<b>Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)</b> ( <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum grex culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
17019001	СИ ГАЛІЛЕО SY GALILEO / SY GALILEO	F1	1959	1959			2019	П	зерн		
16019017	ЛГ Тріумф LG Triumph / LG Triumph	C3	793	793			2020	П	зерн		
16019020	МІП Статус MIP Status / MIP Status	C3	1589	1589			2019	П	зерн		
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b> ( <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum grex culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
17020014	МІП Захисник MIP Zakhysnyk / MIP Zakhysnyk	C3	1589	1589			2019	ЛП	зерн		сбіл
17020016	МІП Шарм MIP Sharm / MIP Sharm	C3	1589	1589			2019	ЛП	зерн		сбіл
17020022	СБ Комфорт CB Comfort / CB Comfort	C3	1747	1747			2020	ЛП	зерн		сбіл
17020008	Маріан Marian / Marian	C3	1990	1990			2020	ЛП	зерн		сбіл
17020015	МІП Девіз MIP Deviz / MIP Deviz	C3	1589	1589			2019	ЛП	зерн		сбіл
17020013	МІП Титул MIP Tytul / MIP Tytul	C3	1589	1589			2019	ЛП	зерн		сбіл
17020017	КВС Кріссі KWS Chrissie / KWS Chrissie	C3	824	824			2019	ЛП	зерн		сбіл
17020010	Кларінетте Klarinette / Klarinette	C3	1797	1797			2020	СЛП	зерн		сбіл
17020012	Елінор Ellinor / Ellinor		1965	1965			2020	Л	зерн		сбіл
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b> ( <i>Zea americana</i> ; <i>Zea alba</i> ; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalasia mays</i> O. Kuntze.)											
16009020	Чорномор Chornomor / Chornomor	F1	1698 1854 1637	1698 1854 1637			2019	Л	зерн	ср (250)	
16009021	Ламасан Lamasan / Lamasan	F1	1698 1854 1637	1698 1854 1637			2019	СЛ	зерн	сс	
16009022	Тавричанка Tavrychanka / Tavrychanka	F1	1698 1854 1637	1698 1854 1637			2019	СЛП	зерн	сс	

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
16009023	Олешківський Олешківський / Oleshkivs`kyi	F1	1698 1854 1637	1698 1854 1637			2019	Л	зерн	ср	
16009035	Р9537 Р9537 / Р9537	F1	9	9			2019	СЛ	зерн		
16009048	Мейфлавер Mayflower / Mayflower	F1	844	844			2019	Л	зерн		
16009078	ДКС5075 DKC5075 / DKC5075	F1	844	844			2019	С	зерн		
17009006	СИ МАРИМБА SY MARIMBA / SY MARIMBA	F1	1219	1219			2019	СЛП	зерн		
17009046	Р0312 R0312 / R0312	F1	9	9			2019	С	зерн		
17009048	Р9757 R9757 / Р9757	F1	9	9			2019	П	зерн		
17009049	Р0349 R0349 / R0349	F1	9	9			2019	С	зерн		
17009050	Р9363 R9363 / Р9363	F1	9	9			2019	СЛП	зерн		
17009051	Р9170 R9170 / Р9170	F1	9	9			2019	СЛП	зерн		
17009052	Р0268 R0268 / R0268	F1	9	9			2019	С	зерн		
16009024	Віра Vira / Vira	F1	1698 1854 1637	1698 1854 1637			2019	СЛП	зерн		
17009054	Р8707 R8707 / Р8707	F1	9	9			2019	СЛ	зерн		
17009055	Р0362 R0362 / R0362	F1	9	9			2019	С	зерн		
17009056	МОНСТР MONSTER / MONSTER	F1	924	924			2019	ЛП	зерн		
17009057	МАС 49П MAS 49P / MAS 49P	F1	924	924			2019	С	зерн		
17009058	МАС 308А MAS 308A / MAS 308A	F1	924	924			2019	СЛП	зерн		
17009047	Р9071 R9071 / Р9071	F1	9	9			2019	П	зерн		
17009065	МАСТОР MASTHOR / MASTHOR	F1	924	924			2019	Л	зерн		
17009074	Р8358 R8358 / Р8358	F1	9	9			2019	СЛП	зерн		
17009075	В2190 B2190 / В2190	F1	9	9			2019	СЛП	зерн		
17009088	Алькор Alkor / Alkor	F1	966	966			2020	СЛ	зерн		
17009090	СИ ТРИВІУС SY TRIVIUS / SY TRIVIUS		1219	1219			2019	СЛП	зерн		
17009053	Р9874 R9874 / Р9874	F1	9	9			2019	С	зерн		
17009092	СИ ТОРИНО SY TORINO / SY TORINO	F1	1219	1219			2019	ЛП	зерн		
17009093	СИ ПРЕМЕО SY PREMEO / SY PREMEO	F1	1219	1219			2019	ЛП	зерн		
17009095	Поєзі КС POESI CS / POESI CS	F1	485	485			2019	СЛП	зерн		
17009096	Палізі КС PALIZI CS / PALIZI CS	F1	485	485			2019	С	зерн		
17009097	Кіянті КС Chianti CS / Chianti CS	F1	485	485			2019	СЛП	зерн		
15009034	МАС 34В MAS 34B / MAS 34B	F1	924	924			2019	ЛП	зерн	сс (360)	
15009035	МАС 48Л MAS 48L / MAS 48L	F1	924	924			2019	ЛП	зерн	сс (420)	
17009060	Стардаст Stardust / Stardust	F1	924	924			2019	СЛ	зерн		
17009112	ЕС ДЖЕНТЛЬМЕН ES GENTLEMAN / ES GENTLEMAN	F1	806	806			2020	СЛП	зерн		



Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17009113	ЕС БРОДВЕЙ ES BROADWAY / ES BROADWAY	F1	806	806			2020	ЛП	зерн		
17009114	ЕС ХЕТТРИК ES HATTRICK / ES HATTRICK	F1	806	806			2020	СЛП	зерн		
17009115	ЕС ДЕКАРТ ES ДЕКАРТ / ES DEKART	F1	806	806			2020	ЛП	зерн		
17009116	ЕС ГЕДЕОН ES GEDION / ES GEDION	F1	806	806			2020	СЛП	зерн		
17009091	СИ ОКТЕОН SY OSTEON / SY OSTEON	F1	1219	1219			2019	СЛП	зерн		
17009118	ЕС ЛЕГОЛАС ES LEGOLAS / ES LEGOLAS	F1	806	806			2020	ЛП	зерн		
17009119	ЕС ПЕРСПЕКТИВ ES PERSPECTIVE / ES PERSPECTIVE	F1	806	806			2020	СЛ	зерн		
17009125	Жаклін Jakleen / Jakleen	F1	793	793			2020	СЛ	зерн		
17009131	Меттью Matthew / Matthew	F1	793	793			2020	СЛП	зерн		
17009132	КОЛЕТИС KOLETIS / KOLETIS	F1	2092	2092			2019	ЛП	зерн		
17009111	ЕС РАНВЕЙ ES RUNWAY / ES RUNWAY	F1	806	806			2020	СЛП	зерн		
17009138	ЗУР307 SUR307 / SUR307	F1	1694	2537			2020	С	зерн		
17009139	ЗУР204 SUR204 / SUR204	F1	1694	2537			2020	СЛП			
17009142	КВС ГРАНАДОС KWS GRANADOS / KWS GRANADOS	F1	2092	2092			2019	Л	зерн		
17009146	Галардо Halardo / Halardo	F1	2291	2291			2020	ЛП	зерн		
17009147	Остін Ostin / Ostin	F1	2291	2291			2020	СЛП	зерн		
17009117	ЕС ЯКАРИ ES YAKARI / ES YAKARI	F1	806	806			2020	СЛП	зерн		
17009159	Р7515 P7515 / P7515	F1	9	9			2019	ЛП	зерн		
17009160	Р8834 P8834 / P8834	F1	9	9			2019	СЛП	зерн		
17009161	Кунео Cuneo / Cuneo	F1	1902	1902			2020	ЛП	зерн		
17009162	Ліворно Livorno / Livorno	F1	1902	1902			2020	ЛП	зерн		
17009163	Пітч Pitch / Pitch	F1	1902	1902			2020	СЛП	зерн		
17009134	КВС КАШЕМИР KWS KASHMIR / KWS KASHMIR	F1	2092	2092			2019	СЛП	зерн		
17009186	РЖТ ЛІЖЕТИККС RGT LIGETIXX / RGT LIGETIXX	F1	1783	1783			2019	СЛП	зерн		
17009187	РЖТ ЗАНЕТИККС RGT ZANETIXX / RGT ZANETIXX		1783	1783			2019	СЛП	зерн		
17009188	РЖТ ЕККСКІ ДУО RGT EXXKI DUO / RGT EXXKI DUO	F1	1783	1783			2019	СЛП	зерн		
17009189	РЖТ АТТРАККСІОН RGT ATTRAXXION / RGT ATTRAXXION	F1	1783	1783			2019	СЛ	зерн		
17009190	РЖТ РЕАККСІОН RGT REAXXION / RGT REAXXION	F1	1783	1783			2019	СЛП	зерн		
17009158	Р9074Е P9074E / P9074E	F1	9	9			2019	ЛП	зерн		
17009192	ВІРЖІЛІО VIRGILIO / VIRGILIO	F1	1783	1783			2019	СЛП	зерн		
17009194	РЖТ ЕККЗЕМПЛАЙР RGT EXXEMPLAIR / RGT EXXEMPLAIR	F1	1783	1783			2019	СЛП	зерн		
17009206	Філмено Filmeno / Filmeno	F1	2011	2011			2019	СЛ	зерн		
17009207	Амелло Amello / Amello	F1	2011	2011			2019	СЛП	зерн		

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17009212	<i>Meganimo</i> <i>Megalito / Megalito</i>	F1	2011	2011			2019	СЛ	зерн		
17009185	<i>РЖТ ДАМІККСУС</i> <i>RGT DAMIXXUS / RGT DAMIXXUS</i>	F1	1783	1783			2019	СЛП	зерн		
17009213	<i>CX 200</i> <i>CX 200 / SKh 200</i>	F1	2444	2444			2020	Л	зерн		
17009214	<i>CX 300</i> <i>CX 300 / SKh 300</i>	F1	2444	2444			2020	СЛП	зерн		
17009215	<i>CX 250</i> <i>CX 250 / SKh 250</i>	F1	2444	2444			2020	СЛ	зерн		
17009216	<i>CX 320</i> <i>CX 320 / SKh 320</i>	F1	2444	2444			2020	СЛП	зерн		
16009125	<i>Селенія</i> <i>Selenia / Selenia</i>	F1	924	924			2019	ЛП	зерн		
17009191	<i>РЖТ МАККСАТАК</i> <i>RGT MAXXATAC / RGT MAXXATAC</i>	F1	1783	1783			2019	СЛ	зерн		
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L.</b> <b>Maize, Corn – parental component</b>											
16909063	<i>ПХ43МВ</i> <i>PH43MW / PH43MW</i>	F1	9	9			2019				
16909175	<i>ССС2121</i> <i>CSC2121 / CSC2121</i>	C3	924	924			2019				
17909007	<i>АІО1881АІО1884</i> <i>AIO1881AIO1884 /</i>	F1	1959	1959			2019				
17909105	<i>ССС3157</i> <i>CSC3157 / CSC3157</i>	C3	924	924			2019				
17909106	<i>СМС3999</i> <i>CMS3999 / CMS3999</i>	C3	924	924			2019				
17909107	<i>ССС3996</i> <i>CSC3996 / CSC3996</i>	C3	924	924			2019				
17909109	<i>СМС2311 ЛЖР2038</i> <i>CMS2311 LGR2038 /</i> <i>CMS2311 LGR2038</i>	F1	924	924			2019				
17909110	<i>ЛІН2248</i> <i>LIN2248 / LIN2248</i>	C3	924	924			2019				
17909112	<i>ЛМХ3164</i> <i>LMH3164 / LMH3164</i>	C3	924	924			2019				
17909113	<i>ЛНР3495</i> <i>LNR3495 / LNR3495</i>	C3	924	924			2019				
17909114	<i>ЛІФ2184</i> <i>LIF2184 / LIF2184</i>	C3	924	924			2019				
17909119	<i>ЛЖР2038 ЛМР3185</i> <i>LGR2038 LMR3185 /</i> <i>LGR2038 LMR3185</i>	F1	924	924			2019				
17909125	<i>МС 150</i> <i>MS 150 / MS 150</i>	C3	966	966			2020				
17909126	<i>МС 200</i> <i>MS 200 / MS 200</i>	C3	966	966			2020				
17909127	<i>Анапа С</i> <i>Anapa C / Anapa S</i>	F1	966	966			2020				
17909128	<i>МС 262 ЗС</i> <i>MS 262 ZC / MS 262 ZS</i>	C3	966	966			2020				
17909108	<i>ЛЛР2961 ЛМР3185</i> <i>LLR2961 LMR3185 /</i> <i>LLR2961 LMR3185</i>	F1	924	924			2019				
17909130	<i>МС 264 СВ</i> <i>MS 264 CV / MS 264 SV</i>	C3	966	966			2020				
17909131	<i>КВ 5Ф1731</i> <i>KW 5F1731 / KW 5F1731</i>	C3	2092	2092			2019				
17909133	<i>КВ 9Д1533</i> <i>KW 9D1533 / KW 9D1533</i>	C3	2092	2092			2019				
17909134	<i>КВ 9ЕУ0015</i> <i>KW 9EY0015 / KW 9EY0015</i>	C3	2092	2092			2019				
17909135	<i>КВ 7Р1104</i> <i>KW 7R1104 / KW 7R1104</i>	C3	2092	2092			2019				
17909115	<i>ЛОР3696</i> <i>LOR3696 / LOR3696</i>	C3	924	924			2019				

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17909139	ЦАЛ2261 CAL2261 / CAL2261	C3	1959	1959			2019				
17909141	ЦІД2457 CID2457 / CID2457	C3	1959	1959			2019				
17909143	ЦІД2268 CID2268 / CID2268	C3	1959	1959			2019				
17909146	ЦАФ3362 CAF3362 / CAF3362	C3	1959	1959			2019				
17909147	262БХ503 262ВН503 / 262ВН503	C3	485	485			2020				
17909129	М 242 ЗС М 242 ЗС / М 242 ZS	C3	966	966			2020				
17909150	441ХФ006 441XF006 / 441XF006	C3	485	485			2020				
17909153	ІФА4226 IFA4226 / IFA4226	C3	1959	1959			2019				
17909154	ІАХс3300 IAX3300 / IAX3300	C3	1959	1959			2019				
17909155	ДІД3464 DID3464 / DID3464	C3	1959	1959			2019				
17909156	НПАКс4072 NPAK4072 / NPAK4072	C3	1959	1959			2019				
17909137	КВ 4ЕХ1630 KW 4EH1630 / KW 4EH1630	C3	2092	2092			2019				
17909158	444СХ118 444SH118 / 444SH118	C3	485	485			2020				
17909167	ЕГ7А97 EG7A97 / EG7A97	C3	806	806			2020				
17909168	ЕГ2363 EG2363 / EG2363	C3	806	806			2020				
17909169	ЕГ3036 EG3036 / EG3036	C3	806	806			2020				
17909175	ЛІМІВВ957С ФБВ1130 LIMIVV957S FBV1130 / LIMIVV957S FBV1130	F1	793	793			2020				
17909149	156ЛА337 156LA337 / 156LA337	C3	485	485			2020				
17909178	РВІ442 РВІ441 RVI442 RVI441 / RVI442 RVI441	F1	793	793			2020				
17909181	АВ01236Ц AV01236C / AV01236C	C3	793	793			2020				
17909182	ДП32 ДЛ26 DP32 DL26 / DP32 DL26	F1	793	793			2020				
17909218	Р16089 R16089 / R16089	C3	1783	1783			2019				
17909235	ГД47ГД48 GD47GD48 / GD47GD48	C3	2264	2264			2020				
17909160	223ДХ002 223DH002 / 223DH002	C3	485	485			2020				
17909148	156ЛА337Х 14В001 156LA337X 14B001 / 156LA337X 14B001	F1	485	485			2020				
17909152	ДАКс3360 DAX3360 / DAX3360	C3	1959	1959			2019				
17909171	ЕС4585 ES4585 / ES4585	C3	806	806			2020				
17909172	ЕГ7471 EG7471 / EG7471	C3	806	806			2020				
17909140	ЦІД2108 CID2108 / CID2108	C3	1959	1959			2019				
17909177	КЮВІ504 QVI504 / QVI504	C3	793	793			2020				
18909009	МБС4300 MBS4300 / MBS4300	C3	2264	2264			2020				
17909161	443УК319 443YK319 / 443YK319	C3	485	485			2020				
17909173	ЕС3556 ES3556 / ES3556	C3	806	806			2020				

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17909174	EC4604 ES4604 / ES4604	C3	806	806			2020				
17909180	MAC385 MAC385 / MAC385	C3	793	793			2020				
18909004	Ш1135 H1135 / H1135	C3	2264	2264			2020				
17909145	227WB025 227WB025 / 227WB025	C3	485	485			2020				
17909151	ХІД3347 HID3347 / HID3347	C3	1959	1959			2019				
17909179	ММЛ525 MML525 / MML525	C3	793	793			2020				
18909001	Ш6210 H6210 / H6210	C3	2264	2264			2020				
17909157	ЕАХ5121 EAX5121 / EAX5121	C3	1959	1959			2019				
18909002	Ш3637 H3637 / H3637	C3	2264	2264			2020				
17909159	483ЮХ037 483QH037 / 483QH037	C3	485	485			2020				
17909176	ФІІ422 ФІІ424 FII422 FII424 / FII422 FII424	F1	793	793			2020				
17909216	Р15021 R15021 / R15021	C3	1783	1783			2019				
17909217	Р15037 R15037 / R15037	C3	1783	1783			2019				
18909005	ЗМГ6403 ZMG6403 / ZMG6403	C3	2264	2264			2020				
17909170	АІІ574 AII574 / AII574	C3	793	793			2020				
<b>Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент</b> Barley (Winter) – parental component			<i>Hordeum vulgare</i> L. ( <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> <i>grex culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)								
17919001	РЕ29 RE29 / RE29	C3	1959	1959			2019				
<b>Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse</b> Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea ( <i>Pisum majus</i> Dode; <i>Pisum romanum</i> ; <i>Pisum saccharatum</i> Ser. in DC.; <i>Pisum macrocarpum</i> Ser.; <i>Pisum hortense</i> Asch. et Graebn.; <i>Pisum commune</i> Clav.; <i>Pisum jomardi</i> Schrank; <i>Pisum uniflorum</i> Hort.; <i>Pisum macrospermum</i> Hort.; <i>Pisum vulgare</i> Jundz.; <i>Pisum sativum</i> L. (s. <i>amplissima</i> ) Gov.)											
17023003	Люмп Lump / Lump	C3	2076	880			2019	ЛП	зерн	пс	сбіл
<b>Сочевиця харчова</b> <i>Lens culinaris</i> Medik. Lentil ( <i>Ervum lens</i> L.; <i>Lens esculenta</i> Moench; <i>Lathyrus lens</i> Bernh.; <i>Lens vulgaris</i> Delarbre; <i>Cicer lens</i> Willd.; <i>Ervum camelorum</i> Spr.; <i>Ervum dispernum</i> Roxb.; <i>Lens sativa</i> Heller; <i>Lens camelorum</i> Webb. et Berth.; <i>Lens disperma</i> (Roxb.) Webb. et Berth.; <i>Vicia lens</i> Coss. et Germ.; <i>Lens nummularia</i> ; <i>Lens abyssinica</i> Alef.; <i>Ervum pilosissimum</i> Schur.; <i>Lens culinaris</i> ssp. <i>esculenta</i> Briq.)											
17027003 <sup>®</sup>	Даринка Даринка / Darynka	C3	2260	2260	2260		2019	СЛ	зерн		
<b>Нут звичайний</b> <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea ( <i>Cicer grossum</i> Salisb.; <i>Cicer sativum</i> Schkuhr; <i>Cicer physodes</i> Rchb.; <i>Cicer rotundum</i> Jord.; <i>Cicer sintensii</i> Hausskn.; <i>Cicer edessanum</i> Stapf.)											
18028011	Степовий велет Степовий велет / Stepovyi velet	C3	2543	2543			2019	СЛП			
<b>Соя культурна</b> <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soya Bean ( <i>Phaseolus max</i> L.; <i>Dolichos soja</i> L.; <i>Soja hispida</i> Moench; <i>Phaseolus sordilis</i> Salisb.; <i>Soja japonica</i> Savi; <i>Soja angustifolia</i> Miq.; <i>Glycine tabacina</i> ; <i>Glycine tomentosa</i> Benth.; <i>Glycine hispida</i> (Moench) Maxim.; <i>Soja soja</i> Karst.; <i>Soja max</i> Piper)											
15045038	Ольвія Olvia / Olvia	C3	2484	2484			2019	Л	зерн	пс	сл
17045011	Браун Braun / Braun		2484	2484			2019	ЛП	зерн	сс	вл
17045030	Нептун Neptune / Neptune	C3	2061	2061			2020	СЛП	зерн	сс	сбіл, вл
17045033	СВХ15Т1С1 SVX15T1S1 / SVX15T1S1	C3	2061	2061			2020	СЛП	зерн	сс	сбіл, вл
17045036	СВХ17Т00С15 SVX17T00S15 / SVX17T00S15	C3	2061	2061			2020	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17045039	CBX16T00C2 SVX16T00S2 / SVX16T00S2	C3	2061	2061			2020	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл
15045039	Балатон Balaton / Balaton	C3	2484	2484			2019	ЛП	зерн	рс	вл
17045032	Тала Tala / Tala		2061	2061			2020	СЛП	зерн	сс	сбіл, вл
17045046	Беттіна Bettina / Bettina	C3	2434	2434			2019	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл
17045049	ЕС ГОВЕРНОР ES GOVERNOR / ES GOVERNOR	C3	806	806			2020	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл
17045053	Алтона Altona / Altona	C3	1564	1564			2019	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл
17045058	СІРЕЛІЯ SIRELIA / SIRELIA	C3	1783	1783			2019	ЛП	зерн	рс	сбіл, вл
17045037	Сіпресс Cypress / Cypress	C3	2061	2061			2020	СЛП	зерн	сс	сбіл, вл
17045012	Регіна Regina / Regina	C3	1564	1564			2019	ЛП	зерн	рс	вл
15045040	Віолетта Violetta / Violetta	C3	2484	2484			2019	ЛП	зерн	рс	вл
17045029	Астор Astor / Astor		2061	2061			2020	СЛП	зерн	рс	сбіл, вл
17045050	ЕС ДИРЕКТОР ES DIRECTOR / ES DIRECTOR	C3	806	806			2020	ЛП	зерн	рс	сбіл, вл
17045052	Ауреліна Aurelina / Aurelina	C3	1564	1564			2019	СЛП	зерн	рс	сбіл, сл
17045051	Албена Albenga / Albenga	C3	1564	1564			2019	СЛП	зерн	рс	сбіл, сл

**Сільськогосподарські: круп'яні Agricultural: Field groats****Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.****Sorghum****(Holcus sorghum; Holcus bicolor L.; Holcus arduini Gmel.; Andropogon bicolor Roxb.; Andropogon halepensis var. bicolor Vined et Druce.)**

16018003	341X120 341X120 / 341X120	F1	1985	1985			2020	СЛ	зерн	ср	вкр
16018005	АРЕЛЬДО ARALDO / ARALDO	F1	806	806			2020	СЛ	зерн	сс	вкр
16018006	ЕУГ542Ф EUG542F / EUG542F	F1	806	806			2020	С	зерн	ср	вкр
17018013	Бенггал Benggal / Benggal	F1	2011	2011			2019	СЛ	зерн	ср	вкр
16018011	КВС ФОВОС KWS PHOBOS / KWS PHOBOS	F1	2092	2092			2019	СЛ	зерн	сс	вкр
17018012	419X124 419X124 / 419Kh124	F1	1985	1985			2020	СЛ	зерн	рс	вкр

**Рис посівний Oryza sativa L.****Rice****(Oryza communissima Lour.; Oryza glutinosa, Oryza montana, Oryza praecox Lour.; Oryza palustris Hamilt.; Oryza latifolia P. Beauv. (non Desf.); Oryza parviflora P. Beauv.)**

17017002	Фагот Fahot / Fahot	C3	1715	1715			2019	С		з	
17017001	Морячок Moriachok / Moriachok	C3	1715	1715			2020	С		з	

**Сільськогосподарські: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre****Соняшник однорічний Helianthus annuus L.****Sunflower****(Helianthus debilis Nutt.; Helianthus indicus L.; Helianthus tubaeformis Nutt.; Helianthus platycephalis; Helianthus macrocarpus DC.; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus colossus O. Ktze.; Helianthus erythrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.)**

16039116	МАС 83СУ MAS 83SU / MAS 83SU	F1	924	924			2019	СЛ	олн	рс	сл
16039128	КС Цорба QC Zorba / QC Zorba	F1	2232	2232			2019	Л	олн	ср	сл
16039129	Міранда ЗУ Miranda SU / Miranda SU	F1	1694	2537			2020	Л	олн	ср	вл
16039130	КС Браво QC Bravo / QC Bravo	F1	2232	2232			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039002	СИ ДАКСТОН SY DAXTON / SY DAXTON	F1	1219	1219			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039036	Фолк Folk / Folk	F1	736	736			2020	СЛ	олн	ср	сл

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17039109	ЕС ВІЛЛІС КЛП ES WILLIS CLP / ES WILLIS CLP	F1	806	806			2020	СЛ	олн	рс	сл
17039172	АЯКС AJAX / AJAX	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
17039073	Р64ГЕ144 P64HE144 / P64HE144	F1	9	9			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039075	Р64ЛЕ136 P64LE136 / P64LE136	F1	9	9			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039079	МАС 880СУ MAS 880SU / MAS 880SU	F1	924	924			2019	СЛ	олн	ср	сл
17039089	ЛГ50480 LG50480 / LG50480	F1	793	793			2020	СЛ	олн	рс	вл
17039090	ЛГ50521 КЛП LG50521 CLP / LG50521 CLP	F1	793	793			2020	СЛ	олн	ср	вл
17039193	М96КЛО2 M96CLO2 / M96CLO2	F1	273	273			2020	СЛ	олн	ур	сл
17039114	ЕС ЕЛЕКТРИК КЛП ES ELECTRIC CLP / ES ELECTRIC CLP	F1	806	806			2020	СЛ	вол	ур	вл
17039119	САБВЕЙ SUBWAY / SUBWAY	F1	1219	1219			2019	СЛ	олн	ср	сл
17039121	СУДОКУ SUDOKU / SUDOKU	F1	1219	1219			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039125	Балу Balu / Balu	F1	2291	2291			2020	СЛ	олн	рс	сл
17039129	ЛС ГЛОБСАН LS GLOBSUN / LS GLOBSUN	F1	1356	1356			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039009	Бонасол ЖМР Bonasol JMR / Bonasol JMR		2312	2312			2020	СЛ	олн	рс	сл
17039173	РЖТ КАСТЕЛЛАНО КЛП RGT CASTELLANO CLP / RGT CASTELLANO CLP	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
17039174	САНБРЕЛА SUNBRELA / SUNBRELA	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039175	РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР RGT BELLVEDER / RGT BELLVEDER	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
17039190	Аргенсол 72 КЛ Argensol 72 CL / Argensol 72 CL	F1	2440	2440			2019	СЛ	олн	сс	сл
17039191	М96С33 M96S33 / M96S33	F1	273	273			2020	СЛ	олн	ур	сл
17039083	НС КОНСТАНТИН ОР NS KONSTANTIN OR / NS KONSTANTIN OR	F1	1210 1517	1978 1517			2020	СЛ	олн	ср	сл
17039194	М98КЛ88 M98CL88 / M98CL88	F1	273	273			2020	СЛ	олн	ур	сл
17039197	Хелесан СУ Helesun SU / Helesun SU	F1	2232	2232			2019	СЛ	олн	рс	вл
18039002	Хайсан 228 Hysun 228 / Hysun 228	F1	1520	2554			2020	СЛ	олн	сс	вл
18039004	Хайсан 218 Hysun 218 / Hysun 218	F1	1520	2554			2020	СЛ	олн	сс	сл
18039005	Хайсан 180 ІТ Hysun 180 IT / Hysun 180 IT	F1	1520	2554			2020	СЛ	олн	ср	сл
18039012	АН20ЛМ01 AN20LM01 / AN20LM01	F1	2451	2451			2020	СЛ	олн	рс	сл
18039011	АН20ЛМ03 AN20LM03 / AN20LM03	F1	2451	2451			2020	СЛ	олн	рс	сл
18039021	Річард Richard / Richard	F1	2458	2458			2020	СЛ	олн	ср	сл
16039114	МЕНДЕЛЬ MENDEL / MENDEL	F1	924	924			2019	СЛ	олн	рс	сл
17039080	ПОВЕРСАН POWERSUN / POWERSUN	F1	924	924			2019	СЛ	олн	ср	сл
17039081	МАС 805А MAS 805A / MAS 805A	F1	924	924			2019	СЛ	олн	ур	сл
17039103	ЕС Саксон ES Sakson / ES Sakson	F1	2433	2433			2019	СЛ	олн	ср	вл

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17039086	Драган ОР Dragan OR / Dragan OR	F1	1978 1210 1517	1978 1210 1517			2020	СЛ	олн	рс	сл
17039092	ЛГ50510 LG50510 / LG50510	F1	793	793			2020	СЛ	олн	ср	вл
17039115	ЕС КОЛОРИС КЛ ES COLORIS CL / ES COLORIS CL	F1	806	806			2020	СЛ	олн	ср	сл
17039116	ЕС АРМОНІКА ES ARMONICA / ES ARMONICA	F1	806	806			2020	СЛ	олн	ср	вл
17039205	СХ 2321 CX 2321 / SKh 2321	F1	2444	2444			2020	СЛ	олн	ур	сл
16039032	ХФ16611 XF16611 / XF16611	F1	9	9			2019	Л	олн	сс	вл
18039013	АН20ЛЕ01 AN20LE01 / AN20LE01	F1	2451	2451			2020	СЛ	олн	рс	сл
18039014	АН20ЛМ02 AN20LM02 / AN20LM02	F1	2451	2451			2020	СЛ	олн	ср	сл
17039071	Р64ЛЛ138 P64LL138 / P64LL138	F1	9	9			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039091	ЛГ50797 КЛП LG50797 CLP / LG50797 CLP	F1	793	793			2020	СЛ	вол	сс	сл
17039102	ЕС Альфа ES Альфа / ES Alfa	F1	2433	2433			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039201	СХ 5220 CX 5220 / SKh 5220	F1	2444	2444			2020	СЛ	олн	ур	сл
17039104	ЕС Берекет ES Берекет / ES Bereket	F1	2433	2433			2019	СЛ	олн	ср	сл
17039120	САЙБЕРІК SUBERIC / SUBERIC	F1	1219	1219			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039163	МАНХЕТТЕН КЛП MANHATTAN CLP / MANHATTAN CLP	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
17039167	АВСТРАЛІЯ AUSTRALIA / AUSTRALIA	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
17039171	КАМПБЕЛЛ CAMPBELL / CAMPBELL	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
17039088	ЛГ50662 LG50662 / LG50662	F1	793	793			2020	СЛ	олн	ср	сл
17039076	ВОЛВЕРІН WOLVERINE / WOLVERINE	F1	924	924			2019	СЛ	олн	ср	ср
17039077	МАС 90ІР MAS 90IR / MAS 90IR	F1	924	924			2019	СЛ	олн	ср	сл
17039100	Аламбра КС Alambra CS / Alambra CS	F1	485	485			2019	СЛ	олн	рс	сл
17039177	РЖТ ДОНАТЕЛЛО RGT DONATELLO / RGT DONATELLO	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
17039178	РЖТ САЛЛЬВАДОР RGT SALLVADOR / RGT SALLVADOR	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039084	Анастасія ОР Anastasija OR / Anastasija OR	F1	1978 1210 1517	1978 1210 1517			2020	СЛ	олн	ср	сл
17039204	СХ 2563 CX 2563 / SKh 2563	F1	2444	2444			2020	СЛ	олн	ур	сл
17039003	СИ КУПЕР КЛП SY COOPER CLP / SY COOPER CLP	F1	1219	1219			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039082	МАС 870Г MAS 870G / MAS 870G	F1	924	924			2019	СЛ	олн	ур	сл
17039085	Латітуда ОР Latituda OR / Latituda OR	F1	1978 1210 1517	1978 1210 1517			2020	СЛ	олн	ур	сл
17039087	ЛГ50609 СХ LG50609 SX / LG50609 SX	F1	793	793			2020	СЛ	олн	ср	вл
17039132	ДСХ415КЛ DSH415CL / DSH415CL	F1	2094	2094			2019	СЛ	вол	сс	вл
17039093	КВС ЛОГОС КЛ KWS LOGOS CL / KWS LOGOS CL	F1	2092	2092			2019	СЛ	олн	сс	сл
17039094	КВС АХІЛЛЕС КЛП KWS ACHILLES CLP / KWS ACHILLES CLP	F1	2092	2092			2019	СЛ	олн	сс	сл

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17039095	Зурфер КЛ Surfer CL / Surfer CL	F1	1694	2537			2020	СЛ	олн	ср	сл
17039097	Терасан КЛ Terasun CL / Terasun CL	F1	1694	2537			2020	СЛ	олн	сс	сл
17039112	ЕС АКСОН СУ ES AXON SU / ES AXON SU	F1	806	806			2020	СЛ	олн	ср	вл
17039108	ФЛОРМАСТЕР ІР FLORMASTER IR / FLORMASTER IR	F1	924	924			2019	СЛ	олн	ср	вл
16039019	ЖИРАЛ GIRAL / GIRAL	F1	1356	1356			2020	Л	олн	рс	сл
16039042	Р64ГГ132 Р64НН132 / Р64НН132	F1	9	9			2019	Л	олн	ср	сл
18039017	Тібо Тібо / Tibo	П	2458	2458			2020	СЛ	олн	сс	сл
16039046	Салвасол Salvasol / Salvasol	F1	1498	1498			2019	СЛ	олн	ср	вл
17039070	ЛНЗ 01 ЛНЗ 01 / LNZ 01	F1	2265	2265			2020	СЛ	олн	ср	вл
17039128	САКСЕСС SUCCESS / SUCCESS	F1	1219	1219			2019	СЛ	олн	ср	сл
17039166	РЖТ БЕЛЛОНА RGT BELLONA / RGT BELLONA	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
17039170	РЖТ ФРАНКЛЛІН RGT FRANKLLIN / RGT FRANKLLIN	F1	1783	1783			2019	СЛ	олн	рс	вл
18039022	Княжий Княжий / Kniazhyi	П	2458	2458			2020	СЛ	олн		сл
17039042	Тайлер Тайлер / Tailer	F1	2273	2273			2020	Л	олн		
17039065	Інесол Inesol / Inesol	F1	2312	2312			2020	СЛ	вол	сс	сл
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент</b> <i>Helianthus annuus L.</i> <b>Sunflower – parental component</b> ( <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus L.</i> ; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> ; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
16939068	АР 003 Б АР 003 Б / AR 003 B		1265	1265			2019				
16939069	АР 002 Б АР 002 Б / AR 002 B		1265	1265			2019				
16939122	ХА1АСУ HA1ASU / Kha1ASU	C3	2232	2232			2019				
16939123	РХАНМ17РФІМІ RHANM17RFIMI / RHANM17RFIMI	C3	2232	2232			2019				
17939005	ЕХ935 EH935 / EH935	C3	2267	2267			2020				
17939035	Ф1316ГФ F1316HF / F1316HF	C3	9	9			2020				
17939046	ТРХ5019Р TRH5019R / TRH5019R	C3	924	924			2019				
17939050	ТФІ4494А TFI4494A / TFI4494A	C3	924	924			2019				
17939051	ТФС3769А TFC3769A / TFC3769A	C3	924	924			2019				
17939052	ТФХ4746А TFH4746A / TFH4746A	C3	924	924			2019				
17939053	ТРС5017Р TRS5017R / TRS5017R	C3	924	924			2019				
17939066	56Ц20Р 56C20R / 56C20R	C3	485	485			2020				
17939067	63Г13іс 63G13is / 63G13is	C3	485	485			2020				
17939070	49Ц01А 49C01A / 49C01A		485	485			2020				
17939071	КТ 24 Б КТ 24 Б / KT 24 B	C3	2433	2433			2019				
17939072	КТ 22 А КТ 22 А / KT 22 A		2433	2433			2019				



Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17939045	113 P 113 P / 113 R	C3	2312	2312			2020				
17939084	Ф7АХ2МЖКА F7AX2MJKA / F7AX2MJKA	C3	806 1435	806 1435			2020				
17939089	P1307I R1307I / R1307I	C3	806 1435	806 1435			2020				
17939093	P5PE4MC R5PE4MS / R5PE4MS	C3	806 1435	806 1435			2020				
17939128	ІМІ 3 ДМ IMI 3 DM / IMI 3 DM	C3	2440	2440			2019				
17939129	АГ 438 РКЛ AG 438 RCL / AG 438 RCL	C3	2440	2440			2019				
17939061	Ф754271МА F754271MA / F754271MA	C3	793	793			2020				
17939133	ВН 2821В VN 2821B / VN 2821V	C3	2265	2265			2020				
17939135	ВН 6045А VN 6045A / VN 6045A	C3	2265	2265			2020				
17939137	ВН 7152В VN 7152B / VN 7152V	C3	2265	2265			2020				
17939139	ВЛ 1240Б VL 1240B / VL 1240B	C3	2265	2265			2020				
17939141	ВН 3040А VN 3040A / VN 3040A	C3	2265	2265			2020				
17939075	КС 501 В KS 501 B / KS 501 V		2433	2433			2019				
18939031	P13ГВ1МЖК R13GW1MJK / R13GW1MJK	C3	1435	1435			2020				
17939087	P1119ЖІ R1119JI / R1119JI	C3	806 1435	806 1435			2020				
17939131	АГ 238 АКЛ AG 238 ACL / AG 238 ACL	C3	2440	2440			2019				
17939029	У14ЛГЦЛЛМ U14LGCLLM / U14LGCLLM	C3	9	9			2019				
17939047	ТRІ4387P TRI4387R / TRI4387R	C3	924	924			2019				
17939132	ВЛ 1120А VL 1120A / VL 1120A	C3	2265	2265			2020				
18939010	ДС 87 В DS 87 B / DS 87 V	П	2458	2458			2020				
18939033	P4НП8МЖС R4NP8MJS / R4NP8MJS	C3	1435	1435			2020				
17939056	ЛГ71234МІА LG71234MIA / LG71234MIA	C3	793	793			2020				
17939062	ЛГ7512340А LG7512340A / LG7512340A	C3	793	793			2020				
17939064	Х11050Р H11050R / H11050R	C3	2092	2092			2019				
18939029	P78033Ж R78033J / R78033J	C3	1435	1435			2020				
17939085	Ф7АХ2МЖА F7AX2MJA / F7AX2MJA	C3	806 1435	806 1435			2020				
18939017	МР7314 MR7314 / MR7314	C3	273	273			2020				
17939054	УН 715 РХА UN 715 PXA / UN 715 RKha	C3	1517	1517			2020				
17939090	Ф5ДЦ5МСА F5DC5MSA / F5DC5MSA	C3	806 1435	806 1435			2020				
17939140	ВН 6531В VN 6531B / VN 6531V	C3	2265	2265			2020				
17939068	67К23Р 67K23R / 67K23R	C3	485	485			2020				
17939048	ТRІ5018P TRI5018R / TRI5018R	C3	924	924			2019				
17939076	КС 505 В KS 505 B / KS 505 V		2433	2433			2019				
17939130	639 Р 639 R / 639 R	C3	2440	2440			2019				

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17939142	TRI4495P TRI4495R / TRI4495R	C3	924	924			2019				
17939091	CP1087MCO SR1087MSO / SR1087MSO	C3	806 1435	806 1435			2020				
17939065	XO9951P HO9951R / HO9951R	C3	2092	2092			2019				
17939044	2603X1093 2603X1093 / 2603Kh1093	C3	2312	2312			2020				
17939073	KT 22 Б KT 22 Б / KT 22 В	C3	2433	2433			2019				
17939080	R469MJKO R469MJKO / R469MJKO	C3	806	806			2020				
17939094	F9ES4MIOA F9ES4MIOA / F9ES4MIOA	C3	806 1435	806 1435			2020				
17939136	VN 1080A VN 1080A / VN 1080A	C3	2265	2265			2020				
18939012	ДС 58 Б ДС 58 Б / DS 58 В	П	2458	2458			2020				
17939039	7PHLQ23P 7PHLQ23R / 7PHLQ23R	C3	9	9			2019				
17939086	R11ST6M2I R11ST6M2I / R11ST6M2I	C3	806 1435	806 1435			2020				
17939134	VN 6079B VN 6079B / VN 6079V	C3	2265	2265			2020				
17939138	VN 7050A VN 7050A / VN 7050A	C3	2265	2265			2020				
18939030	R6PX4JM R6PX4JM / R6PX4JM	C3	1435	1435			2020				
17939092	R1359MJ R1359MJ / R1359MJ	C3	806 1435	806 1435			2020				
<b>Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera</b>											
<b>Rape Seed (Winter) (Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.)</b>											
16040031	Ренді Randy / Randy	C3	1498	1498			2019	СЛП	олн		00
16040035	КВС КЕРРИ КЛ KWS CARRY CL / KWS CARRY CL	F1	2092	2092			2019	СЛП	олн		00
16040036	КВС КИРИЛ КЛ KWS CYRILL CL / KWS CYRILL CL	F1	2092	2092			2019	СЛП	олн		00
17040001	РТ274 RT274 / RT274	F1	9	9			2019	Л	олн		00
17040002	РТ275 RT275 / RT275	F1	9	9			2019	СЛ	олн		00
17040006	ДК Експіро DK Expro / DK Expro	F1	844	844			2019	СЛП	олн		00
17040007	ДК Екстайм DK Extime / DK Extime	F1	844	844			2019	СЛП	олн		00
17040011	Арканзас Arkansas / Arkansas	F1	793	793			2019	СЛП	олн		00
17040013	Абсолют Absolut / Absolut	F1	793	793			2019	СЛП	олн		00
17040017	ІМАНІ IMANY / IMANY	F1	924	924			2019	СЛП	олн		00
17040041	Лексіон Lexion / Lexion	F1	807	807			2019	СЛП	олн		00
17040042	Домінатор Dominator / Dominator	F1	807	807			2019	СЛП	олн		00
17040046	Принц Prince / Prince	F1	807	807			2019	СЛП	олн		00
17040009	ДК Імпеллер КЛ DK Impeller CL / DK Impeller CL	F1	844	844			2019	СЛП	олн		00
16040003	ДК Експрешн DK Expression / DK Expression	F1	844	844			2019	СЛП	олн		00
17040005	ГІМАЛАЇ КЛ HIMALAYA CL / HIMALAYA CL	F1	2255	2255			2019	С	олн		00
16040008	КЛАВІР КЛ CLAVIER CL / CLAVIER CL	F1	912	912			2019	СЛП	олн		00

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
17040012	Аспект Aspect / Aspect	F1	793	793			2019	СЛП	олн		00
15041009	СТЕФАНО КВС STEFANO KWS / STEFANO KWS	F1	2092	2092			2019	СЛП	олн		00
17040014	Атракція Attraction / Attraction	F1	793	793			2019	СЛП	олн		00
16040019	АВАЛ AVAL / AVAL	F1	1959	1959			2019	СЛП	олн		00
17040026	КРИСТАЛ CRISTAL / CRISTAL	F1	912	912			2019	СЛП	олн		00
16040032	Берні Beryu / Beryu	C3	1498	1498			2019	СЛ	олн		00
17040008	ДК Екстракт DK Extract / DK Extract	F1	844	844			2019	СЛП	олн		00
15040038	РХ128 PKh128 / PKh128	F1	9	9			2019	Л	олн		00
17040045	Келтор Keltor / Keltor	F1	807	807			2019	СЛП	олн		00
17040027	ФРАНКЛІН FRANKLIN / FRANKLIN	F1	912	912			2019	СЛП	олн		00
17040043	Темптейшн Temptation / Temptation	F1	807	807			2019	СЛП	олн		00
15040008	Домінік Dominik / Dominik	F1	807	807			2019	СЛП	олн		00
<b>Ріпак (озимий) – батьківський компонент</b> <i>Brassica napus L. oleifera</i> <b>Rape Seed (Winter) – parental component</b> ( <i>Brassica oleifera</i> Moench.; <i>Brassica oleifera</i> Delile; <i>Brassica napus L. ssp. oleifera</i> Metzg.; <i>Brassica rapa L. ssp. napus</i> Briquet.)											
16940001	ССР219 SCR219 / SCR219	C3	844	844			2019				
16940002	СС250Д CS250D / CS250D		844	844			2019				
16940004	СС317 CS317 / CS317		844	844			2019				
16940006	ГО 44 ГО 44 / ГО 44	C3	736	736			2019				
16940007	МО 62 МО 62 / МО 62	C3	736	736			2019				
16940008	СКМО 193 SKMO 193 / SKMO 193	C3	736	736			2019				
16940005	ГО 67 ГО 67 / ГО 67	C3	736	736			2019				
17940006	РММС9695Р RMMC9695R / RMMC9695R	C3	924	924			2019				
17940004	ІСС659 ICS659 / ICS659		844	844			2019				
17940002	ДС1993 DS1993 / DS1993		844	844			2019				
17940001	СС403 CS403 / CS403		844	844			2019				
17940005	РММС9686А RMMC9686A / RMMC9686A	C3	924	924			2019				
17940003	СС398 CS398 / CS398		844	844			2019				
17940007	МЕЛ 1 MEL 1 / MEL 1	C3	736	736			2019				
17940008	ВНІС 1 VNIS 1 / VNIS 1	C3	736	736			2019				
17940009	МЕЛ 2 MEL 2 / MEL 2	C3	736	736			2019				
<b>Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera</b> <b>Rape Seed (Spring) (Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.)</b>											
17041010	САОКЕР КЛ SAOKER CL / SAOKER CL	F1	806	806			2020	П	олн		00
16041001	Клеопатра Cleopatra / Cleopatra	C3	2011	2011			2019	П	олн		00

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed (<i>Proles brevimulticaula</i> Vav. et Ell)</b>											
18035001	Дунай <i>Dunai / Dunai</i>	СЗ	2458	2458			2020	ЛП			
<b>Конопля посівна <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp (<i>Cannabis chinensis</i> Delile; <i>Cannabis erratica</i> Siev.; <i>Cannabis foetens</i> Gilib.; <i>Cannabis lupulus</i> Scop.; <i>Cannabis macrosperma</i> Stokes; <i>Cannabis gigantea</i> Hort.)</b>											
18080002	Мрія <i>MRIA</i>	П	2435 2510	2435 2510			2019	ЛП	ун		
<b>Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet (<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>europaea</i> convar. <i>saccharifera</i> (Alef.) Krass.; <i>Beta vulgaris</i> provar. <i>altissima</i> Doll.; <i>Beta alba</i> Langenthal., <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>saccharifera</i> Alef.)</b>											
17069013	БТС 9975 <i>BTS 9975 / BTS 9975</i>	F1	1974	1974			2019	ЛП	ТХН		
17069014	БТС 4905 Н <i>BTS 4905 N / BTS 4905 N</i>	F1	1974	1974			2019	ЛП	ТХН		
17069021	ЛІВІОЛА КВС <i>LIVIOLA KWS / LIVIOLA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069022	СМАРТ ДАНУТА КВС <i>SMART DANUTA KWS / SMART DANUTA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069023	САНТОРИНА КВС <i>SANTORINA KWS / SANTORINA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069025	ПРЕЦІОЗА КВС <i>PREZIOSA KWS / PREZIOSA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069031	СТЕПАНКА КВС <i>STEPANKA KWS / STEPANKA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069032	АННАМІРА КВС <i>ANNAMIRA KWS / ANNAMIRA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069033	ФДР18Б1089 <i>FDR18B1089 / FDR18B1089</i>	F1	796	796			2020	ЛП	ТХН		
17069020	ІГУАНА <i>IGUANE / IGUANE</i>	F1	1628	1628			2020	ЛП	ТХН		
17069011	БТС 7160 <i>BTS 7160 / BTS 7160</i>	F1	1974	1974			2019	ЛП	ТХН		
17069012	БТС 1730 <i>BTS 1730 / BTS 1730</i>	F1	1974	1974			2019	ЛП	ТХН		
17069026	КОНЦЕРТИНА КВС <i>CONCERTINA KWS / CONCERTINA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069027	СМАРТ БРИГА КВС <i>SMART BRIGA KWS / SMART BRIGA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069029	СМАРТ НАРНІЯ КВС <i>SMART NARNIA KWS / SMART NARNIA KWS</i>	F1	2092	2092			2019	ЛП	ТХН		
17069015	БТС 5735 <i>BTS 5735 / BTS 5735</i>	F1	1974	1974			2019	ЛП	ТХН		
15069006	Фантазія <i>Fantazja / Fantazja</i>	F1	884	884			2020	ЛП	ТХН		
17069018	МАНІТУ <i>MANITOU / MANITOU</i>	F1	1628	1628			2020	ЛП	ТХН		
17069034	ФДР18Б1086 <i>FDR18B1086 / FDR18B1086</i>	F1	796	796			2020	ЛП	ТХН		
17069035	ФДР18Б4020 <i>FDR18B4020 / FDR18B4020</i>	F1	796	796			2020	ЛП	ТХН		
17069019	СІУ <i>SIOUX / SIOUX</i>	F1	1628	1628			2020	ЛП	ТХН		
<b>Сільськогосподарські: картопля Agricultural: Potato Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato (<i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>tuberosum</i>; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chiloense</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>cultum</i> DC.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>sabini</i> DC.; <i>Solanum fonckii</i> Phil.; <i>Solanum chiloense</i> (DC.) Benth.; <i>Solanum cultum</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum sabini</i> (DC.) Berth.; <i>Solanum maglia</i> Schlecht. var. <i>guaytecarum</i> Bitt.; <i>Solanum maglia</i> var. <i>chutubense</i> Bitt.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>europaeum</i> Buk.; <i>Solanum leptostigma</i> Juz.; <i>Solanum molinae</i> Juz.; <i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>chilense</i> Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>guaytecarum</i> (Bitt.) Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> var. <i>chutubense</i> (Bitt.) Hawk.; <i>Solanum tuberosum</i> ssp. <i>andigenum</i> (Juz. et Buk.) Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> Juz. et Buk.; <i>Solanum herrerae</i> Juz.; <i>Solanum subandigenum</i> Hawk.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>grauense</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>digitobatosum</i> Varg.; <i>Solanum andigenum</i> var. <i>carhua</i> Varg.)</b>											
16088005	Сазіма <i>Sagitta / Sagitta</i>		738	738			2019	ЛП	стл	сс	пкр

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
16088013	Торнадо <i>Tornado / Tornado</i>		2243	2243			2020	ЛП	стл	рс	скр
16088003	Таурас <i>Taurus / Taurus</i>		738	738			2019	ЛП	пкр	сс	стл
17088003	Джолі <i>Joly / Joly</i>		738 2600	738 2600			2019	ЛП	стл	сс	скр
<b>Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder</b>											
<b>Боби кінські <i>Vicia faba L. var. minor</i> Field Bean (<i>Faba minor</i> Vohb.)</b>											
18094004	Сіріус <i>Sirius / Sirius</i>	СЗ	1669	1669			2019	ЛП			
<b>Грястиця збірна <i>Dactylis glomerata L.</i> Cocksfoot (<i>Bromus glomeratus</i> Scop.; <i>Festuca glomerata</i> All.; <i>Trachypoa vulgaris</i> Bubani.)</b>											
18182001	Альдебаран <i>Aldebaran / Aldebaran</i>	П	2222	2222			2019	СЛП			
<b>Костриця очеретяна <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. Tall Fescue (<i>Festuca littoralis</i> Wahlb.)</b>											
16205006	Томкет 1 <i>Tomcat 1 / Tomcat 1</i>	С	2222	2222			2019	СЛП	озл		
<b>Костриця овеча <i>Festuca ovina L.</i> Sheep's Fescue (<i>Festuca ovina</i> var. <i>vivipara</i> L.; <i>Bromus ovinus</i> Scop.; <i>Avena ovina</i> Salisb.; <i>Festuca sciaphila</i> Schur.; <i>Festuca questphalica</i> Beenn.)</b>											
16473002	Думас 1 <i>Dumas 1 / Dumas 1</i>	С	2222	2222			2019	СЛП			
<b>Костриця червона <i>Festuca rubra L.</i> Red Fescue, Creeping Fescue (<i>Festuca rubra L. sensu lato</i>; <i>Festuca rubra L. s. str.</i>; <i>Festuca ovina</i> var. <i>rubra</i> Smith; <i>Festuca duriuscula</i> var. <i>rubra</i> Wood.; <i>estuca oregona</i> Festucaasey; <i>Festuca ovina</i> ssp. <i>rubra</i> Hook.; <i>Festuca rubra</i> var. <i>littoralis</i> Vasey; <i>Festuca vallicola</i>; <i>Festuca earlei</i>)</b>											
18377002	ПІНАФОР <i>PINAFOR / PINAFOR</i>	С	2222	2222			2019	СЛП	озл		
16377005	Корейл <i>Corail / Corail</i>	С	2222	2222			2019	СЛП	озл		
18377003	ГРІНМІЛ <i>GREENMILE / GREENMILE</i>	С	2222	2222			2019	СЛП	озл		
<b>Люцерна мінлива <i>Medicago x varia</i> Martyn Hybrid Lucerne (<i>Medicago sativa L. subsp. sativa</i> ? <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i>, <i>Medicago sativa L. nothosubsp. varia</i> (Martyn) Arcang.)</b>											
15364003	Луїза <i>Luiza / Luiza</i>	П	1698	1698			2019	СЛП			
15364001	Одрі <i>Odri / Odri</i>	С	736	736			2020	С	корм		вбіл
<b>Люцерна посівна <i>Medicago sativa L.</i> Lucerne (<i>Medicago falcata</i> Lam. (non L.); <i>Medicago coerulea</i> Less.)</b>											
16196003	Оксітан <i>Occitane / Occitane</i>	С	924	924			2019	Л	корм		сбіл
16196004	Мілкі Макс <i>Milky Max / Milky Max</i>	С	924	924			2019	Л	корм		сбіл
<b>Просо африканське <i>Pennisetum glaucum (L.) R.Br.</i></b>											
17634001	Нутріфід <i>Nutrifeed / Nutrifeed</i>		1520	2554			2019	СЛП			
<b>Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable</b>											
<b>Баклажан <i>Solanum melongena L.</i> Egg Plant (<i>Solanum longum L.</i>; <i>Melongena teres</i> Mill; <i>Solanum undatum</i> Lam.; <i>Solanum esculentum</i> Dun.)</b>											
18093001	МОДАР <i>MODAR / MODAR</i>	F1	1902	1902			2019	ЗГр	свж		
<b>Буряк столовий <i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet (<i>Beta vulgaris L. ssp. europea</i> Krass. var. <i>atro rubra</i> Krass.)</b>											
17122003	Маноло <i>Manolo / Manolo</i>	F1	751	751			2020	СЛП			
17122002	Ред Бул <i>Red Bull / Red Bull</i>	СЗ	1362	1362			2020	СЛП			
<b>Дня звичайна <i>Cucumis melo L.</i> Melon (<i>Melo adana</i> Pang.; <i>Cucumis melo</i> convar. <i>Adana</i> (Pang.) Greb.)</b>											
18147001	Санвісенте <i>Sanvicente / Sanvicente</i>	F1	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
<b>Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash</b>											
17148004	ГОЛДЕН ГЛОРИ <i>GOLDEN GLORY / GOLDEN GLORY</i>	F1	1050	1050			2019	С			

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Кавун звичайний</b> <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai <b>Watermelon</b> ( <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. <i>Vulgaris</i> Fursa var. <i>vulgaris</i> ; <i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.; <i>Cucurbita citrullus</i> L.; <i>Momordica lanata</i> Thunb.; <i>Cucumis sativus</i> Battich; <i>Citrullus pasteca</i> Sageret; <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mansf.)											
17146008	ВМХ4746 WMH4746 / WMH4746	F1	1050	1050			2019	СЛ	свж		
17146011	Тамтам Tamtam / Tamtam	F1	840	840			2019	СЛП	свж		
18146004	Оранж Кінг Orange King / Orange King	F1	1650	1650			2019	ЗГр	ун		
18146001	БАРХАН BARHAN / BARHAN	F1	1050	1050			2019	СЛ			
17146006	Морган Morhan / Morhan	F1	1730	1730			2019	СЛП	свж		
<b>Капуста білоголова</b> <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. <b>White Cabbage</b> ( <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Brassica capitata</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>capitata laevis</i> Metzg.)											
17096007	Канто Kanto / Kanto	F1	2281	2281			2020	СЛП	свж		
17096011	Грін Флеш Green Flash / Green Flash	F1	1852	1852			2019	СЛП	свж		
17096013	ТОРЕАДОР TOREADOR / TOREADOR	F1	1050	1050			2019	СЛП	свж		
17096010	Заказ Zakaz / Zakaz	F1	1852	1852			2019	СЛП	свж		
17096014	ПРОДІКОС PRODIKOS / PRODIKOS	F1	1050	1050			2019	СЛП	овоч		
17096015	ГАЛЛІКАН GALLICAN / GALLICAN	F1	1959	1959			2019	СЛП	свж		
17096008	Бухарест Bucharest / Bucharest	F1	744	744			2019	СЛП	свх		
<b>Капуста броколі</b> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. <b>Calabrese, Sprouting Broccoli</b> ( <i>Brassica oleraceae</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica cauliflora</i> (Mill.) Litzg. ssp. <i>simplex</i> Litzg.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Helm; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cultiflora</i> DC. et subvar. <i>cymosa</i> Lam.)											
18136003	Сігно Cigno / Cigno	F1	2020	2020			2020	СЛП	свж, пер		
<b>Капуста кольрабі</b> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongylodes</i> L. <b>Kohlrabi</b> ( <i>Brassica caulorapa</i> Pasq.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i> L.)											
18098001	Лех Lech / Lech	F1	1730	1730			2019	СЛП			
<b>Капуста пекінська</b> <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. <b>Chinese Cabbage</b> ( <i>Sinapis cernua</i> Thunb.; <i>Sinapis pekinensis</i> Lour.; <i>Brassica cernua</i> (Thunb.) Forbes et Hemsley; <i>Brassica Pe-tsay</i> )											
18135001	Пікаліна Pikalina / Pikalina	F1	2506	2506			2019	ЗГр	свж		
<b>Капуста цвітна</b> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. <b>Cauliflower</b> ( <i>Brassica oleraceae</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef.; <i>Brassica cauliflora</i> (Mill.) Litzg.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.; <i>Brassica botrytis</i> Mill.; <i>Brassica cauliflora</i> Garsaul; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Helm; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cultiflora</i> DC. et subvar. <i>cymosa</i> Lam.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>asparagoides</i> f. <i>albida</i> et f. <i>violascens</i> Thell.; <i>Brassica asparagoides</i> Dalechampi)											
17101004	Овіндолі Ovindoli / Ovindoli	F1	1852	1852			2019	СЛП	свж		
18101001	Ількар Ilkar / Ilkar		1650	1650			2019	ЗГр	свж		
17101003	Акваа Aquata / Aquata	F1	2015	2015			2019	СЛП	свж		
<b>Вігна промениста</b> <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek ( <i>Phaseolus aureus</i> Roxb.; <i>Phaseolus radiatus</i> Lour.; <i>Phaseolus mungo</i> Roxb.; <i>Phaseolus radiates</i> var. <i>aurea</i> (Roxb.) Prain; <i>Phaseolus max</i> Roxb.)											
16024001	Заратустра Zaratustra / Zaratustra	C3	2218	2218			2019	СЛ	зерн		
<b>Кукурудза цукрова</b> <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. <b>Sweet Corn</b>											
17103009	Турбін Turbine / Turbine	F1	2087	2662			2020	СЛП	свж, конс		
18103005	Мірза Mirza / Mirza	F1	273	273			2020	СЗГр	ун		

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Морква <i>Daucus carota</i> L.</b>											
<b>Carrot (<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; <i>Daucus sativus</i> (Hoffm.) Roehl.; <i>Daucus carota</i> L. (pro parte); <i>Daucus carota</i> L. var. <i>sativus</i> Hoffm.; <i>Daucus carota</i> L. ssp.)</b>											
17109008	Новара <i>Novara / Novara</i>	F1	751	751			2020	СЛП			
17109007	Лес Сαινтес <i>Les Saintes / Les Saintes</i>	F1	1852	1852			2019	СЛП			
17109009	Волін <i>Wolin / Wolin</i>	F1	1730	1730			2019	СЛП			
16109002	Нарина <i>Narina / Naruna</i>	F1	2200 2201	2200 2201			2020	СЛП			
<b>Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L.</b>											
<b>Cucumber (<i>Cucumis sativus</i> <i>chiar</i> Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.)</b>											
15110013	Міф <i>Mif / Mif</i>	П	1990	1990			2020	СЛП			
18110011	Мадейра <i>Madeira / Madeira</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	СВЖ		
18110004	БАЗИС <i>BAZIS / BAZIS</i>	F1	1902	1902			2019	ЗГр	СВЖ		
18110005	УБЕДА <i>UBEDA / UBEDA</i>	F1	1902	1902			2019	ЗГр	СВЖ		
18110006	УНІКУМ <i>UNIKUM / UNIKUM</i>	F1	1902	1902			2019	ЗГр	СВЖ		
18110008	Северін <i>Severin / Severin</i>	F1	840	840			2019	ЗГр	СВЖ		
<b>Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L.</b>											
<b>Sweet Pepper, Paprika (<i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum grossum</i>; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i>; <i>Capsicum tetragonum</i>; <i>Capsicum cerasiforme</i>; <i>Capsicum olivaeformae</i>; <i>Capsicum peramidale</i>; <i>Capsicum conoides</i>; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordiforme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)</b>											
17113006	Арбалет <i>Arbalet / Arbalet</i>	F1	2200 2201	2201 2200			2020	СЛП	ОВОЧ		
17113007	Ньютон <i>Niuton / Niuton</i>	F1	2200 2201	2200 2201			2020	СЛП	ОВОЧ		
18113006	ТОМ <i>ТОМ / ТОМ</i>	F1	1902	1902			2019	ЗГр	СВЖ		
18113009	Джіалте <i>Gialte / Gialte</i>	F1	840	840			2019	ЗГр	СВЖ		
18113011	Сардінеро <i>Sardinero / Sardinero</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	СВЖ		
18113008	Драгоні <i>Dragoney / Dragoney</i>	F1	840	840			2019	ЗГр	СВЖ		
18113013	Декстер <i>Dexter / Dexter</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	СВЖ		
18113010	Мавера <i>Mavera / Maveria</i>	F1	840	840			2019	ЗГр	СВЖ		
18113012	Рантор <i>Raptor / Raptor</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр			
18113007	Венера <i>Venera / Venera</i>	F1	2507	2507			2019	ЗГр	ОВОЧ		
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L.</b>											
<b>Tomato (<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>esculentum</i>; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) A. Gray; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon pomumamori</i> Moench; <i>Solanum liriidum</i> Salisb.; <i>Solanum foliosum</i> Link; <i>Lycopersicon esculentum</i> Alef.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)</b>											
17115008	Камі <i>Kami / Kami</i>	F1	2281	2281			2020	СЛП	СВЖ		
17115012	Нуксі <i>Nixu / Nixu</i>	F1	2281	2281			2020	СЛП			
17115028	Сентоса <i>Sentosa / Sentosa</i>	F1	1852	1852			2019	СЛП	СВЖ		
17115031	Стромболіно <i>Strombolino / Strombolino</i>	F1	1362	1362			2020	СЛП	СВЖ, КОНС		
18115022	Пінкшайн <i>Pinkshine / Pinkshine</i>	F1	840	840			2019	ЗГр	СВЖ		
18115023	Вігго <i>Veggo / Veggo</i>	F1	840	840			2019	ЗГр	СВЖ		

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18115030	Фуджімару <i>Fujimaru / Fujimaru</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
18115031	Бірікіно <i>Birikino / Birikino</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
18115032	Філовіта <i>Philovita / Philovita</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
18115033	Джорней <i>Journey / Journey</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
18115047	Саворина <i>Savoryna / Savoryna</i>	F1	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
18115046	Панамера <i>Panamera / Panamera</i>	F1	2020	2020			2020	ЗГр	свж		
18115017	ПРАЙД <i>PRIDE / PRIDE</i>	F1	1902	1902			2019	ЗГр	свж		
18115025	Куртіно <i>Kurtino / Kurtino</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
18115026	ДРЦ 564 <i>DRC 564 / DRC 564</i>	F1	2522	744			2019	ЗГр	свж		
18115027	ПІНКІД <i>PINKID / PINKID</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
18115018	ПІНК СВІТНЕС <i>PINK SVITNES / PINK SVITNES</i>	F1	2429	2429			2019	ЗГр			
18115020	СІК1504 <i>SIK1504 / SIK1504</i>	F1	2429	2429			2019	ЗГр	свж		
18115021	Саймон <i>Saimon / Saimon</i>	F1	840	840			2019	ЗГр	свж		
18115028	Страбена <i>Strabena / Strabena</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
18115034	Органза <i>Organza / Organza</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
18115035	Компліс <i>Complice / Complice</i>	F1	1852	1852			2019	ЗГр	свж		
<b>Редька посівна (редиска) Radish, Garden Radish, European Radish</b>		<b><i>Raphanus sativus L. var. sativus Pers.</i> (<i>Raphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.</i>; <i>Raphanus sativus prol. radiculis Pers.</i>; <i>Raphanus sativus var. radicola DC.</i>; <i>Raphanus sativus minor Dod.</i>; <i>Raphanus raphanistrum ssp. sativus Thell.</i>; <i>Raphanus sativus niger Pers.</i>; <i>Raphanus sativus major Schubler et Mart.</i>)</b>									
17118003	ФІЛІПАР <i>FILIPAR / FILIPAR</i>	F1	1050	1050			2019	С			
18118005	Бодіам <i>Bodiam / Bodiam</i>	F1	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
<b>Салат посівний головчастий Lettuce, Head Lettuce</b>		<b><i>Lactuca sativa L. var. capitata</i> (<i>Lactuca esculenta Salisb.</i>; <i>Lactuca scariola var. sativa C. B. Clarke</i>; <i>Lactuca scariola b sativa Boiss.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. secalina Alef.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. acephala</i>; <i>Lactuca sativa L. var. capitata L.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. romana Lam.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. integrifolia Bish.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. hortensis</i>)</b>									
18421002	Ферлі <i>Fairly / Fairly</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр	свж		
18421003	Брайтон <i>Brighton / Brighton</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр	свж, пер		
19421004	Едуардо <i>Eduardo / Eduardo</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр			
18421004	Алессо <i>Alesso / Alesso</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр	свж, пер		
18421006	Джойс <i>Joice / Joice</i>	П	751	751			2020	СЛП	свж		
18421007	Лектріс <i>Lectrice / Lectrice</i>	П	751	751			2020	СЛП	свж		
18421005	Торасіо <i>Toracio / Toracio</i>	П	751	751			2020	СЛП	свж		
<b>Салат посівний листовий Lettuce</b>		<b><i>Lactuca sativa L. var. secalina</i> (<i>Lactuca esculenta Salisb.</i>; <i>Lactuca scariola var. sativa C. B. Clarke</i>; <i>Lactuca scariola b sativa Boiss.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. secalina Alef.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. acephala</i>; <i>Lactuca sativa L. var. capitata L.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. romana Lam.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. integrifolia Bish.</i>; <i>Lactuca sativa L. var. hortensis</i>)</b>									
18120017	Кодекс <i>Codex / Codex</i>	С	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
19120001	Лока <i>Loka / Loka</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр	свж, пер		
18120012	Біондонна <i>Biondonna / Biondonna</i>	П	751	751			2019	СЛП	свж		



Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
18120014	<i>Solos</i> <i>Solos / Solos</i>	П	751	751			2019	СЛП	свж		
18120015	<i>Екстемп</i> <i>Extemp / Extemp</i>	С	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
18120016	<i>Лалік</i> <i>Laliqe / Laliqe</i>	С	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
<b>Холодок лікарський (спаржа) <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparagus (<i>Asparagus officinalis</i> var. <i>altilis</i> L.; <i>Asparagus hortensis</i> Mill.; <i>Asparagus altilis</i> Aschers.)</b>											
18124001	<i>Сігнус</i> <i>Cygnus / Cygnus</i>	F1	751	751			2020	СЛП	свж, чп		
18124003	<i>Пріус</i> <i>Prius / Prius</i>	F1	751	751			2020	СЛП	свж, хп		
18124004	<i>Бахус</i> <i>Vacchus / Vacchus</i>	F1	751	751			2020	СЛП	свж, хп		
18124002	<i>Кумулюс</i> <i>Cumulus / Cumulus</i>	F1	751	751			2020	СЛП	свж, хп		
<b>Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion (<i>Allium cepa</i> L. var. <i>aggregatum</i> G. Don; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> Helm; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>viviparum</i> (Metz.) Alef.; <i>Allium esculentum</i> Salisb.; <i>Cepa vulgaris</i> Renault; <i>Cepa esculenta</i> Rafin; <i>Porrum cepa</i> (L.) Rchb.)</b>											
17106013	<i>Орленда</i> <i>Orlenda / Orlenda</i>	F1	751	751			2020	СЛП	овоч		
17106014	<i>Монделла</i> <i>Mondella / Mondella</i>	F1	751	751			2020	СЛП	овоч		
17106015	<i>Сонома</i> <i>Sonoma / Sonoma</i>	F1	751	751			2020	СЛП	овоч		
17106011	<i>Поконо</i> <i>Rosono / Rosono</i>	F1	1852	1852			2019	СЛП			
<b>Цикорій салатний (ендивій) <i>Cichorium endivia</i> L. Endive (<i>Cichorium crispum</i> Mill.; <i>Cichorium esculentum</i> Salisb.; <i>Cichorium dubium endivia</i> Krause; <i>Cichorium latifolium</i> Sauv.; <i>Cichorium endivia b dativa</i> DC.; <i>Cichorium endivia</i> ssp. <i>endivia</i>)</b>											
18121001	<i>Калафайн</i> <i>Calafine / Calafine</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр			
18121002	<i>Бенефайн</i> <i>Benefine / Benefine</i>	С	840	840			2019	СЛПЗ	свж		
<b>Дворядник тонколистий <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)</b>											
18582002	<i>Летізія</i> <i>Letizia / Letizia</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр	свж		
<b>Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Roman Lettuce, Cos Lettuce (<i>Lactuca esculenta</i> Salisb.; <i>Lactuca scariola</i> var. <i>sativa</i> C. B. Clarke; <i>Lactuca scariola b sativa</i> Boiss.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>secalina</i> Alef.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>acephala</i>; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>romana</i> Lam.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>integrifolia</i> Bish.; <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>hortensis</i>)</b>											
18546003	<i>Мунред</i> <i>Moonred / Moonred</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр	свж		
18546007	<i>Арміля</i> <i>Armillia / Armilla</i>	С	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
18546002	<i>Тотана</i> <i>Totana / Totana</i>	С	840	840			2019	СЛПЗГр	свж, пер		
18546006	<i>Тудела</i> <i>Tudela / Tudela</i>	С	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
18546005	<i>Веродіта</i> <i>Verodita / Verodita</i>	С	1730	1730			2019	ЗГр	свж		
<b>Кукурудза цукрова – батьківський компонент <i>Zea mais</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn – parental component</b>											
17903002	<i>МС 880</i> <i>MS 880 / MS 880</i>	СЗ	736	736			2020				
17903003	<i>МС 736</i> <i>MS 736 / MS 736</i>	СЗ	736	736			2020				
17903004	<i>Багнет</i> <i>Bagnet / Bahnet</i>	СЗ	736	736			2020				
17903005	<i>ОС 711</i> <i>OS 711 / OS 711</i>	СЗ	736	736			2020				
17903001	<i>МС 999</i> <i>MS 999 / MS 999</i>	СЗ	736	736			2020				

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Плодові та ягідні Fruit and Berry</b>											
<b>Яблуна домашня Malus domestica Borkh.</b>											
<b>Apple (Purus malus L.; Malus communis Lam.)</b>											
17263005	СКЮ 159 SQ 159 / SQ 159		2417	2417			2019	СЛП	свж	пс	
<b>Груша звичайна Pyrus communis L.</b>											
<b>Pear (Pyrus pyraeaster Borkh.; Pyrus sativa Koch; Pyrus achras Gaertn.; Pyrus domestica Medic.)</b>											
17258002	Новинка мліївська Новинка мліївська / Novynka mliivska		2314	2314			2019	ЛП	свж	зим	
<b>Вишня звичайна Prunus cerasus L.</b>											
<b>Sour cherry, Tart cherry, Morello (Cerasus vulgaris Mill.; Cerasus acida Ehrh.; Cerasus hortensis Mill.; Prunus cerasus Ldb.; Prunus cerasus a caproniana L.; Cerasus austera (L.) Haem.)</b>											
15257001	Пам'ять Артеменка Пам'ять Артеменка / Pam'iat` Artemenka		1912	1912			2019	СЛП	ун	сс	
<b>Слива домашня Prunus domestica L.</b>											
<b>Plum (Prunus communis domestica Huds.; Prunus oeconomica Borkh.; Prunus sativa Rouy et Camus.)</b>											
15261001	Янтарна мліївська Янтарна мліївська / Yantarna mliivs`ka		1912	1912			2019	СЛП	ун	сс	
<b>Персик звичайний Prunus persica (L.) Batsch</b>											
<b>Peach (Persica vulgaris Mill.; Amygdalus persica L.; Prunus persica Stokes; Prunus persica var. vulgaris Maxim.; Prunus persica var. desna Makino)</b>											
18259001	Мостиський діамант Мостиський діамант / Mostyskyi diament		2518	2518			2019	СЛП	ун	сп	
18259002	Мостиський Мостиський / Mostyskyi		2518	2518			2019	СЛП	ун	др	
<b>Калина звичайна Viburnum opulus L.</b>											
<b>Snowball Tree (Viburnum trilobum Marsh.; Viburnum opulus b americana Ait.; Viburnum americanum Mill.; Viburnum opulus b pimina Michx.; Viburnum opuloides Muhl.; Viburnum pimina Raf.; Viburnum edule Pursh; Viburnum oxycoccus Pursh; Opulus oxycoccus Bercht.)</b>											
18303002	Аня Аня / Ania		1601 2480	1601 2480			2019	СЛП	ун	рс	
<b>Малина Rubus idaeus</b>											
<b>Raspberry (Rubus idaeus L. ssp. vulgatus)</b>											
18296004	Глен Файн Glen Fyne / Glen Fyne		2221	2221			2019	СЛПЗГр	ун	ср	
17296004	Дрісколл Маравілла Driscoll Maravilla / Driscoll Maravilla		2419	2419			2020	ЛЗГр	свж	рс	
<b>Горіх грецький Juglans regia L.</b>											
<b>Walnut (Juglans fallax Dode; Juglans japonica Sieb.; Juglans duclouxiana Dode; Juglans orientalis Dode; Juglans sinensis Dode; Juglans sibirica Dode; Juglans kamaonia)</b>											
16284004	ГЕТЬМАН ГЕТЬМАН / Hetman		1601 1940	1601 1940			2019	Л	ун	сс	
16284005	КРАСЕНЬ КРАСЕНЬ / Krasen		1601 1940	1601 1940			2019	Л	ун	сс	
18284011	ТАІСІЯ TAISIA / TAISIA		2473	2473			2019	СЛП	ун	сп	
<b>Чорниця Vaccinium corymbosum L.</b>											
<b>Highbush Blueberry, Blueberry (Vaccinium corymbosum L.; Vaccinium angustifolium Aiton; V. formosum Andrews; V. myrtilloides Michx.; V. myrtillus L.; V. virgatum Aiton; V. simulatum Small.)</b>											
18501003	РЕКА РЕКА / REKA		2516	1975			2019	СЛПЗГр	ун	др	
18501002	ВВ008 ВВ008 / VV008		1975	1975			2019	СЛПЗГр	ун	рсдн	
18501001	ВВ006 ВВ006 / VV006		1975	1975			2019	СЛПЗГр	ун	пс	
<b>Лохина високоросла Vaccinium corymbosum L.</b>											
<b>Blueberry, Highbush Blueberry (Vaccinium corymbosum L.; Vaccinium angustifolium Aiton; V. formosum Andrews; V. myrtilloides Michx.; V. myrtillus L.; V. virgatum Aiton; V. simulatum Small.)</b>											
18519001	Ласка Ласка / Laska		2470	2470			2019	ЛП	ун	рс	
18519002	Мавка Мавка / Mavka		2470	2470			2019	ЛП	ун	сс	

Заявка № Application N	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method of propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Ожина</b> <i>Rubus subgenus Eubatus</i> sect. <i>Moriferi &amp; Ursini</i>											
<b>Blackberry, Loganberry, Boysenberry</b>											
18631003	<i>Лох Тей</i> <i>Loch Tay / Loch Tay</i>		2221	2221			2019	СЛПЗгр	ун	др	
<b>Декоративні та лікарські</b> <i>Ornamental and Healing</i>											
<b>Троянда</b> <i>Rosa</i> L.											
<b>Rose</b>											
17339003	<i>РЮІЦЛ 1632А</i> <i>RUICL 1632A / RUICL 1632A</i>		1569	1569			2019	Згр	зріз		
<b>Інші</b> <i>Other</i>											
<b>Павловнія</b> <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc.											
<b>Paulownia</b>											
18649001	<i>Котевіса 1</i> <i>Cotevisa 1 / Cotevisa 1</i>		2489	2489			2019	СЛП	Е, дкр		
18649002	<i>Котевіса 2</i> <i>Cotevisa 2 / Cotevisa 2</i>		2489	2489			2019	СЛП	Е, дкр		

# Сільськогосподарські: ЗЛАКИ

*Жито посівне (озиме) – батьківський компонент*  
*Кукурудза звичайна*  
*Кукурудза звичайна – батьківський компонент*  
*Пшениця м'яка (озима)*  
*Пшениця м'яка (яра)*  
*Пшениця спельта (озима)*  
*Пшениця тверда (озима)*  
*Пшениця тверда (яра)*  
*Ячмінь звичайний (озимий)*  
*Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент*  
*Ячмінь звичайний (ярий)*



**Вид:** Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.

**Заявка № 17915004 Назва сорту:** Ло1018П Ло1015Н **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191015**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плідність	диплоїд	2
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	темне	2
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
4	Колеоптіль: за довжиною	короткий	3
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	дуже коротка	1
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
9	Час початку колосіння	середній	5
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Соломина: опушення під колосом	сильне	7
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
17	Колос: за щільністю	нещільний	3
18	Колос: положення в просторі	похиле	9
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
20	Зернівка: за довжиною	довга	7
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
22	Тип розвитку	озимий	1

**Вид:** Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.

**Заявка № 17915005 Назва сорту:** Ло1019П Ло1059Н **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191016**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2
2	Зернівка: забарвлення алейронового шару	світле	1
3	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
4	Колеопиль: за довжиною	короткий	3
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	дуже коротка	1
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
9	Час початку колосіння	середній	5
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже коротка	1
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1
12	Колос: сизий наліт	дуже сильний	9
13	Соломина: опушення під колосом	сильне	7
14	Рослина: за висотою (разом з колосом і остюками)	низька	3
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	дуже короткий	1
17	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1
18	Колос: положення в просторі	похиле	9
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
20	Зернівка: за довжиною	довга	7
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
22	Тип розвитку	озимий	1

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009088 Назва сорту: Алькор Заявник (код): 966 Власник сорту (код): 966

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200013

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,56	10,44	7,18
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,42	2,69	-0,34
+,- до усередненої урожайності, %	8,3	34,7	-4,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	111	113	114
Висота рослини, см	212,3	248,9	215,3
Вихід зерна, %	80,9	81,9	79
Висота прикріплення качана, см	72,7	82,3	85,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	13,7	26,4	2,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,6	6,1
Вміст білка, %	8,4	8,4	8,9
Вміст крохмалю, %	73,9	73,2	72,3
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009207 Назва сорту: Амелло Заявник (код): 2011 Власник сорту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191096

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,34	9,2	7,89
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,2	1,45	0,37
+/- до усередненої урожайності, %	4	18,7	4,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	112	111	111
Висота рослини, см	211,7	266,3	238,3
Вихід зерна, %	83,4	79,4	80,9
Висота прикріплення качана, см	67,5	90,1	97,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	12	24,8	15,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4,4	6,1
Вміст білка, %	8,9	9	9,5
Вміст крохмалю, %	72,1	72,1	72,3
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009075 Назва сорту: Б2190 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191072

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,96	7,44	7,31
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,3	8,8	7,55
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,34	1,36	0,24
+,- до усередненої урожайності, %	6,8	18,2	3,3
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,19
Тривалість періоду вегетації, діб	103	108	108
Висота рослини, см	209,6	240,2	214,4
Вихід зерна, %	84,3	81	77,8
Висота прикріплення качана, см	67,9	84,2	84,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	29,9	29,2	1,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	5,1	4,6
Вміст білка, %	8,5	8,7	9,4
Вміст крохмалю, %	72,6	73,3	72,2
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	1	1	1
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009024 Назва сорту: Віра Заявник (код): 1698 1854 1637 Власник сорту (код): 1698 1854 1637

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191050

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,89	9,35	6,79
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,55	1,34	0,17
+,- до усередненої урожайності, %	10,4	16,8	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, діб	124	123	119
Висота рослини, см	208,3	234	203,8
Вихід зерна, %	79,8	80,4	80,8
Висота прикріплення качана, см	78	82	81,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24,9	22,3	1,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	4,9	5
Вміст білка, %	8,5	8,2	8,6
Вміст крохмалю, %	72,8	73,3	72,6
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009192 Назва сорту: ВІРЖІЛІО Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191093

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,25	10,13	8,13
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,91	2,12	1,51
+,- до усередненої урожайності, %	17,1	26,5	22,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, днів	121	120	118
Висота рослини, см	240,8	262,4	228,1
Вихід зерна, %	84	78,5	80,7
Висота прикріплення качана, см	81,8	94,4	89,2
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,2	24,6	2,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	5,2	5,1
Вміст білка, %	7,7	8,6	8,4
Вміст крохмалю, %	73,3	73	72,3
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009146 Назва сорту: Галардо Заявник (код): 2291 Власник сорту (код): 2291

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200027

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,02	8,99	8,71
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,32	0,98	2,09
+, - до усередненої урожайності, %	-5,9	12,3	31,5
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	120	121	120
Висота рослини, см	230,5	245,4	222
Вихід зерна, %	83,8	83,8	81,4
Висота прикріплення качана, см	76,8	79,8	87,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	22,3	36,5	5,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	4,5	4,4
Вміст білка, %	7,6	8	8,5
Вміст крохмалю, %	73,9	73,4	72,9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009078 Назва сорту: ДКС5075 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191053

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення піляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,96	11,87	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,52	2,3	
+,- до усередненої урожайності, %	9,6	24,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, діб	127	127	
Висота рослини, см	204,8	256,5	
Вихід зерна, %	82,8	82,1	
Висота прикріплення качана, см	69,6	83,2	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	27,8	44,2	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	3,6	
Вміст білка, %	7,8	7,9	
Вміст крохмалю, %	73,8	72,9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009113 Назва сорту: ЕС БРОДВЕЙ Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200016

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,53	9,53	8,16
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,19	1,47	1,54
+,- до усередненої урожайності, %	3,6	18,4	23,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	116	120	119
Висота рослини, см	230,5	259,3	246,9
Вихід зерна, %	82,8	84,1	80,9
Висота прикріплення качана, см	74,8	78,8	95
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	29,7	28,4	4,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	4,3	5,5
Вміст білка, %	8	8,4	8,8
Вміст крохмалю, %	73	72,9	72,7
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009116 Назва сорту: ЕС ГЕДЕОН Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200019

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,47	8,66	8,06
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,33	0,91	0,54
+,- до усередненої урожайності, %	6,5	11,8	7,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	111	111	112
Висота рослини, см	224,4	257,1	229,9
Вихід зерна, %	84,5	81,2	81,5
Висота прикріплення качана, см	78,3	89	90
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	15,9	27,9	4,7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	5	4,6
Вміст білка, %	8,2	8,8	8,6
Вміст крохмалю, %	73,6	73,5	73,7
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009115 Назва сорту: ЕС ДЕКАРТ Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200018

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,77	9,44	8,47
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,43	1,35	1,85
+,- до усередненої урожайності, %	8,1	16,8	27,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	118	120	119
Висота рослини, см	237,7	257	240,4
Вихід зерна, %	83,5	81,1	80,7
Висота прикріплення качана, см	79,3	91,5	95,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34,3	30,4	1,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	4,5	,,5
Вміст білка, %	8,1	7,7	7,6
Вміст крохмалю, %	73,6	73,9	73,6
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009112 Назва сорту: ЕС ДЖЕНТЛЬМЕН Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200015

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,06	9,8	8,25
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,72	1,79	1,63
+, - до усередненої урожайності, %	13,4	22,3	24,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	118	120	118
Висота рослини, см	236,8	251	236,4
Вихід зерна, %	82,8	81,5	81,1
Висота прикріплення качана, см	80,2	87,1	90,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	15,2	22,8	4,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	5	4,6
Вміст білка, %	7,5	7,8	8,6
Вміст крохмалю, %	74,6	74	73,2
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гелмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009118 Назва сорту: ЕС ЛЕГОЛАС Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,38	9,15	7,79
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,76	1,4	0,27
+,- до усередненої урожайності, %	-14,8	18,1	3,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	110	112	111
Висота рослини, см	224,7	268,8	236,2
Вихід зерна, %	81,9	79,5	81,2
Висота прикріплення качана, см	74,1	87,3	89,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	12,4	24	3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	5,3	6,3
Вміст білка, %	8,2	8,6	9,1
Вміст крохмалю, %	73,2	72	71,6
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009119 Назва сорту: ЕС ПЕРСПЕКТИВ Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,8	8,89	7,15
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,66	1,14	-0,37
+,- до усередненої урожайності, %	12,8	14,8	-5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	112	113	111
Висота рослини, см	238,5	264	228,9
Вихід зерна, %	83,1	81,3	81
Висота прикріплення качана, см	84,7	99,5	90,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	7,5	28,2	1,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	5,4	5
Вміст білка, %	8,6	8,5	8,4
Вміст крохмалю, %	73	72,9	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009111 Назва сорту: ЕС РАНВЕЙ Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200014

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення піляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,82	8,77	7,75
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,68	1,02	0,23
+,- до усередненої урожайності, %	13,2	13,2	3,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	111	112	112
Висота рослини, см	231,4	258	235,4
Вихід зерна, %	84,8	80,7	80,5
Висота прикріплення качана, см	81,9	85,9	90,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	23,9	28,1	4,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,1	4,8	5,1
Вміст білка, %	8,2	8,5	8,7
Вміст крохмалю, %	74,2	73,6	73,6
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009114 Назва сорту: ЕС ХЕТТРИК Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200017

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,83	9,05	8,24
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,49	1,04	1,62
+,- до усередненої урожайності, %	9,2	13	24,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	117	119	118
Висота рослини, см	226,2	233,6	240,6
Вихід зерна, %	81,6	80,6	81,7
Висота прикріплення качана, см	75,7	81,2	93,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	21,2	30,3	13,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,7	3,8
Вміст білка, %	7,9	8,5	8,6
Вміст крохмалю, %	73,8	73,7	73,1
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гелмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009117 Назва сорту: ЕС ЯКАРІ Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200020

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Володь: час цвітіння	ранній	3	
9	Володь: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Володь: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Володь: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Володь: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Володь: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Володь: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Володь: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Володь: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Володь: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Володь: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,2	8,74	7,62
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,06	0,99	0,1
+,- до усередненої урожайності, %	1,1	12,7	1,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	111	111	112
Висота рослини, см	225,1	259,2	231,1
Вихід зерна, %	82,5	84,1	80,6
Висота прикріплення качана, см	75,1	85,8	93
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	19,9	28,1	8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,2	5,4	4,8
Вміст білка, %	8,5	8,6	8,5
Вміст крохмалю, %	73	73,1	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009125 Назва сорту: Жаклін Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200023

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутня або дуже слабка	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутня або дуже слабка	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,77	9,52	7,13
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,63	1,77	-0,39
+,- до усередненої урожайності, %	12,3	22,9	-5,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	111	111	114
Висота рослини, см	222,7	254,8	231,1
Вихід зерна, %	80,6	81	80,7
Висота прикріплення качана, см	77,2	88,2	88,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	17,5	20,9	2,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,9	5,1	4,7
Вміст білка, %	8,3	8,2	8,7
Вміст крохмалю, %	73,2	73	72,4
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009139 Назва сорту: ЗУР204 Заявник (код): 1694 Власник сорту (код): 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200026

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,22	9,8	7,79
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,08	2,05	0,27
+,- до усередненої урожайності, %	21	26,5	3,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	113	112	116
Висота рослини, см	214,7	247,1	228,4
Вихід зерна, %	83,7	80,1	80,3
Висота прикріплення качана, см	68,9	82,4	84
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	26,7	30,8	3,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	5,2	5
Вміст білка, %	8,2	8,4	8,2
Вміст крохмалю, %	73,5	72,8	72,6
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн.		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009138 Назва сорту: ЗУР307 Заявник (код): 1694 Власник сорту (код): 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200025

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,58	9,74	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,14	0,17	
+,- до усередненої урожайності, %	2,5	1,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, діб	127	128	
Висота рослини, см	219	243,8	
Вихід зерна, %	80,9	81,9	
Висота прикріплення качана, см	69,3	83	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,1	34	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	4	
Вміст білка, %	8,5	8,6	
Вміст крохмалю, %	73,1	72,6	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009142 Назва сорту: КВС ГРАНАДОС Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191082

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,93	9,33	7,38
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,21	1,58	-0,14
+,- до усередненої урожайності, %	-4	20,3	-1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	111	110	114
Висота рослини, см	214,7	236,2	217,4
Вихід зерна, %	85,1	83	82,5
Висота прикріплення качана, см	67,5	72,6	75,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	17,5	21,8	5,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	4,7	5,5
Вміст білка, %	7,8	8	9,3
Вміст крохмалю, %	74,3	73,7	73
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009134 Назва сорту: КВС КАШЕМІР Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191081

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,78	10,11	8,05
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,44	2,1	1,43
+,- до усередненої урожайності, %	8,3	26,3	21,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	118	120	119
Висота рослини, см	224,1	248,9	234,6
Вихід зерна, %	85,1	82,1	79,3
Висота прикріплення качана, см	75,3	86,8	91
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24,9	28,3	12,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,7	4,6	4,3
Вміст білка, %	7,9	8	8,3
Вміст крохмалю, %	73,7	72,9	72,7
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009097 Назва сорту: Кіянті КС Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191079

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,31	8,24	7,91
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,03	0,23	1,29
+,- до усередненої урожайності, %	-0,6	2,9	19,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, днів	117	119	118
Висота рослини, см	215,4	233,2	230
Вихід зерна, %	83,3	80,3	80,2
Висота прикріплення качана, см	69,1	74,1	84,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24	30,5	15,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	5	5,1
Вміст білка, %	8,1	7,6	8,1
Вміст крохмалю, %	73,6	74,3	74
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоруозу, бал	8	8	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009132 Назва сорту: КОЛЕТІС Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191080

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,31	8,24	7,91
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,03	0,23	1,29
+, - до усередненої урожайності, %	-0,6	2,9	19,4
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	117	119	118
Висота рослини, см	215,4	233,2	230
Вихід зерна, %	83,3	80,3	80,2
Висота прикріплення качана, см	69,1	74,1	84,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24	30,5	15,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	5	5,1
Вміст білка, %	8,1	7,6	8,1
Вміст крохмалю, %	73,6	74,3	74
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009161 Назва сорту: Кунео Заявник (код): 1902 Власник сорту (код): 1902

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200029

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	ранній	3	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,15	9,6	8,19
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,19	1,48	1,57
+,- до усередненої урожайності, %	-3,6	18,5	23,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	117	118	117
Висота рослини, см	242,3	265,5	229,9
Вихід зерна, %	83,9	82,8	81,9
Висота прикріплення качана, см	78,6	87,8	88,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,3	34,5	5,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	5,5	5
Вміст білка, %	8,7	8,7	8,1
Вміст крохмалю, %	72,6	72,8	73
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 16009021 Назва сорту:** Ламасан **Заявник (код):** 1698 1854 1637 **Власник сорту (код):** 1698 1854 1637

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191047**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,55	8,93	6,22
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,21	0,92	-0,4
+,- до усередненої урожайності, %	3,9	11,5	-6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, днів	121	121	118
Висота рослини, см	201,4	235	217,3
Вихід зерна, %	80	74,6	79,3
Висота прикріплення качана, см	71,8	84,3	83,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,3	23,9	2,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	5,4	5,5
Вміст білка, %	9,3	8,9	8,5
Вміст крохмалю, %	72,6	72,5	73,2
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гелмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009162 Назва сорту: Ліворно Заявник (код): 1902 Власник сорту (код): 1902

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200030

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	дуже слабке
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,65	8,9	8,35
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,69	0,89	1,73
+,- до усередненої урожайності, %	-13	11,1	26,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	118	119	118
Висота рослини, см	235	259,1	243,2
Вихід зерна, %	81,7	76,3	77,9
Висота прикріплення качана, см	78,3	90,8	101,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24,6	36	8,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	5,1	4,7
Вміст білка, %	8,6	8,5	8,7
Вміст крохмалю, %	72,5	73,2	72,7
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009058 Назва сорту: MAC 308A Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191068

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,69	9,43	8,34
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,65	1,42	1,72
+,- до усередненої урожайності, %	-12,1	17,8	25,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	121	119	120
Висота рослини, см	202,2	251,6	230,6
Вихід зерна, %	80,7	82,4	78,9
Висота прикріплення качана, см	71,4	88,5	85,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	29,7	29,8	2,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	4,7	4,5
Вміст білка, %	8,2	9,4	7,5
Вміст крохмалю, %	73,2	72,2	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 15009034 Назва сорту: MAC 34Б Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191044

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначалась	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,69	9,43	8,34
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,65	1,42	1,72
+/- до усередненої урожайності, %	-12,1	17,8	25,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, діб	121	119	120
Висота рослини, см	202,2	251,6	230,6
Вихід зерна, %	80,7	82,4	78,9
Висота прикріплення качана, см	71,4	88,5	85,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	29,7	29,8	2,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	4,7	4,5
Вміст білка, %	8,2	9,4	7,5
Вміст крохмалю, %	73,2	72,2	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 15009035 Назва сорту: МАС 48Л Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191045

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	до великого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,45	11,4	7,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,89	3,39	0,94
+, - до усередненої урожайності, %	-16,7	42,4	14,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	123	121	120
Висота рослини, см	203,9	245,2	235
Вихід зерна, %	80,8	82,8	80,2
Висота прикріплення качана, см	68,9	78	86
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	25,6	22,1	9,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,1	4,4	6,2
Вміст білка, %	8,3	8,3	8,7
Вміст крохмалю, %	73,8	74,1	72,9
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009057 Назва сорту: MAC 49П Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191067

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,3	9,74	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,86	0,17	
+,- до усередненої урожайності, %	15,8	1,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, діб	126	128	
Висота рослини, см	219,7	254,7	
Вихід зерна, %	81,7	78,7	
Висота прикріплення качана, см	66	85,3	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	19	32,6	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	5,4	
Вміст білка, %	7,5	8,1	
Вміст крохмалю, %	74	73,3	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання		зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009065 Назва сорту: МАСТОР Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191070

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	дуже сильне	9
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,86	9,17	6,59
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,28	1,42	-0,93
+,- до усередненої урожайності, %	-5,5	18,3	-12,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	111	112	113
Висота рослини, см	231,3	252,9	232,4
Вихід зерна, %	78,7	77,9	79,9
Висота прикріплення качана, см	82	85	89,2
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	8,8	15,3	1,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	5,1	4,8
Вміст білка, %	8,1	8,8	7,9
Вміст крохмалю, %	73,7	72,7	72,6
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009212 Назва сорту: Мегаліто Заявник (код): 2011 Власник сорту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191097

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,28	9,07	7,25
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,14	1,32	-0,27
+,- до усередненої урожайності, %	22,1	17,1	-3,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	112	114	113
Висота рослини, см	210,7	252,3	234,8
Вихід зерна, %	79,7	78	80,2
Висота прикріплення качана, см	66,5	81,8	85,7
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	11,3	22,8	11,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	3,9	5,4
Вміст білка, %	9,1	9,1	9,9
Вміст крохмалю, %	71,8	71,8	72,2
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009048 Назва сорту: Мейфлавер Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191052

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,59	8,01	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,2	10,46	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,66	2,44	
+, - до усередненої урожайності, %	-12,1	30,4	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	
Тривалість періоду вегетації, діб	119	119	
Висота рослини, см	208,3	235,6	
Вихід зерна, %	84,8	83,5	
Висота прикріплення качана, см	72,7	77,8	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	18,3	19,3	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,6	
Вміст білка, %	8,7	7,9	
Вміст крохмалю, %	73,4	74,6	
Стійкість до посухи, бал	6	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	
Група стиглості (ФАО)	3	3	
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009131 Назва сорту: Меттью Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200024

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлених зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,84	9,51	7,56
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,7	1,76	0,04
+,- до усередненої урожайності, %	13,7	22,7	0,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	112	113	115
Висота рослини, см	213,4	254	237,2
Вихід зерна, %	83	82	80,9
Висота прикріплення качана, см	72,6	89,4	92,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	16,6	16	4,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	5,2	5,1
Вміст білка, %	8,1	8,5	8,6
Вміст крохмалю, %	73,4	73,2	72,9
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009056 Назва сорту: МОНСТР Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191066

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	до помірного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,74	10,15	7,54
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,4	2,4	0,02
+,- до усередненої урожайності, %	-7,8	31	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	110	112	112
Висота рослини, см	230,3	264,5	239
Вихід зерна, %	81,3	78,1	81
Висота прикріплення качана, см	82,1	92,5	88,2
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	16,7	14,8	1,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	5,3	5,6
Вміст білка, %	8,6	9,2	8
Вміст крохмалю, %	72,5	71,8	73,3
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009023 Назва сорту: Олешківський Заявник (код): 1698 1854 1637 Власник сорту (код): 1698 1854 1637

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191049

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,77	8,43	6,12
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,37	0,68	-1,4
+,- до усередненої урожайності, %	-7,2	8,8	-18,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	111	113	117
Висота рослини, см	197,2	229,2	217,6
Вихід зерна, %	82,8	78,7	80,3
Висота прикріплення качана, см	68,3	80,2	86,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	21,1	23	3,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	5	5,3
Вміст білка, %	9,1	9,1	9,4
Вміст крохмалю, %	72,7	71,9	72,3
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009147 Назва сорту: Остін Заявник (код): 2291 Власник сорту (код): 2291

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200028

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	до щільної
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,7	8,15	7,83
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,56	0,4	0,31
+,- до усередненої урожайності, %	10,9	5,1	4,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	113	111	111
Висота рослини, см	214,7	241,8	225,7
Вихід зерна, %	82,8	80,2	81,9
Висота прикріплення качана, см	69	77,1	85,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	10,7	18,9	2,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4	4,8
Вміст білка, %	8,7	8,6	9
Вміст крохмалю, %	72,4	72,3	72,2
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009052 Назва сорту: П0268 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191062

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,35	12,06	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,91	2,49	
+,- до усередненої урожайності, %	16,8	26	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	128	
Висота рослини, см	221,4	237,3	
Вихід зерна, %	79,5	83	
Висота прикріплення качана, см	69	79	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	29,1	47	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4	
Вміст білка, %	7,9	7,4	
Вміст крохмалю, %	73	72,7	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009046 Назва сорту: ПО312 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191056

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,44	9,59	
+,- до усередненої урожайності, т/га	1	0,02	
+,- до усередненої урожайності, %	18,4	0,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, дів	125	129	
Висота рослини, см	209,7	248,2	
Вихід зерна, %	82,4	79,3	
Висота прикріплення качана, см	67,7	84,4	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,7	43	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	3	
Вміст білка, %	7,8	7,3	
Вміст крохмалю, %	73,5	73,1	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009049 Назва сорту: П0349 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191059

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,37	11,76	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,93	2,19	
+,- до усередненої урожайності, %	17,2	22,9	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, дб	125	129	
Висота рослини, см	214,4	260,2	
Вихід зерна, %	82,3	84	
Висота прикріплення качана, см	64,3	91,1	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,6	29,8	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,1	5	
Вміст білка, %	7,2	8	
Вміст крохмалю, %	73,9	72,4	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009055 Назва сорту: ПО362 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191065

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,75	10,4	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,31	0,83	
+, - до усередненої урожайності, %	5,7	8,7	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, дів	124	129	
Висота рослини, см	217,9	244,7	
Вихід зерна, %	83,5	79,5	
Висота прикріплення качана, см	70,1	86,8	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,7	41,4	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	5	
Вміст білка, %	7,7	8,1	
Вміст крохмалю, %	73,9	73,1	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрямок використання		зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009159 Назва сорту: П7515 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191084

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	до середньої кількості
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,96	7,44	7,31
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,91	8,02	7,34
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,05	0,58	0,03
+/- до усередненої урожайності, %	-0,9	7,8	0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,15	0,19
Тривалість періоду вегетації, діб	104	107	106
Висота рослини, см	211,7	239,9	215,4
Вихід зерна, %	86,3	80,8	81
Висота прикріплення качана, см	72,6	79,8	80,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	25,1	31,7	5,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	4,9	5,5
Вміст білка, %	7,8	7,9	8,5
Вміст крохмалю, %	73,3	73,6	72,8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009074 Назва сорту: П8358 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191071

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,01	9,55	8,34
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,87	1,8	0,82
+,- до усередненої урожайності, %	17	23,3	10,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	111	111	113
Висота рослини, см	217,7	253,1	223,6
Вихід зерна, %	83,6	78,6	80,7
Висота прикріплення качана, см	72	88,4	88,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	17,2	22,4	2,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	5,4	5,4
Вміст білка, %	7,5	8,3	9
Вміст крохмалю, %	74	73,3	73,4
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009054 Назва сорту: П8707 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191064

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,3	9,41	7,32
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,16	1,66	-0,2
+,- до усередненої урожайності, %	3,1	21,5	-2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	112	111	114
Висота рослини, см	217,4	262,3	236
Вихід зерна, %	81,3	80,8	80,9
Висота прикріплення качана, см	79	89,9	86,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24,3	19,8	7,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,5	5,1
Вміст білка, %	9,2	8,5	9,3
Вміст крохмалю, %	72,1	72,9	71,8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009160 Назва сорту: П8834 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191085

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	до середньої кількості
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,13	9,74	7,77
+- до усередненої урожайності, т/га	0,79	1,73	1,15
+- до усередненої урожайності, %	14,8	21,5	17,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	117	119	119
Висота рослини, см	218	225	220,6
Вихід зерна, %	83,2	80,9	81,2
Висота прикріплення качана, см	76,6	86,1	87,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	37,4	37	3,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	4,4	4,9
Вміст білка, %	7,9	8,1	8,7
Вміст крохмалю, %	73,7	73,2	73,2
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гелмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009047 Назва сорту: П9071 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191057

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Володь: час цвітіння	ранній	3	
9	Володь: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Володь: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Володь: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Володь: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Володь: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Володь: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Володь: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Володь: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Володь: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Володь: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5	9,35	7,16
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,34	1,03	0,54
+,- до усередненої урожайності, %	-6,3	12,9	8,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, днів	114	121	116
Висота рослини, см	228	240,6	215,1
Вихід зерна, %	85,2	75,5	78,8
Висота прикріплення качана, см	80,4	78,9	78,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	36,2	43,8	8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,7	4,7
Вміст білка, %	9,1	8,1	8,7
Вміст крохмалю, %	73,1	73,9	73,6
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009158 Назва сорту: П9074Е Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191083

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	воскоподібного типу
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,73	10,07	7,66
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,39	2,06	1,04
+, - до усередненої урожайності, %	7,3	25,7	15,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	118	119	119
Висота рослини, см	213,3	242,8	222,9
Вихід зерна, %	81,2	82	80,7
Висота прикріплення качана, см	69,8	80,6	88
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	17	37	9,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,7	4,3	4,7
Вміст білка, %	8,1	8,3	9
Вміст крохмалю, %	73,2	73,5	73
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009051 Назва сорту: П9170 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191061

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,78	9,03	7,36
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,44	1,02	0,74
+,- до усередненої урожайності, %	8,1	12,7	11,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, днів	117	120	120
Висота рослини, см	219,3	243,5	217,9
Вихід зерна, %	84,5	80,8	81,2
Висота прикріплення качана, см	71,2	82,7	82,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,5	38,9	11,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	4,3	3,8
Вміст білка, %	7,8	8,3	8,9
Вміст крохмалю, %	73,7	73,8	73,8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009050 Назва сорту: П9363 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191060

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,35	9,74	7,2
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,01	1,73	0,58
+,- до усередненої урожайності, %	18,9	21,6	8,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, днів	119	120	120
Висота рослини, см	215,3	249,9	215,5
Вихід зерна, %	82,4	79,7	80,4
Висота прикріплення качана, см	72,4	82,7	83,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24,4	39,2	3,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	4,2	4,7
Вміст білка, %	7,9	8	8,9
Вміст крохмалю, %	73,3	73,5	73,1
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009035 Назва сорту: П9537 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191051

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,49	10,27	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,05	0,7	
+,- до усередненої урожайності, %	1	7,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, дів	125	128	
Висота рослини, см	206,6	256,5	
Вихід зерна, %	82,6	80,2	
Висота прикріплення качана, см	67,7	82,8	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	20,1	31,3	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,3	
Вміст білка, %	7,7	8,4	
Вміст крохмалю, %	73,7	72,2	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009048 Назва сорту: П9757 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191058

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,13	7,56	7,42
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,79	-0,45	0,8
+,- до усередненої урожайності, %	14,7	-5,6	12,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	116	120	115
Висота рослини, см	226,8	237,2	212,3
Вихід зерна, %	84,4	78,9	79,4
Висота прикріплення качана, см	73,3	85,1	87,7
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	15,8	43,1	2,7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	3,4	4,7
Вміст білка, %	7,1	8,2	9,2
Вміст крохмалю, %	73,8	72,8	72,4
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009053 Назва сорту: П9874 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191063

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,55	9,56	
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,11	-0,01	
+,- до усередненої урожайності, %	20,4	-0,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, дб	126	129	
Висота рослини, см	218,4	252,3	
Вихід зерна, %	84,8	82,7	
Висота прикріплення качана, см	69,6	87,1	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,1	17	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	3,5	
Вміст білка, %	8	7,7	
Вміст крохмалю, %	73,2	73	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009096 Назва сорту: Палізі КС Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191078

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	дуже слабке
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,44	9,57	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,53	10,45	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,09	0,88	
+,- до усередненої урожайності, %	1,7	9,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	2,21	
Тривалість періоду вегетації, діб	125	128	
Висота рослини, см	214,9	247,8	
Вихід зерна, %	85,4	80,4	
Висота прикріплення качана, см	73,1	84,2	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,3	54,8	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	4,3	
Вміст білка, %	8	7,8	
Вміст крохмалю, %	73,2	72,7	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009163 Назва сорту: Пітч Заявник (код): 1902 Власник сорту (код): 1902

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200031

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,68	9,35	8,67
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,34	1,35	2,05
+,- до усередненої урожайності, %	6,4	16,9	31
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	118	118	118
Висота рослини, см	237,9	267,6	242,6
Вихід зерна, %	82,6	81,8	81
Висота прикріплення качана, см	78,4	90	96,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	31,3	28,9	7,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	5,2	5,4
Вміст білка, %	9	9,1	8,9
Вміст крохмалю, %	72,8	72,1	73,1
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009095 Назва сорту: Поезі КС Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191077

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,42	9,02	7,97
+- до усередненої урожайності, т/га	0,08	1,01	1,35
+- до усередненої урожайності, %	1,5	12,6	20,3
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	118	120	120
Висота рослини, см	221,7	240,6	227
Вихід зерна, %	78,3	78,1	78,7
Висота прикріплення качана, см	76,3	83,3	90,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	22,4	21,9	1,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	3,6	4,9
Вміст білка, %	8,2	8,6	8,7
Вміст крохмалю, %	72,8	72,7	71,7
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009189 Назва сорту: РЖТ АТТРАКЦИОН Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191090

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,16	10,13	7,33
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,02	2,38	-0,19
+,- до усередненої урожайності, %	19,9	30,7	-2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	111	112	113
Висота рослини, см	212,2	251	230,8
Вихід зерна, %	84,8	82	80,8
Висота прикріплення качана, см	72,7	91	87,7
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	17,7	26,9	2,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,9	4,5	4,6
Вміст білка, %	8,2	8,3	8,1
Вміст крохмалю, %	73,1	72,9	72,5
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009185 Назва сорту: РЖТ ДАМІККСУС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191086

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,88	9,05	7,48
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,54	1,04	0,86
+, - до усередненої урожайності, %	10,1	13	13
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	120	119	121
Висота рослини, см	234,5	252,1	225,8
Вихід зерна, %	85,2	81,7	80,1
Висота прикріплення качана, см	80,5	81,8	84,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	26,8	34,8	8,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,1	5,1	4,7
Вміст білка, %	7,8	8,7	8,6
Вміст крохмалю, %	72,9	72,7	72,5
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гелмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009194 Назва сорту: РЖТ ЕККЗЕМПЛЯР Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191094

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,56	10,4	7,98
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,22	2,39	1,36
+,- до усередненої урожайності, %	22,8	29,8	20,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	118	120	121
Висота рослини, см	234,6	252,8	224,9
Вихід зерна, %	82,3	79,1	80,1
Висота прикріплення качана, см	82,9	87,8	86,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,4	26,6	8,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	5,1	5
Вміст білка, %	7,7	8,1	7,5
Вміст крохмалю, %	73,7	73,4	73
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009188 Назва сорту: РЖТ ЕККСКІ ДУО Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191089

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,82	10,1	7,58
+- до усередненої урожайності, т/га	0,68	2,35	0,06
+- до усередненої урожайності, %	13,3	30,3	0,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	112	113	114
Висота рослини, см	215,5	253,6	223,7
Вихід зерна, %	84	80,8	81,4
Висота прикріплення качана, см	73,7	82,9	80,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	19,5	29,4	3,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	5,5	5,2
Вміст білка, %	8,1	8,6	8,8
Вміст крохмалю, %	72,9	72,3	72,4
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009187 Назва сорту: РЖТ ЗАНЕТИККС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191088

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,96	9,9	8,06
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,62	1,89	1,44
+,- до усередненої урожайності, %	11,7	23,6	21,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	118	119	118
Висота рослини, см	228,5	243,1	226,3
Вихід зерна, %	85,4	83,1	80,5
Висота прикріплення качана, см	78,5	88,9	86,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	13,5	32,8	5,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,1	4,3	4,9
Вміст білка, %	7,6	8,3	8,4
Вміст крохмалю, %	73,2	73,4	72,6
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009186 Назва сорту: РЖТ ЛІЖЕТТІККС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191087

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волость: антоціанове забарвлення піляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,52	9,67	7,89
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,18	1,51	1,27
+, - до усередненої урожайності, %	22,1	18,9	19,2
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	122	120	121
Висота рослини, см	233,8	252,9	224,7
Вихід зерна, %	83,8	81,6	80,4
Висота прикріплення качана, см	79,2	87,6	93,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	26,7	35	8,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,3	5	4,2
Вміст білка, %	7,8	8,6	8,4
Вміст крохмалю, %	73	72,6	72,3
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009191 Назва сорту: РЖТ МАККАТАК Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191092

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,22	9,35	7,08
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,08	1,6	-0,44
+,- до усередненої урожайності, %	1,6	20,7	-5,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	111	111	113
Висота рослини, см	200,1	242	229,2
Вихід зерна, %	82,8	80,8	80,1
Висота прикріплення качана, см	67,7	82,4	87,7
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	25,1	35,1	9,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	4,5	5
Вміст білка, %	8,6	8,3	8,9
Вміст крохмалю, %	72,5	72,9	72,3
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009190 Назва сорту: РЖТ РЕАКЦИОН Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191091

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,54	10,05	7,54
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,2	2,04	0,92
+,- до усередненої урожайності, %	3,7	25,4	13,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, днів	118	119	118
Висота рослини, см	236,5	251,7	226,1
Вихід зерна, %	82,5	82,1	79,7
Висота прикріплення качана, см	73,5	84,7	85,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34,8	32,6	2,7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,1	4,6
Вміст білка, %	7,5	8,7	7,9
Вміст крохмалю, %	73,5	72,9	73,3
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009125 Назва сорту: Селенія Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191054

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення піляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,21	8,06	6,87
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,13	0,05	0,25
+,- до усередненої урожайності, %	-2,4	0,6	3,8
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	120	119	116
Висота рослини, см	220,1	228,1	223,7
Вихід зерна, %	82,3	81	80,4
Висота прикріплення качана, см	76	79,9	84,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	30,6	24,1	7,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,4	4,4	5,2
Вміст білка, %	9,4	8,8	7,7
Вміст крохмалю, %	72,2	72,9	73,9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009006 Назва сорту: СИ МАРИМБА Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191055

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,98	9,74	7,72
+- до усередненої урожайності, т/га	0,84	1,99	0,2
+- до усередненої урожайності, %	16,4	25,6	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	112	113	113
Висота рослини, см	207,7	247,6	225
Вихід зерна, %	84,4	82,6	82,1
Висота прикріплення качана, см	72,6	81,7	83,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	19,3	28,6	11,7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,1	4,6	5,6
Вміст білка, %	8	7,6	8,3
Вміст крохмалю, %	73,7	73,6	72,6
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009091 Назва сорту: СИ ОКТЕОН Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191074

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	пізній	7	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення піляків	помірне	5	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,86	10,27	8,52
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,52	2,26	1,9
+,- до усередненої урожайності, %	9,8	28,3	28,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	118	120	118
Висота рослини, см	231,3	250,4	241,2
Вихід зерна, %	82,8	77,9	80
Висота прикріплення качана, см	76,2	88,3	92,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	18,2	39,6	12,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,9	4,6	5,2
Вміст білка, %	7,9	7,8	8,5
Вміст крохмалю, %	73,8	73,8	72,5
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009093 Назва сорту: СИ ПРЕМЕО Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191076

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	до дуже сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,63	9,67	8,48
+- до усередненої урожайності, т/га	0,29	1,66	1,86
+- до усередненої урожайності, %	5,5	20,8	28,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дів	117	120	118
Висота рослини, см	229,7	256,9	233,4
Вихід зерна, %	84,4	81,4	80,3
Висота прикріплення качана, см	70	90,3	93,7
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	19,3	35,8	3,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	3,9	4,8
Вміст білка, %	7,7	7,9	7,7
Вміст крохмалю, %	73,9	74	73,7
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009092 Назва сорту: СИ ТОРІНО Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191075

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,01	9,65	8,97
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,67	1,64	2,35
+,- до усередненої урожайності, %	12,6	20,5	35,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	117	120	119
Висота рослини, см	224,7	246,5	234,3
Вихід зерна, %	82,5	84	80,1
Висота прикріплення качана, см	69,7	84,1	89,7
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	24	34,1	8,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	4,2	4,8
Вміст білка, %	7,7	8,1	8,3
Вміст крохмалю, %	74	73,6	73,2
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009090 Назва сорту: СИ ТРІВІУС Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191073

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення піляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	до дуже сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	до дуже сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,65	10,46	8,66
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,31	2,45	2,04
+,- до усередненої урожайності, %	5,8	30,6	30,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, діб	117	120	119
Висота рослини, см	228,4	253	237,1
Вихід зерна, %	82,5	81,1	80,2
Висота прикріплення качана, см	78,3	90,5	93,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	18,4	22,2	4,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,4	4,9	5,4
Вміст білка, %	8,1	8,4	8,1
Вміст крохмалю, %	73,3	73,4	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009060 Назва сорту: Стардаст Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191069

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення піляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,43	9,04	7,38
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,29	1,29	-0,14
+,- до усередненої урожайності, %	5,7	16,6	-1,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	111	111	111
Висота рослини, см	228,5	263	239,4
Вихід зерна, %	80,4	80,9	80,6
Висота прикріплення качана, см	76	84,6	90,2
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	13,2	10	1,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,7	5	5,1
Вміст білка, %	8,5	8,9	9,1
Вміст крохмалю, %	72,8	71,7	72,6
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009213 Назва сорту: CX 200 Заявник (код): 2444 Власник сорту (код): 2444

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200032

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,05	9,05	7,31
+- до усередненої урожайності, т/га	-0,09	1,3	-0,21
+- до усередненої урожайності, %	-1,7	16,8	-2,8
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	111	113	113
Висота рослини, см	199,8	241,8	219,9
Вихід зерна, %	80,6	78,8	79,1
Висота прикріплення качана, см	65,5	81,8	84,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	13	22	3,2
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,8	4,8	6,1
Вміст білка, %	8,8	9	8,3
Вміст крохмалю, %	71,5	71,9	72,8
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009215 Назва сорту: CX 250 Заявник (код): 2444 Власник сорту (код): 2444

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200034

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волость: час цвітіння	середній	5
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волость: антоціанове забарвлення піляків	помірне	5
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,35	7,77	7,63
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,5	9,13	7,46
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,15	1,36	-0,17
+,- до усередненої урожайності, %	3	17,5	-2,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	112	113	114
Висота рослини, см	203,7	228,6	222,3
Вихід зерна, %	83,4	84,2	80,9
Висота прикріплення качана, см	64,4	75	79,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	11,3	18,2	3,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,9	5,7	5
Вміст білка, %	8,8	9	8,3
Вміст крохмалю, %	72,3	71,8	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009214 Назва сорту: CX 300 Заявник (код): 2444 Власник сорту (код): 2444

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200033

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,65	8,87	8,06
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,31	0,86	1,44
+,- до усередненої урожайності, %	5,8	10,7	21,7
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, діб	118	119	121
Висота рослини, см	228,4	254,1	225,6
Вихід зерна, %	82,8	78,7	80,5
Висота прикріплення качана, см	77,1	88,8	86,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	27,7	37,9	7,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,1	4,8	4,8
Вміст білка, %	8,1	8,2	8
Вміст крохмалю, %	73,4	73,2	72,7
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009216 Назва сорту: СХ 320 Заявник (код): 2444 Власник сорту (код): 2444

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200035

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильно

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,27	9,6	8,21
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,93	1,59	1,59
+,- до усередненої урожайності, %	17,5	19,9	23,9
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, дб	119	119	121
Висота рослини, см	234,7	247	222,3
Вихід зерна, %	84,5	82,9	80,9
Висота прикріплення качана, см	72,8	84,3	87
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	25,5	22,7	3,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	4,8	5,1
Вміст білка, %	7,7	8,1	8,2
Вміст крохмалю, %	73,6	73,4	73,7
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009022 Назва сорту: Тавричанка Заявник (код): 1698 1854 1637

Власник сорту (код): 1698 1854 1637

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191048

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,34	8,01	6,62
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,23	8,22	6,69
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,89	0,21	0,07
+, - до усередненої урожайності, %	16,6	2,6	1,1
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,08	1,2
Тривалість періоду вегетації, діб	119	122	119
Висота рослини, см	205,4	230,3	214
Вихід зерна, %	79,1	79	80,4
Висота прикріплення качана, см	76	78	81
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	26,2	16,6	2,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	4,8	5
Вміст білка, %	9,3	8,9	9,2
Вміст крохмалю, %	72,6	72,6	73,3
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоруозу, бал	8	8	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 17009206 Назва сорту: Філмено Заявник (код): 2011 Власник сорту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191095

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,43	10,1	7,35
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,29	2,35	-0,17
+,- до усередненої урожайності, %	25,1	30,3	-2,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	112	115	113
Висота рослини, см	218,2	271,6	234
Вихід зерна, %	82,9	79,4	78,1
Висота прикріплення качана, см	74,2	97	90,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	12,2	22,3	2,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,2	4,9	5,2
Вміст білка, %	8,8	8,6	9,6
Вміст крохмалю, %	72,6	72,9	72,5
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 16009020 Назва сорту: Чорномор Заявник (код): 1698 1854 1637 Власник сорту (код): 1698 1854 1637

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191046

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірному
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірному
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,14	7,75	7,52
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,86	8,09	6,39
+- до усередненої урожайності, т/га	-0,28	0,34	-1,13
+- до усередненої урожайності, %	-5,4	4,4	-15,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	110	114	117
Висота рослини, см	195,1	229,3	210,1
Вихід зерна, %	81,5	79,5	80,5
Висота прикріплення качана, см	71,5	79,1	83,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	15,1	21,6	1,7
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	5,6	6
Вміст білка, %	9,1	9,3	9,3
Вміст крохмалю, %	72,5	72,2	72,7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909149 Назва сорту: 156ЛА337 Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200045**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вужька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909148 Назва сорту:** 156ЛА337Х 14Б001 **Заявник (код):** 485 **Власник сорту (код):** 485

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200044**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909160 Назва сорту: 223ДХ002 Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200049**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909145 Назва сорту: 227ВБ025 Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200042**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909147 Назва сорту: 262БХ503 Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200043**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 18909005 Назва сорту:** ЗМГ6403 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200071**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909150 Назва сорту: 441XF006 Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200046**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909161 Назва сорту: 44ЗУК319 Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200050

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909158 Назва сорту: 444CX118 Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200047**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909159 Назва сорту: 483ЮХ037 Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200048**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909107 Назва сорту:** ССС3996 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191103**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909106 Назва сорту: СМС3999 Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191102

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909181 Назва сорту:** АВО1236Ц **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200065**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909170 Назва сорту:** АІІ574 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200054**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909007 Назва сорту:** AI01881AI01884 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191100**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909127 Назва сорту: Анапа С Заявник (код): 966 Власник сорту (код): 966

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200038

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909235 Назва сорту:** ГД47ГД48 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200067**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909152 Назва сорту:** ДАКс3360 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191124**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909155 Назва сорту: ДІД3464 Заявник (код): 1959 Власник сорту (код): 1959**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191127**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909182 Назва сорту:** ДПЗ2 ДЛ26 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200066**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909157 Назва сорту:** ЕАКс5121 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191129**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909168 Назва сорту:** ЕГ2363 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200052**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909169 Назва сорту:** ЕГ3036 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200053**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909172 Назва сорту:** ЕГ7471 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200056**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909167 Назва сорту: ЕГ7А97 Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200051

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909173 Назва сорту:** ЕС3556 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200057**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909171 Назва сорту:** EC4585 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200055**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909174 Назва сорту:** ЕС4604 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200058**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909154 Назва сорту:** ІАКс3300 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191126**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	дуже сильне	9
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909153 Назва сорту:** ІФА4226 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191125**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909137 Назва сорту:** KB 4EX1630 **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191117**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909131 Назва сорту: KB 5Ф1731 Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191113

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірно	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірно	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909135 Назва сорту:** KB 7P1104 **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191116**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909133 Назва сорту:** KB 9Д1533 **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191114**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	1
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909134 Назва сорту:** KB 9EY0015 **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191115**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909177 Назва сорту: КЮВІ504 Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200061

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909119 Назва сорту:** ЛЖР2038 ЛМР3185 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191112**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	дуже короткий	1
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутне або дуже слабке	1



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909175 Назва сорту:** ЛІМІВВ957С ФБВ1130 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200059**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909110 Назва сорту:** ЛІН2248 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191106**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусна	1
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909114 Назва сорту:** ЛІФ2184 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191109**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909108 Назва сорту:** ЛЛР2961 ЛМР3185 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191104**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909112 Назва сорту:** ЛМХ3164 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191107**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909113 Назва сорту:** ЛНР3495 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191108**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909118 Назва сорту:** ЛОРЗ690 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191111**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременисто-подібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909115 Назва сорту:** ЛОР3696 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191110**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909129 Назва сорту: М 242 ЗС Заявник (код): 966 Власник сорту (код): 966**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200040**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909180 Назва сорту:** MAC385 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200064**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909009 Назва сорту: МБС4300 Заявник (код): 2264 Власник сорту (код): 2264

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200072

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусна	1
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909179 Назва сорту: ММЛ525 Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200063

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909125 Назва сорту:** МС 150 **Заявник (код):** 966 **Власник сорту (код):** 966

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200036**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	дуже сильне	9
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909126 Назва сорту: МС 200 Заявник (код): 966 Власник сорту (код): 966

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200037

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909128 Назва сорту: МС 262 ЗС Заявник (код): 966 Власник сорту (код): 966

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200039

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірно	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірно	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909130 Назва сорту:** МС 264 СВ **Заявник (код):** 966 **Власник сорту (код):** 966

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200041**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5



Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909156 Назва сорту: НПАКс4072 Заявник (код): 1959 Власник сорту (код): 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191128

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 16909063 Назва сорту:** ПХ43МВ **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191098**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909216 Назва сорту: P15021 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191130**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909217 Назва сорту: P15037 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191131

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909218 Назва сорту: P16089 Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191132**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	сильне	7
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909178 Назва сорту:** PBI442 PBI441 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200062**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909109 Назва сорту:** СМС2311 ЛЖР2038 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191105**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 16909175 Назва сорту: CCC2121 Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191099

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	дуже вузька	1
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909105 Назва сорту:** CCC3157 **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191101**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909176 Назва сорту:** ФІІ422 ФІІ424 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200060**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909151 Назва сорту:** ХІД3347 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191123**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	дуже сильне	9
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	дуже сильне	9
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909139 Назва сорту:** ЦАЛ2261 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191118**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	пром'яний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909146 Назва сорту: ЦАФ3362 Заявник (код): 1959 Власник сорту (код): 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191122

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909140 Назва сорту:** ЦІД2108 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191119**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	циліндрична	3
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 17909143 Назва сорту:** ЦІД2268 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191121**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	дуже сильне	9
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 17909141 Назва сорту: ЦІД2457 Заявник (код): 1959 Власник сорту (код): 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191120

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 18909004 Назва сорту:** Ш1135 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200070**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 18909002 Назва сорту: Ш3637 Заявник (код): 2264 Власник сорту (код): 2264

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200069

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від пізнього до дуже пізнього	8
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 18909001 Назва сорту:** Ш6210 **Заявник (код):** 2264 **Власник сорту (код):** 2264

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200068**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від пізнього до дуже пізнього	8
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012051 Назва сорту: Лаваль Заявник (код): 1517 Власник сорту (код): 1517

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200092

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,6	7,01	6,01
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,51	0,52	0,25
+/- до усередненої урожайності, %	-9,9	8	4,4
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	258	266	264
Висота рослини, см	69,7	76,5	80,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,5	41,5	40,4
Вміст білка, %	13,6	13,8	13,2
Вміст сирової клейковини, %	27,1	27,7	26,8
Сила борошна (W), о.а.	224	260	255
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	1000	990
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморозування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		6,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 16012046 Назва сорту:** Мауріціо **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191181**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	7
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,43	7,29	6,16
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,68	0,8	0,4
+,- до усередненої урожайності, %	-13,3	12,3	7
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	256	265	264
Висота рослини, см	78	86,4	91,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,1	43,9	44,7
Вміст білка, %	14,2	14	13,6
Вміст сирової клейковини, %	28,4	28	27,6
Сила борошна (W), о.а.	218	273	246
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1070	1100	1020
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		5,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012041 Назва сорту: МІП Лада Заявник (код): 1589 Власник сорту (код): 1589

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191188

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,28	7,01	5,76
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,83	0,52	-0
+/- до усередненої урожайності, %	-16,3	8,1	-0,1
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	260	267	266
Висота рослини, см	86,8	92,2	99,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41	44,1	40,8
Вміст білка, %	14,1	13,6	13,6
Вміст сирової клейковини, %	27,9	27,2	27,1
Сила борошна (W), о.а.	246	245	255
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	980	940	950
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		5,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 17012042 Назва сорту:** МІП Фортуна **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191189**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,23	7,11	6,01
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,88	0,62	0,25
+,- до усередненої урожайності, %	-17,2	9,5	4,4
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	260	266	265
Висота рослини, см	83,6	95,7	102
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,9	44	41,3
Вміст білка, %	13,7	13,9	13,5
Вміст сирової клейковини, %	27	27,8	27
Сила борошна (W), о.а.	224	271	230
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	940	1000	920
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	7,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012040 Назва сорту: МІП Ювілейна Заявник (код): 1589 Власник сорту (код): 1589

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191187

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,93	7,1	6,23
+/- до усередненої урожайності, т/га	-1,18	0,61	0,47
+/- до усередненої урожайності, %	-23,1	9,4	8,2
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	259	266	263
Висота рослини, см	82,4	89,1	94,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,2	44,1	42,1
Вміст білка, %	13,8	14,1	13,5
Вміст сирової клейковини, %	27,6	28,3	26,9
Сила борошна (W), о.а.	260	293	233
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1070	1030	1030
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		6,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	слн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.



**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 16012045 Назва сорту:** Мірастар **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191180**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутня або дуже слабка	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	щільний	7
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	7
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,51	6,71	6,1
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,6	0,22	0,34
+,- до усередненої урожайності, %	-11,7	3,3	5,9
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	259	265	267
Висота рослини, см	77,1	91,1	95,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,3	41,2	42,2
Вміст білка, %	14,1	14,2	14,1
Вміст сирової клейковини, %	28,4	28,5	28,8
Сила борошна (W), о.а.	310	327	291
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1180	1130	1000
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	9
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		3,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	слн	слн	слн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012025 Назва сорту: РЖТ Преміант Заявник (код): 1286 Власник сорту (код): 1286

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191185

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,16	7,32	6,02
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,95	0,83	0,26
+/- до усередненої урожайності, %	-18,5	12,8	4,5
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	259	265	265
Висота рослини, см	79,3	88,9	92,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	35,9	40,8	37,5
Вміст білка, %	13,5	13,7	13,7
Вміст сирової клейковини, %	26,8	27,1	27,3
Сила борошна (W), о.а.	261	305	263
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1200	1020	970
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморозування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		6,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012027 Назва сорту: Саласар Заявник (код): 2071 Власник сорту (код): 2071

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200095

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	щільний	7
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,21	6,99	6,58
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,9	0,5	0,82
+,- до усередненої урожайності, %	-17,6	7,7	14,2
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	259	268	267
Висота рослини, см	64,9	75,7	77,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,6	44,3	42,5
Вміст білка, %	13,6	13,7	13,6
Вміст сирової клейковини, %	27	28,4	27,5
Сила борошна (W), о.а.	260	277	240
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1080	1040	970
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		5,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012028 Назва сорту: Соборна Заявник (код): 1698 Власник сорту (код): 1698

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191186

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,3	6,9	6
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,81	0,41	0,24
+/- до усередненої урожайності, %	-15,8	6,3	4,1
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	257	264	262
Висота рослини, см	75,6	81,2	86,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,3	42,5	39,9
Вміст білка, %	13,6	13,9	13,4
Вміст сирової клейковини, %	26,7	27,5	26,4
Сила борошна (W), о.а.	234	293	315
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	890	1000	1040
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	8
Морозостійкість за проморозування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		5,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	слн	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012049 Назва сорту: СОРПІАЛ Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191184

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутня або дуже слабка	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	обоє відсутні	1
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначалась	0
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,4	6,53	5,97
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,71	0,04	0,21
+,- до усередненої урожайності, %	-13,9	0,6	3,7
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	260	267	267
Висота рослини, см	60,2	68,5	71,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,8	42,7	40,1
Вміст білка, %	13,9	14,5	13,8
Вміст сирової клейковини, %	28,1	28,7	27,6
Сила борошна (W), о.а.	318	284	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1200	1030	990
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	2,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	слн	слн	цін

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012047 Назва сорту: СОФІ КС Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191182

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,16	6,33	6,04
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,95	-0,16	0,28
+/- до усередненої урожайності, %	-18,6	-2,5	4,9
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	258	268	268
Висота рослини, см	64,5	74,8	78
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,6	41,5	41,7
Вміст білка, %	13,6	13,6	13
Вміст сирової клейковини, %	27,5	27,2	25,8
Сила борошна (W), о.а.	260	276	260
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000	980	930
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за проморозування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		2,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012048 Назва сорту: СОФРУ Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191183

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0
24	Зернівка: забарвлення	біле	1
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,37	7,16	6,26
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,74	0,67	0,5
+,- до усередненої урожайності, %	-14,5	10,3	8,8
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	258	265	263
Висота рослини, см	62,1	70,9	74,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40	42,8	42,6
Вміст білка, %	13,8	13,3	13,3
Вміст сирової клейковини, %	27,3	26,8	26,6
Сила борошна (W), о.а.	307	288	249
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1100	1120	950
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	2,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цін	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16012044 Назва сорту: Топкапі Заявник (код): 1498 Власник сорту (код): 1498

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191179

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: забарвлення	біле або соломяно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,59	6,38	6,24
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,52	-0,11	0,48
+/- до усередненої урожайності, %	-10,2	-1,8	8,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	258	266	266
Висота рослини, см	79,9	92,9	97,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,1	44,7	43,6
Вміст білка, %	14	14,3	13,6
Вміст сирової клейковини, %	28	28,8	27,5
Сила борошна (W), о.а.	260	321	267
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1060	1130	970
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		4,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	слн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.



**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 17012004 Назва сорту:** Хліб Аріїв **Заявник (код):** 1998 **Власник сорту (код):** 1998

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200093**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабе	1
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,94	6,68	5,82
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,17	0,19	0,06
+,- до усередненої урожайності, %	-3,4	3	1
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	257	265	264
Висота рослини, см	72,3	83,6	88,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,6	44	41,4
Вміст білка, %	13,2	13,2	13,4
Вміст сирової клейковини, %	26,7	26,6	27,8
Сила борошна (W), о.а.	232	262	263
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910	900	980
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		5,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цін	цін

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17012026 Назва сорту: ШТРУ 080150с5 Заявник (код): 2071 Власник сорту (код): 2071

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200094

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	7
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,11	6,49	5,76
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,17	6,84	6,45
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,94	0,35	0,69
+/- до усередненої урожайності, %	-18,4	5,3	12
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,06	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	260	269	267
Висота рослини, см	76,4	86,6	91,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,1	41	39
Вміст білка, %	13,9	13,6	13,5
Вміст сирової клейковини, %	27,7	27,1	27,2
Сила борошна (W), о.а.	210	261	250
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970	900	910
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	9	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморозування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		4,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 17013007 Назва сорту:** Лікамеро **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200098**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	нешільний	3
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска. Плече за формою	пряме	3
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	біле	1
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	довгий	7
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,68	3,53
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,93	4,27	3,86
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,61	0,59	0,33
+,- до усередненої урожайності, %	26,2	16	9,2
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,19	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	90	90	90
Висота рослини, см	62,8	76,9	71,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	34,1	38,6	37,5
Вміст білка, %	13,9	14	13,9
Вміст сирової клейковини, %	27,6	28,1	27,9
Сила борошна (W), о.а.	294	313	324
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1110	1110	1000
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Напрямок використання	слн	слн	слн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 17013004 Назва сорту: ПС Петра Заявник (код): 2071 Власник сорту (код): 2071

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200097

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	нешільний	3
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: забарвлення	біле	1
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,68	3,53
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,3	3,93	3,56
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,02	0,25	0,03
+/- до усередненої урожайності, %	-0,9	6,8	0,7
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,19	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	89	90	92
Висота рослини, см	69,8	80,3	75,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	33,5	39	41,2
Вміст білка, %	14,4	14,8	14,2
Вміст сирової клейковини, %	28,8	30,2	29,2
Сила борошна (W), о.а.	264	284	301
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1020	1080	1010
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	9
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	7	9	9
Напрям використання	цїн	слн	слн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.  
**Заявка № 17013003 Назва сорту:** ШТРУ 093736с4 **Заявник (код):** 2071 **Власник сорту (код):** 2071  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.01.2020  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200096**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	середнє	5
19	Нижня колоскова луска. Плече за формою	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	коричневе	3
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	наявний	9
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,68	3,53
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,05	4,38	3,69
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,73	0,7	0,16
+,- до усередненої урожайності, %	31,5	18,9	4,6
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,19	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	89	90	91
Висота рослини, см	60,7	75,6	69,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	33,9	38,9	41,1
Вміст білка, %	13,5	14	13,4
Вміст сирової клейковини, %	27,5	28,1	26,4
Сила борошна (W), о.а.	303	324	301
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1000	1050	1020
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	8
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	9
Напрямок використання	цїн	слн	цїн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Пшениця спельта (озима) *Triticum spelta* L.

**Заявка № 16539001 Назва сорту:** Аттергауер Дінкель **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191190**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
9	Рослина: за висотою (стебло, колос)	висока	7
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	нешільний	3
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	короткі	3
16	Колос: забарвлення	червоне	4
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1
24	Зернівка: забарвлення	червоне	3
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Лише для сортів пшениці шарозерної. Колос (остистий): зазубленість остюків	ознака не визначається	0
28	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0
29	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: тенденція до вилягання	ознака не визначається	0
30	Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,98	5,4	4,75
Тривалість періоду вегетації, дів	259	267	272
Висота рослини, см	107	119,4	138,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	63,5	71,6	101
Вміст білка, %	16,7	14,5	14,2
Вміст клейковини, %	31,9	29,9	30,3
Показник альвеографа (W), о.а.	161,5	162,5	92
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	790	760	670
Стійкість до вилягання, бал	8	7	6
Стійкість до обсипання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	9
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Вид:** Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.

**Заявка № 16007001 Назва сорту:** Кораловий **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 29.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191191**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: габітус	прямий	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5
22	Остюки: забарвлення	біле	1
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	нещільний	3
28	Зернівка: форма	овальна	5
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	озимий	1
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: за довжиною	короткий	3
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,37	5,97	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,77	5,12	
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,4	-0,85	
+/- до усередненої урожайності, %	9,15	-14,24	
Довірчий інтервал, т/га	0,22	0,44	
Тривалість періоду вегетації, діб	267	254	
Висота рослини, см	72,7	73,7	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,7	45,5	
Вміст білка, %	12,1	12,5	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	8	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,0	5,0	
Блок	1	1	
Напрямок використання	х	х	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 16007003 Назва сорту: Людмила Заявник (код): 1123 Власник сорту (код): 1123

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.11.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191193

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	дуже сильний	9
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	дуже видовжена	7
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5
22	Остюки: забарвлення	біле	1
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	слабко забарвлене	2
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	помірний	5
28	Зернівка: форма	видовжена	7
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	довгий	7
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	озимий	1
32	Колос: забарвлення	інше	5
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: за довжиною	середній	5
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,37	5,97	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,96	5,86	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,59	-0,11	
+,- до усередненої урожайності, %	15,3	-1,84	
Довірчий інтервал, т/га	0,22	0,44	
Тривалість періоду вегетації, діб	268	259	
Висота рослини, см	78,4	83,1	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,7	43,9	
Вміст білка, %	12,2	12,8	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурі і ржі, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5,5	5,5	
Блок	1	1	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.



**Вид:** Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.

**Заявка № 17007003 Назва сорту:** МІП Лакомка **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191194**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутній або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5
22	Остюки: забарвлення	біле	1
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	помірний	5
28	Зернівка: форма	видовжена	7
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	озимий	1
32	Колос: забарвлення	білий або солом'яно-жовте	1
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: за довжиною	короткий	3
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,37	5,97	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,73	5,23	
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,36	0,74	
+/- до усередненої урожайності, %	8,24	-12,4	
Довірчий інтервал, т/га	0,22	0,44	
Тривалість періоду вегетації, діб	268	254	
Висота рослини, см	75,5	78,3	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	48,2	43,9	
Вміст білка, %	12,3	12,1	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	8	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5	5	
Блок	1	1	
Напрямок використання	х	х	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.

**Заявка № 16007002 Назва сорту:** Надійний **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 29.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191192**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листовій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	помірне	5	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	слабко забарвлене	2	
26	Колос: форма	циліндрична	2	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	озимий	1	
32	Колос: забарвлення	інше	5	світло-коричневе
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	сильне	7	
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,37	5,97	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,73	5,23	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,36	0,74	
+,- до усередненої урожайності, %	8,24	-12,4	
Довірчий інтервал, т/га	0,22	0,44	
Тривалість періоду вегетації, дів	268	254	
Висота рослини, см	75,5	78,3	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	48,2	43,9	
Вміст білка, %	12,3	12,1	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	8	8	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал	5	5	
Блок	1	1	
Напрямок використання	х	х	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

**Заявка № 17006002 Назва сорту:** ОДІССЕО **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191196**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	помірне	5
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9
11	Колос: восковий наліт	помірний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9
21	Соломина: вивопнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	помірне	5
22	Остюки: забарвлення	коричневе	3
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	слабке	3
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1
26	Колос: форма	пірамідальна	1
27	Колос: за щільністю	щільний	7
28	Зернівка: форма	видовжена	7
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
31	Тип розвитку	ярий	3
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: за довжиною	короткий	3
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,98	3,11	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,08	3,66	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,09	0,57	
+,- до усередненої урожайності, %	4,4	18,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,42	
Тривалість періоду вегетації, днів	87	87	
Висота рослини, см	55,8	62,2	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,5	42,5	
Вміст білка, %	14,1	14,4	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрямок використання	х	х	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 17006008 Назва сорту: Ремарка Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200099

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	помірне	5
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5
11	Колос: восковий наліт	помірний	5
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	середнє	5
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	слабке	3
22	Остюки: забарвлення	світло-коричневе	2
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	помірне	5
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1
26	Колос: форма	пірамідальна	1
27	Колос: за щільністю	щільний	7
28	Зернівка: форма	яйцеподібна	3
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	ярий	3
32	Колос: забарвлення	червоне	2
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: за довжиною	середній	5
35	Вушка: охоплення соломини	повне	2
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,98	3,11	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	1,93	3,16	
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,02	0,07	
+/- до усередненої урожайності, %	-1,2	2	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,42	
Тривалість періоду вегетації, діб	88	89	
Висота рослини, см	83,4	97,8	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,3	46,3	
Вміст білка, %	15	15,2	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурі ржі, бал	8	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 17006001 Назва сорту: ФУЕГО Заявник (код): 1959 Власник сорту (код): 1959

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191195

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	слабкий	3
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
11	Колос: восковий наліт	слабкий	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	помірне	5
22	Остюки: забарвлення	коричневе	3
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	щільний	7
28	Зернівка: форма	яйцеподібна	3
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
31	Тип розвитку	ярий	3
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: за довжиною	короткий	3
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
37	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0
38	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0
39	Лише для сортів пшениці полби звичайної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,98	3,11	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,12	3,88	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,13	0,79	
+,- до усередненої урожайності, %	6,4	25,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,24	0,42	
Тривалість періоду вегетації, днів	88	87	
Висота рослини, см	58,5	66,6	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	38,2	43,7	
Вміст білка, %	14,3	14,5	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрямок використання	х	х	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 16019017 Назва сорту:** ЛГ Тріумф **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200207**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	відсутня або дуже слабка	1
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	щільний	7
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	середні	5
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	сильне	7
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,32	6,85	5,23
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,66	6,4	6,48
+/- до усередненої урожайності, т/га	-1,66	-0,45	1,25
+/- до усередненої урожайності, %	-31,2	-6,6	24
Довірчий інтервал, т/га	0,15	0,24	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	253	262	253
Висота рослини, см	73,9	87,3	92
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,8	51,7	50
Вміст білка, %	13,5	12,5	12
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.**

**Вид:** Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 16019020 Назва сорту:** МІП Статус **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191351**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	відсутній або дуже малий	1
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	слабкий	3
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,32	6,85	5,23
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,66	5,98	5,73
+,- до усередненої урожайності, т/га	-1,66	-0,87	0,5
+,- до усередненої урожайності, %	-31,3	-12,8	9,5
Довірчий інтервал, т/га	0,15	0,24	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	252	262	253
Висота рослини, см	76,4	94,5	97,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,8	45,8	44
Вміст білка, %	12,1	12,5	12,1
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти гелмінтоспориозу, бал	9	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.**

**Вид:** Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17019001 Назва сорту:** СИ ГАЛІЛЕО **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191352**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	короткі	3
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,32	6,85	5,23
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,39	6,52	6,59
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,93	-0,33	1,36
+,- до усередненої урожайності, %	-17,5	-4,9	26
Довірчий інтервал, т/га	0,15	0,24	0,17
Тривалість періоду вегетації, діб	251	262	249
Висота рослини, см	76,2	90	95,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	48,3	53,1	50,4
Вміст білка, %	12,2	11,9	12
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.**



**Вид:** Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17919001 Назва сорту:** PE29 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191353**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабке	3
5	Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	довша	3
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність півки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	озимий	1
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17020012 Назва сорту:** Елінор **Заявник (код):** 1965 **Власник сорту (код):** 1965

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 13.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200210**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	великий	7
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабе	1
26	Зернівка: опушення вентральної борздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,7	4,81	3,51
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,01	0,58	-0,13
+,- до усередненої урожайності, %	-0,4	13,7	-3,6
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, днів	84	84	83
Висота рослини, см	53	62,9	65,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,8	51,3	46,6
Вміст білка, %	12,2	12,8	11,9
Вирівняність зерна, %	92,5	93,7	95
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17020017 Назва сорту:** КВС Кріссі **Заявник (код):** 824 **Власник сорту (код):** 824

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191358**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшквата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,6	4,81	3,83
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,11	0,58	0,19
+,- до усередненої урожайності, %	-3,9	13,8	5,1
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, днів	83	84	81
Висота рослини, см	50	61,7	62,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,9	54,1	46,7
Вміст білка, %	11,5	12,5	11,7
Вирівняність зерна, %	91,2	93,5	96,1
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	пв	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17020010 Назва сорту:** Кларінетте **Заявник (код):** 1797 **Власник сорту (код):** 1797

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200209**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	велика	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабе	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,88	4,93	3,84
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,17	0,7	0,2
+/- до усередненої урожайності, %	6,2	16,6	5,5
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	84	84	81
Висота рослини, см	54,8	61,2	64,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,1	50,7	45,5
Вміст білка, %	12,8	12,9	12,1
Вирівняність зерна, %	89,3	91,1	94,7
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти буротірки, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17020008 Назва сорту:** Маріан **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200208**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,48	4,28	3,89
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,23	0,05	0,25
+/- до усередненої урожайності, %	-8,4	1,2	6,8
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	84	84	81
Висота рослини, см	59,9	68,6	72,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,4	49,5	47,9
Вміст білка, %	13,3	13,3	13,2
Вирівняність зерна, %	93,4	93,6	93,8
Стійкість до вилягання, бал	7	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурого іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17020015 Назва сорту:** МІП Девіз **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191356**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,49	4,62	3,73
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,22	0,39	0,09
+/- до усередненої урожайності, %	-8,2	9,2	2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	82	84	81
Висота рослини, см	49,1	60,3	64,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,7	50,5	46
Вміст білка, %	12,3	13,2	12,8
Вирівняність зерна, %	92,6	93,6	93,2
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти буроті ржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17020014 Назва сорту:** МІП Захисник **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191355**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	велика	7
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,63	4,7	3,77
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,08	0,47	0,13
+/- до усередненої урожайності, %	-2,9	11,1	3,7
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	82	84	83
Висота рослини, см	54	67,1	65,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,1	51,7	47,9
Вміст білка, %	13,6	13,6	13,5
Вирівняність зерна, %	93,8	93,4	94
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурого іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гелмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17020013 Назва сорту:** МІП Титул **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191354**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довгі	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,42	4,38	3,71
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,29	0,15	0,07
+/- до усередненої урожайності, %	-10,8	3,5	2,1
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	84	84	83
Висота рослини, см	55,3	65,4	65,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,3	47,3	46,3
Вміст білка, %	13,1	13,9	13,1
Вирівняність зерна, %	92,8	94	95
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти буроті ржі, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.



**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 17020016 Назва сорту:** МІП Шарм **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 1589

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191357**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,55	4,83	3,9
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,16	0,6	0,26
+/- до усередненої урожайності, %	-5,9	14,3	7,1
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	83	83	81
Висота рослини, см	50,7	61,7	65,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,9	49,8	46,6
Вміст білка, %	12,5	13,1	13,2
Вирівняність зерна, %	92,3	93,7	95,4
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 17020022 Назва сорту: СБ Комфорт Заявник (код): 1747 Власник сорту (код): 1747

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200211

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	пірамідальна	3
15	Колос: за щільністю	нешільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	середні	5
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	довгий	7
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	еліптична	3
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,71	4,23	3,64
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,7	4,59	3,8
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,01	0,36	0,16
+/- до усередненої урожайності, %	-0,4	8,5	4,5
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,09	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	83	83	80
Висота рослини, см	56,4	63,9	67,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,6	49,7	46,8
Вміст білка, %	11,9	12,2	12,2
Вирівняність зерна, %	93,4	93,6	92,8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти буротірки, бал	9	9	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

*Горох посівний (зерновий)  
Нут звичайний  
Соя культурна*



Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 17023003 Назва сорту: Люмп Заявник (код): 2076 Власник сорту (код): 880

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191010

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	середнє	5
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	велика	7
6	Листки: забарвлення	блакитно-зелене	3
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: листочки	відсутні	1
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0
15	Прилисток: за довжиною	середній	5
16	Прилисток: за шириною	середній	5
17	Прилисток: розмір	малий	3
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	відсутня або дуже коротка	1
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	короткий	3
24	Рослина: час цвітіння	середній	5
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1
28	Квітка: парус за шириною	середній	5
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	округла	3
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	середня	5
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1
37	Біб: за довжиною	довгий	7
38	Біб: за шириною	середній	5
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	ознака не визначається	0
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1
43	Біб: забарвлення	зелене	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0
46	Біб: кількість насінневих зачатків	середня	5
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
48	Насіннина: форма	еліптична	1
49	Насіннина: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Лише сорти з циліндричною формою насіннини і простим типом крохмальних зерен. Насіннина: зморшкватість сім'ядолей	ознака не визначається	0
51	Лише сорти з насіннинами із складним типом крохмальних зерен. Насіннина: інтенсивність зморшкватості сім'ядолей	ознака не визначається	0
52	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: мармуровість насінневої шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: фіолетові чи рожеві плями на насінневій шкірці	ознака не визначається	0
55	Насіннина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінневої шкірки	1
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: забарвлення насінневої шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса	середня	5
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	відсутня	1
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	відсутня	1
62	Тип розвитку	ярий	1

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	-	27,4	27,3
Довірчий інтервал, ц/га (±)	-	2,3	2,2
Урожайність, ц/га	-	32,9	27,9
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-	5,5	0,6
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-	20	2
Тривалість періоду вегетації, діб	-	83	82
Висота рослини, см	-	68,5	73,6
Маса 1000 насінин, г	-	225,7	220,1
Стійкість до вилягання, бал	-	8	7
Стійкість до обсипання, бал	-	8	8
Стійкість до посухи, бал	-	7	8
Придатність до механізованого збирання, бал	-	8	7
Висота прикріплення нижнього бобу, см	-	43,9	49,9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	-	8	8
Стійкість проти корневих гнилей, бал	-	9	8
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерна), бал	-	8	9
Стійкість проти антракнозу, бал	-	8	8
Вміст білка, %	-	23,1	22,8

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

**Вид:** Нут звичайний *Cicer arietinum* L.

**Заявка № 18028011 Назва сорту:** Степовий велет **Заявник (код):** 2543 **Власник сорту (код):** 2543

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191141**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (після цвітіння)	прямий	1
2	Рослина: галуження	сильне	7
3	Рослина: за висотою (за повного розвитку бобів)	середня	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листочок: розмір	середній	5
7	Квітка: забарвлення	біле	1
8	Біб: плодоніжка за довжиною	середня	5
9	Біб: розмір	середній	5
10	Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5
12	Біб: кількість насінин	одна або дві	2
13	Насінина: забарвлення (через місяць після збирання)	бежеве	2
14	Насінина: інтенсивність забарвлення (як для озн. 13)	помірна	5
15	Насіння: маса	велика	7
16	Насінина: форма	від кулястої до кутастої	2
17	Насінина: ребристість	помірна	5
18	Час цвітіння (80% рослин із щонайменше однією квіткою)	середній	5
19	Час досягання насіння	ранній	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 1,8. Тривалість періоду вегетації, днів – 112. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 28. Вміст білка, % – 22,4. Висота рослин, см – 69. Маса 1000 зерен, г – 314. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз – 9; кореневі гнилі – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): зернівка – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045051 Назва сорту:** Албенга **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191339**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,89	3,26	3,44
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,21	0,97	1,56
+,- до усередненої урожайності, %	12,7	42,2	82,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	110	110	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	144,8	217,5	198,8
Висота рослини, см	66	74,4	95,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,6	10,5	14,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	37,1	41,1	38,2
Вміст олії, %	23,6	20,8	21,2
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045053 Назва сорту: Алтона Заявник (код): 1564 Власник сорту (код): 1564

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191341

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,11	3,29	3,67
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,43	1	1,79
+/- до усередненої урожайності, %	25,4	43,7	95,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	109	111	116
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	142	185,7	201,2
Висота рослини, см	67,8	75,9	98,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,0	12,4	15,0
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	34,3	39,1	36,6
Вміст олії, %	25,1	22,2	22,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	нбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.



**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045029 Назва сорту:** Астор **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200191**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	великий	7
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,73	3,03	2,9
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,05	0,74	1,02
+,- до усередненої урожайності, %	2,9	32,2	54
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	106	111	112
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	160,2	226,4	213,7
Висота рослини, см	55,8	67,2	80,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,5	11,7	12,1
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	37,5	40,6	36,5
Вміст олії, %	24,2	22,3	24,1
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045052 Назва сорту:** Ауреліна **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191340**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,93	3,11	3,29
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,25	0,82	1,41
+/- до усередненої урожайності, %	15,1	35,7	75,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	106	107	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	147,3	203,1	194,5
Висота рослини, см	62,8	74,8	94
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9	12,4	15,5
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	39,8	41,9	40,2
Вміст олії, %	23,4	21,4	21,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045039 Назва сорту: Балатон Заявник (код): 2484 Власник сорту (код): 2484

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.11.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191334

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	ланцетна	1
9	Листок: розмір бічного листочка	малий	3
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	18,6	22,4	19,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,1	1,0	0,7
Урожайність, ц/га	14,4	27,4	21,8
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-4,2	5,0	2,7
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-22,4	22,5	14,3
Тривалість періоду вегетації, діб	103	101	119
Маса 1000 насінин, г	121,6	152,9	149,7
Висота рослини, см	63,9	78,6	98,0
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,8	11,6	15,8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	39,6	42,0	39,8
Вміст олії, %	24,0	22,7	23,2
Якість	вл	вл	вл
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045046 Назва сорту:** Беттіна **Заявник (код):** 2434 **Власник сорту (код):** 2434

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191338**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,22	3,21	3,56
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,54	0,92	1,68
+,- до усередненої урожайності, %	32,3	40,4	89,3
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	107	109	113
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	155,3	200,6	191,2
Висота рослини, см	64,5	70	90,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,8	9,5	15,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,9	38	35,9
Вміст олії, %	23,8	22,5	23,1
Блок (Група стиглості)	б	б	б
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045011 Назва сорту:** Браун **Заявник (код):** 2484 **Власник сорту (код):** 2484

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 07.11.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191336**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	куляста	1
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінневі оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	середній	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	16,7	22,9	21,0
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,5	0,5	0,5
Урожайність, ц/га	15,6	29,8	22,7
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-1,1	6,9	1,7
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-6,3	30,0	8,1
Тривалість періоду вегетації, діб	108	122	127
Маса 1000 насінин, г	135,1	160,3	170,4
Висота рослини, см	69,9	92,8	93,0
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,3	16,1	19,1
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	41,0	37,4	40,1
Вміст олії, %	23,8	23,4	22,6
Якість	вл	вл	вл
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045040 Назва сорту: Віолетта Заявник (код): 2484 Власник сорту (код): 2484

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.11.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191335

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	18,6	22,4	19,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,1	1,0	0,7
Урожайність, ц/га	14,2	25,9	19,5
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-4,4	3,5	0,4
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-23,5	15,6	2,1
Тривалість періоду вегетації, днів	107	102	121
Маса 1000 насінин, г	139,2	162,9	156,7
Висота рослини, см	60,1	76,2	85,5
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,9	10,1	15,8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	38,8	40,5	37,1
Вміст олії, %	24,5	23,0	24,2
Якість	вл	вл	вл
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045049 Назва сорту:** ЕС ГОВЕРНОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200198**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,87	3,24	2,86
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,19	0,95	0,98
+,- до усередненої урожайності, %	11,4	41,3	51,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	104	104	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	144,2	196,6	187,6
Висота рослини, см	60	60,5	80,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,4	10,4	13,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	36,8	39,9	35,7
Вміст олії, %	24,2	22	23,8
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045050 Назва сорту: ЕС ДИРЕКТОР Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200199

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,57	3,34	3,06
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,11	1,05	1,18
+/- до усередненої урожайності, %	-6,4	45,7	63
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	105	105	116
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	139,3	186,5	178,7
Висота рослини, см	59,9	71,1	95,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,5	12,1	14,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	9
Вміст білка, %	37,2	40,6	36,3
Вміст олії, %	23,5	21	22,5
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.



**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045030 Назва сорту:** Нептун **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200192**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	великий	7
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінневі оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,82	3,28	2,98
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,23	0,96	0,9
+,- до усередненої урожайності, %	14,5	41,5	43,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	118	114	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	151,8	238	215,1
Висота рослини, см	71,8	71,5	89,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,4	12,1	12,9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	35,4	39,9	35,1
Вміст олії, %	24,3	22	23,6
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045038 Назва сорту: Ольвія Заявник (код): 2484 Власник сорту (код): 2484

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.11.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191333

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	куляста	1
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	середній	5

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,1	22,4	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,9	0,9	
Урожайність, ц/га	14,8	29,7	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-2,3	7,3	
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-13,3	32,4	
Тривалість періоду вегетації, днів	131	131	
Маса 1000 насінин, г	117,0	159,8	
Висота рослини, см	75,3	85,8	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,2	12,3	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	38,7	38,8	
Вміст олії, %	22,1	20,6	
Якість	вл	сл	
Напрямок використання	зерновий	зерновий	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045012 Назва сорту:** Регіна **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191337**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	18,6	22,4	19,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,1	1,0	0,7
Урожайність, ц/га	15,5	33,4	26,2
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-3,1	11,0	7,1
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-16,8	49,0	37,3
Тривалість періоду вегетації, діб	101	110	115
Маса 1000 насінин, г	130,9	199,2	187,5
Висота рослини, см	56,3	66,5	73,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,6	10,8	12,8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	39,5	41,2	40,6
Вміст олії, %	23,3	21,8	22,6
Якість	вл	сл	вл
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill  
**Заявка № 17045033 Назва сорту:** CBX15T1C1 **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200194**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	великий	7
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	середній	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,86	3,44	3,43
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,27	1,12	1,35
+,- до усередненої урожайності, %	17,1	48,2	65,1
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	119	117	128
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	143,6	186,9	189,3
Висота рослини, см	73,4	77,8	88,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9	11,3	13,1
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	36,3	38,1	33,9
Вміст олії, %	23,9	22,3	24,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	нбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045039 Назва сорту:** CBX16T00C2 **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200197**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,75	3,25	2,89
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,07	0,96	1,01
+,- до усередненої урожайності, %	4,4	41,9	53,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	103	104	109
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	148,5	188,2	183,6
Висота рослини, см	62,1	70,2	88
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,9	11,7	12,6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	8	9
Вміст білка, %	36,6	41	36,7
Вміст олії, %	24,4	21,4	23,4
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045036 Назва сорту: CBX17T00C15 Заявник (код): 2061 Власник сорту (код): 2061

Дата пріоритету: 21.11.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200195

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	великий	7
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,72	3,18	2,55
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,04	0,89	0,67
+,- до усередненої урожайності, %	2,3	39,1	35,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, дб	102	105	110
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	153,8	205,1	203,3
Висота рослини, см	59,5	66	76,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8	9,2	11,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	38	42,1	38,2
Вміст олії, %	23,4	20,8	22,7
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045037 Назва сорту:** Сіпресс **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200196**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
13	Насінина: розмір	великий	7
14	Насінина: форма	куляста	1
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінневі оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,9	3,46	3,25
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,31	1,14	1,17
+,- до усередненої урожайності, %	19,5	48,9	56,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, днів	116	117	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	149,1	192,9	175,5
Висота рослини, см	65,8	78,7	94,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,4	14,8	13,1
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	37,9	40,6	33,9
Вміст олії, %	23,3	21	23,5
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	нбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045058 Назва сорту: СІРЕЛІЯ Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191342

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час достигання	ранній	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,68	2,29	1,88
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,61	3,1	2,94
+/- до усередненої урожайності, т/га	-0,07	0,81	1,06
+/- до усередненої урожайності, %	-4,3	35,2	56,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,12	0,08
Тривалість періоду вегетації, дів	107	106	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	144,4	206,4	183,9
Висота рослини, см	54,4	71,6	85,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,3	10,8	12,4
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	36,6	39	34,7
Вміст олії, %	24,3	22,7	24,3
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	нбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.



**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

**Заявка № 17045032 Назва сорту:** Тала **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200193**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	2,32	2,08
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,63	3,04	2,84
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,04	0,72	0,76
+,- до усередненої урожайності, %	2,6	30,9	36,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	123	117	132
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	144	206,4	201
Висота рослини, см	74,5	83,7	95
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,3	13,4	17
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	37,7	39,3	34,2
Вміст олії, %	22,7	22	23,8
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	нбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КРУП'ЯНІ

*Рис посівний*  
*Сорго звичайне (двокольорове)*



Вид: Рис посівний *Oryza sativa* L.

Заявка № 17017001 Назва сорту: Морячок Заявник (код): 1715 Власник сорту (код): 1715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200100

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеопиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Основний листок: забарвлення піхви	зелене	1
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушення поверхні пластинки	слабке	3
9	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
10	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
11	Листок: форма язичка	подвійна	3
12	Листок: забарвлення язичка	безбарвний	1
13	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
14	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
15	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпряме	3
16	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	напівпряме	3
17	Рослина: габітус	прямий	1
18	Тільки для сланких сортів. Стебло: здатність утворювати коліно	ознака не визначається	0
19	Час появи волоті (50% рослин з волотями)	середній	5
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1
21	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
22	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження)	слабке	3
23	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
24	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
25	Стебло: за товщиною	середнє	5
26	Лише несланкі сорти. Стебло: за довжиною (включно волоті)	середнє	5
27	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
28	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначається	0
29	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
30	Волоть: головна вісь за довжиною	середня	5
31	Волоть: кількість на рослині	середня	5
32	Волоть: остюки	наявні	9
33	Волоть: забарвлення остюків (раннє обстеження)	світло-золотисте	1
34	Волоть: розташування остюків	за всією довжиною	5
35	Волоть: найдовші остюки за довжиною	дуже короткі	1
36	Колосок: опушення нижньої квіткової луски	слабке	3
37	Колосок: забарвлення верхівки нижньої квіткової луски	біле	1
38	Волоть: забарвлення остюків (пізнє обстеження)	світло-золотисте	1
39	Волоть: положення відносно стебла	пряме	1
40	Волоть: вторинне гілкування	відсутнє	1
41	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначається	0
42	Волоть: положення гілок	напівпряме	3
43	Волоть: повнота виявлення (розгортання)	сильна	7
44	Час достигання	середній	5
45	Листок: час старіння (пожовтіння)	середній	5
46	Нижня квіткова луска: забарвлення	світло-золотисте	1
47	Нижня колоскова луска: орнаментация	відсутня	1
48	Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
49	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження)	слабке	3
50	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
51	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3
52	Колоскова луска: забарвлення	солон'яне	1
53	Зернівка: маса 1000 шт.	середня	5
54	Зернівка: за довжиною	середня	5
55	Зернівка: за шириною	середня	5
56	Нижня квіткова луска: реакція на фенол	ознака не визначалася	0
57	Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)	ознака не визначалася	0
58	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
59	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
60	Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3
61	Обрушена зернівка: забарвлення	червоне	6
62	Ендосперм: тип	ознака не визначалася	0
63	Ендосперм: за вмістом амілози	ознака не визначалася	0
64	Лужна дигестія	ознака не визначалася	0
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га – 9. Маса 1000 зерен, г – 28,4. Вегетаційний період, діб – 122. Плівковість, % – 20,8. Склоподібність, % – 100. Вихід крупи, % – 65,8; цілого ядра, % – 93,8. Група стиглості – 3. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): пірикуляріоз – 8; фузаріоз, аскохітоз, гельмінтоспоріоз – 9.

## Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

**Вид:** Рис посівний *Oryza sativa* L.

**Заявка № 17017002 Назва сорту:** Фагот **Заявник (код):** 1715 **Власник сорту (код):** 1715

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191199**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Основний листок: забарвлення піхви	зелене	1
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
4	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
5	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
6	Листкова піхва: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
7	Листкова піхва: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
8	Листок: опушення поверхні пластинки	слабке	3
9	Листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1
10	Листок: антоціанове забарвлення шийки	відсутнє	1
11	Листок: форма язичка	подвійна	3
12	Листок: забарвлення язичка	безбарвний	1
13	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
14	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
15	Прапорцевий листок: положення пластинки (раннє обстеження)	напівпряме	3
16	Прапорцевий листок: положення пластинки (пізнє обстеження)	напівпряме	3
17	Рослина: габітус	прямий	1
18	Тільки для сланких сортів. Стебло: здатність утворювати коліно	ознака не визначається	0
19	Час появи волоті (50% рослин з волотями)	ранній	3
20	Чоловіча стерильність	відсутня	1
21	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення кіля (раннє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
22	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (раннє обстеження)	слабке	3
23	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (раннє обстеження)	сильне	7
24	Колосок: забарвлення приймочки	біле	1
25	Стебло: за товщиною	середнє	5
26	Лише несланкі сорти. Стебло: за довжиною (включно волоть)	середнє	5
27	Стебло: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
28	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначається	0
29	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє	1
30	Волоть: головна вісь за довжиною	середня	5
31	Волоть: кількість на рослині	середня	5
32	Волоть: остюки	відсутні	1
33	Волоть: забарвлення остюків (раннє обстеження)	ознака не визначається	0
34	Волоть: розташування остюків	ознака не визначається	0
35	Волоть: найдовші остюки за довжиною	ознака не визначається	0
36	Колосок: опушення нижньої квіткової луски	слабке	3
37	Колосок: забарвлення верхівки нижньої квіткової луски	пурпурове	5
38	Волоть: забарвлення остюків (пізнє обстеження)	ознака не визначається	0
39	Волоть: положення відносно стебла	напівпряме	2
40	Волоть: вторинне гілкування	відсутнє	1
41	Волоть: тип вторинного гілкування	ознака не визначається	0
42	Волоть: положення гілок	напівпряме	3
43	Волоть: повнота виявлення (розгортання)	сильна	7
44	Час досягання	ранній	3
45	Листок: час старіння (пожовтіння)	середній	5
46	Нижня квіткова луска: забарвлення	світло-золотисте	1
47	Нижня колоскова луска: орнаментція	відсутня	1
48	Нижня колоскова луска: антоціанове забарвлення кіля (пізнє обстеження)	відсутнє або дуже слабке	1
49	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення зони під верхівкою (пізнє обстеження)	слабке	3
50	Нижня квіткова луска: антоціанове забарвлення верхівки (пізнє обстеження)	сильне	7
51	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3
52	Колоскова луска: забарвлення	солом'яне	1
53	Зернівка: маса 1000 шт.	велика	7
54	Зернівка: за довжиною	середня	5
55	Зернівка: за шириною	середня	5
56	Нижня квіткова луска: реакція на фенол	ознака не визначалася	0
57	Нижня квіткова луска: інтенсивність фенольної реакції (забарвлення)	ознака не визначалася	0
58	Обрушена зернівка: за довжиною	середня	5
59	Обрушена зернівка: за шириною	середня	5
60	Обрушена зернівка: форма (вигляд збоку)	напівверетеноподібна	3
61	Обрушена зернівка: забарвлення	біле	1
62	Ендосперм: тип	ознака не визначалася	0
63	Ендосперм: за вмістом амлози	ознака не визначалася	0
64	Лужна дигестія	ознака не визначалася	0
65	Обрушена зернівка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га – 9,16. Маса 1000 зерен, г – 31,6. Вегетаційний період, днів – 112. Плівковість, % – 20,8. Склоподібність, % – 100. Вихід крупи, % – 67,4; цілого ядра, % – 92,2. Група стиглості – 3. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): пірикуляріоз – 8; фузаріоз, аскохітоз – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 16018003 Назва сорту: 341X120 Заявник (код): 1985 Власник сорту (код): 1985**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200187**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	темне	7
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	помірне	5
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	дуже коротка	1
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	довга	7
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	тьмяно-жовте	1
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	блідо-коричневе	4
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягання	біле	1
33	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	відсутня або дуже мала	1
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блідо-жовте	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	51,7	68,7	-
Тривалість періоду вегетації, діб	110	125	-
Маса 1000 зерен, г	27,1	27,7	-
Висота рослин, см	105	120	-
Стійкість до вилягання, бал	9	9	-
Стійкість до осипання, бал	9	8	-
Стійкість до посухи, бал	9	9	-
Стійкість до сажки пухирчастої, бал	9	9	-
Стійкість до гельмінтоспору, бал	9	9	-
Стійкість до кукурудзяного метелика, бал	9	9	-
Вміст крохмалю, %	78,2	80,3	-
Вміст сирого протеїну, %	10,4	8,8	-
Напрямок використання: зерновий			
Блок: середньоранній			

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 17018012 Назва сорту: 419X124 Заявник (код): 1985 Власник сорту (код): 1985**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200190**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптила	сильне	7
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	помірне	5
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	слабке	3
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	дуже низька	1
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	світле	3
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	сильне	7
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	ознака не визначалась	0
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	дуже коротка	1
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжево-червоне	4
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузький	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	нещільна	3
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	блідо-жовте	2
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	довга	7
32	Зернівка: забарвлення після досягання	оранжеве	5
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	еліптична	5
35	Зернівка: форма в профіль	вузькоеліптична	3
36	Зернівка: розмір зародка	великий	7
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	відсутня або дуже мала	1
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	оранжеве	4

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,03	4,89	
Довірчий інтервал, т/га	0,37	0,61	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,18	6,46	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,15	1,57	
+,- до усередненої урожайності, %	3,1	32,2	
Тривалість періоду вегетації, днів	102	101	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	29	27,4	
Висота рослини, см	99	103,7	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Вирівняність за висотою, бал	6	4	
Стійкість проти сажки, бал	8	9	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	
Стійкість проти попелиці, бал	8	8	
Вміст білка, %	10,4	9,2	
Вміст крохмалю, %	75,7	76,7	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання		зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 16018005 Назва сорту:** АРЕЛЬДО **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200188**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптіля	відсутнє або дуже слабе	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабе	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабе	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабе	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	темне	7
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	помірне	5
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабе	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелене	1
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабе	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабе	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабе	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабе	3
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	довга	7
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	помірна	5
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузький	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	довгі	7
27	Волоть: щільність (за досягання)	щільна	7
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	блідо-коричневе	4
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягання	біле	1
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	відсутня або дуже мала	1
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 крохмаліста	7
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блідо-жовте	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,37	5,7	
Тривалість періоду вегетації, діб	111	120	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	29,3	26,2	
Висота рослини, см	96,6	109,2	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Вирівняність за висотою, бал	6	6	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспороїзу, бал	8	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти попелиці, бал	8	8	
Вміст білка, %	10,8	9,6	
Вміст крохмалю, %	76	76	
Блок (Група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	зерн		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 17018013 Назва сорту:** Бенггал **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191331**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	ознака не визначалась	0
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	ознака не визначалась	0
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	сильне	7
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	вузкий	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	ширша у верхівковій частині	2
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	темно-червоне	6
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягання	оранжево-червоне	6
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	вузкоеліптична	3
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	відсутня або дуже мала	1
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	блідо-жовте	2

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,01	5,12	
Довірчий інтервал, т/га	0,22	0,62	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,47	6,01	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,9	
+,- до усередненої урожайності, %	11,5	17,5	
Тривалість періоду вегетації, діб	108	109	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	35,9	31,3	
Висота рослини, см	107,3	114,3	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Вирівняність за висотою, бал	6	5	
Стійкість проти сажки, бал	8	9	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти попелиці, бал	8	8	
Вміст білка, %	10,9	9,2	
Вміст крохмалю, %	74,4	77,4	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання		зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.



**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 16018006 Назва сорту:** ЕУГ542Ф **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200189**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабе	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабе	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабе	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабе	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	висока	7
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	світле	3
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	сильне	7
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабе	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабе	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабе	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	помірне	5
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	коротка	3
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжево-червоне	4
21	Рослина: за висотою (за досягання)	середня	5
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	довгий	7
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	червонувато-коричневе	5
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягання	біле	1
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	відсутня або дуже мала	1
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,01	5,12	
Довірчий інтервал, т/га	0,22	0,62	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,84	6,89	
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,83	1,78	
+/- до усередненої урожайності, %	20,8	34,7	
Тривалість періоду вегетації, днів	111	120	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	27,7	19,3	
Висота рослини, см	130,5	168,6	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Вирівняність за висотою, бал	6	7	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти попелиці, бал	8	7	
Вміст білка, %	11,2	9,6	
Вміст крохмалю, %	74,8	76	
Блок (Група стиглості)			ср
Напрямок використання			зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 16018011 Назва сорту: КВС ФОБОС Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191330

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптіля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабке	3
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	помірне	5
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	сильне	7
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	ознака не визначалась	0
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелено-жовте	4
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	довга	7
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною (як для 12)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	нещільна	3
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	тьмяно-жовте	1
21	Рослина: за висотою (за досягання)	низька	3
22	Стебло: діаметр (верхня третина рослини за досягання)	малий	3
23	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	короткий	3
24	Листок: за шириною пластинки третього листка від верхівки (як для 21)	середній	5
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 21)	середня	5
26	Волоть: гілочки за довжиною (у середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за досягання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за досягання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	середня	5
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	біло-жовте	2
31	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після досягання	біле	1
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	еліптична	5
35	Зернівка: форма в профіль	вузькоеліптична	3
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	відсутня або дуже мала	1
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 3/4 склоподібна	3
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біло-жовте	2

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	45,5	56,0	-
Тривалість періоду вегетації, дів	118	136	-
Маса 1000 зерен, г	26,4	24,3	-
Висота рослин, см	105	136	-
Стійкість до вилягання, бал	9	9	-
Стійкість до осипання, бал	8	8	-
Стійкість до посухи, бал	9	9	-
Стійкість до сажки пухирчастої, бал	9	9	-
Стійкість до гельмінтоспориозу, бал	9	9	-
Стійкість до кукурудзяного метелика, бал	9	9	-
Вміст крохмалю, %	75,0	77,4	-
Вміст сирого протеїну, %	10,9	9,2	-
Напрямок використання: зерновий			
Блок: середньостиглий			

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

*Коноплі посівні*

*Льон низький (олійний, кудряш)*

*Ріпак (озимий)*

*Ріпак (озимий) – батьківський компонент*

*Ріпак (ярий)*

*Соняшник однорічний*

*Соняшник однорічний – батьківський компонент*



**Вид:** Конопля посівні *Cannabis sativa* L.

**Заявка № 18080002 Назва сорту:** Мрія **Заявник (код):** 2435 2510 **Власник сорту (код):** 2435 2510

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191038**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядоля: форма	середньообернено- яйцеподібна	2
2	Сім'ядоля: забарвлення	світло-зелене	2
3	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
4	Рослина: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабе	1
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
6	Листок: черешок за довжиною	середній	2
7	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє або дуже слабе	1
8	Листок: кількість листочків	середня	2
9	Центральна листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
10	Центральна листкова пластинка: за шириною	вузька	3
11	Час цвітіння чоловічих суцвіть	ранній	3
12	Суцвіття: антоціанове забарвлення чоловічих суцвіть	відсутнє або дуже слабе	1
13	Суцвіття: вміст ТГК	середній	3
14	Рослина: співвідношення гермафродитних рослин	велике	5
15	Рослина: співвідношення жіночих рослин	ознака не визначається	0
16	Рослина: співвідношення чоловічих рослин	ознака не визначається	0
17	Рослина: за природною висотою	середня	5
18	Головне стебло: забарвлення	помірно зелене	2
19	Головне стебло: міжвузля за довжиною	середні	5
20	Головне стебло: за товщиною	середнє	2
21	Головне стебло: боріздки за глибиною	середні	2
22	Головне стебло: серцевина в поперечному перерізі	середня	2
23	Насіння: маса 1000 шт.	середня	3
24	Насіннина: забарвлення шкірки	світло-сіре	1
25	Насіннина: мармуровість	слабка	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Тривалість періоду вегетації до технічної стиглості, днів – 90. Висота рослин, см – 260,0. Технічна довжина стебел, см – 230,0. Урожайність стебел, т/га – 7,0. Урожайність волокна, т/га – 1,9. Вміст ТГК, % – 0,05. Стабільність ознаки однодомності (вміст рослин плосконі), % – 1. Вміст волокна, % – 28. Стійкість проти фузаріозу, бал – 6. Стійкість проти конопляної блішки, бал – 6; стеблового метелика, бал – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Льон низький (олійний, кудряш) *Linum humile* Mill.

**Заявка № 18035001 Назва сорту:** Дунай **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200081**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою, враховуючи гілочки (під час цвітіння)	середня	5
2	Стебло: за довжиною, не враховуючи коротких гілочок (під час повного розвитку)	середнє	5
3	Квітка: розмір віночка (на початку цвітіння)	малий	3
4	Чашолисток: плямистість (у фазі пуп'янка)	відсутня або дуже слабка	1
5	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка (перед розкриттям квітки)	фіолетове	5
6	Квітка: забарвлення віночка (за повного цвітіння)	блідо-блакитне	2
7	Пелюстка: поздовжній згин	наявний	9
8	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки (одразу після розкриття квітки)	блакитне	2
9	Пиляк: забарвлення (як для 8)	голубувате	4
10	Стовпчики маточки: забарвлення основи (як для 8)	блакитне	3
11	Коробочка: розмір	середній	5
12	Коробочка: в'ячистість несправжніх перетинок	наявна	9
13	Насіння: маса 1000 шт.	дуже велика	9
14	Насінина: забарвлення	світло-коричнєве	3
15	Час початку цвітіння (перша квітка розкрилась на 10% рослин)	середній	5
16	Квітка: за формою	відкрито-роздільна	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 8–12%), т/га – 2,1. Маса 1000 насінин, г – 5. Вміст олії в насінні, % – 39. Вміст в олії: ліноленої кислоти, % – 55; лінолевої кислоти, % – 11; олеїнової кислоти, % – 19. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9; до посухи, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (вілт) (*Verticillium dahliae* Kleb.) – 9; фузаріозне в'янення (*Fusarium lini* Bolley.) – 9; іржа (*Melampsora lini* (Ehrenb.) Lev.) – 9; пасмо (*Phlyctaena linicola* Speg.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): льонова блішка (*Aphthona euphorbiae* Schrnk.) – 9; льоновий трипс (*Thrips lini* Ladurean.) – 9; льонова плодожерка (*Cochylis epilina* Duponchel) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040013 Назва сорту: Абсолют Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191219

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плдоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плдоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,38	3,7	2,87
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,41	0,38	0,4
+,- до усередненої урожайності, %	20,8	11,4	16,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	282	312	299
Висота рослини, см	135,3	127,2	127,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	5,8	5,6
Вміст білка, %	20,6	19,3	17,9
Вміст олії, %	46	46,1	47,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкостролатів, %	0,8	0,5	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсипання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16040019 Назва сорту:** АВАЛ **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191205**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2	3,68	2,71
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,03	0,36	0,24
+,- до усередненої урожайності, %	1,5	10,8	9,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	314	299
Висота рослин, см	135,6	128,9	124,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,9	4,8
Вміст білка, %	20,7	18,7	18
Вміст олії, %	45,7	47,3	48,4
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	1,1	0,8	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040011 Назва сорту: Арканзас Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191217

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плдоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плдоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,48	3,96	3,02
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,51	0,64	0,55
+,- до усередненої урожайності, %	25,9	19,3	22,3
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	312	299
Висота рослини, см	134,5	126,7	131,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	6	4,7
Вміст білка, %	21,2	19,3	18,4
Вміст олії, %	45,7	46,8	47,9
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**



**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040012 Назва сорту:** Аспект **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191218**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,6	3,9	2,83
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,63	0,58	0,36
+,- до усередненої урожайності, %	32	17,5	14,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	311	299
Висота рослини, см	136	120,8	131,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,6	5,3
Вміст білка, %	20,7	18,9	17,8
Вміст олії, %	45,8	46,6	48,4
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040014 Назва сорту: Атракція Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191220

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,97	2,83
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,65	0,36
+,- до усередненої урожайності, %	29,4	19,6	14,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	281	313	299
Висота рослини, см	135,9	121	125,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	5,9	5,1
Вміст білка, %	20,1	19,6	17,2
Вміст олії, %	46,4	46,6	48,5
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16040032 Назва сорту:** Берні **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191207**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,08	3,97	2,42
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,11	0,65	-0,05
+,- до усередненої урожайності, %	5,6	19,6	-2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	311	298
Висота рослини, см	126,5	113,5	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,7	5,5	4,9
Вміст білка, %	20,4	19	17,6
Вміст олії, %	46,2	47,3	48,4
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040005 Назва сорту: ГІМАЛАЇ КЛ Заявник (код): 2255 Власник сорту (код): 2255

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191212

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,13	3,07	2,31
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,16	-0,25	-0,16
+,- до усередненої урожайності, %	8,1	-7,5	-6,5
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	281	313	299
Висота рослини, см	127,3	103,2	122,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,7	5,3	5
Вміст білка, %	21,7	20,4	18,3
Вміст олії, %	44,4	45	47
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0
Вміст глюкостролатів, %	0,8	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	6
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040006 Назва сорту:** ДК Експіро **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191213**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,43	3,83	2,71
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,51	0,24
+,- до усередненої урожайності, %	23,4	15,4	9,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	313	298
Висота рослини, см	137,6	117	130
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,4	5,6	5,1
Вміст білка, %	20,9	18,4	17,8
Вміст олії, %	45,1	46,8	47,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	6	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 16040003 Назва сорту: ДК Експрешн Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191203

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,38	3,73	3
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,41	0,41	0,53
+,- до усередненої урожайності, %	20,8	12,3	21,5
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	314	298
Висота рослин, см	131,8	115,7	119,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,1	5,9	4,6
Вміст білка, %	20,2	18,9	17,9
Вміст олії, %	45,9	47,9	48,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	1	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040007 Назва сорту:** ДК Екстайм **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191214**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,35	3,83	2,9
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,38	0,51	0,43
+,- до усередненої урожайності, %	19,3	15,4	17,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	283	313	299
Висота рослини, см	129,1	113,3	127,4
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,1	5,1
Вміст білка, %	21	19,3	18
Вміст олії, %	45,2	46,5	48
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 17040008 Назва сорту: ДК Екстракт Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191215

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,37	3,78	2,73
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,4	0,46	0,26
+,- до усередненої урожайності, %	20,3	13,9	10,5
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	283	312	299
Висота рослини, см	136,6	113,8	125,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,7	5,9	5,3
Вміст білка, %	21,1	19,2	18,2
Вміст олії, %	45,7	47,4	48,2
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**



**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040009 Назва сорту:** ДК Імпеллер КЛ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191216**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,32	3,94	2,92
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,35	0,62	0,45
+,- до усередненої урожайності, %	17,8	18,7	18,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	312	299
Висота рослини, см	130,8	114	130,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,4	5,2	4,9
Вміст білка, %	21,5	19,4	17,6
Вміст олії, %	45,8	46,7	48,2
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 17040042 Назва сорту: Домінатор Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.11.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191225

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,12	3,88	2,65
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,15	0,56	0,18
+,- до усередненої урожайності, %	7,6	16,9	7,3
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	312	299
Висота рослини, см	133,6	113,2	122,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,1	5,3	4,7
Вміст білка, %	20,8	19,5	18,2
Вміст олії, %	46,1	47	48,3
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0
Вміст глюкостролатів, %	0,8	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 15040008 Назва сорту:** Домінік **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.11.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191200**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	19,7	33,2	24,7
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,5	0,5	0,4
Урожайність, ц/га	20,3	35,9	29,7
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	0,6	2,7	5,0
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	3,0	8,0	20,0
Висота рослин, см	130	128	120
Вегетаційний період, днів	285	309	301
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	6
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти ріпакового квіткоїда, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Вміст білка, %	20,9	19,5	21,9
Вміст олії, %	45,8	47,2	44,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,9	0,8	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,0
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 17040017 Назва сорту: ІМАНІ Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191221

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,97	4,04	2,67
+,- до усередненої урожайності, т/га	0	0,72	0,2
+,- до усередненої урожайності, %	0	21,7	8,1
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	316	300
Висота рослини, см	134,7	114	130,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	5,1	5,6	5,3
Вміст білка, %	21,3	18,5	17,8
Вміст олії, %	45,4	46,7	47,4
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкостролатів, %	0,7	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16040035 Назва сорту:** КВС КЕРПИ КЛ **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191208**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,39	3,36	2,61
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,42	0,04	0,14
+,- до усередненої урожайності, %	21,3	1,2	5,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	315	299
Висота рослини, см	132,9	110,4	129,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,4	5,3
Вміст білка, %	21,1	19,7	18,6
Вміст олії, %	45,9	45,9	47,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,5	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 16040036 Назва сорту: КВС КИРИЛ КЛ Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191209

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,29	3,89	2,77
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,32	0,57	0,3
+,- до усередненої урожайності, %	16,2	17,2	12,1
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	281	316	299
Висота рослини, см	130,3	113,2	134,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,4	5,2
Вміст білка, %	21,1	20,3	17,7
Вміст олії, %	45,6	45,3	47,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040045 Назва сорту:** Келтор **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.11.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191227**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,17	3,41	2,63
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,2	0,09	0,16
+,- до усередненої урожайності, %	10,2	2,7	6,5
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	312	298
Висота рослини, см	127	116,6	120
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4	5	4,6
Вміст білка, %	20,4	19,1	17,6
Вміст олії, %	46	47	48,2
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 16040008 Назва сорту: КЛАВІР КЛ Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191204

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,18	3,74	2,7
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,21	0,42	0,23
+,- до усередненої урожайності, %	10,7	12,7	9,3
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	282	311	299
Висота рослини, см	135,2	124	128,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,2	5,5	5,2
Вміст білка, %	20,9	19,4	18,4
Вміст олії, %	46,2	46,9	47,5
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкостролатів, %	0,8	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**



**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040026 Назва сорту:** КРИСТАЛ **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191222**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,39	3,68	2,55
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,42	0,36	0,08
+,- до усередненої урожайності, %	21,3	10,8	3,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	314	298
Висота рослини, см	133,9	115,8	130,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,5	5,1
Вміст білка, %	20,5	18,6	17,9
Вміст олії, %	45,6	47,6	48,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,4	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040041 Назва сорту: Лексіон Заявник (код): 807 Власник сорту (код): 807

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.11.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191224

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,41	3,97	2,7
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,44	0,65	0,23
+,- до усередненої урожайності, %	22,3	19,6	9,3
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	311	299
Висота рослини, см	131,2	110,7	128,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,2	5,1	4,7
Вміст білка, %	21	20,2	18,8
Вміст олії, %	45,9	46,6	47,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040046 Назва сорту:** Принц **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.11.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191228**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,26	3,65	2,74
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,29	0,33	0,27
+,- до усередненої урожайності, %	14,7	9,9	10,9
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	311	299
Висота рослини, см	134,1	112,5	120,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,1	4,7
Вміст білка, %	20,9	18,6	17,8
Вміст олії, %	45,5	47,3	47,9
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,9	0,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 17040001 Назва сорту: ПТ274 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191210

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,89	3,52	2,46
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,08	0,2	-0,01
+,- до усередненої урожайності, %	-4,1	6	-0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	281	315	299
Висота рослини, см	129,8	119,4	135,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,3	5,3
Вміст білка, %	21,2	19,6	18,8
Вміст олії, %	46,3	47,2	47,9
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040002 Назва сорту:** ПТ275 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191211**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,11	3,6	2,46
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,14	0,28	-0,01
+,- до усередненої урожайності, %	7,1	8,4	-0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	282	314	300
Висота рослини, см	123,1	110	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	5,5	5,4
Вміст білка, %	20,8	19	18,4
Вміст олії, %	45,8	47	47,9
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,5	0,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 15040038 Назва сорту: ПХ128 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191201

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мала	3
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	низька	3
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,84	3,62	2,45
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,13	0,3	-0,02
+,- до усередненої урожайності, %	-6,6	9	-0,8
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	281	316	298
Висота рослин, см	128	117	122,1
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,1	5,4	5,1
Вміст білка, %	20,9	19,7	18,4
Вміст олії, %	46,3	47,8	47,8
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0
Вміст глюкозинолатів, %	1	0,8	0,8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсипання, бал	7	8	6
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	7	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16040031 Назва сорту:** Ренді **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191206**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	сильна	7
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,4	3,71	2,56
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,43	0,39	0,09
+,- до усередненої урожайності, %	21,8	11,7	3,6
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	281	309	297
Висота рослини, см	129,4	109,3	111,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,6	5,7	5,3
Вміст білка, %	20,6	20	17,4
Вміст олії, %	45,8	47	48,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*  
**Заявка № 15041009 Назва сорту:** СТЕФАНО КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191202**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	короткі	3
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,56	3,48	2,68
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,59	0,16	0,21
+,- до усередненої урожайності, %	29,9	4,8	8,5
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	281	310	299
Висота рослини, см	140,5	115,7	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,1	5,5	4,9
Вміст білка, %	21	19	18,5
Вміст олії, %	45,2	46,8	47,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,6	0,5
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	6
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.



**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17040043 Назва сорту:** Темптейшн **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.11.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191226**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,04	3,75	2,71
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,07	0,43	0,24
+,- до усередненої урожайності, %	3,6	13	9,7
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	280	312	299
Висота рослини, см	128,6	119,8	121,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,1	5,4	4,8
Вміст білка, %	20,4	19,4	17,4
Вміст олії, %	46,4	47,1	48,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 17040027 Назва сорту: ФРАНКЛІН Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191223

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,97	3,32	2,47
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,49	3,55	2,92
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,52	0,23	0,45
+,- до усередненої урожайності, %	26,4	6,9	18,2
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, дів	283	313	299
Висота рослини, см	130,8	122,2	121,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5,5	5
Вміст білка, %	21,3	19,8	17,9
Вміст олії, %	45,3	46,3	47,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17940008 Назва сорту:** ВНІС 1 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191243**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	помірна	5
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16940006 Назва сорту:** ГО 44 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191233**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16940005 Назва сорту: ГО 67 Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191232**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	помірна	5
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17940002 Назва сорту:** ДС1993 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191237**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	сильна	7
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17940004 Назва сорту: ICC659 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191239**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17940007 Назва сорту:** МЕЛ 1 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191242**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	помірна	5
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0



**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17940009 Назва сорту: МЕЛ 2 Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191244**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	помірна	5
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16940007 Назва сорту:** М0 62 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191234**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	сильна	7
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*

**Заявка № 17940005 Назва сорту:** РММС9686А **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191240**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17940006 Назва сорту:** РММС9695Р **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191241**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*

**Заявка №** 16940008 **Назва сорту:** СКМО 193 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 191235

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	сильна	7
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16940002 Назва сорту: СС250Д Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191230**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	коротка	3
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	слабка	3
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*

**Заявка № 16940004 Назва сорту: СС317 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191231**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 17940003 Назва сорту:** СС398 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191238**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	помірна	5
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0



**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera*

**Заявка № 17940001 Назва сорту: СС403 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191236**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 16940001 Назва сорту: ССР219 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191229**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 16041001 Назва сорту: Клеопатра Заявник (код): 2011 Власник сорту (код): 2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191245

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізнюлітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2	1,7
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,84	1,82
+,- до усередненої урожайності, т/га		-0,17	0,12
+,- до усередненої урожайності, %		-8,6	6,2
Довірчий інтервал, т/га		0,06	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб		97	101
Висота рослини, см		100,1	102,7
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4,2	4,4
Вміст білка, %		23,4	23
Вміст олії, %		43,1	45
Вміст ерукової кислоти, %		0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %		0,6	0,5
Стійкість до вилягання, бал		9	9
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		8	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		8	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 17041010 Назва сорту: САОКЕР КЛ Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200101

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		1,99	1,78
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,96	1,97
+,- до усередненої урожайності, т/га		-0,02	0,19
+,- до усередненої урожайності, %		-1,2	10,8
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,08
Тривалість періоду вегетації, д/б		104	104
Висота рослини, см		105	110,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4,8	4,1
Вміст білка, %		25,6	26,1
Вміст олії, %		41,7	42
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,5	0,5
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсипання, бал		8	7
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал		9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039167 Назва сорту:** АВСТРАЛІЯ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191294**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,61	3,6	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,53	1,27	
+,- до усередненої урожайності, %	25,3	54,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,9	66,6	
Діаметр кошика, см	17,4	16,1	
Висота рослини, см	163,6	178,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	110	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,5	52,8	
Вміст білка, %	18,1	12,7	
Лушпинність, %	28,6	26,6	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039100 Назва сорту:** Аламбра КС **Заявник (код):** 485 **Власник сорту (код):** 485

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191282**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,73	3,13	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,65	0,8	
+,- до усередненої урожайності, %	31,3	34,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	66,8	62,1	
Діаметр кошика, см	17,4	16,7	
Висота рослини, см	152,1	169,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	109	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	9	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,7	50	
Вміст білка, %	17,2	12,7	
Лущинність, %	29,2	27,8	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 18039013 **Назва сорту:** АН20ЛЕ01 **Заявник (код):** 2451 **Власник сорту (код):** 2451

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200142

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,33	3,21	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,25	0,88	
+,- до усередненої урожайності, %	11,9	37,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,7	54,4	
Діаметр кошика, см	15,9	17,5	
Висота рослини, см	161,6	181	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	6	
Тривалість періоду вегетації, днів	116	112	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,8	49,2	
Вміст білка, %	17,7	16,5	
Лушпинність, %	28,5	25,2	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 18039012 **Назва сорту:** АН20ЛМ01 **Заявник (код):** 2451 **Власник сорту (код):** 2451

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200141

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,43	3,47	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,35	1,14	
+,- до усередненої урожайності, %	16,9	49,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63	57,4	
Діаметр кошика, см	18	16,9	
Висота рослини, см	167,2	173,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	116	110	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,6	49,8	
Вміст білка, %	16,8	16	
Лушпинність, %	26,9	24,6	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039014 Назва сорту: АН20ЛМ02 Заявник (код): 2451 Власник сорту (код): 2451

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200143

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	сильно загнуте до задньої сторони кошика	5
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,37	3,22	
+/- до усередненої урожайності, т/га	0,26	0,83	
+/- до усередненої урожайності, %	12,3	34,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,3	62,4	
Діаметр кошика, см	15,9	18,2	
Висота рослини, см	152,1	171,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,7	48,4	
Вміст білка, %	16,9	15,5	
Лушпинність, %	29,1	24,7	
Блок (Група стиглості)	ср		
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039011 Назва сорту: АН20ЛМ03 Заявник (код): 2451 Власник сорту (код): 2451

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200140

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	сильно загнуте до задньої сторони кошика	5
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,49	3,57	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,41	1,24	
+,- до усередненої урожайності, %	19,7	53	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,4	63,6	
Діаметр кошика, см	18	18,1	
Висота рослини, см	159,7	178,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	116	109	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,1	48,3	
Вміст білка, %	17,4	15,8	
Лушпинність, %	27,4	28,4	
Блок (група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039084 Назва сорту: Анастасія ОР Заявник (код): 1978 1210 1517

Власник сорту (код): 1978 1210 1517

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200112

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumanana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,35	3,66	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,24	1,27	
+,- до усередненої урожайності, %	11,3	53,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,5	64,5	
Діаметр кошика, см	17	17	
Висота рослини, см	166,6	181,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	121	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,9	47,8	
Вміст білка, %	16,3	13,2	
Лушпинність, %	25,1	29,2	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039190 Назва сорту:** Аргенсол 72 КЛ **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191303**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,28	3,5	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,15	1,05	
+,- до усередненої урожайності, %	6,9	42,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,3	65	
Діаметр кошика, см	16,3	17,9	
Висота рослини, см	167,6	187,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,5	49,7	
Вміст білка, %	17,1	15,6	
Лушпинність, %	28,6	27,4	
Блок (Група стиглості)	СС		
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039172 Назва сорту:** АЯКС **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191297**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	слабка	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,58	3,19	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,5	0,86	
+,- до усередненої урожайності, %	24	36,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,6	76,8	
Діаметр кошика, см	16,6	17,3	
Висота рослини, см	156,6	171,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	112	109	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,8	52,5	
Вміст білка, %	16,4	13,2	
Лушпинність, %	27,1	24,2	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039125 Назва сорту: Балу Заявник (код): 2291 Власник сорту (код): 2291

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200128

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,15	3,06	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,07	0,73	
+,- до усередненої урожайності, %	3,2	31,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,8	56,1	
Діаметр кошика, см	17,2	15,8	
Висота рослини, см	155,7	178,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	115	111	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,9	48,8	
Вміст білка, %	17	14,1	
Лушпинність, %	27,1	28,4	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039009 Назва сорту: Бонасол ЖМР Заявник (код): 2312 Власник сорту (код): 2312

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200139

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,08	3,24	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0	0,91	
+,- до усередненої урожайності, %	0	39,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,5	62,9	
Діаметр кошика, см	19,4	19	
Висота рослини, см	156,6	175,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	114	109	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,4	51,9	
Вміст білка, %	16,3	13,5	
Лушпинність, %	27,9	25,6	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039076 Назва сорту: ВОЛБЕРІН Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191274

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної великі	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,52	3,32	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,41	0,93	
+,- до усередненої урожайності, %	19,5	39,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,8	57,2	
Діаметр кошика, см	17	16,7	
Висота рослини, см	164	177,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,8	52	
Вміст білка, %	16,5	14,3	
Лушпинність, %	26,2	25,4	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039086 Назва сорту:** Драган ОР **Заявник (код):** 1978 1210 1517 **Власник сорту (код):** 1978 1210 1517

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200114**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,12	3,55	
+,- до усередненої урожайності, т/га	1,04	1,22	
+,- до усередненої урожайності, %	49,8	52,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	73,4	64,8	
Діаметр кошика, см	19,2	16,4	
Висота рослини, см	159,2	179,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	110	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,1	49,7	
Вміст білка, %	16,9	14,6	
Лушпинність, %	28,6	27,9	
Блок (група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039132 Назва сорту:** ДСХ415КЛ **Заявник (код):** 2094 **Власник сорту (код):** 2094

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191291**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,7	3,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,3	68,8	
Діаметр кошика, см	17,8	17,3	
Висота рослини, см	167,7	176,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	125	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,2	50,1	
Вміст білка, %	18,1	14,7	
Лущинність, %	25,1	24,8	
Блок (Група стиглості)	вол сс		
Напрямок використання	вол		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039112 Назва сорту: ЕС АКСОН СУ Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200124

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,5	3,25	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,39	0,86	
+,- до усередненої урожайності, %	18,7	35,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,7	62,1	
Діаметр кошика, см	15,9	15,9	
Висота рослини, см	160,5	178,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	119	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,3	50,7	
Вміст білка, %	16,7	14,8	
Лушпинність, %	26,8	25,9	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039102 Назва сорту:** ЕС Альфа **Заявник (код):** 2433 **Власник сорту (код):** 2433

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191283**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,58	3,43	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,47	1,04	
+,- до усередненої урожайності, %	22,3	43,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	65,9	62,2	
Діаметр кошика, см	16,4	15,7	
Висота рослини, см	163,6	188	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,7	50,5	
Вміст білка, %	16,2	14,7	
Лушпинність, %	23,9	28	
Блок (Група стиглості)	ср		
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039116 Назва сорту:** ЕС АРМОНІКА **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200127**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,57	3,31	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,92	
+,- до усередненої урожайності, %	21,8	38,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,8	57,5	
Діаметр кошика, см	15,9	16	
Висота рослини, см	164,3	191	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	122	121	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,9	52,5	
Вміст білка, %	16,2	15	
Лушпинність, %	24,8	22,3	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039104 Назва сорту:** ЕС Берекет **Заявник (код):** 2433 **Власник сорту (код):** 2433

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191285**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,18	3,2	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,07	0,81	
+,- до усередненої урожайності, %	3,1	33,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59	55,9	
Діаметр кошика, см	16,4	15,9	
Висота рослини, см	160,3	183,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	119	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,5	49,8	
Вміст білка, %	16,2	12,7	
Лушпинність, %	28,8	26	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039109 Назва сорту:** ЕС ВІЛЛІС КЛП **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200123**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,53	3,47	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,45	1,14	
+,- до усередненої урожайності, %	21,7	48,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	69,1	65,9	
Діаметр кошика, см	17,5	16,7	
Висота рослини, см	160,5	179,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	115	110	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,7	51,3	
Вміст білка, %	16,8	15,9	
Лушпинність, %	25,8	25	
Блок (група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039114 Назва сорту: ЕС ЕЛЕКТРИК КЛП Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200125

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,18	2,47	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,09	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,45	3,5	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,27	1,03	
+,- до усередненої урожайності, %	12,4	41,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	67,4	66,2	
Діаметр кошика, см	17,5	17,6	
Висота рослини, см	153,9	169,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	107	102	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,4	50,5	
Вміст білка, %	17,3	14	
Лушпинність, %	25,6	27,4	
Блок (Група стиглості)	ур		
Напрямок використання	вол олл		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039115 Назва сорту:** ЕС КОЛОРІС КЛ **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200126**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,57	3,33	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,94	
+,- до усередненої урожайності, %	22	39,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	67,3	65,6	
Діаметр кошика, см	17	16,4	
Висота рослини, см	160,5	177,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	119	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,1	48,7	
Вміст білка, %	16,8	15	
Лушпинність, %	27	28,8	
Блок (Група стиглості)	ср		
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039103 Назва сорту:** ЕС Саксон **Заявник (код):** 2433 **Власник сорту (код):** 2433

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191284**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,33	3,39	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,22	1	
+,- до усередненої урожайності, %	10,3	41,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,8	58,9	
Діаметр кошика, см	15	15,3	
Висота рослини, см	167,6	179,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	119	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,9	50,9	
Вміст білка, %	16,6	15,4	
Лушпинність, %	27,7	26,7	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 16039019 Назва сорту:** ЖИРАЛ **Заявник (код):** 1356 **Власник сорту (код):** 1356

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200105**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,88	2,63	
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,2	0,3	
+,- до усередненої урожайності, %	-9,5	12,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	52,1	56,7	
Діаметр кошика, см	17,2	17,2	
Висота рослини, см	146,9	168,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	115	111	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	45,1	49	
Вміст білка, %	18,1	14,6	
Лушпинність, %	30,1	26,4	
Блок (Група стиглості)	рс		
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039095 Назва сорту: Зурфер КЛ Заявник (код): 1694 Власник сорту (код): 2537

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 21.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200121

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,2	3,51	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,09	1,12	
+,- до усередненої урожайності, %	4,2	46,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,2	58,8	
Діаметр кошика, см	15,5	17	
Висота рослини, см	158,7	176,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	121	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,7	49,4	
Вміст білка, %	17,1	13,9	
Лушпинність, %	28,1	28,4	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039065 Назва сорту:** Інесол **Заявник (код):** 2312 **Власник сорту (код):** 2312

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200109**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,4	2,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,7	59,2	
Діаметр кошика, см	17,9	18,5	
Висота рослини, см	158,5	167,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	123	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,5	47,1	
Вміст білка, %	17,5	12,9	
Лушпинність, %	28,2	28,6	
Блок (Група стиглості)	сс		
Напрямок використання	вол		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039171 Назва сорту:** КАМПБЕЛЛ **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191296**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,6	3,85	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,52	1,52	
+,- до усередненої урожайності, %	24,8	65,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	67,4	70,3	
Діаметр кошика, см	17,3	15,4	
Висота рослини, см	161,5	182,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	116	113	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,2	52,2	
Вміст білка, %	17,9	13,4	
Лушпинність, %	26,7	27,5	
Блок (група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039094 Назва сорту: КВС АХІЛЛЕС КЛП Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191281

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,41	3,49	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,28	1,04	
+,- до усередненої урожайності, %	13,4	42,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,7	60,7	
Діаметр кошика, см	15,5	17,6	
Висота рослини, см	148	172,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	123	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	43,9	47,2	
Вміст білка, %	17,9	14,1	
Лушпинність, %	30,4	28,7	
Блок (Група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039093 Назва сорту:** КВС ЛОГОС КЛ **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191280**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної великі	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,53	3,32	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,4	0,87	
+,- до усередненої урожайності, %	18,8	35,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,1	59,4	
Діаметр кошика, см	16,9	17,1	
Висота рослини, см	161,3	170,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	122	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,5	47,2	
Вміст білка, %	17	14,1	
Лушпинність, %	29,1	30,1	
Блок (Група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18039022 Назва сорту:** Княжий **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200146**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,22	3,14	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,09	0,69	
+,- до усередненої урожайності, %	4,1	28,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	82,3	81,3	
Діаметр кошика, см	16,5	18,5	
Висота рослини, см	167	180	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45	49	
Вміст білка, %	16,9	13,9	
Лушпинність, %	30,7	28	
Блок (Група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 16039130 Назва сорту:** КС Браво **Заявник (код):** 2232 **Власник сорту (код):** 2232

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191268**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,11	2,97	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0	0,58	
+,- до усередненої урожайності, %	0	24,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	56,9	68	
Діаметр кошика, см	15,3	17,5	
Висота рослини, см	153,5	173	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	122	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	47,1	50,2	
Вміст білка, %	16,9	18,9	
Лушпинність, %	30,9	22,3	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 16039128 Назва сорту: КС Цорба Заявник (код): 2232 Власник сорту (код): 2232

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191267

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	21,7	24,4	-
Довірчий інтервал (ц/га), ±	0,4	0,5	-
Урожайність, ц/га	17,3	24,9	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-4,4	0,5	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-20,3	2,0	-
Тривалість періоду вегетації, діб	120	121	-
Маса 1000 сім'янок, г	55,1	58,0	-
Висота рослин, см	145	179	-
Стійкість до вилягання, бал	9	8	-
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	-
Стійкість проти строї гнилі, бал	8	8	-
Стійкість до вовчка, бал	8	9	-
Стійкість до іржі, бал	8	8	-
Стійкість до фомозу, бал	8	8	-
Вміст олії, %	47,9	49,3	-
Вміст білка, %	15,8	15,5	-
Лушпинність, %	29,8	26,3	-
Напрямок використання: олійний			
Блок: середньоранньостиглий			

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039085 Назва сорту: Латітуда ОР Заявник (код): 1978 1210 1517 Власник сорту (код): 1978 1210 1517

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200113

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,73	3,65	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,66	1,35	
+,- до усередненої урожайності, %	31,7	58,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	68,7	68,4	
Діаметр кошика, см	16,9	18,5	
Висота рослини, см	167,7	181,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	107	101	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,6	47,7	
Вміст білка, %	17,8	14,6	
Лушпинність, %	30,1	29,4	
Блок (Група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039089 Назва сорту:** ЛГ50480 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200117**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,81	3,49	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,73	1,16	
+,- до усередненої урожайності, %	35,2	49,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	68,1	71,2	
Діаметр кошика, см	17,4	16	
Висота рослини, см	155	173,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	113	109	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47	51,7	
Вміст білка, %	16,9	11,1	
Лушпинність, %	27,9	27,3	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039092 Назва сорту:** ЛГ50510 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200120**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,75	3,78	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,64	1,39	
+,- до усередненої урожайності, %	30,4	58,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	71,1	74	
Діаметр кошика, см	17,1	16,4	
Висота рослини, см	168,2	182,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	122	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47	50,8	
Вміст білка, %	16,8	13,4	
Лушпинність, %	29,3	26,4	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039090 Назва сорту: ЛГ50521 КЛП Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200118

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,39	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,44	1	
+,- до усередненої урожайності, %	21	41,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	70,3	62,5	
Діаметр кошика, см	17,7	15,7	
Висота рослини, см	156,7	176,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,1	51,5	
Вміст білка, %	17	13,2	
Лушпинність, %	26,1	25,3	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039087 Назва сорту: ЛГ50609 СХ Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200115

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,64	3,46	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,53	1,07	
+,- до усередненої урожайності, %	25,1	44,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,7	56,5	
Діаметр кошика, см	17,4	16,5	
Висота рослини, см	162,5	178,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	122	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,2	50,3	
Вміст білка, %	16,1	13,2	
Лушпинність, %	28,1	28,4	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 17039088 **Назва сорту:** ЛГ50662 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200116

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,55	3,09	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,44	0,7	
+,- до усередненої урожайності, %	20,8	29,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,6	61,2	
Діаметр кошика, см	17,5	16,8	
Висота рослини, см	165	174,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,3	50	
Вміст білка, %	16,4	12,2	
Лушпинність, %	28,3	26	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039091 Назва сорту: ЛГ50797 КЛП Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200119

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика стеблом	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,6	3,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,7	59,4	
Діаметр кошика, см	16,5	18,3	
Висота рослини, см	159,8	178,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, діб	124	122	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,5	49,3	
Вміст білка, %	18,3	15,6	
Лущинність, %	26,3	23,4	
Блок (Група стиглості)	вол сс		
Напрямок використання	вол		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039070 Назва сорту: ЛНЗ 01 Заявник (код): 2265 Власник сорту (код): 2265

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200110

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,66	3,37	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,55	0,98	
+,- до усередненої урожайності, %	25,8	41,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,8	66,9	
Діаметр кошика, см	17,4	16,8	
Висота рослини, см	155,5	175,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	118	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,3	51,2	
Вміст білка, %	17,2	15	
Лушпинність, %	25,5	26,5	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039129 Назва сорту: ЛС ГЛОБСАН Заявник (код): 1356 Власник сорту (код): 1356

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200129

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,2	3,39	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,09	1	
+,- до усередненої урожайності, %	4,4	41,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,9	62,8	
Діаметр кошика, см	15	16,6	
Висота рослини, см	161,6	175,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,2	48,2	
Вміст білка, %	17,6	17,1	
Лушпинність, %	28,3	26,2	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039193 Назва сорту:** М96КЛ02 **Заявник (код):** 273 **Власник сорту (код):** 273

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200131**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,48	3,05	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,41	0,75	
+,- до усередненої урожайності, %	19,9	32,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,9	62,5	
Діаметр кошика, см	15,3	16,7	
Висота рослини, см	155,7	172,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	107	104	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,5	48,6	
Вміст білка, %	18,9	14,3	
Лушпинність, %	27,3	29,6	
Блок (Група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039191 Назва сорту: М96С33 Заявник (код): 273 Власник сорту (код): 273

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200130

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumanana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,44	3,24	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,37	0,94	
+,- до усередненої урожайності, %	17,7	40,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	59,9	62,7	
Діаметр кошика, см	16,5	17,8	
Висота рослини, см	164,9	184,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	107	103	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,2	49,4	
Вміст білка, %	18,1	14,6	
Лушпинність, %	26,9	30,4	
Блок (Група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039194 Назва сорту: М98КЛ88 Заявник (код): 273 Власник сорту (код): 273

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200132

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,09	3,18	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,02	0,88	
+,- до усередненої урожайності, %	1,2	38,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,9	63,2	
Діаметр кошика, см	14,9	16,8	
Висота рослини, см	157,8	172,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	106	104	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,3	49	
Вміст білка, %	16,8	14,9	
Лушпинність, %	30,7	28,5	
Блок (Група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039163 Назва сорту:** МАНХЕТТЕН КЛП **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191292**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	сильно виражені	3
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,73	3,55	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,65	1,22	
+,- до усередненої урожайності, %	31,4	52,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,2	61,8	
Діаметр кошика, см	16,5	15,7	
Висота рослини, см	152,3	174,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	111	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,4	53,5	
Вміст білка, %	17,1	13,1	
Лушпинність, %	27,5	24,7	
Блок (група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039081 Назва сорту:** МАС 805А **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191278**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,46	3,62	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,39	1,32	
+,- до усередненої урожайності, %	18,8	57,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,1	68,2	
Діаметр кошика, см	17,5	16,3	
Висота рослини, см	137	156,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	105	102	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,4	49,4	
Вміст білка, %	16,9	14,4	
Лущинність, %	28,7	27,2	
Блок (Група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 16039116 Назва сорту:** МАС 83СУ **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191266**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	-
Довірчий інтервал (т/га), ±	0,02	0,03	-
Урожайність, т/га	2,34	3,45	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, т/га	0,26	1,12	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	12,3	48,3	-
Тривалість періоду вегетації, діб	116	112	-
Маса 1000 сім'янок, г	58,3	66,5	-
Висота рослин, см	146,8	177,3	-
Стійкість до вилягання, бал	8	9	-
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	-
Стійкість проти строї гнилі, бал	9	8	-
Стійкість до вовчка, бал	8	8	-
Стійкість до іржі, бал	8	8	-
Стійкість до фомозу, бал	8	9	-
Вміст олії, %	46,1	49,9	-
Вміст білка, %	16,6	16,0	-
Лушпинність, %	28,7	29,2	-
Напрямок використання:	олн	олн	-
Блок:	рс	рс	-

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039082 Назва сорту: МАС 870Г Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191279

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	світло-жовте	2
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	відсутня	1

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,63	3,26	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,56	0,96	
+,- до усередненої урожайності, %	27,1	41,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	68,1	70,7	
Діаметр кошика, см	17	17	
Висота рослини, см	157,7	173	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	106	103	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,9	48,2	
Вміст білка, %	16,5	13	
Лушпинність, %	29	29,4	
Блок (Група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039079 Назва сорту:** МАС 880СУ **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191276**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,36	3,21	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,25	0,82	
+,- до усередненої урожайності, %	11,7	34,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	69,5	67	
Діаметр кошика, см	15,7	15,7	
Висота рослини, см	163,2	179	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,7	48,9	
Вміст білка, %	17,1	13,8	
Лушпинність, %	28	29	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039077 Назва сорту: МАС 90IP Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191275

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,57	3,16	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,46	0,77	
+,- до усередненої урожайності, %	21,8	32,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	62,8	61,9	
Діаметр кошика, см	15,7	15,8	
Висота рослини, см	159,4	182,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,7	47,9	
Вміст білка, %	18	14,9	
Лушпинність, %	28,2	26,4	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 16039114 Назва сорту:** МЕНДЕЛЬ **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191265**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	сильна	7
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,67	3,62	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,59	1,29	
+,- до усередненої урожайності, %	28,3	55,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,7	70,5	
Діаметр кошика, см	17,8	19,5	
Висота рослини, см	149,6	171,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	115	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,5	48,3	
Вміст білка, %	14,7	16,9	
Лущинність, %	30,3	30,9	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 16039129 **Назва сорту:** Міранда ЗУ **Заявник (код):** 1694 **Власник сорту (код):** 2537

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200106

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюяйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,07	2,92	
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,04	0,53	
+,- до усередненої урожайності, %	-2	22,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,8	54,4	
Діаметр кошика, см	16,2	17,9	
Висота рослини, см	141,5	172,0	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	121	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,4	50,9	
Вміст білка, %	16,8	16,5	
Лушпинність, %	24,5	21,9	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039083 Назва сорту:** НС КОНСТАНТИН ОР **Заявник (код):** 1978 1210 1517

**Власник сорту (код):** 1978 1210 1517

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200111**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,85	3,52	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,74	1,13	
+,- до усередненої урожайності, %	35,1	47,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,5	67,1	
Діаметр кошика, см	17,3	15,9	
Висота рослини, см	167,5	178	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,4	47,6	
Вміст білка, %	16,4	14	
Лушпинність, %	29,4	29,1	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 16039042 **Назва сорту:** П64ГГ132 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 191263

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	21,7	24,4	-
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,4	0,5	-
Урожайність, ц/га	21,4	27,6	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-0,3	3,2	-
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-1,4	13,1	-
Тривалість періоду вегетації, діб	122	121	-
Маса 1000 сім'янок, г	55,8	62,1	-
Висота рослин, см	145	175	-
Стійкість до вилягання, бал	9	8	-
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	-
Стійкість проти строї гнилі, бал	8	8	-
Стійкість до вовчка, бал	8	9	-
Стійкість до іржі, бал	8	8	-
Стійкість до фомозу, бал	8	8	-
Вміст олії, %	47,2	48,8	-
Вміст білка, %	15,9	15,8	-
Лушпинність, %	29,1	26,4	-
Напрямок використання: олійний			
Блок: середньоранньостиглий			

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039073 Назва сорту:** П64ГЕ144 **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191272**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,52	3,54	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,41	1,15	
+,- до усередненої урожайності, %	19,4	48,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,8	65	
Діаметр кошика, см	16,8	16,4	
Висота рослини, см	143,6	172,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46	49,6	
Вміст білка, %	17,1	15,5	
Лушпинність, %	28,1	25,2	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039075 Назва сорту: П64ЛЕ136 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191273

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,71	3,37	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,6	0,98	
+,- до усередненої урожайності, %	28,2	40,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	63,4	59,1	
Діаметр кошика, см	17,1	15,3	
Висота рослини, см	151,7	172,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,7	50,9	
Вміст білка, %	17,2	14,4	
Лущинність, %	25,6	27,1	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039071 Назва сорту: П64ЛЛ138 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191271

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,62	3,8	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,51	1,41	
+,- до усередненої урожайності, %	24,1	58,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	70,1	71,7	
Діаметр кошика, см	16,1	16,7	
Висота рослини, см	155,2	175,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,6	50,7	
Вміст білка, %	16,7	16	
Лушпинність, %	28,7	25,9	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039080 Назва сорту: ПОВЕРСАН Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191277

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	веретиноподібні	1
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,91	3,4	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,8	1,01	
+,- до усередненої урожайності, %	37,9	42,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	66,3	61,2	
Діаметр кошика, см	16,8	15,7	
Висота рослини, см	146,6	172,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,2	46,8	
Вміст білка, %	17,2	15,6	
Лущинність, %	28,6	26,6	
Блок (Група стиглості)	ср		
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039166 Назва сорту:** РЖТ БЕЛЛОНА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191293**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,67	3,61	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,59	1,28	
+,- до усередненої урожайності, %	28,4	54,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,7	61,1	
Діаметр кошика, см	17,1	15,3	
Висота рослини, см	159,3	177,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	114	110	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48	52,8	
Вміст білка, %	17,8	13,5	
Лушпинність, %	25,9	24,2	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039175 Назва сорту:** РЖТ БЕЛЛЬВЕДЕР **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191300**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,61	3,39	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,53	1,06	
+,- до усередненої урожайності, %	25,6	45,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	66,6	69,4	
Діаметр кошика, см	16,8	17	
Висота рослини, см	148,9	170,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	115	110	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	48,2	54,6	
Вміст білка, %	18,5	12,9	
Лушпинність, %	26,8	21,4	
Блок (група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039177 Назва сорту:** РЖТ ДОНАТЕЛЛО **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191301**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumanа</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,83	3,6	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,75	1,27	
+,- до усередненої урожайності, %	36,1	54,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	67,6	66,2	
Діаметр кошика, см	16,9	16,4	
Висота рослини, см	161,5	177,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	114	109	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,4	51,3	
Вміст білка, %	17,6	14,2	
Лущинність, %	27,3	27	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039173 Назва сорту: РЖТ КАСТЕЛЛАНО КЛП Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191298

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,64	3,41	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,56	1,08	
+,- до усередненої урожайності, %	27	46,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	65,5	68,8	
Діаметр кошика, см	16,7	16,2	
Висота рослини, см	154,7	170,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	114	111	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,8	52,3	
Вміст білка, %	17,8	14	
Лушпинність, %	27,5	23,2	
Блок (група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039178 Назва сорту: РЖТ САЛЛ'ВАДОР Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191302

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,63	3,84	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,52	1,45	
+,- до усередненої урожайності, %	24,6	60,7	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,2	62,9	
Діаметр кошика, см	17	17,9	
Висота рослини, см	165,2	181,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,2	52,5	
Вміст білка, %	17,2	13,8	
Лушпинність, %	28	25,1	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039170 Назва сорту: РЖТ ФРАНКЛІН Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191295

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,75	3,23	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,67	0,9	
+,- до усередненої урожайності, %	32	38,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	62,2	55,7	
Діаметр кошика, см	17,5	16	
Висота рослини, см	161,8	179,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	116	111	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,8	50,8	
Вміст білка, %	17,4	12,3	
Лушпинність, %	28,3	24,6	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18039021 Назва сорту:** Річард **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200145**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	широкояйцювата	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцюподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцюподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,47	3,15	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,36	0,76	
+,- до усередненої урожайності, %	17,2	31,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,3	64,2	
Діаметр кошика, см	16,6	17,1	
Висота рослини, см	165,9	182,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,8	49,2	
Вміст білка, %	17,9	14,1	
Лушпинність, %	28,5	27,5	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039119 Назва сорту: САБВЕЙ Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191287

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,81	3,5	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,7	1,11	
+,- до усередненої урожайності, %	33,1	46,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,1	60,1	
Діаметр кошика, см	16,6	16,5	
Висота рослини, см	166,2	185,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,9	50	
Вміст білка, %	16,6	13,3	
Лушпинність, %	29,9	28,4	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039120 Назва сорту: САЙБЕРІК Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191288

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,7	3,7	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,59	1,31	
+,- до усередненої урожайності, %	28,1	54,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,6	59,7	
Діаметр кошика, см	17	16,4	
Висота рослини, см	169,9	182,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47	50,5	
Вміст білка, %	15,2	14,7	
Лушпинність, %	28,6	25,9	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039128 Назва сорту: САКСЕСС Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191290

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,38	3,28	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,27	0,89	
+,- до усередненої урожайності, %	12,8	37,3	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,4	62,9	
Діаметр кошика, см	16	17,4	
Висота рослини, см	148,7	174,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	119	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,6	49,4	
Вміст білка, %	16,9	14,7	
Лушпинність, %	26,6	26,8	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 16039046 Назва сорту:** Салвасол **Заявник (код):** 1498 **Власник сорту (код):** 1498

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191264**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка увігнутий	2
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	55,1	56	
Діаметр кошика, см	15,4	16,4	
Висота рослини, см	151,7	173,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, діб	121	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,8	50,8	
Вміст білка, %	18,7	16,1	
Лушпинність, %	26,8	22,8	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039174 Назва сорту:** САНБРЕЛА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191299**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно випукла	5
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	дуже сильна	9
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,8	3,61	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,69	1,22	
+,- до усередненої урожайності, %	32,7	51	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	64,8	69,2	
Діаметр кошика, см	15,7	17,2	
Висота рослини, см	157,9	175,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	121	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,5	51,2	
Вміст білка, %	16,2	15,7	
Лушпинність, %	28,7	28,5	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039002 Назва сорту: СИ ДАКСТОН Заявник (код): 1219 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191269

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	-
Довірчий інтервал, т/га (±)	0,04	0,05	-
Тривалість періоду вегетації, діб	119	119	-
Маса 1000 сім'янок, г	55,4	53,1	-
Висота рослин, см	143,3	172,9	-
Стійкість до вилягання, бал	9	8	-
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	-
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	-
Стійкість до вовчка, бал	8	8	-
Стійкість до іржі, бал	8	8	-
Стійкість до фомозу, бал	8	8	-
Вміст олії, %	49,1	52,1	-
Вміст білка, %	16,7	16,5	-
Лушпинність, %	27,3	24,3	-
Напрямок використання:	олн	олн	-
Блок:	ср	ср	-

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039003 Назва сорту:** СИ КУПЕР КЛП **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191270**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,17	2,44	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,45	2,87	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,34	0,48	
+,- до усередненої урожайності, %	15,9	20	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,9	64,7	
Діаметр кошика, см	16,2	16,6	
Висота рослини, см	148,8	181,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	119	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	46,3	51,3	
Вміст білка, %	17,8	13,5	
Лушпинність, %	29,6	26,3	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039121 Назва сорту:** СУДОКУ **Заявник (код):** 1219 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191289**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,77	3,18	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,66	0,79	
+,- до усередненої урожайності, %	31,2	33,1	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	58,4	59,5	
Діаметр кошика, см	16,1	15,8	
Висота рослини, см	154,4	178,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,2	51	
Вміст білка, %	18	15,1	
Лушпинність, %	27	25,2	
Блок (Група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 17039205 **Назва сорту:** CX 2321 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200135

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,61	3,24	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,54	0,94	
+,- до усередненої урожайності, %	26	41	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	57,4	57	
Діаметр кошика, см	16,6	15,7	
Висота рослини, см	141,1	167	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	106	103	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	9	
Вміст олії, %	45,6	49,2	
Вміст білка, %	18,6	15,4	
Лушпинність, %	26,5	26,3	
Блок (група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039204 Назва сорту:** CX 2563 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200134**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,36	2,97	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,29	0,67	
+,- до усередненої урожайності, %	13,9	29,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,5	61,4	
Діаметр кошика, см	16,5	16,9	
Висота рослини, см	141,5	168,7	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	106	105	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,7	48,8	
Вміст білка, %	18,7	16,2	
Лушпинність, %	26,2	25	
Блок (група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039201 Назва сорту:** CX 5220 **Заявник (код):** 2444 **Власник сорту (код):** 2444

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200133**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	2,3	
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,33	3,13	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,26	0,83	
+,- до усередненої урожайності, %	12,5	36,2	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	52,4	56,1	
Діаметр кошика, см	17,4	15,8	
Висота рослини, см	143,7	163,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	106	104	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,2	49,3	
Вміст білка, %	18,4	15,7	
Лушпинність, %	26,8	23,7	
Блок (група стиглості)	ур	ур	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039042 Назва сорту: Тайлер Заявник (код): 2273 Власник сорту (код): 2273

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200108

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,06	2,76	
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,05	0,37	
+,- до усередненої урожайності, %	-2,2	15,4	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	54,8	57,9	
Діаметр кошика, см	15,6	17,1	
Висота рослини, см	144,3	171,2	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	121	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	45,6	48,5	
Вміст білка, %	17,8	16,5	
Лушпинність, %	30,3	26,6	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039097 Назва сорту:** Терасан КЛ **Заявник (код):** 1694 **Власник сорту (код):** 2537

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200122**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,43	3,23	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,3	0,78	
+,- до усередненої урожайності, %	14,2	31,8	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	65,5	53,1	
Діаметр кошика, см	17,6	17,6	
Висота рослини, см	156,8	178,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	123	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,6	49,1	
Вміст білка, %	18,4	16,3	
Лушпинність, %	26,8	26,5	
Блок (група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 18039017 Назва сорту: Тібо Заявник (код): 2458 Власник сорту (код): 2458

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200144

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,14	2,82	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,01	0,37	
+,- до усередненої урожайності, %	0,7	14,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	70,3	69	
Діаметр кошика, см	16,3	17,3	
Висота рослини, см	156,9	168,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	120	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	7	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	46,6	50	
Вміст білка, %	17,5	15,3	
Лушпинність, %	28,7	23,1	
Блок (група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039108 Назва сорту:** ФЛОРМАСТЕР IP **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191286**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,33	3,34	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,22	0,95	
+,- до усередненої урожайності, %	10,7	39,9	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,7	60	
Діаметр кошика, см	16	17,3	
Висота рослини, см	158,2	175,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	122	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,6	51,5	
Вміст білка, %	17,1	14,8	
Лушпинність, %	27,3	24,8	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17039036 Назва сорту: Фолк Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736

Дата пріоритету: 13.01.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200107

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	-
Довірчий інтервал, т/га (±)	0,04	0,05	-
Тривалість періоду вегетації, діб	121	120	-
Маса 1000 сім'янок, г	56,2	60,4	-
Висота рослин, см	151,6	177,8	-
Стійкість до вилягання, бал	8	8	-
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	-
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	-
Стійкість до вовчка, бал	8	9	-
Стійкість до іржі, бал	8	8	-
Стійкість до фомозу, бал	8	8	-
Вміст олії, %	45,2	48,8	-
Вміст білка, %	18,1	16,1	-
Лушпинність, %	29,8	27,0	-
Напрямок використання:	олн	олн	-
Блок:	ср	ср	-

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18039005 Назва сорту:** Хайсан 180 IT **Заявник (код):** 1520 **Власник сорту (код):** 2554

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200138**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanchе сumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,11	2,39	
Довірчий інтервал, т/га	0,04	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,83	3,6	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,72	1,21	
+,- до усередненої урожайності, %	34,3	50,6	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	61,8	64,2	
Діаметр кошика, см	16,8	17,6	
Висота рослини, см	162,7	178,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	120	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,9	48,2	
Вміст білка, %	17,5	15,5	
Лушпинність, %	28,9	27,2	
Блок (група стиглості)	ср	ср	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 18039004 **Назва сорту:** Хайсан 218 **Заявник (код):** 1520 **Власник сорту (код):** 2554

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200137

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	біле	1
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,64	3,69	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,51	1,24	
+,- до усередненої урожайності, %	23,9	50,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	70,8	68,3	
Діаметр кошика, см	17,8	16,9	
Висота рослини, см	166	172,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	123	122	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	44,2	47,3	
Вміст білка, %	17,3	15,3	
Лушпинність, %	29,4	28,6	
Блок (група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18039002 Назва сорту:** Хайсан 228 **Заявник (код):** 1520 **Власник сорту (код):** 2554

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200136**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	3,69	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,63	1,24	
+,- до усередненої урожайності, %	29,4	50,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	72,9	70,5	
Діаметр кошика, см	17	17,8	
Висота рослини, см	168,2	181,3	
Ступінь нахилу кошика, бал	8	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	126	124	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	8	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	45,4	50,9	
Вміст білка, %	17,9	14,7	
Лушпинність, %	27,7	25,9	
Блок (Група стиглості)	сс		
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17039197 Назва сорту:** Хелесан СУ **Заявник (код):** 2232 **Власник сорту (код):** 2232

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191304**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,08	2,33	
Довірчий інтервал, т/га	0,02	0,03	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,4	2,89	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,32	0,56	
+,- до усередненої урожайності, %	15,2	24	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	60,7	57	
Діаметр кошика, см	16	16,4	
Висота рослини, см	152,7	175,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6	7	
Тривалість періоду вегетації, днів	114	108	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	7	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	9	
Вміст олії, %	47,3	51,1	
Вміст білка, %	17,9	17,1	
Лушпинність, %	29,4	26,8	
Блок (Група стиглості)	рс	рс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 16039032 Назва сорту: ХФ16611 Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191262

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної великі	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,13	2,45	
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,07	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	1,85	3,22	
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,28	0,77	
+,- до усередненої урожайності, %	-13,1	31,5	
Маса 1000 сім'янок (за стандартної вологості 12%), г	53,6	54,7	
Діаметр кошика, см	14,8	19,5	
Висота рослини, см	138,5	171,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	123	122	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти вовчка, бал	9	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	9	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	50,1	52,4	
Вміст білка, %	15,7	16,4	
Лушпинність, %	21,9	21,8	
Блок (група стиглості)	сс	сс	
Напрямок використання	олійний		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939045 Назва сорту: 113 Р Заявник (код): 2312 Власник сорту (код): 2312**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200150**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939044 Назва сорту:** 2603X1093 **Заявник (код):** 2312 **Власник сорту (код):** 2312

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200149**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumanana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939070 Назва сорту:** 49Ц01А **Заявник (код):** 485 **Власник сорту (код):** 485

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200158**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	малі	3
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939066 Назва сорту: 56Ц20Р Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200155**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошністої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939130 Назва сорту: 639 P Заявник (код): 2440 Власник сорту (код): 2440**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191327**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumanа</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939067 Назва сорту: 63Г13іс Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200156**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939068 Назва сорту: 67K23P Заявник (код): 485 Власник сорту (код): 485**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200157**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939039 Назва сорту: 7ПГЛК23Р Заявник (код): 9 Власник сорту (код): 9**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191310**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	до сильної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубочасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубочасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубочасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубочасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	чорне	4	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939131 Назва сорту:** АГ 238 АКЛ **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191328**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939129 Назва сорту:** АГ 438 РКЛ **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191326**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	вітла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутих стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 16939069 **Назва сорту:** AP 002 Б **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 191306

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	сильно виражені	3
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	округлі	4
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 16939068 Назва сорту:** AP 003 Б **Заявник (код):** 1265 **Власник сорту (код):** 1265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191305**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	сильна	7
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939132 Назва сорту:** ВЛ 1120А **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200170**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюяцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939139 Назва сорту:** ВЛ 1240Б **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200177**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення прийомочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення прийомочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939136 Назва сорту:** ВН 1080А **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200174**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939133 Назва сорту:** ВН 2821В **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200171**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939141 Назва сорту:** ВН 3040А **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200179**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939135 Назва сорту:** ВН 6045А **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200173**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumanana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9



Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 17939134 Назва сорту: ВН 6079В Заявник (код): 2265 Власник сорту (код): 2265

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200172

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатиї	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939140 Назва сорту:** ВН 6531В **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200178**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутих стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939138 Назва сорту:** ВН 7050А **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200176**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюяйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939137 Назва сорту:** ВН 7152В **Заявник (код):** 2265 **Власник сорту (код):** 2265

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200175**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатиий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18939012 Назва сорту:** ДС 58 Б **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200181**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18939010 Назва сорту:** ДС 87 В **Заявник (код):** 2458 **Власник сорту (код):** 2458

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200180**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	сильна	7
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939005 Назва сорту:** EX935 **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 13.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200147**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939128 Назва сорту:** ІМІ 3 ДМ **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191325**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939075 Назва сорту:** КС 501 В **Заявник (код):** 2433 **Власник сорту (код):** 2433

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191323**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної великі	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939076 Назва сорту:** КС 505 В **Заявник (код):** 2433 **Власник сорту (код):** 2433

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191324**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоїцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939072 Назва сорту:** КТ 22 А **Заявник (код):** 2433 **Власник сорту (код):** 2433

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191321**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939073 Назва сорту:** КТ 22 Б **Заявник (код):** 2433 **Власник сорту (код):** 2433

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191322**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939071 Назва сорту:** КТ 24 Б **Заявник (код):** 2433 **Власник сорту (код):** 2433

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191320**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939056 Назва сорту:** ЛГ71234МІА **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200152**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	малі	3
10	Листок: крила	сильно виражені	3
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	дуже ранній	1
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправної борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 17939062 **Назва сорту:** ЛГ7512340А **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200154

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	окремі або дуже дрібні	1
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	малі	3
10	Листок: крила	сильно виражені	3
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18939017 Назва сорту:** МР7314 **Заявник (код):** 273 **Власник сорту (код):** 273

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200182**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	дуже ранній	1
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939087 Назва сорту: P1119ЖІ Заявник (код): 806 1435 Власник сорту (код): 806 1435**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200163**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939086 Назва сорту: P11CT6M2I Заявник (код): 806 1435 Власник сорту (код): 806 1435**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200162**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Сійкість проти несправньої борошністої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939089 Назва сорту: P1307I Заявник (код): 806 1435 Власник сорту (код): 806 1435**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200164**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939092 Назва сорту: P1359МЖ Заявник (код): 806 1435 Власник сорту (код): 806 1435**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200167**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18939031 Назва сорту: P13ГВ1МЖК Заявник (код): 1435 Власник сорту (код): 1435**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200185**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	сильно виражені	3
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939080 Назва сорту:** P469МЖКО **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200159**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	малі	3
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всю висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18939033 Назва сорту: Р4НП8МЖС Заявник (код): 1435 Власник сорту (код): 1435**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200186**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тулий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939093 Назва сорту:** Р5ПЕ4МС **Заявник (код):** 806 1435 **Власник сорту (код):** 806 1435

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200168**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 18939030 **Назва сорту:** Р6ПХ4ЖМ **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200184

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 18939029 Назва сорту: P78033Ж Заявник (код): 1435 Власник сорту (код): 1435**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200183**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всю висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 16939123 **Назва сорту:** РХАНМ17РФІМІ **Заявник (код):** 2232 **Власник сорту (код):** 2232

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 191308

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939091 Назва сорту:** CP1087MCO **Заявник (код):** 806 1435 **Власник сорту (код):** 806 1435

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200166**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939047 Назва сорту:** ТРІ4387Р **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191312**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабе	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	малий	3
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	малий	3
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939142 Назва сорту:** ТРІ4495Р **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191329**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листок: пухирчастість	сильна	7
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	світло-жовте	2
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Сійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmodium helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939048 Назва сорту:** ТРІ5018Р **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191313**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanchе сumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939053 Назва сорту:** TRC5017P **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191317**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	малий	3
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939046 Назва сорту:** TPX5019P **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191311**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	сильна	7
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	світло-жовте	2
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939050 Назва сорту:** ТФІ4494А **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191314**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нешільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошністої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939051 Назва сорту:** ТФС3769А **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата пріоритету:** 24.10.2017

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191315**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939052 Назва сорту:** ТФХ4746А **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата пріоритету:** 24.10.2017

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191316**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	малі	3
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюяйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Сійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmodium helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939029 Назва сорту:** У14ЛГЦЛЛМ **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191309**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939054 Назва сорту:** УН 715 РХА **Заявник (код):** 1517 **Власник сорту (код):** 1517

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200151**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	малі	3
10	Листок: крила	сильно виражені	3
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всю висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939035 Назва сорту:** Ф1316ГФ **Заявник (код):** 9 **Власник сорту (код):** 9

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200148**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильне	7
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939090 Назва сорту:** Ф5ДЦ5МСА **Заявник (код):** 806 1435 **Власник сорту (код):** 806 1435

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200165**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	сильно виражені	3
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939061 Назва сорту:** Ф754271МА **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200153**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: вушка	дуже великі	9
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	відсутнє або дуже слабе	1
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939085 Назва сорту:** Ф7АХ2МЖА **Заявник (код):** 806 1435 **Власник сорту (код):** 806 1435

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200161**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	широкоялицеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутих стеблом	5
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюялицеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939084 Назва сорту:** Ф7АХ2МЖКА **Заявник (код):** 806 1435 **Власник сорту (код):** 806 1435

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200160**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	великий	7
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939094 Назва сорту: Ф9ЕС4МІОА Заявник (код): 806 1435 Власник сорту (код): 806 1435**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200169**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: розмір	великий	7
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабке	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	дуже довга	9
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	великий	7
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939065 Назва сорту: X09951P Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191319**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	малий	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	видовжена	1
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 17939064 Назва сорту: X11050P Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191318**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабо виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатиий	3
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Сійкість проти несправжньої борошністої поси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 16939122 **Назва сорту:** ХА1АСУ **Заявник (код):** 2232 **Власник сорту (код):** 2232

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 191307

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: розмір	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	великі	7
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: вушка	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірне	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4
35	Сім'янка: розмір	середній	5
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БУРЯК (КОРМОВИЙ, ЦУКРОВИЙ)

*Буряк цукровий*





Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 17069032 Назва сорту: АННАМІРА КВС Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191004

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13,8	11,2
+,- до усередненого збору цукру, т/га		4,34	2,86
+,- до усередненого збору цукру, %		46,1	34,1
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		73,8	60,2
+,- до усередненої урожайності, т/га		21,98	14,03
+,- до усередненої урожайності, %		42,4	30,4
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		18,9	18,1
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		92,3	81,3
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 17069012 Назва сорту: БТС 1730 Заявник (код): 1974 Власник сорту (код): 1974

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190992

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		14	10,9
+,- до усередненого збору цукру, т/га		4,6	2,49
+,- до усередненого збору цукру, %		48,9	29,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		71,9	59,4
+,- до усередненої урожайності, т/га		20,07	13,29
+,- до усередненої урожайності, %		38,7	28,8
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,5	17,8
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		91,4	81,3
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренієм, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell  
**Заявка № 17069014 Назва сорту:** БТС 4905 Н **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190994**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,4	10,8
+,- до усередненого збору цукру, т/га		2,98	2,45
+,- до усередненого збору цукру, %		31,7	29,2
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		66,9	58,4
+,- до усередненої урожайності, т/га		15,04	12,28
+,- до усередненої урожайності, %		29	26,6
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		18,4	18,1
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів в у ґрунт, %		91,7	81
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 17069015 Назва сорту: БТС 5735 Заявник (код): 1974 Власник сорту (код): 1974

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190995

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7
9	Листок: за розміром пластинки	великий	7
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13,1	10,5
+/- до усередненого збору цукру, т/га		3,65	2,12
+/- до усередненого збору цукру, %		38,7	25,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		69	58,1
+/- до усередненої урожайності, т/га		17,21	11,98
+/- до усередненої урожайності, %		33,2	26
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,1	17,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів в у ґрунт, %		88,5	79
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 17069011 Назва сорту:** БТС 7160 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190991**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,8	10,2
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,37	1,82
+,- до усередненого збору цукру, %		35,8	21,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		66,9	56,5
+,- до усередненої урожайності, т/га		15,04	10,31
+,- до усередненої урожайності, %		29	22,3
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19	17,8
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		89,2	78,3
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		5	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання			

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 17069013 Назва сорту: БТС 9975 Заявник (код): 1974 Власник сорту (код): 1974

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190993

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13	10,5
+/- до усередненого збору цукру, т/га		3,61	2,11
+/- до усередненого збору цукру, %		38,3	25,2
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		67,4	57
+/- до усередненої урожайності, т/га		15,54	10,88
+/- до усередненої урожайності, %		30	23,6
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,5	18
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		90,3	80,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 17069020 Назва сорту:** ІГУАНА **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200006**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	слабкий	3
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	широкий	7
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13,2	12,3
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,81	3,94
+,- до усередненого збору цукру, %		40,5	47
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		70,8	66,5
+,- до усередненої урожайності, т/га		18,98	20,33
+,- до усередненої урожайності, %		36,6	44,1
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		18,9	18,1
Придатність до механізованого збирання, бал		7	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		86	80,2
Стійкість до цвітущості, бал		8	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	2
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell  
**Заявка № 17069026 Назва сорту:** КОНЦЕРТИНА КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191000**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,7	11,8
+/- до усередненого збору цукру, т/га		3,28	3,41
+/- до усередненого збору цукру, %		34,9	40,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		66,6	65
+/- до усередненої урожайності, т/га		14,76	18,87
+/- до усередненої урожайності, %		28,5	40,9
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,1	17,8
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплодів в у ґрунт, %		93	78
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.



**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 17069021 Назва сорту:** ЛІВІОЛА КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190996**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
14	Листкова пластинка: характер поверхні	сильно гофрована	7
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13,2	10,4
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,74	2,07
+,- до усередненого збору цукру, %		39,7	24,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		70,7	58,8
+,- до усередненої урожайності, т/га		18,82	12,64
+,- до усередненої урожайності, %		36,3	27,4
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		18,9	17,5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		88,3	78,2
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 17069018 Назва сорту: МАНІТУ Заявник (код): 1628 Власник сорту (код): 1628

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200004

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,8	11,7
+/- до усередненого збору цукру, т/га		3,35	3,28
+/- до усередненого збору цукру, %		35,6	39,1
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		67,2	61,3
+/- до усередненої урожайності, т/га		15,32	15,17
+/- до усередненої урожайності, %		29,6	32,9
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,1	18,6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		91,5	79,5
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 17069025 Назва сорту:** ПРЕЦІОЗА КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190999**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,9	12,7
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,52	4,34
+,- до усередненого збору цукру, %		37,4	51,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		69,2	67,8
+,- до усередненої урожайності, т/га		17,38	21,66
+,- до усередненої урожайності, %		33,5	46,9
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		18,8	18,4
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		90,8	78,5
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell  
**Заявка № 17069023 Назва сорту:** САНТОРІНА КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190998**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13,2	11
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,78	2,59
+,- до усередненого збору цукру, %		40,2	30,9
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		68,1	60,5
+,- до усередненої урожайності, т/га		16,26	14,39
+,- до усередненої урожайності, %		31,4	31,2
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,3	17,8
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		90,6	78,5
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 17069019 Назва сорту: CIY Заявник (код): 1628 Власник сорту (код): 1628

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200005

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,5	11,7
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,07	3,36
+,- до усередненого збору цукру, %		32,5	40,1
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		65,2	61,8
+,- до усередненої урожайності, т/га		13,36	15,63
+,- до усередненої урожайності, %		25,8	33,9
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,3	18,5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		88	78,8
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell  
**Заявка № 17069027 Назва сорту:** СМАРТ БРИГА КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191001**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13,4	11,1
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,99	2,74
+,- до усередненого збору цукру, %		42,4	32,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		69,2	60,7
+,- до усередненої урожайності, т/га		17,32	14,54
+,- до усередненої урожайності, %		33,4	31,5
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,5	18
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		92,3	80,5
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		тхн	тхн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 17069022 Назва сорту:** СМАРТ ДАНУТА КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190997**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13	11,8
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,54	3,46
+,- до усередненого збору цукру, %		37,6	41,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		68,2	63,3
+,- до усередненої урожайності, т/га		16,35	17,14
+,- до усередненої урожайності, %		31,5	37,1
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,1	18,3
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		87,4	80,3
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 17069029 Назва сорту: СМАРТ НАРНІЯ КВС Заявник (код): 2092 Власник сорту (код): 2092

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191002

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	вузький	3
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12	11,9
+/- до усередненого збору цукру, т/га		2,56	3,55
+/- до усередненого збору цукру, %		27,2	42,4
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		65	64,8
+/- до усередненої урожайності, т/га		13,18	18,61
+/- до усередненої урожайності, %		25,4	40,3
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		18,5	17,9
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		91,3	78,3
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.



**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 17069031 Назва сорту:** СТЕПАНКА КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191003**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	великий	7
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	вузький	3
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ранній	3
23	Коренеплід: розмір	великий	7
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		13,5	11,3
+,- до усередненого збору цукру, т/га		4,11	2,88
+,- до усередненого збору цукру, %		43,6	34,4
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		70,4	59,8
+,- до усередненої урожайності, т/га		18,56	13,69
+,- до усередненої урожайності, %		35,8	29,7
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,1	18,4
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		89,4	81,7
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 15069006 Назва сорту: Фантазія Заявник (код): 884 Власник сорту (код): 884

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200003

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	червоно-пурпурове	6
6	Рослина: тип розетки	розлога	5
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	широкий	7
19	Черешок: забарвлення	біле	1
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	пізній	7
23	Коренеплід: розмір	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,6	10,4
+/- до усередненого збору цукру, т/га		3,16	1,98
+/- до усередненого збору цукру, %		33,5	23,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		64,9	57,3
+/- до усередненої урожайності, т/га		13,06	11,17
+/- до усередненої урожайності, %		25,2	24,2
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,4	17,6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів в у ґрунт, %		88,5	78,7
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 17069034 Назва сорту:** ФДР18Б1086 **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200008**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,4	10,8
+,- до усередненого збору цукру, т/га		2,93	2,46
+,- до усередненого збору цукру, %		31,1	29,3
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		66	58,9
+,- до усередненої урожайності, т/га		14,18	12,75
+,- до усередненої урожайності, %		27,4	27,6
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		18,8	17,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		88,6	79,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		5	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 17069033 Назва сорту: ФДР18Б1089 Заявник (код): 796 Власник сорту (код): 796

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200007

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	жовте	3
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	овально-конічна	5
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,1	10,5
+/- до усередненого збору цукру, т/га		2,67	2,15
+/- до усередненого збору цукру, %		28,3	25,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		63,9	56,7
+/- до усередненої урожайності, т/га		12,1	10,53
+/- до усередненої урожайності, %		23,3	22,8
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19	18,1
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплодів в у ґрунт, %		86	78,2
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		6	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка №** 17069035 **Назва сорту:** ФДР18Б4020 **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200009

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плідність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	жовте	3
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: забарвлення	зелене	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: розмір	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	овально-конічна	5
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		9,42	8,38
Збір цукру, т/га		12,7	10
+,- до усередненого збору цукру, т/га		3,3	1,64
+,- до усередненого збору цукру, %		35,1	19,5
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,05	0,07
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		51,83	46,14
Урожайність, т/га		65	53,7
+,- до усередненої урожайності, т/га		13,13	7,56
+,- до усередненої урожайності, %		25,3	16,4
Довірчий інтервал, т/га		0,68	1,06
Цукристість, %		19,6	18,4
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів в у ґрунт, %		87,9	77,5
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		7	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КАРТОПЛЯ

*Картопля*



Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 17088003 Назва сорту: Джолі Заявник (код): 738 2600 Власник сорту (код): 738 2600

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.07.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191037

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	конічна	3
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабке	3
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість корневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5
25	Листочок: глясуватість верхнього боку	помірно глясуватий	5
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		203,6	164,6
Довірчий інтервал, ц/га (±)		14,8	6,0
Урожайність, ц/га		257,0	228,0
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га		53,4	63,4
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %		26	38
Вміст крохмалю, %		13,6	13,3
Збір крохмалю, ц/га		34,9	30,3
Вміст сухої речовини, %		21,1	20,5
Тривалість періоду вегетації, діб		109	100
Середня маса товарної бульби, г		191,4	96,0
Товарність бульб, %		73,6	74,0
Лежкість, бал		5	9
Дегустаційна оцінка, бал		6	9
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		Стійкий	Стійкий
Стійкість проти макроспоріозу, бал		9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		9	9
Напрямок використання		стл	стл
Якість		скр	скр

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 16088005 Назва сорту: Сагіта Заявник (код): 738 Власник сорту (код): 738

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.07.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191036

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	малий	3
2	Світловий паросток: форма	сферична	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	листовий	3
13	Рослина: габітус	розлогий	7
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	малий	3
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: заглиблення жилок	мілке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	не глянуватий	3
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	видовжена	5
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	біле	1
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		203,6	164,6
Довірчий інтервал, ц/га (±)		14,8	6,0
Урожайність, ц/га		260,8	218,0
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га		57,2	53,4
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %		28	32
Вміст крохмалю, %		16,1	14,5
Збір крохмалю, ц/га		42,0	31,6
Вміст сухої речовини, %		24,1	22,4
Тривалість періоду вегетації, діб		105	104
Середня маса товарної бульби, г		124,5	90,1
Товарність бульб, %		76,9	75,1
Лежкість, бал		6	9
Дегустаційна оцінка, бал		7	9
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		Стійкий	Стійкий
Стійкість проти макроспоріозу, бал		9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		9	9
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пкр	скр

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.



Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 16088003 Назва сорту: Таурас Заявник (код): 738 Власник сорту (код): 738

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.07.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191035

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	малий	3
2	Світловий паросток: форма	сферична	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість корневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: заглиблення жилок	глибоке	7
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		203,6	164,6
Довірчий інтервал, ц/га (±)		14,8	6,0
Урожайність, ц/га		248,8	183,0
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га		45,2	18,4
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %		22	11
Вміст крохмалю, %		17,8	17,4
Збір крохмалю, ц/га		44,3	31,8
Вміст сухої речовини, %		26,7	25,8
Тривалість періоду вегетації, діб		100	106
Середня маса товарної бульби, г		102,3	83,3
Товарність бульб, %		63,8	70,6
Лежкість, бал		7	9
Дегустаційна оцінка, бал		9	9
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		Стійкий	Стійкий
Стійкість проти макроспоріозу, бал		9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		9	9
Напрямок використання		стл	стл
Якість		пкр	пкр

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 16088013 Назва сорту: Торнадо Заявник (код): 2243 Власник сорту (код): 2243

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200012

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	сферична	1
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	листовий	3
13	Рослина: габітус	розлогий	7
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7
15	Листок: загальний розмір	малий	3
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5
20	Друга пара бічних листочків: розмір	великий	7
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5
28	Рослина: за висотою	середня	5
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	великий	7
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час досягання	ранній	3
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		160,3	162,7
Довірчий інтервал, ц/га (±)		27,0	13,3
Урожайність, ц/га		289,2	231,1
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га		128,9	68,4
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %		80	42
Вміст крохмалю, %		14,1	13,1
Збір крохмалю, ц/га		40,8	30,3
Вміст сухої речовини, %		21,2	20,0
Тривалість періоду вегетації, діб		93	92
Середня маса товарної бульби, г		126,9	91,1
Товарність бульб, %		78,9	70,5
Лежкість, бал		7	9
Дегустаційна оцінка, бал		8	7
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		Стійкий	Стійкий
Стійкість проти макроспоріозу, бал		9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		9	9
Напрямок використання		стл	стл
Якість		скр	скр

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

*Боби кінські*  
*Грястиця збірна*  
*Костриця овеча*  
*Костриця очеретяна*  
*Костриця червона*  
*Люцерна мінлива*  
*Люцерна посівна*  
*Просо африканське*



**Вид:** Боби кінські *Vicia faba* L. var. *minor*

**Заявка № 18094004 Назва сорту:** Сіріус **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 31.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190990**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листя: забарвлення	помірно зелене	2
2	Час цвітіння (50% рослин хоча б з однією квіткою)	середній	5
3	Лише для сортів з меланіновою плямою. Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
4	Листочок: за довжиною (базальна пара листочків другого квіткового вузла)	середній	5
5	Листочок: за шириною	середній	5
6	Листочок: місце максимальної ширини	посередині	2
7	Квітка: за довжиною	середня	5
8	Крило: меланінова пляма	наявна	9
9	Крило: забарвлення меланінової плями	чорне	2
10	Парус: антоціанове забарвлення	наявне	9
11	Парус: поширення антоціанового забарвлення	мале	3
12	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
13	Рослина: за висотою	середня	5
14	Стебло: кількість вузлів (до першого квіткового вузла включно)	середня	5
15	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5
16	Біб: за шириною (від шва до шва)	середній	5
17	Суша насінина: форма поздовжнього розрізу	еліптична	2
18	Суша насінина: маса 100 насінин	середня	5
19	Суша насінина: забарвлення насінневої шкірки (відразу після збирання)	бежеве	1
20	Суша насінина: чорна пігментація рубчика	наявна	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння, т/га – 4,2. Урожайність зеленої маси, т/га – 48. Вміст білка в зеленій масі, % – 19. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб: бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F.Sm.), бал (1–9) – 8; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.), бал (1–9) – 7; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.), бал (1–9) – 7; смугаста плямистість (*Bacterium lathyri* (Mann. et Taub.) Burgw.), бал (1–9) – 6. Стійкість проти шкідників: бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Voh.), бал (1–9) – 5; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.), бал (1–9) – 8; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.), бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Грястиця збірна *Dactylis glomerata* L.

**Заявка № 18182001 Назва сорту:** Альдебаран **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191012**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	тетраплоїд	4
2	Листок: за жорсткістю (вегетативний ріст без яровизації)	помірної жорсткості	5
3	Рослина: тенденція до формування суцвіть (без яровизації)	слабка	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення (після яровизації)	помірна	5
5	Рослина: час появи суцвіття (після яровизації)	пізній	7
6	Рослина: габітус за появи суцвіття	напівпрямий	3
7	Рослина: за довжиною найдовшого стебла, включаючи суцвіття (за повного розвитку)	довга	7
8	Стебло: за довжиною верхнього міжвузля (як для 7)	середнє	5
9	Суцвіття: за довжиною (як для 7)	довге	7
10	Прапорцевий листок: за довжиною (як для 7)	середній	5
11	Прапорцевий листок: за шириною (як для 10)	середній	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,42. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 14,0. Вміст білка, % – 12; клітковини, % – 28. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, дів – 70. Зимостійкість, балів (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 1,2. Посухостійкість, балів – 8. Стійкість до вилягання, балів (1–9) – 7. Стійкість до осипання, балів (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): сажка – 7; антракноз – 7; аскохітоз – 8; борошниста роса – 6; іржа – 7; снігова пліснява – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Костриця овеча *Festuca ovina* L.

**Заявка № 16473002 Назва сорту:** Думас 1 **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191039**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	гексаплоїд	6
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення (влітку в рік сіви)	слабке	3
3	Рослина: за висотою	середня	5
4	Рослина: габітус	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною	ознака не визначається	0
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
8	Листок: сизий наліт	наявний	9
9	Рослина: формування кореневища	відсутнє або слабке (мало помітне)	1
10	Рослина: час виявлення суцвіття	середній	5
11	Рослина: за висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	середня	5
12	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	ознака не визначається	0
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина / ширина	ознака не визначається	0
15	Рослина: за довжиною найдовшого стебла (суцвіття включно; наприкінці цвітіння)	середнє	5
16	Рослина: довжина верхнього міжвузля	середнє	5
17	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	слабке	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,12. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 4. Вміст у сухій речовині білка, % – 14; клітковини, % – 38. Висота рослин, см – 60. Період від сходів (весняного відростання) до збиральної стиглості, днів – 95. Зимостійкість, балів (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 0,55. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 7. Стійкість проти борошнистої роси, бал (1–9) – 7; сажки, бал (1–9) – 7; стебловій іржі, бал (1–9) – 6; антракнозу, бал (1–9) – 7; снігової плісняви, бал (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Костриця очеретяна *Festuca arundinacea* Schreb.

**Заявка № 16205006 Назва сорту:** Томкет 1 **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191040**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	гексаплоїд	6
2	Лише для Ф.р. Рослина: габітус (восени в рік висіву)	ознака не визначається	0
3	Лише для Ф.а. Листки: за фактурою	ніжні	3
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення протягом вегетаційного періоду	помірна	5
5	Лише для Ф.р. Рослина: за довжиною (наприкінці вегетаційного періоду до яровизації)	ознака не визначається	0
6	Рослина: тенденція до формування суцвіття (без яровизації)	сильна	7
7	Рослина: за природною висотою після яровизації (близько 4 тижнів після початку вегетації)	середня	5
8	Рослина: час утворення суцвіття (після яровизації)	середній	5
9	Рослина: габітус з появою суцвіття	напівпрямий	3
10	Рослина: за природною висотою з появою суцвіття	середня	5
11	Рослина: найдовше стебло із суцвіттям включно за довжиною (за повного формування)	коротке	3
12	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
13	Суцвіття: за довжиною (як для 11)	довге	7
14	Прапорцевий листок: за довжиною на типовому стеблі (як для 11)	середній	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,12. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 3,5. Вміст білка, % – 15; клітковини, % – 38. Висота рослин, см – 82. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 85. Зимостійкість, балів (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 8. Посухостійкість, балів (1–9) – 1,2. Стійкість до вилягання, балів (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, балів (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса – 7; сажка – 7; стеблова іржа – 7; антракноз – 8; снігова пліснява – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Костриця червона *Festuca rubra* L.

**Заявка № 18377003 Назва сорту:** ГРИНМІЛ **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191043**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	гексаплоїд	6
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення	помірне	5
3	Рослина: за природною висотою	середня	5
4	Рослина: габітус	напіврозлогий	7
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1
9	Рослина: формування кореневища	відсутнє або слабке	1
10	Рослина: час появи суцвіття	середній	5
11	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	середня	5
12	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	середнє	5
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною (суцвіття включно)	середнє	5
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	довге	7
17	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	помірне	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,15. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 3,5. Вміст білка у сухій речовині, % – 13; клітковини, % – 27. Висота рослин, см – 85. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 70. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 0,98. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 7; сажка – 7; стеблова іржа – 8; антракноз – 8; снігова пліснява – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.



**Вид:** Костриця червона *Festuca rubra* L.

**Заявка № 16377005 Назва сорту:** Корейл **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191041**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	октоплоід	8
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення	помірне	5
3	Рослина: за природною висотою	середня	5
4	Рослина: габітус	напівпрямий	3
5	Листок: за довжиною	довгий	7
6	Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1
9	Рослина: формування кореневища	середнє	2
10	Рослина: час появи суцвіття	ранній	3
11	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	середня	5
12	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	середнє	5
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною (суцвіття включно)	середнє	5
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	довге	7
17	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	помірне	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,13. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 3,8. Вміст білка у сухій речовині, % – 14; клітковини, % – 35. Висота рослин, см – 85. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 85. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 1,3. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; сажка – 7; стеблова іржа – 6; антракноз – 7; снігова пліснява – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Костриця червона *Festuca rubra* L.

**Заявка № 18377002 Назва сорту:** ПІНАФОР **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191042**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	гексаплоїд	6
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення	помірне	5
3	Рослина: за природною висотою	середня	5
4	Рослина: габітус	напіврозлогий	7
5	Листок: за довжиною	довгий	7
6	Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
8	Листок: сизий наліт	відсутній	1
9	Рослина: формування кореневища	середнє	2
10	Рослина: час появи суцвіття	середній	5
11	Рослина: за природною висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	середня	5
12	Прапорцевий листок: за довжиною	короткий	3
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина/ширина	середнє	5
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною (суцвіття включно)	середнє	5
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	середнє	5
17	Суцвіття: за довжиною	коротке	3
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	помірне	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,15. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 3,5. Вміст білка у сухій речовині, % – 13,5; клітковини, % – 26. Висота рослин, см – 65. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, дів – 75. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 1,0. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 7; сажка – 8; стеблова іржа – 7; антракноз – 8; снігова пліснява – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

**Заявка № 15364003 Назва сорту:** Луїза **Заявник (код):** 1698 **Власник сорту (код):** 1698

**Дата пріоритету:** 25.11.2015

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191135**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожай насіння (за 14% вологості), т/га – 0,55. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 81,0/16,8. Вміст білка, % – 20,9; клітковини, % – 25,8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9; пероноспороз – 7; іржа – 7; чорна плямистість стебел – 9; аскохітоз – 7; бура плямистість – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Люцерна мінлива *Medicago × varia* Martyn

Заявка № 15364001 Назва сорту: Одрі Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200080

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	висока	7
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 1	1
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	47,0	98,0	85,0
Довірчий інтервал, ц/га	15,7	25,6	23,5
Урожайність сухої речовини, ц/га	71	74,3	75,1
+/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	24	-23,7	-9,9
+/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	51	-24	-12
Тривалість періоду вегетації, дб	76	112	90
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	6
Стійкість до вилягання, бал	9	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	6	7
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти іржі, бал	7	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал	9	8	8
Залістяність, %	40,8	35,5	29,0
Вміст сирого протеїну, %	20,4	23,6	21,2
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

**Вид:** Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

**Заявка № 16196004 Назва сорту:** Мілкі Макс **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191137**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	висока	7
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5
5	Час початку цвітіння	ранній	3
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня	5
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 6	6
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	43,2	87,4	112,3
Довірчий інтервал, ц/га (±)	4,3	5,1	6,1
Урожайність, ц/га	91,9	94,8	87,3
+/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	48,7	7,5	-25
+/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	113	8	-22
Тривалість періоду вегетації, діб	112	124	66
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість до посухи, бал	9	7	8
Стійкість проти стеблової іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал	8	9	8
Залистяність, %	41,3	64,3	40,3
Вміст сирого протеїну, %	18,6	20,4	21,0
Напрямок використання	корм	корм	корм

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 16196003 Назва сорту: Оксітан Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191136

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	висока	7
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	висока	7
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	довга	7
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	висока	7
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 6	6
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	43,2	87,4	112,3
Довірчий інтервал, ц/га (±)	4,3	5,1	6,1
Урожайність, ц/га	90,2	95	98,4
+/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	47	7,6	-13,9
+/- до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	109	9	-12
Тривалість періоду вегетації, днів	113	125	66
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість до посухи, бал	9	7	8
Стійкість проти стеблової іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал	8	9	8
Залистяність, %	44,1	63,3	40,5
Вміст сирого протеїну, %	19,2	18,8	20,7
Напрямок використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

**Вид:** Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

**Заявка № 15196001 Назва сорту:** Радослава **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669\*

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.04.2019 **Патент №** 190654

**Дата пріоритету:** 26.03.2015

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.03.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 190799

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 3	3
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	51,1	93,4	114,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	11,0	11,1	16,9
Урожайність, ц/га	55,6	118,4	164,2
+ - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	4,5	23,2	50,1
+ - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	9	24	44
Тривалість періоду вегетації, днів	57	92	71
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал	9	8	7
Залистяність, %	47,1	44,8	46,5
Вміст сирого протеїну, %	18,2	19,2	19,7
Напрямок використання	корм	корм	корм

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.**

\* Інформацію щодо власника сорту (код): 1936 люцерни посівної Радослава (заявка № 15196001) надруковану у випуску 2, 2019 вважати помилковою. Правильно читати: власник сорту (код): 1669.

**Вид:** Просо африканське *Pennisetum glaucum* (L.) R.Br.

**Заявка № 17634001 Назва сорту:** Нутріфід **Заявник (код):** 1520 **Власник сорту (код):** 2554

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191178**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сходи: антоціанове забарвлення піхви базального листка	помірне	5
2	Стебло: положення пагонів	напіврозлоге	3
3	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
4	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
5	Листкова пластинка: забарвлення	помірно-зелене	2
6	Листкова піхва: опушення	наявне	9
7	Пиляк: забарвлення	ознака не визначалась	0
8	Час цвітіння	ознака не визначалась	0
9	Соломина: опушення вузла	наявне	9
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Волоть: форма	ознака не визначалась	0
12	Волоть: головна вісь за довжиною	ознака не визначалась	0
13	Волоть: діаметр	ознака не визначалась	0
14	Волоть: ступінь висунання	ознака не визначалась	0
15	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (за винятком верхівки)	ознака не визначалась	0
16	Колоскова луска: кількість щетинок	ознака не визначалась	0
17	Лише сорти з однощетиноквою колосковою лускою. Щетинка: за довжиною	ознака не визначалась	0
18	Лише сорти з багатощетиноквою колосковою лускою. Колоскова луска: щільність щетинок	ознака не визначалась	0
19	Щетинка: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
20	Соломина: діаметр	малий	3
21	Рослина: кількість продуктивних пагонів	мала	3
22	Соломина: антоціанове забарвлення вузла	слабке	3
23	Соломина: антоціанове забарвлення міжвузля	слабке	3
24	Волоть: щільність	ознака не визначалась	0
25	Зернівка: форма	ознака не визначалась	0
26	зернівка: забарвлення	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 16. Висота рослин, см – 150. Тривалість періоду від сходів до укісної стиглості, днів – 100. Кількість укусів, шт. – 3. Вміст у сухій речовині білка, % – 20,5; клітковини, % – 15. Холодостійкість, бал (1–9) – 3. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.



# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

*Баклажан*  
*Буряк столовий*  
*Вігна промениста*  
*Дворядник тонколистий*  
*Диня звичайна*  
*Кабачок*  
*Кавун звичайний*  
*Капуста білоголова*  
*Капуста броколі*  
*Капуста кольрабі*  
*Капуста пекінська*  
*Капуста цвітна*  
*Кукурудза цукрова*  
*Кукурудза цукрова –  
батьківський компонент*  
*Морква*  
*Огірок посівний*  
*Перець однорічний (солодкий)*  
*Помідор їстівний*  
*Редька посівна (редиска)*  
*Салат посівний головчастий*  
*Салат посівний листковий*  
*Салат посівний ромен*  
*Холодок лікарський (спаржа)*  
*Цибуля городня*  
*Цикорій салатний (ендивій)*



**Вид:** Баклажан *Solanum melongena* L.

**Заявка № 18093001 Назва сорту:** МОДАР **Заявник (код):** 1902 **Власник сорту (код):** 1902

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190989**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	слабке	3
3	Рослина: габітус	прямостоячий	1
4	Рослина: за висотою	дуже висока	9
5	Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки)	довге	7
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
8	Стебло: опушення	помірне	5
9	Листкова пластинка: розмір	середній	5
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
11	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
13	Суцвіття: кількість квіток	понад три	2
14	Квітка: розмір	середній	5
15	Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення	помірна	5
16	Плід: за довжиною	середній	5
17	Плід: максимальний діаметр	великий	7
18	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5
19	Плід: основна форма	грушоподібна	4
20	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
21	Плід: верхівка	округла	3
22	Плід: витмка рубця приймочки маточки за глибиною	мілка	3
23	Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин	ознака не визначається	0
24	Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості	фіолетове	3
25	Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки: Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24)	сильна	7
26	Плід: глянуватість (як для 24)	сильна	7
27	Плід: плямистість	відсутня	1
28	Плід: смугастість	відсутня	1
29	Плід: помітність смуг	ознака не визначається	0
30	Плід: щільність смуг	ознака не визначається	0
31	Плід: ребристість	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: квітконіжка за довжиною	середня	5
33	Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою	наявне	9
34	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою	слабка	3
35	Плід: розмір чашечки	середній	5
36	Плід: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1
37	Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки	ознака не визначається	0
38	Плід: шипуватість чашечки	відсутня або дуже слабка	1
39	Плід: зморшкуватість чашечки	дуже слабка	1
40	Плід: забарвлення м'якоті	зеленувате	2
41	Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості	коричневе	4
42	Час початку цвітіння	ранній	3
43	Час фізіологічної стиглості	ранній	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 120. Період від сівби до початку досягання, днів – 100. Період плодоношення, днів – 120. Вміст сухої речовини в плодах, % – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

**Заявка № 17122003 Назва сорту:** Маноло **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200002**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Листок: положення черешка	пряме	1
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	середній	5
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	округла	3
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма кінчика	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	слабке	3
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	відсутні або дуже слабке	1
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сіви)	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 85 т/га. Маса товарного коренеплоду – 210 т/га. Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання – 130 діб. Вміст сухої речовини в плоді – 12,8%; загального цукру – 8,3%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

**Заявка № 17122002 Назва сорту:** Ред Бул **Заявник (код):** 1362 **Власник сорту (код):** 1362

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200001**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	багаторосткове	2
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Листок: положення черешка	пряме	1
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	короткий	3
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	3
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	помірне	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	середній	5
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	пурпурове	4
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5
17	Коренеплід: форма повздовжнього розрізу	яйцевидна	4
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	відсутнє або дуже слабке	1
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	бордове	4
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	слабке	3
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	помірна	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 55 т/га. Маса товарного коренеплоду – 230 г.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Вігна промениста *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek

**Заявка № 16024001 Назва сорту:** Заратустра **Заявник (код):** 2218 **Власник сорту (код):** 2218

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.11.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191006**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1
2	Рослина: тип росту	кущовий	1
3	Рослина: характер росту	індетермінантний	1
4	Лише кущові сорти. Рослина: габітус	напівпрямий	3
5	Тільки кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5
6	Лише виткі сорти. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0
7	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0
8	Рослина: ступінь опушення стебла	слабкий	3
9	Первинні листки: за шириною	вузькі	3
10	Первинні листки: опушення	відсутнє	1
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Суцвіття: кількість квіток у китиці	середня	5
13	Квітка: забарвлення віночка	світло-жовте	1
14	Біб: забарвлення	буре	1
15	Біб: форма	пряма	1
16	Біб: за довжиною	середній	5
17	Біб: за шириною	вузький	3
18	Біб: кількість насінин	велика	7
19	Насінина: форма поперечного перерізу	округло-циліндрична	2
20	Насінина: форма	еліптична	1
21	Насінина: за довжиною	коротка	3
22	Насінина: забарвлення	зелене	1
23	Насіння: маса	середня	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 1,3. Тривалість періоду вегетації, діб – 85. Висота рослин, см – 54. Вміст сирого протеїну, % – 23. Маса 1000 зерен, г – 61. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 5. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta boltshauaeri* Sacc.; *Ascochyta pisi* Lib.) – 5; антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Br. et Cav.; *Colletotrichum truncatum* (Schweinitz) Andrus et Moore) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus*) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

**Вид:** Дворядник тонколистий *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.

**Заявка № 18582002 Назва сорту:** Летіція **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191013**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листок: положення	висхідне	1
2	Листок: колір пластинки	сіро-зелений	2
3	Листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
4	Листок: за довжиною	середній	5
5	Листок: за шириною	середній	5
6	Листок: розсіченість	помірна	5
7	Листок: ширина первинних часток	середні	5
8	Листок: вторинне розчленування	помірне	2
9	Час цвітіння	пізній	7
10	Рослина: за висотою (у фазі цвітіння)	середня	5
11	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірне	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна урожайність зелених листків, т/га – 3,0. Тривалість періоду від сходів до збирання врожаю, діб – 65. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 15; йоду, мг/100 г – 15; заліза, мг/100 г – 1,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Erysiphe communis* (Wallr.) Schltdl.) – 8; плямистість (*Alternaria* ssp.) – 7; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 18147001 Назва сорту: Санвісенте Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191014

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	короткий	3
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	малий	3
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	слабка	3
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	слабка	3
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	коротка	3
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5
11	Черешок: за довжиною	середній	5
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромоноєційні	2
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5
15	Молодий плід: щільність крапок	нещільна	3
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	слабка	3
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	тонка	3
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на ранніх стадіях розвитку плоду	1
24	Плід: за довжиною	середній	5
25	Плід: діаметр	середній	5
26	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	4
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	біле	1
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	помірна	5
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	білуватий	2
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0
36	Плід: щільність плям	відсутня або дуже нещільна	1
37	Плід: розмір плям	ознака не визначається	0
38	Плід: бородавки	відсутні	1
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	сильна	7
40	Плід: форма основи	заокруглена	2
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3
43	Плід: боріздки	відсутні або дуже слабо виражені	1
44	Плід: боріздки за шириною	ознака не визначається	0
45	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0
47	Плід: зморшкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1
48	Плід: коркове утворення	відсутнє	1
49	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначається	0
50	Плід: візерунок коркового утворення	ознака не визначається	0
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	ознака не визначається	0
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	відсутня або дуже низька	1
53	Плід: м'якоть в поздовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	біле	1
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0
57	Плід: консистенція м'якоті	ознака не визначалась	0
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	кремуватий	3
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0
60	Насінина: за довжиною	середня	5
61	Насінина: за шириною	ознака не визначалась	0
62	Насінина: форма	ознака не визначалась	0
63	Насінина: забарвлення	білувате	1

№	Ознака	Проявлення	Код
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5
67	Час достигання	ранній	3
68	Термін зберігання плоду	середній	5
69,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	відсутня	1
69,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
69,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> : Паса 2	ознака не визначалась	0
69,4	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> : Паси 1-2	ознака не визначалась	0
70,1	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси)	наявна	9
70,2	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Паса 2	ознака не визначалась	0
70,3	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Паса 5	ознака не визначалась	0
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> ( <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0
72	Стійкість до колоній ( <i>Aphis gossypii</i> )	відсутня	1
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0
74,2	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Паса E2	ознака не визначалась	0
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	відсутня	1
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 38. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 95. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 68. Вміст сухої речовини в плодах, % – 14%; загального цукру, % – 13. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщ, трипс – 3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса, паса 2,5 – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**



Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraultonia* Filov

Заявка № 17148004 Назва сорту: ГОЛДЕН ГЛОРИ Заявник (код): 1050 Власник сорту (код): 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191017

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядоли	випукла	3
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: ступінь галуження	ознака не визначається	0
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
10	Стебло: крапчастість	наявна	9
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1
12	Листкова пластинка: розмір	малий	3
13	Листкова пластинка: розсіченість	глибока	7
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	мала	3
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	відсутня або мала	1
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	велике	7
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	циліндрична	5
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	жовте	3
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	помірна	5
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	малий	3
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	округлий	1
46	Плід: боріздки	відсутні	1
47	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0
48	Плід: ребра	наявні	9
49	Плід: ступінь виявлення ребер	дуже слабкий	1
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	жовте	3
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	помірна	5
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0

№	Ознака	Проявлення	Код
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1
57	Плід: плямистість	відсутня	1
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначається	0
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	оранжеве	5
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	помірна	5
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	ознака не визначається	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	жовте	2
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насінина: розмір	середній	5
78	Насінина: форма	еліптична	5
79	Насінина: лушпиння	наявне	9
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насінина: забарвлення	кремове	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 80. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 50. Товарність, % – 100. Вміст сухої речовини, % – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 1; фузаріозне в'янення (*Fusarium niveum* E.Sm.) – 1; вірусні хвороби – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

**Заявка № 18146001 Назва сорту:** БАРХАН **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191021**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3
3	Сім'ядолі: розмір	великий	7
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	коротка	3
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	глибока	7
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10–15 листках)	помірна	5
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5
18	Зав'язь: опушення	слабке	3
19	Плід: маса	від великої до дуже великої	8
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	великий	7
24	Плід: заглиблення біля основи	відсутнє або дуже мілке	1
25	Плід: форма апікальної частини	від зрізаної до заокругленої	2
26	Плід: заглиблення верхівки	глибоке	7
27	Плід: розмір рубця маточки	середній	5
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1
30	Плід: вираження смуг	помірне	5
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7
33	Плід: смуги за шириною	середні	5
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2
40	Насінина: розмір	великий	7
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	кремове	2
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наяви	9
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки крапками	1
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	велике	7
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0
50	Листкова пластинка: розмір	великий	5
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з мармуровістю	4
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	довга	7
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	дуже мале	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 70. Вміст сухої речовини в плоді, % – 12,5; загального цукру, % – 7,5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка № 17146008 Назва сорту: ВМХ4746 Заявник (код): 1050 Власник сорту (код): 1050

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191019

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	коротка	3
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	мале	3
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10–15 листках)	помірна	5
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5
18	Зав'язь: опушення	помірне	5
19	Плід: маса	від середньої до великої	6
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5
24	Плід: заглиблення біля основи	милке	3
25	Плід: форма апікальної частини	від зрізаної до заокругленої	2
26	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або дуже милке	1
27	Плід: розмір рубця маточки	середній	5
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0
30	Плід: вираження смуг	помірне	5
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7
33	Плід: смуги за шириною	середні	5
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожеве	4
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насин	велика	3
40	Насінина: розмір	середній	5
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	відсутнє	1
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	ознака не визначається	0
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	ознака не визначається	0
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0
50	Листкова пластинка: розмір	великий	5
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з прожилками і мармуровістю	3
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5
55	Плід: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	мале	3

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 64. Вміст сухої речовини в плоді, % – 12,5; загального цукру, % – 7,8.

Географічні та зони рекомендації використання сорту: СЛ.

**Вид:** Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

**Заявка № 17146006 Назва сорту:** Морган **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191018**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	мале	3
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	слабка	3
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	глибока	7
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10–15 листках)	слабка	3
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	короткий	3
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5
18	Зав'язь: опушення	помірне	5
19	Плід: маса	велика	7
20	Плід: форма позадвужнього розрізу	помірно еліптична	3
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3
25	Плід: форма апікальної частини	від зрізаної до заокругленої	2
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1
30	Плід: вираження смуг	дуже сильне	9
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7
33	Плід: смуги за шириною	дуже широкі	9
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожеве	4
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2
40	Насінина: розмір	середній	5
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	кремове	2
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки крапками	1
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	мале	3
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0
50	Листкова пластинка: розмір	великий	5
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з мармуровістю	4
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	дуже мале	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 78. Вміст сухої речовини в плоді, % – 10; загального цукру, % – 13.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

**Заявка № 18146004 Назва сорту:** Оранж Кінг **Заявник (код):** 1650 **Власник сорту (код):** 1650

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191022**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: форма	вузькоеліптична	1
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	сильна	7
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	слабкий	3
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10–15 листках)	слабка	3
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5
18	Зав'язь: опушення	слабке	3
19	Плід: маса	від середньої до великої	6
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	1
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від слабкої до помірної	4
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3
26	Плід: заглиблення верхівки	середнє	5
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1
30	Плід: вираження смуг	дуже сильне	9
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	помірна	5
33	Плід: смуги за шириною	вузькі	3
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	2
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	відсутня або мала	1
40	Насінина: розмір	малий	3
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	відсутнє	1
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	ознака не визначається	0
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	ознака не визначається	0
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з мармуровістю	4
54	Плід: основне забарвлення смуг	дуже світло-зелене	2
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	середнє	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 22. Вміст сухої речовини в плоді, % – 0,9; загального цукру, % – 39. Період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання, днів – 98; від повних сходів до першого збирання, днів – 76. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): трипс – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

**Вид:** Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

**Заявка № 17146011 Назва сорту:** Тамтам **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191020**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1
6	Рослина: міжвузля за довжиною	короткі	3
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
9	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5
14	Листкова пластинка: пухирчастість (на 10–15 листках)	слабка	3
15	Листкова пластинка: мармуровість	відсутня або слабка	1
16	Черешок: за довжиною	середній	5
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5
18	Зав'язь: опушення	помірне	5
19	Плід: маса	від великої до дуже великої	8
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	4
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	дуже слабка	1
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3
25	Плід: форма апікальної частини	від зрізаної до заокругленої	2
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1
29	Плід: борозенки	відсутні або дуже слабкі	1
30	Плід: вираження смуг	дуже сильне	9
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7
33	Плід: смуги за шириною	вузькі	3
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	тонкий	3
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожево-червоне	5
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7
38	Плід: м'якоть за твердістю	м'яка	3
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	велика	3
40	Насінина: розмір	великий	7
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	кремове	2
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наyjne	9
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки крапками	1
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	мале	3
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3
48,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 1	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 2	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted: Paca 3	ознака не визначалась	0
50	Листкова пластинка: розмір	великий	5
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5
53	Плід: смуги за характером	двокольорові з прожилками і мармуровістю	5
54	Плід: основне забарвлення смуг	дуже темно-зелене	6
55	Плід: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	дуже довга	9
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина/ширина	середнє	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 70. Вміст сухої речовини в плоді, % – 7,1; загального цукру, % – 12.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 17096008 Назва сорту:** Бухарест **Заявник (код):** 744 **Власник сорту (код):** 744

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191024**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1
19	Головка: за довжиною	довга	7
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізний	7
35	Чоловіча стерильність	наявна	9
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 100. Період від сівби до початку досягання, днів – 110. Лежкість, балів (1–9) – 1. Вміст вітаміну С, мг % – 65; загального цукру, % – 4,6; сухої речовини, % – 8,7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8; бактеріоз судинний – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.



**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 17096015 Назва сорту:** ГАЛЛІКАН **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191029**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцеподібна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	малий	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	слабка	3
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкообернено-яйцеподібна	5
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 100. Період від сівби до початку досягання, діб – 105. Лежкість, балів (1–9) – 1. Вміст вітаміну С, мг % – 30; загального цукру, % – 3; сухої речовини, % – 8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 17096011 Назва сорту:** Грін Флеш **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191026**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	сильний	3
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	великий	7
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	коротка	3
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ранній	3
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 60. Період від сівби до початку достигання, днів – 80. Лежкість, балів (1–9) – 1. Вміст вітаміну С, мг % – 65; загального цукру, % – 4,6; сухої речовини, % – 8,7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8; бактеріоз судинний – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 17096010 Назва сорту:** Заказ **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191025**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	поперечноширокоеліптична	4
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	середній	5
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	відсутня	1
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 65. Період від сівби до початку достигання, діб – 95. Лежкість, балів (1–9) – 1. Вміст вітаміну С, мг % – 58; загального цукру, % – 4,2; сухої речовини, % – 7,9. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8; бактеріоз судинний – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 17096007 Назва сорту:** Канто **Заявник (код):** 2281 **Власник сорту (код):** 2281

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200010**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	помірний	5
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	ранній	3
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5
35	Чоловіча стерильність	наявна	9
36	Стойкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 79. Вміст вітаміну С, мг % – 38; загального цукру, % – 4,5; сухої речовини, % – 6,5. Стойкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 17096014 Назва сорту:** ПРОДІКОС **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191028**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцеподібна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	малий	3
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	слабка	3
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкообернено-яйцеподібна	5
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до верхівки	1
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	наявна	9
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 120. Період від сівби до початку досягання, дів – 145. Лежкість, балів (1–9) – 9. Вміст вітаміну С, мг % – 30; загального цукру, % – 3; сухої речовини, % – 11. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8; бактеріоз судинний – 4.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 17096013 Назва сорту:** ТОРЕАДОР **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191027**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	уверненояйцеподібна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	помірний	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкояйцеподібна	6
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: діаметр	середній	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	довга	7
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	наявна	9
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 105. Період від сівби до початку достигання, днів – 110. Лежкість, балів (1–9) – 9. Вміст вітаміну С, мг % – 40; загального цукру, % – 4; сухої речовини, % – 10. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6; бактеріоз судинний – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Капуста броколі *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

**Заявка № 18136003 Назва сорту:** Сігно **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200011**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість стебел	одне	1
2	Рослина: за висотою (за збиральної стиглості)	висока	7
3	Листок: положення (на початку формування головки)	напівпряме	3
4	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5
5	Листок: за шириною	середній	5
6	Листок: кількість часток	середня	5
7	Листкова пластинка: забарвлення	блакитно-зелене	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5
9	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9
10	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5
12	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
13	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
14	Черешок: за довжиною	середній	5
15	Головка: галузки від основи за довжиною (за виключенням стебла)	короткі	3
16	Головка: розмір	великий	7
17	Головка: форма позовдовжнього розрізу	поперечно-еліптична	3
18	Головка: забарвлення	блакитно-зелене	4
19	Головка: інтенсивність забарвлення	сильна	7
20	Головка: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Головка: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: структура тканини	м'яка	3
24	Головка: за щільністю	щільна	7
25	Головка: покривний листок	відсутній	1
26	Рослина: вторинні головки (за збирання)	відсутні	1
27	Рослина: опуклість вторинних головок (як для озн. 26)	слабка	3
28	Квітка: забарвлення	жовте	2
29	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5
30	Час збиральної стиглості (50% рослин)	середній	5
31	Час початку цвітіння (50% рослин мають щонайменше 10% квіток)	ранній	3
32	Чоловіча стерильність	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 18. Тривалість періоду до досягання, діб – 68. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз судинний – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Капуста кольрабі *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *gongylodes* L.

**Заявка № 18098001 Назва сорту: Лех Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191030**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення сім'ядолей	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	ознака не визначалась	0
3	Черешок: перехрещування	відсутнє	1
4	Черешок: за довжиною	середній	5
5	Черешок: за товщиною	середній	5
6	Черешок: за положенням у просторі	похилий	3
7	Листкова пластинка: за положенням у просторі	напівпряма	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
10	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	4
11	Листкова пластинка: розділення на частки стосовно центральної жилки (в нижній частині листка)	відсутні або дуже мало	1
12	Листкова пластинка: кількість часток (у верхній частині листка)	середня кількість	5
13	Листкова пластинка: глибина розчленування (у верхній частині листка)	мілька	3
14	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плеската	2
15	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
16	Листкова пластинка: восковість	сильна	7
17	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	сіруватий	2
18	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
19	Стеблоплід: кількість внутрішніх листків	ознака не визначалась	0
20	Стеблоплід: колір шкірки	біло-зелений	1
21	Стеблоплід: форма у поздовжньому розрізі	поперечно-еліптична	2
22	Стеблоплід: форма верхівки	рівна	5
23	Рослина: початок збиральної стиглості	середній	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 40. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 75. Лежкість, балів (1–9) – 5. Вміст вітаміну С, мг % – 75; загального цукру, % – 2,7; сухої речовини, % – 5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 3; бактеріоз судинний – 3.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**



**Вид:** Капуста пекінська *Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.

**Заявка № 18135001 Назва сорту:** Пікаліна **Заявник (код):** 2506 **Власник сорту (код):** 2506

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.07.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191031**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус (на початку формування головки)	напіврозлогий	2
2	Рослина: за висотою	середня	5
3	Зовнішній листок: за довжиною	довгий	7
4	Зовнішній листок: за максимальною шириною	середній	5
5	Зовнішній листок: форма (до стадії збиральної стиглості)	широко-обернено-яйцеподібна	2
6	Зовнішній листок: форма верхівки	заокруглена	2
7	Зовнішній листок: кількість пухирців на верхній стороні	середня	5
8	Зовнішній листок: розмір пухирців на верхній стороні	середній	5
9	Зовнішній листок: забарвлення	зелене	2
10	Тільки сорти із зеленими зовнішніми листками: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Зовнішній листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
12	Зовнішній листок: ступінь глясватості	слабкий	3
13	Зовнішній листок: опушення (нижнього боку)	слабке	3
14	Зовнішній листок: форма поздовжнього розрізу (виключаючи основу листка)	увігнута	1
15	Зовнішній листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: надрізи краю (дистальної частини)	середні	2
17	Зовнішній листок: ступінь зубчастості краю (основи)	помірний	5
18	Зовнішній листок: форма поперечного перерізу головної жилки (по середині)	увігнута	1
19	Зовнішній листок: головна жилка за довжиною	середня	5
20	Зовнішній листок: головна жилка за шириною (біля основи)	середня	5
21	Зовнішній листок: забарвлення головної жилки	біле	1
22	Головка: за висотою	середня	5
23	Головка: за максимальною шириною	середня	5
24	Головка: форма поздовжнього розрізу	видовжена	5
25	Головка: тип	ознака не визначалась	0
26	Тільки сорти з закритою головою. Верхівка: ступінь перекривання листків	ознака не визначається	0
27	Головка: забарвлення верхівки	жовто-зелене	3
28	Тільки сорти із зеленою верхівкою. Головка: інтенсивність зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
29	Головка: пухирчастість на покривному листку	помірна	5
30	Головка: забарвлення внутрішньої частини	жовте	2
31	Головка: за щільністю (під час збиральної стиглості)	помірної щільності	5
32	Головка: форма кінчика внутрішнього стебла (під час збиральної стиглості)	округла	2
33	Рослина: час збиральної стиглості	середній	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 60. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 65. Тривалість періоду плодоношення, діб – 5. Вміст вітаміну С, мг % – 26; загального цукру, % – 12; сухої речовини, % – 30. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз слизовий, % – 7; бактеріоз судинний, % – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

**Заявка № 17101003 Назва сорту:** Аквата **Заявник (код):** 2015 **Власник сорту (код):** 2015

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191032**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	широкий	7
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	помірна	5
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	сильне	7
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	біле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	пізня	7
27	Скоростиглість: за літнього садіння	від середнього до пізнього осіннього типу	6
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 26. Товарна врожайність, т/га – 25,2. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 110. Період плодоношення, діб – 18. Вміст білка, % – 2,3; вітаміну С, мг % – 125; загального цукру, % – 4,28; сухої речовини, % – 12,7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

**Заявка № 18101001 Назва сорту:** Ількар **Заявник (код):** 1650 **Власник сорту (код):** 1650

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 10.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191034**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	пряме	1
5	Листок: за довжиною	довгий	7
6	Листок: за шириною	широкий	7
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	зелене	1
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3
12	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	3
13	Листок: пухирчатість	слабка	3
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	покрита	3
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	1
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	слабке	3
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	слабка	3
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	жовте	2
26	Скоростиглість: за весняного садіння	дуже рання	1
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ранній осінній тип	3
28	Чоловіча стерильність	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 26. Товарна врожайність, т/га – 25. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 85. Період плодоношення, діб – 20. Вміст білка, % – 2,5; вітаміну С, мг % – 122; загального цукру, % – 3,8; сухої речовини, % – 13,1. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 6; бактеріоз судинний – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

**Заявка № 17101004 Назва сорту:** Овіндолі **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191033**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	широкий	7
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	помірна	5
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	сильне	7
21	Головка: забарвлення	білувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	біле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ранній осінній тип	3
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 25. Товарна врожайність, т/га – 24. Період від повних сходів до початку досягання, діб – 95. Період плодоношення, діб – 20. Вміст білка, % – 2,5; вітаміну С, мг % – 120; загального цукру, % – 3,5; сухої речовини, % – 13,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7; бактеріоз судинний – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

**Заявка № 18103005 Назва сорту:** Мірза **Заявник (код):** 273 **Власник сорту (код):** 273

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200074**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	довга	7	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність качанів, т/га – 27,790. Група стиглості: 2 – середня. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 97. Вміст загального цукру, % – 6,45. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 5; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 5; сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** С, ЗГр.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 17103009 Назва сорту: Турбін Заявник (код): 2087 Власник сорту (код): 2662

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200073

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	широка	7
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність качанів, т/га – 29. Група стиглості: 1 – рання. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 52. Вміст загального цукру, % – 13. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeaе* Burr.) – 8; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 9; сажка пухирчаста (*Ustilago zeaе* Beckm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Вид:** Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

**Заявка № 17903004 Назва сорту:** Багнет **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200078**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 17903003 Назва сорту: МС 736 Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200077

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	коротка	3
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1



Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 17903002 Назва сорту: МС 880 Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200076

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки в просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	пізній	7
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр	середній	5
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

Вид: Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 17903001 Назва сорту: МС 999 Заявник (код): 736 Власник сорту (код): 736

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200075

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки в просторі	сильно похиле	7
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Кукурудза цукрова – батьківський компонент *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

**Заявка № 17903005 Назва сорту:** ОС 711 **Заявник (код):** 736 **Власник сорту (код):** 736

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200079**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки в просторі	сильно похиле	7
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	довгий	7
29	Качан: діаметр	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	коротка	3
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1

**Вид:** Морква *Daucus carota* L.

**Заявка № 17109009 Назва сорту:** Волін **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191140**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: розетка за шириною	середня	5
2	Листок: положення	напівпряме	3
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9
7	Коренеплід: за довжиною	дуже довгий	9
8	Коренеплід: за шириною	вузький	3
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до кінчної форми	середня	5
12	Коренеплід: форма плеча	від плескатої до округлої	2
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	сильно загострений	3
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	відсутній або дуже мала	1
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	дуже великий	9
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабка	1
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 105т/га. Тривалість періоду до досягання – 150 діб; вміст сухої речовини – 12,6%; загального цукру – 9%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 17109007 Назва сорту: Лес Саїнтес Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191139

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: розетка за шириною	широка	7
2	Листок: положення	горизонтальне	5
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7
4	Листок: розсіченість	груба	7
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	сильно загострений	3
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	середня	5
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	відсутня або дуже мала	1
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	темніше	3
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабка	1
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2

За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 80 т/га. Тривалість періоду до досягання – 110 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Вид:** Морква *Daucus carota* L.

**Заявка № 16109002 Назва сорту:** Нарина **Заявник (код):** 2200 2201 **Власник сорту (код):** 2200 2201

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200083**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: розетка за шириною	середня	5
2	Листок: положення	напівпряме	3
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	взьютотрикутна	4
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до кінчної форми	сильна	7
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	сильно загострений	3
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	середня	5
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	відсутнє або дуже слабка	1
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	ранній	3
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 65 т/га. Тривалість періоду до досягання – 110 діб; вміст сухої речовини – 10,5%; загальної цукру – 9,5%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Морква *Daucus carota* L.

**Заявка № 17109008 Назва сорту:** Новара **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200084**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: розетка за шириною	вузька	3
2	Листок: положення	горизонтальне	5
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середній	5
4	Листок: розсіченість	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7
10	Коренеплід: форма позадвжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	слабка	3
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	середня	5
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильна	7
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	темніше	3
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у позадвжньому розрізі)	слабка	3
26	Коренеплід: надземна частина	середня	5
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в позадвжньому розрізі	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	середня	2
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові пиляки	2

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 85 т/га. Тривалість періоду до досягання – 130 діб; вміст сухої речовини – 6%; загально-го цукру – 5,4%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 18110004 Назва сорту:** БАЗИС **Заявник (код):** 1902 **Власник сорту (код):** 1902

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191142**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	гостра	1
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 3 або 4	5
15	Зав'яз: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	довгий	7
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	кугаста	3
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	біле	1
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: борозенки	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	світло-коричневе	2
34	Плід: горбочки	відсутні	1
35	Плід: розмір горбочків	ознака не визначалась	0
36	Плід: смужки за довжиною	середні	5
37	Плід: плями	відсутні	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3
44	Стойкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стойкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	сприйнятливий	1
46	Стойкість проти борошністої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3
47	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	ознака не визначалась	0
48	Стойкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	наявна	9
49	Стойкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стойкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> ) (CGMMV)	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 280. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,2. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, днів – 48. Тривалість періоду плодоношення, днів – 130.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.



Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 18110011 Назва сорту: Мадейра Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191146

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	ознака не визначалась	0
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	ознака не визначалась	0
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ознака не визначалась	0
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи	гостра	2
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	коротка	3
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	слабка	3
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: борозенки	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	світло-коричневе	2
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малий	3
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3
37	Плід: плями	відсутні	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2
46	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	ознака не визначалась	0
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	ознака не визначалась	0
48	Стійкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> ) (CGMMV)	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 140. Вміст сухої речовини в плоді, % – 5. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 40. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 15110013 Назва сорту: Міф Заявник (код): 1990 Власник сорту (код): 1990**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.01.2020**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200085**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	поникле	3
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	гостра	1
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світла	3
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	моноєційність	1
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2
15	Зав'яз: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	відсутня	1
17	Плід: за довжиною	довгий	7
18	Плід: діаметр	великий	7
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: борозенки	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середній	5
36	Плід: смужки за довжиною	довгі	7
37	Плід: плями	наявні	9
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	по всій довжині	5
40	Плід: щільність плям	щільна	7
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	коричневе	5
44	Стойкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стойкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	ознака не визначалась	0
46	Стойкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	ознака не визначалась	0
47	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	ознака не визначалась	0
48	Стойкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	ознака не визначалась	0
49	Стойкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0
50	Стойкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> ) (CGMMV)	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність – 50 т/га.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 18110008 Назва сорту:** Северін **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191145**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	гостра	1
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	гостра	1
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: борозенки	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	великий	7
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3
37	Плід: плями	відсутні	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i> )	помірно стійкий	2
46	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	помірно стійкий	2
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	сприйнятливий	1
48	Стійкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	відсутня	1
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка ( <i>CVYV</i> )	наявна	9
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)</i> )	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 230. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,4. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 45. Тривалість періоду плодоношення, діб – 120. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): *Cucumis Mosaic Virus* – 8. Заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): не виявлено.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 18110005 Назва сорту:** УБЕДА **Заявник (код):** 1902 **Власник сорту (код):** 1902

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191143**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	коротка	3
4	Листкова пластинка: положення	пряме	1
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 4 або 5	6
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи	гостра	2
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	гостра	1
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: борозенки	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	світло-коричневе	2
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малий	3
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плями	відсутні	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	коричневе	5
44	Стойкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стойкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	високо стійкий	3
46	Стойкість проти борошністої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3
47	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	ознака не визначалась	0
48	Стойкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	відсутня	1
49	Стойкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стойкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> (CGMMV))	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 170. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,2. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, днів – 48. Тривалість періоду плодоношення, днів – 120.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 18110006 Назва сорту:** УНІКУМ **Заявник (код):** 1902 **Власник сорту (код):** 1902

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191144**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	коротка	3
4	Листкова пластинка: положення	пряме	1
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 3 або 4	5
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	малий	3
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	велике	7
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	гостра	1
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7
27	Плід: ребристість	сильна	3
28	Плід: борозенки	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	дуже малий	1
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плями	відсутні	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	сприйнятливий	1
46	Стійкість проти борошністої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3
47	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	ознака не визначалась	0
48	Стійкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	відсутня	1
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> ) (CGMMV)	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 210. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, днів – 45. Тривалість періоду плодоношення, днів – 120.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.  
**Заявка № 17113006 Назва сорту:** Арбалет **Заявник (код):** 2200 2201 **Власник сорту (код):** 2201 2200  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2020  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200086**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	низька	3
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7
12	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3
18	Листок: глясуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	слабка	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7
35	Плід: глясуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	дуже загострена	1
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3
40	Плід: кількість долей	переважно три	3
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 80. Тривалість періоду до досягання, діб – 110. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 100. Вміст вітаміну С, мг/100г – 127; загального цукру, % – 6,5; клітковини, % – 0,28; сухої речовини, % – 6,7. Збудників хвороб, бал (1–9): не виявлено.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 18113007 Назва сорту:** Венера **Заявник (код):** 2507 **Власник сорту (код):** 2507

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191151**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	відсутні	1
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабка	3
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабе	1
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
14	Листок: форма	ланцетна	1
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3
18	Листок: глясуватість	слабка	3
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7
35	Плід: глясуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 80. Тривалість періоду до досягання, дб – 105. Товщина стінки плоду, мм – 8. Середня маса плоду, г – 160. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 280; загального цукру, % – 5,6; клітковини, % – 2,2; сухої речовини, % – 7,2.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 18113013 Назва сорту:** Декстер **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191157**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	плоска	5
18	Листок: глясுவатість	слабка	3
19	Квітконіжка: положення	напівпонижле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	наявне	9
24	Плід: положення	горизонтальне	2
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	ознака не визначалась	0
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	ознака не визначалась	0
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2
33	Плід: забарвлення (за досяганням)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досяганням)	помірна	5
35	Плід: глясுவатість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мількі	3
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5
41	Плід: м'якоть за товщиною	тонка	3
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 310. Тривалість періоду до досягання, дів – 90. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 220. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 300; загального цукру, % – 7; клітковини, % – 44; сухої речовини, % – 15.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**



**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 18113009 Назва сорту:** Джіалте **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191153**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабка	3
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3
18	Листок: глясуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	слабка	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	жовте	1
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	слабка	3
35	Плід: глясуватість	слабка	3
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5
38	Плід: форма верхівки	дуже увігнута	5
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	відсутня	1
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 295. Тривалість періоду до досягання, діб – 103. Товщина стінки плоду, мм – 10. Середня маса плоду, г – 290. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 135; загального цукру, % – 5,8; клітковини, % – 2,1; сухої речовини, % – 7,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль верхівкова – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 18113008 Назва сорту:** Драгоні **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191152**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
14	Листок: форма	ланцетна	1
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3
18	Листок: глясுவатість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	сильна	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7
35	Плід: глясுவатість	сильна	7
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 180. Тривалість періоду до досягання, діб – 97. Товщина стінки плоду, мм – 8. Середня маса плоду, г – 270. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 135; загального цукру, % – 5,8; клітковини, % – 2,1; сухої речовини, % – 7,1.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 18113010 Назва сорту:** Мавера **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191154**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3
18	Листок: глясуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	напівпонижле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	наявне	9
24	Плід: положення	понижле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5
35	Плід: глясуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5
40	Плід: кількість долей	переважно чотири і більше	5
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість проти Tobacco virus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість проти Tobacco virus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість проти Tobacco virus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	відсутня	1
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 305. Тривалість періоду до досягання, діб – 107. Товщина стінки плоду, мм – 9. Середня маса плоду, г – 280. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 140; загального цукру, % – 5,5; клітковини, % – 2,1; сухої речовини, % – 7,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1-9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 17113007 Назва сорту:** Ньютон **Заявник (код):** 2200 2201 **Власник сорту (код):** 2200 2201

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200087**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	низька	3
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3
18	Листок: глясுவатість	слабка	3
19	Квітконіжка: положення	напівпонижле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	сильна	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	понижле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трапецієподібна	6
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	помірна	5
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	сильна	7
35	Плід: глясுவатість	сильна	7
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	дуже товста	9
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсидин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 75. Тривалість періоду до досягання, дбб – 115. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 120. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 130; загального цукру, % – 6,8; клітковини, % – 0,3; сухої речовини, % – 6,5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 18113012 Назва сорту:** Раптор **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191156**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	короткі	3
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабка	3
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	плоска	5
18	Листок: глясуватість	слабка	3
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	горизонтальне	2
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	ознака не визначалась	0
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	ознака не визначалась	0
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	ознака не визначалась	0
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2
33	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	2
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5
35	Плід: глясуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3
40	Плід: кількість долей	переважно три	3
41	Плід: м'якоть за товщиною	тонка	3
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	ознака не визначалась	0
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	середній	5
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 280. Тривалість періоду до досягання, діб – 85. Товщина стінки плоду, мм – 7,5. Середня маса плоду, г – 190. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 320; загального цукру, % – 8; клітковини, % – 4; сухої речовини, % – 16.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 18113011 Назва сорту:** Сардінеро **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191155**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	опукла	7
18	Листок: глясுவатість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пелюсток	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	серцеподібна	3
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досяганням)	жовте	1
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досяганням)	помірна	5
35	Плід: глясுவатість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 320. Тривалість періоду до досягання, діб – 95. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 220. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 330; загального цукру, % – 6; клітковини, % – 5; сухої речовини, % – 17.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

**Заявка № 18113006 Назва сорту:** ТОМ **Заявник (код):** 1902 **Власник сорту (код):** 1902

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191150**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Рослина: за довжиною стебла	довга	7
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірна	5
9	Стебло: опушення вузлів	помірне	5
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7
12	Листок: пластинка за шириною	вузька	3
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
14	Листок: форма	ланцетна	1
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1
17	Листок: форма поперечного перерізу	плоска	5
18	Листок: глясуватість	сильна	7
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	сильна	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	наявне	9
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	довгий	7
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5
35	Плід: глясуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: м'якоть за товщиною	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	відсутня	1
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 84. Тривалість періоду до досягання, дб – 100. Товщина стінки плоду, мм – 9. Середня маса плоду, г – 250. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 12; загального цукру, % – 5,2; клітковини, % – 4; сухої речовини, % – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115031 Назва сорту: Бірікіно Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191172

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	дуже малий	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	малий	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	слабка	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9



№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна урожайність, т/га – 150. Вміст каротину, мг% – 70; сухої речовини в плоді, % – 7; вітаміну С, мг% – 20; загального цукру, % – 5. Загальна кислотність, % – 0,45. Маса товарного плоду, г – 20. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 78. Тривалість періоду плодоношення, діб – 180.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115023 Назва сорту: Вігго Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191166

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5
33	Плід: кількість насінневих камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	відсутня	1
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	жовтий	2

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 280. Вміст каротину, мг% – 31; сухої речовини в плоді, % – 4,7; вітаміну С, мг% – 28; загального цукру, % – 6,2. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 240. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 85. Тривалість періоду плодоношення, діб – 65.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115033 Назва сорту: Джорней Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191174

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	довге	7
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	яйцеподібна	9
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	ознака не визначалась	0
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	ознака не визначалась	0
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	малий	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	слабка	1
65	Плід: епідерміс	жовтий	2

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 400. Вміст каротину, мг% – 6; сухої речовини в плоді, % – 4,4; вітаміну С, мг% – 17; загального цукру, % – 3,8. Загальна кислотність, % – 0,42. Маса товарного плоду, г – 110. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 80. Тривалість періоду плодоношення, діб – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115026 Назва сорту: ДРЦ 564 Заявник (код): 2522 Власник сорту (код): 744

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191168

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	короткий	3
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	дуже малий	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	дуже тонкий	1
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	дуже ранній	1
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	відсутня	1
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 300. Вміст каротину, мг% – 65; сухої речовини в плоді, % – 8; вітаміну С, мг% – 22; загального цукру, % – 5. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 22. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 76. Тривалість періоду плодоношення, діб – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 17115008 Назва сорту: Камі Заявник (код): 2281 Власник сорту (код): 2281

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200088

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глясуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: розмір	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0



№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 240. Вміст каротину, мг% – 29; вітаміну С, мг% – 24; загального цукру, % – 5,2. Загальна кислотність, % – 4. Тривалість періоду плодоношення, днів – 64.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115035 Назва сорту: Компліс Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191176

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	вузький	3
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глясுவатість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: розмір	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	ознака не визначалась	0
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	ознака не визначалась	0
29	Плід: розмір квіткового рубця	ознака не визначалась	0
30	Плід: кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3
33	Плід: кількість насінневих камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0
48.1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48.2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50.1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	наявна	9
50.2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50.3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50.4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50.5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50.6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51.1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51.2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51.3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51.4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глясுவатість шкірки	ознака не визначалась	0
65	Плід: епідерміс	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 500. Вміст каротину, мг% – 65; сухої речовини в плоді, % – 4,4; вітаміну С, мг% – 18. Вміст загального цукру, % – 3,8. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 145. Період від повних сходів до початку дозрівання, днів – 80. Тривалість періоду плодоношення, днів – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115025 Назва сорту: Куртіно Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191167

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глясуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	ознака не визначалась	0
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	ознака не визначалась	0
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	ознака не визначалась	0
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	малий	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	ознака не визначається	0
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48.1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48.2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50.1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50.2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50.3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50.4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50.5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50.6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51.1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51.2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51.3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51.4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глясுவатість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 420. Вміст каротину, мг% – 62; сухої речовини в плоді, % – 6,5; вітаміну С, мг% – 20; загального цукру, % – 4. Загальна кислотність, % – 0,45. Маса товарного плоду, г – 44. Період від повних сходів до початку дозрівання, дів – 80. Тривалість періоду плодоношення, дів – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 17115012 Назва сорту: Нуксі Заявник (код): 2281 Власник сорту (код): 2281

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200089

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	велика	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	дуже великий	9
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досяганням)	оранжеве	3
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досяганням)	оранжеве	3
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	пізній	7
43	Час досягання	пізній	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досяганням)	високий	7
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	жовтий	2

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 270. Вміст каротину, мг% – 32; сухої речовини в плоді, % – 5,1; вітаміну С, мг% – 23; загального цукру, % – 4,9. Загальна кислотність, % – 4. Тривалість періоду плодоношення, діб – 50.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115034 Назва сорту: Органза Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191175

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глясуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	ознака не визначалась	0
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	оберненояйцеподібна	8
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	гостра	5
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3
38	Плід: забарвлення (за досягання)	оранжеве	3
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	оранжеве	3
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ознака не визначалась	0
43	Час досягання	пізний	7
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	наявна	9
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51,2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	наявна	9
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0



№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глясுவатість шкірки	слабка	1
65	Плід: епідерміс	знебарвлення	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 600. Вміст каротину, мг% – 62; сухої речовини в плоді, % – 6; вітаміну С, мг% – 19; загального цукру, % – 4. Загальна кислотність, % – 0,46. Маса товарного плоду, г – 100. Період від повних сходів до початку дозрівання, днів – 82. Тривалість періоду плодоношення, днів – 220.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115046 Назва сорту: Панамера Заявник (код): 2020 Власник сорту (код): 2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200091

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глясுவатість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	відсутня	1
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	наявна	9
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 480. Вміст каротину, мг% – 1,2; сухої речовини в плоді, % – 5,5; вітаміну С, мг% – 20; загального цукру, % – 5,5. Загальна кислотність, % – 0,8. Маса товарного плоду, г – 200. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 70. Тривалість періоду плодоношення, діб – 180.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115018 Назва сорту: ПІНК СВІТНЕС Заявник (код): 2429 Власник сорту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191162

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	переважно галузисте	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5
33	Плід: кількість насінневих камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48.1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48.2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50.1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	наявна	9
50.2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50.3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50.4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50.5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50.6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51.1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51.2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51.3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51.4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	наявна	9
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	низька	3
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глясுவатість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлення	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 350. Вміст каротину, мг% – 25; сухої речовини в плоді, % – 6,5; вітаміну С, мг% – 24,5; загального цукру, % – 7,1. Загальна кислотність, % – 1,9. Маса товарного плоду, г – 200. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 130. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): *Phytophthora infestans* – 2. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): *Trialeurodes vaporariorum* – 1.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115027 Назва сорту: ПІНКІД Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191169

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	короткий	3
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	оранжеве	2
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
30	Плід: форма кінця плоду	від заглибленої до плескатої	2
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	наявна	9
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	наявна	9
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 120. Вміст каротину, мг% – 60; сухої речовини в плоді, % – 4; вітаміну С, мг% – 18; загального цукру, % – 3,5. Загальна кислотність, % – 0,45. Маса товарного плоду, г – 240. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 79. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115022 Назва сорту: Пінкшайн Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191165

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпоникле	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глясுவатість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48.1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48.2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50.1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	наявна	9
50.2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50.3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50.4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50.5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50.6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51.1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51.2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51.3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51.4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1



№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глясுவатість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 240. Вміст каротину, мг% – 32; сухої речовини в плоді, % – 5,1; вітаміну С, мг% – 27; загального цукру, % – 6,1. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 180. Період від повних сходів до початку дозрівання, дів – 82. Тривалість періоду плодоношення, дів – 70.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115017 Назва сорту: ПРАЙД Заявник (код): 1902 Власник сорту (код): 1902

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191161

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	переважно галузисте	3
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	сильна	7
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	великий	7
32	Плід: перикарпій за товщиною	тонкий	3
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	наявна	9
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51,2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глясுவатість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 300. Вміст каротину, мг% – 29; сухої речовини в плоді, % – 8; вітаміну С, мг% – 27; загального цукру, % – 7,5. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 250. Період від повних сходів до початку дозрівання, дів – 100. Тривалість періоду плодоношення, дів – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115047 Назва сорту: Саворина Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191177

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	ознака не визначалась	0
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	дуже малий	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	еліптична	6
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3
32	Плід: перикарпій за товщиною	дуже тонкий	1
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	малий	3
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	відсутня	1
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	відсутня	1
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51,2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1

№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	відсутня	1
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	відсутня	1
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	наявні	9
64	Плід: глясுவатість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	жовтий	2

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 500. Вміст каротину, мг% – 14,9; сухої речовини в плоді, % – 6,5; вітаміну С, мг% – 9; загального цукру, % – 5,5. Загальна кислотність, % – 2,7. Маса товарного плоду, г – 12. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 95. Тривалість періоду плодоношення, діб – 180.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115021 Назва сорту: Саймон Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191164

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	вузький	3
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	ознака не визначалась	0
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5
33	Плід: кількість насінневих камер	більше шести	5
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	відсутня	1
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	відсутня	1
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51,2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	відсутня	1
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	відсутня	1
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	відсутня	1
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	відсутня	1
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1

№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глясுவатість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	жовтий	2

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 270. Вміст каротину, мг% – 31; сухої речовини в плоді, % – 4,7; вітаміну С, мг% – 28; загального цукру, % – 5,8. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 260. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 85. Тривалість періоду плодоношення, діб – 72.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 17115028 Назва сорту: Сентоса Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191160

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: розмір	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	дуже велике	9
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	кутаста (видовжена)	4
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	дуже твердий	9
41	Плід: термін лежкості	дуже тривалий	9
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0



№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 145. Вміст каротину, мг% – 0,7; вітаміну С, мг% – 28; загального цукру, % – 5,1. Загальна кислотність, % – 4,3. Тривалість періоду плодоношення, днів – 97.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115020 Назва сорту: СІК1504 Заявник (код): 2429 Власник сорту (код): 2429

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191163

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	коротке	3	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3	
7	Листок: за довжиною	короткий	3	
8	Листок: за шириною	вузький	3	
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	малий	3	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітковіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітковіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3	
29	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	три-чотири	3	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	до середнього
43	Час досягання	ранній	3	до середнього
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7	
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Раса 1	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0	
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0	
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0	
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0	
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0	
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0	
51,1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
51,2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0	
51,3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0	
51,4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти Leveillula taurica	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глясுவатість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 150. Вміст каротину, мг% – 20; сухої речовини в плоді, % – 7,8; вітаміну С, мг% – 18; загального цукру, % – 7,2. Загальна кислотність, % – 2. Маса товарного плоду, г – 150. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 108. Тривалість періоду плодоношення, діб – 130. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): *Aphidinea* – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115028 Назва сорту: Страбена Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191170

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівпряме	3
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	дуже малий	1
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
12	Листок: глясуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	похиле	7
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітковіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітковіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	малий	3
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	кутаста (видовжена)	4
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	ознака не визначалась	0
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: перикарпій за товщиною	ознака не визначалась	0
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	слабка	3
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	наявна	9
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	наявні	9
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	жовтий	2

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 340. Вміст каротину, мг% – 65; сухої речовини в плоді, % – 7; вітаміну С, мг% – 22; загального цукру, % – 4. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 22. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 76. Тривалість періоду плодоношення, діб – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 17115031 Назва сорту: Стромболіно Заявник (код): 1362 Власник сорту (код): 1362

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200090

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	велика	7
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабе	1
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	короткий	3
8	Листок: за шириною	вузький	3
9	Листок: за розсіченістю	перистий	1
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабе	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	дуже малий	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3
32	Плід: перикарпій за товщиною	дуже тонкий	1
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	помірна	5
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	високий	7
45	Наявність сріблястості	сприятливий	9
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 48. Вміст каротину, мг% – 4,7; вітаміну С, мг% – 13; загального цукру, % – 5,8. Загальна кислотність, % – 0,5. Тривалість періоду плодоношення, дів – 38.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115032 Назва сорту: Філовіта Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191173

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	помірне	5
5	Лише індетермінантні сорти.: Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глянуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	наявне	9
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: розмір	дуже малий	1
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	дуже малий	1
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	дуже малий	1
32	Плід: перикарпій за товщиною	ознака не визначалась	0
33	Плід: кількість насінневих камер	тільки дві	1
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	наявне	9
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	середній	5
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	помірна	5
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: термін лежкості	ознака не визначалась	0
42	Час цвітіння	ранній	3
43	Час досягання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	несприятливий	1
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	відсутня	1
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9
51,2	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	наявна	9
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1



№	Ознака	Проявлення	Код
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	середня	5
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глясுவатість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 380. Вміст каротину, мг% – 65; сухої речовини в плоді, % – 6,7; вітаміну С, мг% – 22; загального цукру, % – 4. Загальна кислотність, % – 0,43. Маса товарного плоду, г – 38. Період від повних сходів до початку дозрівання, дів – 77. Тривалість періоду плодоношення, дів – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 18115030 Назва сорту: Фуджімару Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191171

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	пряме	1
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
12	Листок: глясуватість (як для б)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для б)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: за типом	порівну не галузисте і галузисте	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: забарвлення	жовте	1
20	Квітковіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітковіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: розмір	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	не кругляста	1
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	малий	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	ознака не визначалась	0
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі	малий	3
32	Плід: перикарпій за товщиною	ознака не визначалась	0
33	Плід: кількість насінневих камер	чотири, п'ять або шість	4
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	дуже слабка	1
38	Плід: забарвлення (за досягання)	рожеве	4
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	рожеве	4
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: термін лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час досягання	ранній	3
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	ознака не визначалась	0
45	Наявність сріблястості	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9
48,1	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9
48,2	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9
50,1	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )	наявна	9
50,2	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>	наявна	9
51,2	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість проти <i>Mosaic Virus</i> : Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	наявна	9
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0
57	Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>	ознака не визначалась	0
58	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>	відсутня	1

№	Ознака	Проявлення	Код
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9
61	Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>	наявна	9
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 550. Вміст каротину, мг% – 65; сухої речовини в плоді, % – 5; вітаміну С, мг% – 22; загального цукру, % – 4. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса товарного плоду, г – 220. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 78. Тривалість періоду плодоношення, діб – 200.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

**Заявка № 18118005 Назва сорту:** Бодіам **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191198**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоідність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім`ядолі: розмір	малий	3
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	сіруватий	3
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мала	3
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: діаметр	ознака не визначалась	0
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	вузький	3
19	Коренеплід: форма	округла	2
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	яскраво-червоне (забарвлення кіноварі)	1
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	середній	5
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	слабка	3
30	Коренеплід: за довжиною	ознака не визначалась	0
31	Коренеплід: форма плеча	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 47. Тривалість періоду до досягання, днів – 27. Середня маса плоду, г – 61. Вміст сухої речовини, % – 5; вітаміну С, мг/% – 40. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 8; гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 8; чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

**Заявка № 17118003 Назва сорту:** ФІЛІПАР **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191197**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: розмір	великий	7
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	сіруватий	3
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
17	Коренеплід: діаметр	великий	7
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	вузький	3
19	Коренеплід: форма	округла	2
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1
30	Коренеплід: за довжиною	кородкий	3
31	Коренеплід: форма плеча	округла	2

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 32 т/га. Тривалість періоду до досягання – 28 діб. Середня маса плоду – 25 г. Вміст сухої речовини – 6,5%; вітаміну С – 23 мг/%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

**Заявка № 18421004 Назва сорту:** Алессо **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191248**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	великий	7
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	дуже сильне	9
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	висока	7
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприятливий (відсутня)	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 45. Середня маса головки, г – 430. Щільність головки, бал (1–9) – 7. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 67. Група стиглості: 5 – середня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,6; цукрів, % – 2,8; вітаміну С, мг% – 17. Холодостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhunuz) – 9; чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 8; септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 6; вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 7. Пошкодження (заселення) шкідниками не виявлено.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

**Вид:** Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

**Заявка № 18421003 Назва сорту:** Брайтон **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191247**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	середнє	5
10	Головка: за щільністю	щільна	7
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	середнє	5
13	Головка: форма позовжнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5
17	Листок: форма верхівки	гостра	1
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	середній	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутні	1
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з мількою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	нев'ялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	ранній	3
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	висока	7
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	дуже слабка	1
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприятливий (відсутня)	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 37. Середня маса головки, г – 430. Щільність головки, бал (1–9) – 6. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 62. Група стиглості: 3 – рання. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,6; цукрів, % – 2,8; вітаміну С, мг% – 17. Холодостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

**Вид:** Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

**Заявка № 18421006 Назва сорту:** Джойс **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200103**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	дуже сильне	9
10	Головка: за щільністю	щільна	7
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	сіруватий	3
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: розмір пухирів	середній	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	пізній	7
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	низька	3
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 36. Середня маса головки, г – 750. Щільність головки, бал (1–9) – 9. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 50. Група стиглості: 7 – пізня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,8; цукрів, % – 1,7; вітаміну С, мг% – 19,5. Холодостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhunuz) – 9; чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 7; септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 7; вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 1.

**Географічні та зони рекомендації використання сорту:** СЛП.



Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

Заявка № 19421004 Назва сорту: Едуардо Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191249

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	дуже сильне	9
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позадвожнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	висока	7
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприятливий (відсутня)	1

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 45. Середня маса головки, г – 430. Щільність головки, бал (1–9) – 7. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 45. Група стиглості: 5 – середня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,6; цукрів, % – 2,8; вітаміну С, мг% – 17. Холодостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhanzuz) – 9; чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 7; септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 6; вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 7. Пошкодження (заселення) шкідниками – не виявлено.

Географічні та зони рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

**Вид:** Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

**Заявка № 18421007 Назва сорту:** Лектріс **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200104**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	широкоеліптична	7
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	розчленована	3
7	Рослина: діаметр	великий	7
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	сильне	7
10	Головка: за щільністю	середня	5
11	Головка: розмір	великий	7
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	оберненояцеподібна	7
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	пізній	7
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	низька	3
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 32. Середня маса головки, г – 720. Щільність головки, бал (1–9) – 9. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, днів – 48. Група стиглості: 7 – пізня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,4; цукрів, % – 1,7; вітаміну С, мг% – 19,5. Холодостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhunuz) – 9; чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 7; септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 7; вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 1. Стійкість до пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): попелиця – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

**Заявка № 18421005 Назва сорту:** Топаціо **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200102**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	великі	7
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2
7	Рослина: діаметр	великий	7
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	середнє	5
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	горизонтальне	5
16	Листок: форма	поперечно-вузькоеліптична	6
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	сіруватий	3
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабе	1
34	Час збиральної стиглості	пізній	7
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 34. Середня маса головки, г – 730. Щільність головки, бал (1–9) – 9. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 50. Група стиглості: 7 – пізня. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,4; цукрів, % – 1,6; вітаміну С, мг% – 19,3. Холодостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhanzuz) – 9; чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 7; септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 7; вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 1. Стійкість до пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): попелиця – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata*

**Заявка № 18421002 Назва сорту:** Ферлі **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191246**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	середнє	5
10	Головка: за щільністю	щільна	7
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	сильне	7
13	Головка: форма позовжнього розрізу	округла	3
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	округла	4
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	середній	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутні	1
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	помірне	5
34	Час збиральної стиглості	ранній	3
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	висока	7
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	помірна	5
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприятливий (відсутня)	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 40. Середня маса головки, г – 450. Щільність головки, бал (1–9) – 6. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 65. Група стиглості: 3 – рання. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5,6; цукрів, % – 2,8; вітаміну С, мг% – 17. Холодостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, 3Гр.

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 18120012 Назва сорту:** Біондонна **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191250**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	широкоромбоподібна	8
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	дуже сильна	9
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	сильна	7
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабе	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	помірна	5
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 15. Тривалість періоду до досягання, діб – 50. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 9; біла гниль – 7; септоріоз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 18120015 Назва сорту:** Екстемп **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191252**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	розчленована	3
7	Рослина: діаметр	малий	3
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салату)	напівпряме	3
16	Листок: форма	широкоромбоподібна	8
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	слабка	3
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
26	Листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалась	0
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 37,2. Тривалість періоду до досягання, діб – 52. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; біла гниль – 8; септоріоз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 18120017 Назва сорту: Кодекс Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191254

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	розчленована	3
7	Рослина: діаметр	малий	3
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позадвожнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	оберненояцеподібна	7
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	дуже сильна	9
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузне і плямами	3
24	Листок: глясуватість верхнього боку	сильна	7
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
26	Листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірна	5
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	дуже слабка	1
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) I isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалась	0
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 30,1. Тривалість періоду до досягання, діб – 53. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; біла гниль – 8; септоріоз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 18120016 Назва сорту:** Лалік **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191253**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	розлоге	5
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2
7	Рослина: діаметр	малий	3
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позадвожнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	вузькоеліптична	1
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
26	Листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	ознака не визначалась	0
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стойкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стойкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стойкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалась	0
42	Стойкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 38,9. Тривалість періоду до досягання, діб – 54. Стойкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 7; борошниста роса – 8; біла гниль – 8; септоріоз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.



**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 19120001 Назва сорту: Лока Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191255**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	3
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	часточкова	2
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	широкоромбоподібна	8
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	локальне	1
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузне і плямами	3
24	Листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	сильна	7
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	помірна	5
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	сильна	7
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне гілкування	відсутнє або дуже слабе	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	відсутня	1
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприйнятливий (відсутня)	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 23. Тривалість періоду до досягання, діб – 45. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8; борошниста роса – 7; біла гниль – 7; септоріоз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 18120014 Назва сорту:** Солос **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191251**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	широкоромбоподібна	8
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	дуже сильна	9
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузне і плямами	3
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	сильна	7
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	зубчаста	2
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izoate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиці (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	стійкий (наявна)	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 15. Тривалість періоду до досягання, діб – 52. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 9; біла гниль – 7; септоріоз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*

**Заявка № 18546007 Назва сорту:** Армілья **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191260**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	3
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	малий	3
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	середнє	5
10	Головка: за щільністю	щільна	7
11	Головка: розмір	малий	3
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	широкоеліптична	2
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	ознака не визначалась	0
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	помірна	5
26	Листок: розмір пухирів	середній	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	ознака не визначалась	0
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	нев'ялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	сильне	7
34	Час збиральної стиглості	ранній	3
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	низька	3
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	дуже слабка	1
39	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалась	0
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 20,4. Середня маса плоду, г – 190. Щільність головки, балів – 7. Тривалість періоду до досягання, діб – 55. Лежкість, % – 88. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 7; борошниста роса – 7; антракноз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*

**Заявка № 18546005 Назва сорту:** Веродіта **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191258**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	сильне	7
10	Головка: за щільністю	щільна	7
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	1
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салату)	пряме	1
16	Листок: форма	оберненояцеподібна	7
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	слабка	3
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	слабка	3
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	синусоїдна (городчаста)	1
32	Листкова пластинка: жилкування	нев'ялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	слабке	3
34	Час збиральної стиглості	пізній	7
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалась	0
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 25,8. Середня маса плоду, г – 397. Щільність головки, балів – 5,5. Тривалість періоду до досягання, дб – 57. Лежкість, % – 86. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 9; борошниста роса – 8; антракноз – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*

**Заявка № 18546003 Назва сорту:** Мунред **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191257**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	малий	3
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	середнє	5
10	Головка: за щільністю	середньої щільності	5
11	Головка: розмір	малий	3
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	широкоеліптична	2
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	еліптична	2
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	дуже сильна	9
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже сильна	9
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузне і плямами	3
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	сильна	7
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	нев'ялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	відсутня	1
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприйнятливий (відсутня)	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 30. Середня маса плоду, г – 310. Щільність головки, балів – 7. Тривалість періоду до досягання, діб – 44. Лежкість, % – 80. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 8; борошниста роса – 7; антракноз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

**Вид:** Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*

**Заявка № 18546002 Назва сорту:** Тотана **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2029

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191256**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	великий	7
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	сильне	7
10	Головка: за щільністю	середньої щільності	5
11	Головка: розмір	середній	5
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позовжнього розрізу	вузькоеліптична	1
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салату)	пряме	1
16	Листок: форма	оберненояцеподібна	7
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: розмір пухирів	середній	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3
39	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	відсутня	1
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	наявна	9
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	сприйнятливий (відсутня)	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 35. Середня маса плоду, г – 370. Щільність головки, балів – 7. Тривалість періоду до досягання, діб – 44. Лежкість, % – 80. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 8; борошниста роса – 7; антракноз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, 3Гр.

**Вид:** Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*

**Заявка № 18546006 Назва сорту:** Тудела **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.12.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191259**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	3	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	малий	3	
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3	
9	Тільки сорти із закритою головою. Головка: перекриття верхньої частини листків	середнє	5	
10	Головка: за щільністю	дуже щільна	9	
11	Головка: розмір	малий	3	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0	
13	Головка: форма позовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
14	Листок: за товщиною	товстий	7	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3	
16	Листок: форма	поперечно-широкоеліптична	5	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирів	середній	5	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне гілкування	сильне	7	
34	Час збиральної стиглості	ранній	3	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	пізній	7	до дуже пізнього
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	низька	3	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	дуже слабка	1	
39	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactuca</i> ) Ізолат В1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	відсутня	1	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactuca</i>	стійкий (наявна)	9	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 20,1. Середня маса плоду, г – 217. Щільність головки, балів – 6. Тривалість періоду до досягання, дів – 57. Лежкість, % – 87. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 7; борошниста роса – 8; антракноз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Холодок лікарський (спаржа) *Asparagus officinalis* L.

**Заявка № 18124004 Назва сорту:** Бахус **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200203**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час появи пагонів	пізній	7
2	Пагін: антоціанове забарвлення верхівки	наявне	9
3	Пагін: форма верхівки	широкотрикутна	3
4	Пагін: діаметр біля основи верхівки порівняно з серединою стебла	однаковий	2
5	Пагін: положення покривних листків	слабко відхилені	2
6	Пагін: перший покривний листок при основі верхівки за довжиною	середній	5
7	Пагін: перший покривний листок при основі верхівки за шириною	середній	5
8	Рослина: кількість стебел	середня	5
9	Пагін: відкриття покривних листків	сильно відкриті	7
10	Рослина: щільність філоклодій	помірної щільності	5
11	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5
12	Стебло: за довжиною	середнє	5
13	Стебло: за довжиною до першого розгалуження	довге	7
14	Стебло: діаметр над поверхнею ґрунту	середній	5
15	Час початку цвітіння	пізній	7
16	Тип цвітіння	рослини з андрогермафродитними квітками і рослини з чоловічими квітками з рудиментарними приймочкам	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 9. Ураженість хворобами: кореневою гниллю, % – 7; церкоспорозом, % – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.



**Вид:** Холодок лікарський (спаржа) *Asparagus officinalis* L.

**Заявка № 18124002 Назва сорту:** Кумулюс **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200201**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час появи пагонів	пізній	7
2	Пагін: антоціанове забарвлення верхівки	наявне	9
3	Пагін: форма верхівки	широкотрикутна	3
4	Пагін: діаметр біля основи верхівки порівняно з серединою стебла	однаковий	2
5	Пагін: положення покривних листків	прилегли	1
6	Пагін: перший покривний листок при основі верхівки за довжиною	довгий	7
7	Пагін: перший покривний листок при основі верхівки за шириною	середній	5
8	Рослина: кількість стебел	велика	7
9	Пагін: відкриття покривних листків	помірно відкриті	5
10	Рослина: щільність філоклодій	помірної щільності	5
11	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	слабка	3
12	Стебло: за довжиною	середнє	5
13	Стебло: за довжиною до першого розгалуження	середнє	5
14	Стебло: діаметр над поверхнею ґрунту	великий	7
15	Час початку цвітіння	пізній	7
16	Тип цвітіння	рослини з андрогермафродитними квітками і рослини з чоловічими квітками з рудиментарними приймочкам	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 9. Ураженість хворобами: кореневою гниллю, % – 7; церкоспорозом, % – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Холодок лікарський (спаржа) *Asparagus officinalis* L.

**Заявка № 18124003 Назва сорту:** Пріус **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200202**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час появи пагонів	пізній	7
2	Пагін: антоціанове забарвлення верхівки	наявне	9
3	Пагін: форма верхівки	широкотрикутна	3
4	Пагін: діаметр біля основи верхівки порівняно з серединою стебла	однаковий	2
5	Пагін: положення покривних листків	прилегли	1
6	Пагін: перший покривний листок при основі верхівки за довжиною	короткий	3
7	Пагін: перший покривний листок при основі верхівки за шириною	середній	5
8	Рослина: кількість стебел	велика	7
9	Пагін: відкриття покривних листків	слабко відкриті	3
10	Рослина: щільність філоклодій	помірної щільності	5
11	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5
12	Стебло: за довжиною	довге	7
13	Стебло: за довжиною до першого розгалуження	середнє	5
14	Стебло: діаметр над поверхнею ґрунту	середній	5
15	Час початку цвітіння	пізній	7
16	Тип цвітіння	рослини з андрогермафродитними квітками і рослини з чоловічими квітками з рудиментарними приймочкам	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 8,5. Ураженість хворобами: кореневою гниллю, % – 8; церкоспорозом, % – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Холодок лікарський (спаржа) *Asparagus officinalis* L.

**Заявка № 18124001 Назва сорту:** Сігнул **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200200**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час появи пагонів	пізній	7
2	Пагін: антоціанове забарвлення верхівки	наявне	9
3	Пагін: форма верхівки	широкотрикутна	3
4	Пагін: діаметр біля основи верхівки порівняно з серединою стебла	більший	3
5	Пагін: положення покривних листків	прилегли	1
6	Пагін: перший покривний листок при основі верхівки за довжиною	середній	5
7	Пагін: перший покривний листок при основі верхівки за шириною	широкий	7
8	Рослина: кількість стебел	середня	5
9	Пагін: відкриття покривних листків	помірно відкриті	5
10	Рослина: щільність філоклодій	щільна	7
11	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	слабка	3
12	Стебло: за довжиною	середнє	5
13	Стебло: за довжиною до першого розгалуження	середнє	5
14	Стебло: діаметр над поверхнею ґрунту	середній	5
15	Час початку цвітіння	середній	5
16	Тип цвітіння	рослини з андрогермафродитними квітками і рослини з чоловічими квітками з рудиментарними приймочкам	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 9. Ураженість хворобами: кореневою гниллю, % – 7; церкоспорозом, % – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 17106014 Назва сорту: Монделла Заявник (код): 751 Власник сорту (код): 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200205

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5
2	Листки: положення	пряме	1
3	Листки: восковий наліт	сильний	7
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
5	Листки: зігнутисть	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	середня	5
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	поперечноеліптична	8
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	плеската	2
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	плеската	2
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	ознака не визначалась	0
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	пізній	7
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	низька	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 110. Товарна врожайність, т/га – 100. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 7,6; загального цукру, % – 3,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 6; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Цибуля городня *Allium cepa* L.

**Заявка № 17106013 Назва сорту:** Орленда **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200204**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листки: восковий наліт	помірний	5
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	довгий	7
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	середня	5
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	ознака не визначалась	0
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки сорти цибулі городньої.: Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки сорти цибулі городньої.: Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	пізній	7
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	висока	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 110. Товарна врожайність, т/га – 100. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 7,2; загального цукру, % – 3,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 6; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 17106011 Назва сорту: Поконо Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.12.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191344

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листки: восковий наліт	сильний	7
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	короткий	3
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки сорти цибулі городньої.: Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	вузька	3
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	слабка	3
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	ознака не визначалась	0
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	висока	3

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 90. Товарна врожайність, т/га – 83. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 32; загального цукру, % – 9,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 6; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Цибуля городня *Allium cepa* L.

**Заявка № 17106015 Назва сорту:** Сонома **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.01.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200206**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листки: восковий наліт	сильний	7
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	довгий	7
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	великий	7
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	великий	7
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	середня	5
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	ознака не визначалась	0
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	відсутня або дуже слабка	1
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	пізній	7
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5
36	Чоловіча стерильність	низька	2

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 100. Товарна врожайність, т/га – 96. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 7,6; загального цукру, % – 3,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 6; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

**Заявка № 18121002 Назва сорту:** Бенефайн **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191346**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: діаметр	середній	5
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу	усічена	1
4	Серцевина: тенденція до знебарвлення	помірна	2
5	Листок: вигин верхньої частини	слабкий	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: за шириною	ознака не визначається	0
8	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: за шириною	середній	5
9	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: форма	ознака не визначається	0
10	Листок: забарвлення	світло-сірувато-зелене	9
11	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: розсіченість за глибиною	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: жилкування	віялоподібне	3
13	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: частки за довжиною	довгі	7
14	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зубчастість краю	ознака не визначається	0
15	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: зубчастість краю за довжиною	середня	5
16	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: хвилястість краю	ознака не визначається	0
17	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зморшкватість	ознака не визначається	0
18	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка	мале	3
19	Центральна жилка листка: за шириною біля основи	вузька	3
20	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: антоціанове забарвлення біля основи	відсутнє або дуже слабке	1
21	Стебло: за висотою	низьке	3
22	Стебло: фасціація	нявна	9
23	Стебло: положення бічних пагонів	напівпряме	3
24	Лише для сортів типу ескаріоль. Стебло: форма прилистків	ознака не визначалась	0
25	Квітка: забарвлення	блакитне	4
26	Час споживчої стиглості	ранній	3
27	Час стрілкування	дуже пізній	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 32. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 48. Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз – 7; церкоспороз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.



**Вид:** Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

**Заявка № 18121001 Назва сорту:** Калафайн **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191345**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: діаметр	середній	5
2	Рослина: габітус	горизонтальний	3
3	Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу	заокруглена	2
4	Серцевина: тенденція до знебарвлення	помірна	2
5	Листок: вигин верхньої частини	помірний	2
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: за шириною	ознака не визначається	0
8	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: за шириною	широкий	7
9	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: форма	ознака не визначається	0
10	Листок: забарвлення	темно-жовтувато-зелене	3
11	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: розсіченість за глибиною	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: жилкування	віялоподібне	3
13	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: частки за довжиною	довгі	7
14	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зубчастість краю	ознака не визначається	0
15	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: зубчастість краю за довжиною	середня	5
16	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: хвилястість краю	ознака не визначається	0
17	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зморшкватість	ознака не визначається	0
18	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка	мале	3
19	Центральна жилка листка: за шириною біля основи	вузька	3
20	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: антоціанове забарвлення біля основи	відсутнє або дуже слабке	1
21	Стебло: за висотою	низьке	3
22	Стебло: фасціація	нявна	9
23	Стебло: положення бічних пагонів	напівпряме	3
24	Лише для сортів типу ескаріоль. Стебло: форма прилистків	ознака не визначалась	0
25	Квітка: забарвлення	блакитне	4
26	Час споживчої стиглості	ранній	3
27	Час стрілкування	пізній	7

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 32. Період від сходів до збирання врожаю, днів – 45. Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз – 7; церкоспороз – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

# ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

*Вишня звичайна*  
*Горіх грецький*  
*Груша звичайна*  
*Калина звичайна*  
*Лохина високоросла*  
*Малина*  
*Ожина*  
*Персик звичайний*  
*Слива домашня*  
*Чорниця*  
*Яблуна домашня*



**Вид:** Вишня звичайна *Prunus cerasus* L.

**Заявка № 15257001 Назва сорту:** Пам'ять Артеменка **Заявник (код):** 1912 **Власник сорту (код):** 1912

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.11.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191005**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	помірне	5
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2
3	Дерево: галуження	помірне	5
4	Дерево: розташування бруньок	уздовж усієї гілки	1
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	відсутнє або дуже слабке	1
6	Молодий пагін: опущення верхівки (під час активного росту)	слабке	3
7	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	нормальні	1
8	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
11	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
13	Листкова пластинка: глянуватість	сильна	3
14	Листок: черешок за довжиною	середній	5
15	Листок: антоціанове забарвлення черешка (верхній бік)	помірне	5
16	Листок: відношення довжина листкової пластинки / довжина черешка	середнє	5
17	Листок: нектарники	наявні	9
18	Нектарники: розміщення	як біля основи листкової пластинки, так і на черешку	2
19	Нектарники: забарвлення	світло-червоне	3
20	Прилисток: положення	відхилене від пагона	1
21	Прилисток: розмір	малий	3
22	Прилисток: виступи країв	відсутні або слабкі	1
23	Квітка: діаметр	середній	5
24	Квітка: розташування пелюсток	дотичне	2
25	Квітка: форма пелюстки	оберненояцеподібна	2
26	Квітка: розташування	змішане	4
27	Плід: розмір	великий	7
28	Плід: форма (вигляд з боку черевного шва)	округла	3
29	Плід: форма верхівки	плеската	2
30	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7
31	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5
32	Плід: антоціанове забарвлення плодоніжки	відсутнє	1
33	Плід: кількість приквітков на плодоніжці	відсутні або мала	1
34	Плід: розмір приквітков на плодоніжці	середній	5
35	Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом	наявний	9
36	Плід: забарвлення шкірки	помірно-червоне	3
37	Плід: забарвлення м'якоті	помірно-червоне	3
38	Плід: забарвлення соку	помірно-червоне	4
39	Плід: за твердістю	середній	5
40	Плід: кислотність	помірна	5
41	Плід: цукристість	середня	5
42	Плід: соковитість	висока	7
43	Кісточка: розмір	середній	5
44	Кісточка: форма (вигляд з боку черевного шва)	округла	3
45	Плід: відношення маса плоду / маса кісточки	середнє	5
46	Час початку цвітіння	середній	5
47	Час початку достигання плодів	середній	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 15,6. Середній урожай з дерева, кг – 31,2. Вміст сухих розчинних речовин у плодах, % – 16,8; загального цукру, % – 12,5; вітаміну С, мг/100 г – 18,4; пектинових речовин, % – 2,6. Загальна кислотність, % – 1,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 8; клястероспоріоз – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 7; кісточкова муха – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Група стиглості – сс. Напрямок використання – ун. Схема садіння, м – 5 × 4. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Горіх грецький *Juglans regia* L.

**Заявка № 16284004 Назва сорту:** ГЕТЬМАН **Заявник (код):** 1601 1940 **Власник сорту (код):** 1601 1940

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.08.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191007**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	дуже сильне	9
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	переважно на кінцях довгих пагонів, що відходять від дворічних чи старших гілок (плодоношення купками у вузлах)	2
5	Однорічний пагін: забарвлення	чорнувате	4
6	Листок: форма бічних листочків	вузькоеліптична	3
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	велика	7
8	Горіх: розмір	дуже великий	9
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шва)	яйцеподібна	4
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	яйцеподібна	4
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2
12	Горіх: коефіцієнт округлості	середній	5
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	загострена	1
15	Горіх: виступ апікального кінчика	сильний	7
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	помірна	5
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	вузьке	3
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	глибока	7
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	сильно борозенчаста	3
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	тонка	3
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	слабка	3
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легко	3
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3
26	Ядро: розмір	середній	5
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5
28	Час досягання	середній	5
29	Час початку листопаду	середній	5
30	Листок: стійкість до опадання	стійкий	2
31	Оплодень: стійкість до опадання	повністю стійкий	3
32	Час розпускання вегетативних бруньок	від середнього до пізнього	6
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від середнього до пізнього	6
34	Час цвітіння жіночих квіток	від середнього до пізнього	6
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 7,2. Середній урожай з дерева, кг – 72,0. Середня маса плоду, г – 20,2. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Настання знімальної стиглості, діб – 154. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 5. Вихід ядра, % – 51,1. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 7. Вміст жиру, % – 65,4; білка, % – 14,5; вуглеводів, % – 11,8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 9; горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – не визначалась; чорна плямистість – 8. Група досягання - сс.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**

**Вид:** Горіх грецький *Juglans regia* L.

**Заявка № 16284005 Назва сорту:** КРАСЕНЬ **Заявник (код):** 1601 1940 **Власник сорту (код):** 1601 1940

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.08.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191008**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	сильне	7
2	Дерево: габітус	розлогий	3
3	Дерево: щільність розміщення гілок	щільна	7
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	переважно на кінцях довгих пагонів, що відходять від дворічних чи старших гілок (плодоношення купками у вузлах)	2
5	Однорічний пагін: забарвлення	чорнувате	4
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня	5
8	Горіх: розмір	великий	7
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	яйцеподібна	4
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	яйцеподібна	4
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	округла	2
12	Горіх: коефіцієнт округлості	середній	5
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	зрізана	3
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	загострена	1
15	Горіх: виступ апікального кінчика	сильний	7
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній 2/3	2
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	помірна	5
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	середнє	5
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	мілька	3
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	сильно борозенчаста	3
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	тонка	3
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	слабка	3
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легко	3
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3
26	Ядро: розмір	великий	7
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	велике	7
28	Час достигання	середній	5
29	Час початку листопаду	середній	5
30	Листок: стійкість до опадання	стійкий	2
31	Оплодень: стійкість до опадання	повністю стійкий	3
32	Час розпускання вегетативних бруньок	від середнього до пізнього	6
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від раннього до середнього	4
34	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 2,2. Середній урожай з дерева, кг – 22,0. Середня маса плоду, г – 15,1. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Настання знімальної стиглості, діб – 149. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 5. Вихід ядра, % – 51,3. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 7. Вміст жиру, % – 65,4; білка, % – 14,5; вуглеводів, % – 11,8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 9; горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 9; чорна плямистість – 9. Група достигання – сс.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.

**Вид:** Горіх грецький *Juglans regia* L.

**Заявка № 18284011 Назва сорту:** ТАІСІЯ **Заявник (код):** 2473 **Власник сорту (код):** 2473

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191009**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок (плодоношення на бічних плодкових пагонах)	уздовж однорічного пагона	3
5	Однорічний пагін: забарвлення	світло-коричневе	2
6	Листок: форма бічних листочків	широкоеліптична	7
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня	5
8	Горіх: розмір	середній	5
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	широкояйцеподібна	3
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	широкояйцеподібна	3
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	еліптична	3
12	Горіх: коефіцієнт округлості	малий	3
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	зрізана	3
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	зрізана	3
15	Горіх: виступ апікального кінчика	слабкий	3
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	слабка	3
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	середнє	5
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	середня	5
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	помірно борозенчаста	2
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	середня	5
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	помірна	5
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	середні	5
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легко	3
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3
26	Ядро: розмір	великий	7
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	велике	7
28	Час досягання	від середнього до пізнього	6
29	Час початку листопаду	пізній	7
30	Листок: стійкість до опадання	стійкий	2
31	Оплодень: стійкість до опадання	не стійкий	1
32	Час розпускання вегетативних бруньок	пізній	7
33	Час цвітіння чоловічих квіток	пізній	7
34	Час цвітіння жіночих квіток	пізній	7
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	раніше (протандрічний)	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 5,0. Середній урожай з дерева, кг – 17,0. Середня маса плоду, г – 16,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Настання знімальної стиглості, діб – 140. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 7. Вихід ядра, % – 52. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 8. Вміст жиру, % – 63; білка, % – 13; вуглеводів, % – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 7; горіхова міль – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 8; чорна плямистість – 8. Група досягання – сп.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.

Заявка № 17258002 Назва сорту: Новинка мліївська Заявник (код): 2314 Власник сорту (код): 2314

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.08.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191011

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середнє	5
2	Дерево: галузження	помірне	5
3	Дерево: габітус (форма крони)	прямий	2
4	Однорічний пагін: за формою	прямий	1
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5
6	Однорічний пагін: домінуюче забарвлення з-під сонячного боку	оранжево-коричнєве	4
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	7
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	помітно відхилені	3
10	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення (верхня третина)	слабка	3
13	Листкова пластинка: положення відносно пагона	обвисле	3
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
15	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
16	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5
17	Листкова пластинка: форма основи	серцеподібна	5
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1
19	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3
20	Листкова пластинка: форма краю (верхньої половини)	цілісна	1
21	Листкова пластинка: надрізи країв за глибиною	ознака не визначається	0
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5
23	Черешок: за довжиною	середній	5
24	Черешок: прилистки	наявні	9
25	Прилистки: відстань від основи черешка	середня	5
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на плодушках	1
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5
29	Чашолисток: положення відносно віночка	притиснуте	1
30	Квітка: положення країв пелюсток	відокремлені	1
31	Приймочка: розташування відносно пильків	вище (довгий стовпчик)	3
32	Квітка: розмір пелюстки	малий	3
33	Квітка: форма пелюстки (нігтик до уваги не беруть)	округла	1
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	округла	2
35	Квітка: нігтик за довжиною	середній	5
36	Нестиглий плід: забарвлення чашолистків	зелено-коричнєве	2
37	Плід: за довжиною	середній	5
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5
39	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2
41	Плід: за розміром	великий	7
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1
43	Плід: профіль боків	опуклий	3
44	Плід: основне забарвлення шкірки	жовто-зелене	3
45	Плід: відносне поширення основного забарвлення	помірне	5
46	Плід: відтінок основного забарвлення	рожево-червоний	3
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола чашолистків	відсутнє або дуже мале	1
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення на щічках	мале	3
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1
50	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
51	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5
52	Плід: викривлення плодоніжки	слабке	3
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	розкриті	3
56	Плід: блюдце (як для 55)	наявне	9
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	мілке	3
58	Плід: блюдце за шириною (як для 55)	вузьке	3
59	Плід: форма зони навколо блюдця	пласка	1
60	Плід: структура м'якоті	слабкозерниста	3
61	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
62	Плід: соковитість м'якоті	соковита	7
63	Насінина: форма	еліптична	3
64	Час початку цвітіння	пізній	7
65	Час збиральної стиглості	пізній	7

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 15,35. Середній урожай з дерева, кг – 43,0. Маса плоду (середня), г – 192,0. Маса плоду (максимальна), г – 215,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 3,60; загального цукру, % – 19,44; сухих розчинних речовин у плодах, % – 15,91. Загальна кислотність, % – 0,08. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9; парша – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості – зим. Напрямок використання – свж. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 7 × 4. Дегустаційна оцінка бал (1–9) – 8,4.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**



**Вид:** Калина звичайна *Viburnum opulus* L.

**Заявка № 18303002 Назва сорту: Аня Заявник (код): 1601 2480 Власник сорту (код): 1601 2480**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.10.2019**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191023**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Кущ: за висотою	середній	5
2	Кущ: за шириною	середній	5
3	Кущ: відношення висота / ширина	середнє	5
4	Кущ: кількість скелетних гілок	мала	3
5	Пагін: за товщиною (однорічний)	товстий	7
6	Пагін: забарвлення кори	світло-зелене	1
7	Листок: розмір	великий	7
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
9	Листок: форма краю	пилчаста	1
10	Листок: форма основи	округла	2
11	Листок: кількість лопатей	три	3
12	Листок: прилистки	відсутні	1
13	Черешок листка: за довжиною	середній	5
14	Квітка: розмір	великий	7
15	Зав'язь: опушення	відсутнє	1
16	Зав'язь: форма	округла	2
17	Ягода: розмір	великий	7
18	Ягода: форма	округло-овальна	2
19	Ягода: забарвлення	червоне	3
20	Ягода: за твердістю	середня	5
21	Час розвитку бруньок	середній	5
22	Час початку цвітіння	середній	5

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Життєва форма: 1 – кущ. Строк досягання: 2 – середній. Ступінь самоплідності, % – 28. Урожайність, т/га – 14,5. Середня маса плоду, г – 1,8. Соковитість ягід, % – 80,5. Вміст у плодах: вітаміну С, мг/100 г – 85,4; загального цукру, % – 12,5. Загальна кислотність, % – 1,5. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Транспортбельність, бал (1–9) – 5. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Збудників хвороб – не виявлено. Шкідників – не виявлено.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Лохина високоросла *Vaccinium corymbosum* L.

**Заявка № 18519001 Назва сорту:** Ласка **Заявник (код):** 2470 **Власник сорту (код):** 2470

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191133**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	середня	5
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Однорічний пагін: забарвлення	зелене	1
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5
8	Листок: форма	еліптична	3
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
11	Листок: форма краю	цілокрая	1
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	середнє	5
14	Квітка: форма віночка	дзвоникоподібна	2
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	слабке	3
17	Квітка: ребристість трубки віночка	відсутня	1
18	Плодове гроно: за щільністю	щільне	7
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5
20	Плід: розмір	великий	7
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	сплюснута	3
22	Плід: положення чашолистків	від вертикального до напіввертикального	2
23	Плід: тип чашолистків	прямі	2
24	Плід: діаметр основи чашечки	середній	5
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5
26	Плід: інтенсивність нальоту	сильна	7
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	синє	2
28	Плід: за твердістю	тверда	7
29	Плід: цукристість	висока	7
30	Плід: кислотність	помірна	5
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1
32	Час розпускання вегетативних бруньок	ранній	3
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	дуже ранній	1
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і на пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0
35	Час початку досягання ягід на однорічних пагонах	ранній	3
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку досягання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: 3 – рання. Урожайність, т/га – 16,0. Урожайність, кг/кущ – 6,0. Середня маса ягоди, г – 2,1. Вміст в ягодах вітаміну С, мг/100 г – 14,0; загального цукру, % – 13,0; пектинових речовин, % – 0,55; каротину, мг/100 г – 0,12; антоціанів, мг/100 г – 147,0; флавоноїдів, мг/100 г – 87,0. Загальна кислотність, % – 1,6. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 7. Транспортбельність ягід, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Посухостійкість, бал (1–9) – 3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщі – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Лохина високоросла *Vaccinium corymbosum* L.

**Заявка № 18519002 Назва сорту:** Мавка **Заявник (код):** 2470 **Власник сорту (код):** 2470

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 23.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191134**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	сильна	7
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Однорічний пагін: забарвлення	зелене	1
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення довжина / ширина	велике	7
8	Листок: форма	еліптична	3
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірне	5
11	Листок: форма краю	цілокрая	1
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	довге	7
14	Квітка: форма віночка	дзвоникоподібна	2
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	помірне	5
17	Квітка: ребристість трубки віночка	відсутня	1
18	Плодове гроно: за щільністю	щільне	7
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
20	Плід: розмір	великий	7
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	сплюснута	3
22	Плід: положення чашолистків	вертикальне	1
23	Плід: тип чашолистків	завернуті	3
24	Плід: діаметр основи чашечки	малий	3
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5
26	Плід: інтенсивність нальоту	сильна	7
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	синє	2
28	Плід: за твердістю	тверда	7
29	Плід: цукристість	висока	7
30	Плід: кислотність	помірне	5
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	ранній	3
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і на пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0
35	Час початку досягання ягід на однорічних пагонах	середній	5
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку досягання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Сила росту: 7 – сильна. Група стиглості: 5 – середня. Урожайність, т/га – 19,5. Урожайність, кг/кущ – 7,0. Середня маса ягоди, г – 2,2. Вміст в ягодах вітаміну С, мг/100 г – 16,0; загального цукру, % – 14,0; пектинових речовин, % – 0,51; каротину, мг/100 г – 0,13; антоціанів, мг/100 г – 67,0; флавоноїдів, мг/100 г – 31,0. Загальна кислотність, % – 1,8. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 7. Транспортельність ягід, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Посухостійкість, бал (1–9) – 3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщі – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.

Заявка № 18296004 Назва сорту: Глен Файн Заявник (код): 2221 Власник сорту (код): 2221

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191138

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
2	Рослина: кількість пагонів поточного року	велика	7	
3	Наймолодший пагін: антоціанове забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	наявне	9	
4	Наймолодший пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	слабка	3	
5	Пагони поточного року: наліт	слабкий	3	
6	Пагони поточного року: антоціанове забарвлення	сильне	7	
7	Пагони поточного року: міжвузля за довжиною	довгі	7	
8	Пагони поточного року: вегетативна брунька за довжиною	середня	5	до довгої
9	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: за довжиною	довгий	7	
10	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагін поточного року: за довжиною	ознака не визначається	0	
11	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: забарвлення	пурпурово-коричневе	4	
12	Шипи: наявність	відсутні	1	
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	ознака не визначається	0	
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	ознака не визначається	0	
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	ознака не визначається	0	
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	ознака не визначається	0	
17	Листок: зелене забарвлення верхнього боку	помірне	5	до темного
18	Листок: переважна кількість листочків	три	1	
19	Листок: профіль листочків у поперечному перерізі	увігнутий	1	
20	Листок: зморшкватість	сильна	7	
21	Листок: перекриття бічних листочків	вільні	1	
22	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5	
23	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5	
24	Квітконіжка: кількість шипів	відсутні або дуже мала	1	
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5	
27	Квітка: за розміром	велика	7	
28	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодонісні пагони: положення	від горизонтального до похилого	3	
29	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодонісні пагони: за довжиною	середні	5	до довгих
30	Плід: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
31	Плід: за шириною	широкий	7	
32	Плід: відношення довжина / ширина	велике	7	
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	конічна	3	
34	Плід: розмір окремої кістянки	великий	7	
35	Плід: забарвлення	червоне	4	
36	Плід: глянуватість	сильна	7	
37	Плід: за твердістю	середній	5	до твердого
38	Плід: зрощення кістянок з квітколожем	помірне	5	до сильного
39	Плід: тип основного плодоношення влітку	лише на пагонах минулого року	1	
40	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	ранній	3	до середнього
41	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ознака не визначається	0	
42	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	ранній	3	
43	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
44	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку досягання на пагонах минулого року	ранній	3	
45	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку досягання на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
46	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість періоду плодоношення на пагонах минулого року	велика	7	
47	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість періоду плодоношення на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 22,0. Середній урожай з куща, кг – 3,1. Середня маса плоду, г – 5,0. Вміст вітаміну С, мг% – 32,0; загального цукру, % – 8,4; сухої речовини в плодах, % – 11,2. Загальна кислотність, % – 2,1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 8. Стійкість до хвороб, бал (1–9): іржа – 7; пурпурова плямистість – 7. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): малиновий довгоносок – 7; попелиця – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Дегустаційна оцінка свіжих ягід, бал (1–9) – 8. Напрямок використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Група стиглості – ср. Схема садіння, м – 2,5 × 0,4.

## Географічні та зони рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.

Заявка № 17296004 Назва сорту: Дрісколл Маравілла Заявник (код): 2419 Власник сорту (код): 2419

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200082

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2
2	Рослина: кількість пагонів поточного року	середня	5
3	Наймолодший пагін: антоціанове забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	наявне	9
4	Наймолодший пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки впродовж інтенсивного росту	середня	5
5	Пагони поточного року: наліт	слабкий	3
6	Пагони поточного року: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
7	Пагони поточного року: міжвузля за довжиною	середні	5
8	Пагони поточного року: вегетативна брунька за довжиною	середня	5
9	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: за довжиною	довгий	7
10	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагін поточного року: за довжиною	довгий	7
11	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагін у стані спокою: забарвлення	коричневе	3
12	Шипи: наявність	наявні	9
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	помірно	5
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	малий	3
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	короткі	3
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	пурпурове	7
17	Листок: зелене забарвлення верхнього боку	помірне	5
18	Листок: переважна кількість листочків	п'ять	3
19	Листок: профіль листочків у поперечному перерізі	увігнутий	1
20	Листок: зморшкуватість	помірна	5
21	Листок: перекриття бічних листочків	перекриваються	3
22	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5
23	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5
24	Квітконіжка: кількість шипів	середня кількість	5
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
27	Квітка: за розміром	середня	5
28	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: положення	напівпряме	2
29	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Бічні плодоносні пагони: за довжиною	середні	5
30	Плід: за довжиною	середній	5
31	Плід: за шириною	середній	5
32	Плід: відношення довжина / ширина	середнє	5
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	ширококонічна	2
34	Плід: розмір окремої кістянки	середній	5
35	Плід: забарвлення	червоне	4
36	Плід: глясуватість	сильна	7
37	Плід: за твердістю	дуже твердий	9
38	Плід: зрощення кістянок з квітколожем	помірне	5
39	Плід: тип основного плодоношення	і на пагонах минулого року влітку, і на пагонах поточного року восени	2
40	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	пізній	7
41	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	середній	5
42	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	середній	5
43	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	середній	5
44	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку досягання на пагонах минулого року	пізній	7
45	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку досягання на пагонах поточного року	ранній	3
46	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість періоду плодоношення на пагонах минулого року	середня	5
47	Сорти, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість періоду плодоношення на пагонах поточного року	середня	5

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 40,0. Середній урожай з куща, кг – 7,0. Середня маса плоду, г – 5,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 16,0; загального цукру, % – 8,2; сухих розчинних речовин, % – 13,5. Загальна кислотність, % – 2,0. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 8; іржа – 8; пурпурова плямистість – 8. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): малиновий довгоносик – 8; попелиця – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 5. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Де-густаційна оцінка свіжих ягід, бал (1–9) – 7. Напрямок використання – свж. Транспортність, бал (1–9) – 7. Група стиглості – рс. Схема садіння, м – 1,0 × 0,2.

Географічні та садівні рекомендації використання сорту: Л, Згр.

Вид: Ожина *Rubus subgenus Eubatus* sect. *Moriferi* & *Ursini*

Заявка № 18631003 Назва сорту: Лох Тей Заявник (код): 2221 Власник сорту (код): 2221

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191147

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	від прямого до напівпрямого	2	
2	Рослина: кількість нових пагонів	середня	5	до великої
3	Пагін у стані спокою: за довжиною	довгий	7	
4	Пагін у стані спокою: діаметр (у центральній третині)	великий	7	
5	Пагін у стані спокою: антоціанове забарвлення	сильне	7	
6	Пагін у стані спокою: кількість бічних гілок	середня	5	до великої
7	Пагін у стані спокою: переважаюче розміщення бічних гілок	по всій довжині	3	
8	Пагін у стані спокою: форма поперечного перерізу	куста	3	
9	Пагін у стані спокою: шипи	відсутні	1	
10	Пагін у стані спокою: кількість шипів	ознака не визначається	0	
11	Шипи: розмір	ознака не визначається	0	
12	Шипи: положення верхівки відносно пагона	ознака не визначається	0	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (впродовж активного росту)	сильне	7	до дуже сильного
14	Молодий пагін: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
15	Молодий пагін: кількість залозистих волосків	відсутні або мала	1	
16	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5	
17	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5	
18	Верхівковий листочок: розділення на частки	відсутнє	1	
19	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	ц-подібна	1	
20	Верхівковий листочок: хвилястість краю	слабка	2	
21	Верхівковий листочок: пухирчатість між жилками	слабка	3	
22	Листочок: тип розсіченості краю	двічі зазублений	2	
23	Листочок: розсіченість за глибиною	середня	5	
24	Листок: переважаюча кількість листочків	п'ять	2	
25	Листок: тип	непарноперистий	1	
26	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	5	до сильної
27	Листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5	
28	Черешок: розмір прилистків	середній	5	
29	Квітка: діаметр	середній	5	
30	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
31	Плодоносний бічний пагін: за довжиною	середній	5	до довгого
32	Плід: за довжиною	середній	5	
33	Плід: за шириною	середній	5	
34	Плід: відношення довжина / ширина	середнє	5	
35	Плід: кількість кістянок	середня	5	
36	Плід: розмір кістянки	середній	5	
37	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькоюяцеподібна	3	
38	Плід: забарвлення	синювато-чорне	4	
39	Час розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	
40	Плодоношення на пагонах поточного року	відсутнє	1	
41	Час початку цвітіння на пагонах попереднього року	ранній	3	
42	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року: Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
43	Час початку плодоношення на пагонах попереднього року	дуже ранній	1	
44	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року. Час початку плодоношення на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Напрямок використання – ун. Габітус рослини: 2 – від прямого до напіврозлогого. Група стиглості: 1 – дуже рання. Урожайність, т/га – 26,0. Урожай ягід з куца, кг – 12,0. Середня маса ягоди, г – 4,75. Вміст в ягодах: вітаміну С, мг/100 г сирої речовини – 21,0; загального цукру, % – 9,2; пектинових речовин, % – 0,98; сухих розчинних речовин, % – 13,1; флавоноїдів, мг/100 г сирої речовини – 200,0. Загальна кислотність, % – 0,51. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортність ягід, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium rubi-ideai* (Pers.) Karst.) – 6; антракноз (*Gloeosporium venetum* Speg.) – 8; кореневий рак (*Bacterium tumefaciens* E.F.Sm. et Towns.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): ожиниовий кліщ (*Eriophyes gracilis* Nal.) – 8; златка (*Agrilus aurichalceus* Redt.) – 8.

## Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch

Заявка № 18259002 Назва сорту: Мостиський Заявник (код): 2518 Власник сорту (код): 2518

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191159

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: розмір	великий	7
2	Дерево: за силою росту	середнє	5
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5
9	Квітка: тип	розетковий	2
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	світло-рожеве	3
11	Пелюстка: форма	помірно еліптична	4
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	на одному рівні	2
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	вище	3
17	Пиляки: пилок	наявний	9
18	Зав'язь: опушення	наявне	9
19	Прилистки: за довжиною	довгі	7
20	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плоска	2
24	Листкова пластинка: форма краю	мілкопилчаста	2
25	Листкова пластинка: кут основи	гострий	1
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1
29	Черешок: за довжиною	короткий	3
30	Черешок: нектарники	наявні	9
31	Черешок: форма нектарників	ниркоподібна	2
32	Плід: розмір	середній	5
33	Плід: форма (вигляд збоку)	еліптична	5
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1
37	Плід: помітність шва	помірна	5
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	середня	5
40	Плід: основне забарвлення шкірки	жовте	10
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	дуже велика	9
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	червоний	5
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	суцільний рум'янець	1
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9
45	Плід: щільність опушення шкірки	щільне	7
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глясуватість	ознака не визначається	0
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0
48	Плід: шкірка за товщиною	тонка	3
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	помірне	5
50	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	5
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабе	1
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабе	1
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	помірне	2
55	Плід: волокнистість м'якоті	помірна	2
56	Плід: цукристість	низька	3
57	Плід: кислотність	помірна	3
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	середній	5
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	помірне	5
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5
62	Кісточка: рельєфність поверхні	переважно боріздки	4
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	помірна	5
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	наявне	9
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	помірний	5
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	середній	5
67	Час початку цвітіння	середній	5
68	Час споживої стиглості	дуже ранній	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 40,0. Середній урожай з дерева, кг – 32,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 5,0; загального цукру, % – 5,0; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 135,0; пектинових речовин, % – 0,56; сухих розчинних речовин, % – 7,4. Загальна кислотність, % – 0,53. Маса плоду середня, г – 121,0; максимальна, г – 186,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 9; парша – 6; клястероспоріоз – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 8; попелиця – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Зимостійкість, балів (1–9) – 8. Схема садіння, м – 4 × 2. Група стиглості – др. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**



Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch

Заявка № 18259001 Назва сорту: Мостиський діамант Заявник (код): 2518 Власник сорту (код): 2518

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191158

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: розмір	великий	7
2	Дерево: за силою росту	середнє	5
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлогого	2
4	Квітконосний пагін: за товщиною	середній	5
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5
9	Квітка: тип	розетковий	2
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	рожеве	4
11	Пелюстка: форма	помірно еліптична	4
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	середня	3
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	на одному рівні	2
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	вище	3
17	Пиляки: пилок	наявний	9
18	Зав'язь: опушення	наявне	9
19	Прилистки: за довжиною	короткі	3
20	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плоска	2
24	Листкова пластинка: форма краю	мілкопилчаста	2
25	Листкова пластинка: кут основи	гострий	1
26	Листкова пластинка: кут верхівки	середній	5
27	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	3
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	відсутнє	1
29	Черешок: за довжиною	короткий	3
30	Черешок: нектарники	наявні	9
31	Черешок: форма нектарників	ниркоподібна	2
32	Плід: розмір	великий	7
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	плоска	3
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	1
37	Плід: помітність шва	помірна	5
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	середня	5
40	Плід: основне забарвлення шкірки	жовте	10
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	середня	5
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	червоний	5
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	суцільний рум'янець	1
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9
45	Плід: щільність опушення шкірки	щільне	7
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глясуватість	ознака не визначається	0
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3
50	Плід: твердість м'якоті	тверда	7
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	5
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	помірне	2
55	Плід: волокнистість м'якоті	помірна	2
56	Плід: цукристість	середня	5
57	Плід: кислотність	помірна	3
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	середній	5
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	помірне	5
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5
62	Кісточка: рельєфність поверхні	переважно боріздки	4
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	відсутнє	1
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	ознака не визначається	0
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	середній	5
67	Час початку цвітіння	середній	5
68	Час споживої стиглості	від середнього до пізнього	6

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 40,0. Середній урожай з дерева, кг – 32,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 5,0; загального цукру, % – 8,0; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 187,0; пектинових речовин, % – 0,89; сухих розчинних речовин, % – 12,1. Загальна кислотність, % – 0,79. Маса плоду середня, г – 180,0; максимальна, г – 250,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7; моніліальний опік – 9; парша – 6; клястероспоріоз – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 8; попелиця – 7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 2. Зимостійкість, балів (1–9) – 8. Схема садіння, м – 4 × 2. Група стиглості – сп. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Слива домашня *Prunus domestica* L.

**Заявка № 15261001 Назва сорту:** Янтарна мліївська **Заявник (код):** 1912 **Власник сорту (код):** 1912

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 20.08.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191261**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: сила росту	середня	5
2	Дерево: щільність крони	помірна	5
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	слабке	3
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3
8	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	середній	5
9	Однорічний пагін: форма вегетативної бруньки	тупа	2
10	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	злегка відхилене	2
11	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5
12	Однорічний пагін: опора підбрунькового виступу	відсутня	1
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (впродовж інтенсивного росту)	слабке	3
14	Листкова пластинка: положення по відношенню до пагона	спрямоване назовні	2
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
16	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
17	Листкова пластинка: відношення довжина /ширина	середнє	5
18	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	1
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за виключенням кінчика)	гострий	1
20	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2
21	Листкова пластинка: зелене забарвлення верхнього боку	темне	7
22	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5
23	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє	1
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1
25	Черешок: за довжиною	середній	5
26	Черешок: опушення нижнього боку	слабке	3
27	Листок: відношення довжини листової пластинки до довжини черешка	середнє	5
28	Листок: нектарники	відсутні	1
29	Листок: розміщення нектарників	ознака не визначалась	0
30	Квітучий пагін: кількість квіток	середня	5
31	Квітка: діаметр (повністю відкриті квітки)	великий	7
32	Квітконіжка: за довжиною	довга	7
33	Квітконіжка: опушення	відсутнє	1
34	Чашечка: положення чашолистків	не торкаються ні пелюсток, ні квітколожа	2
35	Чашолисток: форма	вузькоеліптична	1
36	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1
37	Пелюстка: розмір	великий	7
38	Пелюстка: форма	еліптична	1
39	Пелюстка: хвилястість краю	відсутня	1
40	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	вище	3
41	Пиляк: забарвлення (перед розтріскуванням)	жовтувате	1
42	Зав'язь: опушення	відсутнє	1
43	Плід: розмір	великий	7
44	Плід: форма (вигляд збоку)	еліптична	2
45	Плід: симетричність (вигляд збоку)	симетричний	1
46	Плід: шов у напрямку до кінця плодоніжки за глибиною	мілкий	3
47	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або слабке	1
48	Плід: опушення верхівки	відсутнє	1
49	Плід: заглиблення плодоніжки	мілке	3
50	Плід: основне забарвлення шкірочки (після видалення воскового нальоту)	жовте	4
51	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	4
52	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
53	Плід: соковитість	середня	5
54	Плід: ступінь зростання кісточки з м'якоттю	не зрощені	1
55	Кісточка: основна форма (вигляд збоку)	еліптична	2
56	Кісточка: форма з черевного боку	еліптична	2
57	Кісточка: розвиток кіля	середній	5
58	Кісточка: структура бічної поверхні	зерниста	1
59	Кісточка: основа за шириною	середня	5
60	Кісточка: форма верхівки	загострена	1
61	Час початку цвітіння	середній	5
62	Час початку достигання плодів	середній	5

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 5 – середня. Урожайність, т/га – 18,0. Середній урожай з дерева, кг – 43,3. Середня маса плоду, г – 48,6. Середня маса кісточка, г – 2,3. Відокремлення кісточка від м'якоти: 5 – відокремлюється. Вміст в плодах загального цукру, % – 9,8; аскорбінової кислоти, мг/100 г – 6,2. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,3. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): моніліоз (*Monilia cinerea* Bonord.) – 7; червона плямистість (полістігмоз) (*Polystigmia rubra* Sacc.) – 8; іржа (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): сливова плоджерка (*Laspeyresia (Grapholifha) fune-brana* Tr.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Чорниця *Vaccinium corymbosum* L.

Заявка № 18501001 Назва сорту: BV006 Заявник (код): 1975 Власник сорту (код): 1975

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191347

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зелене	1	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	довге	7	
5	Листок: за довжиною	середній	5	до довгого
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	до сильної
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	середнє	5	
14	Квітка: форма віночка	гличкоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	наявна	9	
18	Плодове гроно: за щільністю	середнє	5	до щільного
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до середньої
20	Плід: розмір	середній	5	до великого
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	сплюснута	3	
22	Плід: положення чашолистків	вертикальне	1	
23	Плід: тип чашолистків	завернуті	3	
24	Плід: діаметр основи чашечки	малий	3	до середнього
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5	
26	Плід: інтенсивність нальоту	помірна	5	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	темно-синє	3	
28	Плід: за твердістю	тверда	7	
29	Плід: цукристість	низька	3	
30	Плід: кислотність	висока	7	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Рослина: час розпускання вегетативних бруньок	пізній	7	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	пізній	7	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року.	ознака не визначається	0	
35	Час початку досягання ягід на однорічних пагонах	пізній	7	
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку досягання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Сила росту: 7 – сильна. Група стиглості: 7 – пізня. Урожайність, т/га – 14,0. Урожайність, кг/кущ – 3,5. Середня маса ягоди, г – 1,4. Вміст в ягодах: вітаміну С, мг/100 г – 9,8; загального цукру, % – 6,6; пектинових речовин, % – 0,65; каротину, мг/100 г – 0,3; антоціанів, мг/100 г – 250,0; флавоноїдів, мг/100 г – 250,0. Загальна кислотність, % – 0,85. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8. Транспортальність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофторозна гниль кореня – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

**Вид:** Чорниця *Vaccinium corymbosum* L.

**Заявка № 18501002 Назва сорту:** BB008 **Заявник (код):** 1975 **Власник сорту (код):** 1975

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191348**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	сильна	7	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зеленувато-червоне	2	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	еліптична	3	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
11	Листок: форма краю	зубчата	2	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	сильне	7	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	довге	7	
14	Квітка: форма віночка	гличкоподібна	1	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	сильне	7	
17	Квітка: ребристість трубки віночка	наявна	9	
18	Плодове гроно: за щільністю	нешільне	3	
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
20	Плід: розмір	середній	5	
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	сплюснута	3	
22	Плід: положення чашолистків	від вертикального до напіввертикального	2	
23	Плід: тип чашолистків	завернуті	3	
24	Плід: діаметр основи чашечки	середній	5	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5	
26	Плід: інтенсивність нальоту	дуже слабка	1	до слабкої
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	синє	2	
28	Плід: за твердістю	тверда	7	
29	Плід: цукристість	помірна	5	
30	Плід: кислотність	висока	7	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Рослина: час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	середній	5	
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року.	ознака не визначається	0	
35	Час початку достигання ягід на однорічних пагонах	ранній	3	до середнього
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку достигання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Сила росту: 7 – сильна. Група стиглості: 3 – рання. Урожайність, т/га – 14,0. Урожайність, кг/кущ – 3,5. Середня маса ягоди, г – 1,6. Вміст в ягодах: вітаміну С, мг/100 г – 9,8; загального цукру, % – 6,83; пектинових речовин, % – 0,65; каротину, мг/100 г – 0,3; антоціанів, мг/100 г – 250,0; флавоноїдів, мг/100 г – 250,0. Загальна кислотність, % – 0,8. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофторозна гниль кореня – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

**Вид:** Чорниця *Vaccinium corymbosum* L.

**Заявка № 18501003 Назва сорту:** РЕКА **Заявник (код):** 2516 **Власник сорту (код):** 1975

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 04.10.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191349**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	до сильної
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Однорічний пагін: забарвлення	зеленувато-червоне	2	
4	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (верхня половина)	середнє	5	
5	Листок: за довжиною	середній	5	до довгого
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
8	Листок: форма	яйцеподібна	2	
9	Листок: забарвлення верхнього боку	зелене	2	
10	Сорти з зеленим забарвленням листка. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	до сильної
11	Листок: форма краю	цілокрая	1	
12	Генеративна брунька: антоціанове забарвлення	помірне	5	
13	Суцвіття: за довжиною (без квітконоса)	середнє	5	до довгого
14	Квітка: форма віночка	циліндрична	3	
15	Квітка: трубка віночка за довжиною	середня	5	до довгої
16	Квітка: антоціанове забарвлення трубки віночка	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
17	Квітка: ребристість трубки віночка	наявна	9	
18	Плодове гроно: за щільністю	середнє	5	до щільного
19	Нестиглий плід: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
20	Плід: розмір	середній	5	до великого
21	Плід: форма в поздовжньому розрізі	округла	2	
22	Плід: положення чашолистків	від вертикального до напіввертикального	2	
23	Плід: тип чашолистків	завернуті	3	
24	Плід: діаметр основи чашечки	середній	5	
25	Плід: основа чашечки за глибиною	середня	5	
26	Плід: інтенсивність нальоту	слабка	3	
27	Плід: забарвлення шкірки (після видалення нальоту)	синє	2	
28	Плід: за твердістю	тверда	7	
29	Плід: цукристість	помірна	5	
30	Плід: кислотність	помірна	5	
31	Рослина: тип плодоношення	лише на однорічних пагонах	1	
32	Рослина: час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час початку цвітіння на однорічних пагонах	ранній	3	до середнього
34	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року.	ознака не визначається	0	
35	Час початку досягання ягід на однорічних пагонах	дуже ранній	1	до раннього
36	Сорти з плодоношенням на однорічних пагонах і пагонах поточного року. Час початку досягання плодів на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 1 – дуже рання. Урожайність, т/га – 17,0. Урожайність, кг/кущ – 4,4. Середня маса ягоди, г – 1,94. Вміст в ягодах: вітаміну С, мг/100 г – 11,7; загального цукру, % – 9,1; пектинових речовин, мг/100 г – 0,65; каротину, мг/100 г – 0,3; антоціанів, мг/100 г – 250,0; флавоноїдів, мг/100 г – 250,0. Загальна кислотність, % – 0,33. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофторозна гниль кореня – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиці – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 17263005 Назва сорту: СКЮ 159 Заявник (код): 2417 Власник сорту (код): 2417

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.10.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191350

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	прямий	1	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	до довгих
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричневе	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	5	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	двічігородчаста	2	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	до довгого
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
25	Плід: за висотою	середній	5	до високого
26	Плід: діаметр	середній	5	до великого
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5	
28	Плід: основна форма	куляста	6	
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1	
31	Плід: розмір чашечки	малий	3	до середнього
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	червоний	3	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7	
39	Плід: характер покривного забарвлення	суцільний рум'янець із слабо визначеними смугами	2	
40	Плід: смуги за шириною	середні	5	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевочок	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	неглибока	3	до середньої
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	вузька	3	до середньої
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	неглибоке	3	до середнього
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	вузьке	3	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	до твердої
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	ранній	3	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	до дуже пізнього
57	Час споживчої стиглості	від пізнього до дуже пізнього	8	

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 50,0. Середній урожай з дерева, кг – 15,0. Маса плоду середня, г – 175,0; максимальна, г – 200,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирі маси – 6,1; загального цукру, % – 15,0; пектинових речовин, % – 0,92; сухих розчинних речовин, % – 16,0. Загальна кислотність, % – 1,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіпа попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 6. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 6. Тривалість періоду зберігання, дів – 155. Група стиглості – пс. Напрямок використання – свж. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 1 × 3. Дегустаційна оцінка, балів (1–9) – 9.

## Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.



# ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

*Троянда*



Вид: Троянда *Rosa L.*

Заявка № 17339003 Назва сорту: РЮІЦЛ 1632А Заявник (код): 1569 Власник сорту (код): 1569

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.07.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 191343

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	низька	3	до середньої
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	середня	5	до великої
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	великий	7	до дуже великого
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0	
11	Листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	яйцеподібна	3	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0	
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0	
22	Квітка: кількість пелюсток	середня	5	
23	Квітка: група кольору	червона	10	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	середній	5	до великого
27	Квітка: форма	неправильно-округла	2	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескато-випуклий	2	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескато-випуклий	3	
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1	
31	Чашолисток: розчленування	сильне	7	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	наявне	9	
33	Пелюстка: форма	оберненоеліптична	2	
34	Пелюстка: зубчатість	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
35	Пелюстка: завершення країв	помірне	5	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0	
38	Пелюстка: за довжиною	середня	5	до довгої
39	Пелюстка: за шириною	середня	5	до широкої
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	рівномірне	2	
42	Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	темно-пурпурово-червоне	24	
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	червоне	7	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 110,0. Кількість квіток на пагоні, шт. – 1. Діаметр квітки, см – 14. Повнота квітки (кількість пелюсток), шт. – 35. Аромат квітки, бал (1–9) – 3. Тривалість цвітіння рослини, дів – не визначали. Зимостійкість, бал (1–9) – 2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium disciflorum* Y.) – 8; борошниста роса (*Sphaerotheca pannosa* var. *rosae* Wor.) – 7; інфекційний опік (*Coniothyrium wernsdorfflac* Lanb.) – 8; чорна плямистість (*Marssonina rosae* (Lib.) Died.) – 8; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): трояндова цикадка (*Typhlocyba rosae* L.) – 9; трояндова попелиця (*Macrosiphum rosae* L.) – 8; оленка волохата (*Epicometis hirta* Poda) – 5; бронзівка золотава (*Cetonia aurata* L.) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.**

# Інші

## *Павловія*



**Вид:** Павловнія *Paulownia* Sieb. et Zucc.

**Заявка № 18649001 Назва сорту:** Котевіса 1 **Заявник (код):** 2489 **Власник сорту (код):** 2489

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.08.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191148**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: весняне відростання пагона	середнє	5
2	Листок: черешок за довжиною	довгий	7
3	Листок: забарвлення верхнього боку черешка	світло-зелене	2
4	Черешок: кут між черешком і стеблом	великий	7
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
7	Листкова пластинка: випуклість між жилками	слабка	3
8	Листкова пластинка: вираження лопатей	сильне	7
9	Листкова пластинка: форма верхівки	округлозагострена	3
10	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	слабка	3
12	Стебло: забарвлення у верхній третині з-під сонячного боку	сіро-коричневе	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність сирової біомаси, т/га – 337,5. Вихід сухої речовини, т/га – 130,5. Термін використання плантації, років – 30. Періодичність збирання сировини, разів – 5. Вихід енергії, ГДж/га – 2550. Енергетичні витрати на виробництво за рік, ГДж/га – 235. Теплоємність пального, МДж/кг – 18,5. Зольність пального, % – 1,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): оленка волохата – 9. Декоративність, бал (11–99) – 99. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – не визначали. Тривалість періоду цвітіння, діб – 25. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Холодостійкість, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Павловнія *Paulownia* Sieb. et Zucc.

**Заявка № 18649002 Назва сорту:** Котевіса 2 **Заявник (код):** 2489 **Власник сорту (код):** 2489

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.08.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 191149**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: весняне відростання пагона	середнє	5
2	Листок: черешок за довжиною	довгий	7
3	Листок: забарвлення верхнього боку черешка	темно-зелене	4
4	Черешок: кут між черешком і стеблом	великий	7
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7
6	Листкова пластинка: за шириною	широка	7
7	Листкова пластинка: випуклість між жилками	помірна	5
8	Листкова пластинка: вираження лопатей	сильне	7
9	Листкова пластинка: форма верхівки	округлозагострена	3
10	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
12	Стебло: забарвлення у верхній третині з-під сонячного боку	сіро-коричневе	2

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність сирої біомаси, т/га – 348,75. Вихід сухої речовини, т/га – 135,0. Термін використання плантації, років – 30. Періодичність збирання сировини, разів – 5. Вихід енергії, ГДж/га – 2565. Енергетичні витрати на виробництво за рік, ГДж/га – 234. Теплоємність пального, МДж/кг – 18,5. Зольність пального, % – 1,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): оленка волохата – 9. Декоративність, бал (11–99) – 99. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – не визначали. Тривалість періоду цвітіння, дів – 25. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Холодостійкість, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

## Інші відомості

### Other notification

## Скорочені назви, скорочення термінів, які вжито в Бюлетені

### Short names, aberrations as appearing in the bulletin

## Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників прав на сорти рослин

### List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	Назва Name	Адреса Address
8	ТОВ «Сингента» TOV «Synhenta»	03040, вул. Васильківська 14, 5 поверх, м. Київ, Україна 03040, vul. Vasytkivska 14, 5 poverkh, m. Kyiv, Ukraina
9	Товариство з обмеженою відповідальністю «Піонер Насіння Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Pioner Nasinnia Ukraina»	вул. Спаська 30а, м. Київ, 04070, Україна vul. Spaska 30a, m. Kyiv, 04070, Ukraina
20	Державна наукова установа – Кримська дослідно-селекційна станція Всеросійського науково-дослідного інституту рослинництва Derzhavna naukova ustanova – Krymska doslidno-selektsiina stantsiia Vserosiiskoho naukovo-doslidnoho instytutu roslыnnystva	М. Кримськ-4, Краснодарський Край, Росія, 353330 M. Krymsk-4, Krasnodarskyi Krai, Rosiia, 353330
33	Саката Веджитеблз Юроп С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домені Де Саблас БП11, Рю Ду Мулін 30620 Уцхауд, Франція Domaine de Sablas BP11, Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
126	Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова фірма «Еліта Дона» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahropromyslova firma «Elita Dona»	пров. Сільськогосподарський 6, м. Ростов-на-Дону, 344038, Росія prov. Silskohospodarskyi 6, m. Rostov- na-Donu, 344038, Rosiia
142	Семенсес Прогрейн ІНК. Semenses Prograin INC.	Ранг Вас- Рівієр НОРД, Сант-цезар, Квебек Rang Du Bas-de-la- Riviere NORD, St-Cesair, Quebec, JOL 1 T0
169	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапсоїл» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rapsoil»	Вул. Молодіжна 9, стм. Гостомель, Київська обл. Vul. Molodizhna 9, stm. Hostomel, Kyivska obl.
175	ТОВ Науково-виробниче товариство «Насіння» TOV Naukovo-vyrobnyche tovarystvo «Nasinnia»	03142, Україна, м. Київ, вул. Кримського, 4а, к. 410, а/с 145 03142, Ukraina, m. Kyiv, vul. Krymskoho, 4a, k. 410, a/s 145
215	Вілморін Vilmorin S.A.	49250 La Menitre, Franse 49250 La Menitre, Franse
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 Bursa Turkey
293	Товариство з обмеженою відповідальністю «Біоальянс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bioalians»	Вул. Колекторна 30, м. Київ, 02099 Vul. Kolektorna 30, m. Kyiv, 02099
305	Інститут кормів Української академії аграрних наук Instytut kormiv Ukrainської akademii ahrarynykh nauk	21100, Проспект Юності, 16, м. Вінниця 21100, Prospekt IUnosti, 16, m. Vynnytsia
311	Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук Instytut zernovoho gospodarstva Ukrainської akademii ahrarynykh nauk	49027, вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро 49027, vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro
313	Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Donetska doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrainskoi akademii ahrarynykh nauk	П/в Дослідне, Ясинуватський р-н., Донецька обл., 86081 P/v Doslidne, IAsynuvatskyi r-n., Donetska obl., 86081
314	Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук Artemivska doslidna stantsiia rozsadnytstva Instytutu sadyvnytstva Ukrainskoi akademii ahrarynykh nauk	Вул. Ілліча 7,с. Опитне, Артемівський р-н, Донецька обл., 84571 Vul. Illicha 7,s. Opytne, Artemivskyi r-n, Donetska obl., 84571
319	Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук Poliska doslidna stantsiia im. O. M. Zasukhina Instytutu kartopliarstva Ukrainskoi akademii ahrarynykh nauk	П/в Пересувне 2, Малинський р-н, Житомирська обл., 11605 P/v Peresuvne 2, Malynskyi r-n, Zhytomyrska obl., 11605
329	Інститут олійних культур Української академії аграрних наук Instytut oliinykh kultur Ukrainської akademii ahrarynykh nauk	70417, вул. Весняна, 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл. 70417, vul. Vesniana, 1, s. Soniachne, Zaporizkyi r-n, Zaporizka obl.
330	Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Kolomyiska doslidna stantsiia Ivano-Frankivskoho instytutu ahropromysloвого vyrobnytstva Ukrainської akademii ahrarynykh nauk	С. Плядики, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78254 S. Piyadyky, Kolomyiskyi r-n, Ivano-Frankivska obl., 78254
332	Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Ivano-Frankivskyi instytut ahropromysloвого vyrobnytstva Ukrainської akademii ahrarynykh nauk	Вул. Розумовського, 9а, м. Івано-Франківськ, 76028 Vul. Rozumovskoho, 9a, m. Ivano-Frankivsk, 76028
337	Київська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Української академії аграрних наук» Kyivska doslidna stantsiia Natsionalnoho naukovooho tsentru «Instytut zemlerobstva Ukrainської akademii ahrarynykh nauk»	С. Литвинівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07334 S. Lytvynivka, Vyshhorodskyi r-n, Kyivska obl., 07334
340	Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук Synelnykivska selektsiino-doslidna stantsiia Instytutu zernovoho hospodarstva Ukrainської akademii ahrarynykh nauk	52523, вул. Бугаєнка, 3, п/в Раївка, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., +38-05663-46-728 52523, vul. Buhaienka, 3, p/v Raiivka, Synelnykivskyi r-n, Dnipropetrovska obl., +38-05663-46-
344	Інститут садівництва Української академії аграрних наук Instytut sadyvnytstva Ukrainської akademii ahrarynykh nauk	03027, м.Київ, вул. Садова 6, смт. Новосілки 03027, m.Kyiv, vul. Sadova 6, smt. Novosilky

Код Code	Назва Name	Адреса Address
345	Національний науковий центр «Інститут землеробства Української академії аграрних наук» Natsionalnyi naukovyi tsestr «Instytut zemlerobstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk»	08162, вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. 08162, vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt. Chabany, Kyïevo-Sviatoshynskiy r-n, Kyivska obl.
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoï akademii nauk Ukrainy	вул. Тимірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazievska, 1, m. Kyiv, 01014
350	Національний університет біоресурсів і природокористування України Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy	03041, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ 03041, vul. Heroiv Oborony, 15, m. Kyiv
356	Кіровоградський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Kirovohradskiy instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	27602, вул. Центральна 2, п/в Сазонівка, м. Кропивницький 27602, vul. Tsentralna 2, p/v Sazonivka, m. Kropyvnytskyi
369	Львівський національний аграрний університет Lvivskiy natsionalnyi ahrarniy universytet	М. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381 M. Dubliany, Zhovkivskiy r-n, Lvivska obl., 80381
372	Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук Lvivska doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	С. Неслухів, Кам'янсько-Бузький р-н, Львівська обл., 80455 S. Neslukhiv, Kam'iansko-Buzkyi r-n, Lvivska obl., 80455
376	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація «Степова» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha ahrokorporatsiia «Stepova»	Вул. Ходарева 1а, с. Дерезувате, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52523 тел./ факс 0562-399-125; 0562-399-111 Vul. Khodarieva 1a, s. Derezuva, Synelnikivskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 52523 tel./faks 0562-399-125; 0562-399-111
378	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннезнавства та сортівчнення Української академії аграрних наук Selektsiino-henetychniy instytut – Natsionalnyi tsestr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса 65036, Ovidiipolska doroha, 3, m. Odesa
390	Сарненська дослідна станція Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук Sarnenska doslidna stantsiia Instytutu hidrotehniky i melioratsii Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	М. Сарни, 1, Рівненська обл., 34501 M. Sarny, 1, Rivnenska obl., 34501
392	Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Sumskiy instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	42343, вул. Паркова, 3, с. Сад, Сумський р-н., Сумська обл. 42343, vul. Parkova, 3, s. Sad, Sumskiy r-n., Sumska obl.
395	Подільська дослідна станція Тернопільського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Podilska doslidna stantsiia Ternopilskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	Вул. Незалежності, 19, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., 48240 тел. +38-03557-511-47 факс. +38-03557-511-31 Vul. Nezalezhnosti, 19, m. Khorostkiv, Husiatynskiy r-n, Ternopilska obl., 48240 tel. +38-03557-511-47 faks. +38-03557-511-31
398	Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut lisovoho hospodarstva ta ahrolisomelioratsii im. H.M.Vysotskoho	Вул. Пушкінська, 86, м. Харків, 61024 Vul. Pushkinska, 86, m. Kharkiv, 61024
399	Красноградська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук Krasnohradska doslidna stantsiia Instytutu zernovoho hospodarstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	м. Красноград, Харківська обл., 63308 тел./факс. +38-057-44-93-145 m. Krasnohrad, Kharkivska obl., 63308 tel./faks. +38-057-44-93-145
402	Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Instytut ovochivnytstva i bashtantnytstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	62478, вул. Інститутська, 1, п/в Селекційний, Харківський р-н, Харківська обл. 62478, vul. Instyuttska, 1, p/v Selektiiniy, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl.
404	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Української академії аграрних наук Instytut roslinnytstva im. V. YA. Iur'ieva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	Московський проспект, 142, м. Харків, 61060 Moskovskiy prospekt, 142, m. Kharkiv, 61060
410	Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Instytut pivdennoho ovochivnytstva i bashtantnytstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	Вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600 Vul. Chervonoarmiiska, 71, m. Hola Prystan, Khersonska obl., 75600
412	Інститут рису Української академії аграрних наук Instytut rysu Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	75705, с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл. 75705, s. Antonivka, Skadovskiy r-n, Khersonska obl.
416	Приватне підприємство «Наукова селекційно-насінницька фірма «Соєвий вік» Privatne pidpriemstvo «Naukova selektsiino-nasinnnytska firma «Soiviy Vik»	25006, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 29 «Г» 25006, m. Kropyvnytskyi, vul. Murmanska, 29 «H»
432	Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Bukovynskiy instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	Вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026 Vul. Kuznietsova, 21a, m. Chernivtsi, 58026
433	Придністровська дослідна станція садівництва Буковинського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Prydnistrovska doslidna stantsiia sadivnytstva Bukovynskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainkoï akademii ahrarnykh nauk	вул. Яблунівська, 1, м. Чернівці, 58013 vul. IAbulunivska, 1, m. Chernivtsi, 58013
437	Монсанта Інтернешнл Сьорл Monsanto International Sarl	Ру дес Вігнеронс 1А, 1110, Моргес, Швейцарія Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges, Switherland
472	Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіас 2000» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Avias 2000»	Аеропорт б 42, м. Дніпро, 49042 Aeroport b 42, m. Dnipro, 49042
485	Коссад Семанс ЕС А Cussade Semences S A	З.І. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс Z.I.de Meaux, BR 109, 82303 Caussade Cedex



Код Code	Назва Name	Адреса Address
504	Насіннева компанія Лаєн Сідс Лімітед Seed Company Lion Seeds Ltd	CM96CH Ессекс, Вудхем Мортімер CM96SN Essex, Wodham Mortimer
538	Ситнік Ігор Данилович Sytnik Ihor Danylovych	Вул. Генерала Родимцева 3а кв. 45, м. Київ, 03041 Vul. Henerala Rodymtseva 3a kv. 45, m. Kyiv, 03041
558	Панам Франція САРЛ Panam France Sarl	Ф-31340 Віллемур сур Тарн, 544 Рю де Віллебрюмер F-31340, Villemur sur Tarn, 544 Route de Villebrumier
600	Євро Грас Брідинг ГмБХ і Ко. КГ Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG	вул. Вайсенбургер, 5 59557 Ліпштадт Weissenburger Stabe 5 59557 Lippstadt
601	Плант Рісерч Інтернешнл Б.В. Plant Research International B.V.	вул. Дривендаалсестег, 6 б, (6708 ПБ) м. Вагенінген Droevendaalsesteeg 1 (6708 PB) Wageningen
647	Приватне підприємство «Агросвіт» Privatne pidpriemstvo «Agrosvit»	вул. Горького, 40, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74907 vul. Horkoho, 40, m. Nova Kakhovka, Khersonska obl., 74907
658	Шевченко Ігор Андрійович Shevchenko Ihor Andriiovych	вул.Гвардійців Широнінців, 18-Г кв. 43, м. Харків, 61120 vul.Hvardiitsiv Shyronintsiv, 18-H kv. 43, m. Kharkiv, 61120
663	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут сої» Tovarystvo z обмеженою vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut soi»	39000, тупик Автопарківський, 5, м. Глобине, Полтавська обл. 39000, tupyk Avtoparkivskiy, 5, m. Hlobyne, Poltavska obl.
719	Адванта Інтернешнл Б.В. (Ван дер Хаве, Голландія, та Зенек, Бельгія) Advanta Interneshnl B.V. (Van der Khave, Hollandia, ta Zeneka, Belhiiia)	П.я. Бокс 1, 4420 АА Капелла, Дійквелсестраат 70 P.O. Box 1, 4420 AA Kapelle, Dijkwelsestraat 70, Tel.: (0113) 34 79 00, Fax: (0113) 33 01 10
721	Сатімекс Кведлінбург Satimex Quedlinburg	Німеччина, 06484, м. Кведлінбург, вул. Гросс Орден, 19 06484 Quedlinburg, Gros Orden 19, Germany
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z обмеженою vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
738	Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В. HZPC Holland B.V.	П.О. бокс, 9801, Б.Д. Леуварден, Голландія P.O. Box 385, 8901 BD Leeuwarden, The Netherlands
740	Інносід Б.В. Innoseed B.V.	П.О. Вокс 10000, 5250 ГА Віймен, Голандія P.O. Box 10000, 5250 GA Vijmen, The Netherlands
741	Агріко Кооператив Б.А. Agrico Cooperative B.A.	П.О. Б. 70, 8300 АБ Емелорд, Нідерланди P.O. B. 70, 8300 AB Emmeloord, The Netherlands
743	СесВандерхаве Н.В./С.А. SesVanderhave N.B./C.A.	Індустріпарк, 15 В-3300, м. Тінен, Бельгія Industriepark Soldatenplein 22 nr 15 3300 Tienen, Belgium tel. +32(0) 16 80 82 11 fax +32(0) 16 80 83 76
744	Монсанто Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Вестейнд 161, 1601ВМ, Енхуїзен, (поштова адреса: Постбус 22, 1600АА, Енхуїзен) Westeinde 161, 1601BM Enkhuizen (mailing address: Postbus 22, 1600AA Enkhuizen)
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О.Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Голандія P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	П.О. Бокс 4005,6080 АА Наялен, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Naelen, The Netherlands
789	Харріс Моран Сід Компані Harris Moran Seed Company	Модесто СА, 95352, США, поштова скринька 4938 Modesto, CA, 95352, USA, Post Office Box 4938
793	Лімагрейн Європ Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41 Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоебус, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
807	Дойче Заатферделунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
821	ЗАТ «ЗКІ Золдешег Кутато Інтезет» ZKI Zoldsegtermesztesi Kutato Intezet Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	6000, м. Кечкемет, Месой Дюла, ул.б 6000 Kecskemet, Meszoly Gyula ut 6
824	КВС Лохов ГмБХ KWS Lochow GmbH	Поштфак 1197, 29296 Берген, Болерзенер Вег 5, Д-29303 Берген, Німеччина Postfach 1197, 29296 Bergen, Bollersener Weg 5 D-29303 Bergen, Germany
840	Енза Заден Біхір Б.В. Enza Zaden Bikhir B.V.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуїзен, Нідерланди Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанто Технологі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N;Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
866	Насіннева компанія Аурора с.п.а. Seed Company AURORA s.p.a.	віа Грамчі, 1/А 45013, Боттріге ді Адрія, Ровіо, Італія via Gramchi, 1/A 45013, Bottrighe di Adria, Rovio, Italia
879	Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad	М. Горького 30, 21000 Нові Сад, Сербія M.Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Serbia
880	Селген, а.с. Selgen, a.s.	Янковцова 18, 170 37 Прага 7, Чеська Республіка Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Ceska republika
882	ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ Piet Schreurs Holding BV	Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel,The Netherlands ( NL) Hoofdweg 81,1424 PD De Kwakel,The Netherlands ( NL)
883	Кваліті Кропс Агро СРЛ Quality Crops Agro S.R.L.	27 Попа Саву стріт, 011431, Бухарест Румунія 27 Popa Savu strit, 011431, Bukharest Rumuniia
884	Кутновська Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.	вул. Чопіна 255, 99-300 Кутно, Польща Ul. Chopina 255, 99-300 Kutno, Poland

Код Code	Назва Name	Адреса Address
887	Нікерсон - Цваан Б.В. Nickerson - Zwaan B.V.	A/c 1, 4410 AA, Рілланд, Голландія (Schanseind 27, 4921PM MADE P.O. Box 28, 4920 AA Made The Netherlands) Schanseind 27, 4921PM MADE P.O. Box 28, 4920 AA Made The Netherlands, tel:+31162-690-900, +31 162-680-970
888	Приватне мале підприємство «Тирас» Pryvatne male pidpryiemstvo «Tyras»	Вул. Живова, 32, м. Тернопіль, Україна 46008, тел./факс +38-0352-23-50-22 Vul. Zhyvova, 32, m. Ternopil, Ukraine 46008, tel./faks +38-0352-23-50-22
890	Холлар Сідз Hollar Seeds	П. О. Бокс 106, Роккі Форд, Колорадо, США, 81067 P.O. Box 106, Rocky Ford, Colorado U.S.A., 81067
900	Клоз Clause	Руа Луїс Саліант, 3.І. Ля Моте, 26800, Порт-Лес-Валанс, Франція Rue Louis Salliant, Z.I., La Motte, 26800, Portes-Les-Valence, France
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліті, Хользес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
918	Доу АгроСайенс В.м.б.Х. Dow AgroSciences V.m.b.H.	Каертнер Рінг 5-7, А-1010 Вієн, Австрія Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria
922	Закрите акціонерне товариство «Селена» Zakryte aktsionerne tovarystvo «Selena»	65036, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, Україна 65036, Ovidiopol'ska doroha, 3, m. Odesa, Ukraine
924	Маїсадур Семанс Maisadour Semences	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
926	Заатен-Уніон ГмБХ Saaten-Union GmbH	Ейзенштрассе 12, 30916 Ізернхаген НБ, Німеччина Eisenstrasse 12, 30916 Isernhagen NB, Germany
955	Агро-Тіп Agro-Tip Handels u. Consultingges. mbH	Ам Тобербух 7, Д - 21255, Тостедт, Німеччина Am Toberbusch 7, D-21255 Tostedt, Germany
962	Науково-виробниче фермерське господарство «Компанія «Маїс» Naukovo- vyrobnyche fermerske hospodarstvo «Kompaniia «Mais»	вул. Гагарина 21, с. Веселе, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52523 vul. Naharyna 21, s. Vesele, Synelnykivskiy r-n, Dnipropetrovska obl., Ukraine, 52523
964	Приватне підприємство науково-дослідна селекційна станція «Наско» Pryvatne pidpryiemstvo naukovo-doslidna selektsiina stantsiia «Nasko»	вул. Горького, 40, м.Нова Каховка, Херсонська обл., 74907 vul. Horkoho, 40, m.Nova Kakhovka, Khersonska obl., 74907
966	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича комерційна фірма «Селекта» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu naukovo-vyrobnycha komertsiiina firma «Selekta»	49000, м. Дніпро, вул. Батумська 11 49000, m. Dnipro, vul. Batumska 11
969	Моравосід спол. с р.о. Moravoseed spol. s r.o.	69201 Мікулов-Муслов, Чеська Республіка 692 01 Mikulov-Muslov, Czech Republic
983	Дікмманн ГмБХ і Ко. КГ Dieckmann GmbH & Co. KG	Кірххорстерштрассе, 16 Д - 31688 Нінштедт Kirchhorster Str. 16, D - 31688 Nienstaedt
989	ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед TerraVita (Overseas) Limited	Республіка Кіпр, м. Нікосія, Стасіну 1, Мітсі Білдіні 1, оф. 4, Платейя Елефтеаріс, а/с 1505 Respublika Kipr, m. Nikosiia, Stasinu 1, Mitsi Bildin 1, of. 4, Plateiia Eleftearis, a/s 1505
993	БЦ Інститут селекції і рослинництва Bc Institut za orlemenjvanje I proizvodnju biljja d.d.	Ругвіца, Дугосельска 7, 10370, Дуго Село, Хорватія Rugvica, Dugoselska 7, 10370, Dugo Selo, Croatia
1013	Поп Врієнд Сідз Б.В. Pop Vriend Seeds B.V.	П.О.Бокс 52 16193 Г Андіjk, Голандія P.O.Box 52 1619 ZG Andijk, Holland
1028	Товариство з обмеженою відповідальністю «Расава» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rasava»	09051, с. Пустоварівка, пл. Ватутіна 18 а, Сквирський р-он., Київська обл. 09051, s. Pustovarivka, pl. Vatutina 18 a, Skvyrskiy r-on., Kyivska obl.
1032	Бетасід, Інк. Betaseed, Inc.	1788 Маршал Роуд, Шейкопі, МН 55379, США 1788 Marshall Road, Shakopee, MN 55379, USA
1034	Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х Saatbau Linz reg.Gen.m.b.H	Ширменштрассе 19, А - 4020 Лінц, Австрія Schirmerstrasse 19, A-4020 Linz, Austria
1044	Агрофірма «Наско» Ahrofirm «Nasko»	Вул. Володимирська 91, Київ, Україна, 03150 Vul. Volodymyrska 91, Kyiv, Ukraine, 03150
1046	Європлант Пфланцензucht Гмбх Europlant Pflanzenzucht GmbH	Вульф-Верум Стр. 1; D-21303 Луенбург (Германія), Бернхард-Рієманн Стр., 1-3, 21335 Луенбург, Германія Wulf-Werum Str. 1; D-21303 Lueneburg (Germany), Bernhard-Riemann Str., 1-3, 21335 Luneburg, Germany
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаїзен, Голландія Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuzen, The Netherlands
1055	Піонер Хай-Бред Свіццерленд СА Pioner Hi-Bred Switzerland SA	Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland, tel. +1515/2484800, fax +1515/2484999
1072	Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче «Полан» Сп. з о.о. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze «Polan» Sp. z o.o.	30-130 Краков, вул. Ридля 53/55, Польща 30-130 Krakow, ul. Rydla 53/55, Poland
1076	ДПДГ «Асканійське» Інституту олійних культур Української академії аграрних наук DPDH «Askaniiske» Instytutu oliinykh kultur Ukrainsoi akademii ahrarnykh nauk	74862, вул. 40-річчя Перемоги 16, с. Тавричанка, Каховський р-он, Херсонська обл. 74862, vul. 40-richchia Peremohy 16, s. Tavrychanka, Kakhovskiy r-on, Khersonska obl.
1079	Сингента Сідз С.А.С. Syngenta Seeds S.A.S.	12, шеман де л'Обі Б.П. 27, 31790 Сен Совер, Франція 12, chemin de l'Hobit B.P. 27, 31790 Saint Sauveur, France
1086	Сингента Сідз АБ Syngenta Seeds AB	Зокербруксваген 1, БОКС 302, С-261 23, Ландакрона, Швеція Sockerbruksvagen 1, BOX 302, S-261 23, Landskrona, Sweden
1097	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна Burdeniuk-Tarasevych Larisa Antonivna	П/в Мала Вільшанка-1, Білоцерківський р-н, Київська обл., Україна, 09175 P/v Mala Vilshanka-1, Bilotserkivskiy r-n, Kyivska obl., Ukraine, 09175

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1102	Рійк Цваан Велвер ГмБХ Rijk Zwaan Welver GmbH	Верлер штрассе, 1, Д-59514, Вельвер, Німеччина Werler Strasse, 1, D-59514, Welver, Germany
1107	Щербань Сергій Васильович Shcherban Serhii Vasylovych	69093, м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, б. 6, кв. 194 69093, m. Zaporizhzhia, vul. Dehtiarova, b. 6, kv. 194
1109	Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук Cherkaskyi instytut ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainsoi akademii ahramnykh nauk	18015, вул. Пастерівська, 76, м. Черкаси, Україна, тел.: (80472) 31-40-52, e-mail: reg_centra_ck_arv@ukrt.ua 18015, vul. Pasterivska, 76, m. Cherkasy, Ukraina, tel.: (80472) 31-40-52, e-mail: reg_centra_ck_arv@ukrt.ua
1114	Агропромислова фірма «Флора» у формі товариства з обмеженою відповідальністю Ahropromyslova firma «Flora» u formi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu	65045, вул. Спирідонівська, буд. 26, кв. 3, м. Одеса 65045, vul. Spyridonivska, bud. 26, kv. 3, m. Odesa
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Дріада, Лтд» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Naukovo-vyrobnycha firma «Driada, Ltd»	Вул. Рози Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006 Vul. Rozy Liuksemburh, 23, Kherson, Ukraina, 73006
1129	Клиша Андрій Іванович Klysha Andrii Ivanovych	М. Красноград, Харківська обл., Україна, 63308 M. Krasnohrad, Kharkivska obl., Ukraina, 63308
1141	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Сади України» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Sady Ukrainy»	Вул. Акад. Проскури 1, м. Харків 61070, Україна Vul. Akad. Proskury 1, m. Kharkiv 61070, Ukraina
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свितязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 Vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1194	R2n R2n	Руе Еміле Сінгла - Сіте де Бурран, п/я 3336, ФР 122033 Родез Седекс 9, Франція Avenue Saint Pierre, Site de Bourran? 12033 Rodez Cedex 9
1210	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ-Україна» Inozemne Pidpryiemstvo «NS SEME-UKRAINA»	64032, с. Красне, Кегицький р-н., Харківська обл., Україна 64032, s. Krasne, Kehyichivskiy r-n., Kharkivska obl., Ukraina
1219	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Шварцвальдалее 215, 4002 Базель, Швейцарія Schwarzwaldallee 215, 4002 Basel, Switzerland
1223	Нордзаат Заатцухт ГмБХ Nordsaat Saatzzucht GmbH	Hauptstrabe L. D-38895 Bohnshausen Hauptstrabe L. D-38895 Bohnshausen
1227	Палента Технологіс С.А. Palenta Technologies S.A.	Ж. Аларо Аветуе, ве Сентури Тауер, Септх флор № 713, Панама, републіка Панама J. Alfaro Avelue, the Century Tower, Seventh floor № 713, Panama, republic of Panama
1237	СЮД СЕРЕАЛЬ SUD CEREALES	Ма де Соль, РН 6113, 30300 Фурк, Франція Mas des Saules RN D 6113, 30300 Fourques, France +33/466022121, +33/466022151, jean-louis.hubsch@groupsud.com
1247	ТОВ «Бізнес Стретеджі Девелопмент Україна» TOV «Biznes Stretedzhy Development Ukraina»	61120, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 18, корпус «Г», к. 43 61120, m. Kharkiv, vul. Hvardiitsiv Shyronintsiv, bud. 18, korpus «H», k. 43
1253	Ходовля Рослін Смолице Сп.з.о.о Група ІНАР Hodowla Roslin Smolice Sp.z o.o Grupa IHAR	Смолице 146, 63-740 Кобилін, Польща Smolitse 146, 63-740 Kobylin, Polsha
1265	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Агро-Ритм» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo «Aho-Rytm»	с. Солтанівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66521 s. Soltanivka, Liubashivskiy r-n, Odeska obl., 66521
1282	Флоріда Фаундейшн Сід Прод'юсерз, Інк. Florida Foundation Seed Producers Inc.	П/с 309, 3913 Хайвей 71 б Грінвуд, Флоріда 32443 США P/c 309, 3913 Khaivei 71 b Hrinvud, Floryda 32443 SSHA
1286	РАДЖТ Чехія с.р.о. RAGT CZECH s.r.o.	67177 Branisovice c.1 67177 Branisovice c.1, +420/515 337-525, +420/515-337-524, e-mail: PLAML@RAGT.FR
1304	Штрубе ГмБХ енд Ко. КГ Strube GmbH & Co. KG	Гауптшт. 1 38387 Зеллінген, Німеччина Hauptstr. 1 38387 Sollingen Germany
1308	Спільне українсько-югославське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОУКРАЇНА» Spilne ukrainso-juhoslavske pidpryiemstvo u formi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHROUKRAINA»	16500, вул. Петровського, 62, м. Бахмач, Чернігівська обл. 16500, vul. Petrovskoho, 62, m. Bakhmach, Chernihivska obl.
1322	Вудсток КФТ WOODSTOCK KFT	Hungary Budapest, H-1221 Peter Pal u. 51 Hungary Budapest, H-1221 Peter Pal u. 51
1346	Карлсберг Ресерч Лабораторі CARLSBERG A/C Carlsberg Research Laboratory CARLSBERG A/S	Валбі Ланггаде 1, 2500 Валбі, Данія Valby Langgade 1, 2500 Valby, Denmark
1356	Лабуле Семанс LABOULET Semences	Вул. Карно, 1, 80270 Еарен, Франція 1 rue Carnot, 80270 Airaines, France
1358	С.К. Процера Агрокемікалз Румунія С.Р.Л. Societatea Comerciala Procera Agrochemicals Romania S.R.L.	915200, вул. Мункії № 11, Фундулі, Каларасі, Румунія 915200, vul. Munkii № 11, Funduli, Kalarasi, Rumunija
1362	Юнайтед Генетікс Італія С.п.А. United Genetics Italia S.P.A.	Віа Траверсетоло, 260-43020 Піластрелло ді Марано-Парма-Італія, тел.: +390521642032 (642059); e-mail: unitedgenetics@unigenit.it Via Traversetolo, 260-43020 Pilastrello di Marano-Parma-Italia, tel.: +390521642032 (642059); e-mail: unitedgenetics@unigenit.it
1390	Лімагрейн Централ Юроп Сіріалс, с.р.о. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.	Прага 9 Кіе, Подеворська 755/5, PSC 19800 Czech Republic, tel.: fax: e-mail: Oleg.Khehalo@limagrain.com Praha 9 Kie, Podevorská 755/5, PSC 19800 Czech Republic, tel.: fax: e-mail: Oleg.Khehalo@limagrain.com

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1404	Хазера Генетікс Hazera Genetics	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
1420	Сингента Сідз ЛТД Syngenta Seeds LTD	Маркет стейшн, Маркет райзен, Лінкольншир, ЛН 8 5 ЛЖ, Великобританія Market stainton, Market rasen, Lincolnshire, LN8 5LJ, GB
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1439	Айріш Потато Маркетінг Irish Potato Marketing Ltd	Айріш Потато Маркетінг, Кью Хаус, 76 Фурзе Роуд, Сендіфорд Індастріал Істейт, Дублін, 18, Ірландія Irish Potato Marketing Ltd, Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland
1466	Аванта Семіллас САІК Advanta Semillas SAIC	Рута Нак. 33 Км 636 С.С. 559 (2600) Венадо Туерто (Аргентина) Ruta Nac. 33 Km 636 C.S. 559 (2600) Venado Tuerto, AR
1474	Санторі Флауерс ЛТД. Suntory Flowers Ltd.	13-12, Хіракава-Чо 2-Чоме, Чійода-Ку, 102-853 Токіо, Японія 13-12, Hirakawa-Cho 2-Chome, Chiyo-da-Ku, 102-853 Tokyo, Japan
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatzzucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1508	Солана Гмбх унд Ко. КГ Solana GmbH & Co.KG	Альберт-Айнштайн-Рінг 5, 22761 Гамбург, Німеччина Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg, Germany
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Українське насіння» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Ukrainske nasinnia»	64032, Харківська область, Кегичівський район, с. Красне 64032, Kharkivska oblast, Kehyshivskiy raion, s. Krasne
1520	Аванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	Rogers House, 5 President John Kennedy St., Port-Louis, Mauritius Rogers House, 5 President John Kennedy St., Port-Louis, Mauritius
1533	Маральді Сементі Ді Даніеле Маральді MARALDI SEMENTI di Daniele Maraldi	VIA EMILIA 2625, 47521, CESENA FC ITALY VIA EMILIA 2625, 47521, CESENA FC ITALY
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatzzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatzzuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1569	Де Рюйтер Інтелекчуал Проперті Б.В. De Ruyter Intellectual Property B.V.	Meerlandenweg 55 - 1187 ZR - Amstelveen, The Netherlands Meerlandenweg 55 - 1187 ZR - Amstelveen, The Netherlands
1571	Уманський національний університет садівництва Umanskyi natsionalnyi universytet sadivnytstva	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300 vul. Instytut'ska, 1, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslynnytstva im. V.IA. Iur'ieva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128, Україна pr. Moskovskiy, 142, m. Kharkiv, 61128, Ukraina
1589	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskiy instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853 s. Tsentralne, Myronivskiy r-n, Kyivska obl, 08853
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychniy instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	03027, м. Київ, смт Новосілки, вул. Садова, 23 03027, m. Kyiv, smt Novosilky, vul. Sadova, 23
1603	Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Artemivska doslidna stantsiia rozsadnytstva Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	Вул. Ілліча 7, с. Опитне, Артемівський р-н, Донецька обл., 84571 Vul. Illicha 7, s. Opytne, Artemivskiy r-n, Donetska obl., 84571
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukoviy tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Kyievo-Sviatoshynskiy raion, Kyivska obl., 08162
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 В-3300, м. Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1635	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovyykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09176 vul. Tsentralna, 1, s. Mala Vilshanka, Bilotserkivskiy r-n, Kyivska obl., 09176
1637	Асканійська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Askaniiska Derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	74862, с. Тавричанка, Каховський р-н, Херсонської області 74862, s. Tavrichanka, Kakhovskiy r-n, Khersonskoi oblasti
1650	Нонг Ву Біо Ко ЛТД Nong Woo Bio Co LTD	1197 - 4, Маїтен 2 - Донг, Йонгтонг - Гу, Суwon, Гіонггі - До, 443-372, Республіка Корея 1197 - 4, Maetan - 2 - Dong, Yeongtong - Gu, Suwon, Gyeonggi-Do, 443-372, Republic of Korea
1667	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Агробіопродукт» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobnyche pidpriemstvo «Aghrobioprodukt»	м. Київ, вул. Стрійська, 3, 03062 m. Kyiv, vul. Striiska, 3, 03062
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1692	Товариство з обмеженою відповідальністю «Баришівські Аграрні Технології» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Baryshivski Ahrarni Tekhnologii»	07500, Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Леніна, буд. 108 07500, Kyivska oblast, Baryshivskiy raion, smt Baryshivka, vul. Lenina, bud. 108
1694	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Стр. Тон Лука Карагіале Нр.3, 020041 Бухарест, Румунія Str.Ion Luca Caragiale Nr.3, 020041 Bucharest, Romania
1698	Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України Instytut zroshuvanoho zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	73483, Херсонська обл., м. Херсон, Дніпровський район, сел. Наддніпрянське 73483, Khersonska obl., m. Kherson, Dniprovskiy raion, sel. Naddniprianske
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України Instytut oliinykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 70417, Zaporizka obl., Zaporizkiy r-n, s. Soniachne, vul. Instytutaska, 1
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia «Maiaik» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivska obl., Nizhynskiy r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1713	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроплазма» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahroplazma»	Російська Федерація, 350012, м. Краснодар, вулиця ім. Академіка Лук'яненка, буд. № 32, офіс 59 Rosiiiska Federatsiia, 350012, m. Krasnodar, vulytsia im. Akademika Luk'ianenka, bud. № 32, ofis
1715	Інститут рису Національної академії аграрних наук України Instytut rysu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Студентська, 11, с. Антонівка, Скадовського району, Херсонської області, Україна, 75705 vul. Studentska, 11, s. Antonivka, Skadovskoho raionu, Khersonskoi oblasti, Ukraina, 75705
1719	Товариство з обмеженою відповідальністю «НУСІД СЕРБІЯ» Društvo sa organiceom odgovornosci «NUSEED SERBIA»	11000, Serbia, Belgrade, str. Cincar Jankova, 3 11000, Serbia, Belgrade, str. Cincar Jankova, 3
1721	Приватне підприємство «Науково-виробнича компанія «ЛОГОС» Privatne pidpriiemstvo «Naukovo-vyrobnycha kompaniia «LOHOS»	вул. Академіка Туполева, 19, м. Київ, 04128 vul. Akademika Tupolieva, 19, m. Kyiv, 04128
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1743	Делта аграр д.о.о. Delta agrar d.o.o.	Мілентія Поповіча 7б, 11070 Нови Београд, Сербія Milentija Popovica 7b, 11070 Belgrade, Serbia
1747	Карлсберг А/С Carlsberg A/S	Ny Gamle Carlsberg Vej 100, 1760 Kobenhavn, Denmark Ny Gamle Carlsberg Vej 100, 1760 Kobenhavn, Denmark
1749	Товариство з обмеженою відповідальністю «Астарт-Селекція» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Astarta-Selektsiia»	22000, вул. Привокзальна, 53, м. Хмільник, Хмельницький р-н, Вінницька обл. 22000, vul. Pryvokzalna, 53, m. Khmilnyk, Khmilnytskyi r-n, Vinnytska obl.
1759	Май Агро Сід Корп. May-Agro Seed Corp.	Samanli Mah. Yigitler Cd. No.28 - Yildirim/ BURSA / TURKEY Samanli Mah. Yigitler Cd. No.28 - Yildirim/ BURSA / TURKEY
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Рю Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1793	Байєр КропСайєнс НВ Bayer Cropscience NV	Nazarethsesteenweg 77, 9800 Astene (Deinze), Belgium Nazarethsesteenweg 77, 9800 Astene (Deinze), Belgium
1797	Секобра речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1802	Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Cherkaska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	вул. Докучаєва 13, сел. Холоднянське, Смілянського району, Черкаської області, 20731 vul. Dokuchaieva 13, sel. Kholodnianske, Smilianskoho raionu, Cherkaskoi oblasti, 20731
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЄУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домеін де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1848	Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Зелена 1, с. Сад, Сумський район, Сумська область, 42343 vul. Zelena 1, s. Sad, Sumskiy raion, Sumska oblast, 42343
1850	Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Melitopolska doslidna stantsiia sadivnytstva imeni M.F. Sydorenka Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Вул. Вакулєнчука, 99, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72311, Україна Vul. Vakulenchuka, 99, m. Melitopol, Zaporizka obl., 72311, Ukraina
1852	Монсанто Веджітл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1854	Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut silskoho hospodarstva stepovoi zony Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпро, Україна, 49600 vul. Dzerzhynskoho, 14, m. Dnipro, Ukraina, 49600

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1861	Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Bukovynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho gospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Кузнєцова, 21а, м. Чернівці, 58026 vul. Kuznietsova, 21a, m. Chernivtsi, 58026
1865	Шільвануш Чопорт Кфт. Silvanus Csoport Kft.	HU-1067 Budapest, Terez krt. 47, fsz. 2 HU-1067 Budapest, Terez krt. 47, fsz. 2
1893	АСПРІЯ СІДС ЕС.А. ASPRIA SEEDS S.A.	47, Grand-Rue, L 1661 Luxembourg 47, Grand-Rue, L 1661 Luxembourg
1902	Семілас ФІТО, С.А. Semillas FITO, S.A.	C/Selva de Mar, 111, 08019 Barcelona, Spain C/Selva de Mar, 111, 08019 Barcelona, Spain
1912	Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Національної академії аграрних наук України Instytut pomolohii im. L.P. Symyrenka Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Мліїв-1, Городищенський р-н, Черкаська обл., 19512 s. Mliiv-1, Horodyshcenskyi r-n, Cherkaska obl., 19512
1914	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТерраВіта Україна» Tovarystvo z обмеженоiu vidpovidalnistiu «TerraVita Ukraina»	вул. Володимирська, 81 Б, оф. 22, м. Київ, 01033 vul. Volodymyrska, 81 B, of. 22, m. Kyiv, 01033
1926	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрооптіма» Одеса-Київ-Санкт-Петербург Tovarystvo z обмеженоiu vidpovidalnistiu «Ahrrooptyma» Sankt-Peterburh	67652, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, комплекс, 8 км + 100 м траси 67652, Odeska obl., Biliaivskiyi r-n, silrada Usativska, kompleks, 8 km + 100 m trasy Odesa-Kyiv
1928	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохолдинг» Tovarystvo z обмеженоiu vidpovidalnistiu	344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6, офіс 1301 344010, h. Rostov-na-Donu, ul. Horoda Volos, d. 6, ofys 1301
1940	Придністровська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prydnistrovska doslidna stantsiia sadivnytstva Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Яблунівська, 1, с. Годилів, Сторожинецький район, Чернівецька обл., 59052 vul. IABlunivska, 1, s. Hodyliv, Storozhynetskyi raion, Chernivetska obl., 59052
1941	ПАНАМ ФРАНС САРЛ PANAM FRANCE SARL	F-31340 Villemur sur Tarn, 544 Route de Villebrumier F-31340 Villemur sur Tarn, 544 Route de Villebrumier
1942	«НОВАСЕМ» С.Р.Л. «NOVASEM» S.R.L.	Chisinau, str. A.Mateevici 49/2, of. 9, 2012 Moldova Chisinau, str. A.Mateevici 49/2, of. 9, 2012 Moldova
1954	Грізенті Марія Маддалена Grisenti Maria Maddalena	via Delle Meie 15, Baselga di Pine, IT-38042, Italy via Delle Meie 15, Baselga di Pine, IT-38042, Italy
1957	Таврійський державний агротехнологічний університет Tavriskiyi derzhavnyi ahtekhnolohichnyi universytet	пр. Богдана Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 pr. Bohdana Khmelnytskoho, 18, m. Melitopol, Zaporizka obl., 72312
1959	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	SCHWARZWALDALLEE 215, BASEL 4058, SWITZERLAND SCHWARZWALDALLEE 215, BASEL 4058, SWITZERLAND
1965	Бройн Сид ГмБХ & Ко.КГ Breun Seed GmbH & Co.KG	Morgenrot 12, D-06484 Quedlingburg Morgenrot 12, D-06484 Quedlingburg
1970	Державна установа «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України» Derzhavna ustanova «Mykolaivska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu zroshuvanoho zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	57217, Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Полігон, вул. Центральна, 17 57217, Mykolaivska obl., Zhovtnevyi r-n, s. Polihon, vul. Tsentralna, 17
1971	Едвард Вінсон Лімітед Edward Vinson Limited	4 Ewell Barn, Graveney Road, Faversham, Kent, ME13 8UP, United Kingdom 4 Ewell Barn, Graveney Road, Faversham, Kent, ME13 8UP, United Kingdom
1974	Бетасід ГмБХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany
1975	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРУТЕК» Tovarystvo z обмеженоiu vidpovidalnistiu «FRUTEK»	вул. Київська 2а, с. Дорожне, Вінницький район, Вінницька область, 23217 vul. Kyivska 2a, s. Dorozhne, Vinnytskyi raion, Vinnytska oblast, 23217
1978	Інститут за ратарство і повтарство Institut za ratarstvo i povrtarstvo	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
1984	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЕЛЕКЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЯРОВІТ» PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO SELEKTSIINO-VYROBNYCHYI TSENTR «IAROVIT»	36038, м. Полтава, вул. Енгельса, буд. 19а, оф. 207 36038, m. Poltava, vul. Enhelsa, bud. 19a, of. 207
1985	НУСІД ЮРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1987	Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Kirovohradska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Центральна 2, п/в Соzonівка, Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27602 vul. Tsentralna 2, p/v Sozonivka, Kirovohradskiyi raion, Kirovohradska oblast, 27602
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівського району, Чернігівської області, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskoho raionu, Chernihivskoi oblasti, 17131
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
1998	Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський селекційний приватний інститут» Tovarystvo z обмеженоiu vidpovidalnistiu «Odeskyi selektsiyniyi pryvatnyi instytut»	вул. Фрунзе, будинок 4, с. Старостине, Роздільнянський район, Одеська обл., 67420 vul. Frunze, budynok 4, s. Starostyne, Rozdilnianskyi raion, Odeska obl., 67420

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ eGen SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2013	СУПЕРІОР д.о.о. SUPERIOR d.o.o.	Не визначено SERBIA, 11320 Velika Plana, Bul. Oslobodenja 132
2015	Семініс Веджітл Сідз Інк. Seminis Vegetable Seeds Ink.	Seminis Vegetable Seeds Ink. 800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis MO 63167, USA
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2029	Даякай Олена Ігорівна Daiaakai Olena Ihorivna	пр. Героїв Сталінграда, 2, кв. 376, м. Київ, 04211 pr. Heroiv Stalinhrada, 2, kv. 376, m. Kyiv, 04211
2048	Гісем Володимир Васильович Hisem Volodymyr Vasylovych	вул. Срібляста, 7, м. Ужгород, Україна vul. Sribliasta, 7, m. Uzhhorod, Ukraine
2050	Кучеренко Володимир Михайлович Kucherenko Volodymyr Mykhailovych	вул. Сеченова, 7, м. Київ, Україна vul. Sechenova, 7, m. Kyiv, Ukraine
2051	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ АГРОСЕМ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «KOMPANIYA AHROSEM»	«КАРАТ» Промисловий майданчик, 5-А, оф. 207, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300 «KARAT» Promyslovyy mайдanчыk, 5-A, of. 207, m. Vyshhorod, Vyshhorodskyy r-n, Kyivska obl., 07300
2061	Севіта Генетик Sevita Genetics	1451 Камерон РД Інкерман, ОН Канада КОЕ 1J0 1451 Cameron Rd Inkerman, ON Canada KOE 1J0
2071	Штрубе Резерч ГмбХ енд Ко.КГ Strube Research GmbH & Co.KG	Hauptstrabe 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrabe 1, 38387 Sollingen, Germany
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prylutska doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511 vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivska obl., 17511
2076	Селген, а.с. SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic
2082	Зюдвестдойче Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Sudwestdeutsche Saatzzucht GmbH & Co. KG	Im Rheinfeld 1-13, D-76437 Rastatt Im Rheinfeld 1-13, D-76437 Rastatt
2087	ХМ.КЛОЗ, ІНК HM.CLAUSE, INC	555 Codoni Avenue, Modesto, California 95357, USA 555 Codoni Avenue, Modesto, California 95357, USA
2091	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМ-ЗАКАРПАТТЯ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHROPROM-ZAKARPATIYA»	вул. Садова, 21, с. Тарнівці, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89420 vul. Sadova, 21, s. Tarnivtsi, Uzhhorodskyy r-n, Zakarpatska obl., 89420
2092	КВС ЗААТ СЕ KWS SAAT SE	37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2094	Доу АгроСайенс ГмбХ Dow AgroSciences GmbH	Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany
2196	Байер КропСайенс ЛП Bayer CropScience LP	2 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, USA 2 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, USA
2200	Приватне підприємство «Агросвіт» Pryvatne pidpryemstvo «Ahrosvit»	вул. Промислова, 4В, м. Таврійськ, Херсонська обл., 74988 vul. Promyslova, 4V, m. Tavriisk, Khersonska obl., 74988
2201	Приватне підприємство «Науково-дослідна селекційна станція «НАСКО» Pryvatne pidpryemstvo «Naukovo-doslidna selektsiina stantsiia «NASKO»	вул. Леніна, 26, с. Чорнянка, Каховський р-н, Херсонська обл., 74835 vul. Lenina, 26, s. Chornianka, Kakhovskyy r-n, Khersonska obl., 74835
2202	Тракія Тарімсал Арастірма Інстітутсу Trakya Tarimsal Arastirma Enstitüsü	Istanbul Yolu, P.O. Box 16, 22100 Edirne, Turkey Istanbul Yolu, P.O. Box 16, 22100 Edirne, Turkey
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Nertus	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimm. 23, m. Kharkiv
2218	Кулініч Олексій Олександрович Kulinich Olexsiy Oleksandrovych	с. Дослідне, 7/2, Красноградський р-н, Харківська обл., 63304 s. Doslidne, 7/2, Krasnohradskyy r-n, Kharkivska obl., 63304
2221	Джеймс Хаттн Лімітед James Hutton Limited	Mylnefield, Invergowrie, Dundee DD2 5DA, United Kingdom Mylnefield, Invergowrie, Dundee DD2 5DA, United Kingdom
2222	ДЛФ СІДС А/С DLF SEEDS A/S	Ny Qstergade, 9 DK - 4000, Roskilde Denmark Ny Qstergade, 9 DK - 4000, Roskilde Denmark
2223	Вальдланд Інтернаціональ ГмбХ Waldland International GmbH	Goldschmiedgasse 10, 1010 Wien, Osterreich Goldschmiedgasse 10, 1010 Wien, Osterreich
2232	ДОНАУ СААТ С.Р.Л. DONAU SAAT S.R.L.	str. Sirlului, nr.20, et.3, sector 1, Bukarest, Romania str. Sirlului, nr.20, et.3, sector 1, Bukarest, Romania
2237	Інституція Публіса «Інстітул стіінтіфіо-Практик де хортікултура сі Технолоґії Аліментаре» Institutia Publica «Institutul stiintifico-Practic de horticultura si Tehnologii Alimentare»	MD 2070 Chisinau, or. Codru, str. Vierul, 59 MD 2070 Chisinau, or. Codru, str. Vierul, 59
2243	ІПМ Потейто Гроуп Лімітед IPM Potato Group Limited	Unit 412, Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Republic of Ireland Unit 412, Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Republic of Ireland
2252	СБ&Б Фудс Інк. SB&B Foods, Inc.	15681 35 вул. СЕ, Касельтон, Північна Дакота 58012, США 15681 35th St SE, Casselton, ND 58012, USA

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2253	ТОВ «АГРИТЕМА» TOV «AHRITEMA»	вул. Ковпака, 3, м. Київ, 03150 vul. Kovpaka, 3, m. Kyiv, 03150
2255	КВС МОМОН РЕШЕРШ С.А.Р.Л. KWS MOMONT RECHERCHE S.A.R.L.	59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France 59246 Mons-en-Pevele, rue de Martinval, 11, France
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМЬЕР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2257	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕКС УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «HENEKS UKRAINA»	вул. Гоголя, 12, оф. 610, м. Полтава, 36020 vul. Hoholia, 12, of. 610, m. Poltava, 36020
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмБХ P.H. PETERSEN Saatzzucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49027
2264	Норт Американ Планта Дженетікс North American Plant Genetics	19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada 19192, Sleepy Hollow Rd, Blenheim, Ontario, Canada
2265	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «LNZ-AHRO»	вул. Заводська, 17, с. Лебедин, Шполянський р-н, Черкаська обл., 20635 vul. Zavodska, 17, s. Lebedyn, Shpolianskyi r-n, Cherkaska obl., 20635
2267	Хібрисол, С. Л. Hibrisol, S. L.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
2273	Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД СЕМЕНС» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «HRAND SEMENS»	вул. Молодіжна, 1-Б, с. Великий Дальник, Біляївський р-н, Одеська обл., 67668 vul. Molodizhna, 1-B, s. Velykyi Dalnyk, Biliaivskyi r-n, Odeska obl., 67668
2277	Вілморін С.А. Vilmorin S.A.	49250 La Menitre, Franse 49250 La Menitre, Franse
2281	Іказідо Глобал Груп Б.В. Ikasido Global Group B.V.	's-Gravensandseweg 48, 2291 PE Wateringen, The Nehterlands 's-Gravensandseweg 48, 2291 PE Wateringen, The Nehterlands
2291	Товариство з обмеженою відповідальністю «Воскор-Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Voskor-	пров. І. Богуна, 5а, кв. 48, м. Умань, Черкаська обл., 20300 prov. I. Bohuna, 5a, kv. 48, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
2312	Товариство з обмеженою відповідальністю «Передові агротехнології» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Peredovi ahrotekhnolohii»	вул. Академіка Павлова, буд. 88, м. Харків, 61038 vul. Akademika Pavlova, bud. 88, m. Kharkiv, 61038
2313	Нордік Сід Германі ГмБХ Nordic Seed Germany GmbH	Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt Kirchhorster Str. 16. DE-31688 Nienstadt
2314	Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia pomolohii im. L.P. Symyrenka Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Мліїв-1, Городищенський р-н., Черкаська обл., 19512 s. Mliiv-1, Horodyshcenskyi r-n., Cherkaska obl., 19512
2417	Стіхтінг Вагенінген Ресерч - Вагенінген Планта Ресерч Stichting Wageningen Research - Wageningen Plant Research	Droevendaalsesteeg, 1, 6708 PB Wageningen, the Netherland Droevendaalsesteeg, 1, 6708 PB Wageningen, the Netherland
2419	Дрісколлс, Інк. Driscoll's, Inc.	345 Westridge Drive Watsonville, California 95076 345 Westridge Drive Watsonville, California 95076
2429	ТОВ «СПАРК СІДЗ» TOV «SPARK SIDZ»	проспект Маршала Жукова, буд. 47/3, Київський р-н, м. Одеса, 65114 prospekt Marshala Zhukova, bud. 47/3, Kyivskyi r-n, m. Odesa, 65114
2433	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Еліта-Селект» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-vyrobnycha firma «Elita-Selekt»	вул. Кірова, 1, с. Великий Дальник, Біляївський р-н, Одеська обл., 67688 vul. Kirova, 1, s. Velykyi Dalnyk, Biliaivskyi r-n, Odeska obl., 67688
2434	Юніверсіті оф Гвелф University of Guelph	Catalyst Centre, Store Road 50, Ichthyology Building № 92 CA-N1G 2W1 Guelph, Ontario Catalyst Centre, Store Road 50, Ichthyology Building № 92 CA-N1G 2W1 Guelph, Ontario
2435	Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕКОНА» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AVEKONA»	вул. Василенка, б. 12, кв. 155, м. Київ, 03124 vul. Vasylenka, b. 12, kv. 155, m. Kyiv, 03124
2436	Заатцухт Гляйсдорф ГмБХ Saatzzucht Gleisdorf GmbH	Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, Austria
2440	АПСОВСЕМЕНТИ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2444	Товариство з обмеженою відповідальністю «Солярис Гібриди» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Solarys Hibrydy»	вул. Академіка Заболотного, буд. 150 Г, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 150 H, m. Kyiv, 03143
2451	АГРОНЕІМАР ДОО AGRONEIMAR DOO	21000, Serbia, Novi Sad, 6 Svetozara Corovica Str. 21000, Serbia, Novi Sad, 6 Svetozara Corovica Str.
2458	Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Юг Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Terra-IUh Ukraina»	вул. Шовковична, 12-Б, кабінет 103, м. Київ, 01021 vul. Shovkovychna, 12-B, kabinet 103, m. Kyiv, 01021
2466	Меженський Володимир Миколайович Mezhenskyi Volodymyr Mykolaiovych	вул. Лесі Українки, буд. 6, кв. 12, сел. Пшеничне, Васильківський р-н, Київська обл., 08644 vul. Lesi Ukrainky, bud. 6, kv. 12, sel. Pshenychno, Vasylykivskyi r-n, Kyivska obl., 08644
2470	Дурбак Андрій Миронович Durbak Andrii Myronovych	просп. Голосіївський, 88, кв. 7, м. Київ, 03040 prosp. Holosiivskyi, 88, kv. 7, m. Kyiv, 03040
2473	С.Ц. «АМГ-КЕРНЕЛ» СРЛ S.Ts. «AMH-KERNEL» SRL	R. Moldova, or. Soroca, str. Cosauti 35, R. Soroca, MD-3001 R. Moldova, or. Soroca, str. Cosauti 35, R. Soroca, MD-3001



Інші відомості

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2475	АСТ ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД AST GLOBAL TRADING LIMITED	Emirates Financial Towers (EFT), ST13-02, P.O. Box 506985, Dubai, United Arab Emirates Emirates Financial Towers (EFT), ST13-02, P.O. Box 506985, Dubai, United Arab Emirates
2480	Францішко В'ячеслав Станіславович Frantsishko V'iachoslav Stanislavovych	с. Мукша Китайгородська, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32319 s. Muksha Kytaihorodska, Kam'ianets-Podilskyi r-n, Khmelnytska obl., 32319
2484	Науково-бадавче Центрум Розвою Соі «Ейч Соя» Сп. з Naukovo badavche Tsentrum Rozvoiu Soi «Eich Soia» Sp. z o.o.	Ul. Kordeckiego 20 37-420 Rudnik nad Sanem Polska o.o. Ul. Kordeckiego 20 37-420 Rudnik nad Sanem Polska
2485	Фермерське господарство «Мужилко В.В.» Fermerske gospodarstvo «Muzhylko V.V.»	вул. Історична, 10, кв. 4, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900 vul. Istorychna, 10, kv. 4, m. Nova Kakhovka, Khersonska obl., 74900
2489	Комерціал Техніка у Віверос, С.Л. Comercial Tecnica u Viveros, S.L.	Ctra. Nal. 340 Km. 873,5 46250 La Alcudia (Valencia) Spain Ctra. Nal. 340 Km. 873,5 46250 La Alcudia (Valencia) Spain
2503	Інтрепріндереа Пентру Сілвікултура Яргара Intreprinderea Pentru Silvicultura Iargara	г. Яргара, ул. Штефан Водэ, 180, MD-6321 Республіка Молдова h. IArhara, ul. Shtefan Vodэ, 180, MD-6321 Respublyka Moldova
2506	Хареба Олена Василівна Khareba Olena Vasylivna	бульв. Івана Лепсе, 30/1, кв. 18, м. Київ bulv. Ivana Lepse, 30/1, kv. 18, m. Kyiv
2507	Хареба Володимир Васильович Khareba Volodymyr Vasylovych	вул. Садова, буд. 19, кв. 34, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н., Київська обл. vul. Sadova, bud. 19, kv. 34, s. Novosilky, Kyievo-Sviatoshynskiyi r-n., Kyivska obl.
2510	Фермерське господарство «Кравець О.П.» Fermerske gospodarstvo «Kravets O.P.»	вул. Учительська, буд. 26, с. Городківка, Крижопільський р-н., Вінницька обл., 24615 vul. Uchytelska, bud. 26, s. Horodkivka, Kryzhopilskyi r-n., Vinnytska obl., 24615
2516	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРУТЕК» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «FRUTEK»	вул. Малиновського, 19/1, с. Микулинці, Лیتинський р-н., Вінницька обл., 22353 vul. Malynovskoho, 19/1, s. Mykulyntsi, Litynskyi r-n., Vinnytska obl., 22353
2518	Фермерське господарство «Колодка і партнери «Екоягода» Fermerske gospodarstvo «Kolodka i partnery «Ekoiahoda»	вул. 16 Липня, 41, м. Мостиська, Львівська обл., 81300 vul. 16 Lyupnia, 41, m. Mostyska, Lvivska obl., 81300
2522	Монсанта Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
2524	Товариство з обмеженою відповідальністю «РВА Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «RVA Ukraina»	вул. Велика Кільцева, 7, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08130 vul. Velyka Kiltseva, 7, s. Petropavlivska Borshchahivka, Kyievo-Sviatoshynskiyi r-n., Kyivska obl., 08130
2534	Коссад Семанс ЕС А Caussade Semences S A	Z. I. de Meaux, BP 109, 82303 Caussade Cedex, France Z. I. de Meaux, BP 109, 82303 Caussade Cedex, France
2537	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
2543	Сільськогосподарське підприємство «Укрсоя-21» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю Silskohospodarske pidpryiemstvo «Ukrsoia-21» u vygliadi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu	вул. Одеська, 4, смт Овідіополь, Одеська обл., 67801 vul. Odeska, 4, smt Ovidiopol, Odeska obl., 67801
2547	Клузер Брідінг Інтернешнл ГмбХ Cluser Breeding International GmbH	Gammelby 6, 24966 Sorup, Germany Gammelby 6, 24966 Sorup, Germany
2549	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ - УКРАЇНА» Inozemne Pidpryiemstvo «NS SEME - UKRAINA»	проспект Науки, буд. 28, м. Київ, Голосіївський р-н, 03028 prospekt Nauky, bud. 28, m. Kyiv, Holosiivskiyi r-n, 03028
2551	Товариство з обмеженою відповідальністю «АФ НПП АГРОМИР» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AF NPP AHROMYR»	вул. Кузнєцова, 1-Ж, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430 vul. Kuznietsova, 1-Zh, s. Sorokivka, Kharkivskiyi r-n, Kharkivska obl., 62430
2554	Адванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	C:o Multi consult, Les Cascades, Edith Cavell str. PORT LOUIS, MAURITIUS C:o Multi consult, Les Cascades, Edith Cavell str. PORT LOUIS, MAURITIUS
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАЇС» Naukovo-vyrobnyche fermerske gospodarstvo «KOMPANIYA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцево, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskiyi r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2565	Самарська Марія Ігорівна Samarska Mariia Ihorivna	вул. Залізнична, 16, с. Новоукраїнське, Апостолівський р-н, Дніпропетровська обл., 53811 vul. Zaliznychna, 16, s. Novoukrainske, Apostolivskiyi r-n, Dnipropetrovska obl., 53811
2566	Юдін Геннадій Олександрович Yudin Hennadii Oleksandrovych	проспект Олександра Поля, буд. 22/76, м. Дніпро, 53811 prospekt Oleksandra Polia, bud. 22/76, m. Dnipro, 53811
2576	ТОВ «Голден Сидс» TOV «Holden Syds»	вул. Васильківська, буд. 37, м. Київ, 03040 vul. Vasytkivska, bud. 37, m. Kyiv, 03040
2587	ТОВ «Хімагромаркетинг» TOV «Khimahromarketynh»	пр-т. Соборності, 15, м. Київ, 02160 pr-t. Sobornosti, 15, m. Kyiv, 02160
2594	Мереженюк Вадим Анатолійович Merezheniuk Vadym Anatoliiovych	вул. Леваневського, 38, кв. 132, м. Біла Церква, Київська обл. vul. Levanevskoho, 38, kv. 132, m. Bila Tserkva, Kyivska obl.
2595	Сич Зеновій Деонізович Syuch Zenovii Deonyzovych	вул. Опитна, 105, кв. 14, с. Олександрівка, Дніпропетровська обл. vul. Opytna, 105, kv. 14, s. Oleksandrivka, Dnipropetrovska obl.

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
2596	Кубрак Світлана Миколаївна Kubrak Svitlana Mykolaivna	вул. Героїв Чорнобиля, 5, кв. 133, м. Біла Церква, Київська обл. vul. Heroiv Chornobylia, 5, kv. 133, m. Bila Tserkva, Kyivska obl.
2600	Корнелус Йоханнус Б'ємонд Cornelus Johannes Biemond	Leensterweg 54, 9971 ECUtrum Leensterweg 54, 9971 ECUtrum
2623	Кіндрат Володимир Васильович Kindrat Volodymyr Vasylovych	вул. Академіка Янгеля, буд. 93, кв. 10, м. Вінниця, 21032 vul. Akademiika IAnhelia, bud. 93, kv. 10, m. Vinnytsia, 21032
2629	Приватне Підприємство «НАСІННЕВЕ» Pryvatne Pidpryiemstvo «NASINNEVE»	вул. Надточіївська, буд. 19-Б, пгт. Пісочин, Харківський р-н, 62418 vul. Nadtochiivska, bud. 19-B, pht. PISOCHYN, Kharkivskiyi r-n, 62418

**Загальноживані скорочення термінів**

## Common abbreviations

<p>У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).</p> <p><b>ПС</b> – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера),</p> <p><b>РС</b> – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік),</p> <p><b>АС</b> – свідоцтво про авторство на сорт рослин.</p>	<p>The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).</p> <p><b>PBR</b> – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder’s Rights),</p> <p><b>NLI</b> – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing),</p> <p><b>AC</b> – Plant Variety Authorship Certificate.</p>
<p>Скорочені назви, скорочення термінів, які вжито в офіційних описах та показниках господарської придатності:</p> <p><b>П</b> – Полісся,</p> <p><b>Л</b> – Лісостеп,</p> <p><b>С</b> – Степ,</p> <p><b>ЗГр</b> – захищений ґрунт.</p>	<p>Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:</p> <p><b>П</b> – Woodlands,</p> <p><b>Л</b> – Forest-Steppe,</p> <p><b>С</b> – Steppe,</p> <p><b>ЗГр</b> – covered ground.</p>

**Розподіл ботанічних таксонів за блоками*****Кукурудза звичайна***

- 1 Ранньостиглий
- 2 Середньоранній
- 3 Середньостиглий
- 4 Середньопізній

***Ріпак (ярий, озимий)***

- 1 Низькоеруковий

***Соя культурна***

- 6 Ранньостиглий (91–110 діб)
- 7 Середньостиглий (111–130 діб)

***Пшениця м'яка (озима)***

- 1 Середньорослий

## Скорочення термінів, що вжито в Реєстрі сортів рослин України

®	патент
/	значок рівнозначності
<b>Характеристика 1 – Напрямок використання</b>	
пер	переробка
зерн	зерновий
х	харчовий
олн	олійний
вол	високоолеїновий
тхн	технічний
стл	столовий
конс	консервний
ун	універсального призначення
свж	споживання у свіжому вигляді
овоч	овочевий
зріз	зріз
озл	озеленення
корм	кормовий
дкр	для декоративного оформлення
хп	для харчової промисловості
Е	біоенергетичний напрям використання
пкр	підвищеної крохмальності
<b>Характеристика 2 – Група стиглості</b>	
ср	середньоранній
сп	середньопізній
сс	середньостиглий
рс	ранньостиглий
пс	пізньостиглий
рсдн	ранньосередній
зим	зимовий
др	дуже ранній
ур	ультраранній
<b>Характеристика 3 – Якість</b>	
вбіл	високобілковий
сбіл	середньобілковий
вкр	висококrohмальний
скр	середньокrohмальний
вл	високоолійний
сл	середньоолійний
00	низькоеруковий, низькоглюкозинолатний
цін	цінний
ф	філер
слн	сильний
пкр	підвищеної крохмальності
стл	столовий
<b>Характеристика 4 – Метод створення</b>	
СЗ	самозапилення
П	перехресне запилення
С	сорт-синтетик
F1	гібрид

**ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ**  
OFFICIAL PUBLICATION

**ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН**  
*PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION*

*Бюлетень*  
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Божок Ю. О., Мажуга К. М., Ніколенко Н. Г., Тиха Н. В.,  
Троян В. І., Худолій Л. В.

Офіційні описи та показники господарської придатності підготували: Баліцька Л. М., Воловик Г. О., Гринів С. М., Джулай Н. П.,  
Димитров С. Г., Дудка Т. В., Матус В. М., Мізерна Н. О.,  
Носуля А. М., Свинарчук О. В., Симоненко Н. В.,  
Смульська І. В., Сонець Т. Д., Таганцова М. М.,  
Хоменко Т. М., Юшкевич М. С.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 14.04.2020

Дата друку

Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Officina.

Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..

Тираж 30 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.

21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. Келецька, 51а.

Тел.: (0432) 603-00, 69-67-69, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852

e-mail: info@tvoru.com.ua

<http://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –  
офіційне видання, що містить офіційні відомості  
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 6 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211

