


**תכנית הלימודים באלגברה לכיתה ט**

לתלמידים מתקדמים ומתעניינים כוללת התכנית תוספת של תכנים משני סוגים:  
 א. פרקים עצמאיים בהיקף של 4 עד 10 שעות. דוגמאות לפרקים כאלה מופיעות בסוף התכנית.  
 ב. פרקונים קצרים בהיקף של כשיעור. דוגמאות לפרקונים כאלה מופיעות (עם רקע) בצמוד לנושאים בתכנית כהרחבה והעמקה.

**תחום אלגברי: 1. חזקות (8 שעות)**

נושאי הלימוד	הבהרות ודוגמאות									
<p><b>חזקות עם מעריך שלם (גם שלילי)</b></p> <p><b>א. הגדרת החזקה</b></p> <p><b>ב. חוקי חזקה</b></p> $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ $a^n : a^m = a^{n-m}$ $a^n \cdot b^n = (ab)^n$ $a^n : b^n = (a : b)^n$ $(a^n)^m = a^{nm}$ <p><b>(כשהמכנים שונים מ-0)</b></p> <p><b>ג.</b> <math>a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0</math></p> $a^0 = 1, a \neq 0$	<p><b>בנושא החזקות</b> אנו משלבים את התחום המספרי והאלגברי.</p> <p><b>הגדרה:</b> <math>a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n</math> <small>פעמים</small></p> <p><b>למשל:</b> <math>a^5 = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a</math></p> <p><b>דוגמאות:</b></p> <p>1. מי מבין המספרים הבאים שווה ל- <math>2^{10}</math></p> <p>א. <math>2^5 \cdot 2^2</math>      ג. <math>(2^5)^2</math>      ה. <math>(\frac{10}{5})^2</math></p> <p>ב. <math>2^3 \cdot 2^7</math>      ד. <math>2^{20} : 2^2</math>      ו. <math>(2^5)^5</math></p> <p>הנמקה אפשרית: ירידת שלב בסולם החזקות מקטינה פי a</p> <p>2. מי גדול יותר: <math>2^{-5}</math> או <math>2^{-3}</math>? נמקו.</p> <p>3. השלימו את ריבוע הקסם כך שתתקבל אותה מכפלה בכל שורה, בכל טור ובשני האלכסונים.</p> <table border="1" data-bbox="555 1630 865 1854" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td><math>(\frac{a}{2})^2</math></td> </tr> <tr> <td>2a</td> <td><math>(2a)^2</math></td> <td><math>(2a)^3</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>4. השלימו את המכנה: <math>\frac{2a^3b^5}{\dots} = \frac{1}{2}a</math></p> <p>5. תרגילים למתקדמים: בדיקת דוגמאות של השתמרות חוקי החזקות, כגון <math>a^{-3} \cdot a^5 = a^2</math></p>			$(\frac{a}{2})^2$	2a	$(2a)^2$	$(2a)^3$			
		$(\frac{a}{2})^2$								
2a	$(2a)^2$	$(2a)^3$								



6. לפניכם סדרה של משולשים שוויו צלעות  
ההולכים וקטנים. כל משולש מתקבל  
מקודמו על ידי חיבור אמצעי הצלעות של  
המשולש הגדול יותר.  
א. אם אורך הצלע של המשולש הגדול הוא יחידה  
אחת, מה יהיה היקפו של המשולש הרביעי?  
ב. אם שטח המשולש הגדול הוא יחידה אחת,  
מה יהיה שטחו של המשולש הרביעי?  
7. סדרו את המספרים הבאים לפי גודלם  
 $5 \cdot 10^{15}$        $50 \cdot 10^{13}$        $500 \cdot 10^{10}$        $5000 \cdot 10^{10}$   
8. מה גדול יותר?  $4^{300}$  או  $3^{400}$ ?

**ד. כתיב מדעי של מספרים**

**בכתיב מדעי המספר נכתב כמספר בין 1 ל- 10 (לא כולל 10) כפול**

**חזקה של 10.**

**לדוגמה:**  $312745812 = 3.12745812 \times 10^8$

**בקירוב של שתי ספרות אחרי הנקודה, המספר הוא:**  $3.13 \cdot 10^8$

**(במחשבוני ובמחשבים מופיע גם הכתיב 3.12745812E8)**

- כתיבת מספרים גדולים וקטנים

**דוגמאות:**

1. לפניכם מספר עובדות המתוארות בעזרת מספרים גדולים וקטנים.

כתבו מספרים אלו בכתיב מדעי.

א. - מהירות האור בחלל היא בקירוב רב 300,000,000 מטר לשנייה.

- מספר השניות בשנה (365.25 ימים)

- כמה קילומטר יעבור האור בשנה בחלל? כתבו בקירוב של שתי ספרות אחרי

הנקודה של הכתיב המדעי.

ב. סנטימטר מעוקב הוא  $\frac{1}{1000000}$  של מטר מעוקב.

- פיזיקאי מדמיין אטום בגביש כקובייה שצלעה היא קוטר האטום. קוטר של

אטום הוא כ- 0.0000001 מ"מ.

כמה קוביות כאלה יידרשו למלא 1 סמ"ק?

2. מסה של כדור הארץ שווה בערך ל  $6 \cdot 10^{24}$  (ק"ג)

המסה של כוכב הלכת מרקורי (כוכב חמה) היא 0.05 של המסה של כדור הארץ.

כתבו בכתיב מדעי את המסה של מרקורי.

**הכתיב המדעי מאפשר הצגת מירב המידע במספר ספרות מוגבל.**

**דוגמה:**

$2.473 \cdot 10^{13}$  קצר מ- 24,730,000,000,000 וגם מצביע על מידת

**הדיוק.**

תחום אלגברי: 2. טכניקה אלגברית, הכרת נוסחאות הכפל המקוצר (10 שעות)	
נושאי הלימוד	הבהרות ודוגמאות
<p><b>נוסחאות הכפל המקוצר:</b>  <math>(a - b)(a + b) = a^2 - b^2</math>  <math>(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2</math></p> <p><b>א. שימוש בנוסחאות הכפל המקוצר לכפל ביטויים ולפירוק לגורמים</b></p> <p><b>ב. פירוק טרינום ריבועי מהצורה:</b>  <math>ax^2 + bx + c</math>  <b>עבור <math>a = 1</math> בלבד</b>  <b>ג. שימוש לצמצום שברים אלגבריים, לכפל ולחילוק</b></p>	<p>• מוצע לפתוח בישום לחישובים בע"פ כמו <math>72^2</math> ו- <math>63 \cdot 57</math>, ולבדוק במחשבון.</p> <p><b>דוגמאות:</b></p> <p>1. פתחו סוגריים ורשמו ביטוי קצר ככל האפשר:  א. <math>(x + 3)(x - 3)</math>  ב. <math>(x + 5)(x - 5) + (2x + 5)^2</math></p> <p>2. הוסיפו אם אפשר <math>&gt;</math>, <math>&lt;</math>, <math>=</math>, אם אי אפשר, ציינו עבור אילו מספרים נקבל <math>&gt;</math> או <math>&lt;</math>. הסבירו.</p> <p>ב. <math>(a + 1)(a - 1) \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad a^2</math>  ג. <math>(a + 1)^2 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad (a - 1)^2</math>  ד. <math>a^2 + 1 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad a^2 - 1</math>  ה. <math>(a + 1)^2 - 1 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad a^2 + 2a</math>  ו. <math>(a + 1)^2 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad (a + 1)(a - 1)</math>  ז. <math>(a - 1)^2 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad (a + 1)(a - 1)</math></p> <p>• צמצום שברים אלגבריים</p> <p><b>דוגמה:</b></p> <p>1. פרקו לגורמים וצמצמו את השברים:  א. <math>\frac{2a^2 - 32}{4 - a}</math>    ב. <math>\frac{x + 2}{x^2 + 4x + 4}</math>    ג. <math>\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} \cdot \frac{x + 2}{x - 3}</math></p> <p>• פתרון משוואות בעזרת פירוק לגורמים</p> <p><b>דוגמה:</b></p> <p>פתרו:  2. <math>x^3 - 4x = 0</math></p> <p>• כפל וחילוק שברים אלגבריים</p> <p><b>דוגמה:</b></p> <p>3. כפלו: <math>\frac{2a^2 - a}{4} \div \frac{a^2 - 2a + 1}{8a}</math></p>

• פתרון משוואות בעלות מכנה שהוא ביטוי אלגברי פשוט

$$4 \quad \text{א.} \quad \frac{2}{x-3} + \frac{4x}{2x-6} = 6 \quad \text{ב.} \quad \frac{2x}{x^2-4} = \frac{1}{x+2}$$

$$\text{ג.} \quad \frac{x}{x^2-5x+6} - \frac{x+1}{x^2-4} = \frac{6}{x^2-x-6}$$

הנחייה: פרקו את המכנים לגורמים ומצאו במה זה עוזר לפתרון

• שימוש בנוסחת הפרש הריבועים בבעיה מילולית

**דוגמאות:**

5. נתון ריבוע שאורך צלעו  $3a$ . אם נגדיל צלע אחת שלו ב  $2$  ס"מ ונקטין צלע סמוכה

ב-  $2$  ס"מ נקבל מלבן. שטחו של מי גדול יותר ובכמה?

6. א. לפניכם ריבועים ובתוכם ביטויים המבטאים את שטח הריבוע. התוכלו לגלות

את הביטוי המייצג את צלע הריבוע?

$$x^2 - 4x + 4$$

$$4x^2 + 20x + 25$$

ב. לפניכם מלבנים ובתוכם ביטויים המבטאים את שטח המלבן. הציעו ביטויים

אפשריים המייצגים את צלעות המלבן?

$$x^2 - 6x + 8$$

$$x^2 - 25$$

$$4x^2 - 100$$

הציעו אפשרויות נוספות.

**הערה:** דונו בביטויים אפשריים שונים.

**ד. שימוש לפתרון משוואות עם שברים אלגבריים (משתנה במכנה)**

תחום אלגברי: 3. פונקציה ריבועית ומשוואה ריבועית (30 שעות)	
נושאי הלימוד	הבהרות ודוגמאות
<p>• הפונקציה <math>y = x^2</math> הזזות שלה</p> <p>א. היכרות עם הפרבולה <math>y = x^2</math> וייצוגיה השונים (אלגברי, מספרי, גרפי). אפיוני הפרבולה: סימטרייה, תחומי עליה וירידה, נקודת מינימום.</p> <p>ב. הזזות אנכיות: משפחת הפרבולות <math>y = x^2 + c</math> ואפיוניהן: סימטרייה, תחומי עליה וירידה, נקודת מינימום, נקודות חיתוך עם הצירים (נקודות אפס ונקודת חיתוך עם ציר ה-<math>y</math>), תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציות.</p>	<p>במהלך הלימוד של הפונקציות הריבועיות ושל הזזות שלהן מומלץ להשתמש בטכנולוגיה גרפית. כל האמור בהמשך מתייחס לכיתות שבהן ההספק הלימודי משביע רצון. בכיתות אחרות נסתפק בסרטוט הגרפים לפי נקודות שיתקבלו על ידי הצבת מספרים בביטויים של הפונקציות.</p> <p>התלמידים יתנסו בסרטוט ידני של גרף הפונקציה: <math>y = x^2</math>, על פי מספר נקודות וייווכחו שהגרף אינו קו ישר. בהמשך יתנסו בבדיקת טיב הסרטוט על ידי חישוב וסימון נקודות נוספות. יש לקשור זאת לעובדה שקצב השינוי של הגרף אינו קבוע.</p> <p>פרבולה מהצורה <math>y = x^2 + c</math> מתקבלת מהזזה אנכית של הפרבולה <math>y = x^2</math> ב-<math>c</math> יחידות.</p> <p>הערה: בהקשר של מציאת נקודות חיתוך עם הצירים, נזכיר לתלמידים שלכל הנקודות על ציר ה-<math>x</math> שיעור ה-<math>y</math> הוא אפס ולכל הנקודות על ציר ה-<math>y</math> שיעור ה-<math>x</math> הוא אפס.</p> <p>דוגמה: סרטטו את הפונקציה <math>y = x^2 - 4</math>.</p> <p>א. במה שונה הגרף שקיבלתם מהגרף של הפונקציה <math>y = x^2</math>?</p> <p>ב. מהי נקודת המינימום של הפונקציה?</p> <p>ג. מהו ציר הסימטרייה של הפונקציה?</p> <p>ד. רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.</p> <p>ה. מצאו את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-<math>y</math>.</p> <p>ו. מצאו את נקודות האפס של הפונקציה.</p> <p>ז. רשמו שתי נקודות שבהן הפונקציה חיובית, ושתי נקודות שבהן הפונקציה שלילית.</p> <p>ח. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.</p> <p>ט. השוו בין התכונות של הפונקציה <math>y = x^2 - 4</math> לבין התכונות של הפונקציה <math>y = x^2</math>.</p> <p>הערה: נקודות אפס של פונקציה הן נקודות החיתוך של הגרף של הפונקציה עם ציר ה-<math>x</math>. חשוב שהתלמידים יכירו את שני</p>

המונחים.	
<p><b>פרבולה מהצורה <math>y = (x - p)^2</math> היא הזזה אופקית של הפרבולה <math>y = x^2</math> ב- <math>p</math> יחידות.</b></p> <p><b>דוגמאות:</b></p> <p>1. סרטטו את הפונקציות: <math>y = (x - 2)^2</math> , <math>y = (x + 3)^2</math>.</p> <p>2. סרטטו את הפונקציה: <math>y = (x - 3)^2</math></p> <p>א. במה שונה הגרף שקיבלתם מהגרף של הפונקציה <math>y = x^2</math>?</p> <p>ב. מהי נקודת המינימום של הפונקציה?</p> <p>ג. מהו ציר הסימטריה של הפונקציה?</p> <p>ד. רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.</p> <p>ה. מצאו את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה- <math>y</math>.</p> <p>ו. מצאו את נקודת האפס של הפונקציה.</p> <p>ז. השוו בין התכונות של הפונקציה <math>y = (x - 3)^2</math> לבין התכונות של הפונקציה <math>y = x^2</math>.</p> <p>3. א. רשמו משוואה של פרבולה שציר הסימטריה שלה הוא <math>x = -3</math>, וסרטטו סרטוט מקורב שלה. רשמו שתי נקודות שערכי הפונקציה שלהן שווים.</p> <p>ב. רשמו משוואה של פרבולה שיורדת בתחום <math>x &lt; 7</math>, ועולה בתחום <math>x &gt; 7</math>, וסרטטו סרטוט מקורב שלה. רשמו שתי נקודות שערכי הפונקציה שלהן שווים.</p>	<p><b>ג. הזזות אופקיות: משפחת הפרבולות <math>y = (x - p)^2</math> ואפיוניהן:</b></p> <p><b>סימטריה, תחומי עלייה וירידה, נקודת מינימום, נקודות חיתוך עם הצירים (נקודת אפס ונקודת חיתוך עם ציר ה- <math>y</math>)</b></p>
<p><b>בכיתות טובות:</b></p> <p><b>ערך ה- <math>x</math> של נקודות על ציר ה- <math>x</math> שמרחקן מ- <math>s</math> הוא <math>d</math> הוא <math>s + d</math> או <math>s - d</math>.</b></p> <p><b>הסימטריה תוצג גם בכתיב <math>f(s + d) = f(s - d)</math> כאשר הישר <math>x = s</math> הוא ציר הסימטריה.</b></p>	
<p><b>פרבולה מהצורה <math>y = (x - p)^2 + k</math> מתקבלת משילוב של הזזה אופקית והזזה אנכית של הפרבולה <math>y = x^2</math>.</b></p> <p><b>נקודת המינימום של הפרבולה היא: <math>(p, k)</math>.</b></p> <p><b>ציר הסימטריה של הפרבולה הוא <math>x = p</math>.</b></p> <p><b>נקודות האפס של הפרבולה הן נקודות סימטריות לגבי ציר הסימטריה. (נמצאות במרחק שווה מציר הסימטריה).</b></p> <p><b>דוגמה:</b></p> <p>נתונה הפרבולה: <math>y = (x - 5)^2 - 9</math></p> <p>תארו במילים כיצד היא מתקבלת מהפרבולה <math>y = x^2</math>.</p> <p>א. מצאו את נקודות האפס של הפרבולה. סמנו אותן באותיות <math>A, B</math> על ציר ה- <math>x</math>.</p>	<p><b>שילוב של הזזות אנכיות ואופקיות: משפחת הפרבולות <math>y = (x - p)^2 + k</math> ואפיוניהן:</b></p> <p><b>סימטריה, תחומי עלייה וירידה, נקודת מינימום, נקודות חיתוך עם הצירים (נקודות אפס ונקודת חיתוך עם ציר ה- <math>y</math>), תחומי החיוביות והשליליות של</b></p>

<p>ב. באיזו נקודה ציר הסימטרייה של הפרבולה חותך את ציר ה-<math>x</math>? סמנו אותה באות <math>T</math> על ציר ה-<math>x</math>.</p> <p>ג. מהו המרחק של כל אחת מהנקודות <math>A, B</math> מהנקודה <math>T</math>?</p> <p>ד. מצאו עוד זוג נקודות על הפרבולה שהן סימטריות לגבי ציר הסימטרייה.</p> <p><b>לתלמידים מתקדמים:</b>  <b>משפחת הפרבולות <math>y = ax^2</math> נבדלת מהפרבולה <math>y = x^2</math> במידת המתיחה שלהן ובכיוון.</b>  <b>ככל ש-<math> a </math> גדל, מידת המתיחה גדלה. אם <math>a &gt; 0</math> יש לפרבולה נקודת מינימום. אם <math>a &lt; 0</math> יש לפרבולה נקודת מקסימום.</b>  <b>דוגמה:</b>          סרטטו את הפרבולות: <math>f(x) = 3x^2</math>, <math>g(x) = 0.3x^2</math>, <math>t(x) = -2x^2</math>.          א. מצאו את התכונות המשותפות ל שלוש הפרבולות.          ב. מצאו את התכונות המבדילות בין שלוש הפרבולות.</p> <p><b>לסיכום יכירו התלמידים פונקציות שהתקבלו מהפרבולה <math>y = x^2</math> על ידי הזזות ומתיחות, פונקציות שביטוי הכללי: <math>y = a(x - p)^2 + k</math>.</b>  <b>דוגמה:</b>          נתונה הפרבולה: <math>y = -4(x - 1)^2 + 9</math>.          א. תארו במילים כיצד היא מתקבלת מהפרבולה <math>y = x^2</math>.          ב. מצאו את נקודות האפס של הפרבולה. סמנו אותן באותיות <math>A, B</math> על ציר ה-<math>x</math>.          ג. באיזו נקודה ציר הסימטרייה של הפרבולה חותך את ציר ה-<math>x</math>? סמנו אותה באות <math>T</math> על ציר ה-<math>x</math>.          ד. מהו המרחק של כל אחת מהנקודות <math>A, B</math> מהנקודה <math>T</math>?          ה. מצאו עוד זוג נקודות על הפרבולה שהן סימטריות לגבי ציר הסימטרייה.          ו. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.          ז. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.</p> <p><b>ביטוי מהצורה של הפונקציה <math>g(x)</math> מתקבל מהביטוי של הפונקציה מהצורה <math>f(x)</math> או של הפונקציה מהצורה <math>h(x)</math> על ידי טכניקה אלגברית.</b>  <b>הנוסחה לציר הסימטרייה בשביל הפונקציה <math>g(x) = ax^2 + bx + c</math> היא: <math>x = \frac{-b}{2a}</math>. תלמידים מתעניינים יופנו להוכחה שתופיע בספר</b></p>	<p><b>הפונקציות.</b>  <b>הקשר של ציר הסימטרייה עם נקודות האפס של הפרבולה.</b>  <b>ד. מתיחות: משפחת הפרבולות <math>y = ax^2</math> ואפיוניהן:</b>  <b>סימטרייה, תחומי עליה וירידה, נקודת מינימום או מקסימום, נקודות חיתוך עם הצירים (נקודת אפס ונקודת חיתוך עם ציר ה-<math>y</math>), תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.</b>  <b>ה. ביטויים שונים של פונקציה ריבועית:</b>  <math>f(x) = a(x - p)^2 + k</math>  <math>h(x) = a(x - m)(x - n)</math>  <math>g(x) = ax^2 + bx + c</math></p>
---	---

<p><b>הלימוד.</b></p> <p><b>דוגמאות:</b></p> <p>1. לפיכם ארבע פונקציות:</p> <p>א. <math>f(x) = (x - 1)^2 - 27</math>      ב. <math>g(x) = (x - 3)(x - 5)</math></p> <p>ג. <math>h(x) = -x^2 - 20x - 42</math>      ד. <math>t(x) = x^2 + 4x</math></p> <p><b>דיון:</b> עבור כל אחת מהפונקציות, אילו מהמאפיינים הבאים אפשר לקרוא מתוך הביטוי, כמעט ללא צורך בחישובים:</p> <p>i. פונקציה ריבועית בעלת מינימום או בעלת מקסימום</p> <p>ii. שיעורי הקדקוד של הפונקציה</p> <p>iii. תחום העלייה של הפונקציה ותחום הירידה שלה</p> <p>iv. מידת ה"מתיחה" של הפרבולה</p> <p>v. נקודות האפס של הפרבולה</p> <p>vi. נקודת החיתוך עם ציר y</p> <p>vii. התחום שבו ערכי הפונקציה חיוביים, התחום שבו ערכי הפונקציה שליליים</p> <p>viii. האם ניתן למצוא הצגה אחרת לכל אחד מהביטויים של הפונקציות? רשמו ביטויים אפשריים.</p> <p>2. א. הזיזו את הפרבולה שמשוואתה <math>y = 5x^2</math> ימינה 3 יחידות. רשמו את משוואת הפונקציה שהתקבלה.</p> <p>ב. הזיזו את הפרבולה שמשוואתה <math>y = 5x^2</math> 3 יחידות ימינה ו 2 יחידות למעלה רשמו את משוואת הפונקציה שהתקבלה.</p> <p>ג. הזיזו את הפרבולה שמשוואתה <math>y = 5x^2</math> כך שציר הסימטרייה שלה יהיה <math>x = -4</math>. רשמו את משוואת הפונקציה המתקבלת.</p> <p>ד. הזיזו את הפרבולה שמשוואתה <math>y = -3x^2</math> כך שקדקוד הפרבולה יהיה בנקודה <math>(3, -5)</math></p> <p>ה. הזיזו את הפרבולה שמשוואתה <math>y = x^2</math> כך שהיא תתלכד עם הפרבולה <math>y = x^2 + 4x + 6</math></p> <p>3. דיון כתתי: מבלי לפתור משוואות, ענו:</p> <p>א. כמה נקודות אפס יש לגרף של הפונקציה <math>f(x) = 2(x - 3)^2 + 4</math>? נמקו.</p> <p>ב. כמה נקודות אפס יש לגרף של הפונקציה <math>g(x) = -3(x - 2)^2 + 4</math>? נמקו.</p> <p>ג. כמה נקודות אפס יש לגרף של הפונקציה <math>h(x) = (x + 3)^2</math>? נמקו.</p> <p>ד. כמה נקודות אפס יש לגרף של הפונקציה <math>t(x) = x^2 + 3x + 3</math>? נמקו.</p> <p><b>מציאת נקודות אפס של פונקציה ריבועית:</b></p> <p><b>מציאת נקודות אפס של פונקציות מהמשפחה <math>g(x) = ax^2 + bx + c</math></b></p> <p>א. כאשר <math>c = 0</math> נפתור את המשוואה <math>ax^2 + bx = 0</math> על ידי הוצאת הגורם המשותף x מחוץ לסוגריים.</p> <p>ב. אשר <math>b = 0</math> נפתור את המשוואה <math>ax^2 + c = 0</math>.</p>	<p><b>- משמעות חלק מהפרמטרים של פונקציה ריבועית בייצוג הסימבולי והקשר לייצוגים גרפיים</b></p> <p><b>- נקודות אפס של פונקציה ריבועית</b></p>
--	---




<p><b>ג. כאשר <math>a, b, c</math> שונים מאפס, נפתור את המשוואה על ידי השלמה לריבוע.</b></p> <p><b>דוגמה:</b></p> <p>מצאו את נקודות האפס של הפונקציות הבאות:</p> <p>א. <math>f(x) = 2x^2 - 15x</math></p> <p>ב. <math>f(x) = 2x^2 - 32</math></p> <p>ג. <math>f(x) = x^2 + 6x + 8</math></p> <p>ד. <math>f(x) = 4x^2 - 12x + 5</math></p> <p><b>לתלמידים מתעניינים:</b></p> <p>הוכחת הנוסחה לפתרון המשוואה: <math>ax^2 + bx + c = 0</math> תיעשה על ידי <b>השלמה לריבוע</b>.</p> <p><b>ציר הסימטריה</b> בשביל הפונקציה <math>g(x) = ax^2 + bx + c</math> הוא בממוצע הפתרונות של המשוואה הריבועית המתאימה.</p> <p>פתרון מערכת המשוואות נותן את נקודות החיתוך של הגרפים.</p>	<p><b>ו. פתרון של המשוואות מהסוגים הבאים (ללא שימוש בנוסחה):</b></p> <p><math>ax^2 = b</math></p> <p><math>a(x - m)(x - n) = 0</math></p> <p><math>ax^2 + bx = 0</math></p> <p><b>ז. פתירת משוואות על ידי השלמה לריבוע של משוואות פשוטות מהצורה:</b></p> <p><math>x^2 + bx + c = 0</math></p> <p><b>הנוסחה:</b></p> $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ <p><b>ח. מערכת משוואות ממעלה שנייה וההיבטים הגרפיים שלהן</b></p>
--	---

**ט. ייצוג תופעות בעזרת פונקציות ריבועיות**

**דוגמה:**

צורות גדלות:



לפניכם שלוש צורות ראשונות מסדרת צורות.

א. הוסיפו את הצורה הרביעית בסדרה.

ב. מלאו את טבלת הערכים:

מספר המשבצות בצורה	מספר הצורה
	1

ג. האם תוכלו להשתמש בנתונים אלו על-מנת לחזות את כמות הריבועים בצורה השישית?

ד. כתבו פונקציה המתאימה את מספר המשבצות בצורה למספר הצורה. נמקו.

**דוגמאות:**

1. מספר אחד קטן מהמספר השני ב-2.

א. רשמו פונקציה המתאימה למספר הגדול את סכום הריבועים של שני המספרים.

ב. מהו המספר עבורו סכום הריבועים הוא הקטן ביותר? מהו סכום זה?

ג. מהם המספרים עבורם סכום המספרים הוא אפס? נמקו.

2. המרחק בין צמרות שני ברושים גדול פי 1.25 מהמרחק בין גזעיהם. אחד הברושים גבוה מן השני ב-1.5 מטרים. מה המרחק בין גזעיהם?

3. רוכב אופנוע נוהג לנסוע במהירות קבועה דרך מסוימת שאורכה 240 ק"מ. ביום גשום מאוד הקטין את מהירותו ב-20 קמ"ש וכתוצאה מכך נמשכה הדרך שעה יותר. מהי המהירות הקבועה בה רוכב האופנוע נוסע?

4. בתנאים רגילים מקבלים ריבית על הפקדת חסכון בבנק. הרווח מצטרף לקרן כל שנה וגם עליו מחשבים ריבית. מהו אחוז הריבית אם מקרן של 2,500 ₪ קבלו בתום שנתיים 2,756.25 ₪?

5. כמה צלעות למצולע אשר יש לו 20 אלכסונים?

6. עבור חלקה מלבנית הצמודה לקיר נקנתה גדר באורך 30 מ'.  
א. רשמו פונקציה המתאימה לאורך החלקה את שטח החלקה המגודרת.

ב. מה צריך להיות אורך החלקה כדי ששטח החלקה המגודרת יהיה מכסימלי?

**פתרון שאלות בעזרת משוואות ופונקציות קוויות וריבועיות**

ג. מהו שטח זה?




• ייתנו גם שאלות משלבות (אורייניות)


**דוגמה:**

**חלקת אדמה**

מר מזרחי גר במושב ולו חלקת אדמה שמידותיה  $55\text{ מ} \times 20\text{ מ}$ .  
 מדרום וממזרח לחלקה שלו שוכנת חלקה של משפחת קדם.  
 מר קדם מעונין, מטעמים השמורים עמו, שהחלקה שלו מדרום  
 תגדל על חשבון חלקתו ממזרח, לכן הוא מציע למר מזרחי  
 להתחלף בשטחים. הוא אפילו מסכים לתת שטח גדול יותר  
 מהשטח שהוא מקבל.  
 מר מזרחי ומר קדם מחליטים על החלפה באופן המוצג בשרטוט  
 – אחת מצלעות השטח המלבני שווה.



מר מזרחי רוצה לדעת באילו מקרים השטח שיקבל יהיה  
 שווה גדול או קטן מהשטח שייתן ולכן צייר שני גרפים.





אחד מהגרפים מתאר את השטח שמר מזרחי ייתן,  
 והשני מתאר את השטח שיקבל.

- א. איזה משני הגרפים מתאר את השטח שמר מזרחי ייתן, ואיזה את השטח שיקבל?
- ב. מסביב לחלקה של מר מזרחי יש גדר יקרה.  
 מר מזרחי אמר: לפחות על דבר אחד אני שמח. אינני צריך לשנות את אורך הגדר.  
 האם הוא צודק? הסבירו.
- ג. איזה שטח ייתן מר מזרחי אם  $x$  יהיה 10 מ?  
 האם מר מזרחי משיג שטח גדול יותר או קטן יותר במקרה זה, ביחס לשטח שהיה  
 לו קודם?
- ד. אם מר מזרחי ייתן 20% משטח החלקה שלו, מהו אחוז השטח שיקבל משטח  
 החלקה?
- ה. אילו מהביטויים הבאים מתארים את השטח שיישאר למר מזרחי לאחר החלפת  
 השטחים?  
 1.  $20(55 - x)$   
 2.  $20 \cdot 55 - 20x + x(55 - x)$   
 3.  $(20 + x)(55 - x)$   
 4.  $x(55 - x)$
- ו. מה צריך להיות ערכו של  $x$  כדי ששטח החלקה יישאר כפי שהיה לפני החלפה?

<p>ז. 1. האם תוכלו למצוא מספר עבור <math>x</math> כך ששטח החלקה שיישאר לו אחרי ההחלפה יהיה <math>1,250</math> מ"ר? אם לא – הסבירו מדוע. אם כן – מצאו והסבירו כיצד מצאתם.</p> <p>2. האם תוכלו למצוא מספר עבור <math>x</math> כך ששטח החלקה שיישאר לו אחרי ההחלפה יהיה <math>1600</math> מ"ר? אם לא – הסבירו מדוע. אם כן – מצאו והסבירו כיצד מצאתם.</p> <p>ח. אילו ערכים של <math>x</math> אינם מתאימים להחלפת השטחים?</p> <p>ט. מה צריך להיות <math>x</math> כדי שהשטח של מר מזרחי לאחר ההחלפה, יהיה הגדול ביותר? הסבירו כיצד מצאתם.</p>	
---	--

4. הסתברות (8 שעות)

נושאי הלימוד	הבהרות ודוגמאות
<p>מושג ההסתברות המוצג במודלים פשוטים, למשל: מודל הכד ומודל הרוליטה</p> <p>ניסוי דו שלבי וייצוגו בדיאגרמת עץ. כתיבת הסתברויות בכל ענף של העץ: ההסתברויות בענפים הראשונים של העץ מייצגות חלק משלם ואילו ההסתברויות על הענפים המשניים מייצגות חלק של חלק.</p> <p>מושג ההסתברות המותנית</p>	 <p>בכיתה ז הוצג מושג <b>ההסתברות</b> בין השאר דרך דוגמת הכד והכדורים. כאן נוסף את מודל הרוליטה (סביבון חץ). לדוגמה, ההסתברות של מאורע היא <math>1/3</math> אם נטייתו להתממש דומה לנטייתו של החץ המסתובב לעצור בגיזרה נתונה שגודלה <math>1/3</math> של העיגול השלם.</p> <p>מוצע לחזור על הקשר שבין הסתברות ובין שכיחות המתקבלת בניסויים רבים דרך שאלה כגון השאלה הבאה או דרך ביצוע סידרת ניסויים חוזרים רבים.</p> <p>דוגמה:</p> <p>כמה פעמים בערך תראה קובייה הוגנת מספר זוגי אם מטילים אותה 3,000 פעמים?  א. 10    ב. 50    ג. 500    ד. 1,000    ה. 1,500    ו. 2,000</p> <p>רוליטה המתאימה לניסוי דו שלבי תיבנה בשני שלבים. בשלב הראשון היא תחולק לגזרות בהתאם להסתברויות של תוצאות השלב הראשון של הניסוי, ובשלב השני תחולק כל גזרה לגזרות- משנה על פי יחסי ההסתברויות המתאימות בשלב השני של הניסוי.</p> <p><b>דיאגרמת עץ</b> תהווה ייצוג של אופן התפצלות הגזרות בשני שלבי הניסוי.</p> <p>התלמידים לא יידרשו לסרטט רוליטות (בגלל הקושי בסרטוט מדויק) אלא את הייצוגים כדיאגרמת-עץ.</p> <p><b>ההסתברות המותנית</b> תילמד ללא סימון פורמלי אלא בתיאור מילולי כגון "ההסתברות שתהיה ל-... אם וכאשר יקרה ...". ההסתברויות המותנות נכתבות על ענפי השלב השני של עץ ההסתברויות.</p> <p>הסתברות של תוצאה מאוחדת תוצג דרך הייצוג ברוליטה.</p> <p>תרגיל לדוגמה:</p> <p>משה, דינה, מרים, שלמה ואברהם נבחרו פה אחד לוועד הכיתה, והם החליטו לבחור יו"ר בהגרלה. מכיוון שמספר הבנות שבכיתה כפול ממספר הבנים הוחלט לבצע את</p>



הבחירה בעזרת שתי הטלות קובייה.  
 הטלה ראשונה של הקובייה תכריע בין  
 "בת" ו-"בן" באופן שאם יתקבל 1 או  
 2 או 3 או 4 היו"ר יהיה אחת הבנות  
 ואם יתקבלו 5 או 6 יהיה היו"ר אחד  
 הבנים. ההטלה השנייה תכריע בין  
 הבנות או בין הבנים בדרך הבאה:

במקרה הראשון, אם יתקבל מספר זוגי תיבחר דינה ואם יתקבל מספר אי-זוגי תיבחר מרים. במקרה השני 1 או 2 יביאו לבחירת משה, 3 או 4 יביאו לבחירת שלמה ואם יתקבלו 5 או 6 ייבחר אברהם.

א. השלימו את ההסתברויות על הענפים ומתחת לתוצאות הסופיות בתרשים המצורף.

ב. מה ההסתברות לכך ששם היו"ר יתחיל ב-מ?

מה ההסתברות לכך ששם היו"ר יכיל מ?


**התרה:**

ההסתברויות של יושבי הראש השונים הם גודלי הגזרות השונות שברוליטה, היינו,  $1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/9$ .

ההסתברות ששם היו"ר יתחיל ב-מ היא סכום גודלי הגזרות של מרים ומשה, כלומר,  $1/3 + 1/9 = 4/9$




**תחום אלגברי: 5. קריאת מידע מגרפים ודיאגרמות (4 שעות)**

נושאי הלימוד	הבהרות ודוגמאות
<p><b>א. השוואת נתונים והסקת מסקנות</b></p> <p><b>ב. העלאת שאלות</b></p> <p><b>ג. התייחסות איכותית למכסימום ומינימום, ולעליה וירידה ולמהירות של עליה וירידה</b></p>	<p><b>את הנושא הזה מומלץ ללמד במקביל לנושאים האחרים.</b></p> <p><b>דוגמאות:</b></p> <p>1. טמפרטורה הגרפים (לקוחים מאטלס ביו-אקלימי מאת פרופ' ד' אשבל) מתארים את טמפרטורת האדמה בשני ימי קיץ בירושלים, בעומק 1.5 ס"מ מפני הקרקע ובעומק 8 ס"מ.</p>  <p><b>א. באיזו שעה הטמפרטורה בעומק 1.5 ס"מ היא מכסימלית ובאיזו שעה היא מינימלית?</b></p> <p><b>ב. באיזו שעה הטמפרטורה לעומק 8 ס"מ היא מכסימלית ובאיזו שעה היא מינימלית?</b></p> <p><b>ג. מה ההפרש שבין הטמפרטורה המקסימלית והמינימלית בעומק 1.5 ס"מ?</b></p> <p><b>ד. מה ההפרש שבין הטמפרטורה המכסימלית והמינימלית לעומק 8 ס"מ.</b></p> <p><b>ה. הסבירו מדוע תנודות הטמפרטורה בעומק 1.5 ס"מ גדולות מהתנודות בעומק 8 ס"מ?</b></p> <p><b>ו. הסבירו מדוע הטמפרטורות המקסימליות בשני העומקים מתקבלות בזמנים שונים?</b></p> <p><b>ז. מתי מתחממת האדמה (בעומק 1.5 ס"מ) במהירות משמעותית ומתי היא מתקררת במהירות משמעותית?</b></p> <p><b>ח. באילו שעות אין שינויים גדולים בטמפרטורה (בעומק 1.5 ס"מ)?</b></p> <p><b>ט. ציירו על-פי ניחוש גרף המתאר את הטמפרטורות בעומק 13 ס"מ.</b></p>

2. שועלים וארנבות

כאשר שועלים וארנבות נמצאים באותו שטח יש קשר בין השתנות שתי האוכלוסיות. השועלים אוכלים את הארנבות והארנבות - הם לעתים האוכל העיקרי של השועלים. לכן ישנו קשר סיבתי ביניהם, כמו למשל – גידול של אוכלוסיית השועלים גורם להקטנת אוכלוסיית הארנבות והפוך: הקטנה של אוכלוסיית הארנבות גורמת להקטנה של אוכלוסיית השועלים.

הגרפים שלפניכם מתארים את השתנות אוכלוסיות השועלים והארנבות (בקני מדה שונים)



כתבו במקומות המתאימים את המילים "גבוהה", "נמוכה", "עולה" או "יורדת" לפי העניין. נמקו!

א. בזמן a אוכלוסיית השועלים היא \_\_\_\_\_ לכן אוכלוסיית הארנבות \_\_\_\_\_

ב. בזמן b אוכלוסיית הארנבות \_\_\_\_\_ ביותר לכן אוכלוסיית השועלים \_\_\_\_\_ במהירות.

ג. בזמן c ובזמן d יש אוכלוסיות שועלים שוות, אך בזמן c יש יותר ארנבות מבזמן d. באיזה משני הזמנים האלה גדלה אוכלוסיית הארנבות יותר מהר? התוכל להסביר למה?

ד. הסבר מדוע מגיעה אוכלוסיית השועלים למקסימום כאשר אוכלוסיית הארנבות כבר בירידה.

3. מתוך האתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחרו נתונים בנושא המעניין אותכם (למשל,

דיאגרמות אוכלוסייה): <http://www.cbs.gov.il/index.htm>

על סמך המידע שבחרתם לראות:

א. העלו שתי שאלות חשובות שאפשר לקבל עליהן תשובות מהמידע שבחרתם להציג.


ב. האם המידע שבחרתם להציג משקף את המצב בכיתה, בשכונה או בעיר



<p>שלכם? הסבירו את התשובה. ג. האם המידע שבחרתם להציג מאפשר לחזות מגמה לשנתיים הבאות? אם כן- מהי? אם לא- בחרו מידע אחר שמאפשר זאת ותיארו את המגמה.</p>	
---	--

**נושאים למתקדמים – דוגמאות**

מספרים ממשיים (6 שעות)

הבהרות ודוגמאות	הנושאים
<p><b>א.</b> לפניכם ציר המספרים שעליו מסומנים המספרים 0 ו 1. סמנו על ציר המספרים הזה מספר <math>\sqrt{2}</math> (אפשר להשתמש באורך היתר של משולש ישר זווית שאורכי ניצביו הם 1).</p>  <p><b>ב.</b> יש <math>m</math> ו-<math>n</math> שלמים אשר <math>\frac{m}{n}</math> קרוב ל-<math>\sqrt{2}</math>. דוגמאות: <math>\frac{577}{408}</math> ו- <math>\frac{8119}{5741}</math> וכן <math>\frac{1414213}{1000000}</math>. אבל אין <math>m</math> ו-<math>n</math> שלמים אשר <math>\sqrt{2} = \frac{m}{n}</math>.</p> <p><b>תקציר הוכחה:</b></p> <p>נניח שקיימים <math>m</math> ו-<math>n</math> שלמים אשר <math>\sqrt{2} = \frac{m}{n}</math> כלומר, <math>2n^2 = m^2</math>. זה לא יתכן כי <math>m^2</math> מתחלק ב-2 מספר זוגי של פעמים ואילו <math>2n^2</math> מתחלק ב-2 מספר אי-זוגי של פעמים.</p> <p>ההוכחה מסתמכת על זה שמכפלת שני אי-זוגיים היא אי זוגית.</p> <p><b>תרגילים:</b></p> <p>הוכח אירציונליות של <math>\sqrt[3]{2}</math> ושל <math>\sqrt{5}</math>.</p> <p>מדוע אין שיקול דומה מראה ש- <math>\sqrt{4}</math> אינו רציונלי.</p> <p><b>ג.</b> ללא הוכחה: <math>\pi</math> הוא מספר אי רציונאלי.</p> <p><b>דוגמאות:</b></p> <p>1. דוגמאות של חילוק ארוך כגון 3:7 ואח"כ 50:34 יראו מדוע חייבת להתקבל מחזוריות. תרגיל חילוק <math>2345 : 37 = 63.\overline{378378}...</math></p> <p>ייתן שבר עשרוני מחזורי. על מנת לבדוק נסמן את התוצאה באות <math>a</math>.</p> <p>החישוב יראה ש- <math>1000a - a = 63378.\overline{378}... - 63.\overline{378}... = 63315</math></p> <p>לכן <math>999a = 63315</math> לכן <math>a = \frac{63315}{999} = \frac{2345}{37}</math></p> <p>בדרך זו ניתן להפוך כל שבר עשרוני מחזורי לשבר פשוט.</p> <p>2. הוכיחו כי <math>0.999... = 1</math></p>	<p><b>א.</b> <math>\sqrt{2}</math> ממשי אך לא רציונאלי.</p> <p>מספר ממשי הוא כל מספר המיוצג על ידי נקודה שעל ציר המספרים.</p> <p>מספר רציונאלי הוא מספר השווה למנה של שני מספרים שלמים.</p> <p><b>ב.</b> מעבר משבר פשוט אל שבר עשרוני מחזורי ומשבר עשרוני מחזורי אל שבר פשוט</p>

<p><b>דוגמאות:</b></p> <p>1. א. ניצור שבר עשרוני אינסופי לא-מחזורי כך: <math>0.101001000100001\dots</math> ב. ניצור שבר עשרוני אינסופי כלשהו שבו מופיעה הספרה 7 במקום ה-10, במקום ה-100, במקום ה-1000 וכולי, ורק שם. ג. יצרו שבר עשרוני אינסופי שאיננו מחזורי. הסבירו מדוע הדרך שבה אתם יוצרים את השבר מבטיחה שהשבר איננו מחזורי.</p> <p>2. הוכיחו ש- <math>4 - 9\sqrt{2}</math> אינו רציונאלי</p>	<p><b>ג. יצירת דוגמאות של מספרים אירציונאליים</b></p>
--	---

## תכנית הלימודים בגאומטרייה לכיתה ט

לתלמידים מתקדמים ומתעניינים כוללת התכנית תוספת של תכנים משני סוגים:  
 א. פרקים עצמאיים בהיקף של 4 עד 10 שעות. דוגמאות לפרקים כאלה מופיעות בסוף התכנית.  
 ב. פרקונים קצרים בהיקף של כשעור. דוגמאות לפרקונים כאלה מופיעות (עם רקע) בצמוד לנושאים בתכנית כהרחבה והעמקה.

תחום גאומטרי: 1. משפחת המרובעים (בגישה דדוקטיבית) (20 שעות)	
נושאי הלימוד	הבהרות ודוגמאות
<p>א. חזרה על מקבילות אכסיומת המקבילים</p> <p>ב. זוויות בין מקבילים וחותר משפט: ישר החותר מקבילים יוצר זוויות מתחלפות שוות וזוויות מתאימות שוות. משפט: אם חותר של שני ישרים יוצר זוויות מתחלפות שוות או זוויות מתאימות שוות אז הישרים מקבילים.</p>	<p>התלמידים יכירו את הגדרות המושגים, יכירו הוכחות של משפטים ויזכירו טענות באופן עצמאי. בצד הלימוד הדדוקטיבי, התלמידים יעסקו גם בחישובי שטחים והיקפים.</p> <p>מאכסיומת המלבן, אם במרובע יש שלוש זוויות ישרות גם הרביעית ישרה והצלעות הנגדיות שוות זו לזו, נקבל שאם לשני ישרים במישור יש ניצב משותף אז כל ניצב לאחד הישרים ניצב לחברו, והמרחק בין הישרים קבוע (לכן או שהם מתלכדים או שאינם נפגשים). <b>אכסיומת המקבילים הקלסית</b> שקולה לאכסיומת המלבן (ללא הוכחה).</p> <p>המושגים: <b>זוויות מתחלפות, זוויות מתאימות.</b> זיהוי זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות בין שני ישרים וחותר.</p> <p>בעקבות צמד המשפטים ייערך דיון בנושא: <b>טענה וטענה הפוכה</b> הערה: יש טענה וטענה הפוכה לה ששתיהן נכונות, אך יש להבהיר שלא כל הטענות ההפוכות לטענות נכונות הן נכונות. אם ניתן להוכיח טענה הפוכה למשפט, אז הטענה ההפוכה אף היא משפט. דוגמאות: א. טענה נכונה והטענה ההפוכה לה נכונה</p>

<p>טענה: במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו. טענה הפוכה: משולש שבו יש שתי זוויות שוות הוא משולש שווה שוקיים. ב. טענה נכונה והטענה ההפוכה לה אינה נכונה טענה: בריבוע האלכסונים ניצבים ושווים זה לזה. טענה הפוכה: מרובע שבו האלכסונים ניצבים ושווים זה לזה הוא ריבוע (הראו על ידי דוגמה נגדית).</p> <p><b>הגדרה: מקבילית היא מרובע שבו כל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו.</b></p> <p><b>הערה: ניתן גם להגדיר אחרת ולשנות בהתאם את מערכת המשפטים על התכונות.</b></p> <p><b>חזרה על שטח משולש ומעבר לשטח מקבילית.</b></p> <p><b>מסקנה: סכום שתי זוויות סמוכות במקבילית הוא <math>180^{\circ}</math>.</b></p> <p><b>דיון: ניסוח טענות הפוכות לשני המשפטים הראשונים שבימין, בחירת הטענות הנכונות והוכחתן.</b></p>	<p><b>ג. המקבילית ותכונותיה</b></p> <p><b>משפט:</b> <b>צלעות נגדיות במקבילית שוות זו לזו.</b> <b>משפט:</b> <b>זוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזו.</b> <b>משפט:</b> <b>אם במרובע שני זוגות הצלעות הנגדיות שוות זו לזו – המרובע הוא מקבילית.</b> <b>משפט:</b> <b>אם במרובע שני זוגות הזוויות הנגדיות שוות זו לזו – המרובע הוא מקבילית.</b> <b>משפט:</b> <b>אם שתי צלעות במרובע שוות ומקבילות זו לזו אז המרובע הוא מקבילית.</b> <b>משפט:</b> <b>אלכסוני המקבילית חוצים זה את זה.</b> <b>משפט:</b> <b>מרובע שאלכסוניו חוצים זה את</b></p>
---	---

<p>טענה: מקבילית ישרת זווית היא מלבן.</p> <p>דיון: התייחסו לטענות הבאות, מי מהן נכונה? מדוע?</p> <p>א. מרובע שאלכסוניו שווים זה לזה הוא מלבן. ב. מקבילית שאלכסוניה שווים זה לזה היא מלבן. חישוב שטח המלבן (חזרה, כולל מלבנים שצלעותיהם נמדדות בשברים).</p> <p>הגדרה: <b>מעוין</b> הוא מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו. על סמך הטענה - מרובע שצלעותיו הנגדיות שוות זו לזו הוא מקבילית - נקבל שהמעוין הוא מקבילית מיוחדת ולכן יש למעוין את כל תכונות המקבילית. הערה: ניתן גם להגדיר אחרת את המעוין.</p> <p>ניסוח טענות הפוכות למשפטים שבימין והוכחתם. חישוב שטח של מעוין.</p>	<p>זה הוא מקבילית.</p> <p>ד. תכונות של המלבן</p> <p>משפט: במלבן האלכסונים שווים זה לזה (הוכח בכיתה ז').</p> <p>משפט: מקבילית שאלכסוניה שווים זה לזה היא מלבן.</p> <p>משפט: במשולש ישר זווית, התיכון ליתר שווה למחצית היתר.</p> <p>ה. המעוין ותכונותיו</p> <p>משפט: אלכסוני המעוין ניצבים זה לזה וחוצים את זוויות המעוין.</p> <p>משפט: מקבילית שאלכסוניה מאונכים זה לזה היא מעוין.</p> <p>משפט: מקבילית שאחד מאלכסוניה חוצה את אחת מזוויותיה היא</p>
---	---

<p>הריבוע הוא מעוין ישר זווית והוא מלבן שווה צלעות. התכונות הנגזרות מהיותו מלבן או מהיותו מעוין. הגדרה: <b>דלתון</b> הוא מרובע שיש לו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו. <b>קדקוד ראש</b>: קדקוד הנמצא בין שתי צלעות שוות. <b>אלכסון ראשי</b>: אלכסון המחבר את שני קדקודי הראש. האלכסון האחר נקרא: <b>אלכסון משני</b>.</p> <p>הגדרה: <b>טרפז</b> הוא מרובע שבו זוג אחד בלבד של צלעות מקבילות זו לזו. הצלעות המקבילות נקראות: <b>בסיסי הטרפז</b>. הצלעות שאינן מקבילות נקראות: <b>שוקי הטרפז</b>. הערה: המילה "בלבד" שבהגדרת הטרפז באה על מנת שמקבילית לא תיחשב טרפז, ובמשפט על טרפז שווה שוקיים לא נצטרך להוסיף את המילים "שאינו מקבילית". ניתן גם להוכיח שמרובע הוא טרפז אם מראים שלמרובע שתי צלעות מקבילות שונות באורכן.</p>	<p><b>מעוין</b>.</p> <p>ו. תכונות הריבוע</p> <p>ז. דלתון</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• הגדרת הדלתון ותכונותיו</li></ul> <p>משפט: האלכסון הראשי של הדלתון ניצב לאלכסון המשני וחוצה את זוויות הראש של הדלתון.</p> <p>משפט: בדלתון הזוויות - שאינן זוויות ראש - שוות זו לזו.</p> <p>ה. טרפז</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• הגדרת הטרפז ותכונותיו</li></ul> <p>משפט: בטרפז שווה שוקיים שוות זוויות הבסיס זו לזו, והאלכסונים שווים זה לזה.</p> <p>משפט: טרפז שאלכסוניו שווים זה לזה הוא טרפז שווה שוקיים.</p>
--	---


<p>מציאת שטח טרפז או באמצעות חלוקה לחלקים או הכפלת הטרפזים למקבילית או הפיכת הטרפז למשולש.</p>	<p><b>משפט:</b>  <b>טרפז שיש לו זוג של זוויות בסיס שוות זו לזו הוא טרפז שווה שוקיים.</b></p>
--	--

<p><b>תחום גאומטרי: 2. משולשים (14 שעות)</b></p>	
<p><b>נושאי הלימוד</b></p>	<p><b>הבהרות ודוגמאות</b></p>
<p><b>צלעות וזוויות במשולש</b></p> <p><b>משפט:</b>  <b>סכום הזוויות הפנימיות במרובע הוא <math>360^{\circ}</math>.</b></p> <p><b>משפט:</b>  <b>סכום הזוויות במצולע קמור בעל <math>n</math> צלעות הוא: <math>180^{\circ}(n - 2)</math></b></p> <p><b>זווית חיצונית במצולע קמור</b></p> <p><b>משפט:</b>  <b>זווית חיצונית במשולש שווה לסכום שתי זוויות המשולש שאינן צמודות לה.</b></p> <p><b>משפט:</b>  <b>סכום הזוויות החיצוניות, במגמה אחת, במצולע קמור הוא <math>360^{\circ}</math>.</b></p> <p><b>משפט:</b>  <b>במשולש, מול הצלע הגדולה</b></p>	<p><b>ההוכחה מסתמכת על סכום זוויות במשולש ועל כך שכל מרובע ניתן לחלק לשני משולשים.</b></p> <p><b>מרובע שאינו קמור מספק הזדמנות לדבר על זווית בת יותר מ- <math>180^{\circ}</math>.</b></p> <p><b>בכיתות מתקדמות אפשר להוכיח שהטענה נכונה גם למצולעים שאינם קמורים.</b></p> <p><b>מצולע קמור הוא מצולע שכל אלכסונו פנימיים.</b></p> <p><b>הגדרה: <b>זווית חיצונית</b> במצולע קמור היא זווית שבין צלע המצולע לבין המשך צלע אחרת.</b></p>





<p>הגדרה: קטע המחבר אמצע צלע אחת במשולש עם אמצע צלע אחרת במשולש הוא <b>קטע אמצעים</b>.</p> <p>נושא <b>הבניות</b> יילמד במשולב עם התכנים הקודמים לפי הצורך. יש להרגיל את התלמידים לסרטט במדויק במהלך הלימוד השוטף.</p>	<p>יותר נמצאת הזווית הגדולה יותר.</p> <p>משפט: במשולש, מול הזווית הגדולה יותר נמצאת הצלע הגדולה יותר.</p> <p>משפט: סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית.</p> <p>קטע אמצעים במשולש</p> <p>משפט: קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה.</p> <p>משפט: קטע היוצא מאמצע צלע אחת במשולש ומקביל לצלע שנייה, חוצה את הצלע השלישית.</p> <p>בניות בסרגל ומחוגה העתקת קטע, חציית קטע, העתקת זווית, חציית זווית, העברת אנך מנקודה מחוץ לישר, העברת אנך מנקודה על הישר.</p>
---	---

תחום גאומטרי: 3. מעגל (20 שעות)	
נושאי הלימוד	הבהרות ודוגמאות
<p>• הגדרת המעגל ותכונותיו - מושגים</p> <p>הרחבה לתלמידים מתקדמים:</p>	<p><b>הגדרות:</b>  <b>מעגל:</b> קבוצת כל הנקודות שמרחקן מנקודה מסוימת שווה לאורך מסוים קבוע נקראת מעגל. הנקודה היא <b>מרכז המעגל</b> והאורך הקבוע הוא אורך הרדיוס.  <b>רדיוס המעגל:</b> קטע המחבר את מרכז המעגל עם נקודה על המעגל.  <b>מיתר:</b> קטע המחבר שתי נקודות על המעגל.  <b>קוטר המעגל:</b> מיתר העובר דרך מרכז המעגל.  <b>קשת:</b> חלק מהמעגל המוגבל על ידי שתי נקודות.                      שימו לב: שתי נקודות שעל מעגל מחלקות אותו לשתי קשתות.  <b>זווית מרכזית:</b> זווית שקדקודה במרכז המעגל ושוקיה רדיוסים.  <b>זווית היקפית:</b> זווית שקדקודה על היקף המעגל ושוקיה חותכים את המעגל.                      - חזרה על <b>נוסחאות שטח העיגול והיקפו</b>.</p> <p><b>דוגמה: קירובי <math>\pi</math></b>                      היחס בין היקף המעגל לקוטרו הוא יחס קבוע (כלומר, שווה בכל המעגלים, קטנים כגדולים). משום כך ניתן למצוא קירובים ליחס זה באמצעות מדידה או באמצעות חישובים פשוטים, וכך אכן עשו המדענים בימי קדם.                      נראה כיצד מקבלים שהיקף מעגל גדול יותר מפי שלושה מהקוטר. דרך ההיסק: נצא מנקודה שעל המעגל ובסיוע קשתות שמחוגן כמחוג המעגל נבנה בזה אחר זה משולשים שווים צלעות כבציר א. נקבל סגירה מדויקת כי הזוויות בנות <math>60^\circ</math>.                      אורך צלע המשולש שווה לרדיוס המעגל, היקף המשולש שווה <math>6R</math>.                      היקף המעגל, הגדול מהיקף המשולש, שווה <math>2\pi R</math> ולכן <math>\pi &gt; 3</math>.                      נעבור למצולע בן 12 צלעות על-ידי חציית זוויות (ציור ב) ונחשב</p>



(בסימונים של ציור ג):



$$AD = \sqrt{1 - 0.5^2} = 0.866025$$

$$DC = 1 - 0.866025 = 0.133975$$

$$BC = \sqrt{0.5^2 + 0.133975^2} = 0.517638 \dots$$

$$\pi > 6 \cdot 0.517638 = 3.105828$$

ואפשר להמשיך למצולע בן 24 צלעות ולהשתמש בקירוב שהתקבל:

$BC = 0.517638/2$  וכן הלאה. נקבל סדרה של מספרים הולכים

וגדלים המתקרבים ל- $\pi$ .

הראנו כיצד אפשר לקבל סדרה של מספרים המתקרבים ל- $\pi$

מלמטה.

בצורה דומה, על ידי בניית מצולעים חוסמים למעגל, ניתן למצוא סדרה

של מספרים המתקרבים ל- $\pi$  מלמעלה.

שתי סדרות המספרים נותנות קירוב ל- $\pi$ .

הערות:

א. אם במעגל שרדיוסו 1 יש לזווית מרכזית מסוימת מיתר באורך  $a$  אז

למחציתה יש מיתר באורך  $\sqrt{a^2/4 + (1 - \sqrt{1 - a^2/4})^2}$  השווה

$$\text{ל-} \sqrt{2 - \sqrt{4 - a^2}}$$

אם נצא מ- $a = 0.517638$  אז בשלושה צעדי חישוב נקבל מספר

שמרחקו מ- $\pi$  קטן מאלפית.



ב. ביטוי אחר בשביל המיתר החדש הוא  $\frac{a}{\sqrt{2 + \sqrt{4 - a^2}}}$ . יתרונו בזה

שהוא מראה שככל ש- $a$  קטן כן קרוב המיתר החדש להיות שווה לחצי

<p><b>המיתר הקודם.</b></p> <p><b>ג. אופציה: שימוש בנ"ל בגליון אלקטרוני</b></p> <p>הוכחה על ידי הנחת הגזרות זו על זו, הוכחה לא פורמלית.</p> <p>מסקנה: במעגל, מיתרים שווים זה לזה אם ורק אם יש להם קשתות שוות זו לזו.</p> <p>אפשר להוכיח את המשפט על סמך משפט פיתגורס.</p>	<p><b>משפט:</b> במעגל, שתי זוויות מרכזיות שוות זו לזו אם ורק אם יש להן קשתות מתאימות שוות זו לזו.</p> <p><b>משפט:</b> במעגל, שתי זוויות מרכזיות שוות זו לזו אם ורק אם יש להן מיתרים שווים זה לזה.</p> <p><b>משפט:</b> האנך ממרכז המעגל למיתר חוצה את המיתר, חוצה את הזווית המרכזית המתאימה למיתר וחוצה את הקשת המתאימה למיתר.</p> <p><b>משפט:</b> זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית המונחת על אותה הקשת.</p> <p><b>מסקנה:</b> במעגל, לזוויות היקפיות שוות קשתות שוות ומיתרים שווים.</p> <p><b>מסקנה:</b> במעגל, לקשתות שוות מתאימות זוויות היקפיות שוות.</p> <p><b>משפט:</b> ככל שמיתר במעגל גדול יותר, מרחקו מהמרכז קטן יותר.</p>
--	--



<p>הגדרה: <b>משיק</b> הינו ישר המאונך לקצה של רדיוס על היקף המעגל.</p>	<p>- משיק למעגל משפט: המשיק למעגל הינו ישר בעל נקודה משותפת יחידה עם המעגל. משפט: זווית הכלואה בין משיק ומיתר היוצאים מנקודה אחת שעל המעגל שווה לזווית ההיקפית הנשענת על הקשת הכלואה בין המשיק והמיתר. משפט: שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה – שווים זה לזה.</p>
--	---

תחום גאומטרי: 4. גאומטרייה של המרחב (6 שעות)	
נושאי הלימוד	הבהרות ודוגמאות
<p>משפט: ישר, העובר בנקודה שבמישור וניצב שם לשני ישרים שונים שבמישור זה, ניצב גם לכל ישר הנמצא באותו מישור ועובר באותה נקודה.  הגדרה: ישר כזה נקרא אנך למישור.</p>	<p>מומלץ להקדים הצגה הסתכלותית של המשפט. למשל, כספר פתוח עומד על השולחן ניצבת שדרתו (= גב הספר) לא רק לצלעות התחתונות של עמודי הכריכה אלא גם לאלה של כל העמודים. בכיתות רגילות ישמש הדבר תחליף להוכחה ובכיתות חזקות יסייע להבנתה (מחקר הראה ששכנוע מוקדם בנכונותה של טענה מסייע להבנת ההוכחה). ראו נספח על דרך להכנסת המשפט והוכחתו. (ההבדלים שבין ההוכחה המוצעת ובין ההוכחה הקלסית הבעייתית קשורים בהבנה שונה של המלה "פשוט").  שימוש במשפט לחישוב אלכסון של תיבה שמקצועותיה נתונים.</p>

<p><b>דוגמאות:</b></p> <p>א. הראו שהאנך מנקודה למישור קצר מכל קטע אחר המחבר את הנקודה והמישור.          ב. למתקדמים: בסיסה של פירמידה חסום במעגל ומקצועותיה הצדדיים שווים זה לזה.          הוכיחו שהגובה עובר במרכז המעגל.</p> <p><b>הוכחה:</b></p> <p>יהי <math>r</math> רדיוס הכדור, ויהי <math>OM</math> אנך ממרכז הכדור אל המישור ואורכו <math>h</math>. תהי <math>P</math> נקודה כלשהי בחיתוך של הכדור והמישור ונסמן את מרחקה מ-<math>M</math> ב-<math>s</math>. מרחקה מ-<math>O</math> הוא כמובן <math>r</math>. נקבל ש-<math>s^2 = r^2 - h^2</math> לכן אותו ערך <math>s</math> יתקבל לכל נקודה שבחיתוך הנ"ל לכן נקודות החיתוך יוצרות מעגל שמרכזו <math>M</math> ורדיוסו <math>s</math>.</p>   <p><b>קווי אורך וקווי רוחב על כדור הארץ (המסלול האווירי הקצר מלוד להונולולו עובר קרוב לקוטב הצפוני)</b></p> <p><b>דוגמה:</b>          בהנחה שכדור הארץ הוא אמנם כדור ורדיוסו 6,371 ק"מ. (במציאות הכדור קצת פחוס והרדיוס הנזכר הוא רדיוס ממוצע) סרטטו משולש ישר זווית עם זווית בת <math>32^\circ</math> ומדדו את צלעותיו. פי כמה גדול רדיוס כדור הארץ מן היתר שבמשולש שלכם? מצאו לפי זה ערך מקורב בשביל רדיוס קו הרוחב של ירושלים, ובשביל אורכו של קו הרוחב.</p>	<p><b>משפט:</b>          מחיתוך של מישור וכדור מתקבל מעגל.</p> <p><b>מעגל גדול על כדור הגדרה:</b>          מעגל גדול על כדור הוא מעגל שמרכזו מתלכד עם מרכז הכדור.  <b>טענה:</b>          דרך שתי נקודות שאינן על קוטר עובר מעגל גדול יחיד.</p>
---	--

**נספח: ישר ניצב למישור**


אמיתי וגלעד רצו להעמיד תורן לדגל, שיהיה ניצב לקרקע, ותכניתם הייתה זאת: נסרטט על הקרקע ריבוע שאלכסוניו באורך 6 מטר (ולכן כל חצי אלכסון יהיה באורך 3 מטר). בגובה 4 מטר מתחתית התורן נקשור ארבעה חבלים שאורך כל אחד 5 מטר ובקצהו לולאה, נשים את תחתית התורן במרכז הריבוע ונרכיב את הלולאות על יתדות שנתקע בארבעת קדקודי הריבוע. באופן זה נקבל ארבעה משולשים שצלעותיהם 3, 4 ו-5 מטר לכן הם ישרי זווית. (בציור שמימין הריבוע שעל הקרקע ובציור שמשמאל מבט אלכסוני על תוכנית ההעמדה של התורן. במבט אלכסוני עשויים קטעים שווים להיראות שונים. למשל, בציור נראה AF גדול בהרבה מ-BF למרות ששניהם באורך 5, והזוויות נראות שונות מגודלן האמיתי.)



ההעמדה של התורן. במבט אלכסוני עשויים קטעים שווים להיראות שונים. למשל, בציור נראה AF גדול בהרבה מ-BF למרות ששניהם באורך 5, והזוויות נראות שונות מגודלן האמיתי.)

(האמיתי.)


אמר גלעד: בגלל פיתגורס יהיה התורן ניצב לאלכסוני הריבוע, אבל האם אתה בטוח שהוא יהיה ניצב גם לכל ישר אחר המונח על הקרקע ועובר דרך E ?  
אמר אמיתי: אני בטוח בזה, ואני חושב שאצליח גם להוכיח זאת, אבל בוא נקרא לשירה. היא חזקה בגאומטרייה וודאי תוכל למצוא הוכחה.  
אמרה שירה: תחילה אוכיח כבקשתכם, אחר כך אראה שבאותה דרך אפשר להוכיח משפט יותר כללי, ולבסוף אציע על סמך המשפט והוכחתו דרך שתקל את עבודתכם.



ובכן, יהי נתון על הקרקע ישר כלשהו העובר דרך E, ונסמן את נקודות חיתוכו עם הריבוע ב-G ו-H. המשולשים AGE ו- CHE שישר זה חותך מן הריבוע חופפים זה לזה על פי צ"צ, כי לשניהם צלע באורך 3 ושתי הזוויות שעל ידה במשולש האחד שוות למתאימות להן במשולש השני כקדקודיות או כמתחלפות בין מקבילים. לכן  $GE=HE$  ו-  $AG=CH$ .

נחבר את H ו-G אל F ונקבל את המשולשים GAF ו- HCF (המשולשים הנקודים שבציור). משולשים אלה חופפים לפי צ"צ כי (א) הזוויות A ו-C במשולשים אלה שוות כי הן מתאימות במשולשי הפאות של הפירמידה (פאות אלה חופפות לפי צ"צ). (ב)  $CF=AF$  כי שתיהן בנות 5 מטר. (ג)  $AG=CH$  כמוכח לעיל.

לכן המשולש HFG הוא שווה-שוקיים וכבר הוכחנו ש-  $GE=HE$ , לכן FE הוא תיכון לבסיס במשולש שווה שוקיים, לכן ניצב לבסיס. ■



והרי משפט כללי: אם ישר ניצב לשני ישרים שונים הנמצאים במישור אחד אז הוא ניצב לכל ישר אחר הנמצא באותו מישור ופוגש את שלושת הישרים.

הוכחה: לכל שני ישרים שעל הקרקע נוכל ליצור מלבן כבציר, ובכל ההוכחה שלעיל לא השתמשנו בשום תכונה של ריבוע שאינה גם תכונה של מלבן, וגם לא השתמשנו בזה שהמשולשים ישרי הזווית נוצרו דווקא מצלעות של 3,



4 ו-5 אלא רק בשוויון הצלעות המתאימות שבמשולשים אלה. ■


כתוספת אמרה שירה: בעקבות המשפט הכללי ודברים שהופיעו בהוכחה תוכלו לחסוך קצת עבודה. אינכם חייבים להבטיח ש-AC ו-BD יהיו אלכסוני ריבוע, ולא להקפיד על האורכים 3, 4 ו-5. כל הנדרש הוא להבטיח את השוויונות  $FA=FC$  ו- $FB=FD$  על ידי שני זוגות של חבלים נגדיים שווי אורך המחברים לקרקע במרחקים שווים.




**נושאים למתקדמים – דוגמאות**

הוכחות על ידי שטחים (4 שעות)



הבהרות ודוגמאות	הנושאים
<p>הוכחה: נסרטט חוצה זווית לאחת מזוויות המשולש. מנקודת החיתוך של חוצה הזווית עם הצלע שממול לזווית נסרטט אנכים לשתי הצלעות האחרות של המשולש. אנכים אלה שווים זה לזה.</p> <p>נסמן את הצלעות, את חלקי-הצלע ואת שטחי שני המשולשים כבצורה.</p> <p>בגלל שוויון הגבהים לצלעות a, b יהיה</p> $S_1/S_2 = a/b$ <p>כמו כן, בגלל הגובה המשותף לצלע c יהיה</p> $S_1/S_2 = c_1/c_2$ <p>לכן <math>c_1/c_2 = a/b</math></p> 	<p>משפט: חוצה זווית מחלק את הצלע שמול הזווית ביחס הצלעות האחרות שעל יד כל חלק.</p>
<p>הוכחה: במשולש ABC נעביר תיכונים BD ו-CE, נחבר את נקודת פגישתם H אל A ונסמן את שטחי המשולשים כבצורה.</p> <p><math>א+ב+ג = א+ב+ג+ד</math> כי הם חצאים של שטחי המשולש הגדול, כיוון שכל תיכון מחלק את שטח המשולש לשני חלקים שווים. לכן <math>א = ד</math>.</p> <p><math>א=ב</math>, כי הם חצאים של שטח המשולש AHB. מאותה סיבה, <math>ג=ד</math>.</p> <p>לכן: <math>א=ב=ג=ד</math> לכן <math>ג+ד=2ב</math></p> <p>ואם נסתכל על <math>ג+ד</math> ועל <math>ב</math> כעל משולשים בעלי גובה משותף היורד מ-A נמצא ש- <math>CH = 2 HE</math> ■</p> 	<p>משפט: בנקודת פגישתם מחלקים שני תיכונים במשולש זה את זה ביחס 1:2.</p>



<p><b>הוכחה:</b>  <b>כיוון אחד:</b>                  נעביר "קווי-צ'בה" הנפגשים בנקודה אחת ונסמן את חלקי הצלעות ואת שטחי המשולשים כבצירור.</p>  <p>נסתכל על <math>a+b+g</math> ועל <math>d+e+u</math> כעל שני משולשים בעלי גובה משותף ונקבל</p> $\frac{\delta + \beta + \gamma}{\tau + \pi + \iota} = \frac{a_1}{a_2}$ <p>ומכיוון שגם <math>\frac{\delta}{\iota} = \frac{a_1}{a_2}</math> נקבל ש- <math>\frac{\beta + \gamma}{\pi + \tau} = \frac{a_1}{a_2}</math></p> <p>באופן דומה, <math>\frac{\tau + \pi}{\delta + \iota} = \frac{c_1}{b_2}</math> ו- <math>\frac{\delta + \iota}{\beta + \gamma} = \frac{b_1}{b_2}</math></p> <p>לכן <math>\frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{b_1}{b_2} \cdot \frac{c_1}{c_2} = \frac{\beta + \gamma}{\tau + \pi} \cdot \frac{\delta + \iota}{\beta + \gamma} \cdot \frac{\tau + \pi}{\delta + \iota} = 1</math></p> <p><b>תוספת:</b> נסמן את הקטע המשותף ל-<math>g</math> ו-<math>d</math> ב-<math>u</math> ואת הקטע המשותף ל-<math>a</math> ו-<math>b</math> ב-<math>v</math> ואז <math>\frac{\beta + \gamma}{\delta} = \frac{u}{v}</math> וגם <math>\frac{\tau + \pi}{\iota} = \frac{u}{v}</math></p> <p>לכן גם <math>\frac{\beta + \gamma + \tau + \pi}{\delta + \iota} = \frac{u}{v}</math> לכן <math>\frac{b_2}{b_1} + \frac{c_1}{c_2} = \frac{u}{v}</math></p>	<p><b>משפט צ'בה:</b>                  במשולש ABC שלושת הקטעים AD, BE, CF נחתכים בנקודה אחת K אם ורק אם מתקיים:</p> $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$
---	--

קווי צ'בה (Ceva) – חקירה בעזרת תוכנת גאומטרייה דינמית (2 שעות)


<p>והרי תקציר הוכחה בשביל הכיוון שבו נתונה פגישת הקטעים.</p> <p>נעביר מקביל, נאריך קטעים ונסמן כבציור.</p> <p>על-ידי דמיון משולשים נקבל</p> <p>א. <math>\frac{b'}{b''} = \frac{a}{s}</math></p> <p>ב. <math>\frac{c'}{c''} = \frac{t}{a}</math></p> <p>ג. לכן <math>\frac{t}{a''} = \frac{u}{v} = \frac{s}{a'}</math></p> <p><math>\frac{a'}{a''} = \frac{s}{t}</math></p>  <p>ומכאן <math>\frac{a'}{a''} \cdot \frac{b'}{b''} \cdot \frac{c'}{c''} = \frac{s}{t} \cdot \frac{a}{s} \cdot \frac{t}{a} = 1</math></p> <p>הוכחה אחרת מופיעה בתכניתנו בהצעה "הוכחות על ידי שטחים".</p> <p>הוכחות נוספות ועוד מידע מעניין אפשר למצוא באתרים</p> <p><a href="http://www.cut-the-not.org/Generalization/ceva.shtml">www.cut-the-not.org/Generalization/ceva.shtml</a></p> <p><a href="http://www.ies.co.jp/math/java/vector/ceva/ceva.html">www.ies.co.jp/math/java/vector/ceva/ceva.html</a></p> <p>בהמשך ההוכחה שלעיל הרי משהו נוסף:</p> $\frac{b''}{b'} + \frac{c''}{c'} = \frac{s}{a} + \frac{t}{a} = \frac{s+t}{a} = \dots = \frac{u}{v}$	<p>משפט צ'בה:</p> <p>אם שלושה קטעים משלושת הקדקודים A, B, C של משולש אל הצלעות a, b, c מחלקים את הצלעות לששה חלקים a', a'', b', b'', c', c'' בסדר מעגלי (כבציור), אז הקטעים נפגשים בנקודה אחת אם ורק אם</p> $\frac{a'}{a''} \cdot \frac{b'}{b''} \cdot \frac{c'}{c''} = 1$
<p>תלמידים יוכלו לשים לב לכך שאם שנים מקטעי "קדקוד לצלע" הם תיכונים/חוצי-זוית/גבהים אז גם השלישי הוא מאותו סוג.</p> <p>הנחיות ממוקדות (דוגמא קיצונית): "חשבו את a'b'c' ואת a''b''c'' (א"ב"א" וראו מה קורה בעקבות גרירות של נקודות") יוליכו אל משפט צ'בה. אם המשפט התקבל במהירות מוצע לעבור לשאלה באיזה אופן הוא מהווה הכללה למשפטים מוכרים.</p> <p>הנחיות פחות ממוקדות, כגון "מה קורה כשעוברים משני תיכונים אל שני מחלקים-ביחס-1:2", יכולות להוביל למסלול חיפוש יותר ארוך אך כולל יותר תוצאות-ביניים ויותר הוכחות.</p> <p>מסלול כזה עשוי שלא להוביל אל משפט צ'בה אלא, למשל, לכיוון הקרוב למשהו הנוסף שנזכר במבוא שלעיל. דבר כזה אינו צריך להיחשב החטאת המטרה. הדבר החשוב אינו קבלת תוצאה מסוימת אלא עצם התהליך הכולל העלאת השערות ובדיקתן.</p>	<p><u>גוף ההצעה</u></p> <p>בנו משולש כלשהו בעזרת תוכנה של גאומטרייה דינמית. (קדקודי המשולש יינתנו לגרירה חפשית ממקום למקום). בחרו שתי נקודות על שתי מהצלעות (הן יינתנו לגרירה רק לאורך הצלעות). חברו אותן לקדקודים שמולן וקבעו את נקודת החיתוך של שני הקטעים. העבירו קו דרך הקדקוד השלישי ונקודת החיתוך וסמנו את הנקודה שהוא קובע על המשולש. השתמשו באופציות המדידה ובגרירות לחיפוש חוקיות.</p>

משולש הזהב (6 שעות)

הבהרות ודוגמאות	הנושאים
<p>סעיף א:                      בסעיף זה נסתמך על שני משפטים:                      1. משפט:                      אם במשולש שתי זוויות שוות אז המשולש הוא שווה-שוקיים.                      משפט זה הוכח בכיתה ח'. נראה כאן הוכחה נוספת.                      הוכחה:                      יהי נתון משולש ABC עם <math>\angle B = \angle C</math>,                      ונוכיח כי <math>AB = AC</math>.                      ממשפט החפיפה השני ז"ז נובע                      שהמשולש ABC חופף לעצמו לא רק                      בדרך הישרה, כמו שכל משולש חופף לעצמו, אלא גם בחילוף                      תפקידים של B                      ו-C, כלומר, <math>\triangle ABC \cong \triangle ACB</math>. מחפיפה זאת נובע השוויון המבוקש.                      הערה: המשפט הפוך למשפט הראשון שהזכרנו אומר שאם משולש                      הוא שווה שוקיים אז יש לו שתי זוויות שוות (זוויות הבסיס),                      ובדרך כלל לומדים אותו לפני המשפט הנוכחי. כאן לא נזדקק                      לו.</p> <p>2. משפט:                      סכום הזוויות במשולש שווה ל- <math>180^\circ</math>.</p>  	<p>הגדרה:                      משולש זהב הוא משולש                      שזוויותיו הן <math>36^\circ</math>, <math>72^\circ</math>                      ו- <math>72^\circ</math>.</p> <p>משפט:                      לא יתכן משולש זהב                      שגם הבסיס שלו וגם                      השוק נמדדים במספר                      סנטימטרים שלם (והוא                      הדין לכל יחידת מידה                      אחרת).</p>

	משפט:
<p>הוכחה:</p> <p>נסמן חוצה זווית, קדקודים וזוויות כבציור.</p> <p>הזווית <math>B_1</math> היא בת <math>36^\circ</math> (מדוע?),                      לכן <math>AD = BD</math>.</p> <p>הזווית <math>B_2</math> גם היא בת <math>36^\circ</math>,                      ומכיוון שסכום הזוויות של המשולש <math>BDC</math>                      הוא <math>180^\circ</math> תהיה הזווית <math>D_1</math> בת <math>72^\circ</math> לכן  <math>BD = BC</math>.</p> 	<p>חוצה זווית-בסיס של משולש זהב מחלק אותו לשני משולשים שווי שוקים שאחד מהם גם הוא משולש זהב.</p>
<p>הוכחתנו נותנת משהו נוסף והוא השוויון <math>AD = BC</math>.</p> <p>מסקנה: חוצה זווית בסיס במשולש זהב מחלק את השוק שמולה לשני חלקים כך שהחלק הרחוק מהבסיס שווה לבסיס.</p> <p>הוכחת המשפט הראשון:</p> <p>נראה שלא ייתכן שגם <math>AC</math> וגם <math>BC</math> נמדדים במספר סנטימטרים שווה.</p>	
 <p>אילו היו הבסיס והשוק באורכים בני מספרים שלמים של סנטימטרים, היה גם הפרשם <math>CD</math> שווה למספר סנטימטרים שלם. ומכיוון שגם המשולש <math>BDC</math> הוא משולש זהב, נוכל לחצות את הזווית הבסיס <math>D</math> שלו ולקבל משולש זהב חדש <math>DCE</math> וגם צלעותיו צריכות להיות במספרי סנטימטרים שלמים כיוון שהן התקבלו מחיסור של שני מספרים טבעיים (אורכי הצלעות).</p> <p>כעת נחצה את הזווית <math>C</math> ונקבל משולש זהב <math>EFC</math> יותר קטן, וכמקודם נקבל שגם צלעותיו בנות מספר סנטימטרים שלם.</p> <p>אך כשנמשיך בתהליך זה נגיע לבסוף למשולש שצלעותיו קטנות מסנטימטר אחד, ואלה אינן נמדדות במספר סנטימטרים שלם.</p> <p>קיבלנו סתירה ולכן לא ייתכן שאורך השוק ואורך הבסיס במשולש זהב שניהם נמדדים במספר שלם של סנטימטרים.</p>	
<p>הערה: כל האמור עד כאן נכון לא רק למדידה בסנטימטרים אלא גם</p>	

<p>למדידה באינצ'ים או למדידה במילימטרים, או למדידה ביחידת- מידה שגודלה שביעית של אלפית של מילימטר או לכל יחידת מידה אחרת. בשום יחידת מידה לא ימדדו גם AC וגם BC במספרים שלמים.</p>	
<p>סעיף ב: בסעיף זה נסתמך על המשפט: משפט: אם לשני משולשים אותן זוויות אז היחס שבין שתי צלעות של אחד מהם שווה ליחס בין הצלעות המתאימות להן במשולש השני. בפרט נובע ממשפט זה שהיחס שבין אורך שוק ואורך הבסיס במשולש זהב אחד שווה ליחס בין אורך שוק ואורך בסיס בכל משולש זהב אחר. ובדוגמתנו. <math>AC/BC = BC/CD</math></p> <p>הוכחה: מהסעיף הקודם נובע ש-<math>\varphi</math> אינו שבר פשוט, כלומר, אינו שווה לשום מנה של שני מספרים שלמים. ואמנם, אילו היו קיימים <math>m</math> ו-<math>n</math> שלמים כך ש- <math>\frac{AC}{BC} = \frac{m}{n}</math> יכולנו לבחור בקטע שאורכו <math>BC/n</math> כיחידת מידה, ואז היה BC מורכב מ- <math>n</math> קטעים כאלה ו- AC היה מורכב מ-<math>m</math> קטעים כאלה, בניגוד למה שהוכחנו בסעיף א.</p> <p>חישוב <math>\varphi</math> : לצורך החישוב נבנה משולש-זהב ABC עם <math>BC = 1</math>, ומכיון ש- <math>AB/BC = \varphi</math> יהיה <math>AB = \varphi</math> וכמובן גם <math>AC = \varphi</math>. נעביר חוצה זווית BD כמקודם ונקבל משולשים שווי שוקיים ששוקיהם באורך 1 כבציר, לכן <math>CD = \varphi - 1</math>.</p>	<p>סימון: היחס שבין אורך השוק ואורך הבסיס במשולש זהב יסומן באות היוונית <math>\varphi</math> (קרי פי ב-פ לא דגושה) והוא נקרא יחס הזהב או מספר הזהב.</p> <p>משפט: <math>\varphi</math> אינו מספר רציונאלי.</p> <p>משפט: <math>\varphi^2 - \varphi - 1 = 0</math></p>



מזה ומהמשפט על יחסי הצלעות נובע ש-  $\frac{\varphi}{1} = \frac{1}{\varphi-1}$ , ומזה נקבל על

ידי פעולות אלגבריות שתי מסקנות א.  $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$

ב.  $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$

בסעיף הנוכחי נשתמש ב-א לחישוב  $\varphi$ , ובסעיף הבא נחשב את  $\varphi$  בדרך אחרת, בעזרת ב.

$\varphi$  הוא מספר חיובי, ולפי א הוא ממלא את המשוואה הריבועית  $x^2 - x - 1 = 0$ , מכאן נובע ש-

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \frac{1 + 2.2360679}{2} = 1.6180339$$

נציין שהשוויון  $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$  הוא מדויק, אבל המסקנה  $\varphi = 1.6180339$

היא מעוגלת. היא אינה יכולה להיות מדויקת, שהרי

$$1.6180339 = \frac{16180339}{10000000}$$

וכבר הוכחנו ש- $\varphi$  אינו שווה למנה של שני מספרים שלמים.

אי-הדיוק נכנס כשכתבנו  $2.2360679$  במקום  $\sqrt{5}$ .

שאלות:


א. האם יתכן שבעזרת חישוב  $\sqrt{5}$  בדיוק של 20 ספרות או יותר

נקבל ערך מדויק של  $\varphi$ ?


ב. האם ניתן לכתוב את  $\sqrt{5}$  כמנה של שני מספרים שלמים?

**נספחים קטנים**

**א. עשרה משולשי-זהב חופפים מרכיבים מעושר משוכלל.**



מלבן זהב



מעושר משוכלל חסום במעגל

**ב. מלבן שאורכו גדול פי  $\varphi$  מרוחבו היה נחשב בעיני**

**היוונים הקדומים למלבן היפה ביותר. הוא נקרא מלבן הזהב. אם חותכים ממנו ריבוע נותר מלבן שצלעותיו פרופורציוניות לצלעות המלבן המקורי.**

**ג. מימדיו של דף A4**


**הם 21 ס"מ על 29.7**

**ס"מ. היחס ביניהם**

**קרוב מאד**

**ל- $\sqrt{2}$ .**

$21 \cdot \sqrt{2} = 29.69848\dots$



דף A4 מוקטן

**אך אין לבקש מחותכי נייר דיוק של מאיות המילימטר.**


**יחס זה מקובל היום לא בגלל שינוי במושגי היופי אלא משום שצירוף שני מלבנים בעלי יחס צלעות זה נותן מלבן בעל אותו יחס צלעות. (הוכח!).**

**צירוף שני דפי A4 נותן דף A3. קיפול דף A4 נותן שני דפי A5.**

**הערה: גם  $\sqrt{2}$ , כמו  $\varphi$ , אינו שווה לשום מנה של שני מספרים שלמים.**






**ד. לפניכם ציור של מחומש משוכלל ואלכסוניו.**


**כמה משולשי-זהב יש בציור זה?**





נפח פירמידה מיוחדת (2 שעות)

הבהרות ודוגמאות	הנושאים
<p>למען הפשטות נתבונן תחילה בפירמידה שבסיסה מלבן ששטחו <math>S</math> וגובהה <math>h</math>, אך קדקוד הראש שלה לא עומד דווקא מול אמצע הבסיס (ראו ציור א).</p>  <p>בציור ב מצוירת הפירמידה שלנו בתוך תיבה שנפחה <math>Sh</math> ולכן נפח הפירמידה קטן מ- <math>Sh</math>.</p>  <p>נחלק את התיבה לשתי תיבות על ידי מלבן מקביל לפאות ועובר דרך הגובה (ראו ציור ג).</p>  <p>נסלק מחצית של כל תיבה. וכך התקבלה מנסרה שנפחה מחצית נפח התיבה. הפירמידה היא חלק ממנסרה זאת ומכאן נובע שנפח הפירמידה קטן גם מ- <math>\frac{S \cdot h}{2}</math>.</p> 	<p>נפח פירמידה</p> <p>א. מבוא</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• נפח הפירמידה קטן מ- <math>Sh</math> (<math>S</math> - שטח הבסיס, <math>h</math> - גובה הפירמידה)</li> <li>• נפח הפירמידה קטן מ- <math>\frac{S \cdot h}{2}</math></li> </ul>
<p>נוכיח את הנוסחה לחישוב נפח הפירמידה לפירמידות מסוג פשוט.</p>  <p>נתבונן בקובייה שמקצועה יסומן ב- <math>a</math>, נעביר בה אלכסונים ובעזרת המשולשים שהם יוצרים נחלק אותה לשש פירמידות חופפות (ציור ה).</p>	<p>ב. נפח הפירמידה הוא:</p> $\frac{S \cdot h}{3}$



הערה: ראו בסוף הסעיף הוכחה  
לכך שאלכסוני הקובייה נפגשים  
בנקודה אחת ולכן נוצרות שש  
פירמידות חופפות. אחת מהן  
מצוירת בציור ה


נפחה הוא ששית נפח הקובייה, כלומר  $\frac{a^3}{6}$ .

הנמקה: בפירמידה זאת  $S=a^2$  ו-  $h = \frac{a}{2}$  נקבל:

$$= \frac{S \cdot h}{3} = \frac{a^3}{6}$$

הערה: אפשר להוכיח את הנוסחה גם לכל פירמידה אחרת,  
ונשתמש בזה לחישובים, אך ההוכחה המלאה חורגת  
ממסגרתנו הנוכחית.

נפח כל פירמידה  
הוא  $\frac{S \cdot h}{3}$

 <p><b>הוכחה:</b>  נתבונן במרובע <math>ADFG</math>.  <math>AD = FG</math> צלעות הקובייה  <math>DF = FG</math> אלכסוני פיאות הקובייה  לכן המרובע <math>ADFG</math> הוא מקבילית.  (ניתן גם להוכיח שמרובע זה הוא מלבן)  <math>DO = OG</math>  <math>AO = OF</math> במקבילית האלכסונים  חוצים זה את זה.</p> <p><b>נתבונן במרובע <math>DCGH</math>.</b>  בדרך דומה נוכיח שגם מרובע זה הוא מקבילית.  לכן אלכסוני <math>DG</math> ו- <math>CH</math> חוצים זה את זה.  הוכחנו שנקודת האמצע של <math>DG</math> היא <math>O</math> ולכן היא גם נקודת האמצע של <math>CH</math>.  באופן דומה נוכיח שגם האלכסון <math>EB</math> עובר בנקודה <math>O</math>.  כלומר כל האלכסונים של הקובייה נפגשים בנקודה אחת.</p>	<p><b>משפט:</b>  אלכסוני הקובייה  נפגשים בנקודה אחת.</p>
---	--