

точками пунктировки всегда с микроскульптурой. Вершины лопастей лабрума широко закруглены. Внутренний край ср. голеней ♂ немного расширен перед вершиной. Рис. 71, 1—5. 3.2—4.6. — Япония (на Юг от о-ва Хоккайдо)

63. Прсп. более чем вдвое шире длины, ее бока отогнуты почти на ширину булавки ус. Верх очень густо пунктирован очень крупными точками. Ср. голени ♂ простые 64




Рис. 71. Блестянки. Род *Epiraxea*, подрод *Epiraxea*. (Ориг.).

1—5 — *E. domina*, 6—9 — *E. densepunctata*. 1, 6 — контур тела; 2 — ср. голень ♂; 3, 7 — тегмен снизу; 4, 8 — то же сбоку; 5, 9 — пенис сверху.

- Прсп. обычно длиннее, редко вдвое шире своей длины, ее бока всегда отогнуты уже 65
64. Уплощенный. Наибольшая ширина прсп. у задн. углов, кпереди от них ее бока сильно сужены. Темно-коричневый (до почти черного), с осветленными краями прсп. и надкр., а также светлыми ус. и ногами. Рис. 71, 6—9. 2.4—3.2. — Япония *E. (E.) densepunctata* Nak.
- Умеренно выпуклый. Прсп. сильнопоперечная, со слабо суженными боками (сходна с таковой у *E. neglecta*). Одноцветно-рыжий. Рис. 72, 1—5. 2.6—3.0. — Прим. — Япония (включая Хоккайдо). *E. (E.) hilleri* Rtt.
65. Рыжий, верх матовый, довольно густо пунктирован; покрыт умеренно густыми полуприлегающими золотистыми волосками, длина которых примерно в 1.5 раза больше расстояния между основаниями волосков. Прсп. с 4 неотчетливыми углублениями вдоль основания. Ус. бороздки отчетливые, несколько расставленные. Заглазничные ямки не выражены.

¹⁷ Синонимия *E. domina* и *E. obnoxia* установлена изучением ♂ *E. domina* с этикеткой «Japan, Lewis, domina» (MNHN), который обозначается здесь лектотипом, и типа *E. obnoxia* ♀ с этикеткой «Japan, G. Lewis, 1910—320» (BM).