

Mollusca für 1901—1904.

Geographische Verbreitung, Systematik und Biologie.

Von

Dr. W. Kobelt.

Verzeichniss der Publikationen.

a) Jahrgang 1901.

Adams, L. E. & B. B. Woodward. Land- and Freshwater Mollusca of Hampshire. — In: Sci. Gossip vol. 7 p. 301—303, 338, 362.

Ancey, C. F. (1). On the genus Ashmunella Psbry & Ckll., with anatomical notes by R. Murdoch. — In: J. Malac. vol. 8 p. 73—85 pl. VII.

— (2). Considérations sur les faunes malacologiques des parties australes du globe. — In: J. de Conchyl. vol. 49 p. 12—39.

— (3). Études sur la faune malacologique des îles Sandwich.

— 1. Discussion sur l'habitat du Papuina barnaclei E. A. Smith. —

— 2. Sur la valeur du genre Philonesia. — 3. Sur le groupe des Baldiwinia. — 4. Sur quelques Auriculella. — Ibid. p. 132—138.

— (4). Notes critiques et synonymiques de quelques mollusques.

— Ibid. p. 138—148, 219—225.

— (5). Notes sur divers mollusques de l'Amérique du sud. — In: Naturaliste, 1901 p. 81, 82; 92, 93; 103, 104.

André, E. Note sur une Limnée de la faune profonde du Lac Léman. — In: J. of Malac. vol. VIII p. 35.

Baker, C. F. (1). New varieties of freshwater shells. — In: Nautilus vol. XV p. 17, 18.

— (2). Limnaea auricularia in America. — Ibid. p. 58.

— (3). Description of a new species of Limnaea (woodruffi).

— In: Bull. Chicago Acad. p. 229, Textfig.

— (4). A revision of the Limnaeas of Northern Illinois. — In: Trans. Ac. St. Louis, vol. XI p. 1—24, pl. 1.

— (5). The Molluscan Fauna of the Genesee River. — In: Amer. Naturalist vol. XXXV p. 659—664.

Bavay, A. & Ph. Dautzenberg. Description de deux Unio et d'un Corbicula nouveau provenant de l'Indo-Chine. — In: J. de Conchyl. vol. 49 p. 5—9, pl. 1.

- Berg, C.** Noticias malacozoologicas. — Comm. Mus. Buenos Aires, vol. I p. 292.
- Bergh, R. (1).** Beitrag zur Kenntniss der Gattung Harpa. — In: Zool. Jahrb. Anat. vol. XIV p. 609—629, pl. 47.
- (2). Bullacea. — In: Sempers Reisen Philipp vol. VII Abth. IV, Abschn. 2, Lfg. 1 & 2, p. 209—312, Taf. XVII—XXIV.
- Bernier**, vide Dautzenberg & Bernier.
- Blanford, W. T. (1).** Note on Bensonia and on an apparently undescribed species, B. mimela. — In: Pr. mal. Soc. London vol. 4, p. 178, 179, Textfig.
- (2). Note on Bensonia mainwaringi and Macrochlamys dalingensis. — Ibid. p. 180—182, Textfig.
- (3). Notes on Ariophanta, Xestina, Nilgiria and Euplecta, with lists of species. — Ibid. p. 241—253, pl. XXV.
- Blatchley, H. H. & G. H. Ashley.** The Lakes of Northern Indiana and their associated Marl Deposits. — In: Rep. Indiana Geol. vol. XXV p. 31—321, mit Karten.
- Boettger, O.** Diagnose einer neuen Clausilia von Creta. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 33 p. 127, 128,
- Bonnemère, L.** Les mollusques des eaux douces de France et leurs Perles. — Paris 1901, 155 p. avec figs.
- Borcherding, F.** Diagnosen neuer Achatinellen-Formen von der Sandwich-Insel Molokai. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 33 p. 52—58.
- Brasil, L.** Faune marine de la region de St. Luc-sur-mer. Mollusques. — In: Bull. Soc. Normand. IV p. 18—74.
- Brogger, W. C.** Om de senglaciale og postglaciale Nivåforandringer i Kristianiafeltet (Molluskfaunen). In: Norges geol. Undersog. No. 31. — 731 S. mit 19 Tafeln und 65 Textfig.
- Buddicom, R. A.** Mollusks. — In: „Church Stretton“ by C. W. Campbell-Hyslop. Shrewsbury. 8°.
- Bullen, R. A. (1).** On two apparently new species of Corbicula. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 4 p. 223, 224, pl. XXIV.
- (2). Pleistocene Mollusca from the raised beach deposits of Perim Island. — Ibid. p. 254, 255.
- (3). Notes on Helicella cantiana as food for the Turdidae. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 10 p. 27.
- Bulman, G. P.** The Marine Molluska of Northumberland. — In: Rep. Northumberland Sea Fish Comm. 1900 p. 78—82.
- Byne, L. St. G. & A. Leicester.** The Marine Mollusca (and Brachiopoda of the Isle of Man. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 10, p. 75—85.
- Carpenter, H. F.** The shell bearing mollusca of Rhode Island. — In: Nautilus, vol. XV p. 92—96.
- Caziot**, vide Locard & Caziot.
- Chaster, G. W.** Changes in generic names in the Pyramidellidae. — In: J. of Conch. Leeds vol. X p. 8.

Chaster, G. W., Melvill, J. C., Knight, G.A.F. & Hoyle, W.E.
List of British Marine Mollusca (and Brachiopoda). — In: J. of Conch. Leeds vol. X p. 9—27.

Clapp, G. H. A new Jamaican Land-Shell. — In: Nautilus, vol. XV p. 33 pl. 2.

Clessin, S., vide Martini & Chemnitz.

Cockerell, T. D. A. (1). On a slug of the Genus Veronicella from Tahiti. — In: Pr. U. S. Nat. Mus. vol. 23 p. 835—836.

— (2). Three new Nudibranchs from California. — In: J. Mal. vol. VIII p. 85—87.

— (3). Notes on two Californien Nudibranchs. — Ibid. p. 121, 122.

— (4). A new *Tethys* (*ritteri*) from California. — In: Nautilus, vol. XV p. 90, 91.

Collett, O. Pearl Oysters and Pearl Fisheries. — In: Ceylon Observer, 1900 [read Oct. 27].

Collier, E. Reversed Helices recently found in Lancashire. — In: J. of Conch. Leeds vol. X p. 91.

Collinge, Walter E. (1). On a further Collection of South African Slugs, with a Check-list of known Species. — In: Ann. South Afr. Museum, 1901 vol. II p. 229—236 pl. 14.

— (2). On the Anatomy of a Collection of Slugs from N. W.-Borneo; with a List of the Species recorded from that Region. — In: Transact. Roy. Soc. Edinburgh 1901, vol. 40 p. 295—312, pl. 1—3.

— (3). On the Anatomy of certain Agnathous Pulmonate Mollusks. — In: Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 7, p. 65—73, pl. I, II.

— (4). Description of two new species of *Microparmarion* from the Andaman Islands (rectius Annam). In: J. Mal. vol. XIII p. 16—18, pl. 1 (cfr. p. 52).

— (5). Note on the Anatomy of *Amphidromus palaceus*, Mouss. — Ibid. p. 50—52, pl. 4.

— (6). On the Anatomy of *Vitrina irradians* Pfr. Ibid. p. 63—70, pl. V—VI.

— (7). Note on the Anatomy of *Apera burnupi* E. A. Smith. Ibid. p. 71—72.

— (8). Description of some new species of slugs, collected by Mr. H. Fruhstorfer. — Ibid. p. 118—121.

Cooke, A. H. Notes on the references for authorship of species, as given in Jeffreys, British Conchology, vols. II—IV. — In: J. Mal. vol. 8 p. 1—14.

Cort, H. de. De la valeur marchande et du degré de raréité actuel de *Pleurotomaria beyrichi*. — In: Ann. Soc. mal. Belgique. vol. XXXVI, Bull. p. VIII—X.

Cossmann, M. (1). Essais de Paléoconchologie comparée. Livr. 4. Paris 1901. 8°. 293 S., 10 pl.

— (2). Rectifications de Nomenclature. — In: Revue paleo-zool. vol. V. p. 58, 123 u. 124, 220.

Cotter, J. C. B. Sur les Mollusques terrestres de la nappe basaltique de Lisbonne. — In: Comm. geol. Portugal IV p. 127—147, avec pl.

Chandall, O. A. The American Physae. — In: Nautilus vol. XV p. 25—30, 42—45, 54—58, 69—81, pl. II.

Da Costa, S. J. (1). Descriptions of new species of Land-Shells from Central- & South America. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. IV p. 238—240, pl. XXIV.

— (2). Description of a new species of Land-Shell from Columbia. — In: Ann. nat. Hist. ser. 7, vol. 8, p. 557—558, with fig.

Dall, W. H. (1). Synopsis of the Lucinacea and of the American Species. — In: Pr. U. S. Nat. Mus. vol. 23 p. 779—783, pl. 39—42.

— (2). Results of the Branner-Agassiz Expedition to Brazil. Mollusks from the vicinity of Pernambuco. — In: Pr. Washingt. Ac. vol. III p. 139—147.

— (3). The Morphology of the Hinge Teeth of Bivalves. — In: Amer. Naturalist, vol. XXXV p. 175—182.

— (4). A new species of Subemarginula from California. — In: Nautilus, vol. XIV, p. 125, 126.

— (5). A new Pinna from California. — Ibid. p. 142, 143.

— (6). A new species of Liomesus. — In: Nautilus, vol. XV p. 89.

Dall, W. H. & P. Bartsch. A new Californian Bittium. — In: Nautilus, vol. XV p. 58, 59.

Dall, W. H. & Simpson, C. T. The Mollusca of Portorico. — In: Bull. U. S. Fish Comm. 1900. I p. 351—524, pl. 53—58.

Dautzenberg, Ph. (1). Note sur le Voluta (Mamillana) mammilla Gray. — In: J. de Conch., vol. 49 p. 10, 11, pl. II.

— (2). Description de deux Bulimulidae nouveaux provenant du Pérou. — Ibid. p. 132, 213, t. 8.

— (3). Sur deux déformations observées chez les Placostylus de la Nouvelle-Calédonie. — Ibid. p. 217 t. 7 (ex parte).

— (4). Description de trois Mollusques nouveaux, provenant de l'état indépendant du Congo. — In: Ann. Soc. Mal. Belgique, vol. XXXVI, p. 3—7, pl. 1.

Dautzenberg, Ph. & J. Bernier. Description d'un Bulimidé nouveau, provenant de la Nouvelle Calédonie. — In: J. de Conchyl. vol. 49 p. 215, pl. 7 (ex parte).

Vide Bavay & Dautzenberg.

Dean, B. Notes on living Nautilus. — In: American Naturalist vol. XXXV p. 819—837.

Drew, G. A. The Life History of Nucula delphinodata (Migh.). — In: Quart. J. Micr. Sci., vol. 44 p. 313—391, pl. 20—25, figs.

Dumas, —. Conchyliologie bourbonaise. Mollusques terrestres testacés. — In: Rev. Sci. Bourbonais, vol. XIV p. 61—74, 129—159 (Contin.).

Dupuis, P. & Putzeys, S. Diagnoses de quelques espèces de coquilles nouvelles et d'un genre nouveau provenant de l'état in-

dependant du Congo, suivies de quelques observations relatives à des espèces déjà connues. — In: Ann. Soc. mal. Belgique, vol. 36, Bull. p. XXIV—XLII; p. LI—LVI, avec figs.

Dybowski, W. (1). Diagnosen neuer Choanomphalus-Arten.

— In: Nachtbl. D. mal. Ges., vol. 33 p. 119—125.

— (2). Studien über die Binnenmollusken des Amur-Gebietes.

— Ibid. p. 129—144.

— (3). Contribution à la connaissance de l'Ancylodoris baikalensis (polnisch). — In: Wozechświat Warszawa, vol. 20 p. 141.

Elliot, C. Notes on a remarkable Nudibranch from Northwest-America. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 4 p. 163—165, Textfig.

Elrod, M. J. Collecting Shells in Montana. — In: Nautilus, vol. XV p. 86—89.

Fischer, H. Liste des Coquilles recueillies par M. de Gennes à Djibouti et Ali-Sabieh, avec la description de plusieurs formes nouvelles. — In: J. de Conch. vol. 49 p. 96—130, pl. 4 et figs.

Vide Bouvier & Fischer.

Friele, H. & Grieg, J. A. Den Norske Nordhavs Expedition 1876—1878. VII. Mollusca, Lfg. 3. 128 S. mit Textfigur u. Karte.

Frierson, L. S. A new *Unio* from Texas. — In: Nautilus, vol. 15 p. 75 pl. IV.

Fulton, H. (1). Descriptions of some supposed new Species of Diplomatina, Opisthostoma, and a new variety of Alycaeus from North Borneo, Banguay Island and Darjeeling. — In: Ann. Nat. Hist. ser. 7, vol. 8 p. 242—245.

— (2). Descriptions of new species of Xesta, Amphidromus and Cyclostoma from Madagascar and Perak. — In: J. of Malac. vol. 8 p. 103, pl. 9.

Gallenstein, H. von. Die Bivalven- und Gastropodenfauna Kärntens. II. Die Gastropoden Kärntens. Ordnung Stylommato-phoren. — In: Jahrb. Mus. Kärnten, vol. 26 p. 1—169.

Godwin-Austen, H. H. (1). On the Anatomy of the *Helix ampulla* Benson and its generic position in the Ariophantinae. — In: Pr. Mal. Soc. London, vol. 4 p. 187—190 pl. 18.

— (2). On the Anatomy of *Helix politissima*, Pfeiffer, of Ceylon, and on its generic position in the Ariophantinae. — Ibid. p. 261—263, pl. 26.

— (3). On the Anatomy of certain Agnathous Pulmonate Mollusks. — In: Ann. Nat. Hist., ser. 7, vol. 7 p. 488.

Gordon, W. J. Our Countrys Shells, and how to know them. London. 8°. — 152 S. 32 platès.

Gratacap, L. P. Catalogue of the Binney & Bland Collection of the Terrestrial Air-Breathing Mollusks of the United States and Territories in the American Museum of Natural History, with Enumeration of Types and Figured Specimens, and Supplementary Notes. — In: Bull. Amer. Museum, vol. XV p. 335—404, pl. 41—46 (maps).

Grave, C. The Oyster reefs of North Carolina, a geological and economic Study. — In: John Hopkins Univ. Circ., vol. 20 p. 50—53.

Gravier, C. Guide de Zoologiste collectionneur. Méthodes de récoltes, de fixation et de conservation des Invertebrés. Paris. 8°. 1901. — 104 S. u. 113 Textfig.

Gredler, V. Drei neue Landconchylien aus China. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 33 p. 150—153.

Grieg, J. A. vide Friele & Grieg.

Grierson, P. H. Notes on the Mollusca of County Leitrim. — In: Irish Naturalist, vol. 10 p. 110, 111.

Gude, G. K. (1). A third report on Helicoid land-shells from Japan and the Loo Choo Islands. — In: Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 191—201, pl. 19—21.

— (2). Description of a new Species of Chloritis from the Loo Choo Islands. — In: Ann. Nat. Hist., ser. 7 vol. 8 p. 157 (Textfig.).

— (3). Descriptions of new Helicoid land shells from Japan. — In: Pr. Ac. Philad. p. 617.

— (4). Description of two new species of Helicoid landshells. — In: J. of Malac., vol. 8 p. 14—16, figs.

— (5). Notes on some known species of Plectopylis, and description of a new variety of Plectopylis plectostoma Benson. — Ibid. p. 47—49, with figs.

— (6). On two new and three hitherto unfigured species of Plectopylis from Tonkin. — Ibid. p. 110—117, with figs.

— (7). Sur une collection de Plectopylis du Tonkin, avec la description de six espèces nouvelles. — In: J. de Conchyl, vol. 49 p. 197—212, pl. 6, figs.

Harder, P. En ny svenderjysk Lokalitet for marins Diluvium. — In: Medd. Dansk. Geol. For. no. 6 p. 83—96.

Heath, H. & M. H. Spaulding. Cymbuliopsis vitrea, a new species of Pteropod. — In: Pr. Ac. Philad. p. 509—511, with fig.

Hedley, Charles. (1). Studies on Australian Mollusca. Part. IV. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, 1901 p. 16—25, pl. 2.¹⁾

— (2). A Revision of the Types of the marine Shells of the „Chevert“-Expedition. — In: Record. Austr. Museum 1901, vol. 4 p. 121—130, pl. 16, 17.

— (3). The Marine Wood-borers in Australasia and their work. — In: Rep. Austral. Assoc. Adv. Sci. 1901, vol. VIII p. 237—255, pl. 7—10.

— (4). Some new or unfigured Australian Shells. — In: Record Austral. Mus., vol. 4 p. 22, with figs.

— (5). Mollusca. — In: Roth, North Queensland Ethnography. Bulletin no. 3. Food, its search, capture and preservation. Brisbane, 1901.

¹⁾ Part I—III sind in vol. XXV 1900 enthalten, aber erst 1901 ausgegeben und im letzten Berichte nicht besprochen.

- Hemphill, H.** A contribution to West Coast Conchology. — In: *Nautilus*, vol. XIV p. 109, 121, 136, pl. I.
- Henderson, J. B. (1).** Collecting in Haiti. — In: *Nautilus*, vol. XV p. 13—16.
- (2). A new Jamaican Adamsiella. — *Ibid.* p. 49, 50, Textfig.
- (3). Land Shells of Fortune Island, Bahamas. — *Ibid.* p. 85, 86, pl. V.
- Vide Simpson & Henderson.
- Henking, H.** Austern und Austernzucht in Norwegen. — In: *Abh. deutsche Seefischerei-Verein*, vol. VI p. 173—182, pl. 20.
- Heude, P.** Observations sur la faune Conchyliologique de l'Annam. — In: *J. de Conchyl.*, vol. 49 p. 35—36.
- Hidalgo, J. G.** Obra Malacologicas. Entr. 5. Madrid 1901.
- Hilgendorf, F.** Der Uebergang des *Planorbis multiformis* *trochiformis* zum *Planorbis multiformis oxystomus*. — In: *Archiv f. Naturg.*, vol. 67. Beiheft p. 331—348, t. XI. mit Textfig.
- Horsley, J. W.** Notes [on Landshells] from Porthleven, Cornwall. — In: *J. of Conch.*, vol. X p. 48.
- Howe, P.** Report of a dredging expedition off the Southern coast of New England, September 1899. — In: *Bull. U. S. Fish Comm.* vol. XIX, p. 239.
- Hoyle, W. E. (1).** Note on D'Orbignys figure of *Onychoteuthis dussumieri*. — In: *Mem. Manchester Soc.*, vol. 44 No. 4.
- (2). On the generic names *Octopus*, *Eledone* and *Histiopsis*. — *Ibid.* No. 9.
- Hoyle, W. E. & R. Standen.** On a new species of *Sepia* and other shells collected by Dr. R. Koettlitz in Somaliland. — In: *Mem. Manchester Soc.*, vol. 44 No. 6, with pl.
- Hutchinson, F.** On the Freshwater Shells of Rissington, Hawkes Bay. — In: *Trans. N. Zealand Inst.*, vol. 33 p. 207—213.
- Imhof, O. E.** Die Wassermolluskenfauna der Schweiz, insbesondere der Seen. — In: *Biolog. Centralblatt*, vol. 21 p. 43—62.
- Issel, Raf.** Osservazioni sopra alcuni animali della fauna italiana. — In: *Atti Soc. Ligustica*, vol. 12 p. 58—73, t. 1 u. 2, und *Bull. Mus. Genova* No. 106 p. 1—15, t. 1 u. 2.
- Jameson, H. L.** On the identity of the Mother of Pearl Oysters; with a revision of the Subgenus *Margaritifera*. — In: *Pr. zool. Soc. London* 1901 p. 372—394, with 4 figs.
- Jensen, A. S.** Studier over nordiske Mollusker. I. Mya. — In: *Vid. Meddel* 1900. p. 133—158.
- Johansen, A. C.** On the variations observable in some northern species of *Littorina*. — In: *Vid. Meddel.* 1901 p. 295—307.
- Johnson, J. P.** The Pleistocene Fauna of West Wittering. — In: *Pr. Geol. Assoc.*, vol. XVII p. 261—264.
- Johnson, W. H. & G. White.** Some new sections in, and contributions to the faunas of the River Drift of the Uphall Estate, Ilford, Essex. — In: *Essex Naturalist*, vol. XI p. 157—160.

- Keep, J.** Exotic Mollusks in California, — In: *Nautilus*, vol. 14 p. 114, 115.
- Kellogg, J. L. (1).** The clam problem and clam culture. — In: *Bull. U. S. Fish Comm.*, vol. XIX p. 39—44, map.
- (2). Observations on the life-history of the common clam, *Mya arenaria*. — *Ibid.* p. 139—202. Mit Textfig.
- Knight, G. A. F. (1).** Notes on the marine Mollusca of Port-Stewart, North Ireland. — In: *Trans. Soc. Glasgow*, vol. VI p. 1—17.
- (2). Marine Mollusca and Brachiopoda. — In: *Brit. Assoc. Handbook*, Glasgow. 1901. 8°.
- Knipowitzsch, N. W. (1).** Zoologische Ergebnisse der russischen Expedition nach Spitzbergen im Jahre 1900. Ueber die postpliocänen Mollusken und Brachiopoden von Spitzbergen. — In: *Bull. Ac. St. Petersb.*, vol. XII p. 377—386.
- (2). Explorations zoologiques sur le bateau cass-glace „Ernak“ en été de 1901. — In: *Ann. Mus. St. Petersb.* VI. p. 1—20. Avec carte.
- (3). Zur Kenntniss der geologischen Geschichte der Fauna des Weissen und des Murman-Meeres (Postpliocäne Mollusken und Brachiopoden). — In: *Verh. Russ. Mineral. Ges.* vol. 38 p. 1—169.
- Kobelt, W. (1).** Neue Cerastus-Arten aus Abessynien, gesammelt von Baron C. v. Erlanger. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.*, vol. 33 p. 86—89.
- (2). Ein neuer Clavator (heimburgi). — *Ibid.* p. 96.
- (3). Iconographie der schalentragenden europäischen Meeresconchylien, vol. II, Lfg. 14 u. 15. — Wiesbaden.
- (4). Rossmaesslers Iconographie, neue Folge, vol. 9 Lfg. 3 u. 4. Vide Martini & Chemnitz.
- Kräpelin, K.** Die Fauna der Umgegend Hamburgs. In: *Hamburg in naturwissenschaftlicher und medizinischer Beziehung*. Hamburg 1901.
- Lebuer, W. V.** The Marine Mollusca of Northumberland. — In: *Rep. Sea Fish Comm. North.* 1901 p. 49—53.
- Letaeq, A. L.** La Mulette perlière (*Unio margaritifer* Rossm.) et ses stations dans l'ouest de la France. In: *Naturaliste* 1901 p. 241—242.
- Levander, K. M.** Materialien zur Kenntniss der Wasserfauna in der Umgebung von Helsingfors, mit besonderer Berücksichtigung der Meeresfauna. — In: *Acta Soc. Fauna Fenn.* XVII No. 4 23 S.
- Lindholm, W. A.** Beiträge zur Kenntniss der Weichtierfauna Süd-Russlands. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.* vol. 33 p. 161—186.
- Locard, A.** Les Fissurella des côtes de France. — In: *Echange*, vol. XVII p. 6—8.
- Locard, A. & E. Caziot.** Les coquilles marines des cotes de Corse. — In: *Ann. Soc. Linn. Lyon*, vol. 47 p. 1—80, 159—291.
- Long, F. C.** The Land a Freshwater shells of Burnley District. — In: *J. Burnley Lit. Phil. Soc.* 1901 no. 17.

Luther, A. (1). Verzeichniss der Land- und Süßwasser-Mollusken der Umgebung Revels. — In: Acta Soc. Faun. Fennica vol. XX no. 2.

— (2). Bidrag till kännedomen om land- och sötvattengastropodernes utbredning i Finland. — Ibid. no. 3. 125 S. mit Karte.

Mabille, J. Testarum novarum diagnoses. — In: Bull. Soc. philom. vol. III p. 56—58.

Margier, G. Notes malacologiques: le Pupa (*Torquilla*) similis Brug. (*P. cinerea* Drp.) Sa distribution géographique. — In: Feuille jeunes Naturalistes No. 365 p. 139—141.

Marsh, W. A. Description of a new *Unio* from Missouri. — In: Nautilus, vol. 15 p. 74.

Marquand, E. D. The marine shells of Guernsey and the Lesser Channel Islands. — In: Rep. Guernsey Soc. 1901 p. 70—86.

Marshall, W. T. (1). Note on *Myrina simpsoni* Marsh. — In: J. Malac. vol. 8 p. 19.

— (2). *Tapes geographicus* and *T. pullastrum*. — In: J. of Conch. Leeds vol. X p. 27.

— (3). Additions to British Conchology. — Ibid. p. 122—128.

Martel, H. Liste des Coquilles marines, terrestres et d'eau douce recueillies aux environs de Cancale. In: Feuille jeunes Naturalistes No. 364—369, avec pl. XIII—XIV.

Mazzarelli, G. Sulla affinità del genere *Phyllaplysia* P. Fischer. — In: Zoolog. Anzeiger vol. 24 p. 433—437, mit 6 Textfig.

Martens, Ed. von (1). Die Bezeichnung der verschiedenen Richtungen von Farbenbändern, Rippen und Furchen bei den Mollusken-Schalen. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. 1901 vol. 33 p. 1—8.

— (2). Diagnosen neuer Arten. — Ibid. p. 148.

— (3). Neue Meeresconchylien von der deutschen Tiefsee-Expedition. — In: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1901 no. 1.

— (4). Eine neue Süßwasserschnecke aus Kamerun (*Semisinus zenkeri* (*Rhinomelania*) n.).

— (5). Vide Stuhlmann.

Martini & Chemnitz. Conchylien Cabinet, Lfg. 459—468. — *Auriculacea*, *Naninidae*, *Buliminidae*, von Kobelt; — *Pleurotomaria*, von Schmalz; — *Pyramidellidae*, *Styliferidae*, *Vermetidae*, *Caecidae*, von Clessin.

Mayfield, A. Norfolk Marine Mollusca. — In: J. of Conch. Leeds, vol. X p. 49, 50.

Meek, A. On Mussel cultivation on the Coast of Northumberland. — In: Rep. North. Sea Fish Comm. 1900 p. 62—63.

— (2). The Mussel experiment on the Coquet. Ibid. 1901 p. 35.

Melvill, J. C. A few further remarks upon the Erythraean Molluscan Fauna, with descriptions of Seven Species from Aden, in the Collection of Commander E. R. Shopland, R. J. M. — In: Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 7 p. 550—556, pl. IX.

— (2). *Cypraea chrysalis* Kien. and *C. microdon* Gray. — In: J. of Conch. Leeds vol. X p. 117—119.

Melvill, J. C. & J. H. Ponsonby. Description of Fourteen new Species of Terrestrial Mollusca from South Africa. — In: Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 8 p. 315—321, pl. II.

Melvill, J. C. & R. Standen. The Mollusca of the Persian Gulf, Gulf of Oman and Arabian Sea, as evidenced mainly through the collections of Mr. C. W. Townsend 1893—1900, with descriptions of new species. — In: Pr. zool. Soc. London, p. 327—460 pl. XXI—XXIV.

— (2). Mollusca collected by Mr. Rupert Valentin at Stanley Harbour, Falkland Isles 1897—99. — In: J. of Conch, Leeds vol. X p. 43—47.

Moebius, K. Gedanken über die aesthetischen Eigenschaften der Mollusken. In: Archiv f. Naturg. vol. 67 Beiheft p. 1—8.

Moellendorff, O. von. Neue und kritische Landschnecken von Japan und den Liu-kuu Inseln. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 33 p. 33—45.

— (2). Zur Binnenmollusken - Fauna von Annam. IV. Ibid. p. 45—50.

— (3). Diagnosen neuer von H. Fruhstorfer in Tongking gesammelter Landschnecken. Ibid. p. 65—81.

— (4). Zur Südpolarland-Frage. Ibid. p. 125—127.

— (5). Landmollusken. In: C. Semper, Reise Philippinen, wissenschaftl. Resultate vol. VIII Heft 3 u. 4. Wiesbaden, Kreidel.

— (6). Binnenmollusken aus Westchina und Centralasien. II. In: Ann. Mus. zool. Acad. St. Petersbourg, Année VI p. 299—412. Mit Tabelle und pl. 12—17.

— (7). Landmollusken. Ergänzungen und Berichtigungen zu Band III. — In: C. Sempers Reisen im Archipel der Philippinen. Wissensch. Result. vol. VIII p. 98—146, t. 11—13.

Monterosato, T. A. di. Eine neue italienische Hochgebirgs-schnecke. In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 33 p. 186.

Moore, J. E. S. Further Researches concerning the Molluscs of the Great African Lakes. — In: Pr. zool. Soc. London 1901 p. 461—470, pl. 25 u. 26.

Moutier, F. R. Supplément au Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles des environs de Caen. — In: Bull. Soc. Normand. vol. IV p. 8—17.

Murdoch, R. On the anatomy of some Agnathous Molluscs from New Zealand. In: Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 166—173, pl. XVII.

— (2). On the anatomy of the Buliminus djurdjurenensis, Ancey from the Djurdjura Mountains, Kabylia. — Ibid. p. 174—177, with figs.

Naegele, G. Einige Neuheiten aus Vorderasien. In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 33 p. 16—31.

Oreutt, C. R. West American Mollusca. Vol. I (Schluss) San Diego Cal. 1900—1901 and W. American Scient. vol. XI p. 27, 41, 63, 74, 78.

Pace, S. On the rediscovery of *Euseolenops* (= *Neda*) *luniceps* (Cuv.). In: Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 202—204, Textfig.

— (2). Note on the Anatomy of *Thersites* (*Hadra*) *bipartita* (Fér.). Ibid. p. 205—207, Textfig.

Pallary, P. Apport à la Faune Malacologique d'Egypte. — In: Bull. Inst. Egypte vol. II p. 239—244, avec pl.

— (2). Troisième Contribution à l'étude de la Faune malacologique du Nord-Ouest de l'Afrique. — In: C. R. Assoc. franç. 1900 p. 731—735, pl. XI.

— (3). Sur les mollusques fossiles, terrestres, fluviatiles et saumâtres de l'Algérie. — In: Mem. Soc. geol. France Pal. No. 22; 213 S. mit 4 Taf. und 16 Textfig.

— (4). Diagnoses de quelques coquilles nouvelles provenant du Maroc. In: J. de Conchyl. vol. 49 p. 226—228.

Pilsbry, H. A. Relationship of the Genus *Neobeliscus*. — In: Proc. Acad. Sci. Philadelphia 1901 vol. 53 p. 142.

— (2). New species of Mollusks from South-Afrika and Burmah. Ibid. p. 188, with pl. 5.

— (3). New Mollusca from Japan, the Loo-Choo Islands, Formosa and the Philippines. Ibid. p. 193.

— (4). New Land-Mollusca from Japan and the Loo - Choo Islands. Ibid. p. 345.

— (5). New Japanese Marine, Land- and Freshwater Mollusca. Ibid. p. 385 t. 19—21.

— (6). The Land Mollusca of the Loo-Choo Islands. Clausiliidae. Ibid. p. 409 pl. 22, 23.

— (7). Additions to the Japanese Land Snail Fauna. Ibid. p. 465—496 p. 25—28.

— (8). Notices on new Land Snails from the Japanese Empire. Ibid. p. 496—502.

— (9). New Land Mollusca of the Japanese Empire. Ibid. p. 545, 562, 614.

— (10). *Fasciolaria gigantea* subsp. *reevei*. — Ibid. p. 552.

— (11). Additions to the Japanese Land Snail Fauna. V. Ibid. p. 622—647, with pl. 35—38.

— (12). Catalogue of the Clausiliidae of the Japanese Empire. Ibid. p. 647—657.

— (13). Anatomy of *Beddomea* and Relationships of *Amphidromus*. With pl. 16. — Ibid. p.

— (14). Notices on some new Japanese Land snails. — In: Nautilus vol. 14 p. 107, 115, 127.

— (15). *Polygyra stenotrema* without a lip-notch. Ibid. p. 135.

— (16). The subspecies of *Pyramidula alternata*. — Ibid. vol. 15 p. 6.

— (17). New land Shells from the Loo-Choo Islands and Japan. Ibid. p. 18—24.

— (18). A new Columbian Pleurodonte. — Ibid. p. 34, pl. 2 (pars.).

- (19). A new Columbian Clausilia. *Ibid.* p. 39. pl. 2 (pars.).
- (20). Land mollusks of the northeastern group of the Loo-Choo-Islands. *Ibid.* p. 61.
- (21). Tryons Manual of Conchology. Series 2 vol. 14 Bulimi & Bulimulidae.
- Pollonera, C.** Diagnosi preventive di alcune specie nuove di Molluschi. In: *Boll. Mus. Torino* vol. XVI no. 392.
- Preston, H. B.** Description of *Cymbiola maugeri*, a supposed new species from the Falkland Island. — In: *Pr. mal. Soc. London* vol. 4 p. 237 fig.
- Robert, A.** Sur une Monographie ancienne de *Purpura lapillus*. In: *Arch. Zool. Expér.* IX. Notes et Revue No. 1 p. XXV —XXX.
- Rolle, H.** Ein neuer *Bulimus* aus Peru. In: *Nachrbl. D. mal. Ges.* vol. 33 p. 93—95.
- Rosen, O. W. von.** Zur Kenntniss der Stadt Charkow und ihrer nächsten Umgebung (Russisch). — In: *Tagebl. Zool. Abth. Ges. Moskau* vol. 3 no. 2 p. 12, 13.
- (2). Materialien zur Kenntniss der Molluskenfauna des Kaukasus und Centralasiens. *Ibid.* p. 7—12.
- Rossmaessler, E. A.**, vide Kobelt.
- Sacco, F.** I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. — Part 29. *Torino* 1901. 216 S., 29 Taf. (Bivalvia).
- (2). Novita malacologiche. In: *Revista Ital. Pal.* vol. VII, p. 107—111.
- Sarasin, P. & F.** Ueber die geologische Geschichte der Insel Celebes auf Grund der Thierverbreitung. — *Wiesbaden* 1901. 169 S., 15 Karten.
- Scalia, S.** Revisione della fauna post - pliocenica dell' argilla di Nizzetti presso Acicastello (Catania). — In: *Atti Acad. Gioen.* vol. XIII no. 19 (26 S.).
- Shepman, M. M.** An undescribed *Natica*. — In: *Notes Leyden Museum* vol. XXII p. 188, Textfig.
- Schierl, A.** Die Land- und Süsswassermollusken Mährens. In: *Club f. Naturk. Brünn* 1901 p. 49—60.
- Schmaltz, C.** vide Martini & Chemnitz.
- Schmidt, L.** Ueber das Vorkommen von *Pupa secale* Drp. und *Patula rupestris* Drp. in Thüringen. In: *Nachrbl. D. mal. Ges.* vol. 33 p. 51.
- (2). *Physa acuta* Drp. eingeschleppt. *Ibid.* p. 95.
- (3). Die Mollusken des Seebergs. — In: *Naturw. und Geschichte des Seebergs*. Gotha 1901 p. 114—117.
- Scott, T.** The Land- and freshwater Mollusca [of the Clyde Area]. — In: *Brit. Assoc. Handbook*, Glasgow 1901, p. 183—188.
- Sell, H.** Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna des Furesös. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.* vol. 33 p. 97—110, 153.
- Seurat, L. G.** L'huitre perlrière. Exposé des connaissances actuelles sur l'histoire naturelle de ce mollusque, les essais de culture

dont il a été le object et l'histoire de la formation des perles. In: Rev. Sci. Nat. appl. 1901 p. 129—146, 161—162.

(2). L'huître perlière. Nacre et Perles. — In: Enc. Sci. Aide-Mémoire. Paris 1901. 195 p., figs.

Sherborn, C. D. & Woodward, B. B. Notes on the dates of publications of Kiéners „Species général et monographie des coquilles vivantes“ etc. 1834—1880. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 4 p. 216—219.

— (2). Notes on the Dates of Publication of the Natural History Portions of some French Voyages. Part I. In: Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 7 p. 388—392.

— (3). On the Dates of Publication of the Zoological and Botanical portions of some French Voyages. Part II. Ibid. ser. 7 vol. 8 p. 161—164, 333—336, 491—494.

— (4). On the Dates of Publication of the Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles“, and the „Tableaux systématiques des Animaux mollusques“, by the Barons Féruccac and G. P. Deshayes. — Ibid. vol. 8 p. 74—76.

Simpson, C. T. Alasmidonta marginata Say. — In: Nautilus, vol. 15 p. 16, 17.

— (2). On the classification of the Unionidae. Ibid. p. 77—82.

Simpson, C. F. & Henderson, J. B. A new land operculate from Haiti. — In: Nautilus vol. 15 p. 73 pl. 5.

Simroth, H. Ueber die Raublungenschnecken. — In: Naturw. Wochenschr. 1901, vol. XVII p. 109—114, f. 1—14; p. 121—127, f. 15—18; p. 137—140, f. 19.

— (2). Ueber eine merkwürdige neue Gattung von Stylocephalophoren. — In: Zoolog. Anzeiger 1901 vol. 25 p. 62—64.

— (3). Die Nacktschnecken des Russischen Reichs. — St. Petersburg 1901. Mit 27 Tafeln, 10 Karten und 17 Textfiguren.

— (4). Clausilia mimicked by a Microlepidopteron. In: J. of Malac. vol. 8 p. 33, 34.

— (5). Ueber die Abhängigkeit der Nacktschneckenbildung vom Klima. — In: Biolog. Centralblatt vol. 21 p. 501—512.

— (6). Ueber das Problem früheren Landzusammenhangs auf der südlichen Erdhälfte. In: Geogr. Zeitschr. 1901 p. 655—676. Mit Karte.

Smith, E. A. Notice on a species of Paludestrina, new to the British Fauna. In: Ann. nat. Hist. ser. 7 vol. 7 p. 191, 192.

— (2). A list of the known forms of Volutidae from South Afrika, with Descriptions of two new species of Voluta from Natal. In: Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 231—235, with figs.

— (3). On some new Land shells from British East Afrika. In: J. Malac. vol. 7 p. 93—96, with figs.

— (4). Note on the Subgenus Salinator of Hedley. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales vol. XXVI p. 14, 15.

— (5). On some South African Marine shells, with descriptions of new species. — In: J. of Conch. Leeds vol. 10 p. 104—116 pl. 1.

Sowerby, G. B. Descriptions of new species of marine Mollusca collected by the late Otto Koch at the Island of Cebù, Philippines. II. In: Pr. mal. Soc. London vol. 4 p. 208—211, pl. 22.

— (2). Description of *Marginella princeps* n. sp. Ibid. p. 212 pl. 22, pars.

— (3). On seven new species of marine Mollusca collected by Dr. H. Becker at „the Kowie“, South Afrika. Ibid. p. 213—215 pl. 22, pars.

— (4). Descriptions of five new species of Shells. — In: J. Mal. vol. 8 p. 100—103, pl. 9.

Standen, R. vide Hoyle & Standen.

Standen, R. vide Melvill & Standen.

Stearns, R. E. C. Japanese Vivipara in California. — In: Nautilus vol. 15 p. 53, 54.

Steuroos, K. E. Das Thierleben im Murmijärvi - See. Eine faunistisch-biologische Studie. In: Acta Soc. Fauna Fenn. vol. XVII No. 1. 259 S. mit 3 Tafeln.

Steep, E. Shell Life, an introduction to the British Mollusca. London. 8°. 1901. 414 p., 35 pl.

Sterki, V. Nordamerikanische Pisidien und deren Beziehungen zu den europäischen. In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 33 p. 82—86.

— (2). New Pisidia. — In: Nautilus, vol. XIV p. 99—101.

— (3). New North American Sphaeria. Ibid. p. 140—142.

— (4). New Pisidia. Ibid. vol. XV p. 66—69.

Stuhlmann, F. vide Martens.

Sturany, R. Lamellibranchiaten des Rothen Meeres. — In: Bericht Comm. Ocean Forsch. VII. 1901. — In: Denkschr. Akad. Wien vol. 255—359.

— (2). Mollusken. In: Dritte Asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. Vol. 2. Budapest 1901. 4°.

Suter, H. Note upon *Trophon umbilicatus*, Tenison Woods. In: J. Mal. vol. 8 p. 61—63.

Sykes, E. R. Digesta malacologica. No. 1. A Summary of the American Journal of Conchology, 1865—1872. London 1901, 8°. 46 p.

— (2). Description of *Helicina pelewensis* n. sp. from the Pelew Islands. — In: Pr. mal. Soc. London vol. 4, p. 260, fig.

— (3). Notes on the genus *Temesa* H. & A. Adams, with descriptions of two new landshells (*Clausilia* and *Temesa*) from South America. — Ibid. p. 220—222, Textfig.

(4). Malacological Notes. — In: J. Mal. vol. VIII. — 5. The Genus *Rhodea* p. 20; 6. On a new species of *Helicina* from Kangean Island. 7. The value of the name *Ctenopoma*. 8. Note on *Cecina manchurica* A. Ad. Ibid. p. 59—60, figg. — 9. What is *Cyclostoma giganteum*? 10. Note on *Voluta beaui* Fisch. & Bern. — 11. Note on *Cypraea talpa* and *C. exusta*. — 12. The value of *Murdochia Ancey*. — Ibid. p. 105—109, pl. X.

— (5). Conchology at the dawn and close of the nineteenth century. — In: J. Conch. Leeds, v. X, p. 35—42. —

Tate, R. Note on the Nomenclature of *Cingulina brazieri* Angas, a Port Jackson Mollusc. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. XXVI, p. 204.

Tate, R. & W. L. May. A revised Census of the Marine Mollusca of Tasmania. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. XXVI, p. 344—471, pl. 23—27.

Thiele, J. Bemerkungen zur Systematik der Landdeckelschnecken. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 33, p. 89—93.

Tryon, G. W. vide **Pilsbry**.

Vanatta, E. G. New marine Molluska. — In: Pr. Ac. Philad. 1901, p. 182—187, pl. V.

Vayssiére, A. Recherches zoologiques et anatomiques sur les Mollusques Opisthobranches du golfe de Marseille. Troisième partie. Nudibranches. — In: Ann. Mus. Marseille VI, p. 1—130, pl. I—VII.

— (2). Etude zoologique et anatomique de la *Mitra zonata* Marryat. — In: J. de Conchyl. vol. 49, p. 77—95, pl. 3.

— (3). Monographie de la Famille des Pleurobranchidés. II.

— (4). Etude comparée des Opisthobranches des côtes francaises de l'Océan atlantique et de la Manche avec ceux de nos côtes Méditerranéennes. — In: Bull. Soc. France Belgique, vol. XXXIV, p. 281—315.

Vendryes, H. Description of two new species of *Glandina* from Jamaica. — In: Nautilus vol. XIV, p. 133—135, figg.

— (2). New Jamaica Urocryptidae. — Ibid. vol. XV, p. 1—5, pl. 1.

Vest, W. von. Bivalven-Studien. Erweiterung meiner Arbeit, über das Bivalvenschloss. — In: Verh. Siebenb. Ver. p. 89—96.

Voigt, W. Entocolax schiemensi n. sp. — In: Zool. Anzeiger vol. XXIV, p. 285—292.

Walker, B. New varieties of *Physa ancillaria* Say. — In: Nautilus, vol. XIV, p. 97—99.

— (2). New *Amnicola (letsoni)*. — Ibid. p. 113; 114.

— (3). The synonymy of *Bythinella obtusa* Lea. — Ibid. vol. XV, p. 30—32.

— (4). A new species of *Strophitus*. — Ibid. p. 65, 66, pl. III.

Walker, B. & A. C. Lane. Recent Shells (of the Marl). — In: Geol. Survey Michigan, VII, p. 247—255.

Weldon, W. F. R. A first Study of Natural Selection in *Clausilia laminata* (Mont.) — In: Biometrika I, p. 109—124.

Westerlund, C. A. Synopsis Molluscorum in regione Palaeoarctica viventium ex typo *Clausilia Drp.* — In: Mem. Acad. St. Petersbourg XII, no. 11, XXVII & 203 p.

Whiteaves, J. F. Notes on some Land- and Freshwater Mollusca from Forst Chima, Ungava Bay, Ungava. — In: Ottawa Natural. vol. XIV, p. 177—179, fig.

Whitwell, W. Notes of Shells observed and collected in East Sussex. — In: J. of Conch. Leeds vol. X, p. 85, 86.

Wiedermayer, L. Beiträge zur Conchylienfauna Tirols. Die Conchylien des Thales Karteitsch. — In: Zeitschr. Ferdinand. Tirol vol. 44, p. 153—174.

Wiegmann, F. Beiträge zur Anatomie. 1. Anatomische Untersuchung einiger mittelitalienischer Arten. 2. Ueber Corydannisoni Pf. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 33, p. 8—16.

— (2). Binnen-Mollusken aus Westchina und Centralasien. Zootomische Untersuchungen II. Die Bulimiden. In: Ann. Mus. St. Petersbourg VI, p. 220—298, pl. X & XI.

Wilcox, M. A. A revision of the systematic names employed by writers in the Morphology of the Acmaeidae. In: Pr. Boston Soc. vol. 29, p. 217—222.

Williams, J. W. Land- and Freshwater Shells; an Introduction to the study of Conchology. London 1901, 8°, 112 p. fig.

Willey, Arthur. General Account of a Zoological Expedition to the South Seas during the years 1894—1897. — In: Pr. zool. Soc. London 1899, p. 7.

Williamson, M. B. How Potamides (Cerithidea) californica Hald. travels. — In: Nautilus, vol. XV p. 82, 83.

Winkley, H. W. Variations in Odostomia. — In: Nautilus vol. XIV p. 126.

Wohlberedt, O. Ein Conchyliologischer Ausflug nach Montenegro nebst einem Verzeichniss der bisher daselbst gefundenen Mollusken. — In: Abh. Ges. Görlitz, vol. XXIII p. 183—210.

Woodward, B. B. Dates of publication of Forbes & Hanley's History of British Mollusca. — In: J. Malac. vol. VIII p. 121 und J. Conch. Leeds vol. X p. 47.

— (2). Tapes geographicus and T. pullastræ. — In: J. Conch. Leeds vol. X p. 51.

Vide Adams & Woodward, Kennard & Woodward, Sherborn & Woodward.

Wüst, E. Helix banatica (= canthensis Beyr.) aus dem Kalktuff von Bilzingsleben. — In: Zeitschr. Naturw. vol. 74 p. 72—76.

Jahrgang 1902.

Adams, L. E. The Census of the British land- and freshwater Mollusca. — In: J. Conch. Leeds vol. X p. 217—237.

Alcock, A. A Naturalist in Indian Seas. London. 8°, 328 p. (Mollusca, p. 277—282).

Allen, E. J. & Todd, R. A. The Fauna of the Exe Estuary — In: J. Mar. Biol. Assoc. VI p. 295—335, mit Karte.

Ancey, C. F. (1). Two new Bulimini from Central Asia. — In: Nautilus, vol. 16, p. 47, 48.

— (2). Contributions towards the knowledge of the Mollusca of Madagascar. — Ibid. vol. 16 p. 64—68, 80—82.

— (3). Description d'une nouvelle espèce de *Bulimulus*. — In: J. Conch. vol. 50 p. 40, 41, mit Textfig.

— (4). Remarques sur différentes espèces peu connues du Genre *Achatina*. — Ibid. p. 273.

Baker, F. C. (1). Cruising and collecting off the Coast of Lower California. In: *Nautilus*, XVI p. 25—29.

— (2). List of Shells collected on San Martin Island, Lower California, Mexico. — Ibid. XVI p. 40—43.

Bartsch, P. (1). A new *Rissoina* from California. In: *Nautilus*, vol. XVI p. 9.

— (2). Vide Dall & Bartsch.

Bavay, A. (1). Notes sur quelques espèces du Genre *Pecten*, nouvelles ou mal connues. — In: J. de Conch. vol. 50 p. 399—406, pl. VIII (partim).

— (2). Description d'une espèce nouvelle du Genre *Marginella*. — Ibid. p. 407 pl. VIII (partim).

Bellini, R. Contribuzione alla conoscenza della fauna dei molluschi marini dell' isola di Capri. — In: *Boll. Soc. Napoli*, vol. 15 p. 85—121.

Bergh, R. (1). The Danish Expedition to Siam 1899—1900. — I. Gastropoda Opisthobranchiata. — In: *Danske Selsk. Skl.* XII p. 153—218. Mit 3 Tafeln u. Karte.

— (2). Reisen im Archipel der Philippinen von C. Semper. Wissenschaftliche Resultate, Band VII. — Malacologische Untersuchungen IV. 4. *Ascoglossa*, *Aplysiidae*, p. 313—382, Taf. 17—19. (Schluss).

Blanford, W. T. On *Rhiostoma dalyi* n. sp., and *Sesara megalodon* n. sp., obtained by the late Mr. W. M. Daly in Siam. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. V p. 34, 35, with figgs.

Bloomer, H. H. Notes on some further malformed specimens of *Anodonta cygnea* L. — In: *J. Malac.* vol. IX p. 96 pl. 7.

Buchner, O. Einige ergänzende Bemerkungen über Gehäuse-Abnormitäten bei unseren Landschnecken. — In: *Jahresh. Ver. Württemb.* vol. 58 p. 77—82, t. 1, — und *Mitth. Nat.-Kab. Stuttgart* no. 21.

Button, F. L. West American Cypraeidae. — In: *J. Conch.-Leeds* vol. X p. 254—256.

Call, B. E. The European Pond Snail. — In: *Science*, vol. 16 p. 65.

Carpenter, H. F. The shell-bearing Mollusca of Rhode-Island. — In *Nautilus*, vol. XV u. XVI.

Caziot, E. (1). Note on the pairing of *Pyramidula rotundata* (Müll.) with *Vitreolum lucida* (Drap.). — In: *Pr. mal. Soc. London* vol. V p. 11.

— (2). Liste des Mollusques aquatiques vivants dans la fontaine de Nîmes. — In: *Bull. Soc. Nîmes* vol. 29 p. 14—19.

- Clapp, G. H.** vide Pilsbry & Clapp.
- Claudon, E.** Faunule malacologique marine de St. Raphaël (Var.). — In: Feuille jeunes Natural. Année 32 p. 184 & 199. Mit 2 Karten.
- Clessin, S.** vide Martini & Chemnitz.
- Cockerell, T. D. A. & M. Cooper.** Notes on Ashmunella. — In: Nautilus vol. XV p. 109, 110.
- Cockerell, T. D. A. (1).** Three new species of Chromodoris. — In: Nautilus XVI p. 19—21.
- (2). *Unio popei* Lea in New Mexico. — Ibid. p. 69—70.
- Collett, O.** Contributions to Ceylon Malacology. III. The terrestrial Mollusca of Ambagamuwa pt. 2. — In: J. Conch. Leeds vol. X p. 208—214.
- Collier, E.** The Section Placostylus of the genus Bulimus. — In: J. Conch. Leeds vol. X p. 208—214.
- Collinge, W. E. (1).** On the Anatomy of the Genus *Myotesta* Collinge. — In: J. Mal. IX p. 11—16, pl. 1.
- (2). Description of a new Species of *Onchidium* from South Africa. — Ibid. p. 17, Textfig.
- (3). Is *Amalia carinata* a British Slug? — Ibid. p. 63.
- (4). On the Non-Operculate Land and Freshwater Mollusca collected by the members of the „Skeat-Expedition“ in the Malay Peninsula, 1899—1900. — Ibid. p. 71—95, t. 4—6.
- Cooper, M.** vide Cockerell & Cooper.
- Corbett, H. II.** Terrestrial Mollusca of Doncaster. — In: Naturalist 1902 p. 205—207.
- Corney, R. G.** Poisonous Molluscs. — In: Nature, vol. 65 p. 198.
- Cornish, C. J.** The Naturaliste on the Thames. — London, VIII + 260 S.
- Cossmann, M.** Rectifications de nomenclature. — In: Revue paléozol., vol. VI p. 52, 96, 160, 223.
- Coutagne, G.** Les Mollusques de la Tarentaise. — In: Feuille jeunes Naturalistes année 32 p. 137, 159.
- Crosse, H.** vide Fischer & Crosse.
- Crowther, J. W.** The Natural History of Tag Lock. — V. Freshwater Snails. — In: Halifax Naturalist vol. 7 p. 78—80.
- Dall, W. H. (1).** A new species of *Volutomitra* (*alaskana*). — In: Nautilus vol. 15 p. 102, 103.
- (2). Note on the names *Elachista* and *Pleurotomaria*. — Ibid. p. 127.
- (3). Notes on the giant Limas. — Ibid. vol. 16 p. 15—17.
- (4). New species of Pacific Coast Shells. — Ibid. p. 43, 44.
- (5). Note on *Neocorbicula* Fischer. — Ibid. p. 82, 83.
- (6). On the true nature of *Tamiosoma*. — In: Science vol. XV p. 5—7.
- (7). On the genus *Gemma* Deshayes. — In: J. Conch. Leeds vol. 10 p. 238—243.

— (8). Synopsis of the family Veneridae and of the North American species. — In: Pr. U. S. Nat. Museum vol. 26, p. 335—412, t. 12—16.

— (9). Illustrations and Descriptions of new, unfigured or imperfectly known shells, chiefly American, in the U. S. National Museum. — In: Pr. U. S. Nat. Mus. vol. 24 p. 499—566 t. 27—40.

— (10). Synopsis of the Carditacea and of the American Species. — In: Pr. Ac. Philadelphia 1902 p. 696—716.

Dall, W. H. & P. Bartsch. A new Rissoa (*Kelseyi*) from California. — In: Nautilus, vol. 16 p. 94.

Daniels, L. E. A new species of *Lampsilis*. — In: Nautilus, vol. XVI p. 13, 14, t. 2.

Dautzenberg, Ph. (1). Revision des Cypraeidae de la Nouvelle Calédonie. — In: J. Conch. vol. 50 p. 291—384, pl. VII.

— (2). Observations sur quelques mollusques rapportés par M. Ch. Alluaud du Sud de Madagascar. — In: Bull. Soc. zool. France, vol. 27 p. 196—199.

— (3). Descriptions de Mollusques nouveaux provenant de l'île d'Obi (Moluques). — In: Naturaliste, 1902, p. 247, 248, avec 7 figs.

Davenport, C. P. Relative variability of *Pectens* from the East and West Coast of the United States. — In: Science vol. 15 p. 531.

Digby, L. On the structure and affinities of the Tanganyika Gastropods *Chytra* and *Limnotrochus*. — In: J. Linn. Soc. vol. 28 p. 434—442, t. 38—40.

Dimon, A. C. Quantitative study of the effect of Environment upon the forms of *Nassa obsoleta* and *Nassa trivittata* from Cold Spring Harbour, Long Island. — In: Biometrika, II p. 24—43, with figs.

Dupuis, P. & S. Putzeys. Note concernant la découverte du *Petricola pholadiformis* L. en Belgique. — In: Ann. Soc. mal. Belgique vol. 37, Bull. p. IV.

Dybowski, W. (1). Die Verwandtschaft von *Ancylodoris*. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34 p. 18, 19.

— (2). Die Cycladidae des Baikalsees. — Ibid. p. 81—97.

Elliot, C. On some Nudibranchs from Zanzibar. — In: Pr. zool. Soc. London 1902 p. 62—72, with pl. 5 u. 6.

Elrod, M. J. Collecting Shells in Montana. — In: Nautilus, vol. 15 p. 103, 110, 129.

Evermann, B. W. & Goldsborough, E. L. Notes on the fishes and mollusks of Chautauqua, New York. — In: Rep. Fish Comm. XXVII p. 169—175.

Ficalbi, E. Doratopsis vermicularis larva di *Chiroteuthis veranyi*. — In: Monit. Zool. Ital. vol. 13 p. 37—39.

Finn, F. Transport of Molluscs by Waterfowl. — In: Nature, vol. 65 p. 534.

Fischer, H. (1). A propos du type de *l'Helix prunum* Ferussac. — In: J. de Conch. vol. 50 p. 385—386.

— (2). Description d'un Oliva nouveau provenant des Nouvelles Hebrides. — Ibid. p. 409—411, pl. 8.

Fischer, P. & Crosse, H. Mission scientifique au Mexique et dans l'Amerique Centrale. Etude sur les Mollusques terrestres et fluviatiles. Tome II, p. 657—731, pl. 67—72.

Friele, H. Mollusken der ersten Nordmeeraufnahme des Fischerei-Dampfers „Michael Sars“ 1900 unter der Leitung von Herrn Dr. Johan Hjort. — In: Bergens Museum Aarbog 1902 no. 3. Mit 4 Tafeln und Karte.

Frierson, L. S. Collecting Unionidae in Texas and Louisiana. — In: Nautilus, vol. XVI p. 37—40.

Fuchs, T. Ueber den Charakter der Tiefseefauna des Rothen Meeres auf Grund der von der österreichischen Tiefsee-Expedition gewonnenen Ausbeute. — In: Sitzber. Ak. Wien vol. 110 I p. 249—258.

Fulton, H. (1). Description of Ennea affectata, n. sp. from Zanzibar. — In: Pr. Mal. Soc. London, vol. V, p. 32, Textfig.

— (2). Description of Thersites (Rhagada) woodwardi n. from N. W. Australia. — Ibid. p. 33, Textfig.

— (3). Descriptions of a new Alycaeus from Perak and a Bulimulus from Bolivia. — In: Ann. Nat. Hist. (VII) vol. 9 p. 68, 69.

— (4). Descriptions of new species of Land Mollusca from New Guinea. — Ibid. p. 182—184.

— (5). Descriptions of new Species of Ampelita and Tropidophora from Madagascar. — Ibid. p. 313—315.

— (6). Descriptions of new Species of Helicoids from German New Guinea and New Mecklenburg (New Ireland). — Ibid. p. 315—318.

Gatliff, J. H. (1). Notes on Perrys „Conchology“. — In: Victorian Naturalist vol. 19 p. 75—76.

— (2). Vide Pritchard & Gatliff.

Godwin-Austen, H. H. On Helix basileus, Benson, from South-India: its Anatomy and generic position. — In: Pr. Mal. Soc. London vol. V p. 248—252, pl. 6.

Goldsborough, E. L. vide Eversmann & Goldsborough.

Grabau, A. W. Studies of Gastropoda. — In: Amer. Naturalist vol. 36 p. 917—945, mit Textfig.

Graeffe, E. Uebersicht der Fauna des Golfes von Triest. Mollusca. — Arb. Inst. Wien vol. 14 p. 89—136.

Granger, A. Les Mollusques testacés marins des côtes méditerranéennes de la France. — In: Bull. Soc. Béziers vol. 22 p. 41—100, vol. 23 p. 5—30.

Grant, F. E. & E. O. Thiele. Notes on some recent Marine Deposits in the neighbourhood of Williamstown. — In: Pr. Soc. Victoria vol. 15 p. 36—40.

Gredler, P. V. (1). Die Conchylien des Thales Kartitsch von Prof. Leonhard Wiedermeyer. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34 p. 15—18.

— (2). Zur Conchylienfauna von Borneo und Celebes. — Ibid. p. 53—62.

Green, W. A. A few Notes on imported Mollusca. — In: J. Conch. Leeds X p. 185—186.

Grierson, R. H. Some land- and freshwater shells from Cty. Clare. — In: Irish Naturalist vol. XI p. 139, 140.

Gude, G. K. (1). Description of two new Helicoid Land-shells. — In: Ann. nat. Hist. (VII) vol. 10 p. 332, 333, Textfig.

— (2). Note on *Eulota blakeana*, Newcomb and *Eulota luna*, Pilsbry. — In: Pr. mal. Soc. London vol. 5 p. 10, 11.

— (3). A Synopsis of the Genus *Streptaxis* and its allies. — Ibid. p. 201—204, pl. 4.

— (4). A classified list of the Helicoid Land-Shells of Asia. — In: J. Mal. vol. 9 p. 1, 51, 97, 112.

Gulick, A. vide Pilsbry & Gulick.

Hedley, Ch. (1). Scientific Results of the trawling expedition of H. M. C. S. „*Thetis*“ off the Coast of New South Wales in February and March, 1898. Mollusca. Part I. Brachiopoda and Pelecypoda. — In: Mem. Austral. Mus. vol. 4 p. 287—324. — Mit Textfiguren.

— (2). A day on the Great Barrier Reef. — In: Nautilus, vol. XV p. 97—100.

— (3). Notes on Tasmanian and West Indian Conchology. — Ibid. vol. XVI p. 49.

— (4). A new Australian Voluta (*V. perplicata*). — In: Record Austral. Mus. vol. IV p. 309, Textfig.

— (5). Studies on Australian Mollusca. Part. V. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales vol. 26 p. 700—708, pl. 34; — Part. VI ibid. vol. 27 p. 7—29, t. 1—3.

Henderson, J. B. & C. T. Simpson. A new Haytian Chondropoma. — In: Nautilus, vol. 16 p. 88, 89, Textfig.

Hensgen, C. Biometrische Untersuchungen über die Spielarten von *Helix nemoralis*. — In: Biometrika I p. 468—492, mit Textfig.

Hirase, Y. vide Pilsbry & Hirase.

Hoyle, W. E. (1). British Cephalopoda: their nomenclature and classification. — In: J. Conch. Leeds, vol. 10, p. 197—206.

— (2). Two points in nomenclature. I. Cyprinidea versus Cyprina. II. The Genus *Antiopa*. — Ibid. p. 214.

Ihering, H. von (1). Historia de las Ostras Argentinas. — In: An. Mus. Buenos Aires vol. 7 p. 109—123.

— (2). On the Molluscan Fauna of the Patagonian Tertiary. — In: Pr. Amer. Phil. Soc. vol. 41 p. 132—137, pl. 19.

— (3). Die Photinula-Arten der Magellan-Strasse. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34 p. 97—104.

— (4). Zur Systematik der Gattung *Solaropsis*. — Ibid. p. 179—180.

Jameson, H. L. On the Origin of Pearls. — In: Pr. zool. Soc. London, 1901 p. 140—166, pl. 14—17 u. Textfig.

- Jarvis, P. W.** (1). Notes on the distribution of the Pleurodonte acuta group. — In: *Nautilus*, vol. XV p. 137—141, mit Karte.
 — (2). Note on the distribution of the Pleurodonte sinuata group. — In: *Nautilus*, vol. XVI p. 1—4, mit Karte.
- Jensen, A. S.** (1). Studier over nordiska Mollusker. II. *Cyprina islandica*. — In: *Vid. Medd.* 1902 p. 33—42.
 — (2). Fortegnelse over Skaller af bivalve Grundvandmollusker fra store Havdyb mellem Jan Mayen eg Islands. — *Ibid.* p. 43—46.
- Johannsen, A. C.** (1). Einige Bemerkungen über Assiminea grayana und die Molluskenfauna des Furesös. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.* 1902 p. 162—166.
 — (2). Om Aflejeringen af Molluskernes Skaller i Indser og i Hafvet. — In: *Vid. Medd.* 1901 p. 5—46.
 — (3). On the Mollusca between tide-marks at the coasts of Iceland. — *Ibid.* 1902 p. 385—392.
 — (4). On the hypotheses of the sinking of sea-beds, based on the occurrence of dead shallow-water shells at great depths in the Sea. — *Ibid.* p. 393—435.
- Johnson, J. P.** Additions to the Palaeolithic Fauna of the Uphill Brickyard, Ilford, Essex. — In: *Essex Naturalist* vol. XI p. 209—212.
- Joubin, L.** (1). Observations sur divers Cephalopodes: sur une nouvelle espèce du genre *Rossia*. — In: *Bull. Soc. zool. France*, vol. 27 p. 138—143, fig.
 — (2). Revision des Sepiolidae. — In: *Mém. Soc. zool. France* vol. 15 p. 80—144, avec 38 figs.
- Kellog, J. L.** Clam and Scallop industries of New York State. — In: *Bull. New York Museum*, VIII p. 605—631, mit Karte.
- Kennard, A. S. & B. B. Woodward.** (1). On the non-marine Mollusca from the Holocene Deposits at London Wall and Westminster. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. 5 p. 180—182.
 — (2). The Postpliocene non marine Mollusca of Ilford, Essex. — In: *Essex Naturaliste*, vol. XI p. 213—215.
 — (3). The non-marine Mollusca of the Walton Crag. — *Ibid.* p. 216—218.
 — (4). Notes on the Mollusc *Paludestrina jenkinsi*, Smith, in Essex and elsewhere. — *Ibid.* p. 288—291, Textfig.
- Kenyon, A.** (1). Further Note on the Type-specimen of *Voluta roadnightae* Mc Coy. — In: *Pr. mal. Soc. London* vol. 5 p. 10.
 — (2). Some undescribed varieties of *Cypraea*. — In: *J. of Conch. Leeds* vol. 10 p. 183, 184.
- Kershaw, J. A.** Notes on the Argonauts. — In: *Victorian Naturalist* vol. 10 p. 28—32.
- Kesteven, H. L.** (1). The systematic position of the genus *Fossarina* Ad. & Ang., and of *F. varia* Hutton. — In: *Rec. Austral. Mus.* vol. 4 p. 317—322, Textfig.
 — (2). The systematic position of *Purpura tritoniformis* of Blainville. — In: *Pr. Linn. Soc. S. Wales* vol. 26 p. 533—538, pl. 29.

— (3). The Protoconchs of certain Port Jackson Gastropods.
— Ibid. p. 709—716, t. 35, 36.

— (4). A note on two species of Astralium from Port Jackson. Ibid. vol. 27, p. 2—6, Textfig.

— (5). Notes on Prosobranchiata, Nr. 1. Lotorium. Ibid. p. 443—483, pl. 17.

— (6). Sixteen Species of Rissoidae from Queensland new to the State. — Ibid. p. 206.

Kew, H. W. Lincolnshire Non-marine Mollusca. — In: Naturalist, 1902, p. 261—270.

Knipowitsch, N. M. Zoologische Ergebnisse der Russischen Expeditionen nach Spitzbergen. Mollusca und Brachiopoda. I. Ueber die in den Jahren 1899—1900 im Gebiete von Spitzbergen gesammelten recenten Mollusken und Brachiopoden. In: Annuaire Mus. St. Petersbourg vol. VI, p. 435—558, pl. 18 u. 19.

Kobelt, W. Iconographie der schalentragenden europaeischen Meeresconchylien. Vol. III, Lfg. 1 (=16) p. 1—24, t. 59—62.

— (2). *Campylaea cingulata* bei Lugano. In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34, p. 104.

— (3). Cyclophoridae, in: das Thierreich, 16. Liefg., Mollusca. Berlin 8°. — XXXIX u. 662 S. mit Textfiguren und Karte.

— (4). Rossmaesslers Iconographie, N. Folge, vol. IX, Lfg. 5 u. 6, mit t. 261—270.

— (5). Vide Martini & Chemnitz.

— (6). Vide Moellendorff & Kobelt.

Lebour, M. V. Marine Mollusca of Sandsend, Yorkshire. In: Naturalist 1902, p. 171—176.

Licherdopol, —. Fragments de la faune malacologique des departements d'Ilfov, de Vlascha, et de Teleorman. — In: Bull. Soc. Bucarest vol. 10, p. 508—574; vol. 11, p. 347—365.

Lindholm, W. Einige für die Fauna des St. Petersburger Gouvernemente neue Binnenmollusken. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34, p. 208—211.

List, Th. Die Mytiliden. — In: Fauna u. Flora Golf Neapel, Monogr. 27. 312 S. mit 22 Tafeln.

Locard, A. Observations sur les Mollusques testacés marins des côtes de Corse. — In: CR. Assoc. Franc. 1901, II, p. 618—626.

— (2). Description de Mollusques nouveaux appartenant à la Faune souterraine de France et de l'Italie. — In: Bull. Mus. Paris VIII, p. 608—621, avec figs.

— (3). Faunule malacologique des sables quaternaires de l'étang de Capestang (Hérault). — In: Bull. Soc. Beziers vol. XXII, p. 27—40.

— (4). Notices conchyliologiques LVI; Sur la classification des Rissoidae du système européen. In: Echange XVII, p. 5, 11; — LVII. Les Ptéropodes testacés des mers d'Europe. Ibid. p. 67, 74.

— (5). Description d'une nouvelle espèce de Lartetia. — In: Bull. Soc. Nîmes vol. 29, p. 10—13, Textfig.

Loppens, K. Petricola pholadiformis L. — In: Ann. Soc. malac. Belgique vol. 37, Bull. p. XLI u. XLII. —

Luther, A. Ueber eine Clausilia aus Finland. — In: Medd. Soc. Faun. Fenn. vol. XXVII, p. 104—106, mit Textfiguren.

Margier, E. Un Mollusque terrestre à grande dispersion. Pupa (Lauria) cylindracea da Costa, (P. umbilicata Drap.). — In: Feuille jeunes Natural. Année 32, p. 49 u. 50.

Marsh, W. A. Description of a new *Unio (andrewsii)* from Tennessee. In: Nautilus, vol. 15, p. 115, 116.

— (2). Description of a new *Unio (beauchampi)* from Tennessee. In: Nautilus, vol. 16, p. 7, t. 1.

Marshall, J. T. Tapes geographicus and Tapes pullastra. — In: I. Conch. Leeds vol. X, p. 166, 167.

— (2). Additions to „British Conchology“. — Ibid. p. 190—193.

— (3). Notes on the British Species of Buccinum, Fusus etc. In: J. Mal. vol. IX, p. 35—50.

Martens, Ed. von. Neue Unioniden aus Tonkin und Annam. In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34, p. 130—135.

— (2). Die Mollusken (Conchylien) und die übrigen wirbellosen Thiere in Rumpf's Rariteitkammer. — In: Rumphius Gedenkboek. Haarlem 1902, S. 109—136.

— (3). Das neue Auftreten der *Helix obvia* Mke. (candidans Pfr.). — In: Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1902, p. 45—46.

— (4). Einige Schnecken der Cocos-Insel. Ibid. p. 59—62.

— (5). Die geographische Verbreitung von Pomatias septemspiralis Raz. (maculatus Drp.). — Ibid. p. 62—73 und Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34, p. 166—172.

— (6). Die Meeres-Conchylien der Cocos-Insel. — Ibid. p. 137—141.

— (7). Eine für die Provinz Brandenburg neue Süßwasserschnecke, *Physa acuta* Drp. — Ibid. p. 166—168.

— (8). Einige neue Arten von Meer-Conchylien aus den Sammlungen der deutschen Tiefsee-Expedition. — Ibid. p. 237—244.

Martini & Chemnitz. Systematisches Conchylien-Cabinet, Neue Auflage. Lfg. 469—478. — Enthält: Buliminidae, Cyclostomacea, Naninidae und Helix von Kobelt; — Pyramidellidae & Eulimidae von Clessin; — Pleurotomariidae von Schmalz.

Masefield, J. R. B. The Land- and Freshwater Mollusca of Staffordshire. — In: Report North Staffordshire Club, vol. 36, p. 45—64.

Mayer, A. G. Some species of *Partula* from Tahiti. A Study in variation. — In: Mem. Mus. Harvard vol. 26, p. 117—135, with pl.

Mayfield, A. The Mollusca of a Suffolk Parish (Mendlesham). In: Norfolk Soc. vol. VII, p. 348—352.

Meisenheimer, J. Ueber eine neue Familie der gymnosomen Pteropoden aus dem Material der deutschen Tiefsee-Expedition (Pteroceaniden). In: Zool. Anzeiger vol. 26, p. 92—96, mit 2 Textfiguren.

Milthers, V. & Nordmann, V. Ueber einige intraglaziale Süßwassermollusken der Umgegend von Posen. In: Zeitschr. D. geolog. Gesellschaft vol. 54, Mitth. p. 39—42.

Moellendorff, O. F. von. Synopsis Molluscorum in regione palaearctica viventium ex typo *Clausilia* Drp., auctore Dr. C. Ag. Westerlund (Besprechung). — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34, p. 48—52.

— (2). Binnenmollusken aus Hinterindien. 1. Landschnecken aus Kelantan, Ostküste der Halbinsel Malacca. — 2. Neue Arten und Unterarten von Fruhstorfer in Siam gesammelt. — 3. Binnenmollusken aus Siam. — Ibid. p. 135—149 u. 153—162.

— (3). Diagnosen neuer Naniniden aus Hinterindien. Ibid. p. 178.

— (4). Binnenmollusken aus Niederländisch Indien. Ibid. p. 185—207.

— (5). Landmollusken. Ergänzungen und Berichtigungen zu Band III von Sempers Reisen im Archipel der Philippinen. Wissenschaftliche Resultate, Bd. VIII, p. 147—224, t. 14—25.

— (6). On some questions of Malacological Nomenclature. — In: Ann. nat. Hist. ser. 7, vol. 9, p. 120—124.

Moellendorff, O. F. von & W. Kobelt. Diagnose einer neuen Achatina. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. vol. 34, p. 180.

Morse, E. S. *Pholas truncata* in Salem Harbour. — In: Nautilus vol. XVI, p. 8.

Naegele, G. Einige Neuheiten aus Vorderasien. In: Nachrbl. D. mal. Ges. v. 34 p. 1.

Newton, R. B. On the adoption of Roveretos Cypriniadea for Arctica of Schumacher. — In: J. Conch. Leeds vol. X, p. 196, 243.

Nordenskiöld, E. Oesteryöns nutida sötvattensmollusk-fauna jämförd med Aencylusjöns. — Bih. Svensk. Akad. vol. 26, ad. 4, no. 11, 13 S., 2 Taf.

Norman, A. M. Notes on the Natural History of East Finland. — In: Ann. nat. Hist. ser. 7, vol. 10, p. 341—361.

Noter, R. l'Escargot. Son histoire, ses moeurs, son élevage etc. Paris 1902 avec figs.

Nylander, O. O. The original locality of *Limnaea ampla*, Michels. In: Nautilus vol. XV, p. 127—129.

Orcutt, C. R. Shells of Western Lakes and Streams. — In: West American Scientist vol. 12, p. 33—40.

— (2). West American Mollusca. Ibid. p. 67, 86, 105—108.

Ostroumov, Cl. A. (Résultats d'une excursion Zoologique dans la mer d'Azow au bord du bateau „Ljedokol Donskieh, Gul“

du 10—20. Mai 1900. Livr. III. Liste des Mollusques récueillis pendant l'excursion). In: Ann. Mus. St. Petersbourg, Année VI, p. 621—625.

Overton, H. On a malformed variety of *Limnaea pereger* Müll. In: J. Mal. vol. IX, p. 64, fig.

Pace, S. On the Anatomy and relationship of *Voluta musica*, L.; with notes upon certain other supposed members of the Volutidae. — In: Pr. mal. Soc. London vol. 5, p. 21—31, pl. 2.

— (2). Contributions to the Study of the Columbellidae, No. 1. Ibid. p. 36—154.

— (3). On the identity and relationships of *Buccinum dermestoideum* Lam. — *Pseudamycla* n. gen. — Ibid. p. 253—257, mit Textfig.

— (4). Critical notes on Herviers Monograph of the Columbellidae of New Caledonia, with *C. hervieri* nom. nov. In: J. de Conch. vol. 50, p. 412—422.

Pallary, P. Liste des Mollusques de la baie de Tanger. — In: J. de Conchyl. vol. 50, p. 1—39, pl. 1.

Pannel, C. The Land- and Freshwater Mollusca of Surrey, with the localities where the species and varieties have been found. — In: J. Conch. Leeds, vol. X. p. 168—179.

Pilsbry, H. A. New land Mollusca from Japan and the Bonin Islands. — In: Pr. Ac. Philad. 1902, p. 25—32.

— (2). Revision of Japanese Viviparidae, with notes on *Melania* and *Bithynia*. — Ibid. p. 115—121, pl. 9.

— (3). On the localities of A. Adams Japanese Helicidae. Ibid. p. 233—240.

— (4). Additions to the Japanese Land-Snail Fauna VI. Ibid. p. 360—382, t. 17—19. — VII. Ibid. p. 517—533, t. 27, 28.

— (5). South-western Landsnails. — Ibid. p. 510—512.

— (6). New Land-Mollusca from Idaho. — Ibid. p. 593.

— (7). Notices of new Japanese Land Shells. — In: Nautilus vol. XV, p. 116—119.

— (8). *Truncatella subcylindrica* Linnaeus. — Ibid. p. 119, 120.

— (9). Notices of new Landshells of the Japanese Empire. Ibid. p. 141, 142.

— (10). Notices of new Landshells of the Japanese Empire. In: Nautilus vol. XVI, p. 4—7, 21, 22, 45—47, 53—57.

— (11). New American land shells. — Ibid. p. 30—33.

— (12). A new Floridian Helicina. Ibid. p. 53.

— (13). „Pyramidula“ elrodi and *Epiphramphophora circumcarinata*. — Ibid. p. 62, 63.

— (14). Tryons Manual, Second Series vol. XIV u. XV and Index to vols. X—XIV.

Pilsbry, H. A. & Clapp, G. H. New land shells from the Santa Marta Mountains, Columbia. — In: Nautilus, vol. XV, p. 133—137, pl. VII.

Pilsbry, H. A. & Gulick, A. List of land Mollusca from the neighbourhood of Sapporo, Yesso. — In: *Nautilus*, vol. 16, p. 68, 69.

Pilsbry, H. A. & Hirase, Y. Notices on new Japanese Land Snails. *Ibid.* p. 75—80.

Pilsbry, H. A. & E. G. Vanatta. Papers from the Hopkins Stanford Galapagos Expedition 1898—1899. — XIII. Marine Mollusca. In: *Pr. Ac. Washington*, vol. 4, 549—560, pl. 35.

— (2). Vide Walker & Pilsbry.

Pottier, R. Les huîtres comestibles et l'ostréiculture. Paris 8^e. 1902. — 288 p. avec figs.

Preston, H. B. New species of land shells from New Guinea. — In: *Pr. mal. Soc. London* vol. 5, p. 17—19, Textfig.

Pritchard, G. B. & J. H. Gatliff. Catalogue of the Marine Shells of Victoria. Part V. — In: *Pr. Soc. Victoria* vol. 14, p. 85—138.

— (2). On some new species of Victorian Mollusca. — *Ibid.* p. 180—184, pl. 9 u. 10.

Rivers, J. J. Pandora Kennerlia grandis Dall. — In: *Bull. South California Ac.*, vol. 1, p. 9, with fig.

Rolle, H. Neue Landschnecken. In: *Nachrbl. D. mal. Ges.* vol. 34, p. 211, 212.

Rope, G. T. Duration of Life in *Helix pomatia*. — In: *Zoologist*, 1902, p. 151.

Rossmaessler, E. A. Vide Kobelt.

Rowell, J. A new *Helix* from California. — In: *Nautilus* vol. XVI, p. 52.

Schepman, M. M. Description of a new species of *Nerita*. — In: *Notes Leyden Museum*, vol. 23, p. 63, 64 mit Textfig.

Schmalz, C. Vide Martini & Chemnitz.

Shopland, E. R. List of marine shells collected in the neighbourhood of Aden between 1892 and 1901. — In: *Pr. mal. Soc. London* vol. V, p. 171—179, 184.

Simpson, C. T. A new *Najad* from New Zealand. In: *Nautilus* vol. XVI, p. 30.

Simroth, H. Ueber Gebiete kontinuierlichen Lebens und über die Entstehung der Gastropoden. In: *Biol. Centralblatt* vol. XXII, p. 239—256, 262—278.

— (2). Ueber einige kürzlich beschriebene neue Nacktschnecken, ein Wort zur Aufklärung systematischer Verwirrung. In: *Anatom. Anzeiger*, vol. 25, p. 355—357.

— (3). Ueber die Ernährung der Thiere und der Weichtiere im Besonderen. — In: *Congr. Zool.* 1901, p. 777—784, mit Textfig.

Smith, B. Phylogeny of the Species of *Fulgur* with remarks on an abnormal form of *Fulgur canaliculatum*, and Sexual-Dimorphism in *Fulgur carica*. — In: *Pr. Ac. Philadelphia*, p. 505—507.

Smith, Edg. A. Mollusca, in: Report Coll. Nat. History made in the Antarctic Region during the Voyage of the Southern Cross, London 1902, p. 201—213, pl. 24, 25.

— (2). On the supposed similarity between the Mollusca of the Arctic and Antarctic Regions. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 102—166.

— (3). Note on *Cypraea microdon* Gray. — Ibid. p. 167, 168.

— (4). Description of *Achatina machachensis* n. sp. from Basuto-Land. — Ibid. p. 169, Textfig.

— (5). On *Corona pfeifferi* var. *gracilis* n. var. from S. E. Columbia. Ibid. p. 370, Textfig.

— (6). Descriptions of new species of marine shells from South Africa. — In: J. Conch. Leeds vol. 10, p. 248—251, pl. 4.

— (7). Land molluscs from Uganda. — In: Johnston, the Uganda Protectorate, p. 443—453. — London 1902.

Smith, H. H. An annotated catalogue of shells of the genus *Partula* in the Carnegie Museum. — In: Ann. Carnegie Mus. I, p. 422—485.

Soelner, G. W. H. *Vitreola draparnaldi* Beck, in Washington DC. In: Nautilus vol. XVI, p. 94, 95.

Somerville, A. The Conchology of the Clyde, geographical and biological. In: J. Conch. Leeds vol. X, p. 137—141.

Sowerby, G. B. Mollusca of South Africa, Cape Town 1902, p. 93—100, pl. 2.

— (2). Note on the Opercula of *Turbo pulcher* Reeve and *T. ticaonicus* Reeve. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 12.

Springer, A. On some living and fossil snails of the Genus *Physa* found at Las Vegas, New Mexico. In: Pr. Ac. Philadelphia, p. 513—516.

Stearns, R. E. C. The Fossil Fresh-Water Shells, their Distribution, Environment and Variation. — In: Pr. U. St. Nat. Mus. vol. XXIV, p. 279—299, pl. XIX—XXIV.

— (2). *Helix* var. *circumcarinata* and *Pyramidula elrodi*. — In: Nautilus, vol. XVI, p. 61, 62.

— (3). „*Pyramidula*“ *elrodi* and *Epiphramphora circumcari-nata*. — Ibid. p. 83, 84.

Sterki, V. *Pisidium strengi* n. sp. — In: Nautilus, vol. XV, p. 126.

— (2). Some notes on the North-American Cycladinae, with new species. Ibid. vol. XVI, p. 89—93.

— (3). Some additions and corrections to the list of land- and freshwater Mollusca of Tuscarawas Co., Ohio. — In: Ohio Naturalist vol. 2, p. 286.

Steusloff, U. Xerophile Heliceen im Osten Mecklenburgs. — In: Archiv Ver. Mecklenburg vol. 55, p. 176—179.

Sturany, R. Ueber die Verbreitung von *Cylindrus obtusus* Drp. — In: Nachrbl. D. malak. Ges. 1892, vol. 24, p. 9—13.

— (2). Ueber eine neue Höhlenschnecke (*Spelaeoconcha*).
Ibid. p. 13—15 u. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, vol. 51, p. 761, mit
Textfig.

— (3). Mittheilungen über Gehäuseschnecken aus dem Peloponnes. — In: Verh. Zool. bot. Ges. Wien, vol. 52, p. 402—409, mit
Textfig.

— (4). Diagnosen neuer Landschnecken aus der Hercegovina.
In: Ann. Hofmus. Wien, XVI, Notizen p. 65—67.

— (5). Neue Inselformen dalmatinischer Landschnecken. Ibid.
p. 68, 69, Textfig.

— (6). Eine neue Ennea aus Südafrika. Ibid. p. 69, Textfig.

Suter, H. Description of new species of *Separatista* from
New Zealand. — In: J. Malac. vol. IX, p. 65, Textfig.

— (2). Observations concernant les „*Considérations sur les faunes malacologiques des parties australes du globe*“ par M. C. Ancey. — In: J. Conchyl. vol. 49, p. 316—321.

— (3). On the Land Mollusca of Little Barrier Island. — In:
Trans. New Zealand Inst. vol. 34, p. 204—206.

— (4). List of the Species, described in F. W. Huttons Manual
of the New Zealand Mollusca, with the corresponding names used
at the present time. — Ibid. p. 207—224.

Swanton, E. W. South African notes. — In: J. Conch. Leeds
vol. X, p. 194.

— (2). South African Jottings. — In: Naturalist. Journal,
vol. 11, p. 155—158.

Sykes, E. R. On *Helicina pterophora* n. sp. from Guatemala.
In: Pr. mal. Soc. London vol. 5, p. 20, Textfig.

— (2). Note on Tonkinese *Clausiliae*, with illustrations of
some unfigured species, and the descriptions of a new species. Ibid.
p. 189—193, pl. 3.

— (3). On a Collection of non marine shells, formed by Mr.
J. J. Walker, in the New Hebrides. Ibid. p. 196—200, mit Textfig.

— (4). Descriptions of six new land shells from the Malay
Peninsula. — In: J. Mal. vol. IX, p. 22—23.

— (5). On a collection of land- and freshwater shells from
Kelantan, Malay Peninsula. — Ibid. p. 60—63, pl. III.

Taylor, J. W. Monograph of the Land- and Freshwater
Mollusca of the British Isles. Part VIII. Leeds 1902. With
pl. 1—5 u. Figs.

Tryon. Vide Pilsbry.

Vanatta, E. G. List of Land shells collected in the Sacramento
Mountains, New Mexico. — In: Nutilus, vol. XVI, p. 57, 58.

— (2). Vide Pilsbry & Vanatta.

Vayssiére, A. Sur les Opisthobranches recueillis en 1883
par l'expédition du Talisman. — In: CR. Ac. Sciences vol. 134,
p. 296, 297.

— (2). Expéditions scientifiques du „Travailleur“ et du
Talisman. — Paris 1902. Opisthobranches p. 221—250, pl. 9—11.

- Vendryes, H.** A new species and subspecies of Jamaican Pleurodonte. — In: *Nautilus* vol. 15, p. 101, 102, pl. 9—11.
- Wagner, A.** Neue Formen und Fundorte des Genus *Pomatias*, Stud. — In: *Ann. Hofmus. Wien* vol. XVI Notizen, p. 63—65.
- Walker, B.** A revision of the carinate Valvatas of the United States. — In: *Nautilus*, vol. 15, p. 121—125, with figs.
- Walker, B. & Pilsbry, H. A.** The Mollusca of the Mt. Mitchell Region, North Carolina. — In: *Pr. Ac. Philad.* 1902, p. 413—442, pl. 24 u. 25.
- (2). Vide Wright & Walker.
- Webb, W. M.** Landshells used as models by ancient Peruvian Potters. — In: *Pr. Mal. Soc. London*, vol. 5, p. 160, 161, Textfig.
- (2). Pleistocene non-marine Mollusca from Clacton-on-Sea, Essex. — In: *Essex Naturalist*, vol. XI, p. 225—227.
- Welch, R.** Scalariform *Helix nemoralis*. — In: *J. Conch. Leeds*, vol. X, p. 243—245, with pl. 2.
- Westerlund, C. A.** Malacologische Bemerkungen und Beschreibungen. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.*, vol. 34, p. 19—26, 35—47.
- (2). Descripciones de Moluscos nuevos de España. — In: *Bol. Soc. españ.*, vol. II, p. 236—239.
- Whiteaves, J. F.** Notes on some freshwater and land shells from Keewatin, Northern Ontario and British Columbia. — In: *Ottawa Naturalist*, vol. XVI, p. 91—93.
- Wiedermayer, L.** Die Conchylien des Thales Kartitsch. — *Zeitschr. Ferdinandeum Tirol*, III. Folge, Heft 44.
- Williamson, M. B.** A Monograph on *Pecten aequisulcatus* Carp. — In: *Bull. South Calif. Acad.*, vol. I, p. 51—65, pl. 4 u. Textfig.
- Winkley, H. W.** New England marine collecting. — In: *Nautilus*, vol. 16, p. 14, 15.
- Wittich, E.** Diluviale und recente Conchylienfaunen der Darmstädter Gegend. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.*, vol. 34, p. 301—302.
- Woodruffe-Peacock, E. A.** Drift Shells from the River Ancholine, in Codney Parish, Linc. — In: *Naturalist* 1902, p. 138.
- Woodward, B. B.** *Acanthinula lamellata* (Jeffr.) in Buckinghamshire and Berkshire. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. 5, p. 11.
- (2). *Clausilia bimaculata* (Mont.) in Hertfordshire. — *Ibid.* p. 11.
- (3). A final note on *Tapes geographicus*. — In: *J. Conch. Leeds*, vol. 10, p. 167.
- (4). Vide Kennard & Woodward.
- Wright, B. H. & Walker, B.** Check List of North American Najades. Detroit 1902, 8°. 19 S.

Jahrgang 1903.

- Ancey, C. F.** Nouvelles remarques sur les faunes australes du globe. — In: J. de Conchyl., vol. 51, p. 39—47.
 — (2). Faune malacologique terrestre de l'île de Cocos dans l'Océan pacifique. Ibid. p. 97—104.
 — (3). On some new Land Mollusca from Middle America. — In: Nautilus, vol. 17, p. 56, 57.
 — (4). New land snails from South America. Ibid. p. 82, 89.
- Baker, F. C.** Shell collecting on the Mississippi. — In: Nautilus, vol. XVI, p. 102—105.
 — (2). Pleistocene Mollusks of White Pond, New Jersey. — Ibid. vol. XVII, p. 38—39.
 — (3). A partial List of the Marine Mollusks of San Salvador, Bahamas. — Ibid. p. 57.
 — (4). Note on *Murex marcöensis* Sowerby. — Ibid. p. 88, 89.
 — (5). Rib Variation in *Cardium*. — In: American Naturalist vol. 37, p. 481—488.
- Baldwin, D. D.** Descriptions of new species of Achatinellidae from the Hawaian Island. — In: Nautilus, vol. 17, p. 34—36.
- Bartsch, P.** A new Scissurella from Patagonia. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 90, 91.
 — (2). A new Landshell from California. — In: Pr. Soc. Washington, XVI, p. 103, 104.
- Bavay, A.** Au sujet d'un petit groupe de Mollusques pulmonés terrestres operculés, pourvus d'un canal aéritif logé dans le test. — In: Bull. Soc. zool. France, vol. 28, p. 140—143.
- Bavay, A. & Ph. Dautzenberg.** Description de Coquilles nouvelles de l'Indo-Chine. — In: J. de Conch., vol. 51, p. 201—236, p. 7—11.
- Bellini, R.** J Molluschi del Lago Fusaro e del Mar Morto dei Campi Flegrei. — In: Boll. Soc. Napoli, vol. XVI, p. 20—27, Texfig.
 — (2). Notizie sulle formazioni fossilifere neogeniche recenti della regione vulcanica napoletana e malacofauna del Monte Somma. — Ibid. vol. XVII, p. 1—17, con figg.
- (3). La Mitra zonata Marryat nella fauna malacologica di Capri. Ibid. p. 219—220.
- Bigelow, B. P. & E. P. Rathbun.** On the shell of *Littorina litorea* as material for the study of variation. — In: American Naturalist, vol. 37, p. 171—184.
- Billups, A. C.** Adaptation of Mollusks to changed conditions. In: Nautilus, vol. XVI, p. 112—114.
 — (2). The land-shells of Calhoun Falls, S. C. — Ibid. p. 125—128.
 — (3). A proposed study of *Goniobasis*. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 22—24.

- Blackburn, E. P.** Dispersal of shells by beetles. — In: Trans. Hull Club, vol. 3, p. 101.
- Blanford, W. T.** Notes on Mr. W. M. Daly's collections of land- and fresh-water Mollusca from Siam. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 274—284, pl. VIII.
- Caziot, E.** Etude sur la faune des Mollusques vivants terrestres et fluviatiles de l'île de Corse. — In: Bull. Soc. Corse, Année 23. — Bastia 354 S. 2 Taf. (Sep. datirt 1902).
- (2). Etude sur quelques coquilles de la region Circa-méditerranéenne; *Helix niciensis*. Etude des espèces du groupe. — In: Feuille jeunes Natural, vol. 34, p. 10—13, 35.
- (3). Complément à l'étude de la Faune Corse. — In: Mem. Soc. Zool. France 1903, p. 33—40. Avec figs.
- Chadwick, W. H.** Self-Fecundation in *Planorbis vortex*. — In: J. Conch. Leeds, vol. 10, p. 265.
- Chaster, G. W.** Mollusca. — In: Brit. Assoc. Handbook to Southport 1903, p. 146—154.
- Chaster, G. W. & B. Tomlin.** The rediscovery of *Vertigo lilljeborgi* in Ireland. — In: Irish Naturalist, vol. 12, p. 13 u. 14.
- Chun, Carl.** Rhynchoteuthis. Eine merkwürdige Jugendform von Cephalopoden. — In: Zoolog. Anzeiger, vol. XXVI, p. 716—717, mit Textfig.
- (2). Ueber Leuchttorgane und Augen von Tiefsee-Cephalopoden. — In: Verh. D. zool. Ges., vol. 13, p. 67—82.
- Clapp, G. H.** Vitrina depositing eggs. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 252.
- Clessin, S.** Vide Martini & Chemnitz.
- Cockerell, T. D. A.** Variation in the Snail-Genus *Ashmunella*. — In: Pr. Ac. Philad. p. 615, 616.
- (2). Note on *Tritonia palmeri* Cooper 1882. — In: Nautilus, vol. 16, p. 117.
- (3). Some homonymous generic names. — Ibid. p. 118.
- (4). The name *Solenopsis*. — In: Nature, vol. 67, p. 559.
- Collinge, W. E.** Some notes on the genus *Prisma*, Srth. — In: J. Mal. IX, p. 129—132, pl. 9.
- (2). Further Notes on *Amalia carinata* Risso. — Ibid. p. 132, 133.
- (3). On some species of slugs, collected by Mr. H. Fruhstorfer. — In: J. Malac. X, p. 16, 17, pl. I.
- (4). Notes on slugs and sluglike Mollusca. — 1. On the *Limax umbrosus* of Philippi. — 2. On a species of *Arion* from New Zealand. — 3. On the dispersal of *Microparmarion* sp. — 4. Variations in the Foot-fringe of *Arion empiricorum*. — Ibid. p. 17—19.
- (5). Contributions to a knowledge of the Mollusca of Borneo. — Ibid. p. 79—82, pl. VII u. VIII.
- (6). Report on the non-operculate land Mollusca (from the Malay Peninsula). — In: Annandale & Robinson, Fasciculi Malayenses, Zoology, II, p. 205—218, pl. XI—XIII.

Cort, H. de. Ueber den Handelswerth und den Grad der augenblicklichen Seltenheit der Pleurotomaria beyrichi. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 14—16.

Cossmann, M. Essais de Paléoconchologie comparée. Livr. V. Paris. 215 S., 9 Taf.

— (2). Rectifications de Nomenclature. — In: Revue paleozool., vol. VII, p. 67, 128, 227.

Crowther, J. E. A list of the Mollusca of the Parish of Halifax. — In: Halifax Naturalist, vol. 8, p. 48—52.

Csiki, E. Drei neue ungarische Clausiliens. In: Ann. Mus. nat. Hungarici I, 1903, p. 107.

Dall, W. H. Contributions to the Tertiary Fauna of Florida, with especial reference to the Silex Beds of Tampa and the Pliocene Beds of the Caloosahatchie River, including in many cases a complete Revision of the generic groups treated of and their American Tertiary species. — Part VI (Schluss). — In: Transact. Wagn. Inst. III, p. 1219—1654, pl. 48—60.

— (2). Synopsis of the family Astartidae, with a Review of the American Species. — In: Pr. U. S. Nat. Mus., vol. 26, p. 933—951, pl. 62 u. 63.

— (3). A new Crassatellites from Brazil. — In: Nautilus, vol. 16, p. 111.

— (4). Hawaiian Physidae. Ibid. p. 106.

— (5). Two new Mollusks from the West Coast of American.

— In: Nautilus, vol. 17, p. 37.

— (6). A new Species of Metzgeria. — Ibid. p. 51.

— (7). Note on the family Septidae. — Ibid. p. 55.

— (8). A new genus of Trochidae. — Ibid. p. 61.

— (9). Diagnoses of new species of Molluscs from the Santa Barbara Channel, California. — In: Pr. Soc. Washington, vol. 16, p. 171—176.

— (10). Review of the Classification of the Cyrenacea. Ibid. p. 5—8.

Daniels, L. E. A check list of Indiana Mollusca, with localities. — In: 27 Ann. Rep. Departm. Geol. Nat. Resources of Indiana.

Dautzenberg, Ph. Contribution à la faune malacologique terrestre et d'eau douce des îles Obi et Jolo. — In: J. de Conch., vol. 51, p. 1—20, pl. I.

Davenport, C. B. Quantitative studies in the evolution of Pecten. — III. Comparison of Pecten opercularis from three localities of the British Isles. — In: Pr. Amer. Ac., vol. 39, p. 123—159.

— (2). A comparison of some Pectens from the East and the West coasts of the United States. — In: Mark Anniversary Vol. New York 1903, p. 121—136.

Dubois, R. L'origine des perles chez le Mytilus galloprovincialis. — In: CR. Ac. Sci., vol. 136, p. 178, 179.

— (2). Sur l'acclimatation et la culture des Pentadines ou huîtres perlières vraies, sur les côtes de France et sur la production forcée des perles fines. *Ibid.* vol. 137, p. 611—613. — Cfr. id. *CR. Soc. Biol.*, vol. 55, p. 1208—1209.

Dudinsky, E. A festökagył (Unio pictorum) felemós héjavról. In: *Allatoni Kozlemeneyek* II, p. 233.

Dybowsky, W. Zur Kenntniss der ostsibirischen Land-schnecken. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.*, vol. 35, p. 7—10.

— (2). Fauna der Binnenmollusken Littauens. I. *Familia Cycladidae*, Clessin. — *Ibid.* p. 76—83.

— (3). Bemerkungen über die gegenwärtige Systematik der Süsswasserschnecken. *Ibid.* p. 130—145.

— (4). Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfanua Kamtschatkas. — In: *Annuaire Mus. St. Petersb.*, vol. 8, p. 40—55, mit Textfig.

Elliot, C. N. E. Notes on some new or little known members of the family Doridiidae. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. 5, p. 331 337, pl. XIII.

— (2). On some Nudibranchs from East Afrika and Zanzibar II. — In: *Pr. zool. Soc. London* 1903, p. 250—257.

— (3). Nudibranchiata, with some remarks on the Families and Genera, and description of a new genus Doridomorpha. — In: *Fauna and Geography of the Maldives and Laccadive Archipelagoes*, vol. II, p. 540—573, pl. 32. — Cambridge, 1903. 4°.

Elrod, M. J. Notes on *Pyramidula elrodi* Pilsbry. — In: *Nautilus*, vol. 16, p. 109—112, 144, 1 pl.

— (2). Montana Shells. *Pyramidula strigosa*. — In: *Nautilus* vol. 17, p. 1—6.

Farran, G. P. The Nudibranchiate Mollusca of Ballynakill, and Bofin Harbours, Co. Galway. — In: *Rep. Fish. Ireland for 1901*, part II, p. 123—132, p. 1—20.

Ferraz, J. As Perolas e a sua Pesca en Moçambique. — In: *Boll. Soc. Geogr. Lisboa.*, vol. 21, p. 1—20.

Frierson, L. S. The specific value of *Unio declivis*, Say. — In: *Nautilus*, vol. XVII, p. 49—51, pl. 3.

— (2). Notes on the byssus of Unionidae. *Ibid.* p. 76, 77.

Fulton, H. Figures and descriptions of supposed new species and varieties of Ennea, Macrochlamys, Cochlostyla, Strophocheilus (Borus), Odontostomus (Moricandia), Leptopoma, Cataulus, Coptocheilus, and Tropidophora. *J. Mal.* vol. X, p. 99—103, pl. IX.

— (2). Vide Sowerby & Fulton.

Garstang, W. & H. C. Sorby. Mollusca. In: *Victoria County History of Essex*, Mollusca, vol. I, p. 81—86.

Gatliff, J. H. Additions to the list of Victorian Marine Mollusca. — In: *Victorian Naturalist*, vol. 20, p. 89—91.

— (2). Vide Pritchard & Gatliff.

Geret, P. Variété nouvelle de Cypraea, provenant de la Nouvelle Calédonie. — In: *J. de Conch.*, vol. 51, p. 28.

Germain, L. Etude sur le Mollusques terrestres et fluviatiles vivants des environs d'Angers et du département de Maine-et-Loire. — In: Bull. Soc. Ouest France, vol. 3, p. 1—238.

Geyer, . Malakologische Streifzüge in Württemberg. — In: Jahresber. Ver. Württemberg, vol. 59, p. 315—324.

Giard, A. L'origine parasitaire des perles d'après les recherches de M. G. Seurat. — In: CR. Soc. Biol., vol. 55, p. 1222—1228, cave fig.

— (2). Sur la productio olontaire des perles fines ou margarose artificielle. — Ibid. p. 125, 1226.

— (3). Curieuse station de *Theodoxia fluviatilis* L. — In: Feuille jeunes Naturalistes, vol. 33, p. 223.

Godwin-Austen, H. H. On the Anatomy of two Land Molluscs (*Helicarion* (?) *willeyana* and *H.* (?) *woodwardi* new species) from New Britain and Lifu, Loyalty Islands, collected by Dr. Arthur Willey, F. R. S., in 1895—1897. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 296—299, pl. IX.

— (2). Further Description of the Animal of *Damayantia carinata* Collinge, showing its similarity to *D. smithi*, Collinge & G. Austen, with remarks on this genus of Issel, Collingea of Simroth, and Isselentia of Collinge. — Ibid. p. 311—316, pl. XI.

— (3). Morphological observations on species belonging to the families Cyclostomidae and Helicidae. — In: The Natural History of Sokotra and Abd-el-Kuri, edited by H. O. Forbes, p. 159—174, pl. XIII a.

Grabau, A. W. Studies of Gastropoda. II. Fulgor and Sycotypus. — In: American Naturalist, vol. 37, p. 515—540.

Granger, A. Revision des espèces francaises du Genre *Helix*. — In: Actes Soc. Bordeaux, vol. 8, p. 1—60

Gredler, V. Conchyliologisches aus dem Lagerthal. — In: Zeitschr. Ferd. Tirol, vol. 46, p. 285—288.

Grierson, P. H. Notes on the Mollusca of County Kilkenny. — In: Irish Naturalist, vol. 12, p. 307—311.

Gude, G. K. Descriptions of some new forms of Helicoid Landshells. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 262—266, pl. VII.

— (2). Additions to the genus *Streptaxis*. — Ibid. p. 322—327, pl. XII.

— (3). A classified List of the Helicoid Land Shells of Asia. — In: J. Mal. vol. 10, p. 5—16, 45—62, 83—89, 129—136, pl. III.

Hedley, Ch. Studies on Australian Mollusca VII. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. 27, p. 596—619, pl. 29, 31—33.

— (2). Scientific Results of the trawling expedition of H. M. C. S. „*Thetis*“ of the Coast of New South Wales in February and March 1898. Mollusca, Part. II. Scaphopoda and Gastropoda. — In: Mem. Austral. Museum, vol. IV, p. 327—402, with pl. 36—38 and figs.

— (3). Notes on the Zoology of Paanopa or Ocean Island, and Nouru or Pleasant Island, Gilbert Group. The Mollusca. — In: Rec. Austral. Mus., vol. 5, p. 4, 5.

— (4). The effect of the Bassian Isthmus upon the existing marine fauna; a study in ancient geography. With map. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1903, part IV.

Herdmann, W. A. The Pearl Fisheries of Ceylon. — In: Nature, vol. 68, p. 620—622.

— (2). The Pearl Oyster Parasite in Ceylon. — Ibid. vol. 69, p. 126.

— (3). Pearl Oyster Report. — In: Report of the Government of Ceylon on the Pearl Oyster Fisheries of the Gulf of Manaar. Part I, London, 4°.

Hey, W. C. Shore collecting near Scarborough and Filey. — In: Naturalist 1903, p. 344—348.

Hidalgo, J. G. Obras malacologicas. Entrega 6. 400 S. u. 30 Taf. Madrid 1903.

Hinkley, A. A. A proposed study of Goniobasis. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 32—34.

Hirase, Y. Catalogue of the land Shells of Japan to be had of Y. Hirase. — Tokyo 1903. 24 p. with pl.

— (2). Vide Pilsbry & Hirase.

Holt, E. W. L. The public oyster beds on the coasts of Counties Wicklow and Wexford. — In: Rep. Fish. Ireland for 1901, II. p. 4—36.

— (2). A Norwegian method of Oyster Culture. Ibid. p. 77—103, with 10 plates.

Hoyle, W. E. Notes on the type Specimen of *Loligo eblanae* Ball. — In: Mem. Manchester Soc., vol. 47, no. 9, with pl. und Notes Manchester Museum No. 14.

Ihering, H. von. As Melanias do Brazil. — In: Revista Museo Paulista, vol. 5, p. 653—682.

— (2). Note sur quelques Mollusques fossiles du Chile. — In: Revista Chilena, vol. 7, p. 120—127.

Im Thurm, E. A Sketch of the Ceylon pearl fishery of 1903. — In: Spolia Zeylan. I. p. 56—65, with 4 pl.

Jarvis, P. W. Distribution of Jamaican Species of *Colobostylus*. — In: Nautilus, vol. 17, p. 62—65, mit Karte.

Jatta, G. A proposito di alcuni Cefalopodi del Mediterraneo. — In: Boll. Soc. Napoli, vol. 17, p. 193—207.

Johansen, A. C. & J. C. L. Levinsen. De Danske Farvandes Plankton i Aarene 1898—1901. — In: Danske Selsk. Skr., vol. 12, p. 265—297.

Johnson, C. W. Some notes no the genus *Fulgur*. — In: Nautilus, vol. 17, p. 73—75.

Joubin, L. Résultats du Voyage du S. Y. Belgica. Zoologie, Cephalopodes.

— (2). Sur quelques Céphalopodes recueillis pendant les dernières campagnes de S. A. le Prince de Monaco (1901—1902). — In: CR. Ac. Sciences, vol. 136, p. 100—102.

Kellogg, J. L. Feeding Habits and growth of *Venus mercenaria*. — In: Bull. N. York Museum No. 71. 28 S.

Kennard, A. S. & B. B. Woodward. On the occurrence of *Neritina grataleoupiana* Fer. (hitherto misunderstood as *N. fluviatilis*) in the Pleistocene gravels of the Thames at Swanscomb. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 320, 321.

— (2). The Non-Marine Mollusca of the River Lea Alluvium at Walthamstow. — In: Essex Naturalist, vol. 13, p. 13—21, 115, 116, with figs.

— (3). Note on the occurrence of freshwater Mollusca in a water-main at Poplar. Ibid. p. 80, 81.

— (4). Mollusca. In: The Exploration of the Caves of Kesh, County Sligo. — In: Pr. Irish. Ac., vol. 32, p. 181—183.

Kerville, H. Gadeau de. Recherches sur les Faunes marine et maritime de la Normandie. — In: Bull. Soc. Rouen, vol. 36, p. 143—282.

Kesteven, H. L. Notes on Prosobranchiata. II. Littorinacea. In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. 27, p. 620—636, pl. XXX. III. The Neanic Shells of Melo diadema Lam. and the Definition of neponic stage in the Gasteropod Mollusks. — Ibid. vol. 28, p. 443—452.

Kew, H. W. Note on a two-banded shell of *Helicigona arbustorum* from Wensleydale. — In: Naturalist 1903, p. 342—343.

— (2). Snails and Spiders on towers. — Ibid. p. 343.

Knight, G. A. F. A visit to the Outer Hebrids in search of Mollusca. — In: Trans. Perthshire Society, vol. III, p. 193—217.

Knipowitsch, N. Zoologische Ergebnisse der Russischen Expeditionen nach Spitzbergen. Mollusca und Brachiopoda II u. III. — In: Ann. Mus. St. Petersbourg, vol. 7, p. 355—459, t. 8, 9 u. Karte.

Kobelt, W. Diagnosen neuer Cerastus-Arten. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 33—35.

— (2). Diagnosen neuer Arten. — Ibid. p. 88—91, 145—151.

— (3). Diagnose eines neuen Conularius. — Ibid. p. 91.

— (4). Unsere Kenntniss der Fauna europaea. — Ibid. p. 113—121.

— (5). Otto Franz von Moellendorff. Necrolog. Ibid. p. 161 167; Uebersetzung in: J. Mal. vol. X, p. 122—125 (mit Bild).

— (6). Rossmaesslers Iconographie, N. Folge. Zehnter Band, mit Taf. 271—300.

— (7). Iconographie der schalentragenden europaeischen Meerestonconchylien. Dritter Band. Lfg. 17—20.

— (8). Vide Martini & Chemnitz.

- Kobelt, W. & O. F. von Moellendorff.** Catalog der Familie Buliminidae. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., p. 36—60, 65—71.
- Koehler, R. & G. Vaney.** Entosiphon deimatis. Nouveau Mollusque parasite d'une Holothurie abyssale. — In: Revue Suisse Zool., vol. XI, p. 23—41, pl. II.
- Krogh, A.** On shells floating on the surface of the sea. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 341, 342.
- Künkel, K.** Zur Locomotion unserer Nacktschnecken. — In: Zool. Anzeiger, vol. 26, p. 341, 342.
- (2). Zuchtvorschüre mit linksgewundenen Weinbergsschnecken (*Helix pomatia*). — Ibid. p. 656—664.
- Lavezzari, M.** Liste des coquilles recueillies du Val André (Côtes du Nord). — In: J. de Conchyl., vol. 51, p. 29—34.
- Lamy, Ed.** Sur le prétdenu genre *Savignyarca* Jousseaume (Lamelliibranche.). — In: Bull. Mus. Hist. nat. Paris 1903, no. 3.
- (2). Sur une variété de l'*Arca rhombaea* Born. — Ibid. no. 8. 5. pg. avec figs.
- Letacq, A. L.** Note sur la présence de l'*Unio margaritifer*, Rossini, dans la Sarthe, à Saint-Ceneri le Geret, et dans la Gourbe, à Antoigny (Orne). — In: Bull. Soc. Rouen, vol. 37, p. 101, 102.
- (2). Observations biologiques sur la Mulette perlière (*Unio margaritifer* Rossini) . . . recueillies dans l'Udon. — Ibid. p. 111—115.
- Lindholm, W. H.** Zur Molluskenfauna der Gouvernements Kursk und Orenburg. — In: Ann. Mus. Zool. St. Petersbourg, vol. 8.
- Locard, A.** Les Cerithium et les Cerithiidae des mers d'Europe. In: Ann. Soc. Agric. Lyon, vol. 10, p. 95—128.
- (2). Notices Conchyliologiques. LVII Les Ptéropodes testacés des Mers d'Europe. — In: Echange, Année XIX, p. 95 101, 110.
- Locard, A. & L. Germain.** Sur l'introduction d'espèces meridionales dans la faune malacologique des environs de Paris. — In: Bull. Ac. Sciences Lyon 1903, avec figs.
- Lortet, P. & C. Gaillard.** La faune momifiée de l'Ancienne Egypte. — In: Arch. Mus. Lyon VIII, no. 11. Mollusca p. 191—198.
- Lowe, H. N.** Notes on the Mollusk Fauna of San Nicholas Island. — In: Nautilus, vol. 17, p. 66—69.
- Luther, A.** Ueber das Vorkommen von *Alderia modesta* bei Helsingfors. — In: Medd Soc. Faun. Fenn., vol. 28, p. 41—44.
- Mae Intosh, W. C.** Notes from the Gatty Marine Laboratory, St. Andrews. No. XXIV. On the frequency of the occurrence of Pearls in the Mussel (*Mytilus edulis* L.). — In: Ann. nat. Hist. ser. vol. 11, p. 549—551.
- Madoule, A.** Double observation sur le mode de distribution des Mollusques terrestres vivant soit en colonies, soit plus ou moins isolément. — In: Bull. Soc. Elboeuf, vol. XXI, p. 46—49.

Marshall, J. T. Additions to „British Conchology“ VII Torquay 1903. 59 S.

Martens, Ed. von. Neue Meerconchylien aus den Sammlungen der deutschen Tiefsee-Expedition. — In: Nachrbl. D. mal. Ges. 1903, p. 97—105.

— (2). Die beschalten Gastropoden der deutschen Tiefsee-Expedition 1898—1899. — In: Wissensch. Ergebni. D. Tiefsee-Exped. A. Systematisch-geographischer Theil, vol. 7, p. 1—146, Taf. 1—5.

— (3). Süßwasser-Conchylien vom Südufer des Tsad-Sees. — In: SB. Ges. naturf. Fr. Berlin, p. 5—10.

— (4). Verbreitung der Meer-Conchylien an den Küsten von West- und Südafrika. — Ibid. p. 188—193.

— (5). Durchbohrte Schalen von Landschnecken. — Ibid. p. 393.

— (6). Vorkommen der *Helix (Campylaea) preslia* und *Pupa edentula* bei Reichenhall. — Ibid. p. 396—399.

— (7). Land- und Süßwasser-Conchylien von Ost-Borneo. — Ibid. p. 416—428, mit Textfig.

— (8). Griechische Mollusken gesammelt von Eberhard von Oertzen. — In: Archiv f. Naturg., vol. 60, p. 372—374, mit Textfig.

Martini & Chemnitz. Systematisches Conchylien-Cabinet. Neue Ausgabe. Lfg. 479—485 (*Helix*, von Kobelt, 3 Lfg., *Agnatha*, von Moellendorf, 1 Lfg., *Chitonidae*, von Clessm. 3. Lfg.).

Mayfield, A. Notes on the Land- and Freshwater Mollusca of East Suffolk. — In: J. Conch. Leeds, vol. 10, p. 295—299.

Mazzarelli, G. Note biologiche sugli Opistobranchi del Golfo di Napoli. — II. Nudibranchi. — In: Atti Soc. ital., vol. 42, p. 280—296.

Meisenheimer, J. Ueber ein neues Genus der gymnosomen Pteropoden aus dem Material der deutschen Tiefsee-Expedition (*Schizobrachium*). — In: Zoolog. Anzeiger, vol. 26, p. 410—412, mit Textfig.

Melvill, J. C. A revision of the Columbellidae of the Persian Gulf and North Arabian Sea, with description of *C. calliope* n. sp., In: J. Malac. vol. X, p. 27—31, with fig.

— (2). The Genera *Pseudoliva* and *Macron*. — In: J. Conch. Leeds, vol. X, p. 320—330.

Melvill, J. C. & J. H. Ponsonby. Descriptions of Thirty-one Terrestrial and Fluviatile Mollusca from South Africa. — In: Ann. nat. Hist., ser. 7, vol. 12, p. 595—609, with pl. 31 u. 32.

Melvill, J. C. & R. Standen. Descriptions of Sixty-eight new Gastropoda from the Persian Gulf, Gulf of Oman and North Arabian Sea, dredged by Mr. F. W. Townsend of the Indo-European Telegraph-Service, 1901—1903. — In: Ann. nat. Hist., ser. 7, vol. 12, p. 289—324, pl. 20—23. — Auch in: J. Bombay Soc. XVI, 1904, p. 86—98.

— (2). The Genus *Scala* (Klein) Humphrey, as represented in the Persian Gulf, Gulf of Oman and North Arabian Sea, with des-

criptions of new species. — In: J. Conch. Leeds, vol. X, p. 340—351, pl. 7.

Melvill, J. C. & E. R. Sykes. Description of *Marginella lateritia* n. sp. from the Andaman Islands. — In: Pr. Mal. Soc. London, vol. 5, p. 410, Textfig.

Miquel, --. (Moluscos encontrados en Palma de Mallorca). In: Bol. Soc. española II, p. 301, 302.

Moellendorff, O. F. von. Neue Landschnecken von Niederrändisch-Indien. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 156.

— (2). Vide Martini & Chemnitz.

— (3). Vide Kobelt & Moellendorff.

Moore, J. E. S. The Tanganyika Problem. London 1903. XXIII + 371 S., with figs.

Murdoch, R. On the anatomy of *Paryphanta urnula*, Pfr., with notes on *P. hochstetteri* Pfr. and *Rhytida greenwoodi* Gray. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 270—273, with figs.

— (2). In the anatomy of *Paryphanta busbyi*, Gray. — In: Trans. N. Zealand Inst., vol. 35, p. 258—262, pl. XXVII.

Naegele, G. Ueber *Helix pomatia* L. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 24—27.

— (2). Einiges aus Vorderasien. Ibid. p. 168—177.

Napier, H. C. & G. D. H. Carpenter. Record of Mollusca (near Oxford). In: Rep. Ashmolean Soc. 1903, p. 52—54.

Nordenskiöld, E. Ueber die Trockenzeitanpassung eines *Anacyclus* von Südamerika. — In: Zool. Anzeiger, vol. 26, p. 590—593, mit Textfig.

Ortmann, A. E. *Illex illecebrosus* (Lesueur), the „squid from Onondaga Lake, N. Y.“ — In: Science, vol. 17, p. 30, 31.

Pace, S. Note on the genus *Pseudamydra* Pace. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 267—269.

— (2). On the Anatomy of the Prosobranch genus *Pontiothauma* E. A. Smith. — In: J. Linn. Soc. Zool., vol. XXVIII, p. 455—462, pl. 42.

Pallary, P. Mollusques recueillis par le Dr. Innes Bey dans le Haut Nil. — In: Bull. Inst. Egypte, vol. III, p. 87—98, avec 2 pl.

Pannel, J. Additional notes upon the land- and freshwater Mollusca of Surrey. — In: J. Conch. Leeds, vol. 10, p. 331.

Park, J. On the Marine Mollusca of Totaranny Bay, Nelson. — In: Trans. New Zealand Inst., vol. 35, p. 299—304.

Patterson, A. The Mollusca of the Great Yarmouth district. — In: Zoologist, 1903, p. 182—188.

Pearce, S. S. The Association of *Helix nemoralis* and *Helix hortensis*. — In: J. Conch. Leeds, vol. X, p. 300, 301.

Pelseneer, P. Resultats du Voyage du S. Y. Belgica. Zoologie, Mollusques (Amphineures, Gastropodes et Lamellibranches). — Anvers 1903; 85 p. u. 9 pl.

— (2). La Classification des Lamellibranches d'après les branches. — In: Ann. Soc. mal. Belgique, vol. 38, Bull. p. LVIII — LX.

Petch, T. The Marine Fauna and the Humber District and the Holderness Coast. — In: Trans. Hull Club, vol. 3, p. 27—41.

Pilsbry, H. A. Zonites arboreus (Say) in Japan. — In: Nautilus, vol. XVI. p. 119.

— (2). *Helicina japonica* and related forms. Ibid. p. 130, 131.

— (3). Illustrations of some Japanese land shells. Ibid. p. 136.

— (4). A new Pleurotomaria. — Ibid. vol. XVII, p. 36.

— (5). Land Shells of Curacao. — Ibid. p. 48.

— (6). A new Jamaican Colobostylus. Ibid. p. 65.

— (7). New Japanese Marine Mollusca. Ibid. p. 69—71.

— (8). The greatest American Planorbis. Ibid. p. 75.

— (9). A new Guppya from Florida. Ibid. p. 77.

— (10). Shells of Douglas Co., Central Washington. Ibid.

p. 84.

— (11). Mollusca of Western Arkansas and adjacent States, with a Revision of Paravitrea. — In: Pr. Ac. Philadelphia, p. 193—214, pl. IX—XI.

— (12). Additions to the Japanese Land Snail Fauna. No. VIII. Ibid. p. 315—319, pl. XIV.

— (13). A new Japanese Pleurotomaria. Ibid. p. 496, pl. XXII.

— (14). A new American Genus of Arionidae. Ibid. p. 626—628, pl. XXVIII.

— (15). Mexican land- and freshwater Molluska. Ibid. p. 761—789, pl. XLVII—LIV.

— (16). A new Hawaiian Limnaea. Ibid. p. 790, with fig.

— (17). Tryons Manual of Conchology, ser. 2, vols. XV (Pts. 59 & 60) and XVI, pts. 61—63.

Pilsbry, H. A. & Y. Hirase. New Land Shells of the Japanese Empire. — In: Nautilus, vol. XVI, p. 114—117, 128—130.

— (2). Descriptions of new Japanese Land-shells. Ibid. p. 128—130.

— (3). Descriptions of new Japanese Land-shells. Ibid. vol. XVII, p. 31, 32.

— (4). Notices of new Japanese Land-shells. Ibid. 44—46.

— (5). Notices of new Land-shells of the Japanese Empire. Ibid. p. 52—55.

— (6). New Land-snails of the Japanese Empire. Ibid. p. 78, 79.

Preston, H. P. Descriptions of two supposed new species of Cyathopoma. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 340, with figs.

— (2). Supposed new species of *Helicina* and *Bulimus* from Costa Rica. — In: J. Malac., vol. 10, p. 4, with figs.

Pritchard, C. B. & J. H. Gatliff. Catalogue of the Marine Shells of Victoria, Part VI. — In: Pr. Soc. Victoria, vol. XV, p. 176—223. — Part VII, ibid., vol. XVI, p. 96—139.

— (2). On some new species of Victorian Mollusca No. 6. — In: Pr. Soc. Victoria, vol. XVI, p. 92—95, pl. 15.

Protz, A. Zur Binnenmolluskenfauna der Provinz Ostpreussen. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 1—6.

Raymond, W. J. An new Californian Trivia. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 85, 86.

Pollonera, C. Molluschi. — In: Osserv. Scient. Spediz. polare di S. A. R. Luigi Amedeo di Savoia, Duca delli Abruzzi. Milano 1903, 4°, p. 621—623, mit Textfig.

Reynell, A. Note on the occurrence of *Planorbis marginatus* Drp. and *Limnaea peregra* (Müll.) in the Post-Pliocene of Bognor, Sussex. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 5, p. 344, 345.

Ridewood, G. On the structure of the Lamellibranchia. — In: Phil. Trans. Roy. Soc. 1903 (ser. B.), vol. 195, p. 147—284.

Rolle, H. Einige neue Binnenmollusken von den Molukken. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 23, 24.

— (2). Neue Amphidromus-Formen. Ibid. p. 156, 157.

Rosen, O. von. Zur Kenntniss der Molluskenfauna der Stadt Charkow und ihrer nächsten Umgebung. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 152—155.

— (2). Neue Arten aus dem Caucasus und Centralasien. Ibid. p. 178—182.

Scharff, R. F. Some Remarks on the Atlantic Probleme. — In: Pr. Irish Acad., vol. 24, p. 268—302.

Sheppman, M. M. *Neritina subocellata* (Marts.) Sheppman. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 20—22.

— (2). Descriptions of three new species of *Oliva* from the Siboga Expedition. — In: Tijdschr. Nederland. Dierk. Ver., vol. VIII, p. 67—69.

Sell, H. Beiträge zur Kenntniss der Molluskenfauna Dänemarks. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 105—113.

Simpson, J. Marine Conchology of „Dee“. — In: Trans. Aberdeen Soc. 1902—1903, p. 64—86.

Simroth, H. Ueber die wahrscheinliche Herleitung der Gattungen *Monochroma* und *Paralimax*. — In: Ann. Mus. St. Petersbourg VII, p. 283—288.

— (2). Ueber die von Herrn Dr. Neumann in Abessinien gesammelten aulacopoden Nacktschnecken. — In: Zool. Jahrb. Syst., vol. 19, Heft 6. Mit 4 Tafeln und 4 Textfiguren.

Smith, E. A. Note on an abnormal specimen of *Argonauta argo*. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. V, p. 310, with fig.

— (2). On *Xylophaga praestans* n. sp. from the English Coast. Ibid. p. 320—330, with figs.

— (3). A list of species of Mollusca from South Africa, forming an appendix to G. B. Sowerby's „Marine Shells of South Africa“. *Ibid.* p. 354—402, pl. XV.

— (4). Descriptions of new species of land-shells from Central Africa. — In: *J. Conch. Leeds*, vol. X, p. 315—319, pl. IV.

— (5). Note on *Macron trochlea*. *Ibid.* p. 351.

— (6). A new species of *Modiola* from Malacca. *Ibid.* p. 368, fig.

— (7). Note on some Mollusks of the family Bulimulidae from Matto Grosso. — In: *Pr. Z. S. London* 1903, p. 70, 71.

— (8). Marine Mollusca — In: „Fauna and Geography of the Maldives and Laccadive Archipelagoes“, vol. 2, p. 589—630, pl. 35 u. 36.

— (9). Land- and Freshwater shells. — In: *Nat. History Sokotra and Abd-el-Kuri*, p. 111—135, with pl. 12 u. 13, and figs.

Sowerby, G. B. Descriptions of new species of *Nassa*, *Purpura*, *Latirus*, *Voluta*, *Conus*, *Stomatella* and *Spondylus*. — In: *J. Mal.*, vol. 10, p. 73—77, pl. 5.

— (2). Descriptions of fourteen new species of Marine Mollusca from Japan. — In: *Ann. nat. Hist.*, ser. 7, vol. 12, p. 496—501.

— (3). Mollusca of South Africa. — In: *Marine Investigations in South Africa*, vol. 2, p. 213—232, t. 3—5.

Sowerby, G. B. & Fulton, H. C. Note on a specimen of *Fistulana clava*, Lam., perforating a shell of *Mitra interlirata*, Reeve. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. 5, p. 345, pl. 16.

Stearns, R. E. C. Mollusks occurring in Southern California. — In: *Nautilus*, vol. 16, p. 133, 134.

Sterki, V. New *Pisidia*. — In: *Nautilus*, vol. XVII, p. 20—22, 79—82.

— (2). New North-American *Pisidia*. *Ibid.* p. 42, 43.

— (3). Notes on the Unionidae and their Classification. — In: *Amer. Naturalist*, vol. XXXVII.

Sturany, R. Beitrag zur Kenntniss der kleinasiatischen Molluskenfauna. — In: *SB. Ak. Wien*, vol. 111, Abth. I, p. 123—140. Mit 2 Taf.

— (2). Gastropoden und Amphineuren des Rothen Meeres. — In: *Denkschr. Ak. Wien*, vol. 74, p. 219—284. Mit 7 Tafeln.

Suter, H. On a new genus and species of the Family Phenacohelicidae. — In: *J. Malac.*, vol. 10, p. 62—64, pl. 4.

Sykes, E. R. Notes on a Monstrosity of *Rissoia parva* da Costa. — In: *P. mal. Soc. London*, vol. 5, p. 260, fig.

— (2). Description of *Cerastus denshawi* n. sp. from Aden, with a note on *Otopoma clausum*, Sow. and *O. yemenicum*, Bourg. *Ibid.* p. 338, 339, with fig.

— (3). Notes on British Eulimidae. *Ibid.* p. 348—353, pl. 14.

— (4). Malacological Notes. 13. The value of the name *Rhodina*, de Morgan. 14. Description of *Leptachatina henshawi*

n. sp. On the name *Cataulus*. — In: J. Malac., vol. X, p. 1—3, with fig.

— (5). Description of new land shells from the Austromalayan Region. Ibid. p. 64—67.

— (6). Notes on, with illustrations of, Austro-Malayan land shells. Ibid. p. 78, pl. 6.

— (7). On the name *Lima elliptica*. Ibid. p. 104.

— (8). On a small collection of marine shells from Surprise Island. Ibid. p. 137, 138.

— (9). On the Land Operculate Mollusca collected during the „Skeat Expedition“ to the Malay Peninsula in 1899—1900. — In: Pr. zool. Soc. London, p. 194—199, pl. 20.

Taylor, J. W. Monograph of the Land- and Freshwater Mollusca of the British Isles. Part IX.

Tesch, J. J. Vorläufige Mittheilung über die Thecosomata und Gymnosomata der Siboga-Expedition. — In: Tydschr. Nederl. Dierk. Ver., vol. 8, p. 111—117.

Thiele, J. Die beschalten Gastropoden der deutschen Tiefsee-Expedition 1898—1899. B. Anatomisch - systematische Untersuchungen einiger Gastropoden. — In: Wiss. Ergebni. D. Tiefsee-Expedition, vol. VII, p. 147—174, Taf. 6—9.

Tadd, R. A. Notes on the Invertebrate Fauna and Fish-food of the Bays between the Start and Exmouth. — In: J. Mar. Biol. Assoc., vol. VI, p. 541—561.

Tomlin, J. R. *Vertigo heldi* in Ireland. — In: J. Conch. Leeds, vol. 10, p. 307, 308.

Tomlin, J. P. & E. D. Marquard. The land- and freshwater shells of the Channell Islands. Ibid. p. 285—294.

— (2). Vide Chaster & Tomlin.

Tryon. Vide Pilsbry.

Vanatta, E. G. Notes on some shells from North-Carolina. — In: Nautilus, vol. XVI, p. 106.

— (2). A list of Shells collected in Western Florida and Horn Island, Mississippi. — In: Pr. Ac. Philadelph., p. 756—759, with figs.

Vayssiére, A. Sur les Heteropodes recueillis pendant les campagnes de l'Hirondelle et de la Princesse Alice faites sous la direction de S. A. le Prince de Monaco. — In: CR. Ac. Sci., vol. 137, p. 346—348.

Verrill, A. E. Bermuda Islands. New Haven. — 548 p. with 38 pl.

Vignal, L. Sur les variétés du *Cerithium zebrum*, Kiener. — In: J. de Conchyl., vol. 51, p. 21—27, pl. 2.

Walker, Ph. On the specific validity of *Campyloma milesii* Tea. — In: Nautilus, vol. XVI, p. 121—124, pl. V.

— (2). Notes on Eastern American *Ancylia*. Ibid. vol. XVII, p. 13—19, 28—31, pl. 1 & 2.

Welch, R. The Association of *Helix nemoralis* and *Helix hortensis*. — In: J. Conch. Leeds, vol. X, p. 302, 303.

— (2). Pockets of land-shells, Bannmouth Dunes, Portstewart. Ibid. p. 338, 339.

Westerlund, C. Ag. Methodus dispositionis Conchyliorum extramarinorum in Regione palaearetica viventium, familias, genera, subgenera et stirpes sistens. — In: Rad. Jugosl. Ak., vol. 151, p. 82—139.

Wittich, E. Beitrag zur Kenntniss der alt-alluvialen Fauna im Mainthal. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 11—14.

Wohlberedt, O. Nachtrag zur Molluskenfauna von Montenegro und Nordalbanien. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 83—86.

— (2). Neue Fundorte für *Helix pomatia* L. Ibid. p. 86—88.

Woodward, B. B. Note on the Nepionic Shell of *Melo indicus*, Gmelin. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. V, p. 260.

— (2). Note on the dates of publication of J. E. Gray's „Catalogue of Pulmonata . . . in the . . . British Museum“ Pt. I, 12 mo., 1855; and of A. Moquin-Tandons's Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviaires de France, 2 vols., 8°, 1855. — Ibid. p. 261.

— (3). Note on the generic name *Buliminus*. Ibid. p. 309, 310.

— (4). *Vitrea rogersi* n. sp., a British form hitherto misidentified with *Helix glabra* Studer and *Hyalinia helvetica* Blum. — In: J. Conch. Leeds, vol. 10, p. 309—311, pl. VI.

— (5). List of British non marine Mollusca. Ibid. p. 352—367.

Wüst, E. Zur Ausbreitung der *Helix (Xerophila) obvia* Hartm. in Deutschland. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 35, p. 185, 186.

— (2). Pleistocene Flussablagerungen mit *Succinea Schumacheri* Andr. in Thüringen und im nördlichen Harzvorlande. — In: Zeitschr. f. Naturw., vol. 75, p. 312—324, vol. 76, p. 137.

— (3). Ein pleistocäner Unstruktikies mit *Corbicula fluminalis* Müll. sp. und *Melanopsis acicula* Fer. Ibid. vol. 75, p. 209—223.

d) Jahrgang 1904.

Ancey, C. F. New Land-Snails from South Amerika. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 89, 102.

— (2). Notes critiques et synonymiques. — In: J. Conchyl., vol. 52, p. 288—312.

— (3). On some non marine Hawaiian Mollusca. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, no. 2, p. 117, pl. 7.

— (4). Notes on a few Shells. — In: Nautilus, vol. XVIII, p. 21.

— (5). Report on semi-fossil land shells found in the Hamakua District, Hawaii. — In: J. of Malac., vol. XI, p. 65—71, pl. 5.

Andreae, A. Dritter Beitrag zur Binnenconchylienfauna des Miocäns von Oppeln in Schlesien. — In: Mitt. Roemer Mus. Hildesheim No. 20. August 1904.

Baker, Fr. C. Note on *Murex marcoënsis* Sow. — In: *Nautilus*, vol. XVII, p. 94.

— (2). New varieties of American Limneas. *Ibid.* vol. XVIII, p. 10.

— (3). Shells of land- and freshwater; a familiar introduction to the study of Mollusks. Chicago 8°.

— (4). New American Lymnaeas. — In: *Nautilus*, vol. 18, p. 62, 63.

— (5). The Mollusca of Cedar Lake, Indiana. — In: *Nautilus*, vol. 17, p. 112.

— (6) The arrangement of the Collection of Mollusca in the Chicago Academy of Sciences. — In: *Museums Journal III*, p. 354 360, 1 pl.

Baldwin, J. W. The Molluscan Fauna of the Dells of Wisconsin. — In: *Pr. Acad. St. Louis*, vol. XIV, p. 99—105.

— (2). *Jaminia muscorum* mut. *sinistrorum*. — In: *J. of Conch. Leeds*, vol. 11, p. 11.

— (3). Notes on *Planorbis truneatus* Miles. *Ibid.* p. 107—110.

— (4). Spire variation in *Pyramidula alternata*. — In: *Amer. Naturalist*, vol. 38, p. 661—668.

Bartsch, P. A new *Scissurella* (dalli) from Patagonia. — In: *Nautilus*, vol. XVII, p. 90.

— (2). A new *Ashmunella* from New Mexico (*townsendi*). — In: *Smithson. Miscell. Coll.*, vol. 47, no. 1409, p. 13, 14.

— (3). A new species of *Amphidromus* (*gossi*). *Ibid.* no. 1485. p. 292, pl. 46.

— (4). Notes on the Genus *Sonorella* with descriptions of new species. *Ibid.* no. 1481, pl. 28—33.

— (5). Vide Dall & Bartsch.

Bavay, A. Descriptions de quelques nouvelles espèces du genre *Pecten*, et Rectifications. — In: *Journal de Conchyl*, vol. 52, p. 197—206, pl. 6.

— (2). Mission de Créqui-Montfort et Sénéchal de la Grange en Amérique du Sud. Mollusques terrestres et fluviatiles récoltés par le Dr. Neveu-Lemaire. — In: *Bull. Soc. zool. France XXIX*, p. 152—156, avec 7 figs.

Bédé, P. Sur une nouvelle variété de *Murex trunculus* Linné du Pleistocène tunisien. — In: *Bull. Mus. Paris*, vol. 9, p. 372.

Beeston, H. & C. E. Wright. The Land- and Freshwater Mollusca of Ilfracombe and District. — In: *J. of Conch. Leeds*, vol. 11, p. 72.

Bellevoye, A. Les variétés de l'*Helix pomatia*. — In: *Bull. Soc. Sciences naturelles Reims* 1904. — 8 pages, avec pl.

Bellini, Dr. R. The Freshwater Shells of Naples and the Neighbourhood. — In: *J. of Conchol. Leeds*, vol. 11, p. 33—45.

Benham, W. B. Notes on some Nudibranch Mollusca from New Zealand. — In: Trans. New Zealand Inst. 1904, p. 312.

Bergh, R. Sempers Reisen im Archipel der Philippinen. Nudibranchiata IX, vol. VI, Lfg. 1, 55 S., 4 Taf.

Blackburn, E. P. Mollusca of Driffield and neighbourhood. — In: Naturalist 1904, p. 364—367.

Blanford, W. T. Descriptions of Indian and Burmese Land-Shells referred to the Genera *Macrochlamys*, *Bensonia*, *Taprospira* (gen. nov.), *Microcystina*, *Euplecta* and *Polita*. — In: Pr. zool. Soc. London 1904, vol. II (publ. April 18, 1905).

Blaney, Dwight. Shell Collecting Days at Frenchmans Bay. — In: Nautilus, vol. 17, p. 109.

— (2). The Landshells of Ironbound Island, Maine. Ibid. vol. XVIII, p. 45, 46.

Boettger, O. Eine neue Clausilie aus dem ober-oligocaenen Landschneckenkalk von Hochheim. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 36, p. 79.

— (2). Eine neue Form der Paludinidengattung *Emmericia* im Mainzer Becken. Ibid. p. 112.

— (3). Nochmals über Trockenzeit-Anpassung eines *Ancylus* von Süd-Amerika. — In: Zool. Anzeiger, vol. 27, p. 264.

— (4). Beschreibung einer neuen *Melanie* von den Marshall-Inseln. — In: Zool. Jahrb. Systematik, vol. 20, p. 408.

— (5). Landschnecken der Insel Nauru (Marschall-Inseln). Ibid. p. 409—412.

— (6). Nekrolog (des Geh. Reg. Ed. von Martens). — In: Zoolog. Garten, vol. 45, p. 318.

— (7). Nekrolog (von R. A. Philippi). Ibid. p. 356.

Bohn, G. Périodicité vitale des animaux soumis aux oscillations des Hautes Mers. — In: C. R. Acad. Sciences, vol. 139, p. 610.

— (2). Oscillations des animaux littoraux synchrones de la marée. Ibid. p. 646—648.

Bosanquet, R. C. An early Purple-fishery. — In: Rep. Brit. Assoc. Adv. Science, 1903, p. 817, 878.

***Brindley, H. H.** Mollusca. — In: Handbook Nat. Hist. Cambridgeshire, 1904, p. 114—138, 257, 258.

Brusina, Spiridion. Zur Rettung unserer Molluskenfauna. In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 36, p. 157.

Bullen, Rev. R. Ashington. Descriptions of new species of Nonmarine shells from Java and a new species of *Corbicula* from New South Wales. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, no. 2, p. 109.

Byne, L. St. G. The type of *Cypraea caput-anguis* Phil. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 57.

Caziot, E. Observations sur quelques mollusques meridionaux signalés dans les Vosges, par Puton. — In: Bull. Assoc. vosgienne 1904, no. 6.

- (2). Etude sur quelques espèces de Mollusques, visés par Puton comme existant dans les Vosges. *Ibid.* no. 7, Avec fig.
- (3). Etude sur les *Helix* du groupe *cespitem*. — In: *Ann. Soc. Linn. Lyon* 1904.
- (4). Faune du tumulus de St. Christophe près Grasse. — In: *Feuille jeunes Natural.* Ser. 4, vol. 34, no. 406.
- (5). Excursió à la desenbocadura del Llobregat. — In: *Bul. Inst. Catalana d'Hist. Nat.* 1904.
- (6). Contribution à la Faune malacologique de la Catalogne. Etude sur quelques *Helix*. *Ibid.* (Sep.).
- (7). Complément à l'étude de la Faune Corse. — In: *Mém. Soc. zool. France XVI*, p. 33—40, Avec 5 figs.
- (8). Note sur quelques coquilles de la region circa-mediterranéenne: *Helix vermiculata*. — In: *Bull. Soc. zool. France XXIX*, p. 19—23.
- Carter, C. S.** Mollusca of Hubbard Valley. — In: *Naturalist* 1904, p. 60—63.
- Casey, T. L.** Notes on the Pleurotomidae, with description of some new Genera and Species. — In: *Transact. Acad. St. Louis*, vol. XIV, p. 123—179.
- Chaster, G. W.** Irish Field Club Union Conference and excursion at Sligo. Marine Mollusca. — In: *Irish Naturalist*, vol. 13, p. 193.
- Clapp, Geo. H.** A new Omphalina from Alabama (*pilsbryi*). In: *Nautilus*, vol. 18, p. 30.
- (2). New forms of *Polygyra* from Alabama. — *Ibid.* p. 85, 86.
- Clessin, S.** Pisidien aus Centralasien. — In: *Durch Asien*, von K. Futterer, p. 81, 82.
- Cockerell, T. D. A.** *Agriolimax agrestis* in Colorado. — In: *Nautilus*, vol. 18, p. 90, 91.
- Colton, H. S.** Land-snails of Mount Desert, Maine. — In: *Nautilus*, vol. XVII, p. 99.
- Collier, Ed.** The Conchological Differences between the Genera and Sections of the Pupininae. — In: *J. of Conch. Leeds*, vol. 11, p. 110—114.
- (2). *Helix nemoralis* mut. *sinistrorum* in Switzerland. *Ibid.* p. 57.
- (3). Land Shells at high altitudes. *Ibid.* p. 55.
- Collins, Frank.** The Mollusks of Cedar Lake, Indiana. — In: *Nautilus*, vol. XVII, p. 112.
- Collinge, W. E.** Some remarks on the genera *Damayantia*, *Issel*, *Collingea*, *Srth.* and *Isseleentia*, Collge. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. 6, p. 9—12.
- (2). Land- and Freshwater Mollusca. — In: *Contrib. terrestr. Zoology of the Faroeës*. Communicated, with Notes and a Summary, by Nelson Annandale. In: *Pr. Roy. Soc. Edinburgh* 1902—1904, p. 153.

— (3). Description of a new species of *Ariunculus* from Algeria (*pallaryi*). — In: J. Malac. v. 11, p. 47.

— (4). Notes on slugs and slug-like Molluscs. — In: J. Malac. v. 11, p. 14.

— (5). Note on *Parmacella deshayesii* Moq. Tand. Ibid. p. 49.

Cooke, A. H. Note on *Testacella haliotidea* Drp. — In: J. of Malac., vol. 11, p. 49.

Cooke, C. M. Distribution and Variation of *Achatinella multizonata* from Nuuan Valley. — In: Papers B. P. Bishop Museum, vol. II, p. 65—76, table.

Cossmann, M. Essai de Paléoconchologie comparée, Livr. 6. Paris. 8°. 151 S. 9 pl.

Couturier, M. Catalogue des Coquilles Paléarctiques de la Collection Hagenmüller. — In: Ann. Mus. Marseille, vol. 8, p. 19—67.

Cuénnot, L. Contributions à la Faune du Bassin d'Arcachon. III Doridiens. — In: Trav. Lab. Arcachon, vol. 7, p. 1—22, pl. 1.

Da Costa, S. J. New species of Land-shells from Central- and South-America. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, no. 1, p. 5.

Dall, W. H. Die Systematik der Cyrenacea. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 36, p. 74 (Uebersetzung).

— (2). *Gundlachia* and *Ancylus*. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 97.

— (3). Notes on the Nomenclature of the Pupacea and associated forms. Ibid. p. 114—116.

— (4). A new species of *Periploma (sulcata)* from California. Ibid. p. 122.

— (5). Note on the name *Glycimeris*. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 147.

— (6). Contributions to the Tertiary Fauna of Florida, with especial reference to the Silex Beds of Tampa and the Beds on the Caloosahatchee River, including in many cases a complete revision of the generic groups treated of and their American tertiary species (Schluss). — In: Transact. Wagner Free Instit., vol. 3, no. 6, with pl. 45—60.

— (7). Note on the genus *Ampullaria*. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 50—54.

— (8). An historical and systematic review of the Frog-Shells and Tritons. — In: Smiths. miscell. Coll., vol. 47, no. 1475.

Dall, W. H. & Paul Bartsch. Synopsis of the Genera, Subgenera and Sections of the Family Pyramidellidae. — In: Pr. Biol. Soc. Washington 1904, vol. 17, p. 1—16.

Davis, W. Abbot. Notes on the Mollusca of the Bermuda Islands. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 124.

Dautzenberg, Ph. Variations et cas tératologiques chez le *Murex brandaris*. — In: J. Conchyl., vol. 52, p. 285—287.

— (2). Récolte malacologique de M. Weyers dans le Sultanat de Sambas (Borneo). — In: Ann. Soc. mal. Belgique, vol. 38, p. 3—8, avec figs.

Dautzenberg, Ph. & Dollfus, G. F. Etudes critiques sur la nomenclature avec examen des genres *Pectunculus* et *Glycimeris*. — In: Journal de Conchyliologie, vol. 52, p. 109—122.

Dautzenberg, Ph. & A. Bavay. Description d'un *Ammussium* nouveau dragué par le Siboga dans la mer de Celebes (Sibogai). — In: Journal de Conchyl., vol. 52, p. 207.

Dean, J. D. New records for West-Lancashire. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 147.

— (2). Fish and their relation to *Paludestrina jenkinsi*. Ibid. p. 15.

— (3). Note on the Land- and Freshwater Shells of Lancaster. Ibid. p. 47.

— (4). Japanese Oyster Culture. — In: Bull. U. St. Fisch. Comm. XXII, p. 17—37, 4 pl., 27 figs.

Eliot, C. N. E. On the *Doris planata* of Alder & Hancock. — In: Pr. mal. Soc. London vol. VI p. 180.

— (2). On some Nudibranchs from East Africa and Zanzibar. IV. *Dorididae Cryptobranchiatae*. — In: Pr. London Soc. London 1904, I, p. 380—406, pl. 23, 24. V. Ibid. II, p. 83—105, t. 3 u. 4.

Evans, W. Note on *Limax tenellus* (Müll.) with exhibition of living examples from the Forth area. — In: Pr. Phys. Soc. Edinburgh, vol. XVI, p. 22—24.

Ferris, J. H. Southwestern Shells. — In: Nautilus, vol. XVIII, p. 49—54.

Fischer, H. Remarques sur le *Columbella terpsichore* Sow. et sur l'*Euchelis erythraeensis* Sturany. — In: J. de Conch., vol. 52, p. 59.

— (2). Considerations générales. — In: Mission Pavie, Zoologie, Mollusques, Paris. 4^e. 11 S.

— (3). Le Rev. P. Heude. — In: J. de Conchyl., vol. 52, p. 372—376.

Fischer, H. & Dautzenberg, P. Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Indo-Chine orientale cités jusqu'à ce jour. — In: Mission Pavie Indo-Chine, Etudes diverses, vol. III, p. 390—450.

Font y Saqué, N. Moluscos recogidos en Rio de Our (Sahara español). — In: Bol. Soc. españ., vol. 3, p. 209—211.

Frierson, L. S. Structure of the Shell in *Unio*. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 98.

— (2). Observations on the genus *Quadrula*. Ibid. p. 111.

Fulton, Hugh. Descriptions of some new Species and Varieties of *Catalaulax* from the Collection of the late Hugh Nevill Esq. — In: Ann. nat. Hist., ser. 7, vol. 13, p. 452, 453.

— (2). Note on *Thersites* (*Hadra*) *bellendenkerensis*, Braz, and *beddomae* Braz. — In: J. Malac., vol. 11, p. 1.

— (3). A critical List of the Sphaerospira Section of Thersites. *Ibid.* p. 2—11.

— (4). On some new species of *Melania* and *Jullienia* from Yunnan and Java. — In: *J. of Mal.* XI, p. 51, 52, t. 4, f. 1—5.

— (5). On a collection of Land Shells from Gebi Island, Moluccas, with descriptions of new species. — *Ibid.* p. 53, 54, t. 4, f. 6—11.

— (6). Note on *Leptopoma crenilabre* Strubell. *Ibid.* p. 55, pl. 4.

Germain, L. Considérations générales sur la Faune malacologique vivante du département de Maine-et-Loire. — In: *C. R. Assoc. Franc.* 1903, II, p. 764—773.

— (2). Sur quelques „Helices xerophiliennes“ du groupe *Variabiliana*, recueillies aux environs de Dieppe (Seine-Inférieure) In: *Feuille jeunes Naturalistes*, 1904, p. 102, 103.

— (3). Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles des environs d'Angers et du département de Maine-et-Loire. — In: *Bull. Soc. Ouest France*, vol. 14, p. 1—125, avec pl. et figs.

Geyer, —. Beiträge zur Vitrellaenfauna Württembergs. — In: *Jahresb. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg* 1904, p. 208—334 mit Taf. 8—14.

Giard, A. Sur la prétendue nocivité des huîtres. — In: *Revue d'Hygiène* 1904, 29 S.

— (2). Sur la synonymie de la petite Pentadine de la Méditerranée. — In: *C. R. Société Biolog.*, vol. 56, p. 255—257.

— (3). Les précurseurs des idées modernes sur l'origine des perles (Androsthène, Rondelet et Bohadsch). — In: *Feuille jeunes Naturalistes* 1904, vol. 24, p. 45—49.

Godwin-Austen, H. H. On the Genus *Eurystoma* of Albers (type *Helix vittata* Muller), its anatomy and references to other Indian species. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. 6, p. 48—50.

— (2). Note on *Damayantia smithii* Collinge and G. Austeni.

Goldfuss, O. Beiträge zur Molluskenfauna Schlesiens. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.*, vol. 36, p. 61—73, 128.

Grabau, A. W. Phylogeny of *Fusus* and its allies. — *Smithson. Collect.* vol. 44, 192 S., 18 pl.

Greene, C. List of the Marine Molluca, recorded as found in Suffolk. — In: *Pr. Suffolk Inst.*, vol. 11, p. 320—323.

— (2). Additions and Corrections to Suffolk Land- and Fresh-water Shells. *Ibid.* p. 324, 325.

Grierson, P. H. Notes on the Mollusca of North-Cork and Waterford. — In: *Irish Naturalist*, vol. 13, p. 164—169.

Gulick, Addison. The fossil Land shells of Bermuda. — In: *Pr. Ac. Philad.*, vol. LVI, p. 406—426, pl. 36.

Gude, G. K. Report on a small collection of Helicoids from British New Guinea. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. 6, p. 41, Textfig.

- (2). Note on *Corilla erronella*, Nevill mss. (mit Textfig.)
In: J. of Malacology, vol. 11, p. 45.
- (3). Helicoid Land-Shells of Asia. Corrections and Additions. Ibid. p. 93—97.
- Hägg, R.** Mollusca and Brachiopoda gesammelt von der Schwedischen zoologischen Polarexpedition nach Spitzbergen, dem Nordöstlichen Groenland und Jan Mayen im J. 1900. — In: Arktic Zool. II, p. 31—66, mit Tafel.
- (2). Two new Opistobranchiate Mollusca from the Red Sea. — In: Results Swed. Zool. Exped. Egypte and the White Nile 1901, under L. A. Jägerskiöld. Upsala 1903, 16 S., 1 Taf.
- (3). Land- and Freshwater Mollusca from the Upper Nile. (Shendy-Fashoda). Ibid. 1903, No. 7, 26 S.
- Hedley, Ch.** Additions to the Marine Molluscan Fauna of New Zealand. — In: Records Australian Museum, vol. 5, part 2 (January 1904). With figs.
- (2). Studies on Australian Mollusca VIII. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. 29, p. 182—211, pl. 8—10.
- (3). The habitat of *Gomphina moerchii*, Angas. — In Record Austr. Mus. V. 2, p. 134.
- (4). On the change of name of *Poroleda lanceolata* Tate. — In: Victorian Naturalist, vol. XXI, p. 112.
- Henshaw, H. W.** On certain deposits of semi-fossil shells in Hamakua-District, Hawaii. With descriptions of new species. — In: J. of Malac., vol. 11, p. 56—64, pl. V.
- Herdmann, W. A.** Recent Investigations on Pearls in Shellfish. — In: Trans. Liverpool Biol. Sect. XVIII, p. 168—177.
- (2). Sewage and Shellfish. Ibid. p. 178—188.
- (3). History of the principal Pearl Banks. — In: Rep. Pearl Oyster Fisheries of the Gulf of Manaar, part II, p. 1—36.
- Heynemann, D. F.** Some recent slug papers. — In: Journal of Malac., vol. 11, p. 48.
- Hidalgo, J. G.** Obras malacologicas. Atlas, Entrega VI. Madrid 1904.
- (2). Catalogo de los Moluscos testaceos de las Islas Filipinas, Jolo y Marianas. — In: Rev. Ac. Cienc. Madrid I, 192 S.
- Hinkley, A. A.** List of Alabama Shells collected in October and November 1903. — In: Nautilus, vol. XVIII, p. 54.
- Hirase, V.** Vide Pilsbry & Hirase.
- Horsley, the Rev. Canon.** The Land-shells of Majorka. — In: J. of Conch. Leeds, v. 11, p. 65—70.
- Hoyle, W. E.** A diagnostic key to the Genera of Recent Dibranchiate Cephalopoda. — In: Mem. Manchester Society, vol. 48, part III, 1903—1904.
- (2). On the Cephalopodes. Supplementary Report XIV. — In: Report Gov. Ceylon Pearl Oyster Fisheries in the Gulf of Manaar, by Herdman, published by the Royal Society 1904. With 3 plates.

— (3). *Sepia burnupi* n. sp. from Natal. — In: J. of Conchol. Leeds, v. 11, p. 27, pl. 1.

— (4). Isac Cooke Thomson Obituary. Ibid. p. 14.

— (5). Reports on the Scientific Results of the Expedition to the Tropical Pacific, in charge of Alexander Agassiz, on the U. S. Fish Commission Steamer „Albatross“ from August 1899 to March 1900. Report on the Cephalopoda. — In: Bull. Mus. Comp. Zool. Cambridge, Mass. 1904, vol. 43, p. 1—71, pl. 1—12, Textfigs. A—G.

Huddleston, W. H. On the Origin of the Marine (Halolimnic) Fauna of Lake Tanganyika. — In: J. Victoria Inst., vol. 36, p. 300—351, with 2 pl.

Hutton, F. W. Three new generic names for Mollusca. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. 29, p. 401.

— (2). Index Faunae Novae Zealandiae. London 1904. 8° (Mollusca p. 57—59, 348, 349.)

Hyning, van, A Molluscan Stampede (mit Textfig.). — In: Nautilus, vol. 18, p. 31.

Jackson, John, W. Report on the Miller's Dale Ramble. — In: J. of Conchol. Leeds, vol. 11, p. 13, 105.

— (2). Report on the Fleetwood Ramble. Ibid. p. 115.

Jackson, John W. & Fred Taylor. Observations on the Habits and Reproduction of Paludestrina. — In: J. of Conchol. Leeds, v. 11, p. 9 (woodcut).

Jackson, J. W. & C. H. Moore. Further Observations on the Molluscan Fauna of Granger over Sands and District. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 45.

Jakhontov, G. Communication de l'excursion sur le lac Baical, faite en été de l'année 1902. — In: Protok. Kasan Univ. 1902—1903, no. 212 (Russisch).

Jatta, G. A proposito di alcuni Cefalopodi del Mediterraneo. — In: Boll. Soc. Napoli XVII, p. 193—207.

Jennings, F. B. *Helix pomatia* monstr. sinistrorum in Surrey. — In: J. of Conch. Leeds, v. 11, p. 96.

Jensen, C. A. & C. Sell. Beiträge zur Kenntniss der Molluskenfauna Dänemarks. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 36, p. 117.

Jensen, A. S. *Pecten frigidus*, nomen *Pectini profundorum maris polaris incolae novum datum*. — In: Ved. Medd. 1904, p. 305—311, cum figg.

— (2). Bemaerkninger om Molluskerne i de hævede Lag ved Bulandshöfoi. — In: Ofv. Danske Selsk. Vorh. 1904, p. 382—396.

Ihering, H. von. Zur Kenntniss der Najaden von Gojaz. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 36, p. 154.

Johnson, Ch. W. On the generic position of *Teredo fistula* H. C. Lea. — In: Nautilus, v. XVIII, p. 13.

— (2). *Panopaea bitruncata* Conrad. Ibid. p. 73, pl. IV.

— (3). Ancyli adhering to Water-Beetles. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 120.

— (4). Notes on some Cape Cod Mollusca. *Ibid.* vol. 18, p. 47, 48.

Jones, K. Hurleston & H. B. Preston. List of Mollusca collected during the commission of H. M. S. "Waterwitch" in the China Seas. With descriptions of new species. With figs. — In: *Pr. mal. Soc. London*, vol. 6, p. 138—152.

Jukes-Browne, A. J. On some questions of Nomenclature. — In: *J. of Conch. Leeds*, vol. 11, p. 97.

Kenyon, Agnes F. Note on *Cassis paucirugis* Mke. — In: *J. of Conchol. Leeds*, vol. 11, p. 12.

Keep, J. West American Shells. San Francisco 1904. 360 S.

Kelsee, F. W. A peculiar *Haliotis* — In: *Nautilus*, vol. 18, p. 67.

Knipowitsch, N. Zoologische Ergebnisse der Russischen Expeditionen nach Spitzbergen. Mollusca & Brachiopoda. IV. Nachtrag. — In: *Annuaire Mus. St. Petersbourg*, vol. VIII, p. 333—343.

Kobelt, A. Verzeichniss der in den Bänden 1—35 des Nachrichtenblattes enthaltenen Arbeiten. — In: *Nachrbl. D. mal. Ges.* 1904, Beilage. 42 S.

Kobelt, W. Streifzüge in Südalien. — In: *Nachr. D. Mal. Ges.*, vol. 36, p. 1—21, 49—57, 97—103, 131—154.

— (2). Diagnosen neuer *Murella*-Arten. *Ibid.* p. 21, 57.

— (3). Die systematische Stellung der chinesischen *Ennea*. *Ibid.* p. 26.

— (4). Lo Bianco, le pesche abissali eseguite da F. A. Krupp col Yacht Puritan. *Ibid.* p. 30—32.

— (5). Unsere Kenntniss der Fauna europaea. Landschnecken aus Sinaia. *Ibid.* p. 33, 34.

— (6). *Cassidaria echinophora* var. *gigantea*. *Ibid.* p. 39.

— (7). *Museum Loebbeckeanum*. *Ibid.* p. 81—87.

— (8). Eine *Stenogyra* aus Turkestan (*St. retteri*). *Ibid.* p. 87.

— (9). *Iberus Montf.* und *Otala Schum.* *Ibid.* p. 88.

— (10). Eine merkwürdige Abnormität von *Helix pomatia* L. *Ibid.* p. 125.

— (11). *Helix albescens* (Jan) Rossmaessler, in *Monitore Zool. ital.* XV, p. 206.

— (12). Iconographie der schalentragenden europaeischen Meerestischmäuler. Vol. 3, Lfg. 22 u. 23. — Wiesbaden.

— (13). Rossmaesslers Iconographie der europaeischen Land- und Süßwasserconchylien. Neue Folge Bd. XI (Registerband). Wiesbaden.

— (14). Vide Martini & Chemnitz.

Kormos, T. Neue Beiträge zur recenten Gastropoden Fauna von Püspökfürdö. — In: *Allat. Kozl. Magyar Tars*, III, p. 102—111 (Ungar.).

— (2). Ueber den Ursprung der Succinea (Lucena) oblonga Drp. Ibid. p. 184 (ungarisch).

Korotnieff, A. de. Resultats d'une expédition zoologique au Lac Baikal. — In: Arch. Zool. Exper. II, p. 1—26 avec carte et 13 figs.

Kunkel, Karl. Zur Biologie des Limax variegatus. — In: Zool. Anzeiger, vol. XXVII, no. 18, p. 573.

Kroulikowsky, L. C. Notices Zoologiques. V. Données sur les Mollusques au district d'Ourjoum du gouv. de Viatka. — In: Bull. Soc. Oural, vol. 24, p. 43—45.

Lajos, S. Magyaroszógi íy Helicidák. — In: Ann. Mus. Hung. vol. 2, p. 292—295.

Lamplugh, G. W. Land-shells in the intra glacial Chalk-rubble at Sowerby, near Bridlington Quay. — In: Pr. Yorkshire geol. Soc., vol. XV, p. 91—95.

Lamy, Ed. Liste des Arches conservées, avec étiquettes de Lamarck dans les collections du Muséum de Paris. — In: Journal de Conchyliologie, vol. 52, p. 132—167.

— (2). Sur le pretendu genre Savignyarca (Jousseaume) Lamellibranche. — In: Bull. Mus. Paris, vol. IX, p. 140—142.

— (3). Sur une variété de l'Arca rhombea Born. Ibid. p. 393—397.

Lang, A. Ueber Vorversuche zur Untersuchung über die Varietätenbildung von Helix hortensis Müller und Helix nemoralis L. — In: Denkschr. Ges. Jena (Festschr. Haeckel) vol. XI, p. 437—506.

Lauterborn, R. Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins und seiner Umgebung II. Faunistische und biologische Notizen. — In: Mitth. Pollichia 1904. — Mollusca, p. 23—27.

Leboucher, J. & Letacq, A. L. Catalogue des Mollusques observés dans le département de l'Orne. — In: Bull. Soc. Normand, vol. VI, p. 186—221.

Lebour, M. V. Additions to the list of the Marine Mollusca of Northumberland. — In: Rep. Northumberland Sea Fish. Comm. 1903, p. 50.

Lehmann, A. Die Schnecken und Muscheln Deutschlands. — Eine Anleitung zur Bestimmung und Beobachtung der deutschen Land- und Süßwassermollusken, sowie zur Anlegung einer Schnecken- und Muschelsammlung. Zwickau 1904. 8°. 82 S. mit 2 Tafeln und 3 Texfiguren.

Lindholm, W. Zur Molluskenfauna der Gouvernements Kursk und Orenburg. — In: Ann. Mus. St. Petersbourg, vol. 8, p. 338—344.

Lindinger, Dr. L. Verzeichniss der in und um Erlangen beobachteten Mollusken. — In: Abh. naturh. Ges. Nürnberg, vol. XV, Heft 2, Jahresbericht für 1903 (Nürnberg 1904) S. 63—83.

Locard, A. Notices Conchyliologiques LVIII. Les huîtres des mers d'Europe. — In: Echange, vol. 20, p. 62, 71, 79 u. 84.

- Lowe, H. N.** A dredging trip to Santa Catalina Island. — In: *Nautilus*, vol. XVIII, p. 18—20.
- Lucas, B. R.** Notes on Isle of Man Mollusca. — In: *J. of Conch.* Leeds, v. 11, p. 90.
- **Mac Intosh, W. C.** The story of a pearl. — In: *Zoologist*, 1904, p. 41—56, pl. 1.
- Madison, J.** *Testacella scutulum* in Worcestershire. — In: *J. of Conch.* Leeds, vol. 11, p. 103.
- Madoulé, A.** Observations sur la Mode de distribution des Mollusques, soit en colonies soit plus ou moins isolément. — In: *Bull. Soc. Rouen*, vol. 38, p. 312—314.
- Maisonneuve, P.** La Faune de Maine-et-Loire. — In: *Anger et l'Anjou.* (Moll. p. 140—142).
- Malarld, A. E.** Les méthodes statistiques appliquées à l'étude des variations des Patelles. — In: *Bull. Musée Paris*, vol. 9, p. 270—274.
- (2). Sur un Lamellibranche nouveau, parasite des Synaptes. *Ibid.* p. 342—346.
- Maluquez y Nicolau, J.** Moluscos marinos de Llansa (Cataluña). — In: *Bol. Soc. Español*, vol. III, p. 226—235.
- Margier, E.** Mollusques terrestres de la haute-vallée du Verdon (Basses Alpes). — In: *Feuille Jeunes Naturalistes* vol. 34, p. 64, 65.
- Martens, Ed. von.** Die beschalten Gastropoden der deutschen Tiefsee-Expedition 1898—99. A. Systematisch-geographischer Theil. Sep. Abdr. aus: Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer Valdivia, herausgegeben von Carl Chun. Vol. VII. Mit 5 Tafeln.
- (2). Einige Conchylien vom Urmia-See. — In: *S.-Ber. Ges. naturf. Fr.* Berlin 1904, no. 1.
- (3). Verbreitungskärtchen von Landschnecken im deutschen Reiche. *Ibid.* p. 126—133.
- Martini & Chemnitz.** Conchylien-Cabinet. Neue Auflage. Lfg. 486—496. Enthält *Helix*, *Nanina* und *Agnatha* von Kobelt und den Schluss der Chitonidae von Clessin.
- Marquand, E. D.** Imperforate *Haliotis tuberculata*. — In: *J. of Conch.* Leeds, v. 11, p. 48.
- Melvill, J. C.** Descriptions of twenty three species of Gastro-poda from the Persian Gulf, Gulf of Oman, and Arabian Sea, dredged by Mr. F. W. Townsend of the Indo-European Telegraph Service, in 1903. — In: *Pr. malac. Soc. London*, vol. VI, p. 51—60, pl. 5.
- (2). Descriptions of twenty-eight species of Gastropoda from the Persian Gulf, Gulf of Oman, and Arabian See, dredged by Mr. F. W. Townsend 1900—1904. *Ibid.* p. 158—169, pl. 10.
- (3). Descriptions of twelve new species and one variety of Marine Gastropoda from the Persian Gulf, Gulf of Oman, and

Arabian Sea, collected by Mr. F. W. Townsend. — In: J. of Malac., vol. 11, p. 79—85, pl. 8.

— (4). On Berthais, a proposed new genus of Marine Gastropoda from the Gulf of Oman. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, p. 61—63, with fig.

— (5). Note upon *Oliva gibbosa* Born and its limits of variation. Ibid. p. 64, with fig.

— (6). *Conus coromandelicus* Smith, its probable affinities and systematic position in the family Conidae. Ibid. p. 170—173, with fig.

— (7). Note on *Mitra stephanucha* Melvill, with description of a proposed new variety. Ibid. p. 86, pl. 8.

Melvill, J. C. & R. Standen. Cypraeidae of the Persian Gulf, Gulf of Oman and North Arabian Sea, as exhibited in Mr. F. W. Townsend's Collections, 1903 u. 1904. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 117—122.

Menzel, Dr. H. Zwei neue Arten von *Valvata* Müll. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 36, p. 77, mit Textfig.

Metcalf, M. M. *Neritina virginea* var minor. — In: Amer. Natural., vol. 38, p. 565—569, with pl.

Moore, C. E. On the northernmost habitat of *Liguus fasciatus* on the Florida East Coast. — In: Nautilus, vol. 18, p. 88, 89.

Morlet L. Descriptions de Mollusques nouveaux recueillis par M. A. Pavie en Indochine. — In: Mission Pavie Indochine, Etudes Diverses III, p. 351—389, pl. 19—22 (Wiederabdrucke aus dem Journal de Conchyliologie).

Murdoch, R. B. Additions to the Marine Mollusca of New Zealand. — In: Trans. N. Zealand Inst. 1904, p. 217—232, pl. 7, 8.

Murie, J. Report on the sea-fisheries and fishing-industries of the Thames Estuary. London 8°. (Mollusca p. 172—224).

Newton, R. B. Notes on the Post-tertiary and Tertiary Fossils obtained by Col. English from the District surrounding the Dardanelles. — In: Quart. Journal Geol. Soc., vol. 60, p. 277—299, pl. 24.

Nobre, A. Mollusques et Brachiopodes de Portugal (suite). — In: Ann. Sci. nat. Porto, vol. 8, p. 141—151.

Nordmann, V. En Klump sammenkittede Molluskskaller fra Havbunden ved Loesp. — In: Medd. Danske Geol. For., vol. 9, p. 37—44.

— (2). Ostersens (*Ostrea edulis* L.) Udbredelse i Mitiden og Foretiden i Havet omkung Dänmark. Ibid. p. 45—60, mit Textfig.

Oldham, Chas. W. D. Crick (Necrolog). — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 116.

Pallary, Paul. Quatrième Contribution à l'étude de la Faune malacologique du Nord-Ouest de l'Afrique. — In: J. de Conch., vol. 52, p. 5—58, pl. 1—3.

- (2). Addition à la Faune Conchyliologique de la Méditerranée.
- In: Ann. Mus. Marseille Zool. Tome VIII Memoire 1—16 S. avec pl. 1.
- (3). Addition à la Faune malacologique du Golfe de Gabès.
- In: Journal de Conch., vol. 52, p. 212—248, pl. 7.
- Patterson, R. L.** The Common Mussel in Belfast Lough. — In: Irish Naturalist, vol. 13, p. 148—150.
- Pavie, A., Morlet, L., Dautzenberg, Ph. & H. Fischer.** Mollusques. — In: Indo-Chine 1879—1895. Etudes diverses. — III. Recherches sur l'Histoire naturelle de l'Indo-Chine orientale. Paris, 4°, p. 332—450, avec pl. 19—23.
- Pelseneer, P.** L'Acclimatation de certains Mollusques marins.
- In: C. R. Assoc. Francaise 1903, part II, p. 774—776.
- (2). Quelques problèmes zoologiques de l'Antarctique. Ibid. p. 810—12.
- Petch, T.** The published records of the Land- and Fresh-water Mollusca of the East Riding, with additions. — In: Trans. Hull Club, III, p. 121—172.
- Petersen, H.** Die Conchylienfauna des Nieder-Elbegebietes.
- In: Verh. Ver. Hamburg, vol. 12, p. 60—89.
- Pilsbry, H. A.** New Japanese Marine Mollusca: Gastropoda.
- In: Pr. Acad. Philad., vol. LVI, p. 3—37, pl. 1—6.
- (2). New Japanese Marine Mollusca: Pelecypoda. Ibid. p. 550—501, pl. 39—41.
- (3). A new floridian Amnicola (augustina n.). — In: Nautilus XVII, p. 113.
- (4). A new subspecies of Polygyra tridentata (depressa). Ibid. p. 142.
- (5). New Clausiliidae of the Japanese Empire X. — In: Pr. Acad. Philadelphia, vol. 56, p. 809—838, pl. 52—57.
- (6). Plectopylis in the Riukiu Islands. — In: Nautilus, vol. XVIII, p. 58.
- (7). A new Lower Californian Sonorella. Ibid. p. 59.
- (8). New species of Buccinum from the Kurile Islands. Ibid. p. 87, 88.
- (9). New Land-Snails from North Carolina. Ibid. p. 89, 90.
- (10). Tryons Manual of Conchology. Second Series, vol. XVI u. XVII (Achatinidae).
- Pilsbry, H. A. & Y. Hirase.** Descriptions of new Japanese Land-Snails. — In: Nautilus, vol. 104—108, 116—119. Vol. XVIII, p. 3—9, 32, 33.
- (2). Descriptions of new Land-Snails of the Japanese Empire. — In: Proc. Acad. Philadelphia, vol. 56, p. 616—638.
- Pilsbry, H. A. & E. G. Vanatta.** On certain Rhachiglossate Gasteropoda eliminated from the Aquillidae. — In: Pr. Acad. Philad., vol. 56, p. 592—595, with figs.

Ponsonby, J. H. Description of a Helicoid Land shell (*Xanthomelon bednalli*) from Central Australia. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, p. 182, fig.

Preston, H. B. Descriptions of some new species of Cingalese and Indian Marine Shells. — In: J. of Malac., vol. XI, p. 75—78, pl. 6 u. 7.

Pritchard, G. B. & J. H. Gatliff. Catalogue of the Marine Shells of Victoria. Part. VIII. — In: Pr. Soc. Victoria, vol. 17, p. 220—266.

— (2). On some new species of Victorian Mollusca. Ibid. p. 338, 339, pl. 20.

Raymond, W. J. A new Californian Trivia (*ritteri n.*). — In: Nautilus, vol. XVII, p. 85.

— (2). A new Dentalium from California (*vallicolens*). Ibid. p. 123.

— (3). Two new species of Pleurotoma from California. — In: Nautilus, vol. XVIII, p. 1—3.

Rhoads, S. N. A glimpse at the shell fauna of Delaware. — In: Nautilus, vol. 18, p. 63—67.

Ribeiro, A. de, *Limax variegatus* Drp. — In: Arch. Mus. Rio Janeiro XII, p. 138, 139.

Rochebrune, A. T. Sur une Collection d'Unionidae du dep. de la Charente. — In: Bull. Mus. Paris IX, p. 388—393.

— (2). Observations sur le genre Bartlettia. Ibid. vol. X, p. 60—62.

— (3). Monographie du genre Harmandia. Ibid. p. 138—141.

— (4). Recherches sur la validité de certains genres d'Unionidae Africains. Ibid. p. 254—263.

Rochebrune, A. T. & L. Germain. Diagnoses de Mollusques nouveaux provenant de la mission du Bourg de Bozas. — In: Bull. Mus. Paris, vol. 10, p. 141—144.

Roebuck, W. Denison. Re-establishment of *Limax tenellus* as a British Species. — In: J. of Conch. Leeds, v. 11, p. 106.

— (2). Radnorshire Slugs. Ibid. p. 128.

— (3). *Limax tenellus* in Scotland. — In: Ann. Scot. Nat. Hist. 1904, p. 218—221

— (4). Re-establishment of *Limax tenellus* as a British species.

— In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 106—109.

Rolle, H. Drei neue Najadeen aus Tonkin. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 36, p. 25, mit Taf. 1—4.

— (2). Diagnosen neuer Arten. Ibid. p. 35.

Rosen, O. von. Zwei neue Buliminus-Arten aus Central-Asien.

Rossmaessler, E. A. Vide Kobelt.

Scales, F. S. Collecting Land- and Freshwater Mollusca. — In: Knowledge, 1904, vol. I, p. 164.

Scharff, R. F. The Origin of the Land- and Freshwater Mollusca at present living in the British Island. Presidential Address. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 138—144.

Sell, C. Vide Jensen & Sell.

Seurat, L. G. Sur le Méléagrin du Lagon de Temoe (Crescent). — In: C.-R. Soc. Biologie, vol. 56, p. 293, 294.

— (2). Sur la biologie des huitres perlières et nacrières des îles Gambier. Ibid. p. 294, 295.

Simroth, H. Ueber Ostracolethe und einige Folgerungen für das System der Gastropoden — In: Zeitschr. f. wissensch. Zool., vol. 76, p. 612—672, t. 32.

— (2). Neuere Arbeiten über die Verbreitung der Gastropoden. — In: Zoolog. Centralblatt, vol. 11, p. 605—650.

— (3). Ueber die von Herrn Neumann in Abessinien gesammelten aulacopoden Nacktschnecken. — In: Zool. Jahrb. Systematik, vol. XIX, p. 673—726, mit 4 Tafeln und Textfiguren.

Smith, Edg. A. Note on Voluta brazieri, Cox. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, p. 178, fig.

— (2). Description of a new species of Cassis (fortisulcata). Ibid. p. 21, woodcut.

— (3). Descriptions of new species of Ena, Pseudoglessula and Subulina from British and German East Afrika. Ibid. p. 68 (woodcuts).

— (4). Some Remarks on the Mollusca of the Lake Tanganyika. Presidential Adress. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, no. 2, p. 77—104.

— (5). Description of a new species of Opisthostoma from Borneo (beddomei, mit Textfig.). Ibid. p. 105.

— (6). On a collection of Marine Shells from Port Alfred, Cape Colony. — In Journal of Malacology, vol. 11, p. 22—44, pl. 2, 3.

— (7). Note on the Epiphragms of Thaumastus sangoae and Th. bitaenius. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, p. 3, 4, fig.

— (8). Natural History Notes from H. M. Indian Marine Survey Steamer Investigator. Series III, No. 1. On Mollusca from the Bay of Bengal and the Arabian Sea. — In: Ann. Nat. Hist. vol. 13, p. 453—473; vol. XIV, p. 1—14.

— (9). Note on Terebra hedleyi Tate. — In: Pr. Linn. Soc. N. S. Wales, vol. 29, p. 211.

Soos, L. Magyarország Helicidái (die Heliciden Ungarns). — In: Allatt. Kozl. Magyar Tars III, p. 134—184.

Sowerby, G. B. Descriptions of six new species of marine Mollusca from the collection of the late Admiral Keppel. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, p. 174—177. Textfig.

— (2). Descriptions of Dolium magnificum and Murex multispinosus. Ibid. p. 7 u. 8 (woodcut).

— (3). Mollusca of South Afrika (Pelecypoda). — In: Marine Investigations South Africa, vol. IV, 19 S., 2 pl.

Sowinsky, W. Introduction à l'étude de la faune du bassin marin Ponto-Aralo-Kaspien sous le point de vue d'une province zoogéographique indépendante. — In: Zapiski Kiev. Obshch. vol. XVIII.

Standen, R. Report on the Wirral Peninsula Ramble. — In: J. of Conch. Leeds, v. 11, p. 49.

— (2). The Zebra Mussel (*Dreissensia polymorpha* Pallas). Ibid. p. 83.

Stearns, R. E. C. Limax maximus and other slugs in California. — In: Nautilus XVIII, p. 34.

Strehel, Hermann. Beiträge zur Kenntniss der Molluskenfauna der Magalhaen-Provinz. — In: Zoolog. Jahrb., vol. 21, Heft 2, p. 171—248, t. 3—8.

Sturany, R. Ueber einige von Herrn G. Paganetti-Hummller entdeckte Höhlenschnecken. Mit Textfiguren. — In: Nachrbl. D. mal. Ges., vol. 36, p. 103.

— (2). Ueber Kreta-Mollusken. Ibid. p. 108. Mit Textfig.

— (3). Kurze Diagnosen neuer Gastropoden. — In: Akad. Anzeiger Akad. Wien 21. April 1904.

Suter, Henry. New Landshells from New Zealand. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, p. 155—158, figs.

— (2). Report on the Mollusca collected by Messrs. Keith Lucas and G. L. Hodgkin in Six Lakes of New Zealand. — In: Trans. N.-Zealand Inst. 1904, p. 233.

— (3). The first discovered New Zealand Gundlachia (neozealandica). Ibid. p. 258.

— (4). Revision of the New Zealand Species of the Genus *Potamopyrgus*. With Description of a New Species (*subterraneus*). Ibid. p. 258—267. With figs.

— (5). Revision of the New Zealand Species of the Genus *Isidora*, with Description of a new subspecies. Ibid. p. 267—276, with figs.

Sykes, E. R. Notes on the Genus *Anoma*, Alb. — In: Pr. Mal. Soc. London, vol. 6, p. 152, with pl. 9.

— (2). Descriptions of two new species of *Melania* from the New Hebrides. Ibid. p. 13, woodcut.

— (3). On the Mollusca procured during the Porcupine Expedition 1869—70. Supplement Notes, part I. Ibid. p. 23—40, with pl. 3.

— (4). The Hawaiian species of *Opeas*. Ibid. p. 112, Textfig.

— (5). On a new species of *Amastra* from the Hawaiian Island. — In: Ann. N. H. 1904. VII, 14, p. 159, Textfig.

— (6). On some non marine shells from the Austro- and Indo-Malayan Regions. — In: J. of Malac., vol. XI, p. 87—92, pl. 9.

Taylor, Fred. Vivipara *conecta* var. *atropurpurea* at Wicken Fen, Cambs. — In: J. of Conch., vol. 11, p. 144.

- Taylor, J. W.** Monograph of the Land- and Freshwater Mollusca of the British Isles, part X, Leeds, 8°.
- Tesch, J. J.** The Thecosomata and Gymnosomata of the Siboga Expedition. Leiden 1904. 92 S., 6 Taf.
- Tomlin, J. R. le B.** Paludestrina anatina Drp. new to Britain. — In: J. of Conch. Leeds, vol. XI, p. 11.
- Tryon.** Vide Pilsbry.
- Vaughan, J. W.** A contribution toward a List of the Land- and Freshwater Mollusca of Breconshire and Radnoshire. — In: J. of Conch. Leeds, vol. 11, p. 56.
- Vayssiére, A.** Etude zoologique de l'Archidoris stellifera von Ihring. — In: Journal de Conchyliologie, vol. 52, p. 123—131.
- (2). Mollusques Hétéropodes provenant des campagnes des yachts Hirondelle & Princesse Alice (1885—1893). — In: Resultats camp. scientifiques Prince Monaco Fasc. 26.
- (3). Recherches zoologiques et anatomiques sur les Mollusques Opistobranches du Golfe de Marseille; Supplément. — In: Ann. Mus. Marseille, vol. VIII, p. 71—108. pl. 2 u. 3.
- Van Hyning.** Vide Hyning.
- Verco, J. C.** Notes on South Australian Marine Mollusca, with descriptions of new Species. Part I. — In: Trans. Roy. Soc. South Australia, vol. 28, p. 135—145, pl. 26.
- Verrill, A. E.** Additions to the Fauna of the Bermudas from the Yale Expedition of 1901, with notes on other species. — In: Trans. Connect. Acad., vol. 11, p. 15—62, t. 1—9.
- Walker, Bryant.** New species of Somatogyrus. — In: Nautilus, vol. XVII, pl. 5.
- (2). Notes on Eastern American Ancyli (with pl.). Ibid. vol. XVIII, p. 16, 25—29, 75—83, pl. I, II, V, VI.
- (3). Hints on collecting Land- and Fresh-Water Mollusca. — In: J. Applied Microsc. VI, p. 2365—2368.
- Welch, R.** Rare or local Irish Land- and Freshwater Mollusca. — In: J. of Conchol. Leeds, vol. 11, p. 16.
- (2). Some Results of a Flood in North Ireland. Ibid. p. 29.
- (3). Decalcification of Freshwater-Shells. — In: Irish Naturalist, vol. XIII, p. 29.
- Welch, R. & A. W. Stelfox.** The Mollusca of Bushy Park, Dublin. — In: Irish Naturalist, vol. XIII, p. 121—126.
- (2). Irish Field Club Union. Conference and Excursion at Sligo. Mollusca (Land- and Freshwater). Ibid. p. 183—193, pl. 8 u. 9.
- Webster, Rev. W. H.** New Mollusca from New Zealand. — In: Pr. mal. Soc. London, vol. 6, no. 2, p. 106. Mit Textfig.
- (2). Some new species of New Zealand Marine Shells together with remarks on some Non-marine Species and some Additions to the Index faunae — In: Tr. New Zealand Inst. 1904, p. 276—280, with pl. 9 u. 10.

Weldon, W. F. R. Note on a race of *Clausilia itala* (von Martens). — In: Biometrika, vol. III, p. 299—307.

Whitwell, W. *Helix Cantiana* Mtg. at Tooting Common, Surrey. — In: J. of Conchol. Leeds, vol. 11, p. 55.

— (2). *Physa acuta* Drp. at Kew Gardens. Ibid. p. 19.

Winkley, Rev. W. H. *Helix hortensis* in New England. — In: Nautilus, vol. XVII, p. 121.

Winkworth, J. T. Varieties of *Helix nemoralis*. — In: Essex Naturalist, vol. 13, p. 256.

Wissel, C. von. Pacificische Chitonen der Sammlungen Schauinsland und Thilenius, nebst einem Anhang über drei neuseeländische Species der Gattung *Oncidiella*. — In: Zool. Jahrb. Syst., vol. 20, p. 591—676, mit 5 Taf.

Woodward, B. B. The British Species of *Vallonia*. — In J. of Conch. Leeds, v. 11, p. 82.

— (2). Mollusca. — In the: Victoria History of the County of Bedfordshire. Vol. 1, p. 69, 70.

— (3). Mollusca. — In the: Victoria History of the County of Warwick. Vol. I, p. 67, 68.

Wright, C. E. *Succinea oblonga* Drp. var. *alba*. — In: J. of Conch. Leeds, v. 11, p. 96.

— (2) Vide Beeston & Wright.

I. Geographische Verbreitung.

a) Binnенconchylien.

Allgemeines.

1901. **Ancey** in J. Conch. v. 49 erörtert die Beziehungen der Molluskenfaunen der südlichsten Länder und ihre Bedeutung für die Theorie von der ehemaligen Existenz eines antarktischen (richtiger nothialen) Kontinentes. Er findet auch in der südafrikanischen Fauna antarktische Elemente. *Ancylus caffer* Krauss hat seine nächsten Verwandten in dem tasmanischen *Ancylastrum cuminianum* Bourg., *Bul. bowkeri* und einige Verwandte schliessen sich den südamerikanischen *Eudiotopus* an (was allerdings erst anatomisch nachzuweisen wäre), die *Trachycystis* an die *Stephanoda* von Juan Fernandez und die neuseeländischen *Flammulina*, die *Bulimus* von St. Helena südamerikanischen Gruppen (was sicher falsch ist). In den Endodonta derselben Insel sieht er einen besonders wichtigen Ueberrest der uralten antarktischen Fauna; ebenso in den *Succineen* der Gruppe *Helisiga*. Er erörtert ferner die Faunen von Tristan da Cunha, den Falklandinseln, Juan Fernandez und Masafuera, der polynesischen Inselgruppen südlich vom Aequator, und die Verbreitung zahlreicher Molluskengattungen.

Ueber dieselbe Frage äussert sich **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 125, er macht einige kritische Bemerkungen zu Einzelangaben von Ancey.

Pilsbry 1901, Pr. Phil. p. 142, erklärt die von ihm aufgestellte südamerikanische Gattung *Neobeliscus* für die, nächste Verwandte des *Atopocochlis exaratus* von den Guineainseln und sieht darin einen Beweis für alten Landzusammenhang.

Auch **Simroth** 1901, Geogr. Zeitschr. p. 655, erörtert das Problem des früheren Landzusammenhangs auf der südlichen Hemisphäre.

Ebenso **Suter** 1901, in J. Conch. vol. 49; er stellt wie Pilsbry die *Ridleya* von Fernando Noronha zu den südamerikanischen *Polygyratia* und hätt die Endodontiden für polynesischen, nicht antarktischen Ursprungs. — **Ancey** 1903 J. Conch. vol. 51 vertritt geschickt und energisch seine Ansicht (die Gruppe des *Hyperaulus ridleyi* ist nach Pilsbry im Miocän von Florida reich vertreten; cfr. Jahresber. 1896—1900 p. 283).

Palaearktisches Gebiet.

Die paläarktischen Clausiliien stellt **Westerlund** 1901 Mem. Ac. Petersb. in einem systematischen Katalog zusammen; vgl. die Befprechung von **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 48.

Von **Kobelt's** Jkonographie sind in der Berichtsperiode zwei Doppellieferungen des neunten und der zehnte Band erschienen; die zahlreichen neuen Arten sind im systematischen Theil aufgeführt, sie stammen zum weitaus grösseren Theile aus dem Circummediterran-gebiet; sie einzeln bei den betreffenden Ländern anzuführen erscheint kaum nöthig. Als elfter Band der neuen Folge ist 1904 ein Registerband erschienen, der neben einem systematischen, einem kritischen und einem alphabetischen Register der aufgezählten Arten auch eine ins Einzelne gehende Uebersicht der geographischen Verbreitung der einzelnen Gattungen und auch der Faunen der einzelnen natürlichen Bezirke enthält. (Das Unternehmen wird fortgesetzt.)

Die Verbreitung von *Pomatias septemspiralis* erörtert **Martens** 1902 S.-B. nat. Berlin p. 02; die Ausbreitung von *Xerophila obvia* derselbe ibid. p. 45. — **Westerlund** 1902 Nachrbl. beschreibt in zwei Aufsätzen eine grosse Anzahl neuer Arten aus den verschiedensten palaearktischen Gebieten.

Kobelt 1903 Nachrbl. p. 113 giebt eine Uebersicht über den heutigen Stand unserer Kenntnis der Verbreitung der europäischen Binnencoonylien. — **Gude** 1902 giebt auch die Helicidenfauna der zum europäisch-palaearktischen Faunengebiete gehörenden Theile Asiens. — **Simroth** 1902 zählt die aus dem gesammten russischen Reiche bekannten Nacktschnecken auf.

Skandinavien. **Brøgger** 1901 Norges Geol. Undersog. no. 31 erörtert die postglaziale Fauna der Gegend von Christiania. —

Westerlund 1902 und **Nordenskiöld** 1902 beschreiben eine Anzahl neuer Süßwasserarten.

Finland. **Steenroos** 1901 Act. Soc. fenn. zählt die Mollusken des Nurmijärvi-Sees auf.

Dänemark. **Sell** 1901 Nachrbl. zählt die Fauna des Furesö bei Kopenhagen auf. — **Westerlund** 1902 Nachrbl. beschreibt einige neue Planorbis. — **Johansen** 1902 Nachrbl. macht Bemerkungen zu der Arbeit von Sell und berichtet über das Vorkommen von *Assiminea grayana* in Dänemark. — **Sell** 1903 giebt einige Beiträge zur Fauna von Dänemark. — **Wesenberg-Lund** 1903 weist im Furesö eine Reliktenfauna nach. — **Jensen & Sell** 1904 Nachrbl. p. 117 geben die Fauna des Söborghus-Sees auf Seeland.

England. **Taylor's** gross angelegtes Werk über die englischen Binnenconchylien schreitet zwar etwas langsam, aber regelmässig fort; die in der Berichtsperiode erschienenen Abtheilungen behandeln die Nacktschnecken; für jede Art ist ein farbiges Kärtchen beigegeben.

1901. **Adams & Woodward** Sci. Goss. zählen die Binnenconchylienfauna von Hampshire auf, — **Buddicom** die von Church Stretton. — **Collier** zählt die aus Lancashire bekannten verkehrt gewundenen Helices auf. — **Grierson** giebt die Fauna der Cty. Latrim in Island, — **Horsley** die von Porthleven in Cornwall. — **Johnson & White** machen wichtige Bemerkungen über die Mollusken des Flussgenistes bei Uphall Estate in Essex. — **Long** behandelt die Fauna des Distriktes von Burnley, — **Scott** die der Clyde area. — Die in den englischen Gewässern neu eingeschleppte *Paludestrina jenkinsi* behandelt **Smith**, Ann. Nat. Hist. VII. — **Whitwell** macht Mittheilungen zur Fauna von East Sussex.

Corbett 1902 Naturalist zählt die Landschnecken von Doncaster auf. — **Crowther** 1902 Halifax Natural. die Süßwasserarten von Tag Lock; — die aus dem Themsegebiet **Cornish** 1902; — die Fauna von Staffordshire **Masefield** 1902 Rep. N. Staffordsh. Club v. 36 p. 45. — Die Mollusken der Pfarrei Mendelsham in Suffolk **Mayfield** 1902 Tr. Norfolk Soc. VII p. 348. — die Fauna von Surrey **Pannell** 1902, J. Conch. Leeds X p. 108; — die Fauna der Clyde Area **Scott** 1901 Brit. Assoc. Handbook p. 510—571; — deren geographische Bedeutung und Biologie **Somerville** 1902 J. Conch. Leeds X p. 137. — **Woodroff-Peacock** zählt die Schnecken aus dem Genist des River Ancholme in Cadney Parish, Lincolnshire auf.

1903. Eine Aufzählung der britischen Binnenconchylien, in welcher besonders die Nomenclatur in sorgsamster Weise den heute geltenden Nomenclaturregeln angepasst ist, giebt **Woodward** in J. of Conch. X p. 352. — Derselbe hat (in Victoria History) die Molluskenfaunen der Grafschaften Cumberland, Norfolk, Worcestershire, Hertford, Surrey und Essex, und mit **Adams** zusammen von Northampton gegeben. — 1902. **Chaster & Tomlin** haben *Vertigo Lilljeborgi* in Irland wiedergefunden. — **Grierson** zählt die Fauna

der irischen Grafschaft Kilkenny auf. — Die Verbreitung von *Paludestrina jenkinsi* in Essex erörtern **Kennard & Woodward**. — Die Binnencoonylien von Lincolnshire zählt **Kew** auf; — die von Staffordshire **Masefield**, — die der Pfarrei Mendlesham in Suffolk **Mayfield**, — die von Surrey **Pannell**.

1903. Bemerkungen über die Binnencoonylien des östlichen Suffolk giebt **Mayfield**, — einige Zusätze zur Fauna von Surrey **Pannell**. — **Tomlin** weist *Vertigo heldi* in Irland nach. — **Tomlin & Marquard** zählen die Binnencoonylienfauna der Kanalinseln auf. **Woodward**, J. Conch. X behandelt die seither unter *Vitrea glabra* vereinigten drei Hyalinarten und beschreibt eine neue Art (*V. rogersi*). — Die Mollusken des Great Yarmouth District zählt **Patterson** auf; — **Knight** die wenig zahlreichen Arten der äusseren Hebriden.

Crowther 1903 Halifax Natural. zählt die Mollusken der Pfarrei Halifax (Schottland) auf.

1904. **Woodward** gibt eine Revision der Fauna von Bedfordshire, — **Vaughan** von Brecon u. Radnor, — **Brindley** von Cambridgeshire, — von Wirral Peninsula in Cheshire **Standen**, — von Millers Dale in Derbyshire **Jackson**, — von Ilfracombe in Devonshire **Breston & Wright**, — von der Insel Man **Lucas**, — von Grange-over-Sands in Lancashire **Jackson & Moore**, aus Lancashire ferner **Dean**, — von Droyloden **Taylor**, — von Lancaster **Dean**, — aus Oxfordshire, speciell der Umgegend von Oxford **Napier & Carpenter**, — aus Warwickshire **Woodward**. Kleinere faunistische Mittheilungen machen: **Baldwin**, **Wright**, **Petch**, **Petty**, **Peacock**, **Carter**, **Roebuck**, **Whitwell**, **Crowther**, **Godfrey** u. A. — Aus Irland: **Welch**, **Grierson**, **Stelfox**. — Fauna der Hebriden **Godfrey**. — Faroe und Orkneys **Collinge**.

Deutschland. **Schmidt** 1901 zählt vom Seeberg bei Gotha 41 Sp. auf, sämtlich weitverbreitete deutsche Formen. — **Kraepelin** giebt eine Zusammenstellung der Fauna von Hamburg. — **Schmidt** 1901 Nachrbl. behandelt das Vorkommen von *Pupa secale* und *Patula rupestris* in Thüringen. — **Stensloff** 1902 Nachrbl. weist die drei deutschen Xerophilen aus Mecklenburg nach. — **Wittich** 1902 Nachrbl. vergleicht die quaternäre Fauna der Provinz Starkenburg mit der recenten. — **Protz** 1903 Nachrbl. erörtert die Binnennolluskenfauna von Ostpreussen, — **Wüst** 1903 Nachrbl. die Ausbreitung von *Xerophila obvia*, — **Geyer** 1903 die Molluskenfauna von Württemberg, — **Martens** 1903 Ber. Ges. Berlin bespricht das Vorkommen von *Campylaea presliai* und *Pupa edentula* bei Reichenhall. — **Lindinger** 1904 zählt die Fauna der Umgebung von Erlangen auf. — **Geyer** 1904 Jahresh. Württemberg p. 207—334 bearbeitet die württembergische *Vitrella* nach sehr reichem, zum grossen Theil lebend gesammeltem Material und kommt zu sehr überraschenden Resultaten bezüglich der Speziesumgrenzung. — **Goldfuss** 1904 Nachrbl. p. 61 gibt einen erheblichen Beitrag zur Fauna von Schlesien. — **Lehmann** 1904 giebt in einem eigenen

Werkchen mit 2 Tafeln eine Molluskenfauna von Deutschland. — Die Fauna der Umgebung von Hamburg behandeln **Petersen** 1904 und **Ulmer** 1904, letzterer speziell die des Eppendorfer Moores. — **Martens** 1904 berichtet über einen vom Berliner Museum unternommenen Versuch, die Verbreitung der Mollusken in Deutschland durch besondere Kärtchen für jede Art festzulegen. — Eine neue *Valvata* aus Bayern beschreibt **Menzel**.

Oestreichisches Alpengebiet. **Gallenstein** 1901 Nachrbl. giebt eine sehr sorgfältig gearbeitete Zusammenstellung der Stylommatophoren von Kärnthen (keine n. sp.). — **Gredler** 1902 Nachrbl. giebt eine Fauna des Thales von Kartitsch, Draugebiet, und beschreibt eine neue *Clausilia* (wiedermayeri). — **Sturany** 1902 Nachrbl. erörtert die merkwürdige Verbreitung von *Cylindrus obtusus* Drp. in den oestreichischen Alpen. — Die Fauna des Thales Kartitsch zählt **Wiedermayer** 1901 *Ferdinandeum* auf; — einige Arten aus dem Lagerthal **Gredler** 1903 ibid. vol. 46, p. 285.

Ungarn. **Brusina** 1903 in Mitth. Ver. Steiermark für 1902 erörtert das eigenthümliche Vorkommen der *Melanopsis parreyssi* im warmen Wasser des Bischofsbades bei Grosswardein. — **Bemerkungen** über dasselbe macht **Kormos** 1904. — **Csiki** 1904 beschreibt einige neue Clausiliensformen aus Ungarn. — **Lajos** 1904 beschreibt einige neue Arten von *Fruticicola* und *Xerophila*. — **Soos** 1904 giebt eine Revision der ungarischen Heliciden.

Deutsch-Oestreich. **Schierl** 1901 Club Brünn gibt ein Verzeichniss der Molluskenfauna Mährens. — **Absolon** 1903 in Nestn. Klub Prostejove II, p. 61 berichtet über ein subterranea Vorkommen von *Hyalina cellaria*.

Finland. **Luther** 1901 Acta Soc. Fenn. gibt eine Uebersicht der Verbreitung der Mollusken in Finland. Nach der Karte trennt er das Gebiet durch eine Linie, die etwa dem 28° ö. L. entspricht, in zwei Hälften, welche dann wieder in 29 Bezirke zerfallen. — Die Arbeit von **Levander**, obwohl vorwiegend mit den Meermollusken der Gegend von Helsingfors beschäftigt, enthält auch zahlreiche Süsswasser- und Brakwasserformen. — **Steuroos** behandelt das Thierleben im Nurmijarvi-See. — **Westerlund** 1902 beschreibt einen neuen *Planorbis* (*pupillus*).

Schweiz. **Imhof** 1901 Biol. Centralbl. zählt die Wassermollusken der Schweiz und besonders der schweizer Seen auf. — **Kobelt** 1902 Nachrbl. p. 104 erörtert das Vorkommen von *Campylaea cingulata* bei Lugano. — **Collier** zählt einige von ihm in der Höhe von über 6000 Fuss im Wallis gefundene Mollusken auf.

Dalmatien u. Herzegowina. Eine hochinteressante neue Höhlenschnecke (*Spelaeoconcha paganettii*) aus einer Höhle auf der Insel Curzola beschreibt **Sturany** 1902 in Verh. Ges. Wien, vol. 51 und Nachrbl. — Derselbe 1902 in Notizen Wiener Hofmus. giebt Beiträge zur Fauna Dalmatiens und der Herzegowina. — **Wagner** 1902 Monogr. *Pomatias* beschreibt eine neue Art (*P. roseoli*) aus der Herzegowina. — **Sturany** 1904 beschreibt einige neue Höhlen-

formen aus der Hercegovina, darunter die merkwürdige neue Gattung *Pholeoteras*, eine Pupide mit Gitterskulptur.

Portugal. 1901 **Cotter** zählt die im Basalttuff von Lissabon vorkommenden Landschnecken auf; die Fauna ist wegen dreier von dort beschriebener Buliminus von geographischer Bedeutung, gehört aber vermutlich den Grenzschichten zwischen Kreide und Eocän an.

Spanien. Eine Anzahl neuer Arten beschreibt **Westerlund** 1902 Bol. Soc. Esp. II, p. 236 (dieselben sind aus Nachrbl. 1902 p. 19 abgedruckt). — Einige Arten von Moncayo in Arragonien zählt **Nayas** 1904 auf; — aus der Umgebung von Saragossa **Bovio** 1904. — Beiträge zur Fauna von Katalonien gibt auch **Caziot** 1904 (5 & 6).

Eine Anzahl Landschnecken von Majorka, Balearen zählt **Horsley** 1904 auf.

Frankreich. 1901 **Bonnemière** gibt eine Aufzählung der Süsswassermollusken, die mir nicht zugänglich geworden ist. — **Dumas** setzt seine Conchyliologie bourbonnais fort. — **Martel** zählt die Fauna der Umgebung von Cancale auf. — **Moutier** gibt einen Nachtrag zur Fauna von Caën. — **Granger** 1903 Actes Soc. Bordeaux gibt eine Aufzählung der französischen Helices. — **Germain** 1903 & 1904 zählt die Binnenconchylien der Umgebung von Anger und im Dep. Maine-et-Loire auf. — **Letacq** 1903 erörtert die Verbreitung von *Margaritana margaritifera* in der Sarthe, der Gourbe und dem Udon. — **Locard** 1903 beschreibt eine neue *Lartetia (umbilicata)* aus Südfrankreich. — Derselbe 1902 gibt einige Beiträge zur Fauna der unterirdischen Gewässer Südfrankreichs. — Die Verbreitung von *Torquilla similis* Brug. in Südfrankreich und an der Riviera erörtert **Margier** 1901 Feuille jeunes nat. p. 139. — **Leboucher & Letacq** 1904 geben die Fauna des Dep. Orne; — **Maisonneuve** 1904 einige Nachträge zu Maine-et-Loire; — **Rochebrune** 1904 die Najadeen und die Limnaeiden der Charente; — **Germain** 1904 zählt die Heliciden von Dieppe auf; — **Dauphin** eine Anzahl Arten von Brides-les-Bains in Savoyen; — **Margier** 1904 gibt die Fauna von Verdon in den Basses-Alpen.

Italien. **Monterosato** 1901 Nachrbl. p. 186 beschreibt eine neue *Xerophila (vigiliana)* aus dem Hochgebirge der Abruzzen. — **Bellini** 1903 Boll. Soc. Napoli zählt die Fauna des Lago di Fusaro auf. — **Issel** 1901 Act. Soc. Ligust. macht interessante Mittheilungen über die Mollusken der italienischen Thermalquellen.

Kobelt 1903 Ann. zool. Napoli beschreibt zehn neue Arten *Helix* (1 *Pomatis*, 9 *Iberus*) aus Süditalien; dieselben sind auch in vol. 10 der Iconographie abgebildet. — **Kobelt** 1904 Nachrbl. gibt eine eingehende Schilderung zweier mehrwöchentlicher Sammelausflüge nach der Gegend südlich von Neapel (Provinz Salerno, Basilicata und Nordkalabrien) und beschreibt eine Reihe neuer

Iberusformen von da. — Die Süßwassermollusken der Gegend von Neapel zählt **Bellini** 1904 auf.

Korsika. **Caziot** 1902 (oder 1903) giebt eine sehr sorgfältig gearbeitete, durchweg auf eigenem Material beruhende Zusammenstellung der Molluskenfauna mit sorgfältiger Aufzählung der Fundorte. Es hat die beiden von Mabille als neu beschriebenen Pomatiás eben so wenig am Originalfundort wiedergefunden, wie das von Requien angegebene Pomatiás obscurus. — Derselbe 1901 C.-R. Ass. franc. giebt eine Vergleichung der Faunen von Korsika und Sardinien. — Derselbe 1904 giebt einen Nachtrag zur korsischen Fauna.

Balkanhalbinsel. Eine Sammelexkursion durch Montenegro beschreibt **Wohlberedt** 1901 Abh. Görlitz, v. 23, p. 181 (1 n. sp.); — **Westerlund** 1902 Nachrbl. eine neue *Hydrobia (sturanyi)* aus Macedonien. — Neue Pomatiáarten beschreibt **Kobelt** in der Ikonographie und im Martini-Chemnitz.

Griechenland. **Kobelt** 1902 in Mart. Chemn. erörtert eingehend die Verbreitung der Formen der *Helix (Codringtonia) codringtonia* Gray und beschreibt drei n. sp. — **Sturany** 1902 Nachrbl. zählt eine grössere Anzahl in Pelopones gesammelter Landschnecken auf. — **Westerlund** 1902 Nachrbl. beschreibt einige neue *Helix* und *Buliminus*. — **Martens** 1903 Arch. f. Nat., v. 69 giebt einen Nachtrag zur Ausbeute von Oertzen.

Russland. **Lindholm** 1901 Nachrbl. 160 giebt ein Molluskenverzeichniß von Nowyi Oskol im Gouv. Kursk und zählt p. 185 eine Anzahl Arten aus dem Gouv. Charkow auf. — **Luther** 1901 Act. Soc. fennica beschreibt aus der Umgebung von Reval 65 Arten auf, davon 12 für Esthland neu. — **Simroth** 1902 zählt in einer umfangreichen Arbeit mit zahlreichen Tafeln die Nacktschnecken des gesamten Russischen Reiches in Europa und Asien auf und beschreibt ausser zahlreichen neuen Arten zwei neue Gattungen aus dem Kaukasus. — **Lindholm** 1902 Nachrbl. zählt die Fauna der Umgebung von Petersburg auf. — Derselbe giebt 1903 Ann. Mus. Petersb. die Fauna der Gouvernements Kursk und Orenburg, und weist *Unio tumidus*, *limosus*, *batavus* und *ater* in den Zuflüssen von Ural und Kama nach. — **Rosen** 1901 zählt die in der nächsten Umgebung von Charkow von ihm gefundenen Arten auf. — Einige Arten von Urjum, Gouv. Diatka, zählt **Krulinowsky** 1904 auf.

Rumänien. **Licherdopol** 1902 Bull. Bucarest 9 u. 10 giebt Notizen über die Molluskenfaunen verschiedener Departements von Rumänien. — **Kobelt** 1904 Nachrbl. zählt 18 Landschnecken von Sinaja auf; — **Gaudet** 1904 Bull. Bucarest, v. 13, p. 491 eine Anzahl Arten aus der Umgebung von Bukarest.

Creta. Eine neue *Albinaria* aus Creta beschreibt **Boettger** 1901 Nachrbl. p. 127. — **Sturany** 1904 Nachrbl. p. 108 zählt vom Grafen Attems gesammelte Arten auf (1 n. sp. *Clausilia*).

Vorderasien. Die Fauna von Cheikle in Nordsyrien zählt **Naegele** 1901 Nachrbl. p. 16 (24 sp., 5 n. sp.). — Derselbe ebenda

p. 27 von Urmia im persischen Armenien eine Anzahl Arten (1 n. var.). — Eine Anzahl weiterer neuer Arten zählt Derselbe 1902 Nachrbl auf; — eine neue *Helix (karagolica)* **Westerlund** 1902 ebenda, ebenso eine neue *Helix (vernicata)* aus Syrien. — **Gude** 1902 zählt die Heliciden der verschiedenen vorderasiatischen Provinzen auf, auch von Persien und Arabien.

Aus dem Urmia-See erwähnt **Martens** 1904 S.-B. Ges. Berlin 4 Arten (keine n. sp.).

Nordafrica. **Pallary** 1901 J. C. p. 226 beschreibt eine Anzahl neuer Arten aus Marocco, — eine weitere Anzahl 1901 in C.-R. Assoc. franc. 1900, p. 731; — eine grössere Anzahl 1904 J. Conch. v. 52. — Ebenda zählt Derselbe sämmtliche aus Marocco bekannte Binnенconchylien auf (400 sp.).

Egypten. **Pallary** 1901 Bull. Inst. Egypte II beschreibt eine Anzahl neuer Arten aus dem seither unerforschten Gebiete zwischen Nil und Rothem Meer; und ebenda 1903 III eine Anzahl von Jnnes Bey gesammelter Arten vom oberen Nil.

Sibirien. Fünf neue *Choanamphalus* aus der Angara beschreibt **Dybowski** 1901 Nachrbl. p. 119. — Derselbe behandelt ibid. p. 129 die Binnенconchylien des Amurlandes. — Die Cycladiden des Baikalsees behandelt Derselbe 1902 Nachrbl. p. 65. — **Simroth** 1902 zählt mit den russischen auch die sibirischen Nacktschnecken auf; — **Gude** 1902 Ann. N. G. v. 10 die Heliciden.

Dybowski 1903 Nachrbl. p. 7 beschreibt eine Anzahl ost-sibirischer Landschnecken, und zählt (Ann. St. Petersb. VIII, p. 40) einige Arten aus Kamschatka auf.

Hochasien. **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. veröffentlicht die zweite Abtheilung der Bearbeitung der Ausbeute der russischen Expeditionen nach Gansu, Sytshuan und Schensi, vorwiegend Buliminus, von denen jetzt 116 Arten bekannt sind; fünf neue, z. th. sehr eigenthümliche Untergattungen. Im Anhang wird eine Uebersicht der geographischen Verbreitung der chinesischen Mollusken gegeben. M. unterscheidet 9 zoogeographische Provinzen die sich mit der politischen Eintheilung nicht decken. Die Abgrenzung ist indess nur eine provisorische. — **Gude** 1902 J. Mal. v. 9 giebt eine systematische Aufzählung der centralasiatischen Heliciden (*Macrochlamys coeligena* n. aus Russisch-Turkestan). — **Ancey** 1902 *Nautilus* v. 16 beschreibt zwei neue Buliminus von ebenda. — **Simroth** 1902 Nacktschn. russ. Reich zählt auch die centralasiatischen Nacktschnecken auf. — Zwei neue Buliminus aus Centralasien beschreibt **Rosen** 1904 Nachrbl. p. 169.

Tropisches Asien. **Gude** 1902 J. Mal. IX giebt eine sorgfältig gearbeitete Zusammenstellung der Heliciden sämmtlicher zum Erdtheil Asien gehörenden Länder.

China. Drei neue Arten aus Inner-China beschreibt **Gredler** 1901 Nachrbl. p. 150.

In der zweiten Hälfte der Bearbeitung von Potanin's Ausbeute enthüllt **Moellendorff** einen ungeahnten Reichthum von Buliminus-

Arten, die aber alle zu von den europäischen verschiedenen Unter-gattungen gehören; die Westgrenze läuft durch die transkaspische und persische Wüste, nach Osten bildet die Wasserscheide des Hoangho eine äusserst scharfe Grenze, die kein Buliminus überschreitet; nach Süden liegt die Grenze im Kamm des Tsing-ling-Gebirges.

Gude 1902 J. Mal. v. 10 zählt die Heliciden von China einschliesslich Hainan und Formosa auf.

Heude 1901 J. Conch. p. 35 macht einige Bemerkungen über das Verhältniss der Fauna des Yangtse zur Fauna von Annam; etwa ein halbs Dutzend Unioniden ist gemeinsam; eine Verschleppung durch Vögel ist eben so wenig wahrscheinlich, wie eine Wanderung durch die Berge von Yünnan; dagegen kann eine Verbindung durch das Küstenland bei etwas höherem Stand der Gewässer stattgefunden haben. — **Sturany** 1901 hat die Mollusken der dritten Forschungsreise des Grafen Eug. Zichy bearbeitet. — Eine Anzahl Arten aus Shantung beschreiben **Jones & Preston** 1904 Waterwitch.

Japan. **Pilsbry** 1901 Ann. N. H. VIII giebt eine vorläufige geographische Uebersicht über die Binnенconchylienfauna. Das paläarktische Element ist unbedeutend, dagegen hat eine starke ostasiatische Beimengung die Inseln auf zwei verschiedenen Wegen erreicht, aus dem Amurgebiet über Sachalin, und aus China über die Liu-kius und Formosa. Die Liukius hatten zweifellos früher einen Landzusammenhang über Hokkaido mit Japan, der früher unterbrochen wurde, als der mit Hakkido und Honda. Die Isolirung vieler Inseln hat erst stattgefunden nach der Ausbildung der heutigen Fauna; viele haben selbst die Lokalrassen gemein.

Japan u. Liu Kiu Inseln. Neue und kritische Landschnecken von Japan und den Liu-kiu Inseln zählt **Moellendorff** 1901 Nach-rbl. p. 33 auf (1 nov. gen. Gastrodonta, 6 n. sp.). Zahlreiche neue Arten **Pilsbry** 1901 Pr. Phil., p. 345, p. 402; — Die Clausiliiden der Liu-Kiu Derselbe ibid. p. 409; — ferner japanische Mollusken Derselbe, ibid. p. 465, p. 495. — Zahlreiche neue Arten beschreibt auch **Gude** 1901 in verschiedenen Arbeiten, — **Pilsbry** und **Pilsbry & Hirase** 1902 in Pr. Phil. und Nautilus vol. 15 u. 16 bereichern die Fauna von Japan um eine grosse Zahl von Arten aus den verschiedensten Gattungen. — **Pilsbry & Gulick** zählen die Fauna von Yesso auf. — **Gude** 1902 Ann. N. H. X beschreibt eine neue Eulota (gereti).

Pilsbry allein oder mit **Hirase** zusammen setzt seine Veröffentlichungen neuer Arten auch in den Jahren 1903 und 1904 in den Pr. Philadelphia und dem Nautilus fort und enthüllt einen überraschenden Reichthum der japanischen Fauna.

Hirase 1903 giebt mit Nautilus vol. XVI einen Katalog der japanischen Binnенconchylien mit Abbildungen von einem Dutzend noch unabgebildeter Formen.

Vorderindien. Eine neue Diplommatinide von Darjiling beschreibt **Fulton** 1901.

Südindien. Ein neues Cyathopoma (peilei) von Yerkand in den Shevroy Hills beschreibt **Preston** 1903 Pr. mal. Soc. V, p. 340.

Ceylon. **Collett** 1902 J. Ceylon As. Soc. XVI giebt die zweite Abtheilung der Molluskenfauna von Ambagamuwa. — Eine neue *Jerdonia (serendibensis)* von Pussevalla beschreibt **Preston** 1903 Pr. Mal. Soc. V, p. 340; — zwei neue *Cataulus* **Fulton** 1903 J. Mal. X, p. 102; — einige weitere *Cataulus* **Fulton** 1904 Ann. Hist. XIII, p. 452; — eine neue *Corilla* **Gude** 1904 J. Mal. XI, p. 45.

Niederländisch Indien. Von der kleinen Insel Roma bei Alor beschreibt **Moellendorff** 1903 Nachrbl. p. 106 eine *Chloritis (romaënsis)* und eine *Xestina (rugosissima)*; — **Rolle** ibid. p. 157 eine neue Varietät (*romaënsis*) des *Amphidromus laevus*, und (var. *gracilis*) des *Amph. inconstans*; — zwei neue *Trochomorpha* von Engano Island **Sykes** 1904 J. Mal. XI.

Tenimber Inseln. Eine *Cochlostyla (Calocochleas talautana)* beschreibt **Gude** 1903 J. Mal. X, p. 49.

Andamanen. **Fulton** 1903 J. Mal. X beschreibt eine neue *Macrochlamys (subconvallata)*. Fundort nicht ganz sicher.

Die Fundortsangabe Andamanen für zwei *Microparmarion* bei **Collinge** 1901 J. Mal. VIII beruht auf einem Irrthum; die Arten sind aus Annam; — **Collinge** 1901 J. Mal. VIII, p. 120.

Hinterindien. Einen vierten Beitrag zur Fauna von Annam giebt **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 45 (4 n. sp.). — 45 von Frustorfer in Tongking, besonders im Manson-Gebirge gesammelte Arten Derselbe 1901 ibid. p. 64; weitere 20 ibid. p. 110. — **Gude** 1901 in J. Mal. VII und J. de Conch. v. 49 beschreibt eine Anzahl *Plectopylis* aus Tongking. — **Heude** 1901 J. Conch. macht Bemerkungen über das Verhältniss der Süßwasserfauna von Annam zu der des Yang-tse-kiang. — **Blanford** 1902 Pr. mal. Soc. v. 5 beschreibt aus Siam eine neue Art von *Rhiostoma (dalyi)* und *Sesara (megalodon)*. — **Moellendorff** 1902 Nachrbl. in verschiedenen Aufsätzen zählt zahlreiche neue Arten aus Siam und Tongking, von der Insel Kelantan und von Perak auf. — **Martens** 1902 Nachrbl. beschreibt eine Anzahl *Anodontia*, *Nodularia*, *Quadrula* und *Pseudodon* aus Tongking und Annam. — **Sykes** 1902 Pr. mal. Soc. vol. 5 giebt eine Revision der aus Tongking beschriebenen Clausiliens (chiem-hoaënsis n.). — **Gude** 1902 Ann. N. H. v. 10 beschreibt eine neue *Ganesella (procera)* aus Tongking; — **Fulton** 1902 Ann. N. H. v. 9 einen neuen *Alycaeus (conformis)* aus Perak. — Die Fauna der Insel Kelantan haben ausser Moellendorff auch **Sykes** 1902 J. Mal. v. 9 und **Collinge** 1902 (beide nach der Ausbeute der „Skeat-Expedition“), mit zahlreichen Arten bereichert.

Collinge 1903, in *Fasciculae malayenses* berichtet über die auf der Halbinsel gesammelten deckellosen Landschnecken; — **Sykes** 1903 Pr. Z. S. zählt die Deckelschnecken auf, welche die Skeat-Expedition 1899—1900 auf der malayischen Halbinsel gesammelt hat. — **Bavay & Dautzenberg** 1903 J.-C. beschreiben

zahlreiche Arten und Varietäten aus Tongking und geben die Abbildungen einer Anzahl schon früher beschriebener Arten. — **Blanford** 1903 Pr. mal. Soc. V zählt die Ausbeute Daly's aus Siam auf und beschreibt eine Anzahl neuer Arten (*Paludomus*, *Melania* und *Ampullaria*). — **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. V beschreibt einen neuen *Streptaxis (prestoni)* aus Siam; — **Fulton** 1903 in J. Mal. X einen *Coptocheilus (perakensis)* von Perak; ferner **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. V eine neue *Ganesella (procera)* von Than-moi in Tongking. — **Fischer & Dautzenberg** geben 1904 in der Mission Pavie eine vollständige Liste der bis heute bekannten Arten aus Hinterindien.

Hinterindien. Eine Anzahl neuer Najadeen beschreibt **Rolle** 1904 Nachrbl. 45 u. 46; — eine neue *Harmandia (castelnaui)* **Rochebrune** 1904 Bull. Mus. Paris IX, p. 138; — eine Anzahl Süßwasserarten aus Yünnan beschreibt **Fulton** 1904 J. Mal. XI, p. 51.

Borneo. **Collinge** 1901 Trans. Edinb. zählt die nackten oder unvollständig beschalten Schnecken von Nordborneo auf. — Einige neue Arten **Gredler** 1902 Nachrbl. p. 53. — **Martens** 1903 S.-B. Ges. Berlin giebt eine Aufzählung der aus Ost-Borneo bekannten Arten nach den Sammlungen eines Sohnes des Archidiakonus Ad. Schmidt (10 n. sp. u. var.). — **Collinge** 1903 J. Mal. v. 10 beschreibt eine Anzahl neuer Arten der Gattungen *Damayantia*, *Collingea*, *Parmarion* und *Atopos*; — ein neues *Opisthostoma (beddomei)* **Smith** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 105; — einen neuen *Amphidromus (grossei)* **Bartsch** 1904 Smith. Misc. Coll. p. 292; — einen weiteren (Weyersi) **Dautzenberg** 1904 Ann. mal. Belg. (nebst einer Anzahl Arten aus dem Sultanat Sambas). — Auch **Jones & Preston** 1904 Pr. mal. Soc. VI zählen unter der Ausbeute der Waterwitch eine Anzahl Arten aus Borneo auf.

Java. Eine neue *Xesta (dwipana)* aus Java beschreibt **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. V, p. 264; — einige neue Arten (*Corbicula*, *Vivipara*, *Lagochilus*, *Melania*) **Bullen** 1904 Pr. mal. Soc. VI, p. 109 & 110.

Sumatra. **Gude** 1903 J. Mal. X, p. 45 beschreibt eine neue *Dyakia (smithiana)* und eine *Trichochloritis (tabularis)*.

Celebes. Eine Anzahl Arten von Kurukan in der Minahassa beschreibt **Gredler** 1901 Nachrbl. p. 62.

P. & F. Sarasin geben auf Grund der im vorigen Jahresbericht erwähnten beiden grossen Arbeiten eine reich mit Karten ausgestattete geologische Geschichte der Insel, die allerdings auch andere Thierklassen in Betracht zieht, aber sich doch wesentlich auf die Mollusken stützt und auch alle benachbarten Inselgruppen in Betracht zieht.

Molukken & Suluinseln. **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 185 und **Dautzenberg** 1902 Naturaliste p. 247 haben heinahe gleichzeitig die Fauna der Molukkeninsel Obi behandelt, doch hat M. sicher die Priorität, wenn auch nur um wenige Tage. — **Dautzenberg** 1903 J. Conch. p. 5 giebt eine ausführlichere Bearbeitung mit

Abbildung der neuen Arten. — Derselbe ibid. p. 19 zählt einige Arten von der Insel Jolo im Sulu-Archipel auf. — Eine neue Planispira (buelowi) und zwei Physiden von Obi (Miratesta schmalziana und Ameria obiana) beschreibt **Rolle** 1903 Nachrbl. p. 23. — Zahlreiche neue Arten von Buru, Halmahera und Waigui beschreibt **Sykes** 1903 J. Mal. X; — eine neue Varietät (halmaherica) von Planispira (quadrisfasciata) **Gude** 1903 J. Mal. X, p. 48. — Ein Leptopoma (placidum) von Südflores und ein zweites (albicans) von Sumba beschreibt **Fulton** 1903 J. Mal. X, p. 101. — Eine Anzahl neuer Arten von Batjan, Gebi, Obi und Waigui beschreibt **Sykes** 1904 J. Mal. XI; — solche von Gebi **Fulton** 1904 J. Mal. XI, p. 53.

Philippinen. **Moellendorff** hat die von Semper begonnene Bearbeitung der philippinischen Landconchylien aufgenommen und die Agnathen und einen grossen Theil der Naninen durchgearbeitet. Nach seinem frühen Tode hat **Kobelt** den Band zu Ende geführt und wird das Unternehmen in Verbindung mit der Tochter des Verstorbenen fortsetzen.

Von Palawan beschreibt **Rolle** 1903 Nachrbl. p. 156 einen neuen Amphidromus (Waterstraati). — **Hidalgo** setzt ebenfalls seine Bearbeitung der Philippinischen Fauna in den Obras fort. Derselbe beginnt in den Rev. Acad. Cienc. 1904 die Veröffentlichung eines neuen Katalogs der philippinischen Mollusken.

Makaronesien. **Ancey** 1901 J. Conch. p. 143 vermutet, dass eine Reihe kleiner Arten, welche Terver in Orseilleballen gefunden und als kanarisch betrachtet hatte, wie Helix caementitia, umbilica, terveriana, cyclodon, nicht von den Inseln, sondern von der gegenüberliegenden afrikanischen Küste stammen; er ist sicher für H. melolontha Shuttl. (= subapiculus Ancey). Dagegen ist myristica Shuttl., angeblich von den Capverden, zweifellos kanarisch.

Moellendorff 1901 Nachrbl. p. 125 spricht sowohl der Patula (Ridleya) quinquelirata Smith als dem Bulimus ridleyi (Hyperaulax) Smith von Fernando Noronha makaronesischen Charakter zu. — **Ancey** 1903 J. Conch. p. 39 widerspricht dem entschieden.

Afrika.

Ostafrika. Einen neuen Rhachis (fülleborni) beschreibt **Martens** 1901 Nachrbl. p. 148; — eine neue Ennea (affectata) von Sansibar **Fulton** 1902 Pr. mal. Soc. V, p. 32. — **Smith** 1902 hat für das Werk von Johnston über Uganda die Mollusken bearbeitet. — Derselbe 1903 J. Mal. X, p. beschreibt eine grössere Anzahl neuer Arten aus Uganda und von Kenia und Kilimandscharo. — Eine neue Ennea (oleacea) beschreibt **Fulton** 1903 J. Mal. X, p. 99. — **Smith** 1904 Pr. mal. Soc. VI, p. 68 beschreibt eine Anzahl Arten aus Deutsch und Britisch Ostafrika. — Vom oberen Nil zwischen Shendy und Faschoda zählt **Hägg** 1903 zwanzig Arten meist aus dem Süßwasser auf (keine n. sp.). — Eine grosse Anzahl

neuer Arten aus Zentralafrika beschreiben **Rochebrune & Germain**; — eine neue Limicolaria (*longa*) aus Britisch Ostafrika **Pilsbry** 1904 in Tryon, Manual; — einige neue Arten von Spirotoxon **Simroth** 1904 Zool. Jahrb. XIX.

Socotra & Abd-el-Gury, **Smith** 1903 Nat. Hist. Sokotra giebt eine sehr sorgfältige Aufzählung aller von den beiden Inseln bekannten Arten und beschreibt eine Anzahl neuer.

Südarabien. Einen neuen Cerastus (*dinshawi*) aus dem Hinterland von Aden beschreibt **Sykes** 1903 Pr. mal. Soc. V, p. 338.

Südafrika. 14 neue Arten aus dem Kapland beschreiben **Melvill & Ponsonby** 1901 Ann. N. H. VIII, p. 315; — eine neue Ennea (*premnodes*) aus Natal **Sturany** Ann. Hofm. Wien p. 69. — **Collinge** 1901 Ann. S. Afr. Museum giebt die Zusammenstellung der aus der Kap-Kolonie bekannten Nacktschnecken. — **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. nat. Hist. XII beschreiben 31 neue Arten aus Südafrika. — Eine Tropidophora (*plurilirata*) vom Kap beschreibt **Fulton** 1903 J. Mal. X, p. 103.

Congostaat. Drei neue Arten beschreibt **Dautzenberg** 1901 Ann. Mal. Belg. v. 26; — eine weitere Reihe Novitäten **Dupuis & Putzeys** ibid. Bull. p. XXIV.

Kamerun. Eine neue Pseudachatina (*perelongata*) beschreibt **Rolle** 1902 Nachrbl. p. 211 von Old Calabar; — eine neue Nacktschneckengattung (*Varania*) **Simroth** 1904.

Westafrika. Eine Arbeit von **Nobre** über die Molluskenfauna der portugiesischen Besitzungen in Westafrika in Ann. Sci. Porto VII ist dem Referenten nicht zugänglich geworden. — Eine Anzahl neuer Achatiniden beschreibt **Pilsbry** 1904 in der Monographie der Familie.

Abessynien. Fünf neue von C. von Erlanger gesammelte Cerastus beschreibt **Kobelt** 1901 Nachrbl. p. 86; — vier weitere Derselbe 1903 Nachrbl. p. 33. — **Simroth** 1904 zählt zahlreiche neue von Neumann gesammelte Nacktschnecken aus Abessynien auf.

Somaliland. **Moellendorff & Kobelt** 1902 Nachrbl. p. 180 beschreiben eine neue Achatina (*erlangeri*) aus der Ausbeute von Carlo von Erlanger. — einen neuen Conulinus **Kobelt** 1903 Nachrbl. p. 91 (aus Molu).

Tsad-See. **Martens** 1903 S.-B. Ges. Berlin zählt vier von Glauning am Südufer des Tsad-Sees gesammelte Arten auf, die ersten aus dem See (3 n. sp.).

Tanganyika. Weitere Beiträge zur Aufklärung über die Fauna dieses Sees giebt **Moore** 1901 Pr. Z. S. p. 461. — Die systematische Stellung der Gattungen Chytra und Limnotrochus erörtert **Digby** 1902 J. Linn. Soc. vol. 28. — Ferner **Moore** 1903 in einem eigenen umfangreichen Werke. — Eine sehr gründliche Bearbeitung des Tanganyika-Problems giebt **Smith** 1903 in seiner Presidential Adress, Pr. mal. Soc. VI, p. 77—104 — Derselbe

macht weiter kritische Bemerkungen 1904 in Pr. Mal. Soc. VI, p. 77. — Ferner äussern sich über das Problem **Huddleston** 1904 in J. Victoria Inst. v. 36 und Geological Magaz. I; — und **Gravier** 1904 in Bull. Mus. Paris IX, p. 347.

Maskarenische Provinz.

Einen neuen Clavator von Madagaskar beschreibt **Kobelt** 1901 Nachrbl. p. 96. — Neue Arten (Ampelita und Tropidophora) **Fulton** 1902 Ann. N. H. v. 9. — Zahlreiche neue Arten aus den Gattungen Clavator, Cyclostoma, Euplecta, Helicarion, Helicophanta, Hemiplecta, Leucotaenius und Macrochlamys beschreibt **Ancey** 1902 Nautilus XVI. — Eine Anzahl von Alluaud in Süd-Madagaskar gesammelter Arten zählt **Dautzenberg** 1902 Bull. Soc. France v. 27 auf; — neue Arten von Ampelita und Tropidophora **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX; — eine weitere Tropidophora (perfecta) **Fulton** 1903 J. Mal. X, p. 102.

Eine neue Edentulina (stumpffi) von Nossi-bé beschreibt **Kobelt** 1904 im Mart. Chemnitz.

Seychellen. Drei neue Arten beschreibt **Martens** 1903.

Aldabras. Die Molluskenfauna zählt **Voeltzkow** 1902 auf.

Australien und Melanesien.

Australien. Eine neue Rhagada (woodwardi) aus Nordwestaustralien beschreibt **Fulton** 1902 Pr. mal. Soc. V, p. 33; — einen neuen Badistes (meridionalis) aus Südaustralien **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. V, p. 264. — Eine Corbicula (faba) aus dem Richmond River, N. S. Wales beschreibt **Bullen** 1904 Pr. mal. Soc. VI, p. 110. — **Fulton** 1904 J. Mal. v. 11 giebt eine kritische Uebersicht über die australischen Hadra aus der Gruppe Sphaerospira und beschreibt eine neue Art (Sph. concors). — Derselbe erörtert ebenda die Synonymie von Hadra bellendenkerensis und H. beddomeae. — **Ponsonby** 1904 Pr. mal. Soc. p. 182 beschreibt ein neues Xanthomelon (bednalli) aus Zentral-Australien.

Neu Guinea. Einige neue Arten aus Britisch Neu Guinea beschreibt **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX, p. 182; — einige aus Deutsch Neu Guinea Derselbe p. 315; — **Gude** 1902 J. Malac. IX, p. 59 eine neue Chloritis (prestoni); — eine Anzahl neuer Arten (Macrochlamys, Papuina, Chloritis), **Preston** 1902 Pr. mal. Soc. V, p. 117; — eine neue Euplecta (planti) **Gude** 1904 Pr. Mal. Soc. VI, p. 114.

Bismarck Archipel. Eine neue Papuina (spadicea) von Neu Mecklenburg beschreibt **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX, p. 318. — Vier neue Varietäten der Papuina phaeostoma Marts. von der Insel Kung bei Neu Mecklenburg beschreibt **Rolle** 1902 Nachrbl. p. 212.

Marshall Inseln. Einen Beitrag zur Molluskenfauna giebt **Boettger** 1904 Zool. Jahrb. Syst. v. 20, p. 408 (n. sp. von *Helicina*, *Opeas* & *Trochomorpha*).

Neucaledonien. **Dautzenberg** & **Bernier** 1901 J. Conch. p. 215 beschreiben einen neuen *Leucocharis* (porphyrochila). — **Dautzenberg** ibid. p. 217 bildet einige Monstrositäten von *Placostylus porphyrostomus* Pfr. und *fibratus* Martyn ab.

Neuseeland. **Hutchinson** 1901 Trans. N. Z. v. 33 zählt die Süßwasserfauna von Rissington an der Hawkes Bai auf. — **Suter** 1901 Tr. N. Z. Inst. v. 24 macht interessante Bemerkungen über die Binnenconchylien von Neuseeland; — Derselbe 1905 ibid. v. 25 zählt die Fauna von Little Barrier Island auf. — *Placostylus bovinus* ist von Lord Howes Island abzuleiten, nicht von Neucaledonien; **Suter** 1901 J. Conch. p. 318. — Ueber einen *Arion* von Neuseeland vgl. **Collinge** 1903 J. Mal. X, p. 17. — Fünf neue Entodontidae beschreibt **Webster** 1904 Pr. mal. Soc. VI, p. 106—108. — Ein Verzeichniss sämmtlicher bekannter Arten giebt **Hutton** 1904 in seinem Index faunae Novae Zealandiae. — **Suter** 1904 Pr. mal. Soc. VI, p. 165 beschreibt einige neue Arten von Endodonta und Rhytidida. — Derselbe 1904 berichtet über die Resultate der Erforschung einer Anzahl neuseeländischer Seen, die zum Nachweis des Vorkommens von *Gundlachia* geführt haben, und revidirt die Gattungen *Potamopyrgus* und *Isidora*.

Sandwichs-Inseln. 1901 **Ancey** (J. C.) behandelt das Vorkommen von *Papuina barnaclei* Smith, die er für eingeschleppt und wieder verschwunden hält; und macht einige synonymische Bemerkungen. — **Collinge** 1902 erwähnt den europäischen *Limax maximus* von Hawaii. — Fünf neue *Achatinella* von Molokai beschreibt **Borchering** 1901 Nachrbl. p. 32; — einige neue *Amastra Baldwin* 1903 *Nautilus* XVII, p. 34; — eine neue *Leptachatinia (henshawi)* **Sykes** 1903 J. Mal. X; — eine *Limnaea (hawaiensis)* **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 790.

Helix sandwicensis Pfr. ist Jugendzustand einer südamerikanischen *Happia* aus der Gruppe der *cuzcana* und sicher nicht hawaiisch; **Ancey** 1902 J. Conch. p. 145. — Die *Opeas* von Hawaii erörtert **Sykes** 1904 Pr. mal. Soc. VI, p. 112 (2 n. sp.). — Eine ganze Reihe neuer Arten bildet **Ancey** 1904 Pr. mal. Soc. VI, p. 117—127 ab. — Derselbe 1904 behandelt eine interessante subfossile Fauna von Hawaii und beschreibt einige neue *Succinea*. — Mit derselben Fauna beschäftigt sich auch **Henshaw** J. Mal. v. VI, p. 56 und beschreibt eine Anzahl neuer *Punctum* von Oahu und Vitrea von Hawaii. Die Erhaltung ist eine so gute, dass es wahrscheinlich erscheint, dass die Formen auch noch lebend vorkommen. — **Sykes** 1904 Ann. N. H. XIV, p. 159 beschreibt eine neue *Amastra (rex)*.

Amerika.

Nordamerika. Die Beziehungen zwischen den nordamerikanischen und den europäischen Pisidien erörtert **Sterki** 1901 Nachrbl. p. 82.

Whiteaves 1904 Ottawa Natural. XVII p. 192 macht auf das Vorkommen von *Arionta arbustorum* in Neufundland aufmerksam. Da an derselben Stelle auch die europäische Haide (*Calluna*) wächst, über deren Einschleppung sich noch eine Tradition erhalten hat, hält er eine Einschleppung der Schnecke auch nicht für unmöglich.

Ueber das merkwürdige Vorkommen von *Tachea hortensis* in Neu England vgl. **Winkley** 1904 in *Nautilus* XVII p. 121.

Canada. **Whiteaves** 1902 Ottawa Nat. XVI macht Bemerkungen über die Binnenconchylien von Keewatin, Northern Ontario und British Columbia. — **Walker** 1904 Ottawa Nat. XVIII p. 18 macht einige Zusätze zur Molluskenfauna. — Ein **Anonymus** (F. R. L.) bespricht ebenda das Vorkommen von *Margaritana deltoidea*.

Alaska. **Baker** 1904 *Nautilus* XVIII p. 62 beschreibt eine neue *Limnaea (randolphi)*.

Vereinigte Staaten. **Blatschley & Ashley** 1901 Rep. Ind. Geol. XXV berühren in ihrer wesentlich palaeontologischen und geologischen Arbeit auch die rezente Fauna der Seen von Nord-indiana. — **Chandall** 1901 *Nautil.* XV behandelt die Verbreitung der nordamerikanischen Physidae. — Schilderungen von Sammellexkursionen in Montana giebt **Elrod** 1901 *Nautil.* XV. — Einen neuen *Unio* aus Texas beschreibt **Frierson** 1901 ibid. — **Gratacap** 1901 Bull. Amer. Mus. XV giebt einen neuen Catalog der Binney & Bland Collection mit genauen Angaben über die Typen und die abgebildeten Exemplare. — Eine Anzahl neuer Pisidien und Sphaerien beschreibt **Sterki** 1901 in *Nautilus* XIII & XIV. — Einen neuen *Unio* (*Lampsilis blatchleyi*) aus Indiana beschreibt **Daniels** 1902 *Naut.* XVI. — Die Fauna des Lake Chautauqua, New York, behandelt **Eversman & Goldsborough** 1902 Rep. Fish Comm. XXVII. — Sammellexkursionen auf Flüssen in Texas und Louisiana schildert **Frierson** 1902 *Nautil.* XVI. — Populäre Mittheilungen über die Mollusken der westlichen Vereinigten Staaten macht **Orcutt** 1902 W. Amer. Scient. XII. — Neue amerikanische Landschnecken beschreibt **Pilsbry** 1902 *Nautilus* XVI p. 30; eine neue *Helicina (tantilla)* aus Florida ebenda p. 53; aus Idaho in Pr. Phil. 1902 p. 593. — Die in den Sacramento Mountains in Neu-Mexico gesammelten Mollusken zählt **Vanatta** 1902 *Nautilus* XVI auf. — **Walker & Pilsbry** 1902 Pr. Phil. geben die Fauna der Mt. Mitchell Region in Nord Karolina. — **Colton** 1903 *Nautil.* XVII p. 99 zählt die Landschnecken von Mount Desert in Maine auf. — **Collins** 1903 ibid. p. 112 die Fauna von Cedar Lake in Indiana. — **Pilsbry** 1903 ibid. p. 113 beschreibt eine neue *Amnicola (augustina)* aus Florida. — **Billup** 1903 *Nautilus* XVI p. 22 macht einen Vorschlag zum gemeinsamen Studium der nordamerikanischen Goniobasis.

— Derselbe 1903 ibid. p. 125 zählt die Fauna von Calhoun Falls in Süd Carolina auf. — **Blatchley & Daniels** 1903 in 27 Ann. Rep. Geol. Indiana zählen auch die in Indiana vorkommenden Mollusken auf. — **Daniels** 1903 ibid. giebt eine Check-List der Mollusken von Indiana. — Die Ancylichen der Gebiete westlich vom Mississippi behandelt **Walker** 1903 in *Nautilus* XVII. — **Pilsbry** 1903 *Nautilus* XVII p. 75 beschreibt einen neuen *Planorbis* (*magnificus*), den grössten unter den Amerikanern, und p. 77 eine neue *Guppya* (*miamensis*). — Ferner giebt Derselbe 1903 Pr. Philad. p. 193 einen Bericht über die ziemlich eigenthümliche und an Varietäten reiche Fauna des Gebirges an der Westgrenze von Arkansas.

Pilsbry 1903 Pr. Philad. 626 beschreibt eine Cerionide (*Zaco-leus idahoensis*) aus Idaho, die eine eigene Gattung bildet. — Einige Arten aus Nord-Carolina beschreibt **Vanatta** 1903 *Nautilus* XVI p. 106. — Derselbe 1903 Pr. Phil. p. 756 giebt ein Verzeichniss der in West-Florida und auf der zu Mississippi gehörenden Insel Horn gesammelten Arten. — **Hinkley** 1904 *Nautilus* XVII p. 37 verzeichnet eine Anzahl von ihm in Alabama gesammelten Arten; — **Farris** 1904 ibid. p. 49 solche aus den Südweststaaten, besonders Arizona; — **Baker** 1904 ibid. XVII p. 112 vom Cedar Lake in Indiana; — **Cockerell** 1904 ibid. XVII p. 130 die Höhenfauna am Pikes Peak über 10 000 Fuss; — **Rhoads** eine Ausbeute aus Delaware ibid. XVIII p. 63; — **Hyning** 1904 ibid. XVII p. 130 die Fauna von Des Moines in Iowa; — **Colton** 1894 ibid. XVII p. 99 die von Mount Desert in Maine; — eine Fauna der Dells von Wisconsin giebt **Baker** 1904 Trans. St. Louis XIV p. 99. — Wegen kleinerer faunistischer Notizen siehe in 1904: **Clapp**, **Cockerell**, **Moore**, **Daniels**, **Pilsbry**.

Californien. **Bartsch** 1903 Pr. Soc. Washington p. 103 beschreibt eine neue *Sonorella* (*walcottiana*). — Die Molluskenfauna von Süd-Californien zählt **Stearns** 1903 *Nautilus* XVI p. 133 auf. — Ueber *Limax maximus* und einige andere Nacktschnecken: **Stearns** 1904 *Nautilus* XVIII p. 34: — über den *Limax* auch **Vanatta** ibid. p. 23 und **Bartsch** p. 12. — Eine neue *Sonorella* (*fisheri*) beschreibt **Bartsch** 1904 Smiths. Miscell. Collect.

Centralamerika. **Fischer & Crosse** im Schlussheft der Mission scient. Mexico 1902 theilen das mexikanische Faunengebiet in vier Provinzen: den Ostabhang gegen das Antillenmeer, die zentrale Hochebene, den pacifischen Abhang, von welchem indess die Landenge von Tehuantepec zu dem Osten gehört, und die kalifornische Halbinsel.

Die Fauna der Cocosinsel an der pacifischen Küste von Costarica zählt auf **Martens** 1902 Ges. nat. Fr. auf (1 n. sp. *Tornatellina hopkinsi*). — **Pilsbry** in Tryon beschreibt ein neues *Coelocentrum* (*dispar*) aus Guatemala; — **Sykes** 1902 Pr. mal. Soc. V eine neue *Helicina* (*pterophora*).

Da Costa 1901 Pr. mal. Soc. IV beschreibt einen neuen *Drymaeus* (*chiriquensis*) aus Panama. — **Ancey** 1903 *Nautil. XVII* beschreibt

einige neue Streptostyla aus Centralamerika; — **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 262 eine neue Leptarionta aus Chiriquí, Panama.

Preston 1903 J. mal. X p. 4 beschreibt neue Arten (*Helicina* und *Bulimulus*) aus Costarica.

Da Costa 1904 beschreibt eine Streptostyla (*costaricensis*) aus Costarica und einen *Neocyclotus* (*panamensis*) aus Panama.

Cocosinsel. **Ancey** 1903 J. Conch. p. 97 zählt die Fauna der zu Costarica gerechneten Insel dieses Namens auf (vgl. Martens 1898 S. B. Ges. Berlin no. 9). Er vermutet eine Besiedelung sowohl von Amerika wie von Polynesien aus. — Eine neue *Guppya* (*fultoni*) beschreibt **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 265.

Westindien. **Jarvis** 1902 *Nautilus* XV erörtert die geographische Verbreitung der Pleurodonte aus der Gruppe der *Pl. acuta* und (*XV*) der *Pl. sinuosa*.

Portorico. Die Landschnecken zählen **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I auf.

Jamaica. Eine neue Art beschreibt **Clapp** 1901 Naut. XV p. 33; — eine neue *Adamsiella* **Henderson** 1901 Naut. XV p. 49; — zwei neue *Glandina* **Vendryes** 1901 Naut. XIV, einige neue Urocyclidae derselbe Naut. XV; — einen neuen *Colobostylus* (*nuttii*) **Pilsbry** 1903 Naut. XVII p. 65.

Haiti. Ueber Excursionen auf der Insel berichtet **Henderson** 1901 Naut. XV p. 13—16. — Ein neues *Chondropoma* (*superbum*) beschreiben **Henderson & Simpson** 1902 Naut. XVI p. 98.

Bahamas. Die Landschnecken von Fortune Island zählt **Henderson** 1901 Naut. XV auf.

Barbados. **Brown** 1902 J. of Conch Leeds X p. 266 zählt 46 Arten Binnencnchylien auf und giebt eine tabellarische Uebersicht über die Verbreitung jeder Art.

Bermudas. **Gulick** 1904 Pr. Phil. p. 405 berichtet über eine interessante subfossile Fauna mit mehreren neuen Arten, die wahrscheinlich auch lebend vorkommen dürften. — Einige Bemerkungen über Landschnecken macht auch **Davis** 1904 Naut XVII p. 125.

Südamerika.

Eine Anzahl Arten von verschiedenen Punkten Südamerikas beschreibt **Ancey** 1901 Naturaliste p. 81—104; — eine Anzahl *Dryptus* und zwei *Neocyclotus* **Da Costa** 1901 Pr. Mal. Soc. p. 238.

— **Pilsbry & Clapp** in *Nautilus* XV 1902 beschreiben eine grössere Anzahl neuer Landschnecken (*Aperostoma*, *Circinaria*, *Glandina* und *Helicina*) aus der Sierra de Santa Marta in Columbien; — **Fulton** 1902 Ann. N. Hist. IX einen neuen *Bulimulus* (*compactus*) aus Bolivia. — **Ancey** 1902 J. C. v. 50 einen neuen *Bulimus* (*bonneti*) von ebenda. — **Pilsbry** 1901 Naut. XIV beschreibt eine neue Pleurodonte und eine neue *Clausilia* aus Columbien. — Eine neue *Temesa* (*magnifica*) von Sorato in Bolivia und eine neue *Nenia* (*pilsbryi*) von Callanga in Peru beschreibt **Sykes** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 222. —

Eine neue Porphyrobaphe unsicheren Fundortes beschreibt **Rolle** 1902 Nachrbl. p. 211. — **Ancey** 1903 Nautil. XVII p. 89 giebt eine neue Beschreibung von Porphyrobaphe galactochila und beschreibt einen neuen Bulimulus (blanfordianus) von Iquico in Bolivia; — Derselbe 1903 ibid. p. 102 beschreibt eine Reihe neuer Arten aus Brasilien und Argentinien. — Zahlreiche neue Arten aus Südamerika beschreibt **Da Costa** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 5, 6. — Solche aus Bolivia **Bavary** 1904 Bull. Soc. Zool. Fr. v. 29 p. 152.

Peru. 1901. Zwei neue Peronaeus beschreibt **Dautzenberg** (J. C.). — Eine Anzahl neuer Arten von Ampullaria, Bulimulus, Drymaeus und Helix Derselbe 1901 J. C. v. 49. — Einen neuen Dryptus (filocinctus) von Peru beschreibt **Rolle** 1901 Nachrbl. p. 93; — einen neuen Bulimulus (icterostomus) vom oberen Maranon **Martens** 1901 Nachrbl. p. 149. — **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 262 beschreibt eine neue Varietät (diminuta) von Labyrinthus baeri aus Perené. — Einen Borus (separabilis), wahrscheinlich aus Peru beschreibt **Fulton** 1903 J. Mal. X p. 100; — **Rolle** 1904 Nachrbl. p. 35 neue Arten von Bulimulus, Bulimus, Nenia und Systrophia.

Brasilien. Einige neue Bulimulidae aus Matto Grosso beschreibt **Smith** 1903 Pr. Z. S. p. 70. — Einen neuen Odontostomus (toleratus) beschreibt **Fulton** 1903 J. Mal. p. 100. — Einen Strophocheilus (myersi) von Minas geraes beschreibt **Da Costa** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 5. — Die Unioniden von Goyaz zählt **Ihering** 1904 Nachrbl. p. 154 auf. — **Ribeiro** 1904 Arch. Mus. Rio Janeiro XII p. 138 weist den europäischen Limax variegatus in Brasilien nach. — **Ancey** 1904 Nautilus XVII p. 102 beschreibt einige neue Bulimulus und Odontostomus.

Mexico. **Pilsbry** 1903 Pr. Philad. p. 701 beschreibt eine grössere Anzahl neuer Arten aus verschiedenen Gattungen.; — **Fischer & Chatelet** 1904 eine neue Glandina (lamyi).

b) Meeresconchylien.

Die wichtige Frage über das Verhältniss der arktischen Fauna zur antarktischen erörtert **Smith** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 162 in seiner Presidential Adress. Er prüft die von John Murray als identisch angegebenen 11 Arten und findet 6 davon sicher falsch bestimmt; Janthina kommt als pelagisch nicht in Betracht, die 4 anderen sind kosmopolitisch oder doch sehr weit verbreitet. Bezuglich der Gattungen kommt er zu dem Schluss, dass die Ähnlichkeit der beiden Faunen nicht grösser sei, als zwischen beliebigen anderen Meeren, und dass die Südmeere eine ganze Anzahl von Gattungen haben, welche den nordischen fehlen.

Arktisches Reich.

Friile & Grieg 1901 bringen den Bericht über die Norske Nordhavs Expedition nach langer Unterbrechung zum Schluss; die

dritte Lieferung enthält eine vollständige Aufzählung aller beschriebenen Arten und bei jeder die horizontale und vertikale Verbreitung. — **Knipowitsch** 1901 Bull. Mus. Petersb. XII p. 377 zählt die von der russischen Expedition im Jahre 1900 an Spitzbergen gesammelten postpliocänen Arten auf; — Derselbe 1901 Ann. Mus. Petersb. VI die Ausbeute des Eisbrechers Ermak im Sommer 1900; — Derselbe 1901 Verh. Russ. Miner. Ges. v. XXVIII giebt auf Grund der postpliocänen Molluskenfauna eine geologische Geschichte der Mollusken des Weissen Meeres; — Derselbe 1902 Ann. St. Petersbourg VI p. 435 zählt die von der russischen Expedition nach Spitzbergen gesammelten Lamellibranchiaten, und ibid. VII p. 355 die Gastropoden auf, mit Abbildung und Beschreibung zahlreicher, auch neuer Arten. — **Pollonera** 1902 Spediz. *italica* zählt die von der ersten Expedition des Herzogs der Abruzzen gesammelten Mollusken auf. — **Jensen** 1902 Ved. Medd. p. 33 behandelt die arktischen Cyprinen; — **Johansen** 1902 einige litorale Arten von Island. — **Dall** 1903 Synops. Astartidae beschreibt eine neue *Astarte (soror)* von Grönland. — **Haegg** 1904 Moll. Schwed. Expedition behandelt die gesammelten Bivalven (1 n. sp.). — **Jensen** 1904 Ved. Medd. p. 305 beschreibt einen neuen *Pecten (frigidus)* aus dem arktischen Tiefwasser. — **Knipowitsch** 1904 Ann. Petersb. VIII p. 133 giebt einen Nachtrag zu seinen früheren Veröffentlichungen über die Ausbeute der russischen Expedition nach Spitzbergen.

Nordatlantisches Reich.

Kobelt hat seine Iconographie der schalentragenden europäischen Meeresconchylien regelmässig weitergeführt, die Pectinibranchia proboscidiifera zu Ende gebracht und die Toxoglossa begonnen. — **Vayssière** 1901 Bull. Franco-belg. XXXIV giebt eine vergleichende Uebersicht der Nacktkiemer des Kanals, der atlantischen u. mittelmeerischen Küste Frankreichs. — **Friese** 1902 Bergens Mus. Aarbog zählt die von dem Fischerei-Dampfer Michael Sars bei seiner ersten Nordmeeraufnahme gesammelten Mollusken auf (vier Tafeln und Karte). — Eine Anzahl zwischen Island und Jan Mayen gesammelte Zweischaler zählt **Jensen** 1902 Ved. Medd. p. 43—46 auf; — **Johansen** 1902 ibid. p. 385 die an Island innerhalb der Gezeitenlinien gesammelten Arten. — **Vayssière** 1902 C. R. Ac. Sci. v. 134 giebt eine vorläufige Notiz über die vom Talisman gesammelten Hinterkiemer und in einem eigenen Werke den Hauptbericht. — **Locard** 1903 Bull. Soc. Agr. Lyon X p. 95 ff. behandelt die europäischen Cerithiden, und in Echange XIX die Pteropoden; ferner in Bull. Soc. Agric. die Turbiniden und Trochiden.

England. 1901. Ein von der **Conchological Society of Great Britain and Ireland** eingesetztes Komité giebt ein Verzeichniss der in „British Area“ lebenden Meeresmollusken (720 spec.).

Mayfield in J. Conch. Leeds X p. 49 zählt die Strandfauna der Grafschaft Norfolk auf; — **Byne & Leicester** ibid. p. 75 die der

Insel Man. — **Marshall** ibid. p. 122—128 und 190—193 setzt seine Additions fort und behandelt Eulima, Natica und Adeorbis; — **Hoyle** ibid. p. 197 giebt die Liste der britischen Cephalopoden nach der Nomenclatur von 1869 (Jeffreys), 1890 (Normann) und der offiziellen Liste von 1902. — **Knight** im Brit. Assoc. Hand. N. Glasgow giebt eine Zusammenstellung der marinen Mollusken (und Brachiopoden) von Glasgow. — **Marshall** 1902 J. Mal. giebt eine kritische Revision der Arten von Fusus (Neptunea), Buccinum etc. (*F. consimilis* n.). — Lokalfaunen und kleinere Mittheilungen geben in 1902: **Knight, Cole, Allen & Todd, Pearcey, Lebour,** und für Irland: **Welsh** und **Praeger**.

Sykes 1903 Pr. mal. Soc. V revidirt die britischen Eulimidae und beschreibt eine neue Art (*Eu. collini*). — **Marshall** 1903 Additions VII setzt seine Revision der englischen marinen Fauna fort und beschreibt einen neuen Utriculus (*tomlinianus*) und einige neue Varietäten. — Eine neue Xylophaga (*praestans*) von Northumberland beschreibt **Smith** 1903 Pr. mal. Soc.; — eine neue Doris (*beaumonti*) von der Westküste von Irland **Farran** 1903 Rep. Fish Comm. Ireland 1903 II. — Kleinere Lokalfaunen und Notizen über einzelne Arten geben **Garstang & Sorby** und **Cole** von Essex; — **Knight** von den äusseren Hebriden; **Simpson** von Aberdeen und Kinkardshire; — **Hey** von Yorkshire; — von Narin in Irland **Massy**. — Ferner **Todd, Sorby, Cooper, Patterson, Petch, Brady, Chaster**.

Die Liverpool Marine Biol. Assoc. giebt 1904 eine Revision der Mollusken des Districtes von Plymouth. — **Greene** 1904 Pr. Suffolk XI p. 320 giebt ein Verzeichniß der von der Küste von Suffolk bekannten Arten. — Kleinere Mittheilungen und Angaben über das Vorkommen einzelner Arten machen **Castle, Chaster, Jackson, Standen, Plowright, Saunders, Lebour, Moscy, Vallentin**.

Kanal. **Brasil** 1901 Bull. Soc. Norm. v. 5 zählt von Luc sur mer 155 Arten auf; keine n. sp. — **Marquand** 1901 Rep. Guernsey Soc. p. 70 berichtet über die marine Fauna der englischen Kanalinseln.

Belgien. **Gilson** 1902 Mem. Mus. Belg. I p. 7—81 giebt auch eine Uebersicht der an der belgischen Küste gesammelten Arten. — **Pelseneer** 1904 C. R. Assoc. Fr. 1903 p. 223 hat Petricola auch an der belgischen Küste gefunden.

Ostsee. **Levander** 1901 Act. Soc. Fenn. XVII no. 4 zählt die Fauna der Ostsee bei Helsingfors auf. — **Luther** 1903 Medd. Soc. Fenn. XXVIII p. 41 berichtet über das Vorkommen von *Alderia modesta* dasselbst.

Mittelmeer. **Bellini** 1902 Boll. Soc. Napoli XV p. 85—121 zählt die von ihm an Capri gesammelten Arten auf; von Interesse ist das Vorkommen einer *Mitra zonata*. Er unterscheidet fünf Tiefenzonen, eine über dem Meeresspiegel liegende mit *Littorina neritoides*, die Küstenzone, die Lamellarienzone, die Zone der Kalkalgen (40 bis 80 m) und die Korallenzone, welche in eine obere und eine untere zerfällt. — **Claudon** giebt eine Faunula von St. Raphael,

Dep. Var. — **Graeffe** 1902 Arb. Inst. Wien zählt die Mollusken des Golfs von Triest auf; — **Granger** 1902 Bull. Beziers XXII u. XXIII die der französischen Südküste. — **List** 1902 giebt in Flora und Fauna des Golfes von Neapel die prächtig ausgestattete Monographie der Mytiliden. — **Locard** 1902 C. R. Assoc. France 1901 giebt einige vorläufige Mittheilungen über die Fauna von Korsika.

Nalato 1902 hat eine mir nicht bekannt gewordene Uebersicht der venetianischen Mollusken herausgegeben; — **Pallary** 1902 J. Conch. das Verzeichniss der in der Bucht von Tanger gefundenen Arten. — Eine populäre Arbeit von **Saitta** 1902 über Fische und Mollusken von Sicilien ist mir nicht zugänglich geworden.

Bellini 1903 Boll. Soc. Napoli XVI p. 20 behandelt die Faunen der mit Meerwasser gefüllten Seen Fusaro und Mar Morto in den phlegräischen Feldern. Es fanden sich insgesamt 66 Formen; einige Varietäten werden als neu beschrieben. — **Seguenza** 1903 Paleont. ital. IX gibt eine Aufzählung der neogenen Rissoiden von Messina, der auch manches Bemerkenswerthe über lebende Arten enthält.

Pallary 1904 giebt zwei wichtige Beiträge zur Fauna des Mittelmeeres, den einen über den Golf von Gabès, den anderen über die Küste von Nordafrika; einige neue Arten werden namhaft gemacht. — **Ancey** 1904 Naut. XVIII p. 21 hat Natica prietoii Hid. an der afrikanischen Küste gefunden. — **Maluquez y Nicolay** 1904 Bol. Soc. españ. III p. 226—255 zählt die Mollusken von Llansa in Catalonien auf. — **Brusina** 1904 Nachrbl. p. 167 beschreibt ein neues Cerithium (sykesi) aus der Adria.

Pontus. Ostroumow 1902 Ann. Mus. Petersb. VI p. 621 giebt das Verzeichniss der im Azowschen Meere gesammelten Arten. — Einige gemeine Strandarten erwähnt **Haupt** 1904 in: Natur u. Haus XII p. 193.

Westafrikanisches Reich.

Meisenheimer 1902 Zool. Anzeiger p. 92 beschreibt aus dem Golf von Guinea einen neuen Pteropoden, *Pteroceanis diaphana*, der eine neue Familie Pteroceanidae bildet. — **Martens** 1903 Valdivia und S.-B. Ges. Berlin giebt die Zusammenstellung der Faunen der einzelnen Abtheilungen von Westafrika. — **Joubin** beschreibt 1902 u. 1903 neue Cephalopoden von den Kapverden. — **Nobre** 1903 (?) Ann. Porto VII zählt die Fauna der Kapverden auf. — **Font y Saqué** 1904 Bol. Soc. españ. III, p. 209—211 zählt eine Anzahl am Rio de Oro an der Saharaküste gesammelte Arten auf. — **Casey** 1904 Trans. St. Louis beschreibt eine neue Pleurotomidengattung *Helenella* von St. Helena. — Einige neue Arten veröffentlicht **Sowerby**.

Südafrika. Sowerby 1901 Pr. mal. Soc. IV beschreibt sieben neue Arten von The Kowies; — **Smith** 1901 J. Conch. Leeds X, p. 104 beschreibt 19 neue Arten und berichtigt eine Reihe Sower-

by'scher Bestimmungen. — Derselbe 1901 Pr. mal. Soc. IV, p. 232 zählt die von Südafrika beschriebenen Volutiden auf und beschreibt zwei neue Arten (*Alcithoe ponsonbyi* u. *Lyria queketti*) von Natal; — Derselbe 1902 J. Mal. X, p. 248 sieben n. sp.; — **Sowerby** 1902 Mar. Invert. S. A. p. 93 giebt einen Nachtrag zu seinem früheren Veröffentlichungen; — **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V giebt ebenfalls einen Nachtrag zum Sowerby'schen Katalog (390 sp., 18 n. sp., zahlreiche Berichtigungen). — **Smith** 1904 J. Malac. XI beschreibt eine grosse Anzahl von Arten von Port Alfred. — Auch **Sowerby** veröffentlicht 1904 als vierten Band der Marine Investigations eine erhebliche Zahl neuer Lamellibranchiaten.

Indo-pacifisches Reich.

Rothes Meer. 1901 **H. Fischer** in J. C. zählt 65 Arten von Djibuti am Rothen Meer auf, davon eine Anzahl neu; er bringt auch einige Savigny'sche Arten zur Neuabbildung.

Meisenheimer 1902 Zool. Anz. beschreibt eine neue Pteropode aus dem Material der deutschen Tiefsee-Expedition, die eine eigene Gattung und Familie bildet (*Pteroceanis diaphana*). — **Fuchs** 1902 macht einige Bemerkungen über die von der „Pola“ nachgewiesene Tiefseeflora des Rothen Meeres. — **Shopland** 1902 Pr. mal. Soc. V zählt die von ihm während eines zehnjährigen Aufenthaltes in Aden beobachteten Mollusken auf.

Sturany 1903 Denk. Ak. Wien v. 74 giebt mit der Bearbeitung der von der „Pola“ gesammelten Mollusken einen sehr wichtigen Beitrag zu unserer Kenntniss der erythraischen Fauna (21 n. sp.). Eine eigentliche Abyssalflora ist nicht vorhanden; unter 1000 M. wurde nur die leere Schale einer *Janthina* gefunden.

Hägg 1904 Ark. Zool. beschreibt zwei von der schwedischen Nilexpedition gesammelte Nudibranchier.

Persischer Meerbusen. 1901 **Melvill & Sykes** bearbeiten die Mollusken aus dem Persischen Meerbusen, dem Golf von Oman, dem arabischen Meerbusen, nach den Sammlungen des Telegraphen-Direktors Townsend; ein guter Theil derselben ist beim Auswechseln eines alten Telegrafenkabels abgenommen worden; es konnten deshalb auch meistens die genauen Tiefen angegeben werden. Die Einleitung von Townsend giebt einen ganz vorzüglichen Ueberblick über die Vertheilung der Arten und ihre Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit.

Melvill & Standen 1903 Ann. N. H. v. 12 beschreiben weitere 68 neue Arten aus der Ausbeute Townsend; — Dieselben 1903 J. Conch. v. 10 geben eine Revision der Scalidae aus demselben Gebiet und beschreiben einige neue Arten. — **Melvill** 1903 J. Mal. v. 10 revidirt die Columbellidae und beschreibt eine n. sp. (*C. caliope*). — Derselbe 1904 Pr. mal. Soc. VI zählt eine Reihe neuer Arten aus dem persischen Meerbusen und den angrenzenden Gewässern nach Sammlungen von Townsend auf; eine weitere Anzahl 1904 in

J. Mal. XI, p. 79—85. — **Melvill & Standen** 1904 J. Conch. XI, zählen die gesammelten Cypraeidae auf.

Lakhediven und Malediven. **Eliot** 1903 hat für ein grösseres geographisches Werk über die Inseln die Nudibranchier bearbeitet; — **Smith** 1903 die marinen Mollusken.

Ostafrika. **Hoyle & Standen** 1901 beschreiben von der Somaliküste 45 Gasteropoden, 13 Pelecypoden, alle neu, und einen Octopus n. sp. — **Martens** 1902 Nachrbl. beschreibt eine Anzahl neuer von der Valdivia gesammelter Arten (Actaeon, Puncturella, Solariella, Typhis, Ringicula, Pleurotoma, Voluta) von der Ostküste Afrikas. — **Eliot** 1902 Pr. Z. S. beschreibt drei neue Gattungen Nudibranchier von Sansibar. — **Voeltzkow** 1902 Abh. Senckenb. zählt die an der Aldabras gesammelten Meeressconchylien auf.

Eliot 1903 Pr. Zool. Soc. setzt die Bearbeitung der ostafrikanischen Nudibranchier fort. — **Martens** 1903 beginnt die systematische Bearbeitung der Gastropoden der deutschen Tiefsee-Expedition; — Derselbe 1903 S.-B. Ges. Berl. giebt eine Uebersicht über die Verbreitung der Meeresmollusken längs der Küste von Ost- und Südafrika. — **Eliot** 1904 Pr. Z. S. zählt eine weitere Reihe neuer ostafrikanischer Nudibranchier auf.

Bengalischer Meerbusen. **Smith** 1904 Ann. Nat. Hist. XIII und XIV behandelt die Ausbeute des Investigator im Tiefwasser dieses Meerbusens und bildet zahlreiche neue Arten ab.

Preston 1904 J. Mal. XI beschreibt zahlreiche neue Arten von Ceylon; — **Hoyle** 1904 die ceylonesischen Cephalopoden.

Malayisches Gebiet. **Alcock** 1902 Naturalist Ind. Sea giebt p. 267—282 Abbildungen und Beschreibung von ihm im indischen Ocean gesammelten Arten. — **Schepmann** 1903 Tijdschr. ned. Ver. (2) VIII beschreibt drei neue von der Siboga gesammelte Oliva-Arten. — Einen sehr wichtigen Beitrag zur Fauna namentlich des südindischen Meeres hat die Tiefsee-Expedition der Valdivia ergeben, von der **Martens** 1903 die beschalten Gastropoden als vol. VII der Wissenschaftlichen Ergebnisse herausgegeben hat.

Philippinen. **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. v. 4 beschreibt nach den Sammlungen von O. Koch zahlreiche neue marine Arten von Cebu. — Einen neuen Spondylus (occidens) beschreibt **Sowerby** 1903 J. Mal. X p. 77 — einen neuen Murex (multispinosus) **Sowerby** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 7; — eine neue Pleurotomidengattung (Lophiotoma) **Casey** 1904 Trans. St. Louis XIV.

Japan. **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 383 beschreibt eine Anzahl neuer Arten; — ebenso 1903 Nautil. XVII, p. 69—71; — eine neue Pleurotomaria (hirasei) 1903 Pr. Philad. p. 496. — Eine Uebersicht über die japanischen Gastropoden giebt **Pilsbry** Pr. Phil. p. 3—37, über die Pelecypoden ebenda p. 550—561. Die zahlreichen neuen Arten werden unten namhaft gemacht. — Einige neue Chlamys beschreibt **Bavay** 1904 J. Conch. v. 52.

Australien. **Hedley** 1900 u. 1901 Pr. Linn. S. N. S. Wales XXV u. XXVI beschreibt zahlreiche neue australische Arten und

bildet bereits beschriebene ab. — Derselbe 1901 Record Austral. Mus. IV. p. 121 giebt eine Revision der Typen der von der Chevert Expedition gesammelten Arten. — Derselbe 1902 u. 1903 Mem. Austral. Mus. IV verzeichnet die von der „Thetis“ vor der Küste von Neusüdwales gesammelten Mollusken, und beschreibt in Rec. Austral. Mus. IV eine neue Voluta (*perPLICATA*).

1903 Pritchard & Gatliff setzen ihre Arbeit über die Fauna von Victoria (in Pr. Soc. Victoria XIV) fort. — Hedley 1903 Rec. Austr. Mus. V zählt die auf den Inseln Paanopa und Nauru der Gilbert-Gruppe gesammelten Mollusken auf. — Kesteven 1902 Pr. L. Soc. N. S. Wales XXVII, p. 206 fügt der Fauna von Queensland 16 sp. Rissoidae zu.

Die Arbeiten von Hedley, Verco und Pritchard & Gatliff werden auch in 1904 fortgesetzt.

1903 Hedley (4) macht darauf aufmerksam, dass eine äusserst scharfe Faunengrenze zwischen Melbourne und Sydney liegt; sie wird durch Kap Wilson markirt und hängt in letzter Linie von der Existenz einer Landverbindung zwischen Südaustralien und Tasmanien, der sogenannten Bass-Strasse, im Pliocän ab, welche Kap Wilson über die Inseln Flinders und Kent mit Kap Portland in Tasmanien verband. Hedley bezeichnet die Fauna, welche sich von Kap Wilson westlich über Melbourne und Adelaide über die ganze südaustralische Küste bis Westaustralien erstreckt, als die Adelaidian Fauna, die östliche von Tasmanien, Gippsland und Neusüdwales als Peronian Fauna. Er schlägt ausserdem für die Küste von Queensland von der Moreton-Bay bis zur Torresstrasse den Ausdruck Solanderian Fauna vor und von der Torresstrasse bis zu den Houtmans Abrolhos an der Westküste den Namen Dampierian Fauna.

Hedley 1904 (1) beschreibt nach Drake - Sammlungen von Hamilton aus Neuseeland 2 n. gen. und 12 n. sp.; — Smith 1902 J. Mal. IX, p. 109 eine neue *Gomphina* (*maorum*). — Suter 1902 J. Mal. IX, p. 65 eine neue *Separatista* (*benhami*).

Tasmanien. Tate & May 1901 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI geben eine revidirte Liste der tasmanischen Meeresconchylien.

Neu Caledonien. Dautzenberg 1902 J. Conch. giebt eine monographische Bearbeitung der Cypraeiden mit sorgfältiger Synonymie (70 sp. mit einigen neuen Varietäten). — Pace 1902 ibid. giebt eine Kritik der Hervier'schen Aufzählung der neucaledonischen Columbellidae. — Nautilus macromphalus ist streng auf Neu Caledonien beschränkt; schon an Viti und den Neuen Hebriden findet sich nur *N. pomphilus*; Willey 1899 P. Z. S. p. 8.

Neu Seeland. Park 1903 Trans. N. Z. Inst. XXXV, p. 299 zählt die Mollusken der Totaranui Bay bei Nelson auf. — Hutton 1904 giebt in seiner Fauna auch ein vollständiges Verzeichniss der neuseeländischen Arten. — Hedley 1904 Rec. Aust. Mus. V, p. 86—97 bereichert die neuseeländische Fauna um zahlreiche Arten. —

Murdoch 1904 giebt einen erheblichen Nachtrag zur neuseeländischen Fauna. — **Ebenso Webster.**

Westatlantisches Reich.

Carpenter 1901 Naut. XV zählt die schalentragenden Meer-mollusken von Rhode Island auf. — Ueber Drakefahrten an der Küste von Neu-England berichtet **Howe** 1901 in Bull. U. S. Fish-Comm. XIX p. 239. — **Winkley** 1902 Naut. XVI p. 14 giebt Nachricht über Sammelexcursionen an der Küste von Neu-England; — **Blaney** 1904 Naut. XVII p. 109 über Sammeln in der Frenchman's Bai in Maine. — **Johnson** 1904, Naut. XVIII p. 47 bespricht einige Mollusken vom Cap Cod.

Die marine Fauna der Bermudas behandeln **Verrill** 1904 Trans. Connect. Acad. XI p. 15—62; — und **Davis** 1904 in Naut. XVII p. 125—130, beide mit Tafeln und Abbildungen neuer Arten.

Westamerikanisches Reich.

Westküste von Nordamerika. Eine neue Submarginula und eine Pinna beschreibt **Dall** 1901 Naut. XIV p. 142; — ein neues Bittium **Dall & Bartsch**; — eine Anzahl Nacktschnecken **Eliot** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 163. — Beiträge zur Fauna der Nordwestküste von Nordamerika giebt **Hemphill** 1901 Naut. XIV. — **Orcutt** 1901 Amer. Scient. XI führt die Fauna der nordamerikanischen Westküste zu Ende.

Bartsch 1902 Naut. XVI p. 9 beschreibt eine neue Rissoina (bakeri) aus Californien. — Die westamerikanischen Cypraeiden zählt **Button** 1901 J. Conch. Leeds X auf. — Drei neue Chromodoris von Kalifornien beschreibt **Cockerell** 1902 Nautilus XVI p. 19—21; — **Dall** 1902 Naut. XV p. 102 eine neue Volutomitra (alaskana) von Alaska; — Derselbe ibid. p. 43 beschreibt einige neue Arten; auch die Descriptions & Illustrations in P. U. S. Mus. XXIV und die verschiedenen Synopsis ebenda enthalten zahlreiche Arten von der Westküste. — **Dall & Bartsch** 1902 Naut. XVI p. 94 beschreiben eine neue Rissoina (kelseyi) von Kalifornien.

Einen neuen Sigaretus (noyesi) beschreibt **Dall** 1903 Nautilus XVII p. 37; — eine neue Metzgeria (californica) Derselbe ibid. p. 51. — Acht neue Arten aus dem kalifornischen Kanal von St. Barbara Derselbe 1903 Pr. Biol. S. Wash. XVI p. 171; — eine neue Trivia (ritteri) von Kalifornien **Raymond** 1903 Naut. XVII p. 85; — ein neues Dentalium (vallicolens) Derselbe 1904 Naut. XVII p. 123; — ein Periploma (sulcata) **Dall** 1904 ibid. p. 122. — Eine systematische populäre Aufzählung der Fauna giebt **Keep** 1904 in einem eigenen Werkchen. — Zwei neue Pleurotomien von Kalifornien beschreibt **Raymond** 1904 Naut. XVIII p. 1—3; — **Lowe** 1904 Naut. XVIII p. 18—20 verzeichnet eine Anzahl bei Santa Catalina gedrakter Arten.

Panama-Provinz. **Pilsbry & Vanatta** 1902 zählen die von der Hopkins-Stanford-Expedition an den Galapagos-Inseln gesammelten marinen Mollusken auf (ca. 100 sp., 5 n. sp.) Ebenso die von der Cocosinsel (19 sp.), unter diesen das westindische *Chlorostoma maculostriatum*.

Martens 1902 S. B. Ges. Berlin p. 59—62 zählt einige an der Cocos-Insel vorkommende Mollusken auf.

Hoyle 1904 verzeichnet die vom Albatros 1901 gedrakten Cephalopoden.

Westindien und tropisches Südamerika. Die marine Fauna von Portorico zählen **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I auf, ca. 600 Arten, davon 42 n. sp. — Eine Anzahl mariner Mollusken aus der Nähe von Pernambuco **Dall** 1901 Pr. Ac. Wash. III p. 139 (2 n. sp.); von 87 beobachteten Arten kommen nur 13 nicht in Westindien vor, eine Abgrenzung zwischen Brasilien und Westindien ist also unmöglich. — Neue westindische Arten der Gattungen *Venericardia*, *Tivela*, *Cytherea* beschreibt **Dall** 1902 gelegentlich der Revision der amerikanischen Veneridae und in Pr. U. St. Nat. Mus. v. 24; — einige westindische Pyramidelliden **Clessin** 1902 in Martini & Chemnitz.

Dall 1903 beschreibt gelegentlich der Revision der Astartidae einige tropisch atlantische Arten; — **Vanatta** 1903 Pr. Phil. einige Arten von West-Florida und Mississippi; — **Baker** 1903 zählt eine Anzahl an der Küste von San Salvador gesammelte Formen auf. — Einen neuen Fusus von Brasilien beschreibt **Grabau** 1904 Smithson. Coll. v. 45.

Antarktisches Reich.

Mellvill & Standen 1901 J. Conch. Leeds X p. 43 zählen die von R. Valentin in Stanley Harbour auf den Falklands-Inseln gesammelten Arten auf (keine n. sp.). — **Preston** Pr. mal. Soc. IV p. 257 beschreibt eine neue *Cymbiola* (*maugeri*). — **Smith** 1902 hat für den Reisebericht des Southern Cross die Mollusken bearbeitet und beschreibt zahlreiche neue Arten aus dem antarktischen Gebiet. — Die Photinula der Magellansstrasse erörtert **Ihering** 1902 Nachrbl. p. 97. — Eine neue *Scissurella* von Patagonien beschreibt **Bartsch** 1903 Naut. XVII p. 90.

Pelseneer 1904 C. R. Assoc. Française 1903 bespricht einige Probleme der antarktischen Fauna. — **Strebler** 1904 Zool. Jahresb. XXI p. 171—248 bearbeitet ausführlich die Trophon der Südspitze Amerikas. — **Vallentin** 1904 Mem. Manch. v. 48 behandelt die Fauna der Falklandinseln.

II. Systematik.

A. Cephalopoda.

Hoyle 1904 Mem. Manchester vol. 48 gibt einen vorzüglich gearbeiteten Bestimmungsschlüssel der lebenden Cephalopoden. Sein System ist folgendes:

I. Octopoda.

- Cirrhoteuthidae mit den Gattungen Cirroteuthis, Stauroteuthis, Frokenia, Opisthoteuthis.
Amphitretidae: Amphitretus.
Alloposidae: Alloposus, Bolitaena.
Argonautidae: Argonauta, Ocythoë, Tremoctopus.
Polypodidae: Polypus, Tritaxeopus, Pinnocetus, Cistopus, Scaeurgus, Moschites, Hoylea, Eledonella, Japetella.

II. Decapoda. A. Myopsidae.

- Sepiolidae: Sepiola, Iniotheuthis, Euprymna, Stoloteuthis, Heteroteuthis, Nectoteuthis, Sepioloidea, Sepiadarium, Rossia, Semirossia, Promachoteuthis.
Loliginidae: Loligo, Sepioteuthis, Lolius, Lolliguncula.
Sepiidae: Sepia, Sepiella, Hemisepiops.
B. Oegopsidae.
Spirulidae: Spirula.
Gonatidae: Gonatus.
Onychoteuthidae: Onychoteuthis, Ancistroteuthis, Chaunoteuthis, Teletethis, Tetranychoteuthis, Lycoteuthis.
Enoploteuthidae: Enoploteuthis, Abralia, Thelidoteuthis, Ancistrochirus, Pterygioteuthis, Pyroteuthis, Abraliopsis, Octopodoteuthis, Cuciotheuthis.
Thaumatalampadidae: Thaumatalampsas.
Architeuthidae: Architeuthis.
Bathyteuthidae: Bathytentis, Ctenopteryx.
Tracheloteuthidae: Tracheloteuthis, Brachioteuthis.
Histiotheuthidae: Histiotheuthis, Calliteuthis, Meleagroteuthis.
Thysonoteuthidae: Thysonoteuthis
Ommastrephidae: Ommastrephes, Symplectoteuthis, Sthenoteuthis, Dosidiscus, Illex, Todaropsis, Hyaloteuthis, Rhynchoteuthis.
Chiroteuthidae: Chiroteuthis, Doratopsis, Mastigoteuthis.
Grimalditeuthidae: Grimalditeuthis.
Galiteuthidae: Galiteuthis.
Cranchiidae: Cranchia, Pyrgopsis, Leachia, Taonius.
C. Incertae Sedis: Dubioteuthis, Lepidoteuthis, Cirrhobrachium,

Octopoda.

Argonautidae.

Argonauta (Linné) expansa Dall zuerst abgeb. bei Dall 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 33 f. 1—3.

Tremoctopus (delle Ch.) *scalenus* n. Panama; **Hoyle** 1904 Bull. Mus. Cambridge vol. 43 p. 13 fig.

Amphitretidae.

Amphitretus (Hoyle), Ein frisches Exemplar dieser seltenen Gattung beschreiben **Ijima & Ikeda** 1902 Annot. Zool. japon. IV; die spezifische Bestimmung bleibt unsicher.

Cirrhoteuthidae.

Stanroteuthis (Verrill) *hippocrepium* n. Panama; **Hoyle** 1904 Bull. Mus. Cambridge vol. 43 p. 6, fig.

Froeckenia n. gen. für *Tr. clara* n. Panama; **Hoyle** 1904 Bull. Mus. Cambridge vol. 43 p. 7, fig.

Polypodidae (Octopidae).

Polypus (Schneider) *gardineri* n. Lakhediven; **Hoyle** Lakhed. p. 976 Textfig. 144, 145; — *hermanni* n. Ceylon; **Hoyle** 1904 Suppl. Rep. p. 187 pl. 1; — *aiborescens* n. *ibid.*, id. p. 189 t. 2 f. 8, 9, 12, t. 3; — *campbelli* n. Campbell Insel; **Smith** 1902 Voy. Southern Cross p. 201 t. 24 f. .

Hoyle 1901 Mem. Manchester vol. 45, III nimmt für *Octopus* Lam. den Namen *Polypus* Schneider 1784 auf und nennt die Familie Polypodidae; ebenso hat Eledone in Zukunft Moschites Schneider zu heissen.

Hoylea (Cossmann). — **Hoyle** 1901 Mem. Manchester vol. 45 erklärt die Ersetzung von *Histiopsis* Hoyle (wegen eines älteren *Histiops*) für unnöthig, umso mehr als der Name *Hoylea* durch Rochebrune präoccupirt und *Histiopsis* ohnehin zweifelhaft ist. (Im Diagnostic Key 1904 scheint er indes den Namen doch anzunehmen).

Dekapoda.

Sepiolidae.

Heteroteuthis (Gray) *weberi* n. Java; **Joubin** 1902 Mem. Soc. zool. France XV p. 113.

Joubin 1902 Mem. Soc. zool. France XV p. 80—144 giebt eine Revision der Familie. Er unterscheidet drei Unterfamilien: Sepiolidae mit den Gattungen *Sepiola* Leach, *Imotenthis* Verrill, *Microtenthis* Ortmann, *Stoloteuthis* Verrill und *Promachotenthis* Hoyle; — *Heteroteuthinae* mit den Gattungen *Heteroteuthis* Gray (nec Verrill) und *Nectoteuthis* Verrill; — und *Rossiae* mit der Gatt. *Rossia* Owen und den Untergattungen *Rossia* s. str., *Franklinia* Normann und *Semirossia* Steenstrup.

Rossia (Owen) *caroli* n. Azoren; **Joubin** 1902 Bull. Soc. zool. France XXVII p. 138.

Loliginidae.

Loligo (Lam.) *diomedae* n. Acapulco, West-Mexiko; **Hoyle** 1904 Bull. Mus. Cambridge vol. 43 p. 29, fig.

Sepiidae.

Sepia (L.) *koettlitzi* n. Küste des Somali-Landes; **Hoyle & Standen** 1901 Mem. Manchester vol. 45 t. 1; — *burnupi* n. Natal; **Hoyle** 1904 J. of Conch. XI p. 27, fig.

Enoplotenthidae.

Abralia (Gray) *andamanica* Goodrich abgebild. bei Alcock 1902 p. 280, Textfig.

Chiroteuthidae.

Chiroteuthis (d'Orb.) *pellucida* Goodrich, abgebild. bei Alcock 1902 p. 280, Textfig.

Mastigoteuthis (Hoyle) *dentata* n. Galapagos; Hoyle 1904 Bull. Mus. Cambridge vol. 43 p. 34, fig.

Cranchiidae.

Taonius (Steenstr.) *abyssicola* Goodrich, abgebild. bei Alcock 1902 p. 279, Textfig.

Ommastrephidae.

Rhynchoteuthis (d'Orb.) *chuni* n., nördlich der Marquesas; Hoyle 1904 Bull. Mus. Cambridge vol. 43 p. 32, fig.

Sedis incertae.

Lepidotethis n. gen. Joubin 1901 Cephal. Princesse Alice p. 70 t. 6, t. 7, t. 10, f. 3–6, t. 15 f. 1, 2, aus dem Magen eines an den Azoren gefangenen Walfisches (wahrscheinlich auf ein halbverdautes Stück gegründet, das seine Oberhautbewaffnung verloren hat; Hoyle 1901 Mem. Manchester v. 45; cfr. Diagnostic Key 1904 p. 17).

Dubio teuthis n. gen., Joubin 1901 Cephal. Princesse Alice p. 102 t. 15 f. 8–10.

Cirrobrachium n. gen., Hoyle 1904 Rep. Albatros, in Mus. Cambridge, vol. 43 p. 28; — *filiferum* n., nördlich der Marquesas; id. ibid. p. 28.

B. Gastropoda.

I. Prosobranchia.

a) Pectinibranchia.

α. Rhachiglossa.

Muricidae.

Cossmann 1903 Essais paléont. comp. V rechnet zu dieser Familie die Muricinae, Ocinebrinae, Trophoninae, Typhinae und Rapaninae. Er macht darauf aufmerksam, dass die Muricinae, Ocinebrinae und Typhinae nach fünf verschiedenen Richtungen hin korrespondirende Varietäten oder Formen entwickeln, welche er als Longicaudes, Poliacanthophores, Pterophores und Pachycolpes bezeichnet. — Zu den *Muricinae* rechnet er die Gattungen Murex s. str. mit den Untergattungen Murex s. str. einschliesslich Haustellum Montf., Tubicauda Jouss., Acupurpura Bayle; — Pteropurpura Jouss. mit Alipurpura Bayle; — Chicoreus Mtf. mit Euphyllon Jouss. und Inermicosta Jouss.; — Muricantha Swains. mit Favartia Jouss., Hexaplex Perry und Poirieria Jousseaume, und Homalacantha Moerch; — Muricopsis Bucq., Dautz. & Dollf. — Zu den *Ocinebrinae* (oder wie er schreibt Ocinebrinae) die Gattungen Ocinebra Leach mit den Untergattungen Ocinebra s. str., Antimurex n. = Crassilabrum Jouss. nec

Mühlf., und Ocinebrina Jouss.; Vitularia Swains.; Pterorhytis Conrad; — Hadriania Bucq. mit Pseudomurex Mtrs.; — Urosalpinx Stimpson; — Eupleura Adams. — Zu den *Trophoninae*: Trophon mit Trophonopsis, Xanthochorus Fischer, Forreria Jonss. und Boreotrophon Fischer; — und Aspella Gray. — Zu den *Typhinae*: Typhis Montf. mit den Untergattungen Typhis s. str. einschliesslich Typhina Jouss., Typhinellus Jouss. und Haustellotyphus Jouss.; — Cyphonochilus Jouss.; — Pterotyphis Jouss. — Zu den *Rapaninae*: Rapania Schum. mit Latiaxis Swainson.

Antimurex nom. nov. für Crassilabrum Jousseaume nec Müblf.; Cossmann 1903 Essais paléont. p. 12; — Typus Murex crassilabrum Gray.

Kalydon (Hutton) paivae Crosse. Zu dieser Art als Varietäten zu stellen sind nach Hedley 1903 Thetis II p. 381: Trophon hanleyi Angas, Tr. australis T. Woods, Tr. assisi T. Woods und Tr. squamosissimus Woods; — curta n. Neuseeland; Murdoch 1904 Tr. N. Z. Inst. p. 228 t. 8 f. 22.

Latiaxis (Swains.) rosaceus n. (= nodosa Sow. nec Ad.), Südafrika; Smith 1903 Pr. mal. Soc. V p. 376 t. 15 f. 6.

Maculotriton Dall ist nach Pilsbry & Vanatta 1904 Pr. Philad. p. 592 als Gattung zu den Muricidae zu stellen. (Shell acuminate - oblong, longitudinally plicate and spirally tuberculate - lirate, with a smooth trochoid nucleus of about $3\frac{1}{2}$ whorls; aperture ovate, the outer lip thick, dentate within, and strengthened by a rounded varix outside; another varix often developed opposite it on the last whorl. Anterior canal open, very short. A small posterior sinus is defined by a low callus on the parietal wall. Operculum with basal nucleus. — Type: Triton bracteatus Hds.; — M. bracteatus subsp. longus n. Japan; iid. p. 595.

Murex (L.) malabaricus Smith abgeb. bei Alcock 1903 p. 172, Textfig.; — gallinago n. Japan; Sowerby 1903 Ann. N. H. XII p. 496; — submissus n. Maldiven; Smith 1903 Malvide Isl. p. 609 fig.; — damicornis n. Neusüdwales; Hedley 1903 Mem. Austral. Mus. IV p. 378 Textfig. 92; — trunculus var. pagodula n. Nordafrika; Pallary 1903 Ann. Mus. Marseille VIII p. 6 t. 1 f. 1; — brandaris var. robusta n., quadrifasciata n., diplacantha n., Mittelmeer; Dautzenberg 1904 J. Conch. v. 52 p. 285 t. 8 f. 1—3; — multispinosus n. Philippinen; Sowerby 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 8, Textfig.; — (Pteropurpura) carpenteri Dall abgeb. bei Dall 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV t. 34 f. 9; — (Pt.) petri Dall desgl. t. 34 f. 7; — (Pteronotus) exquisitus n. unsicheren Fundorten; Sowerby 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 176.

Muricidea (Swains.) philippiana Dall zuerst abgeb. bei Dall 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV t. 29 f. 5; — (Pseudoneptunea) multangula Phil. desgl. t. 30 f. 1.

Ocinebrina (B. D. D.) edwardsi var. apiculata n. Tanger; Pallary 1901 J. C. p. 344, abgeb. ibid. 1902 t. 1 f. 8, 9; var. crassata n. ibid. f. 10, 11; — var. hispidula n. Golf von Gabes; Pallary 1900 J. Conch. v. 52 p. 231 t. 7 f. 18.

Ocinebra? (Leach) painei n. Kalifornien; Dall 1903 Pr. Wash. XVI p. 175 — marjoriae n. persischer Meerbusen; Melvill & Standen 1903 Ann. N. H. XII p. 308 t. 22 f. 10; — monoptera n. Japan; Pilsbry 1904 Pr. Philad. p. 17 t. 4 f. 32.

Pteropurpura (Jousseaume). **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. **XXIV** p. 532 nimmt diesen Namen (von 1880) statt des bei den Reptilien *praeoccupirten* *Pteronotus* auf; *Pteryumurex* Rovereto 1899 wird dadurch überflüssig.

Trophon (Montf.) *kowieensis* n., Kowies, Südafrika; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 213 t. 22 f. 16; — *pelecatus* n. Patagonien; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. 24 p. 535; — (*Boreotrophon*) *maclaini* n. Grönland; id. p. 538; — (*Actinotrophon*) *camtschatkanus* n. Kamtschatka; id. p. 541; — (*A.*) *smithi* n. Kalifornien; id. p. 542. — (*A.*) *peregrinus* n. *ibid.*, id. p. 543; — *beringi* n. Beringsmeer; id. p. 544; — *pacificus* n. *ibid.*, id. p. 544; — *tripherus* n. Nordwestamerika; id. p. 545; — *alaskanus* n. Alaska; id. p. 545; — *mazatlanicus* n. Mazatlan; id. p. 546; — *panamensis* n. Panama: id. p. 546; — *avalonensis* n. Avalon b. Sta. Barbara, Kalifornien, id. p. 546, mit var. *?eucymatus* n. p. 547; — *rotundatus* n. Beringsmeer; id. p. 547; — (*Austrotrophon*) *pinnatus* n. Unterkalifornien; id. p. 549; — *simplex* n. Südafrika; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 380, Textfig. 93. — *ohlini* n. Südspitze von Amerika; **Strebler** 1904 Zool. Jahrb. XXI p. 203 t. 3 f. 9; — *paessleri* n. *ibid.*, id. p. 213 t. 7 f. 56; var. *turrita* n. *ibid.*, id. p. 215 t. 7 f. 57; — *elongatus* n. *ibid.*, id. p. 217 t. 7 f. 58; var. t. 8 f. 66; — *pseudoelongatus* n. *ibid.*, id. p. 220 t. 7 f. 60; — *albus* n. *ibid.*, id. p. 221 t. 7 f. 61; — *obesus* n. *ibid.*, id. p. 222 t. 7 f. 62; — *acuminatus* n. *ibid.*, id. p. 222 t. 7 f. 62; — *fenestratus* n. *ibid.*, id. p. 225 t. 7 f. 59; — *hoyei* n. *ibid.*, id. p. 227 t. 8 f. 68, 69; — *brucei* n. *ibid.*, id. p. 230 t. 8 f. 72; — *ornatus* n. *ibid.*, id. p. 231 t. 8 f. 73; — *standeni* n. Falkland-Inseln; id. p. 232 t. 7 f. 67; — *couthouyi* n. Südspitze von Amerika; id. p. 236 t. 7 f. 65, t. 8 f. 76; — *elegans* n. *ibid.*, id. p. 241 t. 8 f. 71; — *ringei* n. Pfeffer mss., *ibid.*, id. p. 242 t. 8 f. 77. — *laminatus* Petterd zuerst abgebildet (als *Murex*) bei **Tate & May** 1901 t. 23 f. 3.

Typhis (Montf.) *martyria* n. Golf von Kalifornien; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. 24 p. 550; — *transcurrents* n. Sansibar; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berlin p. 240, abgeb. Tiefsee t. 3 f. 2; — *syringianus* n. Süd-Australien; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 381, Textfig. 94.

Purpuridae.

Cossmann 1903 Essais Paléoconch. comp. V rechnet zu dieser Familie die Gattungen: *Purpura* Brug. mit den Untergattungen *Purpura* s. str. einschliesslich *Plicopurpura* n. und *Planithais* Bayle, *Stramonita* Schum. einschliesslich *Thalessa* Ad. und *Trochia* Swains; *Polytropalicus* Rovereto = (*Polytropa* Swains.) mit *Cronia* Ad. und *Agnesia* Ten. Woods; — *Cymia* Moerch; — *Jopas* Adams mit *Pinaxia* H. Ad.; — *Vexilla* Swains mit *Usilla* H. Ad.; — *Acauthina* Fischer de Waldh. mit *Chorus* Montf.; — *Ricinula* Lam. mit *Sistrum* Montf.; — *Concholepas* Lam.

Purpura (Brug.) *pseudamygdala* (Cronia) nom. nov. für Bucc. *amygdala* Reeve, nec *Purpura amygdala* Kiener; **Hedley** 1902 Studies VII p. 599 t. 29 f. 4, 5; — *sertata* n. Südaustralien; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 383, Textfig. 95, 96; — *eudeli* n. China; **Sowerby** 1903 J. Malac. X p. 74 t. 5 f. 3. — *pura* n. *ibid.*, **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 376 t. 15 f. 21; — *tosana* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 17 t. 3 f. 30; — *texturata* n. Port Alfred; **Smith** 1904 J. of Mal. XI p. 32 fig.

Plicopurpura nom. nov. für *Purpurella* Dall nec Desv.; **Cossmann** p. 69.

Ricinula (Lam.) *japonica* (*Pentadactylus*) n. Japan; **Sowerby** 1903 Ann. N. H. XII p. 496; — *paucimaculata* n. ibid., id. p. 496.

Sistrum (Montf.) *squamilaratum* n. Südafrika; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 377 t. 15 f. 17; — *indigoferum* n. Rotes Meer; **Melvill** 1901 Ann. Nat. Hist. VII p. 551 t. 9 f. 1; — *morus* var. *borealis* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 18 t. 3 f. 31.

Rapanidae.

Rapana (Schum.) *idolea* Tryon (nec *idoleum* Jonas) = *fusiformis* Chemn.; **Martens** 1903 Tiefsee p. 96.

Buccinidae.

Cossmann 1901 Essais Paléoc. comp. fasst in dieser Familie sechs Unterfamilien zusammen: 1. Buccininae mit den lebenden Gattungen *Buccinum* L. incl. *Volutarpa* Fischer, *Mala Jeffr.*, *Liomesus* Stimp. — 2. Cominellinae mit den Gattungen *Cominella* Gray incl. *Triumphis* Gray, *Chlanidota* Martens, *Josepha*, *Tenn.* Woods, — *Cyllene* Gray. — 3. Photinae für *Phos* Montf. und einige fossile Gattungen. — 4. Pisaniinae für *Pisania* Gray (= *Pollia* Gray), *Metula* Adams und *Tritonidea* Swains. einschl. *Cantharus* Bolten. — 5. Latrunculinae für *Latrunculus* Gray (*Typus Ebura spirata*), einschl. *Peridipsacus* Rovereto (*Typus Eb. molliana* Chemn.) und *Zemira* Ad. (*Eb. australis*). — 6. Pseudolivinae mit den Gattungen *Pseudoliva* (*Typus B. plumbeum* Chemn.) und *Fulmentum* Fischer (*Typus seuddoliva* sepimenta Rang.).

Adansonia nom. nov. für *Folinaea* Mtrs. nec *Folinia* Crosse; **Pallary** 1902 J. Conch v. 50 p. 23.

Buccium (L.) *birasei* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 391 t. 20 f. 22, — *inclitum* n. Japan; **Pilsbry** 1904 *Nautilus* v. 18 p. 87; — *chichimanum* n. ibid., id. p. 87.

Cominella (Gray) *unifasciata* Sow. = *Purpura castanea* Dkr.; **Smith** 1904 J. of Malac. XI p. 33; — *suleata* Sow. wahrscheinlich eine *Daphnella*; id. p. 28.

Lachesis (Risso) *australis* n. Kerguelen; **Martens** 1903 Tiefsee p. 62 t. 5 f. 18.

Donovania (Bucq.) *decorata* n. Mtrs. mss., Nordafrika; **Pallary** 1902 J. C. p. 13 t. 1 t. 14. — *fenestrata* Tate & May abgeb. bei **Tate & May** 1901 t. 24 f. 36.

Euthria (Gray) *hokkaidonis* n. Hokkaido, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 389 t. 19 f. 17; — *queckettii* n. Durban, Natal; **Smith** 1901 J. C. Leeds X p. 110 t. 1 f. 1; — *aucklandica* n. Neuseeland; **Smith** 1902 Voy. Southern Cross VII p. 203 t. 24 fig. 12, 13; — *pura* n. Südafrika; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 25 t. 2 f. 14.

Euthria eburnea Sowerby = *Peristernia leucothoe* Melvill; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 309.

Fascinus n. gen. *Buccinidarum*, zunächst mit *Hindsia* verwandt, klein, oblong mit grossem Embryonalgewinde und 4 Windungen, gegittert, nur ein Varix an der Mündung; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 373. — *Typus F. typicus* n. Südaustralien; id. p. 376, Textfig. 91.

Pisania (Bivona) *delicatula* n. Bird Island, Pacific; **Sowerby** 1902 J. Mal VIII p. 101 t. 9 f. 2.

Metula (Adams) *daphnelloides* n. Gulf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 307 t. 22 f. 9; — *mitrella* Ad. & Rve. = *bindsi* Adams; **Smith** 1904 Investigator p.

Phos (Montf.) *gladysiae* n. Gulf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 416 t. 23 f. 15; — *oxyglyptus* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 401 t. 57 f. 18; — *nitens* n. Cebu; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 208 t. 22 f. 1; — *tabidus* n. Neusüdwales; **Hedley**, in: Pr. Linn. S. N. S. Wales vol. 29 p. 191; — *tenuicostatus* (*Cominella*) T. Woods zuerst abgeb. bei **Tate & May** 1901 p. 358, Textfig. 2.

Nassarina (Dall) *metabrunnea* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 401 t. 57 f. 16.

Nassaria (Link) *teres* n. Nicobaren; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berlin p. 240; Tiefsee p. 98 t. 3 f. 9.

Sylvanocochlis n. gen. *Buccinidarum*; **Smith** 1903 J. C. Leeds X p. 325 für *Pseudoliva ancilla* Hanley (Shell very smooth, dun coloured, imperforate, fading into white in the centre of the last whorl, somewhat solid, spire attenuately fusiform, whorls compressedly flattened, not the least channelled at the sutures; mouth ovate oblong, outer lip thin, possessing a tooth-like projection, near the base, at the point where commences the spiral groove extending over the last whorl to the columellar margin; the last almost smooth, white, shining with a shining noduled callus in the upper part).

Tritonidea (Swains.) *submenkeana* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 387 t. 21 f. 24. — *natalensis* n. Natal = *subrubiginosa* Sow. nec Smith; **Smith** 1901 J. C. Leeds, X p. 111 t. 1 f. 23; — *sowerbyana* n. Gulf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 306 t. 22 f. 8; — *natalensis* Smith = *carinifera* Küster; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 371; — *tosana* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 19 t. 4 f. 33. — (*Cantharus*) *eburneus* Petterd (*Trophon*) abgeb. bei **Tate & May** 1901 p. 357, Textfig. 1; — *kingicola* Tate & May desgl. t. 24 f. 20.

Chrysodomidae.

Cossmann 1901 (Ess. Paléoc. comp.) errichtet eine eigene Familie. Dieselbe enthält (an lebend vorkommenden Formen) *Chrysodus* Swains. (= *Neptunea* Bolten) mit den Untergattungen *Siphon Klein*, *Volutopsis Moerch*, *Siphonalia* Adams, *Kelletia Bayle*, *Penion Fischer* (für *Fusus dilatatus Quo*), *Austrofusus* Kobelt und *Pseudoneptunea* Kobelt: — und *Euthria* Gray.

Dall 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV p. 521 betrachtet die Chrysodominae als eine Unterfamilie der Buccinidae und erkennt folgende Gattungen an: *Chrysodus* Swains., Typus *Chr. antiquus* L.; — *Ephora* Conrad (Miocän); — *Tritonofusus* Beck mit *Siphonorbis* Moerch (= *Siphonella Verill*), Typus *F. lachesis* Moerch.; — *Plicifusus* Dall, Typus *F. kroyeri* Moeller; — *Ancistrolepis* Dall für *Chr. eucosmus* Dall und *Mohnia* Friele; — *Volutopsis* Moerch. mit *Pyrulofusus* Moerch; — *Liomesus* Stimp.; — und *Beringius* Dall, Typus *Chrysodus* *crebricostatus* Dall. — Der Name *Siphon Klein* wird als vorlinneisch verworfen, *Neptunea* Bolten als auf ein buntes Artengemenge ohne Diagnose gegründet.

Chrysodomus (Swains.) *intersculptus* var. *frater* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 591 t. 20 f. 22; — *pericochlion* Schrenk abgeb. ibid. t. 20 f. 23.

Beringius (Dall). — Die Namen Jumala Friele und Ukko Friele haben in die Synonymie zu wandern; **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV p. 529.

Volutopsius (Mörch) *trophonius* n. Beringsmeer; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. vol. 24 p. 527: — *kobelti* n. ibid., id. p. 528 t. 35 f. 2; — *castaneus* Mörch, ebenda neu abgebildet t. 36 f. 2; — *attenuatus* Dall t. 36 f. 3; — *regularis* Dall t. 36 f. 6.

Siphonalia (Adams) *maxima* Tryon, ein ausgewachsenes Stück abgeb. bei **Hedley** 1903 Mem. Austral. Museum IV t. 38.

Sipho (Klein) *antarctidis* n. Antarktisches Meer; **Pelseneer** 1903 Voy. Belgica p. 22.

Nassidae.

Cossmann 1901 (Essais Paléoc. comp. livr. 4) vertheilt die Nassiden in folgende Unterfamilien: 1. *Nassinae* mit *Nassa* Lam. (einschliesslich *Niotha* Ad., *Zeuxis* Ad., *Hima* Ad., *Amycla* Ad. und *Telasco* Ad.), *Desmoulea* Gray, *Arcularia* Link (einschliesslich *Naytia* Ad.), *Cyclonassa* Swains. und *Alectryon* Montf. (einschliesslich *Aciculina* Ad.); — 2. *Dorsaninae* mit den Gattungen *Dorsanum* Gray (einschliesslich *Liodomus* Swains., *Northia* Gray und *Adinus* Ad.), und *Buccinanops* d'Orb. (einschliesslich *Bullia* Gray); — 3. *Truncariinae* mit den Gattungen *Ilyanassa* Stimp. (einschliesslich *Paranassa* Conrad und *Nassodonta* Ad.), *Amentone* n. (= *Canidia* Adams 1861 nec Thomson 1857), *Truncaria* Ad. & Rve., und *Venassa* Martens.

Amycla corniculum var. *bedei* n. Golf von Gabés; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 228 t. 7 f. 9.

Bullia (Gray) *trifasciata* n. Kap; **Smith** 1904 J. Malac. XI p. 34 t. 2 f. 17; — (*Pseudostrombus*) *strenaria* n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 51 t. 5 f. 10.

Cyllene (Gray) *japonica* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 19 t. 4 f. 34.

Nassa (Lam.) *collaticia* (*Alectryon*) n. Karachi; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 409 t. 23 f. 10; — (*Al.*) *eronea* n. Persischer Meerbusen; iid. p. 410 t. 23 f. 11; — (*Al.*) *idyllia* n. Golf von Oman; iid. p. 410 t. 23 f. 12; — (*Niotha*) *angriensis* n. Angrias Bank bei Bombay; iid. p. 412 t. 23 f. 13; — (*N.*) *sturtiana* n. Golf von Oman; iid. p. 413 t. 23 f. 14; — *frederici* nom. nov. für N. (*Hima*) *townsendi* Melv. nec Dall; — *tingitana* n. Tanger; **Pallary** 1901 J. C. p. 226, t. 1 f. 3, 4; — *cebuensis* n. Cebu; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 208 t. 22 f. 2; — *eusulcata* n. Südafrika; **Sowerby** 1902 Marine Invest. Cap p. 94 t. 2 f.; — *circumtexta* n. Südafrika (= *trifasciata* Sow. nec Ad.); **Martens** 1903 Tiefsee p. 27 t. 3 f. 18; — *natalensis* n. Südafrika; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 373 t. 15 f. 6 (= *sturmii* Reeve nec Phil.); — *optima* n. Nordwest-Australien; **Sowerby** 1903 J. Mal. X p. 73 t. 5 f. 12; — *desmoulioides* n. Südafrika; **Sowerby** 1903 Marine Invest. Cap p. 219 t. 4 f. 1; — *analogica* n. iid., id. p. 219 t. 4 f. 3; — (*Alectryon*) *himeroessa* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 306 t. 22 f. 7; — *maldivensis* n. Malediven; **Smith** 1903 p. 606; — *mulukuensis* n. iid., id. p. 607; — *subtranslucida* n. iid., id. p. 607; — *disparilis* n. iid., id. p. 607; — (*Cyclonassa*)

vayssieri n. Nordafrika; **Pallary** 1903 Ann. Mus. Marseille VIII p. 9 t. 1 f. 15—18; — thaumasia Stur. Rotes Meer, zuerst abgeb. bei **Sturany** 1903 Pola t. 2 f. 7, 8; — steindachneri n. ibid., id. t. 2 f. 9; — xesta n. ibid., id. t. 2 f. 6; — munda n. ibid., id. t. 2 f. 4; — sporadica n. ibid., id. t. 2 f. 5; — stiphia n. ibid., id. t. 2 f. 2; — poecilosticta n. Port Alfred, Kap; **Smith** 1904 J. Malac. XI p. 33 t. 2 f. 16; — fernussaci var. arcuata n. Golf von Gabés; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 226 t. 7 f. 10; — var. exigua n. ibid., id. p. 226 t. 7 f. 14; — semiplicata var. hiradoensis n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 20 t. 4 f. 35; var. hizenensis n. ibid., id. p. 21 t. 4 f. 36.

Columbellidae.

Cossmann 1901 (Essais Paléoc. comp. livr. 4) spaltet die Familie in die Unterfamilien Columbellinae und Atiliinae. Die erstere umfasst die Gattungen Columbella Lam., Mitrella Risso (mit Nitidella Swains.), Anachis Ad. (mit Astyris Ad.), Alcira A. Ad. und Strombocolumbus Cossm. (= strombina Moerch 1859, nec Bronn 1849); — letztere die Gattungen Atilia Ad. einschliesslich Orthurella Sacco, und Aesopus Gould.

Pace 1902 Pr. mal. Soc. V p. 36—154 giebt ein Verzeichnis der bekannten Arten nebst einer kritischen Uebersicht der vorgeschlagenen Gattungen und Sektionen; Strombocolumbus Cossmann für Strombina Moerch wird zurückgewiesen, da eine Gattung Strombina Bronn nicht existirt.

Kesteven 1902 Pr. N. S. Wales XXVI bildet die Embryonalschalen von C. semiconvexa und C. australis ab.

Aesopus (Gould) urania n. Mekran Küste; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 407 t. 23 f. 9, mit var. albens.

Antistreptus n. gen., ähnlich Anachis, aber linksgewunden mit rechts-gewundenem Nucleus; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. 24 p. 532; Typus A. magellanicus n. Magellansstrasse; id. p. 532.

Columbella (Lam.) melitoma (Seminella) n. Karachi; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 405 t. 23 f. 5; — (S.) phaula n. ibid., iid. p. 405 t. 23 f. 6; — (S.) selasphora n. ibid., iid. p. 406 t. 23 f. 7; — (S.) townsendi n. ibid., iid. p. 406 t. 23 f. 8; — albinodulosa Gaskoin, neu abgebildet bei **H. Fischer** 1901 J. C. p. 101, Textfig.; — (Atilia) fauroti Jouss. zuerst abgebildet, ibid. p. 102 Textfig. — polynyma nom. nov. für misera Dkr. nec Sow. = japonica Mrts. nec Reeve; **Pilsbry** 1901 Pr. Philad. p. 196; — (Anachis) leptalea n. Umkomaas, Natal; **Smith** 1902 J. C. Leeds p. 250 t. 4 f. 4; — calliglypta n. Puerto Rico **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 405 t. 57 f. 13; — perculta n. ibid., iid., p. 405 t. 57 f. 12; — hidalgoi Mtrs. zuerst abgeb. bei **Pallary** 1902 J. C. v. 50 t. 1 f. 5—7; — plexa n. Australien; **Hedley** 1901 Studies V p. 720, Textfig. 28; — hervieri nom. nov. für peasei; **Pace** 1903 J. Conch. v. 50 p. 420; — (Nitidella) seychellarum n. Seychellen; **Martens** 1903 Tiefsee p. 105 t. 5 f. 17; — calliope n. Bombay; **Melvill** 1903 J. Malac. X p. 29 fig.; — agatha n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 52 t. 5 f. 11; — turturina var. borealis n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 13; — albinodosa var. ogasawara n. ibid., id. p. 14 t. 3 f. 23; — liocyma n. ibid., id. p. 14 t. 3 f. 24; — somnium n. ibid., id. p. 15 t. 2 f. 28, 29; — hahajimana n. ibid., id. p. 15 t. 3 f. 25; — divaricata n. ibid., id. p. 16 t. 3 f. 26; — huttoni Suter (= Lachesis sulcata Hutt.) zuerst abgebildet bei **Murdoch** 1904 Tr. N. Z. Inst. p. 223 t. 7

f. 12; — transitans n. Neuseeland; id. p. 224 t. 7 f. 13; — paxillus n. ibid., id. p. 224 t. 7 f. 14; — saxatilis n. ibid., id. p. 224 t. 7 f. 15.

Mitrella (Risso) agnesiana n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 401 t. 23 f. 3; — alizonae n. Persischer Meerbusen; iid. p. 402 t. 21 f. 5; — astolensis n. Mekran Küste; iid. p. 403 t. 23 f. 4; — nomadica n. Karachi; iid. p. 404 t. 21 f. 7; — erythraensis n. Rotes Meer; **Sturany** 1903 Pola abgeb. t. 1 f. 5; — nomaensis n. ibid., desgl. t. 1 f. 6.

Erato (Donovan) recondita n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 302 t. 21 f. 9; var. haplochila n. ibid., iid. p. 302 t. 21 f. 10; — bimaculata Tate zuerst abgebildet bei **Tate & May** 1901 t. 23 f. 6.

Coralliophilidae.

Cossmann 1903 Essais Paléoconch. comp. V p. 82 rechnet hierher die Gattungen *Rbizochilus* Steenstr., *Coralliophila* Adams mit *Corallibia* Adams, *Leptoconchus* Rüppell, *Magilus* Montf. und *Rapa* Klein.

Coralliophila (H. & A. Ad.) rubrococcinea n. Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 401 t. 21 f. 2; — jeffreysi var. hiradoënsis n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 16 t. 3 f. 27. — dissimulans n. Ceylon; **Preston** 1904 J. Mal. XI p. 77 Textfig.

Olividae.

Oliva (Lam.) caribaeensis n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 391 t. 56 f. 9; — rubrolineata n. Neue Hebriden; **Fischer** 1902 J. Conch. v 50 p. 409 t. 8 f. 12, 13; — rufofulgorata n. Holländisch Indien; **Schepman** 1903 Tijdschr. nederl. Vereen. vol. 8 p. 67; — dubia n. ibid., id. p. 68; — ceramensis n. Ceram; id. p. 68.

Ueber die Mittel zur Artunterscheidung bei *Oliva* vgl. **Bridgman** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 346.

Ancillaria (Lam.) lanceolata (*Turrancilla*) n. Sansibar; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berlin p. 23; 1903 Tiefsee VII p. 110 t. 3 f. 10; — hasta n. ibid.; id. 1903 p. 37 t. 3 f. 13; — contusa Rve. abgeb. bei **Sowerby** 1903 Marine Invest.-Cap II; — albozonata n. Port Alfred, Kap; **Smith** 1904 J. Malac. XI p. 29 t. 2 f. 9; — recevi n. ibid., id. p. 29 t. 2 f. 10.

Turbanellidae.

Turbanella (Lam.) triangularis Smith = *truncata* Sow.; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 370.

Mitridae.

Costellaria (Swains.) malcolmensis n. Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 421 t. 23 f. 18; — pasithea n. Golf von Oman, iid. p. 422 t. 23 f. 17; — hizenensis u. Hizen, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 386 t. 21 f. 31; — vanattai n. ibid., id. p. 387 t. 21 f. 31; — diaconalis n. Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 308 t. 22 f. 12; — angustissima n. Maldiven; **Smith** 1903 Maldiven p. 605 fig.

Mitra (L.) lalage (*Cancilla*) n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 419 t. 23 f. 16; — (*Turricula*) caliendrum n. Persischer Meerbusen; iid. p. 420 t. 21 f. 1; — (*Pusia*) blanfordi n. Golf von Oman, iid. p. 423 t. 23 f. 19;

— kowiensis n. Kowies, Südafrika; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 213 t. 22 f. 17; — tunetana n. Tunis; **Pallary** 1903 Ann. Mus. Marseille VIII p. 8 t. 1 f. 8, 9; — cornicula var. glandina n. Nordafrika; id. p. 8 t. 1 f. 19; — (*Phaeomitra*) triplicata n. Ostafrika; **Martens** 1903 Tiefsee p. 104 t. 3 f. 17; — lowei n. St. Barbara Channell; **Dall** 1903 Pr. Biol. Soc. Washington XVI p. 173; — dolorosa n. ibid., id. p. 173; — hirasei n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 12 t. 13 f. 21; — townsendi n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 163 t. 10 f. 14. — (*Putia*) hedleyi n. Neuseeland; **Murdoch** 1904 Tr. N. Z. Inst. p. 228 t. 8 f. 21.

Thala (H. & A. Ad.) ogasawarana n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 13 t. 3 f. 22; — ceylanica n. Ceylon; **Preston** 1904 J. Mal. XI p. 76, Textfig.

Turrieula (Klein) scalariformis T.-Woods, abgeb. bei **Tate & May** 1901 p. 361, Textfig. 3.

Fusidae (= *Fasciolariidae*).

Cossmann 1901 (Essais Paléoc. comp. livr. 3) setzt an die Stelle des gebräuchlichen Namens *Fasciolariidae* den Namen *Fusidae*. Er rechnet zu derselben folgende Unterfamilien: 1. *Fusinae* mit den Gattungen *Fusus* Lam. (mit *Aptyxis* Troschel und *Columbarium* Martens, letzteres sicher eine Toxoglosse); — *Clavella* Swains. 2. *Fasciolariinae* mit den Gattungen *Fasciolaria* Lam. (mit *Pleuroploca* Fischer), *Lathyrus* Montf., *Peristernia* Mörcb und *Leucozonia* Gray; — 3. *Ptychatractinae* für *Ptychatractus* Stimp.

Austrofusus (Kob.) appressus n. Südwestafrika; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berlin p. 21; Tiefsee t. 2 f. 9.

Fusus (Lam.) crassus n. Tanger; **Pallary** 1901 J. Conch. v. 49 p. 43 abgeb. bei **Pallary** 1902 J. C. v. 50 t. 1 f. 1, 2; — verrucosus var. Chuui n. Ostafrika; **Martens** 1903 Tiefsee p. 101 t. 2 f. 15; — subangulatus n. Ostafrika; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berlin p. 21, Tiefsee t. 8 f. 11; — rufinodis n. Ostafrika, Sumatra; id. S. B. Ges. Berlin p. 22; Tiefsee t. 2 f. 10; — ?retarius n. Ostafrika; id. 1901 p. 22, Tiefsee t. 2 f. 4; — eingulatus n. Kap; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 30 t. 2 f. 11; — bifrons n. Rothes Meer; **Sturany** 1903 abgeb. t. 1 f. 1—4; — waitei n. Neusüdwales; **Hedley** 1903 Austral. Mus. IV p. 373 t. 37 f. 1; — suboblitus n. Japan **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 18 t. 1 f. 5.

Fusus pyrrhostoma Watson ist nach **Sowerby** 1903 Marine Invest. II eine *Neptuneopsis*, nach **Martens** 1903 Tiefsee eine eigene Gattung *Fusivoluta* bei den *Volutidae*.

Latirus (Montf.) alboapicata n. Durban, Natal; **Smith** 1902 J. C. Leeds X p. 250 t. 4 f. 5; — singularis n. unsicheren Fundortes; **Sowerby** 1903 J. Malac. X p. 74 — imbricatus Sow. = abnormis Smith; **Sowerby** 1903 Marine Invest. II p.

Metzgeria (Dkr.) californica n. Kalifornien; **Dall** 1903 Nautilus XVII p. 51.

Peristernia (Moerch) ustulata var. lachuana n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Philad. p. 309 t. 19 f. 18; — corallina n. Maskat; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. Hist. XII p. 308 t. 22 f. 11.

Volutidae.

Voluta (L.) ponsonbyi (*Alcithoe*) n. Natal; **Smith** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 231, Textfig.; — queckettii (*Lyria*?) n. ibid., id. p. 234, Textfig. — perplicosa n. Australien; **Hedley** 1901 Rec. Austr. Mus. IV p. 309 Textfig. — (*Fusivoluta*)

anomala n. Nordost-Afrika; **Martens** 1902 S. B. Berlin p. 237; abgeb. 1903 Tiefsee VII p. 107, t. 3 f 14; — *epigona* n. Ost-Afrika; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 106, Textfig.; — *dohrni* n. Florida; **Sowerby** 1903 J. mal. X p. 74 t. 5 f. 8; — *brazieri* Cox ist eine Abnormität von *delicosa* Montf.: **Smith** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 178.

Cymbiola (Swains.) *mangeri* n. Falkland-Inseln; **Preston** 1901 P. mal. Soc. IV p. 237 Textfig.

Fusivoluta n. subg. *Volutae*, ohne Spindelfalten, mit schrägem, papillenförmigen Apex, für *V. anomala* n.; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berlin 1902 p. 237.

Scaphella (Swains.) *stearnsi* zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. XXIV p. 517, Textfig.

Lyria (Swains.) *planicostata* n., unbekannten Fundortes; **Sowerby** 1903 J. mal. S. X p. 75 t. 5 f. 7.

Volutilithes (Ad. & Rve.) *gilchristi* n. Südafrika; **Sowerby** 1902 Marine Invest. p. 99 t. 2 f.

Turbinellidae.

Cossmann 1901 (Essais Pal. compar. livr. 4) zählt zu dieser Familie die Unterfamilien: 1. Turbinellinae mit den Gattungen *Turbinella* Lam. und *Vasum* Bolten; — 2. Tuditulinae mit *Tuditula* Bolten und *Streptosiphon* Gill. — 3. Fulgorinae für die Gattung *Fulgor* Montf. — 4. Melongeninae mit *Melongena* Schum. *Pugilina* Schum., *Solenostira* Dall, *Semifusus* Swains., *Megalatractus* Fischer.

Turbinella (Lam.) *triangularis* n. Durban, Natal, Tiefwasser; **Smith** 1902 J. Conch. Leeds X p. 249 t. 4 f. 6 = *truncata* Sow. fide **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 370.

β. *Taenioglossa*.

Tritoniidae.

(*Simpulidae* Dautz., *Aquillidae* Pilsbry, *Septidae* Dall).

Die Familie ist in der Berichtszeit von drei bedeutenden Forschern, **Cossmann** (Essais Pal. comparée V 1903), **Pilsbry** (Pr. Ac. Philad. 1904) und **Dall** (Smiths. miscell. Coll. 1904 no. 1475) bearbeitet worden.

Cossmann stützt sich wesentlich auf die Stellung der Varices. Er erkennt, abgesehen von den nur fossil vorkommenden Gattungen an: *Tritonium* für *Murex tritonis* L. mit Subg. *Lampusia*, Typus *Tr. pileare* L. einschliesslich Sektion *Aquillus* für *Tr. cutaceum*, Subg. *Ranularia*, Typus *Tr. clavator* Lam. — Subg. *Lotorium*, Typus *Tr. femorale* L. mit Sekt. *Linatella*, Typus *Tr. poulsoni* Mörch.; Subg. *Colubraria*, Typus *Tr. maculosum* Gmel.; — Gen. *Persona*, Typus *Tr. anus* L.; — Gen. *Priene*, Typus *Triton scaber* King mit Subg. *Fusitriton* für *Tr. cancellatus* Lam. — Gen. *Ranella* Typus *R. gigantea* Lam., mit Sektion *Biplex* für *R. pulchra* Gray, und Subgen. *Argobuccinum*, Typus *Murex argus* Gmel.

Pilsbry 1904 kassiert den Namen *Tritonium* aus den altbekannten Gründen und nimmt dafür *Aquillus* Montf. (als etymologisch verschieden von *Aquila*) an, nennt demnach auch die Familie *Aquillidae*, als Typus der Gattung nimmt er *Murex cutaceus* L. an. Dazu stellt er als Sektionen *Lampusia*, *Lotorium* und *Monoplex*, Typus *Tr. cynocephalus* L., und als Untergattung *Septa*, Typus *S. rubicunda* Perry = *Tr. nodifer* Lam.; als Gattungen erkennt er ferner an: *Distortrix*, *Priene*, *Colubraria*, *Cumia* und bei *Ranella*.

Dall 1904 (Smith. Miscell. Collect. vol. 47 no. 1475) spaltet die Familie in drei: Ranellidae, Septidae, Colubrariidae. Er gibt (in Schlüsselform) für dieselben folgendes systematisches Schema:

a) Ranellidae. Nur eine Gattung:

Bursa Bolten mit den Untergattungen Bursa s. str. (mit den Sektionen Bursa, Typus spinosa Lam., Marsupina n., Typus spadicea Montf.; Chasmotheca n. Typus foliata Brod., Ranella, Typus bufonia Gmel.; Lampadopsis n. Typus rhodostoma Beck.; Colubrellina n. Typus condita Gmel., — Aspa Ad., Typus marginata Gmel.; — Bufonaria Schum. mit den Sektionen Crossata Cossm., Typus ventricosa Brod.; Bufonaria s. str., Typus scrobiculator L., und Craspedotriton Dall, Typus convolutus Brod.

b) Septidae. Hierher neben mehreren fossilen Gattungen:

Personella Conrad, lebend repräsentiert durch Tr quoyi.

Gyrineum Link, Typus Murex gyrinus L. = Ranella ranina Lam.

Eugyrina Dall, Typus Ranella gigantea Lam.

Argobuccinum Mörch, Typus Ranella vexillum Brod.. mit den Untergattungen: Paralagena Dall (= Lagena Mörch 1852, nec Walker 1784), Typus Tr. claudestinus Lam.; — Fusitriton Cossm., Typus Tr. cancellatus Lam.; — Priene Ad., Typus Tr. scaber King.

Distortrix Link, Typus Murex anus L.

Cymatium Bolten, Typus Murex femoralis L., mit den Sektionen: Lampusia Schum., Typus Murex pilearis L.; Ranularia Schum., Typus Tr. clavator L. Tritonocauda n., Typus M. caudatus Gmel., Gutturnium Mörch, Typus Tr. tuberosus Lam.; Turrifriton n., Typus Tr. gibbosus Brod.; Tritoniscus n., Typus Tr. loroisi Petit; Cabestana Bolten, Typus M. cutaceus L., und den Untergattungen Monoplex Perry, Typus Murex costatus Born, und Linatella Gray, Typus Tr. cingulata Perry.

Septa Perry (= Triton Lam.), Typus S. rubicunda Perry = Triton nodiferus Lam.

Colubrariidae (wahrscheinlich sämtlich rhachigloss), mit der einzigen Gattung Colubraria Schum. 1817 (= Epidromus Mörch 1852) mit den Sektionen; Colubraria s. str., Typus C. maculosa Gmel., ?Cumia Bivona, Typus C. decussata Biv. (= Tr. reticulatus Blainv.); Maculotriton n., Typus Tr. swiftii Tryon; Caducifer Dall n., Typus T. truncatus Hds.; Taeniola n., Typus Tr. decollatus Sow., und der Untergattung Phrygiomurex n. für Triton sculptilis Rve.

Pilsbry & Vanatta 1904 Pr. Philad. bestreiten die Berechtigung der Familie Colubrariidae; sie verweisen unter Abbildung von Zunge und Apex Maculotriton zu den Muricidae neben Ocinebra und Caducifer zu den Buccinidae als Subgenus von Tritonidea; auch Taeniola Dall gehört zu Pisania.

Caducifer n. sect. Colubrariae, Typus Tr. truncatus Hinds. **Dall** 1904 Smiths. Misc. Coll. 1475 p. 136. — Gehört zu den Buccinidae. **Pilsbry & Vanatta** 1904.

Chasmotheca n. sect. Bursae, Typus foliata Brod.; **Dall** 1904 l. c. p. 118. Eugyrina n. gen. für Ranella gigantea Lam.; **Dall** 1904 l. c. p. 132.

Maculotriton n. sect. Colubrariae, Typus Triton bracteatus Hiads.; **Dall** 1904 l. c. p. 136. — Gehört nach **Pilsbry & Vanatta** 1904 zu den Muricidae.

Marsupina n. sect. Bursae, Typus B. crassa Dillw.; **Dall** 1904 l. c. p. 118.

Monostiolum n. sect. *Colubrariae*, Typus *Triton swifti* Tryon; **Dall** 1904 l. c. p. 136.

Paralagenia nom. nov. für *Lagena* Mörch 1852, nec Walker 1784; **Dall** l. c. p. 132.

Phrygiomurex n. subg. *Colubrariae*, Typus *Triton sculptilis* Rve.; **Dall** 1904 l. c. p. 137.

Taeniola n. subg. *Colubrariae*, Typus *Triton decollatus* Sow.; **Dall** 1904 l. c. p. 137.

Tritonisus n. sect. *Cymatii*, Typus *Tr. loroisi* Petit; **Dall** 1904 p. 134.

Tritonocanda n. sect. *Cymatii*, Typus *Triton caudatus* Gmelin; **Dall** 1904 l. c. p. 133.

Turritriton n. sect. *Cymatii*, Typus *Triton gibbosus* Brod.; **Dall** 1904 p. 133.

Cryotritonium n. subg. für *Lampusia* (Priene) *murrayi* Smith; **Martens** Tiefsee VII p. 38.

Triton (Lam.) *pumilio* (Lotorium) n. Süd-Australien; **Hedley** 1903 *Triton* II p. 339 Textfig. 68; — (*Tritonium*) *streptum* nom. nov. für *Tr. distortum* Schub. & Wagner; **Cossmann** 1903 *Essais* V p. 112; — (*Lotorium*) *nassariforme* n. Süd-Afrika; **Sowerby** 1902 *Mar. Invest.* p. 95; — (*Simpulum*) *dolarium* var. *elongata* n. Nord-Afrika; — **Pallary** 1903 *Ann. Mus. Marseille* VIII p. 1 t. 1 f. 3; — (*Cryotritonium* n.) *murrayi* Smith abgeb. bei **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 38 t. 3 f. 16.

Colubraria (Schum.) *crebriliratus* n. Port Alfred, Kap; **Sowerby** 1903 *Marine Invest Cap* II p. 220 t. 4 f. 4; — *concinnata* n. Golf von Oman; **Melvill** 1904 *Pr. mal. Soc.* VI p. 51 t. 5 f. 10.

Lampusia (Schum.) *nodocostata* Tate & May, abgeb. bei **Tate & May** 1901 t. 23 f. 2.

Doliidae.

Dolium (L.) *magnificum* n. China; **Sowerby** 1904 *Pr. mal. Soc.* VI p. 7 Textfig.

Cossmann 1903 *Essais Paléoc. comp.* V zählt zur Familie die Gattungen: *Dolium* Lam. mit den Untergattungen *Dolium* s. str. (einschliessl. *Perdix* Montf.), *Eudolium* Dall (= *Dolopis* Mtrs. nec Conrad) und *Malia* Valenc., und *Pirula* Lam. — *Ficus* Klein = *Ficula* Swains. = *Sycotypus* Adams nec Browne).

Lamellariidae.

Lamellarria (Montg.) *mollis* n. Antarktisches Meer; **Smith** 1902 *Voy. Southern Cross* VII p. 205 t. 24 f. 1.

Cassididae.

Cossmann 1903 *Essais Paléoconch. comp.* V p. 121 erkennt als Gattungen an: *Cassidea* Brug. (= *Cassis* Lam. nec Klein), mit den Untergattungen *Cassidea* s. str. einschliesslich *Levenia* Gray, und *Semicassis* Mörch mit *Casmaria* Adams; — *Bezoardica* Schum. mit *Cypraeicassis* Stutchb.; — *Cassidaria* Lam.; — *Sconsia* Gray, — und *Oniscia* Sow. mit *Pachybathron* Gask.

Cassis (Lam.) *bituberculosa* n. Cap Guardafui, Ost-Afrika; **Martens** 1901 *S. B. Ges. Berlin* p. 23; 1903 Tiefsee VII p. 111 t. 3 f. 11; — *microstoma* n. Ost-Afrika; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 112 t. 3 f. 12; — (*Semicassis*) *fortisulcata*

n. Kauai, Sandwichinseln; **Smith** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 21 Textfig. — (Cassidea) pyrum var. thomsoni Brazier abgeb. bei **Hedley** 1904 Thetis II t. 35 f. 2, 3; — turgida Reeve. var. ibid. t. 36 f. 1; — (Cassidea) sinuosa n. Süd-Australien; **Verco** 1904 Tr. S. Austr. v. 28 p. 141, Textfig.

Strombidae.

Cossmann 1904 Essais Pal. comp. VI unterscheidet bei den lebenden Strombiden die Gattungen *Strombus* L. mit *Monodactylus* Klein, *Gallinula* Klein und *Cannarium* Schum.; — *Rostellaria* Lam.; — *Rimella* Agassiz; — *Terebellum* (Klein) Lam. — Er hält die Familie für einen direkten Nachkommen der mesozoischen Aporrhaidae.

Radius (Klein) *gracillimus* n. Natal; **Smith** 1901 J. Conch Leeds, X p. 107 t. 1 f. 20, 21.

Aporrhaidae.

Cossmann 1904 Essais Pal. comp. VI nimmt für die einzige lebende Gattung den Namen *Chenopus* Phil. an, behält aber für die Familie den Namen Aporrhaidae bei, da er auch den Familiennamen Prioritätsrechte zuspricht.

Struthiolariidae.

Cossmann 1904 Essais Pal. comp. VI p. 105 erkennt *Pelicaria* Gray, Typus *Str. scutulata* Martyn, als Gattung an.

Cypraeidae.

Cossmann 1903 Essais Paléoc. comp. V vereinigt in dieser Familie die alten Gattungen *Cypraea*, *Ovula*, *Pedicularia* und *Erato*. Er erkennt als Gattungen an: *Cypraea* mit den Untergattungen *Cypraea* s. str., *Luponia*, *Monetaria*, *Cypraeovula* und *Trivia*; — *Pustularia* Swains.; — *Amphiperas* Gron. mit *Simnia* Risso, *Neosimnia* Fischer; — *Pedicularia* Swains.; — *Calpurnus* Montf.; — *Erato* Risso. — Die von Jousseaume aufgestellten Gattungen werden theilweise als Sektionen anerkannt.

Pediculariidae.

Pedicularia (Swains.) *stylasteris* n. Neusüdwales; **Hedley** 1903 Mem. Austral. Mus. IV p. 342 f. 69; — *californica* Newcomb abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 38 f. 5.

Cypraeidae.

Cypraea (L.) *tigris* var. *lineata* n. Viti-Inseln; **Kenyon** 1902 in J. C. Leeds X p. 183; — *mappa* var. *viridis* n. Neu-Caledonien; ibid. p. 183; — *breyeriana* var. *barbara* n. ibid., ead. p. 183; — *helvolia* var. *borneensis* n. Borneo; ead. p. 183; var. *timorensis* n. Timor; ead. p. 184; — *miliaris* var. *diversa* n. West-Australien; ead. p. 184; — *carneola* var. *rubiola* n. ibid., ead. p. 184; — *minoridens* nom. nov. für *microdon* auctqr. nec Gray; **Melvill** 1901 J. Conch. X p. 119; — *chrysalis* Kiener = *microdon* Gray; id. p. 117.

Cypraea caledonica = *lynx* monstr., *barthelemyi* = *moneta* monstr.; *noumeensis* = *annulus* monstr.; — *crossei* = *stolida* monstr.; **Dautzenberg** 1902 in J. C. vol. 50 p. 294. — *argus* var. *concatenata* n. Neu-Caledonien; ibid. p. 296; —

controversa Gray — *isabella* var., id. p. 299; — *propinqua* Garr. = *carneola* var. id. p. 300; — *talpa* var. *saturata* n. *ibid.*, id. p. 302; — *rhinoceros* Souv. = *interrupta* var. id. p. 303; — *coffea* Sow. = *neglecta* var., id. p. 311; — *neglecta* monstr. *marteli* n. *ibid.*, id. p. 311 t. 7 f. 3, 4; — *caurica* var. *obscura* Rossiter abgeb. *ibid.* t. 7 f. 5, 6; — *mappa* var. *montrouzieri* nom. nov. für var. *nigricans* Crosse, id. p. 325; — *histrio* var. *luctuosa* n. *ibid.*, id. p. 331; — *vestimenti* Rochebr. und *pleuronectes* Rochebr. = *moneta* var. *barthelemyi*; id. p. 335; — *tigris* var. *rossiteri* n. *ibid.*, id. p. 342; — *candida* Pease = *clandestina* var. id. p. 357; — *clandestina* monstr. *marteli* n. *ibid.*, id. p. 358 t. 7 f. 12; — *poraria* var. *insignis* n. *ibid.*, id. p. 368; — *staphylaea* var. *depravata* n. *ibid.*, id. p. 374 t. 7 f. 9, 10. — *tricornis* Jouss. und *henardi* Jouss. = *cicercula* var., id. p. 378; — *fultoni* n. Süd-Afrika; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. Cap II p. 218 t. 4 f. 7.

Die Cypraeiden des persischen Meerbusens und der anliegenden Gebiete revidiren **Melvill & Standen** 1904 J. of Conch. XI p. 117; neu einige unbedeutende Varietäten von *C. caurica*, *ocellata* und *pulchella*.

Trivia (Gray) *atomaria* n. Panama; **Dall** 1902 Nant. XVI p. 43; — *panamensis* n. *ibid.*, id. p. 43.

Cerithiidae.

Bittium (Leach) *atramentarium* n. Karachi; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 375 t. 22 f. 16; — *chemnitzianum* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 393 t. 19 f. 14, 15; — *reticulatum* var. *hanleyi* Mtrs. zuerst abgebildet bei **Pallary** 1902 J. C. 50 t. 1, f. 15; — *quadricinctum* n. Südafrika; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 381 t. 15 f. 11; — *caudatum* n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 161 t. 10 f. 8; — *williamsoni* n. Kalifornien; **Arnold** 1903 Mem. Calif. Acad. III p. 295; — *furvum* Watson = *Cerithium icarus* Bayle juv.; **Hedley** 1904 Studies VIII p. 88.

Cerithidea (Swains.) *mutata* n. Albemarle, Galapagos; **Pilsbry & Vanatta** 1902 Hcpk. Stanf. Exped. p. 558 t. 25 f. 1.

Cerithiolinum n. gen.. für *Cer. metula* Loven; **Locard** 1903 Ann. Soc. Agric. Lyon X p. 110.

Cerithium (Brug.) *yerburyi* var. *djiboutiense* n., Djibuti; **H. Fischer** 1901 J. C. p. 110 t. 4 f. 9. — (*Clypeomorus*) *clypeomorus* Jouss. zuerst abgebildet *ibid.* p. 112, Textfig. 8; — *dautzenbergi* n. Fichteninsel, Neu-Caledonien; **Vignal** 1901 J. C. p. 303 t. 8 f. 11, 12; — *bavayi* n. Neu-Caledonien; id. p. 304 t. 8 f. 7, 8; — *muscarum* var. *protracta* n. ?; id. p. 305 t. 8 f. 9, 10; — *rufonodulosum* n. Algoabay; **Smith** 1901 J. Conch. Leeds X p. 108 t. 1 f. 8; — *oscitans* n. Cebu; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 211 t. 22 f. 12; — *trailli* var. *kikaiensis* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 25 t. 4 f. 38; — *subscalatum* n. *ibid.*, id. p. 25 t. 4 f. 39; — *anembatum* n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 161 t. 10 f. 6; — *pervicax* n. *ibid.*, id. p. 161 t. 10 f. 7; — *tubulus* Dkr. = *serotina* H. Ad.; **Hedley** 1903 Mem. Austral. Mus. IV p. 346; — *exilissimum* n. Mittelmeer; **Locard** 1903 Ann. Soc. Agr. Lyon X p. 106; — *submediterraneum* n. Mtrs. mss., *ibid.*, id. p. 106; — *vereendum* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 300; — *albocopertum* n. Bermudas; **Davis** 1904 Nautilus XVII p. 129, Textfig.; — *sykesi* n. Adria; **Brusina** 1904 Nachrichtsbl. p. 167.

Cerithiopsidae.

Cerithiopsis (Fls. & H.) pupa n. Portorico: **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 424 t. 53 f. 16; — *turbanilloides* (Bittium) T. Woods, abgeb. bei **Tate & May** 1901 p. 385 Textfig. 6; — *sarissa* n. Neuseeland; **Murdoch** 1904 Tr. N. Z. Inst. p. 221 t. 7 f. 8, 9.

Triforiidae.

Triforis (Desh.) *idoneus* n. Mekran Küste; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 376 t. 22 f. 17; — *picturatus* n. Cebu; **Sowerby** 1901 p. 211 t. 22 f. 12 (= *elegans* Hinds fide **Smith** 1903 Lakhediven p. 613.) — (*Triphora*) *regina* n. Australien; **Hedley** 1902 Studies VII p. 608 t. 32 f. 21; — *innotabilis* n. Sydney; id. p. 608 t. 32 f. 23—25; — *albovittata* n. ibid., id. p. 609 t. 32 f. 26, 27; — *nigrofusca* Ad. zuerst abgebildet id. t. 33 f. 34, 35; — *tasmanica* Woods desgl. t. 32 f. 22; — *cinerea* n. Australien; id. p. 612 t. 33 f. 36, 37; — *nocturna* n. ibid., id. p. 613 t. 32 f. 30, 31; — *maculosa* n. ibid., id. p. 614 t. 32 f. 32, 33; — *ampulla* n. ibid. id. p. 615 t. 33 f. 38, 39; — *fasciata* T. Woods zuerst abgebildet, id. p. 33 f. 40, 41; — *labiata* A. Ad. desgl. t. 33 f. 42—44; — *kesteveeni* n. Sydney; id. p. 618 t. 33 f. 45; — (*Triphora*) *concatenata* n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 162 t. 10 f. 9; — (*Triphora*) *princeps* n. unsicheren Fundortes; **Sowerby** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 174; — *smithii* n. desgl., id. p. 175; — *abnormalis* n. Japan; **Sowerby** 1903 Ann. N. H. XII p. 498; — (*Viriola?*) *senafirensis* n. Rothes Meer; **Sturany** 1903 Denk. Ak. Wien v. 74 p. 262. — *lilaceocinctus* n. Malediven; **Smith** 1903 Lakhediven p. 613; — *excellens* n. ibid., id. p. 613; — *gracilior* n. ibid., id. p. 614; — *pura* n. ibid., id. p. 614; — *fuscicans* n. Port Alfred; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 37 t. 3 f. 6; — *fusco-maculata* n. ibid., id. p. 37 t. 3 f. 7; — *convexa* n. ibid., id. p. 37 t. 3 f. 9.

Hedley 1903 Studies VII erklärt für die richtige Schreibart *Triphora*.

Vermetidae.

Vermetus (Mörch) *waitei* n. Port Kembla, Australien; **Hedley** 1903 Thetis II p. 346, Textfig. 72.

Die Gattung monographisch behandelt von **Clessin** in Mart. & Chemn. ed. II. *Stephopoma* (Moerch) *nucleogranosum* n. Süd-Australien; **Verco**, Tr. Soc. S. Australia v. 29 p. 189, Textfig.

Turritellidae.

Turritella (Lam.) *acuta* T. Woods, *oxyacris* Tate u. *lamellosa* Watson = *subsquamosa* Dkr.; **Hedley** 1903 Thetis II p. 347; — *punctulata* Sow. abgeb. bei **Martens** 1903 Tiefsee t. 4 f. 9; — *declivis* Ad. & Rve. var. desgl. t. 4 f. 10; — *illustris* n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 J. Malac. p. 81.

Mesalia (Gray) *pulchella* n. Tanger; **Pallary** 1901 J. Conch p. 315.

Caecidae.

Caecum (Flem.) *lilianum* n. Sydney; **Hedley** 1902 Studies VII p. 603 t. 29 f. 7; — *digitulum* n. Neu-Seeland; **Hedley** 1904 Record Austral Mus. V p. 94 Fig.

Strebloceras (de Folin) *clyanicollis* n. Neu Süd Wales; **Hedley** 1904 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales v. 29 p. 189.

Naticidae & Sigaretidae.

Natica (Lam.) *tranquilla* (Eunatica) n. Golf von Oman; **Melvill & Sykes** 1891 p. 359 t. 22 f. 5; — *kraussi* n. Natal, Mauritius; **Smith** 1901 J C. Leeds p. 248 t. 4 f. 1; — *delicatula* n. Antarktischer Ozean; **Smith** 1902 Voy. Southern Cross VII p. 206 t. 24 f. 6; — *millepunctata* var. *punctatissima* n. Nordafrika; **Pallary** 1903 Ann. Mus. Marseille VIII p. 11 t. 1 f. 6, 7; — *hebraea* var. *zonata* n. ibid., id. p. 11 t. 1 f. 10, 11; — *bunrupi* n. Südafrika; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 385 t. 15 f. 11; — (*Lunatia*) *draconis* n. Sta. Barbara Channel, Kalifornien; **Dall** 1903 Pr. soc. biol. Washington XVI p. 174; — (*Macromphalina*) *californica* n. ibid., id. p. 175; — *strigosa* n. Neu-Amsterdam; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 64 t. 4 f. 7; — *sculpta* n. Kerguelen; abgeb. ibid. t. 4 f. 1; — *per-scalpta* Marts., desgl. t. 4 f. 5, 6; var. *eximia* n. ibid., id. p. 66 t. 3 f. 23, 24; — *pliculosa* n. Ostafrika; ibid. p. 118 t. 3 f. 21; — *effosa* Watson 1886 = *bed-domei* Johnst. 1884; **Hedley** 1903 Thetis II p. 358; — *tropus* n. Port Alfred; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 34 t. 2 f. 22; — *decipiens* n. ibid., id. p. 34 t. 2 f. 23.

Amauropopsis (Moerch) *moerchi* abgeb. bei **Hedley** 1902 Pr. L. Soc. N. S. Wales v. 26 p. 700, Textfig.; — *purpurea* desgl. bei **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV p. 551 t. 3.

Polynices (Montf.) *sagamiensis* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 23 t. 4 f. 57.

Sigaretts (Lam.) *noyesii* n. Gorgona-Inseln; **Dall** 1903 Naut. XVII p. 37.

Vanicoro (Gray) *expansa* n. Nordwest-Australien; **Sowerby** 1902 J. Mal. VIII p. 102 t. 9 f. 3.

Littorinidae.

Echinella (Swains.) *enmingi* var. *luchuana* n. Liu Kiu Ins.; **Pilsbry** Pr. Phil. 1901 p. 394 t. 21 f. 25.

Laevilittorina (Dall) *elongata* n. Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 Voy. Belgica, Zool. p. 14.

Litorina (Fer.) *atkana* n. Westliche Aleuten; **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV p. 551 t. 39 f. 11; — *aleutica* Dall abgeb. ibid. t. 39 f. 4, 6.

Litiopidae.

Argyropeza n. gen. für A. *divina* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 371 (t. nitida, vitrefacta apice brunneo, anfr. 3 laevibus, sequentes bicarinati. carinis nodulosis, ultimus tricarinatus; apertura ovata; peristoma sinuatum; columella ad basin subproducta).

Fossaridae.

Fossarus (Phil.) *capensis* n. Südafrika; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 190 t. 5 f. 13; — *sydneyensis* n. Sydney; **Hedley** 1901 p. 89 t. 3 f. 12; — *bulimoides* T. Woods = ? *Actaeon austrinus* juv.; **Hedley** 1903 Thetis II p. 393. — (*Couthouya*) *unicarinialis* n. Bombay; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 301 t. 21 f. 7; — *quinquecarinalis* n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. 1904 v. 6 p. 54 t. 5 f. 19; — *thelacme* n. ibid., id. p. 54 t. 5 f. 20; — *bulimoides* T. Woods zuerst abgeb. b. **Tate & May** 1901 t. 26 f. 66; — *minuta* (*Crosseia*) Petterd desgl. t. 27 f. 85.

Fossarina Ad. & Ang. vide Trochidae.

Solaridae.

Solarium (Lam.) *maximum* Phil., Embryonalschale abgeb. bei **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 349 Textfig. 73; dieselbe stin.mt mit Formen, welche von Adams zur Pleuropodengattung *Agadina* Gould gerechnet werden; — *supraradiatum* n. Nicobaren; **Martens** 1903 *Tiefsee* p. 118 t. 4 f. 16; — (*Torinia*) *cerdaleum* n. Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 *Ann. N. H.* XII p. 297 t. 20 f. 16; — (*T.*) *abyssorum* n. Golf von Oman; id. p. 297 t. 21 f. 1; — (*T.*) *admirandum* n. ibid., id. p. 322.

Omalaxis (Desh.) *exquisita* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 *Bull. Fish Comm.* I p. 435 t. 54 f. 12. — *meridionalis* n. Cape Three Points, Australien; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 351 Textfig. 74; — (*Homalaxis*) *cornuammonis* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 *Ann. N. H.* XII p. 298 t. 21 f. 4; — *rotulacatharinea* n. ibid., iid. p. 299 t. 21 f. 3.

Trichotropidae.

Trichotropis (Brod.) *townsendi* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 *Pr. Z. S.* p. 360 t. 22 f. 7; — *pulcherrima* n. ibid., iid. 1903 *Ann. N. H.* XII p. 296 t. 20 f. 15.

Sirius (Hedley) n. gen. *Trichopidarum*, kegelförmig, dünnchalig, ohne Epidermis, Typus *Raulinia badia* Tenn. Woods.; **Hedley** 1900 (1) p. 88 t. 3 fig. 8. — Zunächst mit *Lippistes* verwandt, aber mit einem Vorsprung an der Spindel und abweichendem Embryonalende; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 344.

Anoplocamus (Dall) *borealis* Dall, zuerst abgeb. b. **Dall** 1902 *Pr. U. St. Nat. Mus.* XXIV t. 38 f. 4.

Capriliidae.

Caprilus (Montf.) *subcompressus* n. Antarktischer Ocean; **Pelseneer** 1903 *Voy. Belgica Zool.* p. 20 fig.; — *caramanensis* n. Rothes Meer; **Sturany** 1903 *Denkschr. Ak. Wien vol.* 74 p. 256 t. 7 f. 12; — *fragilis* Bucht von Bengalen; **Smith** 1904 *Ann. N. H.* XIV p. 1; — *devotus* n. Neusüdwales; **Hedley** 1904 *Pr. Limn. Soc. N. S. Wales* v. 29 p. 190.

Rissoidae.

Rissoa (Freminv.) *charope* (*Apicularia*) n. Golf von Oman; **Melvill & Sykes** 1901 *Pr. Z. S.* p. 365 t. 22 f. 8. — (*Manzonia*) *petronella* n. Karachi; iid. p. 366 t. 22 f. 9; — (*Alvania*) *alveata* n. Angrias Bank bei Bombay; iid. p. 366 t. 22 f. 10; — *crawfordi* n. Südafrika, Algoa Bay; **Smith** 1901 *J. Conch. Leeds* X p. 107 t. 1 f. 13; — *portoricana* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 *Bull. Fish Comm.* I p. 433 t. 53 f. 20; — *opima* n. ibid., iid. p. 433; — *adarensis* n. südliches Eismeer; **Smith** 1902 *Voy. Southern Cross* VII p. 205 t. 24 f. 17; — *spinosa* Mtrs. zuerst abgeb. b. **Pallary** 1902 *J. C. 50* t. 1 f. 12, 13; — *tokyensis* n. Japan; **Pilsbry** 1904 *Pr. Philad.* p. 26 t. 4 f. 40; — *ogasawarana* n. ibid., id. p. 26 t. 4 f. 41; — (*Setia*) *inflata* n. Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 *Voy. Belgica Zool.* p. 21 fig.; — *columna* n. ibid., id. p. 21 fig.; — *subtruncata* n. ibid., id. p. 21 fig.; — *perspecta* n. Port Arthur; **Smith** 1904 *J. Mal.* XI p. 25 t. 2 f. 25; — *conspecta* n. ibid., id. p. 35 t. 3 f. 1; — *monodonta* var. *auriformis* n. Golf von Gabes; **Pallary** 1904 *J. de Conch.* v. 52 p. 254 t. 7 f. 12; —

apicilirata Tate & May zuerst abgeb. b. **Tate & May** 1901 t. 26 f. 61; — *demensa* T. & M. desgl. t. 26 f. 61; — *discrepans* T. & M. desgl. t. 26 f. 65; — *dubitabilis* Tate desgl. t. 26 f. 71; — *tumida* T. Woods desgl. t. 26 f. 67; — *simsoni* Tate & May desgl. t. 26 f. 76; — *verconis* Tate desgl. t. 27 f. 86; — *hulliana* Tate desgl. t. 26 f. 62; — *perexigua* (*Rissoina*) T. & M. desgl. t. 23 f. 5; — *unilirata* T. Woods desgl. t. 26 f. 79; — *pellucida* T. & M. desgl. t. 23 f. 8; — *vulgaris* n. Neuseeland; **Webster** 1904 Tr. N. Z. Inst. p. 277 t. 9 f. 3. — *micans* n. *ibid.*, id. p. 271 t. 9 f. 4; — *zosterophora* n. *ibid.*, id. p. 277 t. 9 f. 5; — *carnosa* n. *ibid.*, id. p. 278 t. 9 f. 6; — *candidissima* n. *ibid.*, id. p. 278 t. 9 f. 6; — *agrestis* n. *ibid.*, id. p. 279 t. 10 f. 10; — *microstriata* n. Neu-Seeland; **Murdoch** 1904 Tr. N. Z. Inst. p. 229 t. 8 f. 25; — *insculpta* n. *ibid.*, id. p. 229 t. 8 f. 28.

Acinulus Mtrs. mss. n. subgen. *Acini*, Typus *Rissoa cimex* Fbs.; **Segnenza** Paleont. ital. IX p. 48.

Eatonella (Smith) *paludinoides* n. Antarktisches Meer; **Smith** 1902 Voy. Southern Cross VII p. 205 t. 24 f. 18; — *limbata* Hutton, zuerst abgeb. bei **Webster** 1904 Tr. N. Z. Inst. t. 10 f. 8; — *olivacea* Hutton desgl. t. 10 f. 9.

Fenella (A. Ad.) *tanyspira* n. Karachi; Indusmündung; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 370 t. 22 f. 14.

Epigrus n. g. *Rissoidarum*, für R. *ischna* Tate; **Hedley** 1903 Mem. Austral. Mus. IV p. 354 f. 78; — *vesconis* Tate (= *Rissoa badia* Pett. nec A. Ad. abgeb. *ibid.* p. 356 Textfig. 79, 80).

Fluxina (Dall) *dallianna* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 298 t. 23 f. 5.

Flemingia Jeffreys (nec de Koninck) umgetauft in *Taramellia*; **Seguenza** 1903 Palaeont. ital. IX p. 53.

Rissoina (Brug.) *sceptrum regis* n. Golf von Oman; **Melvill & Sykes** 1901 Pr. Z. S. p. 367 t. 22 f. 11; — (*Rissolina*) *pseudoscalaris* n. *ibid.*, iid. p. 368 t. 22 f. 13; — (*Phosinella*) *paschalis* n. Karachi; iid. p. 368 t. 22 f. 12; — *bertholetti* Aud (= *Savigny* t. 4 f. 2) neu beschrieben und abgebildet; **H. Fischer** 1901 J. C. p. 114 t. 4 f. 5, 6; — *rissoi* Aud. (= *Savigny* t. 4 f. 1) desgl. *ibid.* p. 115; — *cretacea* T. Woods abgeb. b. **Hedley** 1903 Mem. Austral. Mus. IV fig. 76; — *rex* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 27 t. 5 f. 42; — *materinsulae* n. *ibid.*, id. p. 27 t. 5 f. 44; — *isosceles* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 302 t. 21 f. 12; — (*Zebina*) *registomoides* n. *ibid.*, iid. p. 303 t. 21 f. 13; — *alfredi* n. Port Alfred; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 35 t. 2 f. 24; — (*Phosinella*) *phormis* n. Golf von Oman; **Melvill** 1904 J. Mal. XI p. 80.

Rissopsis (Garrett) *buliminoides* Tate & May zuerst abgebildet **Tate & May** 1901 t. 26 f. 75; — *consobrina* T. & M. desgl. t. 27 f. 94.

Scrobs (Watson) *pyramidalatus* n. Neusüdwales; **Hedley** 1903 Mem. Austral. Mus. IV p. 354 f. 77.

Taramellia nom. nov. für *Flemingia* Jeffr. nec de Koninck; **Seguenza** 1903 Palaeont. ital. IX p. 53.

Adeorbidae.

Adeorbis (S. Wood.) *placens* n. mit var. *complanata* n., Golf von Oman, Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 373 t. 22 f. 15; — *subcarinatus* var. *interrupta* n. England; **Marshall** 1903 J. of Conch. Leeds p. 192; — *axiotinus* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 391 t. 21 f. 8.

Paludinidae.

Amnicola (Hald.) *tryoni* n. Mexiko; **Pilsbry** 1903 Pr. Philad. p. 781 t. 52 f. 10; — *panamensis* Psbry. abgeb. ibid. t. 52 f. 11; — *augustina* n. Florida; id. 1904 *Nautilus* XVII p. 113.

Andrusovia n. gen. Brusina mss. für A. dybowskii n., Kaspisches Meer; **Westerlund** 1903 Rad Jugosl. Akad. v. 151 p. 133.

Bythinia (Leach) *servainiana* var. *caspica* n. Kaspisches Meer; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 45; — *striatula* var. *japonica* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 405, abgeb. 1902 t. 9 f. 9—12 (nach **Moellendorff** Westchina 1901 p. 101 zu *Fossarulus* zu stellen); — *richmondiana* Petterd (und *Pupa anodonta* Muson & Hedley) = *Hydrobia petterdi* Smith fide **Hedley** 1904.

Clessinia (Dyb.) *ahngeri* n. Kaspisches Meer; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 45.

Hydrobia (Hartm.) *sturanyi* n. = *Sturany* 1894 t. 18 f. 34, 35, Ochridasee, Albanien; mit var. *pygmaea* n.; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 46; — *steindachneri* n. ibid., = *Sturany* t. 18 f. 32, 33; id. p. 47.

* *Jullienia* (Cr. & F.) *carinata* n. Yunnan; **Fulton** 1904 J. Mal. XI p. 52 t. 4 f. 5.

Lartetia (Bourg.) *umbilicata* n. Südfrankreich; **Locard** 1903 Bull. Nimes v. 29 p. 10, Textfig.

Lithoglyphus (Mühlf.) *aenatus* n. Muchalatka; **Westerlund** 1902 Nachrbl. 1902 p. 47; — *minutus* n. Kleinasiens; **Naegele** 1903 Nachrbl. p. 176.

Micromelania (Brus.) *subulata* n. Kaspisches Meer; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 47.

Nematurella (Sandb.) *marginata* n. Kaspisches Meer; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 45.

Paludestrina (d'Orb.) *antarctica* n. Antarktisches Meer; **Smith** 1902 Voy. Southern Cross VII p. 204 t. 24 f. 16; — *popoensis* n., Poposee, Anden; **Bavay** 1904 Bull. Soc. zool. France v. 29 p. 154 Textfig. 5.

Paludomus (Swains) *siamensis* n. Menam, Siam; **Blanford** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 283 t. 8 f. 3.

Potamopyrgus (Stimpson) *subterraneus* n. Neuseeland; **Suter** 1904 Trans. N. Zeal. Inst. p. 267, Textfig.

Pseudamnicola (Paul.) *sinaica* n. Sinaihalbinsel; **Pallary** 1903 Bull. Soc. Egypte II p. 243 Textfig.

Pyrgula (Jan.) *neveui* n. Titicacasee; **Bavay** 1904 Bull. Soc. zool. Fr. v. 29 p. 155 Textfig. 6.

Pyrgulopsis (Pilsbry) *patzcuarensis* Psbry. abgeb. b. **Pilsbry** 1903 Pr. Philad. p. 780.

Stenothyra (Bens.) *formosana* n. Formosa; **Pilsbry & Hirase** 1904 *Nautilus* XVII p. 8.

Somatogyrus (Gill) *hinkleyi* n. Alabama; **Walker** 1904 *Naut.* XVII p. 135 t. 5 f. 1; — *constrictus* n. ibid., id. p. 135 t. 5 f. 2; — *nanus* n. ibid., id. p. 136 t. 5 f. 3; — *umbilicatus* n. ibid., id. p. 137 t. 5 f. 4; — *coosaensis* n. ibid., id. p. 137 t. 5 f. 5; — *obtusus* n. ibid., id. p. 138 t. 5 f. 6; — *crassus* n. ibid., id. p. 138 t. 5 f. 7; — *georgianus* n. ibid., Georgia; id. p. 139 t. 5 f. 8; — *pensylvanicus* n., Pensylvanien, id. p. 140 t. 5 f. 9; — *virginicus* n. Virginia; id. p. 141 t. 5 f. 10; — *pilsbryanus* n. Alabama; id. p. 142 t. 5 f. 11.

Vitrella (Clessin). — **Geyer** hat begonnen, die schwäbischen Quellen auf diese seither mit zwei Ausnahmen nur in einzelnen Exemplaren im Genist gefundene Gattung zu durchforschen und hat dabei nicht nur eine ganz überraschende Menge von Individuen, sondern auch einen ganz ungeahnten Formenreichtum gefunden, der allerdings die älteren Arten so ziemlich über den Haufen wirft. G. sondert die Formen in erster Linie nach den Fundorten. Er stellt 1904 folgende Arten auf und bildet sie vorzüglich ab: *quenstedti* Wiedersh., Falkensteiner Höhle, p. 310 t. 8, 9 u. 10, mit *pellucida* Benz als Verkümmерungsform, und var. *weinlandi* n. p. 316 t. 8 f. 21, 22, 27, 28, Eckisloch bei Urach; — *putei* n. Kohlberg bei Nürtingen, p. 317 t. 11 f. 1—10; — var. *rösleri* n. Nonnenbrunnen bei Oftedingen, p. 318 t. 11 f. 11—17; — *exigua* n. Randecker Moor; p. 320 t. 8 f. 10—13; — *labiata* n. Wiesenquellen bei Degenfeld; id. p. 320 t. 10 f. 11—16; — *franconia* n. mit var. *scalaris* p. 323 t. 12, Quellen zwischen Vorbach und Tauber, — var. *spirata* n. p. 325 t. 12, 13, zwischen Vorbach und Jagst; — var. *spirilla* t. 14, Brettachthal; — var. *postera* n. t. 13, Gegend von Backnang.

Viviparidae.

Vivipara (Lam.) *henzadensis* n. Henzada, Birma; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 188 t. 5 f. 1; — *japonica* var. *iwakawa* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 117 t. 9 f. 3 (= *oxytropis* Kobelt nec Benson; — *ingallsiana* (Reeve?) Kobelt = *selateri* Ffld.; id. p. 118 t. 9 f. 4; — *abbreviata* Reeve = *malleata* Reeve; id. p. 116 t. 9 f. 6, 7; — *gracilior* n. Tsadsee; **Martens** 1903 S. B. Ges. Berlin p. 7; — *locardi* n. Westfrankreich; **Germain** 1903 Bull. S. Ouest France III p. 218, Textfig.; — *rouyeri* n. Java; **Bullen** 1906 Pr. mal. Soc. VI p. 110 t. 6 f. 3.

Valvatidae.

Valvata (Müll.) *hagenmüllerii* n. Corsika; **Caziot** 1903 (1) p. 315; — *stelleri* n. Kamtschatka; **Dybowski** 1903 Ann. Mus. Petersbourg VIII p. 46; — *innesi* n. Egypten; **Pallary** 1903 Bull. Egypete II p. 243 Textfig.; — (*Cincinnia*) *piscinalis* var. *dilatata* n. Dänemark; **Sell** 1903 Nachrbl. p. 110; — *humeralis* Psbry. abgeb. b. **Pilsbry** 1903 Pr. Philad. p. 778; — *andreana* (*Cincinnia*) n. Diluvium; **Menzel** 1903 Nachrbl. p. 77, Textfig., mit var. *latrix* ibid., Textfig.; — *maroccana* n. Marocco; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 41 t. 3 fig. 6, 7.

Melanidiidae.

Burtonilla n. gen. für *Turbanilla* (?) *terebriformis* Smith aus dem Tanganyika; **Smith** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 67 Textfig. 2. — (Shell elongate, slender, imperforate; whorls numerous, longitudinally costate, glossy, apparently without a periostracum; aperture entire, not channelled in front; columella reflexed anteriorly, above obsolete uniplicate; labrum probably thin).

Doryssa (H. & A. Adams) *schuppiae* n. Braslien; **Ihering** 1902 Museo Paulista p. 659, Textfig. 1; — *rixosa* n. ibid., id. p. 632 Textfig. 2, 3.

Melanopsis (Fer.) *moureyensis* n. Marokko; **Pallary** 1901 J. C. p. 228. — Ueber die Stellung der neuseeländischen und neucaledonischen *Melanopsis* vgl. **Suter** 1901 J. Conch. p. 320, und **Ancey** 1903 J. Conch. p. 43.

Melania (Lam.) *reiniana* var. *hidachiensis* n. Prov. Hidachi, Japan; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 119 t. 9 f. 2; — *libertina* var. *latifusus* n. Mino, Japan; id

p. 120 t. 9 f. 8. — Ebenda ein Diagramm der japanischen Melanien; — binodosa n. Siam; **Blanford** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 283 t. 8 f. 2; — dulcis n. Gebi, Molukken; **Fulton** 1904 J. Mal. XI p. 51 t. 4 f. 2; — aeruginosa n. ibid., id. p. 51 t. 4 f. 1; — lauta n. ibid. id. p. 52 t. 4 f. 4.

Rhinomelania n. subg. für *Semisinus zenkeri* n. Kamerun; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berlin p. 26.

Semisinus (Fischer) *zenkeri* (*Rhinomelania*) n. Kamerun; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berlin p. 26.

Ampullariidae.

Bemerkungen über die Ampullariidae macht **Dall** 1904 J. of Conch. v. XI p. 50—55.

Ampullaria (Lam.) *baeri* n., Huallaga, Peru; **Dautzenberg** 1901 J. C. p. 312 t. 9 f. 12, 13; — *winkleyi* n. Burma; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 189 t. 5 f. 2, 3; — *dalyi* n., Siam; **Blanford** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 281 t. 8 f. 1.

Limnopomus n. subg. Ampullariae, Typus A. *columellaris* Gould; **Dall** 1904 J. of Conch. v. XI p. 54.

Pseudampullaria Ancey 1898 = *Petterdiana* 1896; **Suter** 1901 J. Conch. p. 320.

Assimineidae.

Assiminea (Gray) *angustata* n., Kitani, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 396; — *umlaasiana* n., Natal; **Smith** 1902 J. C. Leeds X p. 249 t. 4 f. 3; — *pagodella* n., Australien; **Hedley** 1902 Studies VII p. 603 t. 29 f. 6.

γ) Toxoglossa.

Conidae.

Conus (L.) *clytospira* (Leptoconns) Melvill & Standen zuerst abgebildet bei **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 21 f. 12 (nach Preston ibid. = *C. milne-edwardsi* Jouss. 1894); — *beddomei* n., Westindien; **Sowerby** 1902 J. Mal. VIII p. 101 t. 9 f. 1—5; — *torquatus* n. Westafrika; **Martens** S. B. Ges. Berlin p. 15; — *stimpsoni* n., Key West, Florida; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. v. 24 p. 503 t. 29 f. 7; — *eucoronatus* n. Cap St. Blaize, Südafrika; **Sowerby** 1903 Marine Invest. II p. 217 t. 3 f. 9; — *gilchristi* n., Natal; id. p. 217 t. 3 f. 8; — *patens* n., Kap; id. p. 218 t. 3 f. 7; — *torquatus* Martens abgeb. bei **Martens** 1903, Tiefsee t. 1 f. 1; — *aculeiformis* var. *torensis* n. Rothes Meer; **Sturany** 1903 Pola, p. 227 (19) t. 4 f. 8; — *planiliratus* var. *bathaeon* n. ibid., id. p. 227 (19) t. 4 f. 6, 7; — *boubeae* n., unsicheren Fundortes; **Sowerby** 1903 Pr. mal. Soc. VI p. 76 t. 5 f. 5; — *dormitor* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 6 t. 1 f. 9; — *kikaiensis* n. ibid., id. p. 6 t. 1 f. 8; — *gratamacapii* n. ibid., id. p. 6 t. 1 f. 10; — *coromaudelicus* Smith abgeb. bei **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 170, Textfig.

Pleurotomidae.

Casey 1902 in Trans. Acad. St. Louis giebt ein vollständig neues System der Pleurotomiden, lebender und fossiler. Er unterscheidet sieben Untergattungen: Pleurotominae (oder wie er schreibt: Pleurotomini), Clavinae, Belinae, Pseudotominae, Donovaniinae (sicher keine Toxoglossen), Daphnellinae, Tarininae

und Mitromorphinae. Zu den Pleurotominae gehören: *Pleurotoma* Lam., *Lophiotoma* n., *Gemmula* Wkff., *Tomopleura* n., *Orthosurella* n., *Surecula* H. & A. Adams. Die übrigen Unterfamilien sind nicht in gleicher Weise durchgeführt.

Antiphanes n. subg. von *Pleurotoma*, Typus *Surecula perversa* Gabb; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. v. 24 p. 513; — *catalinae* n., Kalifornien; **Raymond** 1904 *Nautilus* XVIII p. 2.

Ancystrosyrinx (Dall) *orientis* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 56 t. 5 f. 3.

Bathytona (Harris & Burrows) *biconica* n., Australien; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 385 Textfig. 98.

Borsonia (Bell.) *epigona* n., Sumatra; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berlin p. 19; Tiefsee p. 91 t. 2 f. 2.

Clathromangelia? (Mtrs.) *strigillata* n. Golf von Gabes; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 222 t. 6 f. 7.

Clathurella (Carp.) *thalia* n., Mekranküste; **Melvill & Standen** 1901 Pl. Z. S. p. 445 t. 24 f. 10; — *darnleyi* Braz. = *albifuniculata*; **Hedley** Record 1901 p. 122; — *macleayi* Braz. abgeb. ibid. Textfig.; — *granulosissima* Tate desgl. bei **Tate & May** Pr. N. S. Wales 1901 t. 24 f. 34; — *dichroma* n., Rotes Meer; **Sturany** 1903 Pola p. 252(44) t. 5 f. 5; — *chichimijana* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 11 t. 1 f. 7; — *centrosa* n. ibid., id. p. 11 t. 1 f. 6; — *lischkeana* n. ibid., id. p. 12 t. 2 f. 14; — *polyhymnia* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 J. Mal. X p. 165 t. 10 f. 17; — *amphiblestrum* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 58 t. 5 f. 7; — *epixantha* n. ibid., id. p. 59 t. 5 f. 3; — *hedleyi* n. ibid., id. p. 59 t. 5 f. 9; — *crassilirata*, n., Port Alfred, Kap.; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 27 t. 2 f. 6; — *opsimathes* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 314 t. 22 f. 19; — *sykesii* n. ibid., iid. p. 314 t. 23 f. 4; — *quisquilia* n. ibid., id. p. 315 t. 23 f. 7; — *epentroma* n., Neuseeland; **Murdoch** 1904 Trans. N. Z. Inst. p. 219 t. 7 f. 4; var. *whangaruensis* n. ibid., p. 219 t. 7 f. 5.

Clavatula (Lamarck) *parilis* n., Durban; **Smith** 1901 J. C. Leeds X p. 115 t. 1 f. 7; — *turriplana* n. Kapland; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. Cap. II p. 215 t. 3 f. 6.

Columbarium (Marts.) *canaliculatum* n., Ostafrika; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berlin p. 20, abgeb. Tiefsee VII t. 2 f. 7; — *cingulatum* n. ibid., id. p. 20, abgeb. id. t. 2 f. 8.

Cythara (Schum.) *typhonota* n., Tumb Island; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 446 t. 24 f. 12; — *edithae* n., Golf von Oman; iid. p. 446 t. 24 f. 11; — *hirasei* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 10 t. 2 f. 13; — *verhöffeni* n., Westküste von Sumatra; **Martens** 1903 Tiefsee p. 91 t. 2 f. 5; — *elegantissima* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 319 t. 23 f. 13; — *nevilliana* u., Ceylon; **Preston** 1904 J. Mal. XI p. 75.

Daphnella (Hinds) *ceciliae* n., Mekran-Küste; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 447 t. 24 f. 13; — *evergestis* n., Golf von Oman; iid. p. 447 t. 24 f. 14; — *receptoria* n., Mekran-Küste; iid. p. 448 t. 24 f. 15; — *veneris* n., Golf von Oman; iid. p. 449 t. 24 f. 16; — *xylois* n. ibid., iid. p. 449 t. 24 f. 17; — *fragilis* var. *articulata* n., Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 385 t. 21 f. 26; — *engramma* n., Cuba; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. v. 24 p. 503 t. 29 f. 3; — *vestalis* n., Australien; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 390 Textfig. 105; — *angasi* nom. nov. für

Clath. sculptilis Angas nec Tate; id. p. 391; — *dea* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 167 t. 10 f. 24; — *lucasii* n. *ibid.*, id. p. 167 t. 10 f. 25; — *radula* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 8 t. 2 f. 17; — (*Pleurotomella*) *nereidum* n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 315 t. 23 f. 2; — (*Pl.*) *amphitrites* n. *ibid.*, *iid.* p. 316 t. 23 f. 3; — *thyatrica* n. *ibid.*, *iid.* p. 316 t. 23 f. 6; — *thya* n. *ibid.*, *id.* p. 316 t. 23 f. 8; — *buccinulum* n. *ibid.*, *iid.* p. 317 t. 23 f. 9; — *epicharta* n. *ibid.*, *iid.* p. 317 t. 23 f. 10; — *hedyia* n. *ibid.*, *iid.* p. 318 t. 23 f. 11; — *euphosyne* n. *ibid.*, *iid.* 318 t. 23 f. 12; — *cassandra* n., Neusüdwales; **Hedley** 1904 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales v. 29 p. 187 fig. 8; — *eulimenes* n., Golf von Oman; **Melvill** 1904 J. Malac. XI p. 84 fig.

Drillia (Gray) *alcyonea* n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z S. p. 435 t. 23 f. 21; — *athyrma* n. *ibid.*, *iid.* p. 436 t. 23 f. 22; — *circumvertens* n. *ibid.*, *iid.* p. 436 t. 23 f. 23; — *clydonia* n. *ibid.*, *iid.* p. 437 t. 23 f. 24; — *omanensis* n. *ibid.*, *iid.* p. 438 t. 24 f. 1; — *prunulum* n. *ibid.*, *iid.* p. 439 t. 24 f. 2; — *tasconium* n. *ibid.*, *iid.* p. 440 t. 24 f. 2; — *topaza* n. *ibid.*, *iid.* p. 440 t. 24 f. 4; — (?) *actinocyla* n., Porto Rico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 385 t. 57 f. 15; — *gundlaechi* n. *ibid.*, *iid.* p. 386 t. 57 f. 17; — *pouciana* n. *ibid.*, *iid.* p. 386 t. 57 f. 19; — *melonesiana* n. *ibid.*, *iid.* p. 386 t. 57 f. 20; — *interpleura* n. *ibid.*, *iid.* p. 386 t. 57 f. 21; — *greeleyi* n., Brasilien; **Dall** 1901 Pr. Ac. Wash. III p. 146; — (*Clavus*) *fusconitens* n., Cebu; **Sowerby** Pr. mal. S. p. 208 t. 22 f. 3; — *rugisculpta* n., Kowie; **Sowerby** *ibid.* p. 213 t. 22 f. 20; — *tricarinata* T. Woods abgeb. b. **Hedley** Record 1901 p. 23, Textfig.; — *spaldingi* n. desgl. p. 122, Textfig.; — *cancellata* Tate desgl. b. **Tate & May** Pr. N. S. W. t. 24 f. 27; — *agnewi* Tate desgl. t. 24 f. 29; — *elachystoma* n., Ost-Afrika; **Martens** S. B. Ges. Berl. 1901 p. 17; Tiefsee VII t. 2 f. 13; — *roseobasis* n., Galapagos; **Pilsbry & Vanatta** 1902 Pr. Wash. Acad. IV p. 558 t. 25 f. 3; — *albemarlensis* n. *ibid.*, id. p. 538, t. 25 f. 3; — *empyrosia* Dall zuerst abgeb. b. **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. 24 p. 516, Textfig.; — *fossata* n., Natal; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. Cap II p. 214 t. 3 f. 5; — *scitecostata* n., Port Alfred; id. p. 214 t. 4 f. 10; — *wilkiae* Sow. = *platystoma* Smith; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 363; — *sesquiteria* n., Ostafrika; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 82 t. 1 f. 7; — *bisinuata* Mrts. abgeb. *ibid.* t. 1 f. 8; — *dilecta* n., Südaustralien; **Hedley** 1903 Thetis II p. 387 Textfig. 100; — *nenia* n. *ibid.*, id. p. 387 Textfig. 101; — *prosuavis* n. = *suavis* Smith nec Hervier; id. p. 389 Textfig. 102; — *multilirata* Smith zuerst abgeb. id. p. 389 Textfig. 103; — *potti* Stur. zuerst abgeb. b. **Sturany** 1903, Pola t. 5 f. 8; — ?*inchoata* Stur. desgl. *ibid.* t. 5 f. 8; — *streptonotus* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 7 t. 3 f. 18; — *albiguttata* n. *ibid.*, id. p. 8 t. 3 f. 19; — *thetis* n., Port Alfred, Kap; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 26 t. 2 f. 1; — *subcontracta* n. *ibid.*, id. 26 t. 2 f. 2; — *albonodulosa* n. *ibid.*, id. p. 27 t. 2 f. 3; — *praetermissa* n. *ibid.*, id. p. 27 t. 2 f. 4; — *nivosa* n. *ibid.*, id. p. 27 t. 2 f. 5. — *dives* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 311 t. 22 f. 15; — *philotima* n. *ibid.*, *iid.* p. 311 t. 22 f. 16; — *continua* n. *ibid.*, *iid.* p. 312 t. 22 f. 18; — *lithoria* n. *ibid.*, *iid.* p. 313 t. 22 f. 10; — *audax* n., Golf von Oman; *ibid.* p. 313 t. 23 f. 1; — *worthingtoni* n., Andamanen; **Smith** 1904 Ann. N. H. XIII p. 160; — *lyallensis* n., Neuseeland; **Murdock** 1904 Trans. N. Z. Inst. p. 221 t. 7 f. 7.

Genota (H. & A. Ad.) *fissa* (Dolichotoma) n. Ostafrika; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berl. p. 18; Tiefsee p. 87 t. 1 f. 14; — *attractoides* var. *obsoletes* n. Nias; id. 1903 Tiefsee p. 86; var. *aethiopica* n. Ostafrika; id. p. 87 t. 1 f. 15; — *bitorquata* n., Dar es Salam; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berl. p. 18; Tiefsee t. 1 f. 13; — *belaeformis* n., Kapland; **Sowerby** 1904 Mar. Invest. II p. 216 t. 4 f. 8; — *stearnsiana* n., Californien; **Raymond** 1904 *Nutilus* p. 1.

Glyphostoma (Carp.) *tricolor* Braz. abgeb. b. **Hedley** 1901 Rec. p. 122, Textfig.; — *siren* n., Port Alfred, Kap; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 28 t 2 f. 7; — *epicharis* n., Rotes Meer; **Sturany** 1903 Pola p. 251 (43) 7 f. 2; — *pyenochila* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. Mal. Soc. VI p. 58 t. 5 f. 6.

Helenella n. gen. für *Pleurotoma multigranosa* Smith; **Casey** 1904 Tr St. Louis p. 167; — *insolens* n., St. Helena; id. p. 167.

Homotoma (Bellardi) *mobilis* n., Golf von Gabes; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 219 t. 7 f. 2; — *bracteata* n. ibid., id. p. 220 t. 7 f. 4.

Leucosyriux (Dall) *crispulata* n., Ostafrika; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berl. p. 16; abgeb. Tiefsee t. 2 f. 6; — *recta* n., Australien; **Hedley** 1903 Thetis II p. 386 Textfig. 99; — *vepallida* n., Golf von Aden; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berl. p. 240; Tiefsee t. 2 f. 6; mit var. *denticulosa* p. 90.

Lophiotoma n. gen. für *Pleurotoma tigrina* Lam.; **Casey** 1904 Tr. St. Louis v. 14 p. 130; — *microsticta* n., Philippinen; id. p. 130.

Mangelia (Risso) *averina* n., Karachi, Indusmündung; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 441 t. 24 f. 5; — *myrmecodes* n. ibid., iid. p. 442 t. 24 f. 6; — *phaea* n., Persischer Meerbusen; iid. p. 442 t. 24 f. 7; — *pulchripicta* n. ibid., iid. p. 443 t. 24 f. 9; — *terpnisma* n., Golf von Oman; iid. p. 443 t. 24 f. 8; — *asarca* n., Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 388 t. 57 f. 14; — *aguadillana* n. ibid., iid. p. 389 t. 57 f. 22; — *eudeli* n., Réunion; **Sowerby** 1902 J. Mal. VIII p. 192 t. 9 f. 4; — *desalesi* Ten. Woods, abgeb. b. **Hedley** 1901 Record p. 23, Textfig.; — *sanctaegallae* Tate desgl. b. **Tate & May** 1901 Pr. N. S. Wales, t. 24 f. 33; — *delicatula* Tate desgl. t. 24 f. 35; — *alternata* n., desgl., Textfig. 4; — *?incerta* n., Victoria; **Pritchard & Gatliff** 1902 Pr. Wash. Ac. v. XIV p. 180 t. 9 f. 1; — (*Eucythara*) *africana* n., Natal; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. Cap II p. 216 t. 5 f. 9: — *pertabulata* n., Rotes Meer; **Sturany** 1903 Pola p. 23 (23) t. 3 f. 1; — (*Glyphostoma*) *epicharis* n., Rotes Meer; id. p. 251 (43) t. 7 f. 2; — *pura* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 9 t. 2 f. 15; — *semicarinata* n. ibid., id. p. 9 t. 2 f. 16; — *kamakurana* n. ibid., id. p. 10 t. 2 f. 11; — *cinnamomea* var. *peraffinis* n. ibid., id. p. 10 t. 2 f. 12; — *adamantina* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. Mal. Soc. VI p. 165 t. 10 f. 18; — *aglaja* n. ibid., id. p. 165 t. 10 f. 19; — *apollinea* n. ibid., id. p. 166 t. 10 f. 20; — *barbiton* n. ibid., id. p. 166 t. 10 f. 21; — *callistephana* n. ibid., id. p. 166 t. 10 f. 22; — *kowatensis* n. ibid., id. p. 167 t. 10 f. 25; — *bathmis* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. Mal. Soc. IV p. 57 t. 5 f. 4; — *eophora* n. ibid., id. p. 58 t. 5 f. 5; — *pyenochila* n. ibid., id. p. 58 t. 5 f. 6; — *alfredi* n., Port Alfred, Kap; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 29 t. 2 f. 8; — (*Philbertia*) *papillosa* n., Golf von Gabes; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 220 t. 7 f. 4; — *kochi* n. ibid., id. p. 221 t. 7 f. 5; — (*Clathromangelia*) *strigilata* n. ibid., id. p. 222 t. 7 f. 6; — *comideleuca* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 313 t. 23 f. 5.

Megasurecula n. gen. für *Surcula carpenteriana* Gabb; **Casey** 1904 Tr. St. Louis XIV p. 147.

Orthosurecula n. gen. für *Pleurotoma longiforma* Aldr. & *Surcula transversaria* Lam.; **Casey** 1904 Tr. St. Louis XIV p. 151.

Mitromorpha (Pease) *suteri* n., Neuseeland; **Murdoch** 1906 Trans. N. Z. Inst. p. 220 t. 7 f. 6.

Pleurotoma (Lam.) *subsuturalis* (Brachystoma) n. Ost-Afrika; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berl. p. 16; — (*Subulata*) *bisinuata* n. ibid., id. p. 17; — (*Dolichotoma*) *fissa* n. ibid., id. p. 18; — (*D.*) *bitorquata* n. ibid., id. p. 18; — (*Pseudotoma*) *chuni* n., Sumatra; id. p. 19; — (*Antiphanes*) *piona* n., Alaska; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. v. 24 p. 514; — *thalaea* n., Californien; id. p. 514; — *santarosana* n. ibid., id. p. 515; — *callicesta* n., Acapulco; id. p. 515, mit Textfiguren; — *symbiotes* n., Indischer Ozean; **Alecock** 1902 p. 130, Textfig.; — *gilchristi* n., Süd-Afrika; **Sowerby** 1902 Mar. Invest. p. 99 t. 2 fig.; — *weldiana* Woods = *Drillia fucata* Reeve; **Hedley** 1902 *Nautilus* XVI p. 49; — (*Surcula*) *lobata* n., Natal; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. Cap II p. 213 t. 4 f. 9; — (*Clavus*) *lignaria* n. ibid. id. p. 213 t. 3 f. 4; — (*Genota*) *belaeformis* n. ibid., id. p. 216 t. 4 f. 8; — (*Gemmula*) *gemmaulina* n., Westküste von Sumatra; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berl. p. 238; 1903 Tiefsee VII t. 1 f. 2; — (*G.*) *rotatilis* n., Somaliküste; id. p. 239; Tiefsee t. 1 f. 3; — (*Brachytoma*) *subsuturalis* n. ibid., id. p. 239; Tiefsee t. 1 f. 7; — *vepratica* n., Torresstrasse bis Botany-Bai; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 384, Textfig. 97; — *siebenrocki* Sturany zuerst abgeb. b. **Sturany** 1903 Pola t. 3 f. 2; — *beblammna* n., Rothes Meer; id. p. 23(23) t. 3 f. 4; — (*Oligotoma*) *patricia* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 J. Mal. X p. 164 t. 10 f. 15; — (*Brach.*) *griffithi* var. *gracilior* n., Ostafrika; **Martens** 1903 Tiefsee, p. 84; — *tryponodes* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 57 t. 5 f. 2; — (*Gemmula*) *navarchus* n. ibiid.; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 310 t. 21 f. 15.

Pontothauma (Smith) *chumi* n., West-Sumatra; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berlin p. 19; Tiefsee p. 86 t. 1 f. 10.

Raphitoma (Bell.) *taprurensis* (Ginnaniana) n., Golf von Gabes; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 218 t. 7 f. 1.

Surcula (H. u. A, Ad.) *circumstrieta* n., Ost-Afrika; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berl. p. 15; — *obliquicosta* n., Sumatra; id. p. 16; beide abgeb. 1903 Tiefsee VII t. 1 f. 6 u. t. 2 f. 1; — *exstructa* n. ibid., id. p. 81 t. 1 f. 4; — *halierya* n., Persischér Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 164 t. 10 f. 16; — *margaritae* n., Andamanen; **Smith** 1904 Ann. N. H. XIII p. 458.

Spirotropis (G. O. Sars) *limula* n., Neu-Amsterdam; **Martens** 1903 Tiefsee p. 61 t. 5 f. 23.

Tomopleura n. gen. für *Pleurotoma nivea* Phil.; **Casey** 1904 Tr. St. Louis XIV p. 138.

Cancellariidae.

Cancellaria (Lam.) *agalma* (Trigonostoma) n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 450 t. 24 f. 18; — *middendorffiana* Dall zuerst abgeb. b. **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. v. 24 p. 516, Textfig.; — *producta* n., Natal; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. Cap. v. II p. 220 t. 4 f. 5; — (*Trigonostoma*) *luscinia* n., Arabischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. p. 319 t. 23 f. 14,

15; — pergradata n., Südaustralien; **Verco** 1904 Trans. Soc. South Australia v. 28 p. 142, Textfig.

Admete (Kroyer) *microscopica* (Cancellaria) Dall abgeb. b. **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. 24 p. 504, t. 29 f. 4.

Terebridae.

Terebra (Lam.) *diversa* n. = *rufopunctata* Sow. nec Smith; **Smith** 1901 J. C. Leeds X p. 115 t. 1 f. 6; — *juanica* n., Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 382 t. 57 f. 5; — *cognata* Smith zuerst abgeb. b. **Melvill & Standen** 1901 (2) t. 21 f. 9; — *macandrewi* Smith desgl. t. 21 f. 6; — *pellyi* Smith desgl. t. 21 f. 10; — *hedleyi* nom. nov. für *Cingulina brazieri*; **Tate** Pr. N. S. Wales p. 214; — *texana* n., Texas; **Dall** 1902 Pr. U. S. Mus. XXIV p. 502, Textfig.; — *floridana* n., Florida; id. p. 502, Textfig.; — *rushii* n. *ibid.*, id. p. 502, Textfig.; — *inconspicua* n., Victoria; **Pritchard & Gatliff** 1902 Pr. S. Victoria XIV, p. 181 t. 9 f. 2; — *loisae* n., Natal; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 360 t. 15 f. 1; — *casta* var. *natalensis* n. *ibid.*, id. p. 360; — *hedleyi* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 3 t. 1 f. 1; — *hizenensis* n. *ibid.*, id. p. 4 t. 1 f. 2; — *awayensis* n. *ibid.*, id. p. 5 t. 1 f. 4; — *texana* Dall abgeb. b. **Dall** 1902 Pr. U. St. N. Mus. XXIV t. 29 f. 8; — (*Subula*) *floridana* n. desgl. f. 9; — (*Acus*) *rushii* n. desgl. f. 6; — *assimilis* Angas = *fictilis* Hinds.; **Hedley** 1903 Thetis II p. 384; — *helichrysum* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 310 t. 22 f. 14; — *suspensa* n., Port Alfred; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 30 t. 2 f. 12 (= *pertusa* Sow. nec Born).

Parviterebra (Pilsbry n.) *paucivilvis* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 5 t. 1 f. 4.

δ) *Ptenoglossa.*

Scalidae.

Boreoscala n. sect., Typus Se. groenlandica; **Kobelt** 1902 Jcon. mar. p. 4. *Crossea* (A. Ad.) *biconica* n., Torresstrasse; **Hedley** 1902 P. L. S. N. S. Wales XXVI p. 12 t. 2 f. 24; — *gatliffi* n. *ibid.*, id. p. 13 t. 2 f. 25; — *carinata* n., Neusüdwales; **Hedley** 1902 Thetis II, p. 345, Textfig. 71; — *glabella* n., Neuseeland; **Murdoch** Trans N. Zealand Inst. 1904 p. 225 t. 8 f. 16, 17; — *cancellata* T. Woods abgeb. b. **Tate & May** 1904 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales t. 23 fig. 1; — *minuta* Petterd *ibid.* v. 27 f. 85.

Berthais n. gen. Scalidarum für *Scala intertexta* Melv. & Stand., Golf von Oman, und Ouoba egregia A. Ad.; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 61, Textfig.

Aclis (Lovén) *bitaeniata* n., Japan; **Sowerby** 1903 Ann. N. H. XII p. 498; — *beltista* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 53 fig.; — *thesanaria* n., Golf von Oman; **Melvill** 1904 J. Malac. XI p. 79 fig.

Scala (Klein) *gloriola* (Clathrus) n., Maskat, Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 355 t. 22 f. 6; — *millecostata* Pease zuerst abgeb. bei **Smith** J. C. Leeds X t. 1 f. 5; — *amathusia* n., Mekran-Küste; **Melvill & Standen** 1903 J. C. Leeds X p. 341 t. 7 f. 1; — *calidea* n., Maskat, Persischer Meerbusen; *ibid.* p. 341 t. 7 f. 2; — *cerdanta* n., Golf von Oman; *ibid.* p. 342 t. 7 f. 3; — *continens* n. *ibid.*, *ibid.* p. 342 t. 7 f. 12; — *deifica* n. *ibid.*, *ibid.* p. 343 t. 7 f. 4; — *electica* n., Indien, Kurachi; *ibid.* p. 343 t. 7 f. 5; — *emiliae* n. *ibid.*, *ibid.* p. 343 t. 7 f. 6; — *goniophora* n. *ibid.*, *ibid.* p. 344 t. 7 f. 7; — *laidlawi* n.,

Persischer Meerbusen; iid. p. 344 t. 7 f. 8; — melior n., Kurachi; iid. p. 345 t. 7 f. 9; — rissoinaeformis n., Golf von Oman; iid. p. 346 t. 7 f. 10; — sykesii n., iid. p. 346 t. 7 f. 11; — thelicheria n., Persischer Meerbusen; iid. p. 346 t. 7 f. 13; — townsendi, Mekran-Küste; iid. p. 347 t. 7 f. 14; — (*Opalia*) xenicima n., iid. p. 348 t. 7 f. 17; — (*Cirsotrema*) corolla n., Golf von Oman; iid. p. 348 t. 7 f. 18; — (*C.*) mammosa n., *ibid.*, iid. p. 349 t. 7 f. 15; — (*C.*) optima n., Maskat; iid. p. 350 t. 7 f. 16; — eulita n., Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 412 t. 57 f. 2; — humerosa n., Cebu; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 210 t. 22 f. 10; — (*Scalaria*) unilateralis n., Nicobaren; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berl. p. 241; 1903 Tiefsee p. 118 t. 4 f. 11; — tenebrosa n., Südafrika; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. II p. 220 t. 4 f. 6; — jolyi n., Monterosato mss., Nordafrika; **Pallary** 1903 Ann. Mus. Marseille VIII p. 10 t. 1 f. 20—22; — sawineae n., Santa Barbara Channel, Californien; **Dall** 1903 Pr. Biol. Soc. Wash. XVI p. 175; — sophinodis n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1903 Pr. mal. Soc. VI p. 53 t. 5 f. 17; — instructa n., Neu-Amsterdam; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 69 t. 4 f. 12; — nitidella Dall zuerst abgeb. b. **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 30 f. 8; — scipio Dall *ibid.* f. 10; — (*Amaea*) mitchelli n., desgl. *ibid.* f. 3, 4; — (*Acrilla*) retifera Dall *ibid.* t. 30 f. 9; — (*Constantia*) intertexta n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 304 t. 22 f. 6; — eusculpta n., Japan; **Sowerby** 1903 Ann. N. H. XII p. 497.

ε) *Gymnoglossa.*

Pyramidellidae.

Chaster 1901 J. C. Leeds X p. 8 ändert die präoccupierten Sektions- oder Gattungsnamen *Spiralina* Ch. in *Spiralinella*; — *Jordaniella* in *Jordannla*, — und *Noëmia* Folin in *Oda* Mtrs. mss.

Dall & Bartsch 1904 Pr. Biol. Soc. Washington p. 1—16 geben eine Synopsis der Gattungen, Untergattungen und Sektionen der Familie. Sie erkennen als Gattungen an: *Pyramidella* Lam., *Turbanilla* Risso, *Odostomia* Flem., *Murchisonella* Mörch.

Clessin in Martini-Chemnitz 1901 & 1902 gibt den Schluss einer Monographie der Pyramidelliden.

Eulimella (Seacchi) *carmanica* n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 303 t. 21 f. 14; — *nivea* n., Port Alfred; **Smith** 1904 J. Mal. v. XI p. 36 t. 3 f. 2; — *minor* n. *ibid.*, *id.* p. 36 t. 3 f. 3; — *gedrosica* n., Küste von Belutschistan; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 55 t. 5 f. 14; — *venusta* n. *ibid.*, *id.* p. 56 t. 5 f. 15; — *turrita* Petterd abgeb. b. **Tate & May** 1901 t. 25 f. 38; — *micra* (*Aelis*) Petterd desgl. t. 25 f. 43, 44; — *coena* Hutt. abgeb. b. **Webster** 1904 Tr. N. Z. Inst. t. 10 f. 11.

Elusa (Ad.) *livida* n., Cebu; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 210 t. 22 f. 8; — *crassicostata* n. *ibid.*, *id.* p. 210 t. 22 f. 9; — *halabisensis* n., Rothes Meer; **Sturany** 1903 Denkschr. Ak. Wien vol. 74 p. 258 t. 6 f. 11.

Actaeopyramis (Fischer) *laetitia* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 305 t. 22 f. 3; — *brevicula* n. *ibid.*, *id.* p. 305 t. 22 f. 4; — *bulinea* var. *tenuis* n., Nordafrika; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 235.

Fenella (A. Ad.) *xanthacme* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 56 t. 5 f. 16.

Mathilda (Semper) *gracillima* n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 378 t. 22 f. 18; — *zmitampis* n. *ibid.*, *iid.* p. 379 t. 22 f. 19; — *rosae* n., Südaustralien; **Hedley** 1901 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales p. 722 t. 47 f. 13, 14; — *decorata* n., Neustädwales; **Hedley** 1903 Mem. Austr. Mus. V p. 352 f. 75; — *carystia* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 321.

Myxa n. gen. *exesa* n., Neustädwales; **Hedley** 1903 Mem. Austr. Mus. IV p. 363 f. 86 (genabelt, aus wenigen Windungen bestehend, ohne Spindelfalte, der Mundrand an der Basis vorgezogen; ähnlich *Niso*, aber mit heterostrophem Apex).

Mormula (A. Ad.) *persarum* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 304 t. 22 f. 2.

Mumiola (A. Ad.) *carbasea* n., Arabisches Meer; **Melvill** 1904 J. Mal. XI p. 83 fig.

Odostomia vide *Ptychostomon*.

Oscilla (A. Ad.) *faceta* n., Golf von Oman; **Melvill** 1904 J. Mal. XI p. 82 fig.

Pseudorissoina (Tate & May) *tasmanica* T. & M. abgeb. b. **Tate & May** 1901 t. 25 f. 55, 56.

Ptychostomon (Locard) *litopina* n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 395 t. 23 f. 1; — *major* n. *ibid.*, *iid.* p. 395 t. 23 f. 2; — (*Odost.*) *lavertinae* n., Kap = *Od. angasi* Sow. nec Tryon; **Smith** 1901 J. Conch. Leeds X p. 108 t. 1 f. 15; — (*Pyrgulina*) *robusta* n., Kowies, Südafrika; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 214 t. 22 f. 19; — (*P.*) *interseculpta* n., Cebu; *id.* p. 209 t. 22 f. 7; — (*Pyrgulina*) *perspectiva* n., Nord-Queensland; **Hedley** 1902 Pr. Linn. S. N. S. Wales XXVII p. 10, Textfig.; — *senex* n. *ibid.*, *id.* p. 10, Textfig.; — *zea* n. *ibid.*, *id.* p. 11, Textfig.; — *umeralis* n. *ibid.*, *id.* p. 11, Textfig.; — (*Vilia*) *pilsbryi* n., Singapore; **Dall & Bartsch** 1904 Pr. Biol. Soc. Washingt. p. 15; — (*Evalina*) *americana* n., Sta. Catalina, Californien; *iid.* p. 16; — (*Odostomia*) *nugatoria* n., Neustädwales; **Hedley** 1903 Mem. Austr. Mus. IV p. 363 f. 87; — (*Pseudorissoina*) *exigua* n. *ibid.*, *id.* p. 361 f. 83; — *dorica* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 J. Mal. XI p. 82 fig.; — (*Odost.*) *deflexa* Tate & May abgeb. bei **Tate & May** 1901 t. 25 f. 45; — (*Od.*) *tasmanica* T. Woods desgl. t. 23 f. 4; — (*Pyrgulina*) *suprasculpta* (*Rissoina*) T. Woods desgl. t. 26 f. 68; — *impolita* Hutton abgeb. bei **Murdoch** 1904 Tr. N. Zeal. Inst. t. 8 f. 18; — *proxima* n., Neuseeland; *id.* p. 226 t. 8 f. 19; — *vestalis* n. *ibid.*, *id.* p. 227 t. 8 f. 20.

Ptychostomon (Locard). — Von der alten Gattung *Odostomia* (Flem.) trennen **Dall & Bartsch** 1901 l. c. wegen des abweichend geformten Embryonalendes die Untergattungen *Lysacme* n., Typus *Chrysallida clausiliiformis* Carp. — und *Obtortio* Hedley, Typus *Rissoa pyrrhaeme* Melv. & Stand. ab. Die Hauptmasse mit gleichsculptirtem Apex zerfällt in folgende Untergattungen: *Elodiamea* Folin, Typus *Elodia elegans* de Folin; — *Odostomiella* Folin, Typus *Rissoa doliolum* Phil.; — *Salassia* Folin, Typus *S. carinata* Folin; — *Vilia* n., Typus *Od. pilosbryi* n.; — *Folinella* n., Typus *Aaura anguliferens* Phil.; — *Trabecula* Mtrs., Typus *Od. zeffreysi* Mtrs.; — *Parthenina* Buequoy, Typus *Turbo indistinctus* Mtg.; — *Besla* n., Typus *Chrysallida convexa* Carp.; — *Mumiola* A. Ad., Typus *Monoptygma spirata* A. Ad.; — *Chrysallida* Carp., Typus *Chemnitzia communis* C. B. Ad.; — *Pyrgulina* A. Ad., Typus *Chrysallida costa* A. Ad.; — *Egila* n., Typus *Chr. lacunata* Carp.; — *Spiralinella* Chaster, Typus *Turbo*

spiralis Mtg.; — *Haldra* n., Typus *Chr. photis* Carp.; — *Miralda* A. Ad., Typus *Parthenia diadema* A. Ad.; — *Ividia* n., Typus *P. armata* Carp.; — *Evalina* n., Typus *Ev. elegans* A. Ad.; — *Oda* Mtrs., Typus *Od. dolioliformis* Jeffr.; — *Cyclodostoma* Sacco, Typus *C. mutinensis* Sacco; — *Doliella* Mtrs. Typus *Od. nitens* Jeffr.; — *Scalenostoma* Desh., Typus *Sc. carinata* Desh.; — *Jordaniella* Chast., Typus *T. nivosus* Desh.; — *Spiroclimax* Moerch, Typus *Sp. scalaris* Moerch; — *Amaura* Moeller, Typus *A. candida* Moeller; — *Odostomia* Flemming mit den Sektionen *Odostomia* s. str., Typus *Od. plicata* Mtg.; *Stomega* n., Typus *Od. conspiciens* Alder; und *Brachystomia* Mtrs., Typus *Od. rissooides* Hanley: — *Heida* n., Typus *Syrnola caloosaenius* Dall; — *Myxa* Hedley, Typus *M. exesa* Hedley; — *Pseudorissoina* Tate & May, Typus *Styliifer tasmanicus* T. Wood; — *Liostomia* Sars, Typus *Rissoa eburnea* Sars; — *Oceanida* Folin, Typus *O. gradata* de Folin.

Pyramidella (Lam.). — **Dall & Bartsch** 1904 l. c. theilen die Gattung in drei (unbenannte) Abtheilungen nach der Zahl der Spindelfalten. Drei Falten haben: *Pyramidella* s. str., Typus *P. dolabrata* Lam.; — *Milda* n., Typus *P. ventricosus* Quoy; — *Longchaeus* Moerch, Typus *P. punctata* Chemn.; — *Voluspa* n., Typus *P. auricoma* Dall; — *Pharcidella* Dall, Typus *P. folinii* Dall; — *Collolongchaeus* n., Typus *Ph. jamaicensis* Dall; — *Otopleura* Fischer, Typus *P. auris cati* Chemn.; — *Triptychus* Moerch, Typus *P. nivea* Moerch. — Zwei Falten haben: *Tiberia* Mtrs., Typus *P. nitidula* Ad.; — *Ulfa* n., Typus *P. cossmanni* n.; — *Tropaea* n., Typus *P. subulata* A. Ad.; — *Vagna* n., Typus *P. paumotensis* Tryon; — *Eulimella* Fbs., Typus *Eu. crassula* Fbs. mit Sektion *Cossmannia* für *P. clandestina* Desh. — Nur eine Falte haben: *Orinella* n. für *Orina pinguicula* A. Ad.; — *Sulcorinella* n., Typus *P. dodona* n. — *Actaeopyramis* Fischer, Typus *P. striata* Gray; — *Styloptygma* A. Ad., Typus *Monoptygma stylina* A. Ad.; — *Syrnola* A. Ad., Typus *S. gracillima* A. Ad., mit Sektion *Stylopsis* A. Ad. für *St. typica* A. Ad.; — *Iphiana* n. für *Syrnola densestriata* Garrett; — *Syrnolina* n. für *P. rubra* Pease.

(*Sulcorinella*) *dodona* n. (fossil, Florida) **Dall & Bartsch** 1904 l. c. p. 15.

Syrnola (Adams) *mekranica* n., Mekranküste; **McIvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 390 t. 22 f. 21; — *bacillum* n., Japan; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 394 t. 21 f. 25; — *nisooides* n., Ostafrika; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 119 t. 5 f. 10; — *macrocephala* n., Neusüdwales; **Hedley** 1903 Mem. Austr. Mus. IV p. 362 f. 85; — *trivittata* n., Rothes Meer; **Sturany** 1903 Denkschr. Ak. Wien v. 74 p. 258 t. 7 f. 8; — *mussandamica* n., Golf von Oman; **McIvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 304 t. 22 f. 1; — *petterdi* Tate & May zuerst abgeb. bei Tate & May 1901 t. 25 f. 37; — *harrisoni* Tate & May desgl. t. 25 f. 54.

Turbanilla (Risso). — **Dall & Bartsch** 1904 l. c. spalten die Gattungen in zwei Gruppen, solche ohne Basalkiel und solche mit Basalkiel. Zu der Gruppe ohne Basalkiel gehören die Untergattungen: *Ptycheulima* Sacco, Typus *T. pyramidata* Desh.; — *Chemnitzia* d'Orb., Typus *Melania campanellae* Phil.; — *Turbanilla* s. str., Typus *T. plicatula* Risso = *typica* Dautz.; — *Strioturbanilla* Sacco, Typus *T. alpina* Sacco; — *Pyrgolampros* Sacco, Typus *P. mioperplicatus* Sacco; — *Suleoturbanilla* Sacco, Typus *Tornatella turricula* Eichw.; — *Pyrgisculus* Mtrs., Typus *T. (Melania) scalaris* Phil.; — *Pyrgiscus* Phil., Typus *Melania rufa* Phil.; — *Pyrgolidium* Mtrs., Typus *P. roseum* Mtrs.; — *Tragula* Mtrs., Typus *Od. fenestrata* Phil.; — *Dunkeria* Carpenter, Typus *D. paucilirata* Carp.; — *Cingulina* A. Ad., Typus *C. circinata* A. Ad.; — *Saccoina* n. Typus *S. pica*

monterosatoi Sacco; — Careliopsis Moerch, Typus C. styliformis Moerch; — Visma n., Typus Eulimella tenuis Sow.; — Mormula A. Ad., Typus M. rissoina A. Ad.; — Lancella n., Typus Lancea elongata Pease. — Einen Basalkiel haben: Asmundia n., Typus Chemnitzia turrita C. B. Ad.; — Peristichia Dall, Typus P. toreta Dall; — Baldra n., Typus T. archeri n.; — Discobasis Cossmann, Typus Aciculina demissa Desh.

(Baldra) archeri n. Singapore; **Dall & Bartsch** 1894 l. c. p. 15.

Turbonilla (Risso) charbarensis (Pyrgostelis) n. Charbar, Mekran Küste; **Melville & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 393 t. 22 f. 22; — linjaica n. Persischer Meerbusen; iid. p. 393 t. 22 f. 23; — stegastris n. ibid., iid. p. 393 t. 22 f. 24; — varicifera n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 198, 395 t. 21 f. 27; — portoricensis n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 414 t. 53 f. 15; — insularis n. ibid., iid. p. 415 t. 53 f. 21; — bathyraphae n. Kowies, Südafrika; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 213 t. 22 f. 18; — hiradoensis n. Japan; **Pilsbry** 1894 Pr. Philad. p. 29 t. 5 f. 45; — (Cingulina) terebra Dkr. abgeb. ibid. t. 30 t. 5 f. 46; — (C.) cingulata Dkr. desgl. p. 30 t. 5 f. 47; — (C.) triarata n. ibid., id. p. 31 t. 5 f. 48; — inaequalis n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 101 t. 10 f. 10; — microporena n. ibid., id. p. 102 t. 10 f. 11; — recticostata n. ibid., id. p. 163 t. 10 f. 12; — scalptidens Watson abgeb. bei **Hedley** 1903 Thetis II p. 363, Textf.; — gemmula n. Port Alfred; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 36 t. 3 f. 4; — decora n. ibid., id. p. 36 t. 3 f. 5.

Eulimidae.

Eulima (Risso) styliferaoides n. Karachi; Indusmündung; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 388 t. 22 f. 10; — dunkeriana n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 395 t. 21 f. 30; — luchuanica n. Liu Kiu; id. p. 396 t. 21 f. 29; — translucida n. Algoa Bay; **Smith** 1901 J. C. Leeds X p. 109 t. 1 f. 11; — algoensis n. ibid., id. p. 109 t. 1 f. 10; — anceps n. England; **Marshall** 1901 J. C. Leeds X p. 124; — submarginata n. Cebu; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 209 t. 22 f. 4; — collinsi n. Guernesey; **Sykes** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 349 t. 14 f. 8; — zuerst abgeb. ibid. anceps Marsh. t. 14 f. 11; — compactilis Mtrs. t. 14 f. 13; — curva Mtrs. t. 14 f. 1, 6; — frielei Jordan t. 14 f. 5, 9; — incurva Ren. t. 14 f. 3, 4; — marty-jordani Jordan t. 14 f. 7; — pernula Mtrs. t. 14 f. 2, 10, 12; — platycyme nom. nov. für solidia Jeffr. nec Sow.; — munita n. Neusüdwales; **Hedley** 1903 Mem. Austr. Mus. IV p. 358 f. 81; — decagyra n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 302 t. 21 f. 11; — muelleriae n. Rothes Meer; **Sturany** 1903 Denkschr. Ak. Wien vol. 74 p. 258 t. 6 f. 10; — orthophyes n. ibid., id. p. 258 t. 6 f. 8; — apeles T. Woods zuerst abgebildet bei **Tate & May** 1901 p. 381 Textfig. 5; — mayi Tate desgl. t. 25 f. 58; — tenysoni Tryon = micans T. Woods nec Carp., desgl. t. 25 f. 60; — inflata Tate & May desgl. t. 25 f. 58; — mayi Tate desgl. t. 25 f. 50.

Leiostraca (H. & A. Ad.) lodderae n. Neusüdwales; **Hedley** 1903 Mem. Austr. Mus. IV p. 360 f. 82; — murdochii n. Neu Seeland; **Hedley** 1904 Rec. Austral. Museum V p. 97 Textfig.

Menon (Hedley) n. gen. Eulimidarum (= Chileutomia Tate & Cossmann), **Hedley** 1901 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales vol. 25 p. 90, für M. anceps n. Australien; id. p. 90 t. 3 fig. 5—7, p. 505.

Mucronalia (A. Adams) *birtsi* n. Ceylon; **Preston** 1904 J. Mal. XI p. 77 t. 6 f. 5; — *oxytenes* n. Golf von Oman; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 163 t. 10 f. 13.

Niso (Risso) *portoricensis* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901, Bull. Fish Comm. I p. 414 t. 57 f. 4.

Subularia (Mtrs.) *piperata* n. Cebu; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 209 t. 22 f. 5.

Pseudorissina (Tate & May) *exigua* n. Australien; **Hedley** 1903, Thetis II p. 361 Textfig. 83.

Styliferidae.

Stylifer (Turton) *thielei* n. Rothes Meer; **Sturany** 1903 Denkschr. Ak. Wien vol. 74 p. 258, Textfig.; — *lodderae* Petterd zuerst abgeb. bei **Hedley** 1900 Studies I Textfig. 92; — *kochianus* n. Cebu; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. p. 209 t. 22 f. 6.

Enteroxenos n. gen. für eine schmarotzende Art E. *ostergreni* n. von der norwegischen Küste; **Bonnevie** 1904, Zool. Jahrb. Anat. XV p. 731, mit Figuren.

III. Neurobranchia s. Pneumonopoma.

Thiele 1901 Nachrbl. macht einige wichtige Mittheilungen über Radulauntersuchungen bei Pneumonopomen. Cyclosurus gehört neben Ditropis; — *Lagochilus limbiferus* Blfd. ist Mychopoma.

Kobelt 1902 giebt als Heft 16 des Tierreichs die Monographie der Cyclophoridae.

Truncatellidae.

Truncatella (Risso) *kiusinensis* n. Kiusiu: **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 615.

Cecina (A. Ad.) *manchurica* Ad. abgebildet bei **Sykes** 1901 J. Mal. VIII p. 60, Textfig.

Blanfordia (A. Ad.) *japonica* var. *simplex* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 26.

Coxiella (Smith) *confusa* Smith = *badgerensis* Johnston; **Hedley** 1904, Studies VIII p.

Cyclophoridae.

Cyclophorus (Montf.) *dohertyi* Fulton 1899 = *sericatus* Ancey 1883; **Ancey** 1901 J. C. p. 145; — (*Litostylus*) *fruhstorferi* n. Mansongebirge, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 80; — (*Eucyclophorus*) *polystictus* n. Thanmoi, ibid., id. p. 80; — (*Litostylus*) *ignilabris* n. Tongking; id. p. 117; — *hirasei* n. Oshima; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 348; — *turgidus* var. *angulatus* n. Liu Kiu; id. p. 549; — *kikoiensis* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 27; — *cornutus* nom. nov. für *C. cornu venatorium* auct.; **Kobelt** 1902 Thierreich p. 98; — *hirasei* Psbry. abgeb. bei **Pilsbry** 1903 Nautilus XVI p. 137, Textfig.

Lagochilus (Blfd.) *insulare* n. Isle des Merveilles, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 116; — *diplotoma* n. Kebao, ibid., id. p. 117; — *hypselospirum* n. Tonking; id. p. 79; — *rollei* n. Kelantan; Malacca; **Moellendorff** 1902, Nachrbl. p. 141; — *obianum* n. Insel Obi; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. 1902 p. 193; — *kobelti* n. Jalor, Malacca; **Sykes** 1903 Pr. Z. S. p. 194 fig.; — (*Japonia*)

sadoënsis n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Nautil. XVII p. 31. — (Jap.) toshunmana n. ibid., iid. 1904 p. 104; — obliquispirus n. Java; **Bullen** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 110 t. 6 f. 4, 5; — tokunoshimana n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904, Pr. Philad. p. 616.

Murdochia n. gen. **Ancey** 1901 J. Conch. v. 49 p. 24 für die sogenannten Leptopoma von Neuseeland (= Cytora Kobelt & Middff. 1897; cfr. **Sykes** 1901 J. Mal. VIII p. 109 (**Moellendorff** Nachrbl. 1901 p. 126).

Leptopoma (Pfr.) megalostoma n. Obi; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 192, mit f. bitaeniata; — scabrum n. Burn; id. p. 200; — fulgurans n. Obi; **Dautzenberg** 1902 Naturaliste p. 248 fig. 6 [= macrostoma Middff. prior]; — altius n. ibid., id. p. 248 fig. 7; — diplochilus n. Waigiu; **Sykes** 1903 in J. Malac. vol. 10 p. 66, 78 t. 6 f. 4; — placidum n. Flores; **Fulton** 1903 ibid. p. 101, t. 9 f. 7; — albicans n. Sumba; id. p. 101, t. 9 f. 5; — gebiense n. Gebi, Molukken; **Fulton** 1904 J. Malac. vol. XI p. 54 t. 4 f. 10, 11; — crenilabre Strubell (nec Kobelt) abgeb. ibid. t. 4 f. 12, 13.

Cyclotidae.

Cyclotus (Moutf.) hirasei n. Liukiu; **Pilsbry** 1901 Nautil. XV. p. 22; — (Siphonocyclus) solutus var. subsolutus n. Kelantan; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 143; — (Pseudocyclophorus) guttatus codonostoma n. Obi; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 194; M (Ps.) pulchellus n. Tomia, Toukan Bessi; id. p. 206; — (Ps.) liratus n. ibid., id. p. 206. — (Plat.) perampus n. Ost-Borneo; **Martens** 1903 SBer. Ges. nat. Fr. Berlin p. 421; — (Plat.) bicolor n. ibid., id. p. 421; — (Plat.) vatheleti n. Tongking; **Dautzenberg & Bavay** 1903 J. C. p. 235 t. 11 f. 17. 18.

Nakadaëlla n. gen., Typus **Cyclotus** micron Pilsbry; **Ancey** 1904 J. C. p. 120; — **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. stellt p. 619 C. micron zu *Jerdonia*.

Platyrraphe (Middff.) leucacme n. Thamnoi, Tongking; **Moellendorff** 1901 p. 80; — chrysalis n. Kelantan, Malacca, **Sykes** 1902 J. Mal. IX. p. 23; — vatheleti n. Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 J. C. p. 235 t. 11 f. 17. 18; leucacme Middff. & sordida Pfr. abgebildet ibid. t. 11 f. 13—16; — bicolor n. Ost-Borneo; **Martens** 1903 S. Ber. Ges. Berl. p. 421.

Ueber den Werth der Gattung vgl. **Dautzenberg** in J. de Conch. v. 51 p. 231. — Es giebt folgende neue Diagnose derselben: T. parva, unicolor, plerumque lutescens, spiraliter lineolata, sutura profunda, peculiariter applanata, plerumque rudius striata; apex mammillaris, anfractus ultimus saepe subsolutus. — Testa humo plus minusve copiose induta, canali aerifero tenui, complanato, in pariete forato, sub suturam condito, longe spiraliter ascendente et prope aperturam in porum apertum desinente munita. — Vgl. auch **Bavay** 1903 Bull. Soc. Zool. France vol. 28, wo der Manuscriptname *Cryptaulus* für die Gattung erwähnt wird.

Opisthoporus (Benson) dautzenbergi n. Kelantan, Malacca; **Sykes** 1902 J. Mal. IX. p. 23. — rhoistoma n. Nordborneo; **Gredler** 1902 Nachrbl. p. 55; — bialatus n. Kelantan; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 142.

Cyathopoma (Blfd.) peilei n. Shervary Hills, Südindien; **Preston** 1903 Pr. mal. S. V. p. 340, Textfig.; — (Jerdonia) serendibense n. Ceylon; id. p. 340, Textfig.; — iota n. Liukius; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 619.

Neocyclotidae.

Neocyclotus (Cr. & F.) *columbiensis* n. Columbia; **da Costa** 1901 Pr. mal. Soc. IV. p. 249 t. 24 f. 7; — *caucaeñsis* n. Thal des Cauca; id. p. 240 t. 24 f. 9; — *panamensis* n. Panama; **da Costa** Pr. Mal. Soc. 1904 VI. p. 6 t. 7 f. 6—8.

Aperostoma (Troschel) *confusum* n. = *Cyclostoma giganteum* Pfr. Mart Ch. nec Gray; **Sykes** 1901 J. Mal VIII. p. 106 t. 10 f. 2; — *giganteum* Gray abgeb. ibd. f. 1, *fischeri* Hid. f. 3; — *sanetae marthae* n. Columbia; **Pilsbry & Clapp** 1902 Naut. XV p. 134; Textfig.; — *smithi* n. ibid., id. p. 135, Textfig.

Pupinidae.

Cataulus (Blfd.) *connectens* n. Ceylon; **Fulton** 1903 J. Mal. X. p. 102 t. 9 f. 4; — *greeni* var. *robusta* n. ibid., id. p. 102 t. 9 f. 1; — *rugosa* n. Ceylon; **Fulton** 1904 Ann. N. H. p. 452; — *sykesi* n. ibid., id. p. 452.

Pupina (Vign.) *solidula* (*Tylotoechus*) n. Langson, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 81. — (T.) *excisa* n. Kelantan, Malacca; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 145; — (T.) *siamensis* n. Siam; id. p. 160; — *crossei* Braz. und *nitida* Braz. zuerst abgebildet bei **Hedley** 1902 Pr. N. S. Wales p. 20 Textfig.; — *brachysoma* n. Ancey mss., Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 in: J. C. p. 230 t. 10 f. 15, 16. — *miookoana* Mlldff. 1897 = *beddomei* Ancey 1895; **Ancey** 1904 J. C. v. 52 p. 309.

Coptocheilus (Gould) *perakensis* n. Perak; **Fulton** 1903 S. Mal X p. 102 t. 9 f. 3.

Pupinella (Gray) *funatoi* n. Tanegashima; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 497; — *rufa* var. *tanegashimae* n. ibid., id. p. 497; — *oshimae* n. Oshima; id. p. 349, abgeb. 1903 Nautilus XVI p. 137 Textfig. — *oshimae* var. *tokunoshimanana* n. Osumi, Liukins; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 618.

Porocallia (Mlldff.) *moluccana* n. Obi; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 149.

Spiropoma (Kob. & Moellendorff) *nakadai* n. Tanagashima; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 496.

Alycaeidae.

Alycaeus (Gray) *satsumana* n. Satsuma, Kiusiu; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 548. — *tanegashimae* n. Tanegashima; id. p. 562; — *kelantensis* n. Kelantan, Malakka; **Sykes** 1902 J. Mal IX p. 62 t. 3 f. 13, 14; — *perakensis* var. *altispira* n. ibid.; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 144; — (*Orthalycaeus*) *kelantanensis* n. ibid., id. p. 145; — *biexcisus* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 26; — *pilsbryi* nom. nov. für Al. reinhardtii Psby. nec reinhardtii Moerch; **Kobelt** 1902 Tierreich p. 301; — *vinetus* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Naut. XVI p. 54; — *harimensis* var. *sadoensis* n. Japan; **Pilsbry** 1903 Naut. XVI p. 129; — *awaënsis* n. ibid., id. 1903 vol. XVII p. 117; — *purus* n. Osumi, Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 617; — *tokunoshimanus* n. ibid., id. p. 617; — *laevicervix* n. ibid., id. p. 618; — *oshimanus* n. ibid., **Pilsbry & Hirase** m.: Nautilus 1904 vol. XVIII p. 7.

Diplommatinidae.

Angigaster nov. sect. Diplommatinae, Typus D. *vespa* Pbsry & Hirase (Constriction in the first part of the penultimate whorl on the front or left side; the columellar lamella therefore nearly two whorls long; a palatal plica but no parietal lamella developed); **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 619.

Arinia (Adams) *japonica* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 *Nautilus* vol. XVI p. 136; — (*Leucania*) *aesopus* *Bavay & Dautz.* (Dipl.) zu *Arinia* zu stellen; *Ancey* 1904 J. C. p. 120.

Diancta (Marts.) *multiplicata* n. Obi; **Moellendorff** 1902 *Nachrbl.* p. 194. *Diplommatina* (Bens.) *minutissima* (*Sinica*) n. Omi, Japan; **Moellendorff** 1900 *Nachrbl.* p. 45; — (*Sinica*) *fulva* n. mit var. *canalifera* n. und var. *progaster* n. Tongking; **Moellendorff** 1901 *Nachrbl.* p. 118; — (*S.*) *scolops* n. Kebao, *ibid.*, id. p. 118; — *tanegashimae* n. Tanegashima; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 497; — *turris* n. Oshima; *id.* p. 35; — *saginata* n. *ibid.*, *id.* p. 351; — *oshimae* n. *ibid.*, *id.* p. 351; — *luchuana* n. Okinawa; *id.* p. 352; — *septentrionalis* n. Hokkaido; *id.* p. 352; — *ouyx* u. Nordborneo; **Fulton** 1901 Ann. N. H. VIII p. 244; — *plecta* n. *ibid.*, *id.* p. 244; — *sykesi* n. *ibid.*, *id.* p. 244; — *tenuilabiata* n. Bangnay; *id.* p. 245; — *oviformis* n. Indien; *id.* p. 245; — *regularis* n. *ibid.*, *id.* p. 245; — *insularum* n. Liukiu; **Pilsbry** 1901 *Nautilus* XV. p. 22; — *cassa* n. Japan; *id.* p. 23; — *yakushimae* n. Linkiu; *id.* p. 64; — *niahensis* n. Nordborneo; **Gredler** 1902 *Nachrbl.* p. 59; — *pseudopomatias* n. Nias; *id.* p. 60; — (*Sinica*) *sinulabris* n. Kelantan, Malacca; **Moellendorff** 1902 *Nachrbl.* p. 143; — *kiiensis* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 28; — *kobelti* var. *ampla* n. *ibid.*, *id.* p. 28; — *pnudica* n. *ibid.*, *id.* p. 28; — *dormitor* n. Japan; **Pilsbry** 1902 *Nautil.* XV p. 142; — *skeati* n. Malakka; **Sykes** 1903 Pr. Z. S. p. 198 fig.; — *laidlawi* n. *ibid.*, *id.* p. 198 fig.; — *debilis* n. Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 J. C. p. 223 t. 10 f. 13. 14; — (*Sinica*) *messageri* n. Ancey mss., *ibid.*, *id.* p. 224 t. 11 f. 1. 2; — *gramum* n. *ibid.*, *id.* p. 225 t. 11 f. 3. 4; — *lemyrei* n. *ibid.*, *id.* p. 226 t. 11 f. 5. 6; — *aesopus* n. *ibid.*, *id.* p. 226 t. 11 f. 7. 8; — *balansai* var. *robusta* n. p. 221 t. 10 f. 1—4; var. *elata* n. p. 222 t. 10 f. 7—8; var. *intermedia* n. p. 222 t. 10 f. 5—6; — *belonis* Mlldff. zuerst abgebildet t. 10 f. 9—12. — *oreadis* n. Queensland; **Hedley** 1901 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales vol. 25 p. 512 t. 25 f. 22; — *tosana* n. Liukius; **Pilsbry & Hirase** 1904 p. 620; — *tosanella* n. *ibid.*, *id.* p. 620; — *gibbera* n. *ibid.*, *id.* p. 620; — *goniobasis* n. *ibid.* mit var. *onoensis* n. *ibid.*, *id.* p. 621; — *kynshuensis* n. Satsuma; *id.* p. 621; — *tokunoshimana* n. Osumi; *id.* p. 622; — *ventriosa* n. *ibid.*, *id.* p. 622; — *kumejimana* n. Liukius; *id.* p. 623; *lateralis* n. *ibid.*, *id.* p. 623; *immersidens* n. *ibid.*, *id.* p. 623; — *vespa* n. *ibid.*, *id.* p. 624.

Opistostoma (Blfd.) *laidlawi* n. Kelantan, Malakka; **Sykes** 1902 J. Mal. IV p. 22; — *concinnum* n. Nordborneo; **Fulton** 1901 Ann. N. H. VIII p. 242; — *simplex* n. *ibid.*, *id.* p. 243; — *omithi* n. Bangney Ins., *id.* p. 243; — *sarawacense* n. Saravak; **Gredler** 1902 *Nachrbl.* p. 57; — *hiesenhauseni* *ibid.*, *id.* p. 58; — *annandalei* n. Malakka; **Sykes** 1903 Pr. Z. S. p. 198 fig.; — *beddomei* n. Borneo; **Smith** 1904 Pr. mal Soc. VI p. 105, Textfig.

Pseudopomatias (Mlldff.) *fulvus* n. Mansongeb., Tongking; **Möllendorff** 1901 *Nachrbl.* p. 81.

Pomatiasidae.

Kobelt 1902 im Tierreich nimmt für Pomatias autor. nec Stud. statt Hartmannia den Namen *Cochlostoma* Jan an.

Pomatias (Studer) *gracilis* var. *gracillimma* n. Welebit; **Wagner** 1901 Ann. Hofm. Wien p. 63; — *roseoli* n. Herzegowina; *id.* p. 63; — (*Cochlostoma*) *loebbeckei* nom. nov. für *laburdensis* Fagot nec *Folin & de Berillon*; **Kobelt** 1902,

Tierreich p. 502. — arnantorum n. Albanien, Montenegro; **Wohlberedt** 1903 Nachrbl. p. 85.

Realiidae.

Adelomorpha (Tapp.) *brunnea* n. Obi; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 195.

Diadema (Pease) *carolinarum* Mlldff. = *angulosa* (*Omphalotropis*) *Ancey prior*; **Ancey** 1901 J. C. p. 147.

Heteropoma (Mlldff.) *tongkingense* n. Kabao, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 119.

Mascaria (Angas). — *Megalomastoma bifasciatum* Sow. stammt sicher nicht von Guayaquil, sondern aus dem maskarenischen Gebiet, und ist wahrscheinlich auf ein abgeriebenes Exemplar von *M. litturata* gegründet; **Ancey** 1904 J. C. v. 52 p. 309.

Omphalotropis (Pfr.) *japonicus* n. Shikoku; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 405; — (*Eurytiopsis*) *buruana* n. Buru; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 201; — (*Eu.*) *aurea* n. ibid., id. p. 201; — *conella* n. Neue Hebriden; **Sykes** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 200 fig. 5; — *waigiouensis* n. Waigin; **Sykes** 1903 J. Mal. vol. 10 p. 67, fig.; — *varians* Mlldff. 1897 = *poecila* Ancey 1890; **Ancey** 1904 J. Conch v. 52 p. 308.

Realia (Gray) *turriculata* subsp. *leptidea* n. Nordinsel, Neuseeland; **Suter** 1904 Pr. mal. Soc. p. 157.

Chondrocyclus (Mlldff.) *exsertus* n. Natal; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. VIII p. 608 t. 32 f. 11.

Cyclostomidae.

Ericia (Moq. Tand.) *elegans* var. *apennina* Mtrs. abgeb. bei **Kobelt**, Icon. X no. 1918; — var. *corsicana* n. Korsika, id. p. 71 no. 1919; — *mauretanica* Pallary abg. ibid. no. 1920; — *elegans* var. *tingitana* n. Marocco; **Pallary**, 1904 J. C. p. 33 t. 3 f. 5.

Colobostylus (Cr. & F.) *nuttii* n. Jamaica; **Pilsbry**, 1903, *Nautilus* XVIII p. 65. — *Chondropoma andrecosae* Ancey, von der Insel Utila, nicht vom Festland von Honduras, ist hierher zu rechnen; **Ancey**, J. C. v. 52, p. 308.

Ligatella (Martens) *sikorae* n. Madagaskar; **Fulton**, 1901 J. Mal. VIII p. 104 t. 9 f. 6; — *moniliata* (*Cyclostoma*) var. *haemastoma* n. Mayotte; **Ancey**, 1904 J. C. p. 310.

Tropidophora (Troschel) *carnicolor* n. Madagaskar; **Fulton**, 1902 Ann. N. H. IV p. 314 (auch **Ancey**, 1902 *Nautil.* XVI p. 81); — *crenulatum* n. ibid., id. p. 314; — *alayerianum* n. ibid., **Ancey**, l. c. p. 81; — *comburens* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby**, 1903 Ann. N. H. XII p. 608 t. 32 f. 2; — *perfecta* n. Madagaskar; **Fulton**, in: J. Mal. vol. X, p. 102 t. 9 f. 11; — *plurilirata* n. Kapland; id. p. 103, t. 9 f. 8.

Otopoma (Gray) — **Sykes**, 1903 Pr. mal. Soc. p. 339 macht Bemerkungen über *O. clausum* Sow. und *yemenicum* Bourg., für den er *Georgia* Bourg. als Untergattung anerkannt.

Licinidae.

Chondropoma (Pfr.) *superbum* n. Haiti; **Henderson & Simpson**, 1902 *Naut.* XVI p. 88, Textfig.; — *martensianum* abgeb. bei **Pilsbry**, Pr. Ac. Phil. 1903 p. 780.

Rhytidopoma nom. nov. für Ctenopoma Pfeiffer 1856, non Peters 1844 gen. Piscium; **Sykes**, 1901 J. Mal. VIII p. 59.

Helicinidae.

Helicina (Lam.) *yaeyamensis* n. Yaeyama, Liukiu; **Pilsbry**, 1901 Pr. Phil. p. 497; — *leptalea* n. Südamerika; **Ancey**, 1901 Natural. p. 104; — *pelewensis* n. Palaos; **Sykes**, p. 200 Textfig.; — *rufocallosa* Ancey zuerst abgeb. ibid., Textfig.; — *rollei* n. Kangean bei Bali; **Sykes**, 1901 J. Mal. VIII p. 59, Textfig.; — (*Pleuropoma*) *obiana* n. Obi; **Moellendorff**, 1902 Nachrbl. p. 195; — (Pl.) *sykesi* n. Rolle mss., Tukan Bessi Gruppe; id. p. 207; — *capsula* n. Japan; **Pilsbry**, 1902 Pr. Phil. p. 25; — *ogowarana* n. ibid., id. p. 25; — *hirasei* n. ibid., id. p. 25; — *yoshiwarana* n. mit var. *microtheca* n., ibid. p. 26; var. *arata* n. p. 26; — *varians* n. Santa Cruz Archipel; **Sykes**, 1903 J. Mal. X p. 67, 78 t. 6 f. 6; — *sadoensis* n. Japan; **Pilsbry & Hirase**, 1903 Nautilus XVI p. 128; — *vereocunda* subsp. *degener* n. Osumi; iid. 1904 p. 625; — *euglypta* Crossc 1874 = *plicatula* Pfr. 1848; **Ancey**, 1904 J. C. v. 52 p. 309; — *pterophora* n. Guatemala; **Sykes**, 1901 Pr. mal. Soc. V p. 20 Textfig.; — *baldwini* n. Hawaii; **Ancey**, 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 126 t. 7 f. 24; — *dissotropis* n. ibid., id. p. 127 t. 7 f. 22, 23; — *sulculosa* n. ibid., id. p. 127 t. 7 f. 25.

Proserpinidae.

Ceres (Gray) *nelsoni* Dall abgeb. bei **Dall**, 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV t. 28 f. 1, 3, 5, 8.

Hydrocenidae.

Georissa (Blfd.) *japonica* n. Harima, Japan; **Moellendorff**, 1901 Nachbl. p. 45; — *kobelti* n. Baram; **Gredler**, 1902 Nachrbl. p. 61.

II. Opisthobranchiata.

a) Tectibranchiata.

Actaeonidae.

Actaeon (Montf.) *aethiopicus* (Leucotina) n. Pemba Kanal, Ostafrika; **Martens**, 1902 S.-B. Ges. Berlin p. 243; 1903 Tiefsee p. 129 t. 5 f. 14; — *pilsbryi* nom. nov. für *A. affinis* Adams nec Sow.; **Cossmann**, Revue paleont VI p. 100; — (*Microglyphis* n.) *breviculus* n. Kalifornien; **Dall**, 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV p. 512, fig. — (*Rictaxis*) *painei* n. ibid.; **Dall**, 1903 Pr. Soc. Washington XVI p. 172. — *pulchrior* n. Persischer Meerbusen; **Melvill**, 1904 Pr. mal. Soc. VI t. 3 f. 2; — *ovatus* Jeffr. gehört zu *azoricus* Locard, nicht zu *monterosatoi*; id. p. 29.

Microglypis n. subg. *Actaeonis*; **Dall**, 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV p. 512, für *Act. breviculus* n.

Kleinella (A. Ad.) *sympresta* n. Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen**, 1903 Ann. N. H. XII p. 320 t. 23 f. 16.

Tornatinidae.

Tornatina (A. Ad.) *erithodes* n. Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen**, 1901 Pr. Z. S. p. 453 t. 24 f. 19; — *zoë* n. Karachi, iid. p. 453 t. 24 f. 20; — *meridionalis* n. Natal; **Smith**, 1901 J. C. Leeds X p. 249 t. 4 f. 2; — *exserta* n. Neusüdwales; **Hedley**, 1903 Mem. Austr. Mus. IV p. 393 fig. 108; — *insignis* n. Japan; **Pilsbry**, 1904 P. Philad. p. 36 t. 5 f. 49; — *decorata* n. *ibid.*, id. p. 37 t. 5 f. 51.

Utriculus (Brown) *tomlinianus* n. Schottland; **Marshall**, 1903 Addit. Brit. Conch. VIII p. 35.

Volvula (A. Ad.) *flavotincta* n. Golf von Aden; **Martens**, 1903 Tiefsee p. 130 t. 5 f. 21; — *rostrata* n. Neusüdwales; **Hedley**, 1903 Mem. Austr. Mus. IV p. 394; — *tragula* n. *ibid.*, id. p. 395 f. 111.

Scaphandridae.

Scaphander (Montf.) *cancellatus* n. Pulo Nias; **Martens**, 1902 S.-B. Ges. Berlin p. 244; 1903 Tiefsee p. 131 t. 5 f. 19; — *ceylanicus* n., vor Ceylon; **Smith**, 1904 Ann. N. H. XIV p. 5.

Atys (Montf.) *sharpi* n. Westindien; **Vanatta**, 1901 Pr. Phil. p. 183 t. 5 f. 6, 7; — (*Roxana*) *lithensis* n. Rothes Meer; **Sturany**, 1903 Pola, p. 235 (27) t. 6 f. 2; — *flavovirens* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen**, 1903 Ann. N. H. XII p. 321 t. 23 f. 20; — *pransa* n. Neusüdwales; **Hedley**, 1904 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales v. 29 p. 191, Textfig.; — *submalleata* n. Andamanen; **Smith**, 1904 Ann. N. H. XIV p. 6.

Bullidae.

Haminea (Leach) *zanzibarica* n. Sansibar; **Vanatta**, 1901 Pr. Phil. p. 182 t. 5 f. 12; — *succinea* var. *solidior* n. Westindien; *ibid.* p. 182 t. 5 f. 8.

Cylindrobulla (Fischer) *fischeri* Ad. & Angas zuerst abgebildet bei **Hedley**, 1902 Studies VII p. 604 t. 29 f. 8, 9.

Cylichnidae.

Cylichna (Lovén) *buschirensis* n., Buschir, Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 444 t. 24 f. 21; — *crenilabris* n., Golf von Oman; *ibid.* p. 445 t. 24 f. 22; — *taoënsis* n., Buschir; *ibid.* p. 455 t. 24 f. 23; — *thetidis* n. Neusüdwales; **Hedley** 1903 Mem. Anstr. Mus. IV p. 395, Textfig.; — *protumida* n. *ibid.*, id. p. 396 fig. 112; — *jecoralis* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. Nat. Hist. XII p. 320 t. 23 f. 18; — *obscura* n., Südost-Island; **Sykes** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 37 t. 3 f. 9; — *verrilli* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. t. 29 f. 1; — *pithicus* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. 1904 p. 168 t. 10 f. 28; — *andamanica* n., Andamanen; **Smith** 1904 Ann. N. H. XIV p. 6; — *hoernesi* Wkff. abgeb. bei **Sykes** 1904 Pr. mal. Soc. VI t. 3 f. 1; — (*Bullina*) *elongata* Jeffr. desgl. t. 3 f. 8; — *striata* Hutton zuerst abgeb. bei **Murdoch** 1904 Trans. N. Z. Inst. t. 7 f. 1, 2.

Retusa (Brown) *omanensis* n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 321 t. 23 f. 19; — *marshalli* n., Portugal; **Sykes** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 31 t. 3 f. 5, 6; — *dilatata* n., Golf von Gabes; **Pallary** 1904 J. Conch. v. 52 p. 315 t. 7 f. 8; — *mayri* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U.

St. N. Mus. XXIV t. 29 f. 2; — bysma n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 168 t. 10 f. 27.

Cylichnopsis n. subg. *Cylichnae* für *C. acrotoma* Cossm.; **Cossmann** 1904 Essais VI p. 118.

Philinidae.

Philine (Ascan.) *intermedia* n., Spitzbergen; **Knipowitsch** 1901 VI Ann. Mus. Petersb. p. 488 t. 19 f. 34, 35; — *antarctica* n., Antarktischer Ozean; **Smith** 1902 Voy. Southern Cross VII p. 208 t. 24 f. 1; — *apertissima* n. *ibid.*, id. p. 208 t. 24 t. 2, 3; — *trapezia* n., Neustädwales; **Hedley** 1902 Pr. L. Soc. N. S. Wales XXVI p. 704; — *teres* n. *ibid.*, **Hedley** 1903 Mem. Aust. Mus. IV p. 398 t. 113; — *sykesii* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. Mal. Soc. IV p. 6 t. 5 f. 23.

Ringiculidae.

Ringicula (Desh.) *aethiopica* n., Ostafrika; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berlin p. 243; 1903 Tiefsee p. 129 t. 5 f. 15.

Oxynoidae.

Oxynoë (Raf.) *natalensis* n., Südafrika; **Smith** 1903 Pr. Mal. Soc. V p. 359 t. 15 f. 18 (*pellucidus* Sow. nec A. Adams).

Pteroceanidae.

Pteroceanidae n. famili., *Tectibranchiarum* für *Pteroceanis diaphana* n. gen. & spec., Golf von Aden; **Meisenheimer** 1902 Zool. Anzeiger XXVa p. 92, Texfig.

Odostomiopsidae.

Odostomopsis n. gen. & fam., Thiele mss.; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 68; Schale wie bei *Odostomia*, aber eine eigenthümliche Radula vorhanden; — *typica* n., Thiele mss.; Kerguelen; id. p. 68 t. 7 f. 27; — *circumrosa* n. *ibid.*, id. p. 70 t. 7 f. 28. — Die Anatomie bei **Thiele** 1903 Tiefsee VII p. —.

Umbrellidae.

Umbraculum (Schum.) *rushii* (Hyalopatura) Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV t. 30 f. 5.

Tethidae.

Tethys (C.) *cervina* n., Porto Rico; **Dall & Simpson** 1901 Rep. Fish-Comm. I p. 365 t. 56 f. 2; — *morio* n., Bermudas; **Verrill**, Trans. Connect. Acad. XI p. 25; — *tarda* n. *ibid.*, id. p. 26.

Doridiidae.

Chelidonura (A. Ad.) *varians* n., Sansibar; **Eliot** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 335; — *hirundinina* var. *punctata* n. *ibid.*, id. p. 336 t. 13 f. 2; — *philinopsis* n. *ibid.*, id. p. 336.

Doridium (Meckel) *gardineri* n., Rotuma; **Eliot** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 332; — *reticulatum* n., Wasin Island, Ostafrika; id. p. 335 t. 13 fig. 1.

Pleurobranchidae.

Pleurobranchus (Meckel) *lacteus* n., Porto Rico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 367 t. 56 f. 6.

Cryptomphalus () *minikorensis* n., Maldiven; **Smith** 1903 Lakhediven p. 600, fig. —.

Sedis incertae.

Toledonia n. gen. für *T. perplexa* n., Puntas Arenas, Magellansstrasse; **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV p. 512 (Shell small, smooth, thin, imperforate, succineiform; pillar continuous, with the basal margin of the aperture straight, but with an elevated thin plait near the base of the pillar, which appears to be continued into the coil of the shell; nucleus smooth, dextral; soft parts unknown).

b) Nudibranchiata.

Alloiodoris n. gen., Typus *A. marmorata* n., Tasmanien; **Bergh** 1904 in Semper IX 6 p. 41, figg.

Antiopa (Ald. & Hauc.) präoccupirt bei Meigen, der Name deshalb in *Antiope* geändert; **Hoyle** 1902 J. Conch. Leeds X p. 214.

Antiope nom. nov. für *Antiopa*, Alder & Hancock, nec Meigen; **Hoyle** 1902 J. of Conch. Leeds X p. 214.

Archidoris (Bergh) *stellifera* n., Marseille; **Vayssiére** 1904 J. Conch. v. 52 p. 130, figg.; — *africana* n., Ostafrika; **Eliot** 1903 Pr. Z. S. II p. 361; — *minor* n. ibid., id. p. 362; — *violacea* n., Neuseeland; **Bergh** 1904 in Semper, IX 6 p. 31, figg.; — *nanula* n. ibid., id. p. 33, figg.

Baeolidia (Bergh) *major* n., Sansibar; **Eliot** 1903 Pr. Z. S. I p. 252.

Bornella (Gray) *simplex* n., Sansibar; **Eliot** 1904 Pr. Z. S. II p. 103.

Cerberilla (Bergh) *africana* n., Sansibar; **Eliot** 1903 Pr. Z. S. I p. 254.

Chromodoris (Alder & Hancock) *universitatis* n., Kalifor., **Cockerell** 1902 Naut. XVI p. 19; — *porterae* n. ibid., id. p. 20; — *macfarlandi* n. ibid., id. p. 20; — *sykesi* n., Sansibar; **Eliot** 1904 Pr. Z. S. I p. 387; — *cavae* n. ibid., id. p. 388; — *annulata* n. ibid., id. p. 389; — *splendens* n. ibid., id. p. 390; — *vicina* n. ibid., id. p. 392; — *nigrostriata* n. ibid., id. p. 394; — *inconspicua* n. ibid., id. p. 398; — *flava* n. ibid., p. 339.

Coryphella (Gray) *sarsi* n., Norwegen; **Friese** 1902 Bergens Aarb. III p. 12, mit fig.; — *californica* n., Californien; **Bergh** 1904 in Semper IX 6 p. 6, fig.; — *cooperi* n., Californien; **Cockerell** 1901 J. Mal. VIII p. 83.

Crosslandia n. gen. für *Cr. viridis* n., Sansibar; **Eliot** 1902 Pr. Z. Soc. II. p. 64.

Cuthona (A. & H.) *bicolor* n., Japan; **Bergh** 1904 in Semper IX. 6 p. 3 fig.

Cuthonella (Bergh) *ferruginea* n., Island; **Friese** 1902 Bergens Aarb. III p. 10, fig.; — *berghi* n. ibid., id. p. 11.

Dictyodoris (Bergh) *maculata* n., Maldiven; **Eliot** 1903 Fauna Laccad. p. 556.

Discodoris (Bergh) *edwardsi* n., Marocco; **Vayssiére** 1902 Travail. p. 232, fig.; — *dubia* n., Tasmanien; **Bergh** 1904 in Semper IX. 6 p. 53, fig.; — *egena* n. ibid., id. p. 54, fig.

Doridomorpha n. gen. für *D. gardineri* n., Rotuma; **Eliot** 1903 Fauna Laccad. p. 544, mit fig.

Doriopsis (Bergh) *pallida* n., Golf von Siam; **Bergh** 1902 Danske Selsk. Skr. XII p. 193.

Doris (L.) *beaumonti* n., Westküste von Irland; **Farran** 1903 Rep. Fish Ireland 1901, II p. 126, mit Abb.; *giardi* n., Wimereux; **Abrik** 1904 C. R. Soc. Biolog. v. 57 p. 232.

Dunga n. gen. für *D. nodulosa* n., Sansibar; **Eliot** 1902 Pr. Z. Soc. II, p. 71, figg.

Ercolania (Trinchese) *zanzibarica* n. Sansibar; **Eliot** 1903 Pr. Z. S. I p. 256.

Elysia (Risso) *subornata* n. Bermudas; **Verrill** 1904 Tr. Connect. Ac. p. 29; — *flava* n. *ibid.*, id. p. 30; — *pieta* n. *ibid.*, id. p. 30; — *papillosa* n. *ibid.*, id. p. 31.

Facelina (Ald. & Hanc.) *goshugi* n. Bermudas; **Verrill** 1904 Tr. Connect. Acad. p. 34; — *stearnsi* n. Californien; **Cockerell** 1901 J. Mal. VIII p. 86.

Fracassa (Bergh) *tuberculosa* n. Sansibar; **Eliot** 1903 Pr. Z. S. II p. 371.

Halgerda (Bergh) *willeyi* n. Loyalitäts Inseln; **Eliot** 1903 Pr. zool. Soc. II p. 372, fig.; — *wasinensis* n. Ostafrika; *id.* p. 373, fig.

Hexabranchus (Ehrbg.) *digitatus* n. Malediven; **Eliot** 1903 Fauna Laccad. p. 546; — *plicatus* n. Rothes Meer; **Haegg** 1904 Res. Swed. Exped. Nile p. 5 t. 1 fig. 4, 5.

Homoiodoris (Bergh) *novae zealandiae* n. Neuseeland; **Bergh** 1904 in Semper IX. 6 p. 35, fig.

Idalia (Leuckart) *plebeia* n. Golf von Siam; **Bergh** 1902, Danske Selsk. Skr. XII p. 186, fig.

Lamellidoris (Bergh) *aureopuncta* n. Bermudas; **Verrill** 1904 Trans. Connect. Ac. XI p. 31, fig. ; — *miniata* n. *ibid.*, id. p. 32.

Linguella (Blainv.) *variolosa* n. Chinesisches Meer; **Bergh** 1904 in Semper IX. 6 p. 21.

Marionia (Vayss.) *chlaoanthes* n. Golf von Siam; **Bergh** 1902 Danske Selsk. Skr. XII p. 196 fig.; — *pellucida* n. Ostafrika; **Eliot** 1903 Pr. zool. Soc. II p. 94; — *levis* n. *ibid.*, id. p. 94, fig.; — *ramosa* n. Sansibar; *id.* p. 96; — *albotuberculata* n. *ibid.*, id. p. 97; — *viridescens* n. *ibid.*; *id.* p. 98.

Madrella (Ald. & Hanc.) *aurantiaca* n. Marseille; **Vayssiére** 1904 Ann. Mus. Marseille VIII p. 89, fig.

Melibe (Rang) *bucephala* n. Golf von Siam; **Bergh** 1902 Danske Selsk. Skr. XII p. 205, fig.; — *pellucida* n. Columbia; **Bergh** in Semper IX. 6 p. 11, fig.

Nembrotha (Bergh) *coerulea* n. Ost-Afrika; **Eliot** 1904 Pr. zool. Soc. II p. 91; — *affinis* n. *ibid.*, id. p. 92, fig.

Nossis n. gen. für N. *indica* n. Golf von Siam; **Bergh** 1902 Danske Selsk. Skr. XII p. 210, fig.

Notarchus (Cuvier) *brevipes* n. Rothes Meer; **Haegg** 1904 Res. Swed. Exp. Nile p. 1 t. 1 f. 1—3.

Notodoris (Bergh) *gardineri* n. Malediven; **Eliot** 1903 Fauna Laccad. p. 548, fig.; — *minor* u. Sansibar; **Eliot** 1904 Pr. zool. Soc. II p. 84.

Peltodoris (Bergh) *angulata* n. Ostafrika; **Eliot** 1904 Pr. zool. Soc. II p. 365; — *aurea* n. *ibid.*, id. p. 366.

Peronodoris n. gen., Typus P. *cancellata* n. Stiller Ozean; **Bergh** 1904 in Semper IX. 6 p. 45, fig.

- Platydoris* (Bergh) *pulchra* n. Ostafrika; **Eliot** 1903 Pr. zool. Soc. II p. 377;
— *incerta* n. ibid., id. p. 378; — *papillata* n. ibid., id. p. 379.
- Pleuroleura* (Bergh) *alba* n. Sansibar; **Eliot** 1904 Pr. zool. Soc. II p. 104.
- Pleurophyllidiella* n. gen. für *Pl. horatii* n., Wasin; **Eliot** 1903 Pr. Z. S. I p. 251.
- Pleurophyllidiopsis* (Bergh) *berghi* n. Biscayischer Meerbusen; **Vayssiére** 1902 Travailleur p. 237, fig.
- Sclerodoris* n. gen., Typus *Doris osseosa* Kelaart; **Eliot** 1903 Pr. zool. Soc. II p. 381; — *tuberculata* n. Ostafrika; id. p. 381; — *minor* n. ibid., id. p. 382; — *rubra* n. ibid., id. p. 382; — *coriacea* n. ibid., id. p. 383. — Die Gattung ist nach **Eliot** 1904 Pr. zool. Soc. I p. 380 wahrscheinlich Synonym von *Peronodoris* Bergh.
- Staurodoris* (Bergh) *pecten* n. Malediven; **Eliot** 1903 Pr. zool. Soc. II p. 363;
— *calva* n. ibid., id. p. 364.
- Tergipes* (Cuvier) *antarcticus* n. Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 Voy. Belgica Zool. p. 15, Fig.
- Thecacera* (Bergh) *velox* n. Californien; **Cockerell** 1901 J. Mal. VIII p. 87.
- Thordisa* (Bergh) *stellata* n. Sansibar; **Eliot** 1903 Pr. zool. Soc. II p. 368.
- Trevelyania* (Kelaart) *coccinea* n. Ostafrika; **Eliot** 1904 Pr. zool. Soc. II p. 85.
- Trippa* (Bergh) *monsoni* n. Sansibar; **Eliot** 1903 II p. 371.
- Tritonia* (Cuvier) *incerta* n. Stiller Ozean; **Bergh** 1904 in Semper IX. 6 p. 24, Fig.
- Zatteria* n. gen. für *Z. browni* n. Sausibar; **Eliot** 1902 Pr. Z. S. II p. 62, fig.

b) Scutibranchia.

a) *Rhipidoglossa*.

Trochidae.

Eine Monographie der europäischen Turbinidae vom Standpunkt der Nouvelle Ecole aus giebt **Locard** 1903; eine Anzahl Monterosato'scher Arten wird zum erstenmal genauer beschrieben.

Astralium (Link) *andersoni* (Bolma) n. Durban, Natal; **Smith** 1902 J. C. Leeds X p. 248 t. 4 f. 7; — *bathyraphae* Smith zuerst abgebildet bei **Alcock** 1902 p. 279, Textf.; — *fimbriatum* und *tentoriforme* gut verschieden; **Kesteven** 1902 Pr. N. S. Wales XXVII p. 2, Textfig.; — *gilchristi* n. Kap; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. II p. 221 t. 5 f. 6; — *andersoni* Smith abgeb. ibid. t. 5 f. 7; — *pyramidalis* n. Neuseeland; **Webster** 1904 Tr. N. Z. Inst. p. 276 t. 9 f. 2.

Basilissa (Fitz.) *patula* n. Ostafrika; **Martens** 1901 S.-B. Ges. Berlin p. 25; 1903 Tiefsee VII p. 124 t. 4 f. 17; — *aethiopica* n. (*Margarita*, *Turcicula*) zwischen Cap Guardafui und Aden; id. 1901 p. 24, 1903 p. 125 t. 4 f. 20; — *ottoui* var. *chuni* n. Pulo Nias; id. 1903 p. 127 t. 4 f. 19; — *compsa* n. Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 100 t. 10 f. 4.

(*Margarita*) *aegleis* Watson und (M.) *regalis* **Verrill** = *ottoui* Phil. und zu *Basilissa* gehörig; **Martens** 1903 Tiefsee VII p. 126.

Calliostoma (Swains.) *aucklandicum* n., Neuseeland: **Smith** 1902 Voy. Southern Cross VII p. 202 t. 24 f. 5; — *dubium* var. *kochi* zuerst abgeb. bei **Pallary**

1902 J. C. 50 t. 1 f. 23, 24; — *hedleyi* n., Victoria, **Pritchard & Gatliff** 1902
Pr. Victoria XIV p. 182 f. 3; — *sublaeve* var. *chuni* n., Somaliküste; **Martens**
 1903 *Tiefsee* VII p. 121 t. 4 f. 3; — *perfragile* n., Kap; **Sowerby** 1903 Mar.
Invest. II p. 222 t. 5 f. 3; — *granoliratum* n. *ibid.*, id. p. 222 t. 5 f. 7; — *iri-*
descens n. *ibid.*, id. p. 223 t. 5 f. 4; — *variegatum* Carpenter zuerst abgeb. bei
Dall 1902 *Pr. U. St. Nat. Mus.* XXIV t. 39 f. 10; — *turbinum* Dall desgl. t. 39
 f. 1; — *iridium* Dall desgl. t. 39 f. 3; — *liratum* Sow. = *multiliratum* Smith;
Smith 1903 *Pr. mal. Soc.* V p. 389; — *thrinoma* n., Persischer Meerbusen;
Melvill & Standen 1903 *Ann. N. H.* XII p. 296 t. 20 f. 13.

Calliotropis n. subg. *Calliostomatis* für *Trochus Ottoi* Phil.; **Seguenza** 1903
Boll. Soc. geol. ital. XXI p. 462.

Cantharidus (Montf.) *hirasei* n., Japan; **Pilsbry** 1901 *Pr. Phil.* p. 199, 398
 t. 21 f. 32; — *bisbalteatus* n. *ibid.*, id. p. 199 t. 21 f. 33.

Clanculus (Montf.) *gennesi* n. (= *Savigny* t. 3 f. 3) Djibuti; **H. Fischer**
 1901 J. C. p. 123 t. 4 f. 11, 12; — *gummifera* n., Japan; **Pilsbry** 1901 p. 200,
 398 t. 21 f. 34; — *hizenensis* n. *ibid.*, id. p. 200, 398 t. 21 f. 35; — *microdon*
 var. *ater* n. *ibid.*, id. p. 200; — *gummifera* var. *pallidus* n., Japan; **Pilsbry**
 1903 *Nautil.* XVII p. 71; — *hizenensis* var. *fraterculus* n. *ibid.*; **Pilsbry** 1904
Pr. Phil. p. 33 t. 6 f. 54; — *mixtus* n., Süd-Afrika; **Smith** 1903 *Pr. mal. Soc.* V
 p. 389 t. 15 f. 7; — (*Clanculopsis*) *jussieui* subsp. *debilis* n., Golf von Gabes;
Pallary 1904 *J. Conch.* v. 52 p. 240.

Chlorostoma (Swains.) *argyrostomum* var. *basiliratum* n., Japan; **Pilsbry**
 1901 *Pr. Phil.* p. 202; — *smogrossi* n., Albemarle, Galapagos; **Pilsbry & Vanatta**
 1902 *Voy. Hopkins Stanf.* p. 557 t. 35 f. 6, 7; — *rugatum* var. *sublaeve* n.,
 Japan; **Pilsbry** 1904 *Pr. Phil.* p. 33 t. 5 f. 50.

Collonia (Gray) *rosa* n., Japan; **Pilsbry** 1904 *Pr. Phil.* p. 31 t. 6 f. 53; —
rosea (Monilea) T. Woods zuerst abgeb. bei **Tate & May** 1901 p. 400, Textfig.

Cynisca (Adams) *forticostata* n., Port Alfred; **Smith** 1904 *J. Mal.* XI p. 38
 t. 3 f. 12, 13.

Enida (A. Ad.) *persica* n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 *Ann. N. H.*
 XII p. 294.

Euchelus (Phil.) *ruber* var. *brunneus* n., Japan; **Pilsbry** 1901 *Pr. Phil.*
 p. 201; — *erythraeensis* n., Rothes Meer; **Sturany** 1903 *Pola* p. 266 (58) f. 6
 (= *Clanculus gennesi* fide **Fischer** 1904 *J. Conch.* v. 52 p. 59). — *lischi* n.,
 Japan; **Pilsbry** 1904 *Pr. Phil.* p. 34 t. 6 f. 55; — *hachijoensis* n. *ibid.*, id. p. 35
 t. 6 f. 56; — (*Hybochelus*) *cancellatus* n. *ibid.*, id. p. 35 t. 6 f. 57; — *townsendianus*
 n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 *Ann. N. H.* XII p. 295.

Ethalia (H. & A. Adams) *jucunda* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904
 p. 159 t. 10 f. 3; — *floccata* n., Japan; **Sowerby** 1903 *Ann. N. H.* XII p. 500; —
rhodomphala n., Malediven; **Smith** 1903 *Lakhediven* p. 618 fig.; — *africana* n.,
 Port Alfred; **Smith** 1904 *J. Mal.* XI p. 38 t. 3 f. 10, 11.

Fossarina (Ad. & Angas) gehört zu den Trochiden; **Kesteveen** 1902 *Rec. Austral. Mus.* IV p. 317; *Minos* Hutton ist synonym.

Ganesa (Ad.) ?*panamensis* n., Panama; **Dall** 1902 *Pr. U. St. Nat. Mus.*
 XXIV p. 554.

Gibbula (Risso) *legrandi* (*Fossarina*) Petterd zuerst abgeb. bei **Tate & May**
 1901 t. 24 f. 21, 22; — *dolorosa* T. Woods desgl. t. 24 f. 31.

Risellopsis n. gen. für *Fossarina varia* Hutton; **Kesteveen** 1901 Rec. Austr. Mus. IV p. 319.

Gibbula (Risso) *tingitana* n., Tanger; **Pallary** 1901 J. C. p. 315, abgeb. 1902 t. 1 f. 25; — *minuseula* nom. nov. für *pygmaea* Phil. nec Risso; **Locard** 1903 Turbinidae p. 36. — *inevitabilis* n., Mittelmeer; id. p. 40; — *affinis* var. *cognata* n., Japan; **Pilsbry** 1903 Naut. XVII p. 69; — *vittata* n. ibid., id. p. 69; — *incarnata* n. ibid., id. p. 70; — *canfieldi* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 39 f. 2; — *vimontiae* Mtrs. zuerst genauer beschrieben bei **Locard** 1903 Turbinidae p. 31; — *sulliotii* Mtrs. desgl. p. 32; — *tantilla* Mtrs. desgl. p. 36.

Liota (Gray) *disjuncta* n., Neusüdwales; **Hedley** 1903 Mem. Austr. Mus. IV p. 337 f. 66; — *squamicostata* n., Malediven; **Smith** 1903 Lakhediven p. 617 fig.; — *romalea* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 293 t. 20 f. 8; — *echinacantha* n. ibid., iid. p. 293 t. 30 f. 9; — *tasmanica* var. *scalaris* n., Neusüdwales; **Hedley** 1903 Thetis II p. 336; — *corona* n., Torresstrasse; **Hedley** 1901 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII p. 14 t. 2 f. 21—23; — *incidata* n. ibid., id. p. 14 t. 2 f. 18—20; — *polypeura* n., Neuseeland; **Hedley** 1904 Rec. Austr. Mus. V p. 93, fig.; — *densilineata* Tate zuerst abgeb. bei **Tate & May** 1901 t. 25 f. 59.

Leptothyra (Carp.) *rubens* n., Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 296 t. 20 f. 14; — *arenacea* n., Victoria; **Pritchard & Gatlieff** 1902 Pr. Soc. Victoria p. 181 t. 9 f. 3; — *huttoni* T. Woods zuerst abgeb. bei **Murdoch** 1904 Trans. N. Zealand t. 7 f. 10; — *crassicosta* Hutt. desgl. t. 7 f. 11.

Margarita (Leach) *lamellosa* n., Antarktischer Ocean; **Pelseneer** 1903 Voy. Belgica Zool. p. 18 fig.; — *aloyssi - sabandiae* n., Nördliches Eismeer; **Pollonera** 1902 Spediz. polar Abruzzi p. 623.

Mecolistia (Hedley) *spinosa* n., Nord-Queensland; **Hedley** 1902 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales XXVII p. 15 t. 2 f. 26.

Minolia (A. Adams) *arata* n., Neusüdwales; **Hedley** 1903 Mem. Austral. Mus. IV p. 333 f. 65; — *congener* n., Kap; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. II p. 223 t. 5 f. 2; — *ornata* n., Japan; **Sowerby** 1903 Ann. N. H. XII p. 498.

Monilea (Swains.) *nucleolus* n., Japan; **Pilsbry** 1903 Naut. XVII p. 70.

Omphalius (Philippi) *comptus* n., Japan; **Sowerby** 1903 Ann. N. H. XII p. 499; — *collingei* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 J. Mal. XI p. 80.

Photinula (Adams) **Ihering** 1902 Nachrbl. p. 97 spaltet die Gattung in zwei Untergattungen: *Photinula* s. str., Typus *Pr. violacea* King; und *Kingotrochus* n., Typus *Ph. caerulescens* King; — (*K.*) *lahillei* n. Sta.-Cruz, Patagonien; id. p. 101, Textfig.

Solariella (S. Wood) *beckeri* n., Kowie, Südafrika; **Sowerby** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 214 t. 22 f. 22; — *carlotta* n., Queens Charlotta Island; **Dall** 1902 Pr. U. St. Mus. 24 p. 553; — *periomphalia* n., Neu Amsterdam; **Martens** 1901 S. B. Ges. Berlin p. 24, 1903 Tiefsee VII p. 70 t. 5 f. 1; — *biradiatula* n., Dar es-Salam; **Martens** 1902 S. B. Ges. Berlin p. 242, 1903 Tiefsee VII p. 123 t. 5 f. 3; — *infralaevis* n., Somaliküste; id. p. 242, 1903 Tiefsee p. 123 t. 4 f. 21; — *persculpta* n., Kap; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. II p. 223 t. 5 f. 8; — *zacalles* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 295; — *illnstris* Stur. abgeb. bei **Sturany** 1903 Denkschr. Ac. Wien vol. 74 t. 1 f. 7.

Stylobates n. gen. *Trochidaram* für *St. aeneus* n., Tiefwasser vor. Hawaii;
Dall 1903 Naut. XVII p. 61.

Thalotia (Gray) *maldivensis* n., Maldiven; **Smith** 1903 Lakhediven p. 617 fig.

Tharsis (Jeffr.) *globosa* n., Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 Voy. Belgica Zool. p. 18.

Trochocochlea (Klein) *blainvillei* n., Tanger; **Pallary** 1901 J. C. v. 50 p. 27 t. 1 f. 19, 20; zuerst abgebildet *Tr. sagittifera* Lam., id. t. 1 f. 18; — *Tr. crassa* var. *denudata* Mtrs., id. t. 1 f. 21, 22; — *obstrieta* n. (= *crassa* Fbs. & Hanl. nec Pult.); **Locard** 1903 Turbinid. p. 52; — *castriotae* n., Neapel; **Bellini** 1902 Bull. Nap. XVI p. 14 f. 3.

Trochus (Lam.) *hirasei* n., Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 22 t. 5 f. 52.

Turbo (L.) *radina* (Lunella) n., Neuseeland; **Webster** 1904 Tr. N. Zeal Inst. p. 276 t. 9 f. 1.

Ziziphinus (Gray) *gibbosulus* n. (Monterosato mss.), Sicilien; **Locard** 1903 Turbinidae p. 17; — *corallinus* Mtrs. beschrieben ebenda p. 21; — *scabriculus* Mtrs. und (*Jujubinus*) *aureus* Mtrs. zuerst genauer beschrieben ibid. p. 11.

Delphinulidae.

Delphinula (Lam.) *diplostera* n., Rothes Meer; **Melvill** 1901 Ann. nat. Hist. VII p. 554 t. 9 f. 5.

Phasianellidae.

Phasianella (Lam.) *tristis* n., Japan; **Pilsbry** 1903 Nautil. XVII p. 69, abgeb. 1904 Pr. Philad. t. 6 f. 64.

Neritidae.

Nerita (L.) *martensiana* n., Liu Kiu; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 397; — *helicinoides* var. *tristis* n. ibid., id. p. 397; — *junguhuhi* n., Java; **Schepman** 1902 Notes Leyden Mus. XXIII p. 63 fig.; — *proxima* n., Japan; **Sowerby** 1903 Ann. N. H. XII p. 498.

Neritina (Lam.) *fluvialis* var. *sarmatica* n., Gouv. Kursk, Südrussland; **Lindholm** 1901 Nachrbl. p. 181.

Ninnia n., *Brusina* mss., nov. subg. *Neritinæ*, Typus *N. schulzii* Grimm; **Westerlund** 1903 Rad Jugosl. Ak. vol. 151 p. 133.

Cyclostrematidae.

Cyclostrema (Marryat) *ocrinium* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 346 t. 22 f. 1; — *quadricarinatum* n. ibid., iid. p. 346 t. 22 f. 2; — *eumares* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 158 t. 10 f. 1; — *europetum* n. ibid., id. p. 159 t. 10 f. 3; — *inscriptum* Tate abgeb. bei **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 338, Textfig. 67; — *decussatum* n., Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 Voy. Belgica Zool. p. 19 fig.; — *liratulum* n. ibid., id. p. 19 fig.; — *humile* n. ibid., id. p. 20 fig.; — *hengamense* n., Persischer Meerbusen; **Melvill & Standen** 1903 Ann. N. H. XII p. 291 t. 20 f. 3; — *supremum* n. ibid., iid. p. 291 t. 20 f. 4; — *annellarium* n., Golf von Oman; iid. p. 292 t. 20 f. 5; — *prominulum* n. ibid., iid. p. 292 t. 20 f. 6; — *euchilopterum* n. ibid., id. p. 292 t. 20 f. 7; — *gyalum* n., Persischer Meerbusen; **Melvill** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 54 t. 5 f. 22; — *eumares* n. ibid., id. p. 158 t. 10 f. 1; — *eupoietum*

n. *ibid.*, id. p. 159 t. 10 f. 2; — (*Cirsonella*) *australe* Angas zuerst abgeb. bei Tate & May 1901 p. 397 Textfig. 8; — ?brunnienuse Bedd. desgl. p. 397, Textfig. 9.

Vitrinella (C. B. Ad.) *mooreana* n., Florida; Vanatta 1903 Pr. Philad. p. 758 Textfig. 1.

Cocculinidae.

Cocculina (Dall) *portoricensis* n., Portorico; Dall & Simpson 1901 Bull. Fish Comm. I p. 440 t. 53 f. 18, 19; — *laevis* n., Thiele mss., Pulo Nias; Martens 1903 Tiefsee VII p. 127 t. 5 f. 11, 12; — *radiata* n., Thiele mss., id. p. 128 t. 5 f. 13; — *meridionalis* n., Neusüdwales; Hedley 1903 Mem. Austral. Mus. IV p. 331 f. 64.

Haliotidae.

Haliotis (L.) *granti* n., Victoria; Pritchard & Gatliff 1902 Pr. Soc. Victoria XIV p. 183 t. 10 f. 1.

Fissurellidae.

Emarginula (Lam.) *triangulata* n., Cebu; Sowerby 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 211 t. 22 f. 13; — *harmilensis* n., Rothes Meer; Sturany 1903 Denkschr. Ak. Wien vol. 74 p. 235 t. 5 f. 12; — *undulata* n., Golf von Oman; Melvill & Standen 1903 Ann. N. H. XII p. 290 t. 20 f. 1; — *camilla* n. *ibid.*, iid. p. 290 t. 20 f. 2.

Fissurella (Brug.) *crucis* Bedd. zuerst abgeb. bei Tate & May 1901 p. 408 Textfig. 11.

Glyphis (Carpenter) *spreta* nom. nov. für *fimbriata* Sow. nec Reeve; Smith 1901 J. Conch. Leeds X p. 104 t. 1 f. 18; — *elizabethae* nom. nov. für *sieboldii* Sow. nec Reeve p. 104 t. 1 f. 12.

Subemarginula (Blainv.) *yatesi* Dall abgeb. bei Dall 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 38 f. 1—3.

Zeidora (Gray) *flabellum* Dall zuerst abgeb. bei Dall 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 38 f. 8; — *tasmanica* Bedd. desgl. bei Tate & May 1901 t. 24 f. 25, 26.

Puncturella (Lowe) *analogia* n., Kerguelen; Martens 1902 S. B. Ges. Berlin p. 243, 1903 Tiefsee VII p. 70 t. 5 f. 8; — (*Cranopsis*) *aethiopica* n., Sansibar; id. 1902 p. 242, 1903 p. 128 t. 5 f. 9; — *henniana* Brazier = *harrisoni* Beddome; Hedley 1903 Thetis II p. 330; — *galerita* n., Torrestrasse; Hedley 1901 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI p. 103, Textfig.: — *demissa* n., Neuseeland; Hedley 1904 Rec. Austr. Mus. V p. 93, fig.

Scissurellidae.

Scissurella (d'Orb.) *australis* n. Neusüdwales; Hedley 1903 Mem. Austral. Mus. IV p. 329 f. 63; — *jacksoni* n. Persischer Meerbusen; Melvill 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 100 t. 10 f. 5; — *dalii* n. Patagonien; Bartsch 1903 Nautilus XVII p. 90; — *euglypta* n. Antarktischer Ozean; Pelseneer 1903 Voy. Belgica Zool. p. 17 fig.; — *aetheria* n. Golf von Oman; Melvill & Standen 1903 Ann. N. H. XII p. 300 t. 21 f. 5; — *atkinsonii* Ten. Woods = *Schismope carinata* Watson; Hedley 1903 Thetis II p. 329; — *rosea* n. Neuseeland; Hedley 1904 Rec. Austr. Mus. V p. 90, fig.:

Incisura n. gen. für *Scissurella* *littletonensis* Smith; Hedley 1904 Rec. Austr. Mus. V. p. 91.

Pleurotomariidae.

Pleurotomaria (Defr.) *hirasei* n. Japan; **Pilsbry** 1903 Pr. Philad. p. 496 t. 22 f. 1, 2 *Nautilus* XVII p. 30.

Stomatellidae.

Stomatella (Lam.) *exquisita* n., unbekannten Fundorten; **Sowerby** 1903 J. Conch. Leeds X p. 76 t. 5 f. 4.

β. Dokoglossa.

Patellidae.

Patella (L.) *luchuana* n. Liu Kiu; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 202; — ? *decemcostata* n. Algoa Bay; **Smith** 1901 J. Conch. Leeds p. 106 t. 1 f. 22. — *hepatica* nom. nov. für *Acmaea striata* Pilsbry nec Quoy & Gaimard; **Pritchard & Gatliff** 1903 Pr. Soc. Victoria XV p. 194.

Acmaeidae.

Acmaea (Eschsch.) *minutissima* n. Andamanen; **Smith** 1904 Ann. N. H. XIV p. 4. — *heroldi* var. *signata* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 212, 398 t. 19 fig. 10, 11; — *roseoradiata* n. Capstadt; **Smith** 1901 J. Conch. Leeds X p. 106 t. 1 f. 19; — *albonotata* n. Natal; id. p. 107 t. 1 f. 14, 16.

Nacella (Schum.) *crebristriata* n. Süd-Australien; **Verco** 1904 Trans. R. Soc. S. Australia v. 28 p. 144 fig.; — *tasmanica* Tate & May zuerst abgebildet bei **Tate & May** 1901 t. 27 f. 89, 90.

Nucleobranchiata.

Cymbuliidae.

Cymbulia (Péron & Lesueur) *sibogae* n. Holländisch-Indien; **Tesch** 1904 Tijdskr. ned. Ver. VIII p. 113.

Cymbuliopsis (Pelseneer) *intermedia* n. Holländisch Indien; **Tesch** 1904 Tijdskr. Ned. Ver. VIII p. 113; — *vitrea* n. Monterey, Californien; **Heath & Spaulding** 1901 Pr. Philad. p. 509 Textfig.

Janthinidae.

Janthina (Lam.) *auriculata* n. Ostafrika; **Martens** 1903 Tiefsee p. 142 t. 4 f. 15.

IV. Pulmonata.

α. Stylommatophora.

Agnatha.

Moellendorff hat die Monographie dieser Familie, welche bei der Unmasse der in neuerer Zeit (nach Tryon's Monographie) beschriebenen Arten eine dringende Nothwendigkeit ist, für die neue Auflage des Martini—Chemnitz begonnen. Nach seinem frühen Tode hat **Kobelt** die Fortsetzung übernommen und in der Berichtsepoke die Rhytididen und Ennea zu Ende geführt.

Simroth 1901 Naturw. Wochenschrift vol. 17 bestreitet — und zwar allem Anschein nach mit Recht — die phylogenetische Zusammengehörigkeit der

Agnathen (Raublungenschnecken) und erklärt ihre anscheinende Verwandtschaft für eine Konvergenzerscheinung. Er betrachtet die Glandinidae als Achatinoid, Selenites als Zonitoid, Daudebardia als Hyalinoid, die kaukasischen Raubnacktschnecken als Verwandte von Parmacella etc.

Rhytididae.

Rhytida (Pfr.) *bernieri* n. Neu Caledonien; **Dautzenberg** 1901 J. C. p. 299 t. 8 f. 1—3; — (*Eurhytida*) *wynyardensis* Petterd zuerst abgeb. bei **Moellendorff** 1903 M. Ch. t. 5 fig. 19—21; — *duplicata* n. Neuseeland **Suter** 1904 p. 155 Textfig. 1—3.

Afrorhytida n. subg. Rhytididae, Typus *Rh. knysnaensis* Pfr.; **Moellendorff** apud **Kobelt** in: Mart. Chemn. 1904 p. 61.

Ptychorhytida n. subg. Rhytididae Typus *Rh. beraudi* Gassies; **Moellendorff** apud **Kobelt**, in: Mart. Chemn. 1904 p. 65.

Paryphanta (Albers) *striata* n. Britisch Neu Guinea; **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX p. 182; — *louisiadaruum* Mlldff. abgeb. bei **Moellendorff** 1903 M. Ch. t. 3 f. 1—3; — *striata* n. Britisch Neu Guinea; **Fulton** 1903 Ann. N. H. IX p. 182; — *elegans* n. ibid., id. p. 182.

Streptaxidae.

Gude 1902 Pr. mal. Soc. V gibt einen sehr sorgfältig gearbeiteten Catalog der Familie, in welcher er neben der Gattung *Streptaxis* Gray nur noch *Happia* Bourg. und *Scolodonta* Doering als Gattungen anerkannt. Die Untergattungen sind im wesentlichen die Pfeiffer'schen, neben denen noch *Stremmatopsis* Mabille, *Colpanostoma* Bourg., *Tayloria* Bourg. und *Micrartemon* Mlldff. als Sektionen anerkannt werden. *Streptaxis* zählt 130 Arten, *Happia* 13, *Scolodonta* 17.

Systrophia (Pfr.) *moellendorffi* n. Huancabamba, Peru; **Rolle** 1904 Nachrbl. p. 35 t. 5 f. 2.

Streptaxis (Gray) *costulatus* (Eustreptaxis) var. *subcostulata* n. Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 65; — (*Odontartemon*) *cristatellus* n. ibid., id. p. 66; — *sykesi* n. Jalor, Malakka; **Sykes** 1902 J. Mal. IX p. 72 t. 4 f. 1, 2; — *striatula* n. Ligei, ibid., id. p. 73 t. 4 f. 3, 4; — *translucidus* n. Kongostaat; **Dupuis & Putzeys** 1901 p. LI, Textfig.; — *gaudioni* n. ibid., iid. p. LII, Textfig. — *collingei* u. Kalantan; **Sykes** 1902 J. Malac. IX p. 22, 60, t. 3 f. 8—10; — *sykesi* n. Malayische Halbinsel; **Collinge** 1903 J. Mal. IX p. 72 t. 4 f. 1, 2; — *striatula* n. ibid., id. p. 73 t. 4 f. 3, 4; — *marconi* nom. nov. für *Marconia gibbosa*; **Gude** 1902 Pr. mal. Soc. VI p. 205; — *siamensis* var. *subbulbulus* n., var. *subglobosus* n., var. *expansilabris* n., Siam; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 154; — (*Odontartemon*) *mabilie* n. Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 J. C. v. 51 p. 203 t. 7 f. 13—15; — (*Eustreptaxis*) *costulatus* var. *edentula* n. ibid., iid. p. 202 t. 7 f. 7—9; var. *major* n. ibid., iid. p. 202 t. 7 f. 4—6; var. *subcostulatus* Mlldff. abgebildet ibid. t. 7 f. 1—3; — (*Odontartemon*) *cristatellus* Mlldff. abgebildet ibid. t. 7 f. 10—12; — *subbulbulus* Mlldff. zur Art erhoben und abgebildet bei **Gude** 1902 Pr. mal. Soc. V t. 4 f. 16—18. Ferner abgebildet ebenda: *Str. leonensis* Pfr. t. 4 f. 1—5; — *eburneus* Pfr. t. 4 f. 4—6; — *gibbosus* Pf. t. 4 f. 7—9; — *sinuosus* Pf. t. 4 f. 10—12; — *anceyi* Mab. t. 4 f. 13—15; — *diploodon* Mlldff. t. 4 f. 19—21. — *Str. dacostae* n. Caucathal, Neu Granada; **Gude** 1903

Pr. mal. Soc. V. p. 322 t. 12 f. 5—7; — prestoni n. Lampun, Siam; id. p. 323 t. 12 f. 17—19; — latior n. Nilgiris; id. p. 323 t. 12 f. 1—4; — pleurostomoides n. Tinevelly, Südinndien; id. p. 324 t. 12 f. 14—16; — thebawi G. Aust. zuerst abgebildet ibid. t. 12 f. 11—13; — porrectus Pf. desgl. t. 12 f. 20—22; — obtusus Stol. desgl. t. 12 f. 8—10.

Circinaria (Beck) *ponsonbyi* n. Columbia; **Pilsbry & Clapp** 1902 *Nautilus* XV p. 134, Textfig.

Enneidae.

Kobelt 1904 *Nachrbl.* p. 27 wendet sich gegen die seitherige Scheidung der Untergattungen nach der Anzahl der Mündungszähne und errichtet drei neue Untergattungen auf geographischer Grundlage (*Indoennæa*, *Sinoennea* und *Pseudelma*). Ebenso glaubt er die Ostafrikaner, Südafrikaner und Westafrikaner als besondere Gruppen absondern zu können.

Edentulina (Pfr.) *stumpffii* n. Nossi-bé, Madagaskar; **Kobelt** 1904 *Mart. Ch.* p. 294 t. 35 f. 6—7.

Diaphora (Albers) *densecostulata* n. Langson, Tongking; **Moellendorff** 1901 *Nachrbl.* p. 66; abgeb. bei **Bavay & Dautzenberg** 1903 *J. C.* v. 51 t. 8 f. 5—7; — *orrecta* Martens zuerst abgeb. bei **Kobelt** *Mart. Chemn.* t. 18 f. 4; — *homologyra* Quadr. & Mlldff. desgl. t. 17 f. 12.

Ennea (Adams) *plagiostoma* (*Microstrophia*) n. Tongking; **Moellendorff** 1901 *Nachrbl.* p. 110; — *unilirata* n. Ost Uganda; **Smith** 1903 *J. C. Leeds* X p. 315 t. 4 f. 8; — *commoda* n. ibid., id. p. 315 t. 4 f. 10; — *insolita* n. ibid., id. p. 315 t. 4 f. 10; — *prodigiosa* n. ibid., id. p. 316 t. 4 f. 11; — *columella* n. ibid., id. p. 315 t. 4 f. 12; — *premnodes* n. Südafrika; **Sturany** 1901 *Ann. Hofm.* Wien p. 60, Textfig. — *ugandae* n. Uganda; **Smith** 1901 *J. Mal.* p. 95 Textfig. — *berthae* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1901 *Ann. N. H.* VIII p. 315 t. 2 f. 1; — *columella* n. ibid., iid. p. 316 t. 2 f. 2; — *foriclus* n. ibid., iid. p. 316 t. 2 f. 3; — *hickeyana* n. ibid., iid. p. 317 t. 2 f. 4; — *zanguebarica* Morel = *obesa* Gibbons; **Ancey** 1901 *J. C.* p. 219; — *longula* Smith = *Bul. inconspicuus* Morelet; id. p. 220; — (*Microstrophia*) *malaccana* n. Malacca; **Moellendorff** 1902 *Nachrbl.* p. 136. — (*Elma*) *toukiniana* n. Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 *J. C.* v. 51 p. 204 t. 8 f. 1, 2; — (*Elma*) *messageri* n. ibid., id. p. 205 t. 8 f. 3, 4; — *oleacea* n. Deutsch Ost-Afrika; **Fulton** 1902 *J. Mal.* vol. 10 p. 99 t. 9 f. 9; — *iwakawa* subsp. *miyakojimana* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 *Pr. Phil.* p. 631. — *calopasa* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1903 *Ann. N. H.* XII p. 596 Texttf.; — *claustraria* n. ibid., iid. p. 597 t. 31 f. 6; — *craterodon* n. ibid., iid. p. 597 t. 31 f. 9; — *daedalea* n. ibid., iid. p. 598 t. 31 f. 12; — *genialis* n. ibid., iid. p. 598 t. 31 f. 14; — *himerothales* ibid., iid. p. 599 t. 31 f. 13; — *montana* n. ibid., iid. p. 599 t. 31 f. 13; — *sylvia* n. ibid., iid. p. 599 t. 31 f. 4; — *triglochis* u. ibid., iid. p. 600 t. 31 f. 11; — *virgo* n. ibid., iid. p. 600 t. 31 f. 10; — *warreni* n. ibid., iid. p. 601 t. 31 f. 7. — (*Sinoennea*) *fuchsii* Gredler zuerst abgebildet bei **Kobelt** *Mart. Chemn.* t. 20 f. 5. — (*S.*) *micropleuris* Mlldff. desgl. t. 20 f. 6; — (*S.*) *plagiostoma* Mlldff. desgl. t. 20 f. 7; — (*S.*) *densecostulata* Mlldff. desgl. t. 20 f. 8, 9; — (*Gulella*) *malaccana* Mlldff. desgl. t. 33a f. 15, 16; — *boettgeri* (Nevill mss.) n. Japan; ibid. p. 288 t. 33a f. 17, 18.

Indoennea n. subg. Enneæ mit schwächer, auf die oberen Windungen beschränkter Skulptur, ausgebreitetem Mundsaum, starker Lamelle und höchstens

zwei Zähnchen; Heimat Südindien; **Kobelt** 1904 Nachrbl. p. 28. Typus E. vara Bens.

Pseudelma n. subg. für zwei Arten von den Komoren mit ausgebuchtetem Aussenrand; Typus *Ps. incisa* Morel.; **Kobelt** 1904 Nachrbl. p. 29 (labro externo prope insertionem sinu profundo suturae parallelo, in typo tubulum parvum in pariete aperturali relinquente diviso vel sinuato, insignis; apertura edentula vel obsoletissime uniplicata).

Sinoennea n. subg. Enneae; **Kobelt** 1904 Nachrbl. p. 28 (T. parva, pupaeformis, plerumque costellata; apertura parva quadridentata; plicis columellari, parietali et palatali et denticulo basali; peristoma continuum, in anfractum penultimum peculiariter ascendens). — Typus *E. strophoides* Gredler.

Glandinidae.

Glandina (Schum.) pittieri n. Costarica; **Martens** 1901 Biol. C. A. p. 611 t. 44 f. 5; — (*Varicella*) taylori n. Jamaica; **Vendryes** 1901, Naut. XIV p. 133, Textfig.; — (*V.*) deflorescens n. ibid., id. p. 134 Textfig.; — callista n. Columbien; **Pilsbry & Clapp** 1902 *Nautilus* XV p. 133 Textfig.; — bogotensis n. Bogota; **da Costa** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 6 f. 5; — lamyi n. Mexiko; **Fischer & Chatelet** 1903 J. C. v. 51 p. 331 t. 13 f. 10; — huiningensis n. Mexiko; **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 770 t. 47 f. 2; — victoriana n. ibid., id. p. 771 t. 48 f. 1, mit subsp. *alticola* f. 2; — oblonga var. *tamaulipensis* n. ibid., id. p. 772 t. 47 f. 6; — bogotensis n. Bogota; **Dacosta**, Pr. mal. Soc. VI p. 6 t. 1 f. 5.

Salasiella (Strebel) minima n. Mexiko; **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 773, Textf. 6; — subcylindrica n. ibid., id. p. 774 Textf. 1; — elegans Mrt. abgeb. bei **Martens** 1901 Biol. centr.-amer. t. 44 f. 1.

Streptostyla (Shuttleworth) bicolor (Pittieria) n. Costarica; **Martens**, Biol. C. A. p. 617 t. 44 f. 6; — chiriquiana nom. nov. für Str. *flavescens* da Costa nec Shuttleworth, id. p. 615; — pallidus nom. nov. für dieselbe Art; **Dacosta** Pr. M. Soc. IV p. 185; — costaricensis n. Costarica; **Dacosta** 1904 Pr. M. Soc. VI p. 6 t. 1 f. 3; — sumichrasti n. Centralamerika; **Ancey** 1903 Nautil. XVII p. 56; — clavulata n. ibid., id. p. 56.

Trigonochlamydae.

Hyrcanolestes n. gen. für *Parmacella* *velitaris* Marts.; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 226 (Trigonochlamyde gracilior. Abdomen supra soleam non impressum; texturae maculae polygonales, magnae. Latitudo soleae proportionatiter haud exigua); — *valentini* n. Karabagh; id. p. 229 t. 22 f. 8, t. 26 f. 1—6.

Phrixolestes n. gen.; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 222 (Trigonochlamydi similis sed gracilior, extrema parte corporis non impressa. Texturae maculae minimae. Penis calcareo corpore excitario pyramidali institutus); — *adsharicus* n. Adsharien; id. p. 224 t. 22 f. 4; — *ponticus* n. Sephanos bei Trapezunt; id. p. 225 t. 22 f. 5.

Trigonochlamys (Böttger) boettgeri Ret. abgeb. bei **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. t. 22 f. 3, t. 23 f. 7, 8; — *minor* n. Adsharien; id. p. 221 t. 22 f. 2, t. 23 f. 1—6.

Pseudomilax (Böttger) retowskii Böttg. abgeb. bei **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 231 t. 22 f. 7; — *ananowi* n. Wladikawkas; id. p. 232 t. 22 f. 6.

Apera (Heyn.) *purcelli* n. Südafrika; **Collinge** 1901 Ann. S. Afrika II p. 230 t. 14 f. .

Philomycidae.

Philomycus (Rafinesque) *fruhstorferi* n. Tongking; **Collinge** 1901 J. Mal. VIII p. 119 mit var. *punctatus* n.; — *dendriticus* n. ibid., p. 119.

Limacidae.

Simroth 1903 Ann. Mus. Petersb. VII p. 283 glaubt *Paralimax* mit Sicherheit von *Macrochlamys* ableiten zu können, *Monochroma* allerdings mit weniger Sicherheit von *Camaena*.

Gigantomilax (Bttg.); — **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. trennt die Gattung in die Sektionen *Gigantomilax* s. str. mit breitem kurzem Penis, und *Turcomilax* mit cylindrischem Penis; — (T.) *nanus* Srth. abgeb. t. 19 f. 15—20; — (G.) *kollyi* Ret. desgl. t. 19 f. 1—9; — (G.) *robustus* n. Asterabad; id. p. 182 t. 19 f. 10—14.

Limax (L.) *daghestanus* (Heynemannia) n., Daghestan; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 72 t. 3 f. 5, 6; — (H.) *ananowi* var. *imereticus* n. Imeretien; id. p. 73 t. 3 f. 7; — (H.) *caucasicus* Srth. abgeb. ibid. t. 3 f. 13—17; — *amaliooides* Srth. desgl. t. 3 f. 18—23; — *ordubadensis* n. = *colchicus* Srth. olim, Ordubad; id. p. 77 t. 4 f. 1—7; — *simplex* Srth. abgeb. id. t. 4 f. 8; — *valentini* Srth. desgl. t. 4 f. 10—12; — *keyserlingi* Mrts. desgl. t. 4 f. 13—15; — *baeri* Srth. desgl. t. 4 f. 16—19; — (*Lehmannia*) *retowskii* Srth. desgl. t. 5 f. 17—20; — *sidamoensis* n. Sidamo; **Rochebrune & Germain** 1904 Bull. Mus. Paris X p. 143; — *subfossilis* n. Pollonera mss. Riviera; **Caziot** 1904 Feuille Jeunes Naturalistes v. 34 p. 223, Textfig.; — *duplex* n. Seealpen; id. p. 223, Textfig.

Lytopelte (Bttg.) *caucasica* (Liolytopelte) n. Alasangebiet; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 171 t. 17 f. 5—14; — *grusina* n. Tiflis; id. p. 173 t. 17 f. 15.

Simroth 1902 Nacktschn. Russland p. 174 zerlegt die kleine Gattung in zwei Sektionen, *Liolytopelte* für die ciskaspischen einfarbigen Arten mit nur am Ende gekieltem Rücken, und *Tropidolytopelte* für die transkaspischen gefleckten Arten mit bis zum Mantel gekieltem Rücken.

Mesolimax (Pollon.) *escherichi* Srth. abgeb. bei **Simroth** 1902 Nacktschn. Russland t. 13 f. 1—7; — (*Toxolimax*) *hoplites* Srth. desgl. t. 12 f. 8—15.

Metalimax (Srth.) *elegans* n. Russland; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 94.

Monochroma (Srth.) *brunneum* Srth. abgeb. bei **Simroth** 1902 Nacktschn. Russland p. 96 t. 6 f. 7—18.

Paralimax (Bttg.) (einschliesslich *Eumilax* Bttg.), monographisch behandelt von **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 104; — *brandti* var. *coriaceus* n. p. 116 t. 10 f. 3; var. *nubilus* n. p. 117 t. 9 f. 1; var. *notatus* n. p. 117 t. 9 f. 3—6, 8—9 t. 10 f. 1, 2; — var. *lilacinus* n. t. 10 f. 4; — *marmoratus* n. Imeretien; id. p. 117 t. 9 f. 7; — *niger* n. Suchumkale; id. t. 11 f. 1; — *nigerrimus* n. Kislovodsk an der Kuma; id. p. 119; — *albomaculatus* n. Kaukasus; id. p. 120 t. 12 f. 1; — *salamandroides* n. Wladikawkas; id. p. 120 t. 11 f. 2—6; — *gyratus* n. Loba, Nordwestkaukasus; id. p. 122 t. 11 f. 7; — *gracilis* n. Imeretien; id. p. 124 t. 10 f. 5, 6; — *ochraceus* n. Gagry, Pontusküste; id. p. 126 t. 12 f. 11; — *raddei* n.

Wladikawkas; id. p. 126 t. 12 f. 6—10; var. striata n. ibid., id. p. 127 t. 12 f. 5, 9; var. pictus p. 128 t. 12 f. 6; — var. elegans n. p. 128 t. 12 f. 10; var. variegatus n. p. 128 t. 12 f. 7; var. obscurus n. p. 128 t. 12 f. 8; — minutus n. Wladikawkas, p. 129 t. 12 f. 12.

Phrixolesthes n. gen. *Limacidae*; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russland p. 212; — *adsharicus* n. *Adscharien*; id. p. 224; — *ponticus* n. Kaukasus; id. p. 225.

Pseudomilax (Bttg.) *reibischii* n. Russland; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 232; — *annonowi* n. ibid., id. p. 232.

Trigonocheilamys (Bttg.) *minor* n. Russland; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 221.

Turcomilax n. subg. *Gigantomilacis*; Typus *G. nanus* Srth; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 176.

Vitrinidae.

Vitrina (Drp.) *bozasi* n. Lebaugi, Centralafrika; **Rochebrune & Germain** 1904 Bull. Mus. Paris X p. 43; — *ultima* Mouss. & kermandecensis Smith = keppeli Pfr; **Ancey** 1903 J. De Conch. v. 52 p. 288.

Girasiidae.

Apoparmarion n. gen. für *A. partridgii* n. Perak; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 73 t. 4 f. 5—12, t. 5 f. 31—33.

Paraparmarion n. gen. für *P. elongatus* n. Perak; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 75 t. 5 f. 34—36.

Cryptosemelus n. gen. für *Cr. gracilis* n. Bukit Besar, Malacca; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 76 t. 5 f. 37—39.

Microparmarion (G. Aust.) *moellendorffii* n. Andamanen; **Collinge** 1901 J. Mal. VIII p. 17 t. 1 f. 1—6; — *andamanica* n. ibid., id. p. 17 t. 4 f. 7—10; — *brunneopallescens* n. Annam; **Collinge** ibid. p. 120; — *annamica* nom. nov. für *andamanica* Coll., Annam, nicht Andamanen; id. p. 120.

Parmarion (Mrts.) *shelfordi* n. Borneo; **Collinge** 1903 J. Mal. vol. 10 p. 81 t. 1; — *malayana* n. Malacca; **Collinge** 1903 Fase. malay. II p. 206, fig.

Naninidae.

Ariophanta (Desm.) *canarica* n. South Canara; **Blanford** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 248 t. 25 f. 1; — *hetaeraea* n. ibid., id. p. 248 t. 25 f. 2.

Bensonia (Pfr.), — **Blanford** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 178 giebt eine Revision der Gattung; — *mimela* n. Simla; id. p. 179 Textfig.; — *mainwaringi* Nevill zuerst abgeb. id. Textfig.; — (*Oxytes*) *laotica* n. Laosgebiet; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 178; — *nepalensis* n. Nevill mss., Nepal; **Blanford** Pr. Z. S. II p. 441 t. 25 f. 1. — *Trichobensonia* n. subg. vide unten; — *laotica* n. Gebiet der Laos; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 178.

Coneuplecta (Mldff.) *confinis* n. Thanmoi, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 68; — *subangulata* n. ibid., id. p. 69; — *ochthogryra* n. Insel Bahmün; id. p. 111; — *globulosa* n. Kebao; id. p. 112; — *sculptilis* n. ibid., id. p. 112; — *moellendorffii* nouv. nov. für *C. globulosa* Mldff. 1901 nec. 1900; **Gude** 1904 J. Mal. v. 11 p. 95. — *taeniolata* n. Obi Inseln; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 186; — *buruana* n. Buru; ibid. p. 197.

Cryptosemele n. gen. für *Cr. gracilis* n., Malacca ; **Collinge** 1902 J. Mal. XI p. 76 t. 5 f. 37—39.

Cryptosoma (G. Aust.) *fragile* n. Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 67; — *imperator* var. *brunneus* n. Insel Bahnum; id 1901 Nachrbl. p. 111.

Ctenoglypta n. gen., Typus *Helix newtoni* Nevill; **Ancey** 1904 J. Conch. v. 52 p. 306.

Dendrotrochus (Pilsbry) *stramineus* n. Neue Hebriden; **Sykes** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 197 Textfig.

Durgella (Blfd.) *siamensis* n. Siam; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 155.

Dyakia (G. Aust.) *smithiana* n. Sumatra; **Gude** 1903 J. Mal. v. 10 p. 47 Textfig.

Euplecta (Semper) *transfretata* n. Vorderindien; **Blanford** 1901 P. Mal. Soc. IV p. 249 t. 25 f. 9; — *agastya* n. ibid., id. p. 250 t. 25 f. 10; — *binoyaensis* n. ibid., id. p. 250 t. 25 f. 7; — *laevis* n. ibid., id. p. 251 t. 25 f. 8; — *fluctuosa* n. ibid., id. p. 251, Textfig.; — *granulifera* n. ibid., id. p. 252, Textfig.; — *oribates* n. ibid., id. p. 253, Textfig.; — *oxyacme* n. Madagaskar; **Ancey** 1902 *Nautilus* XVI p. 64; — *pulchella* n. Anamulys Südindien; **Blanford** 1904 Pr. Z. S. II p. 447 t. 25 f. 18; — *pratti* n. Britisch Neu Guinea; **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. VI p. 114, Textfig.; — (*Coneuplecta*) *moellendorffi* nom. nov. für *Eu. globulos* Mlldff. 1901 nec 1900; **Gude** 1904 J. Malac. v. 11 p. 95.

Helicaron (Fer.) *tongkingensis* n. Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 66; — ? *dautzenbergianus* n. Madagaskar; **Ancey** 1902 *Nautilus* XVI p. 64; — *rollei* n. Buru; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 196; — *willeyana* n. Neu Britannien; **Godwin-Austen** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 216 t. 9 fig. 1; — *woodwardi* n. Loyalitäts Archipel, Neu Caledonien; id. p. 298 t. 9 f. 2.

Indrella n. subg. *Ariophantae*, Typus Ar. *ampulla* Bens.; **Godwin-Austen** 1901 Pr. mal. Soc. Vol. 4 p. 190.

Hemiglypta (Mlldff.) *moussonii* var. *oxytropis* zuerst abgebildet bei **Moellendorff** 1902 Philipp. t. 12 f. 4, 5, t. 19 f. 14; var. *nana* t. 16 f. 10, t. 18 f. 6; var. *arayatensis* t. 16 f. 9, t. 18 f. 2; var. *transitans* t. 12 f. 6, 7; — *semperi* var. *eurytaenia* t. 14 f. 2, t. 15 f. 2, t. 17 f. 2; — var. *tumidula* t. 14 f. 3, t. 15 f. 3, t. 17 f. 2; — *connectens* Mlldff. t. 14 f. 4, t. 15 f. 4, t. 17 f. 4; var. *grandis* t. 14 f. 5, t. 15 f. 5, t. 17 f. 5; — *franciscanorum* Quadr. & Mlldff. t. 14 f. 6, t. 15 f. 6, t. 17 f. 6; — *globosa* var. *depressa* t. 14 f. 12, t. 15 f. 8; — *infrastriata* Mlldff. t. 14 f. 13, t. 16 f. 1, t. 19 f. 1.

Hemiplecta (Albers) *subsulcata* n. Kalidupa; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 204; — *oleata* n. Madagaskar; **Ancey** 1902 *Nautilus* v. 16 p. 65; — *profuga* n. ibid. p. 65; — *densa* var. *annectens* n. Ost-Borneo; **Martens** 1903 S.-B. Ges. Berlin p. 422; — *salangana* var. *martensi* n., **Collinge** 1903 Fasc. mal. p. 209; — *densa* var. *annectens* n., Borneo; **Martens** 1903 S.-B. Ges. Berl. p. 422.

Kaliella (Blfd.) *regularis* n., Langson, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 69; — *dolichoconus* n., Mansongebirge, ibid., id. p. 69; — *tongkingensis* n. ibid., id. p. 70; — *gradata* n. ibid., id. p. 70; — *subcrenulata* n., Shikoku, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 404; — *lioderma* n., Harima, ibid., id. p. 404; — *hariensis* n. ibid., id. p. 404; — *borealis* n., Hokkaido; id. p. 346; — *praealta* n., Omi, id. p. 547; — *kyotoensis* n., Kyoto; id. p. 548; — *modesta* n., Oshima, prov. Higo; id. p. 548; — *nahaënsis* n., Okinawa; id. p. 548; — *symmetrica* = *Pagoduloides*; **Pilsbry** 1901 Ann. N. H. VII p. 7; — *nuda* n., Japan; **Pilsbry**

1901 Naut. XV p. 21; — austeniana, n., Linkiu; id. p. 20; — yaeyamensis n. ibid., id. p. 21; — kagaënsis n., Japan; — Pilsbry & Hirase 1902 Naut. XVI p. 79; — gudei n. ibid., iid. p. 79; — ogasawarana n. ibid., Pilsbry 1902 Pr. Phil. p. 31; — hachijoensis n. ibid., Pilsbry 1902 Naut. XVI p. 55; — pallida n. ibid., id. p. 55; — okiana n. ibid., id. Naut. XVII p. 6; — hizenensis n. ibid., id. p. 7; — ordinaria n., Ancey mss., Tongking; Bavay & Dautzenberg 1903 J. C. p. 210 t. 8 f. 18—19; — nesiotica n., Japan; Pilsbry & Hirase 1903 Naut. XVII p. 54; — soroicula n. ibid., iid. p. 107; — humiliconus n., Japan; Pilsbry & Hirase 1904 Pr. Phil. p. 633; — okinoshimana n. ibid., iid. p. 632; — bimaris n. ibid., iid. p. 632; — gudei var. persubtilis n. ibid., iid. p. 634; — xenica n., Japan; Pilsbry & Hirase 1903 Naut. XVII p. 32; — incensa n. ibid., iid. p. 46; — harimensis var. sadoënsis n. ibid., iid. p. 46; — peralta var. izuschichitoensis n. ibid., iid. p. 54; — thaanumi n., Hawaii; Ancey 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 110 t. 7 f. 6; — lubricella n. ibid., id. p. 110 t. 7 f. 7; — tongkingensis Mldff. abgeb. bei Bavay & Dautzenberg 1903 J. Conch. v. 51 t. 8 f. 14—17, mit var. albina n., p. 209.

Macrochlamys (Benson) *stenogyra* n., Mansongebirge, Tongking; Moellendorff 1901 Nachrbl. p. 67; — *declivis* n., Thanmoi; ibid., id. p. 67; — *glyptorhaphe* n., ibid., id. p. 68; — *euspira* n., Insel Bahmum; id. p. 111; — *tanegashimae* n., Tanegashima, Liu kiu; Pilsbry 1901 Pr. Philad. p. 498; — *perfragilis* n., Okinawa, id. p. 345; — *gudei* n. ibid., id. p. 345; — *duleis* n., Prov. Kii, id. p. 562; — *coeligena* n., Tien-Shan; Gude 1902 J. Mal. IX p. 97 Textfig. 1—3; — *cerasina* n., Japan; Pilsbry 1902 Naut. XV p. 117; — *semisericata* n. ibid., id. Naut. XVI p. 54; — *kagaënsis* n., Japan; Pilsbry & Hirase 1902 Naut. XVI p. 78; — *papuensis* n., Britisch Neu-Guinea; Preston 1902 Pr. mal. Soc. V p. 17, Textfig.; — *granosculpta* n., Madagascar; Ancey 1902 Naut. XVI p. 65; — *humbloti* n. ibid., id. p. 66; — *obiana* n., Rolle mss., Obi-Inseln; Moellendorff 1902 Nachrbl. p. 186; — *buruana* n., Buru, id. p. 196; — *heptagyra* n., Siam, id. p. 155; — *ochthogryra* n. ibid., id. p. 155; — *brunnea* n. ibid., id. p. 155; — *clessini* nom. nov. für M. schmidti Clessin nec Brancsik; Westerlund 1902 Nachrbl. p. 19; — *haetwickei* var. *kelantanensis* n., Kelautan; Moellendorff 1902 Nachrbl. p. 137; — *subconvallata* n., Andamanen; Fulton 1903 J. Mal. X p. 99, Textfig.; — *kuluensis* n., Kulu, Himalaya; Blanford 1904 Pr. Z. S. II p. 442 t. 25 f. 5; — *superflua* n., Sikkim; id. p. 442 t. 25 f. 7; — *atoma* n., Fairbank mss., Godavary-Thal, Indien; id. p. 443 t. 25 f. 6; — *prava* n., Südindien; id. p. 443 t. 25 f. 9; — *rutila* n., Anamullys; id. p. 443 t. 25 f. 11; — *chaos* n., Burma; id. p. 444 t. 25 f. 8; — *natha* n. ibid., id. p. 444 t. 25 f. 19; — *noxia* n. ibid., id. p. 445 t. 25 f. 14; — *curvilabris* n. ibid., id. p. 445 t. 25 f. 13; — *spreta* n. ibid., id. p. 445 t. 25 f. 12; — *patens* n. ibid., id. p. 445 t. 25 f. 15; — *pseudochoinix* n., Great Cocos Isl., id. p. 446 t. 25 f. 16; — *dulcis* var. *koschikiyimana* n., Japan; Pilsbry & Hirase 1904 Pr. Phil. p. 635; — *subelimatus* n. ibid., iid. p. 635; — *gudei* var. *inclytus* n. ibid., id. p. 636; — *izuschichitojimana* n. ibid., iid. 1903 Naut. XVII p. 106; — *decens* n. ibid., iid. p. 106; — *diadema* Dall zuerst abgeb. bei Dall 1902 Pr. U. St. Nat. Mus XXIV t 27 f 1—3.

Martlesia (Semper) *percivali* n., Kilima-Ndcharo; Smith 1903 J. C. Leeds X p. 317 t. 4 f. 16; — *permanens* n., Uganda; id. 1901 J. Mal. VIII p. 94 Textfig. 2, 3.

Microcystina (Moerch) *tongkingensis* n., Mansongebirge. Tongking; **Moellendorff** 1901 *Nachrbl.* p. 70; — *leucocystis* n. *ibid.*, id. p. 71, mit subsp. *angigyrta* n., — *mansonensis* n. *ibid.*, id. p. 71; — ?*opaca* n., Insel Kebao, *ibid.*, id. p. 113; — *hiraseana* n., Tanegashima, Liu-kuu; **Pilsbry** 1901 *Pr. Phil.* p. 498; — *lutescens* n.; Philippinen; **Moellendorff** 1901 in *Semper* v. 8 p. 140 fig.; — *bucoplax* n. *ibid.*, id. p. 145 fig.; — *marginata* n., Buru; **Moellendorff** 1902 *Nachrbl.* p. 197; — *irregularis* n. *ibid.*, id. p. 197; — *circumdata* n., Japan; **Pilsbry** 1902 *Naut.* XV p. 55; — *bahajimana* n. *ibid.*, id. p. 118; — *yakuensis* n. *ibid.*, id. *Naut.* XVI p. 6; — *nuda* n. *ibid.*, **Pilsbry & Hirase** 1902 *Naut.* XVI p. 79; — *messageri* n., Ancey mss., Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 *J. C.* p. 207 t. 8 f. 8—10; — *higashiyamana* n., Japan; **Pilsbry** 1903 *Naut.* XVI p. 129; — *stuarti* n., G. Aust. mss., Andamanen; **Blanford** 1904 *Pr. Z. S.* II p. 446 t. 25 f. 16; — *shevaroyana* n., Shevaroy Hills, Süddindien; — id. p. 446 t. 25 f. 17; — *velata* Gude (*Crystallus*) zuerst abgeb. bei **Gude** 1901 *Pr. mal. Soc.* IV t. 29 f. 7—9; — *ceratodes* Gude desgl. t. 19 f. 1—3; — *labilis* Gude desgl. t. 19 f. 4—6; — *vaga* n., Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 *Pr. Phil.* p. 634; — *lampra* n. *ibid.*, id. p. 634; — *rufobruunnea* (*Mycrocystis*) n., Hawaii; **Ancey** 1904 *Pr. mal. Soc.* VI p. 119.

Otesia (Ad.) *bijuga* var. *convexospira* n., Kelantan; **Moellendorff** 1902 *Nachrbl.* p. 157.

Philonesia (Sykes) ist von *Microcystis* nicht zu trennen; **Ancey** 1901 *J. C.* p. 136.

Pliotropis n. subg. *Otesiae*, Typus *O. biangulata* Pfr.; **Moellendorff** Ms. apud **Kobelt**, 1904 *Mart. Chemn.* p. 1093.

Ravana u. subg. *Ariophantae* für *Hel. politissima* Pfr.; **Godwin-Austen** 1901 *Pr. mal. Soc.* IV p. 261 pl. XXVI.

Sesara (Albers) *mouleyitensis* n., Birma; **Gude** 1901 *J. Mal.* VIII p. 15 *Textfig.* 4—6; — *megalodon* n., Siam; **Blanford** 1902 *Pr. mal. Soc.* V p. 35

Sitala (H. Ad.) *striolata* n. Langson, Tonking; **Moellendorff** 1901 *Nachrbl.* p. 68; — *latissima* n. Japan; **Pilsbry** 1902 *Naut.* XVI p. 56; — *carinifera* n. Kelantan; **Moellendorff** 1902 *Nachrbl.* p. 138; — *subscalaris* n. *ibid.*, id. p. 138; — *sublineolata* n. *ibid.*, id. p. 139; — *acuteacarinata* n. Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1902 *J. C.* p. 208 t. 8 f. 11—13; — *nijimana* n., Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 *Naut.* XVII p. 55; — *insignis* n. Tosa, Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 *Pr. Phil.* p. 632; — *latissima* var. *conica* n. Osumi, *ibid.*, iid. p. 632.

Taphrospira n. gen., von *Macrochlamys* durch eine Rinne neben der Naht unterschieden; Typus *T. convallata* Bens.; **Blanford** 1904 *Pr. Z. S.* II p. 441; — *excavata* n. Nord Cachar (= *compluvialis* Hanley & Theobald, nec Blfd.); *id.* p. 442 t. 25 f. 3.

Trichobensonia n. subg. *Bensoniae*, Typus *B. luzonica* Mlldff.; **Moellendorff** 1902 in *Semper Landmoll.* VIII p. 223.

Trachycystis (Pilsbry) *centrifuga* n. Kapland; **Melvill & Ponsonby** 1903 *Ann. N. H.* p. 602 t. 32 f. 9; — *glebaria* n. Natal; *ibid.* p. 602 t. 32 f. 15; — *laticostata* n. Kapland; *ibid.* p. 602 t. 32 f. 5; — *oreina* n. Grahamstown, *ibid.* p. 602 t. 32 f. 8; — *patera* n., Bedford, Kapland; *ibid.* p. 603 t. 32 f. 6; — *permeata* n. *ibid.*, *ibid.* p. 603 t. 32 f. 2, Pinetown, Natal; — *scolopendra* n. Natal; *ibid.* p. 603 t. 32 f. 3; — *simplex* n. Pondoland; *ibid.* p. 603 t. 32 f. 17.

Trochozonites (Pfeffer) *trifilaris* (Moaria) n. Kongostaat; **Dupnis & Putzeys** 1901 p. LI Textfig.; — *percostulatus* n. *ibid.*, *iid.* p. LIII Textfig.

Trochonanina (Mouss.) *bonhouri* n. Albany-See; **Rochebrune & Germain** 1904 Bull. Mus. Paris v. 10 p. 143; — *zeltneri* v. *Ualamo*; *iid.* p. 143.

Vitrinoconus (Semper) *moellendorffii* n. Panay Philippinen; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 194.

Wiegmannia n. gen., **Collinge** 1901 Tr. Edinb. vol. 40 p. 299; Typus *W. gigas*; *id.* 1902 Amer. Nat. XXXVI p. 592.

Xesta (Albers) *piperata* n. Madagaskar; **Fulton** 1902 J. Mal. VIII p. 103 t. 9 f. 7; — *obiana* n. Obi; **Moellendorff** 1902 p. 186; — *kaledupana* n. Rolle mss., Kaledupa; *id.* p. 204; — *perfragilis* n. *ibid.*, *id.* p. 204; — *tomiana* n. Rolle mss., Insel Tomia; *id.* p. 205; — *sulcatala* n. Obi; **Sykes** 1903 J. Mal. X p. 64, 78 t. 6 f. 5; — *dwipana* n. Java; **Gude** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 264 t. 7 f. 15—17.

Xestina (Pfeffer) *denserugata* n. Annam; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 45; — *tenera* n. *ibid.*, *id.* p. 46; — *pharangensis* n. *ibid.*, *id.* p. 46; — *gassi* n. Südindien; **Blanford** 1901 Pr. mal. Bl. IV p. 249 t. 25 f. 3; — *granulosa* n. Siam; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 156; — *cardiostoma* n. ? Kambodscha; *id.* p. 178; — *tongkingensis* n. Tongking; *id.* p. 179; — *rugosissima* n. Insel Roma; **Moellendorff** 1903 Nachrbl. p. 156.

Zonitidae.

Fametesta n. subg. Hiraseae, Typus *Hel. operculina* Gld; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 29.

Gastrodontella n. gen. Zonitidarum; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 38 (t. *minuta*, *trochiformis*, *corneo-hyalina*, *multispira*; *anfractus intus lamellis transversis muniti*). — *japonica* n. Japan; *id.* p. 38. — **Pilsbry** 1901 Ann. N. H. VIII p. 8 erklärt die Art für Synonym mit *Kaliella multivolvis* Psbry.; Zahnbildungen kommen auch bei anderen *Kaliella* vor.

Gastrodonta (Albers) *gularis* subsp. n., Nordcarolina; **Walker & Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 434.

Guppya (Moerch) *goyazensis* n. Goyaz, Brasilien; **Ancey** 1901 Natural p. 82; — *sericea* n. *ibid.*, *id.* p. 83; — *miamiensis* n. Florida; **Pilsbry** 1903 Nautilus XVII p. 77; — *hopkinsi* Dall = *Microcystis pacifica* Pf.; **Ancey** 1903 J. Conch. v. 51 p. 99; — *angasi* abgeb. bei **Martens** 1901 Biol. Centr.-amer. t. 44 f. 2; — *miceps* desgl. t. 44 f. 4.

Hirasea n. gen. Zonitidarum, **Pilsbry** in: 1902 Nautilus XV p. 118 u. Pr. Philad. 1902 p. 29; Typus *H. sinuosa* n. Japan; *id.* p. 118; — *nesiotica* n. *ibid.*, *id.* p. 118; — (*Fametesta* n.) *mirabilis* n. *ibid.*, *id.* Pr. Phil. p. 31; — *acuta* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Nautilus XVI p. 5; — *major* n. *ibid.*, *id.* p. 47; — *diplomphala* var. *latispira* n. *ibid.*, *id.* p. 47; — *profundispira* n. *ibid.*, *id.* p. 47; — *insignis* n. Ogasawara, Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 636.

Hirasiella n. gen. Zonitidarum, **Pilsbry** 1902 Nautilus XV p. 142; Typus *H. clava* n. Japan.

Hyalinia (Agass.) *adjacens* n. Ajaccio; **Caziot** 1904 (5) p. 34 Textfig. E. *Omphalina* () *martensiana* n. Mexiko; **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 766 t. 48 f. 7 (mit Textfig. der Radula); — *montereyensis* abgeb. *ibid.* t. 48 f. 9; —

rugeli var. *oxycoecus* n. Nord Karoliua; **Vanatta** Nautil. XVI p. 106; — *pilsbryi* n. Alabama; **Clapp** 1904 Nautilus XVIII p. 30.

Pristiloma (Pilsbry) *idahoënsie* n. Idaho; **Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 593; — *japonica* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVII p. 78.

Retinella (Shuttle.) *libanica* Naeg. & Westerl. zuerst abgebild. bei **Kobelt**, Iconogr. IX no. 1582.

Vitrea (Fitz.) *cyrrina* n. Atrankan, Cypern; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 22; — *lepta* n. Sevilla; id. p. 22; — *placenta* n. Capri; id. p. 23; — *hariemensis* Pilsbry. = *Macrochlamys doenitzi* juv.; **Pilsbry** 1901 Ann. N. H. VIII p. 5; — *vanattai* n. Nordkarolina; **Walker & Pilsbry** 1902 Pr. Phil. p. 432 t. 23 f. 4—6; — *approximata* n. ibid., id. p. 431 t. 23 f. 8, 9; — *raderi* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Mus. t. 27 f. 4—6; — *rogersi* n. England; **Woodward** 1903 J. Conch. Leeds X p. 310, Textf.; — *alliaria* Mill. & *helvetica* Blum abgeb. ibid. Textf.; — *capsella* var. *lacteodens* n., West Arkansas; **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 211 t. 11 f. 5; — *hawaiensis* n. Hawaii; **Ancey** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 120 t. 7 f. 8.

Zonites (Montfort) *albanicus* var. *narentanus* Bttg. zuerst abgeb. bei **Kobelt** Icon. no. 1566; — *gemonensis* var. *ruralis* Westerl. desgl. n. 1568; — *acies* var. *kleciachi* desgl. no. 1578; — *cytherae* **Martens** 1891 S.-B. Ges. nat. Berl. p. 148, abg. Ic. no. 1620 & M. Ch. t. 236 a. f. 9—11; — *anthesi* n. Pergamos; **Kobelt** 1903 Nachrbl. p. 88; Ic. 1916, 1921; — *insignis* n. Cilicien; **Naegele** 1903 Nachrbl. p. 169; — *naxius* n. Naxos; **Martens** 1903 Arch. f. Nat. v. 69 p. 372, Textfig.

Zonitoides (Lehmann) *subarboreus* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Naut. XVI p. 54; — *pugetensis* Dall abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. N. Mus. XXIV p. 500 t. 27 f. 10—12; — *cupido* n. Südafrika; **Melvill & Ponsouby** 1903 Ann. N. H. XII p. 601 t. 32 f. 1; — *apertus* n. Osumi, Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 636; — *chichimanus* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 Naut. v. 18 p. 5.

Patulidae.

Patula (Held) *sanctimonialis* n. China; **Gredler** 1901 Nachrbl. p. 150; — (*Gonyodiscus*) *ugandana* n. Ost-Uganda; **Smith** 1903 J. C. Leeds X p. 317 t. 4 f. 13; — (*G.*) *imitata* n. ibid., id. p. 317 t. 4 f. 14; — (*G.*) *lamellifera* n. ibid., id. p. 317 t. 4 f. 15; — (*Pyramidula*) *conica* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1902 Naut. XVI p. 77. — (*P.*) *pauper* var. *hachyoënsis* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Naut. XVI p. 56; — (*P.*) *victoriana* n. Mexiko; **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 769 t. 49 f. 1.

Punctum (Morse) *atomus* n. Izen, Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 636; — *rota* n. ibid., iid. p. 637; — *morseanum* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1902 Naut. XVI p. 5; — *infans* n. iid. Naut. XVII p. 107; — *randolphii* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 27 f. 7—9; — *horneri* n. Oahu; **Ancey** 1904 J. Mal. v. 11 p. 66, Textfig.; — *elachistum* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 Naut. v. 18 p. 5; — *apertum* n. ibid., iid. p. 5.

Endodontidae.

Endodontia (Albers) *melbournensis* Cox besser abgebildet bei **Hedley** 1902 Studies VII t. 31 f. 16, 17; — *subdepressa* Brazier zuerst abgebildet, id. t. 31 f. 13—15; — *otwayensis* Petterd desgl. t. 31 f. 10—12; — *tamarensis* Petterd desgl. t. 31 f. 18—20; — *ochra* n. Neuseeland; **Webster** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 107 Textfig. 2; — *chrysauchen* n. ibid., id. p. 107 Textfig. 3; — *alloia* n. ibid., id. p. 108 Textfig. 4; — (*Charopa*) *transenna* n. Neu Seeland; **Suter** 1904 Pr. mal. Soc. vol. 6 p. 156 Textfig.

Laoma (Gray) *francesci* u. Neuseeland; **Webster** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 106 Textfig. 1; — *elaiodes* n. ibid., id. p. 106 Textfig. 5.

Ranfurlya n. gen. Endodontidarum für R. *constanceae* n. Auckland; **Suter** 1903 J. Mal. X p. 62, Textfig.

Hutton 1904 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales führt als neue Namen ein: *Delos* für *Rhenea* Hutton nec *Saalmüller* p. 461; — *Thermia* für *Pyrrha* Hutton nec *Cabanis* p. 461; — *Serpho* für *Carthaea* Hutton nec *Walker* p. 461.

Trochomorphidae.

Trochomorpha (Albers) *montana* (Sivela) n. Mansongebirge, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 71; — *gouldiana* n. Oshuna, Liukiu; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 345; — *subternatana* n. Insel Obi; **Dantzenberg** 1902 Natural. p. 247, Textfig.; — (*Sivella*) *discus* n. Buru; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 198; — (*S.*) *grubaueri* n. Kelantan, Perak; id. p. 138; — (*S.*) *kelantanensis* n. ibid., id. p. 139; — *insolata* n. (*Nigritella*), Marshall Ins.; **Boettger** 1904 Zool. Jahrb. Syst. vol. 20 p. 410; — *cultrata* n. Japan; **Pilsbry** & **Hirase** 1904 p. 632; — *gulielmi* n. Engano Insel; **Sykes** 1904 J. Mal. v. 11 p. 87 t. 9 f. 11, 12; — *dantzenbergi* n. ibid., id. p. 87 t. 9 f. 13, 14.

Arionidae.

Arion (L.) *subfuscus* var. *fennicus* n. Finland; **Simroth** 1902 Nacktschn. Russl. p. 50; — *sibiricus* n. Sibirien; id. p. 53 t. 2 f. 1—6.

Ariunculus (Pollonera) *pallaryi* n. Algerien; **Collinge** 1904 J. Malac. v. 11 p. 47.

Zacoleus n. gen. für *Z.* *idahoensis* n., Idaho; **Pilsbry** 1903 Pr. Philad. p. 626.

Helicidae.

Amphilita (Beck) *subnigra* n. Madagaskar; **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX p. 13.

Ambigua n. subg. für *Camp.* *tetrazona* Jan; **Westerlund** 1903 Rad jugosl. Ak. p. 96.

Alabastrina n. subg. Iberi; Typus I. *alabastrites* Mich.; **Kobelt** Icon. v. 11, p. 132, 194.

Amphidromus (Albers) gehört mit *Beddomea* zu den Heliciden in die nächste Nähe von *Camaena* und *Chloritis*; **Pilsbry** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 138.

Amphidromus (Albers) *rhodostylus* n. Annam; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 47; — *metabletus* var. *pachychilus* n. ibid. p. 49; var. *insularis* n. ibid., id. p. 49; — *perakensis* n. Perak; **Fulton** 1902 J. Mal. XI p. 104 t. 9 f. 8—10; —

waterstraati n. Palawan; **Rolle** 1903 Nachrbl. v. 35 p. 156; — *laevis* var. *romaënsis* n. Roma bei Timor; id. p. 157; var. *kissiensis* n. Kissu; id. p. 157; — *inconstans* var. *gracilis* n. Roma; id. p. 157; — *kobelti* n. Siam; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. v. 34 p. 157; — *kuebni* n. Rolle mss., Kaledupa; id. p. 205; — *glaucolarynx* subsp. *albicans* n. Siam; id. p. 157; — *martensi* var. *capistratus* n. Ost-Borneo; **Martens** 1903 S.-B. Ges. Berlin p. 424, Textfig.; — *adamsi* var. *obliquatus* n. ibid., id. p. 424, Textfig.; — *gossi* n. Kina, Balu, Borneo; **Bartsch** 1904 Smiths. Miscell Coll. no. 1485 p. 292 pl. 46 f. 1—9; — *palaceus* var. *subcarinata* n. Java; **Bullen** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 109 t. 6 f. 6; — *weyersi* n. Borneo; **Dautzenberg** 1904 Ann. Soc. mal. Belgique v. 38 p. 4, Textfig.

Armandiella nom. nov. für *Armandia* Ancey (präoccupirt bei den Lepidopteren); **Ancey** 1901 J. C. p. 144.

Ashmunella (Pilsbry & Cockerell). — Eine Aufzählung der Arten und Varietäten gibt **Ancey** 1901 J. Mal. VIII p. 73 (mit anatomischen Notizen von **Murdoch**). — Notizen über die Gattung geben **Cockerell & Cooper** 1902 Nantil. XV p. 109; — *ashmuni* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXIV t. 38 f. 4, 6; — *rhyssa* Dall desgl. t. 27 f. 11, 14; — *pseudodonta* Dall desgl. t. 27 f. 135, t. 28 f. 4; — *walkeri* n. Neu Mexiko; **Ferriss** 1904 v. 18 p. 53; — *townsendi* n. ibid.; **Bartsch** 1904 Smiths. Coll. v. 47 p. 13.

Beddomea (Nevill). — **Pilsbry** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 158 pl. 16 gibt die Anatomie der Gattung; sie gehört mit *Amphidromus* zu den Helicidae epi-phallogona neben *Camaena* und *Chloritis*.

Campylaea (Beck) *kirakoeica* Kim. zuerst abgeb. bei **Kobelt** Icon. IX no. 1618, 1619; — *crombezi* Loc. desgl. no. 1621; — *apfelbecki* n. Herzegowina; **Sturany** 1901 Ann. Wien Hofm. p. 65 (Icon. no. 1752); — *pantheri* n. ibid., id. p. 66 Ic. 1753; — *insolita* var. *lagostana* n. Lagosta, Dalmatien; id. p. 68 Textfig. 1; — (*Dinarica*) *montenegrina* var. *wohlberedti* n. Montenegro; **Kobelt** Icon. IX no. 1698—1700; — var. *albanica* n. Grec, Albanien; id. p. 69 no. 1717; — *wiedermayeri* n. Kartitschthal bei Lienz; id. X p. 4 no. 1751; — *cingulina* var. *hians* n. Seealpen bei Mentone; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 23; — *argentellei* var. *conviva* n. Berg Chelmos, Arkadien; id. p. 23; — *conemenosi* var. *acaranica* f. *elaphia* n. Akarnanien; id. p. 24.

Botteria n. subg. *Campylaeae* für *C. setosa* Zgl.; — *Cattania* n. subg. für *C. trizona*; — *Drobacia* n. subg. für *C. banatica*; — *Kosicia* n. subg. für *C. intermedia*; — *Sabljaria* n. subg. für *C. stenomphala* Mke.; — *Vidovicia* n. subg. für *C. lacticina* Zgl.; **Brusina** 1904 Nachrbl. p. 162.

Cristigibba (Tapp. Can.) *wahnesi* u. Neu Mecklenburg; **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX p. 315; — *albopicta* n. Halmahera; **Sykes** 1903 J. Mal. X p. 64 t. 6 — *gebiensis* n. Gebi Insel; **Sykes** 1904 J. Mal. XI p. 88 t. 9 f. 7, 8; — *fruhstorferi* n. Obi; id. p. 89 t. 9 f. 9, 11.

Draparnaudia (Montr.) *crossei* n. Neu Caledonien; **Pilsbry** 1901 Manual vol. 14 p. 17 t. 3 f. 10, 11; — *lifuana* n. Lifu; id. p. 17 t. 3 f. 7—9, 12—15; — *walkeri* n. Neue Hebriden; **Sykes** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 197 Textfig.; — *gassiesi* nom. nov. für *Bulimus turgidulus* Gassies nec Desh.; **Pilsbry** 1902 Manual, Index p. LXXI.

Epiphramphophora (Doering) *stella* var. *centralis* n. Südamerika; **Ancey** 1901 Naturaliste p. 83; — *dormeri* n. Paragnay; **Gude** 1901 Pr. Mal. VIII p. 15

Textfig. 1—3. — *orophila* n. Bolivia; **Ancey** 1903 Naut. XVII p. 80; — *exarata* var. *rubicunda* n. Kalifornien; **Rowell** 1902 Naut. XVI p. 52.

Fruticicola (Held) *dacia* n. Ungarn; **Lajos** 1904 Ann. Mus. Hung. II p. 294.

Glyptostoma (Carpent.) *newberryanum* var. *depressum* n. Vereinigte Staaten; **Bryant** 1902 Naut. XVI p. 70.

Helicophanta (Beck) *alayeriana* n. Madagaskar; **Ancey** 1902 Nautilus XVI p. 66.

Helix (s. str.) *fathallae* (Pomatia) n. Akbes, Syrien; **Naegele** 1901 Nachrbl. p. 20 (cfr. **Kobelt**, Icon. no. 1640); — (*Levantina*) *praecellens* n. Nordsyrien; id. p. 21 (cfr. **Kobelt**, Icon. no. 1636); — (*Macularia*) *grossularia* Mrts., zuerst abgeb. Icon. no. 1671; — (*Pom.*) *oestreichi* Icon. no. 1674; — (*Levantina*) *naegelei* Kob. Icon. no. 1675, 1676; — (*Pom.*) *salomonica* Naeg. no. 1614; — (*Eremia*) *zitteli* Btg. abgeb. bei **Kobelt** Ic. IX no. 1624 u. M. Ch. t. 145 f. 1—3; — (*Levantina*) *mardinensis* Kob. desgl. Ic. 1629, 1630; — (*Pomatia*) *ligata amandolae* n. Abruzzen; id. X p. 6 no. 1754; — (*Tachea*) *triangula* Naegele abgeb. no. 1757; — (*Iberus*) *gauri* n. Mte. Santangelo; id. p. 9 no. 1758; — (*Codringtonia*) *acarnanica* n. Akarnanien; id. p. 10 no. 1759; M. Ch. t. 310 f. 1, 2; — (*C.*) *arcadica* n. Arkadien; id. p. 10 no. 1760; M. Ch. t. 309 f. 7, 8, t. 311 f. 1, 2; — (*C.*) *cylleonica* n. Rolle mss., Cyllene; id. p. 11 no. 1761; M. Ch. t. 310 f. 5, 6; — (*Iberus*) *potentiae* n. Basilicata; id. p. 13 no. 1764; — (*I.*) *basilicatae* n. ibid., id. p. 14 no. 1765; — (*I.*) *wullei* n. Mte. Postiglione; id. p. 14 no. 1766—1768; — (*Pomatia*) *dorylaeensis* n. Naegele mss., Eske Schehir; id. p. 15 no. 1769; — (*Macularia*) *riffensis* Pallary abgeb. no. 1822, 23; — (*M.*) *jourdaniana* var. *subseguyana* n., var. *lellae* n. u. var. *tafnensis* n. Westalgerien; Ic. p. 42 no. 1829—1833; — (*Iberus*) *surrentinus* vallicola n. Selethal, Prov. Salerno; id. p. 43 no. 1837—1840; — var. *picentinus* n. Campagna; id. p. 44 no. 1841; — var. *corvinus* n. Mte. Corvino; id. p. 45 no. 1842; — var. *irpinus* n. Giffone; id. p. 45 no. 1843; — var. *planicola* n. Piano di Sorrento; id. p. 46 no. 1844, 1845; — var. *altilcola* n. Höhe über Sorrent; id. p. 46 no. 1846—48 (diese Formen auch in Ann. mus. zool. Napoli N. Ser. 1903 vol. 1 no. 5, mit Holzschnitten); — var. *meridionalis* n. Scilla, Calabrien; id. p. 47 no. 1849, 1850; — (*Tachea*) *beckeri* n. Albufera di Valencia, subfossil; id. p. 60 no. 1890; — (*T.*) *sylvatica* var. *pedemontana* n. ligurische Alpen; id. p. 61 no. 1891—1893; — (*Iberus*) *circeja* n. Mte. Circejo; id. p. 62 no. 1894, 1895; — (*I.*) *melii* n. ibid., id. p. 63 no. 1896; — (*Macularia*) *punctata* var. *maurula* n. Prov. Oran; id. p. 63 no. 1897; — (*M.*) *dupotetiana* var. *scissilabrum* n. ibid., Icon. no. 1899—1900; var. *microstoma* n. ibid., Ic. no. 1901, 1902; — (*M.*) *alabastrites* var. *subvanvinquiae* Pall. mss., ibid., id. p. 66 no. 1910, 1911; — *hieroglyphicula* var. *compacta* n. ibid., id. p. 66 no. 1912; — (*P.*) *radiosa* var. *angustefasciata* n. Constantinopel; id. p. 68 no. 1914; — (*Pom.*) *salisi* Mab. abg. no. 1915; — (*P.*) *pomacella* attalus Brussa; id. p. 70 no. 1917; — (*Iberus*) *companyoi* var. *praeconica* n. Nordspanien; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 38; — (*Pomatia*) *patruelis* n. Epirus; id. p. 39; — (*Tacheocampylaea*) *raspailii* var. *pollonerae* n. Corsika (= Rossm. Iconogr. fig. 305); **Caziot** 1903 (1) p. 119; var. *solida* n. ibid., id. p. 120; — (*T.*) *brocardi* var. *fasciata* n. ibid., id. p. 124; — (*T.*) *marchii* n. ibid., id. p. 128 t. 2 f. 1; — (*T.*) *cyrniaca* var. *tachigyrta* Westerl. = *montigena* Hagenmull.; id. p. 136; — (*T.*) *venacensis* n. *Pollonera* mss., ibid., id. p. 142 t. 1 fig. 2; — (*Macularia*)

bonifaciensis nom. nov. für *jaspidea* Moq. Tandon nec Pfr., *ibid.*, id. p. 231; var. *pseudohospitans* n. *ibid.*, id. p. 224; var. *hospes* n. *ibid.*, id. p. 225; — (*M.*) *halmyris* var. *sardica* n. Fra Piero mss., *ibid.*, id. p. 230; var. *conoidea* n. *ibid.*, id. p. 231; — (*M.*) *pseudohalmyris* n. *ibid.*, id. p. 231 t. 1 f. 6; — (*Macularia*) *vermiculata* var. *vilossarum* n. Catalonian; **Caziot** 1904 (6) p. 3; — (*M.*) *niciensis* var. *perforata* n., var. *minor* n., var. *subdepressa grandis* n. und var. *subdepressa major* n., Umgebung von Nizza; *id. in Feuille jeunes Natur.* 1904 (?) p. 35.

Labyrinthus (Beck) *baeri* n. Huallaga, Peru; **Dautzenberg** 1901 J. C. p. 306 t. 9 f. 1—3; — *baeri* var. *diminuta* n. Perime, Peru; **Gude** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 262 t. 7 f. 1—4; — *columbiensis* n. Sierra Sta. Marta; **da Costa** 1901 Ann. N. H. VII p. 8 Textfig.

Leucochroa (Beck) *insularis* Bttg. abgebildet bei **Kobelt** Icon. X no. 1922, 1923; — *liedtkei* n. Ain Sefra, Oase Tiut; *id. p. 72* no. 1924; — *rugosa* n. Pallary mss. Traras, Oran; *id. p. 73* no. 1925.

Papuina (Marts.) *groulti* n. Insel Obi; **Dautzenberg** 1902 Naturaliste p. 247, Textfig.; — *lanceolata* var. *unicolor* n. Insel Obi; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 191; — *rhynchostoma* var. *obiana* n. *ibid.*, id. p. 191; — *pseudosatsuma* n. *ibid.*, id. p. 192; — *trochiformis* n. Insel Mafor, Holl. Neu Guinea; **Preston** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 18, Textfig. II; — *phaeostoma* var. *raremaculata* n., var. *fulgorata* n. und var. *densepicta* n., Neu Mecklenburg; **Rolle** 1902 Nachrbl. p. 212; — *densestriata* n. Neu Mecklenburg; **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX p. 316; — *humilis* n. *ibid.*, id. p. 317; — *jucunda* n. Deutsch Neu Guinea; *id. p. 317*; — *spadica* n. Neu Mecklenburg; *id. p. 318*; — *gemina* n. Britisch Neu Guinea; **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX p. 183; — *cynthia* n. *ibid.*, id. p. 183; — *callosa* n. Halmahera; **Sykes** 1903 J. Mal. X p. 65 t. 6 f. ; — *wallaceana* n. Waigu; *id. p. 65* t. 6 f. ; — *pyrgus* n. *ibid.*, id. p. 78 t. 6 f. ; — *pseudosatsuma* Mlldff. = *piliscus* Mrts.; **Dautzenberg** 1903 J. C. p. 14; — *pseudolanceolata* n. (= *lanceolata* *unicolor* Mlldff., Obi; *id. p. 11*; — *obiensis* Dautz. = *piliscus* Mrts., *id. p. 14*; — *fallax* n. Gebi, Molukken; **Fulton** 1904 J. Mal. XI p. 53 t. 4 f. 6, 7; — *ecolorata* n. Batjan; **Sykes** 1904 J. Mal. XI p. 90 t. 9 f. 2; — *semibrunnea* n. Gebi; *id. p. 90* t. 9 f. 1; — *lanceolata* var. *pulchrizona* n. Obi; *id. p. 91*.

Obbina (Semper) *subgranulata* n. Batjan; **Sykes** 1904 J. Mal. XI p. 89 t. 9 f. 5, 6.

Planispira (Beck) *spiriplana* n. Insel Obi; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 187; — *pruinosa* n. *ibid.*, id. p. 188; — *liedtkei* n. Rolle mss., *ibid.* id. p. 188; — *kendigiana* n. Rolle mss., *ibid.*, id. p. 189; — *rollei* n. *ibid.*, id. p. 189; — *semiquadrivolvis* n. Ostborneo; **Martens** 1903 S.-Ber. Ges. Berlin p. 423: — *buelowi* n. Batchian; **Rolle** 1903 Nachrbl. p. 23; — (*Cristigibba*) *albopicta* n. Halmahera, Obi; **Sykes** 1903 J. Mal. X p. 64, 78 t. 6 f. ; — *quadrifasciata* var. *halmaherica* n. Halmahera; **Gude** 1903 J. Mal. X p. 48 t. 3 f. 2. — (*Vulvus* n.) *endoptycha* var. *depressa* n. Waigu; **Sykes** 1904 J. Mal. XI p. 88.

Pleurodonte (Fischer) *vacillans* n. Jamaica; **Vendryes** 1902 Naut. XV p. 101 Textf.; — *gudeana* nom. nov. für *Helix neogranadensis* Kobelt nec Pfr.; **Ancey** 1904 J. Conch. v. 52 p. 297.

Polygyra (Say) *alabamensis* n. Alabama; **Pilsbry** 1902 Naut. XVI p. 30; — *texasensis* n. Texas; *id. p. 31*; — *blandiana* n. Missouri; **Pilsbry** 1903 Pr.

Phil. p. 203 t. 9 f. 11—13; — albolabris var. fuscolabris n. West Arkansas; id. p. 200; — (Stenotrema) barbata n. Alabama; Clapp 1904 Nautilus XVIII p. 85.

Rhagada (Albers) woodwardi n. Nordwest Australien; Fulton 1902 Pr. mal. Soc. V p. 33, Textf.

Sonorella (Pilsbry) granulatissima n. Arizona; Pilsbry 1902 Naut. XVI p. 31; — aschmuni n. Arizona; Bartsch 1904 Smiths. Misc. Coll. v. 47 p. 190 t. 31 f. 5; — wolcottiana Bartsch (Pr. biol. Soc. Wash. 1903 XVI p. 103, (ex errore walcottiana) abgeb. ibid. t. 31 f. 4; — indioensis Yates desgl. t. 33 f. 1; — hachitana Dall desgl. t. 31 f. 2; — nelsoni n. Chihuahua, Mexiko; id. p. 191 t. 31 f. 3; — goldmanni n. ibid. id. p. 192 t. 32 f. 6; — merrilli n. St. Quentin, Niederkalifornien; id. p. 192 t. 32 f. 5; — granulatissima Pilsbry abgeb. ibid. t. 32 f. 4; — dalli n. Arizona; id. p. 193 t. 31 f. 1; — mearnsi n. Sonora; id. p. 194 t. 32 f. 2; — bailieyi n. Inyo Cty., Kalifornien; id. p. 195 t. 33 f. 4, mit var. orcutti p. 196 t. 33 f. 5; — fisheri n. ibid., id. p. 197 t. 33 f. 3; mit var. lioderma Psbry. p. 198; — lioderma n. Unter Kalifornien; Pilsbry 1904 Nautilus 1904 XVIII p. 59.

Bartsch 1904 l.c. unterscheidet nach dem Embryonalende vier Gruppen, die sich um S. wolcottiana, hachitana, magdalensis und fisheri gruppieren. Die Embryonalendungen von 1, 2, 4 sind in riesiger Vergrosserung abgebildet.

Thersites (Pfr.) beddomei Braz. = bellendenkerensis Braz. var.; Fulton 1904 J. Mal. XI p. 1; — challisi Cox, appendiculata Pfr., thatcheri Cox, banni Braz., hilli Braz., johnstonei Braz., bayensis Braz., praetermissa Cox, yeppensis Bedd. sämmtlich Varietäten von incei Pfr.; Fulton ibid. p. 2; — seminigra Morelet, parsoni Cox, aureedensis Braz. Varietäten von lessoni Pfr.; id. p. 3 & 4; var. rufa n. Queensland; abgeb. t. 1 f. 4; — bala Braz. = curtisiana Pfr., id. p. 4; rainbirdi Cox = yulei Fbs., id. p. 4; — moresbyi Angas = rockhamptonensis Cox; id. p. 6; — mourilyana Braz. = whartoni Cox; id. p. 6; — tomsoni Braz. = cookensis Braz., id. p. 7; — mulgravensis Braz. mit var. palmensis Braz., abgeb. ibid. t. 1 f. 1, t. 1 f. 5, 6; var. meridionalis n. f. 7, 8; — concors n. Gayudah, Queensland (parsoni Pilsbry nec Cox); id. p. 8 t. 1 f. 3; — etheridgei Braz. abgeb. ibid. t. 1 f. 2.

Trochula (Schlüter) conica var. chiai n. Gerona; Caziot 1904 (6) p. 5; var. depressa n. Barcelona, id. p. 6; var. tuberculata n. ibid., id. p. 6.

Vulnus n. sect. Planispirae, Typus Pl. endoptycha Marts.; Sykes 1904 J. Mal. XI p. 88.

Westerlundia n. subg. Fruticola (= Latona Westerl.); Kobelt 1904 Icon. XI p. 131, 181.

Xanthomelon (Albers) bednalli n. Central-Australien; Ponsonby 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 182, Textfig.

Xerophila (Held) daurae n. Marocco; Pallary 1901 J. C. p. 226; — vaucherii n. Südmarocco; id. p. 227; — vigiliana n. Mte. Vigilio, Abruzzen; Kobelt 1901 Nachrbl. p. 186; — (Jacosta) subsuta Mrts. abgeb. bei Kobelt Icon. IX no. 1673; — luteata var. galestoma n. Albarracin Spanien; Westerlund 1902 Nachrbl. p. 24; — deplanata n. Avignon; id. p. 24; — opalina n. Polle de Rodana, Spanien; id. p. 25; — karagolica n. Smyrna; id. p. 25; — dantei var. resoluta n. Auvergne; id. p. 26; — omala n. Patras, Griechenland; id. p. 26; — strenua n. Sevilla; id. p. 35; — variegata var. infans n. Griechenland, Smyrna; id. p. 36; — janinensis n. Janina, Epirus; id. p. 36; — petasia n. Nordspanien; id. p. 37; — (Jacosta) ledereri var.

colona n. Messina; id. p. 38; — (*Turricula*) vernicata n. Smyrna; id. p. 38; — syrensis var. exseita Marts. = eminens Westerl.; id. p. 20; — (*Theba*) ischnia n. Mabille mss., Corsica; **Caziot** 1903 (1) p. 98; — (*Th.*) abebaia n. Mab. mss., ibid., id. p. 99; — (*Th.*) ousterea n. Mab. mss., ibid., id. p. 103; — (*Th.*) monereibia n. Mab. mss., ibid. id. p. 103; — (*Th.*) godeffroyi n. Mab. mss., id. p. 104; — (*Th.*) euclastolena n. Mab. mss., ibid. id. p. 103; — (*Th.*) thomasinae n. ibid., id. p. 103 t. 1 fig. 3; — (*Th.*) bastitensis n. ibid., id. p. 105 t. 1 f. 2; — (*Th.*) guitioni n. ibid., id. p. 106 t. 1 fig. 1; — (*Xer.*) venacensis n. Pollonera mss., ibid., id. p. 142; — calceola nom. nov. für calculina Locard nec Pfr., id. p. 162; — submendranoi n. ibid., id. p. 167, — pila nom. nov. für pilula Locard non Pfeiffer neque Mousson; id. p. 172; — albovariegata n. mit var. menzaensis n. ibid., id. p. 174; — scita n. ibid., id. p. 178 t. 2 f. 3; — tartaginiana n. ibid., id. p. 182 t. 1 f. 7; — erratica var. cenestina n., var. tandoni n., var. roberti n., var. quittoni n. ibid., id. p. 199; — duminyi n. ibid., id. p. 200; — restonicana n. ibid., id. p. 202, var. gracilis n. p. 203; — fertoni n. ibid., id. p. 204 t. 1 f. 8 var. unicolor n. p. 204; — faleuccii n. ibid. p. 207 t. 2 fig. 4; — zuluetai n. Villossar de Mar, Barcelona; **Caziot** 1904 p. 6 Textfig. 1; — paoliana n. Corsika; **Caziot** 1904 (5) p. 35 Textfig. A; — mauryi n. ibid., id. p. 36, Textfig. B; — mantinica var. moitaënsis n. ibid., id. p. 37; — albovariegata und var. manzaensis abgeb. ibid. Textfig. C, D; — adelpha n. Ungarisches Litorale; **Lajos** 1904 Ann. Mus. Hung. II p. 293.

Eulotidae.

Aegista (Alb.) *aperta* var. *cavata* n. Tomisato, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 564; var. *trachyderma* n. Pilsbry & Gude mss., Prov. Kii; id. p. 614; — *mimulooides* n. Omi, Japan; **Gude** 1901 Pr. Phil. p. 617; — *friedeliana* var. *tumida* n. Gozo, Yamato; id. 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 195; — ?*intonsa* n. Japan; **Pilsbry** & **Hirase** 1902 Naut. XVI p. 77; — *minima* n. ibid., iid. p. 45; — *omma* n. Liukius; **Pilsbry** & **Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 625; — *friedeliana* var. *humerosa* n. (= *goniosoma* olim) iid. p. 625; — *kobensis* n. Japan; **Pilsbry** & **Hirase** 1903 Naut. XVII p. 105; — *discus* n. ibid.; iid. p. 105; — *friedeliana* var. *peraperta* n. ibid., iid. p. 45.

Acusta (Albers) *despecta* var. *ikiensis* n. Iki, Japan; **Pilsbry** & **Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 627; var. *praetenuis* n. ibid., iid. p. 627.

Albersia (H. Ad.) *subsphaerica* n., Gebi, Molukken; **Fulton** 1904 J. Mal. XI p. 54 t. 4 f. 8, 9; — *waiguensis* n. Waigu; **Sykes** 1904 J. Mal. XI p. 88 t. 9 f. 6; — *obiana* n. Rolle mss., Obc.; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. p. 191.

Camaena (Albers) *xanthoderma* var. *ingens* n. Mansongebirge, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 74.

Cathaea (Mlldff.) *retteri* var. *serotina* n. Turkestan; **Westerlund** Nachrbl. 1902 p. 20; — (*Euc.*) *sturanyi* n. Rolle mss., Osh, Fergana; **Gude** 1904 J. Mal. XI p. 93; — (*Campylocath.*) *hermanni* n. Mlldff. mss.; id. p. 93.

Chloritis (Beck) *athrix* n. Mansongebirge, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 73; — *insularis* n. Isle de Merveilles, ibid., id. p. 113; — *eucharistus* n. Oshima; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 347; — *hirasei* n. Prov. Kii, id. p. 565; — (*Trichochloritis*) *pumila* n. Suruga; **Gude** 1901 Pr. Phil. p. 617; — (*Sulcobasis*) *prestoni* n. Neu-Guinea; **Gude** 1902 J. Mal. XI p. 59 Textfig. 1—4; — *siamensis* n. Kanburi, Siam; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. v. 34 p. 156; — *kuehnii*

n. Rolle mss. Buru; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. v. 34 p. 198; — (Ptychochloritis n.) buruana n. Rolle mss., Burn; id. p. 199; — (Pt.) mirabilis n. Rolle mss., Burn; id. p. 199; — (Albersia) obiana n. Rolle mss., Obi, id. p. 191; — (Sulcobasis) globosa n. Nordküste von Britisch Neu-Guinea; **Preston** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 17 Textfig. 2; — (S.) stirophora var. collingwoodi n. Collingwood Bay, ibid.; id. p. 17 Textfig. 5; — (Austrochloritis) maforinsulæ n. Mafor, Holländisch Neu-Guinea; id. p. 18 Textfig. 3; — multisetosa n. Neu-Mecklenburg; **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX p. 315; — tenebrica n. ibid., id. p. 316; — perpunctatus n. Japan; **Pilsbry** 1902 Naut. XV p. 116; — bracteatus n. ibid., id. Naut. XVI p. 21; — albolabris n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1902 Naut. XVI p. 76; — romaeensis n. Insel Roma; **Moellendorff** 1903 Nachrbl. v. 35 p. 156; — echizenensis n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVI p. 116; — tosanus n. ibid.; iid. p. 134 & XVII p. 31; — (Trichochloritis) tabularis n. Sumatra; **Gude** 1903 in: J. Mal. X p. 48 t. 3 f. 5; — unguiculina Marts. und albodenata Smith abgeb. ibid. t. 3; — toramis n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVII p. 31; — obscurus n. Osumi; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Philad. p. 638 Textf.; — tosanus var. osumiensis n., ibid., iid. p. 629; — brachystoma n. Ost-Borneo; **Martens** 1903 SB. Ges. Berlin p. 422.

Dolicheulota n. subg. *Eulotae*, **Pilsbry** 1901 Man. p. 18 (Shell umbilicate, solid, Bulimus shaped, having the sculpture and colour-pattern; aperture ovate, longer than wide, the peristome reflexed) Typus Bul. formosensis Pfr.

Eulotella (Pilsbry) commoda var. izuensis n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVII p. 105.

Eulota (Hartm.) jourdyi (Eulotella) subsp. monticola n., Mansongebirge, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 74; — fruticum var. asiatica n. Ostsbirien, **Dybowski** 1901 Nachrbl. p. 131; — gerstfeldi n. Amurland; id. p. 137 Textfig.; — succincta var. amblytropis n. Linkiu; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 193; — sargentiana n. Japan; id. p. 193; — (Coelurus) cavyconus n. Japan; **Pilsbry** 1902 Naut. XV p. 117; — (C) cavitectum n. ibid.; **Pilsbry & Hirase** 1904 Naut. XVI p. 134; — callizona var. montivaga n. Tosa; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 626; — niyaka n. ibid., iid. p. 627; — luhuana var. yakoshimana n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVII p. 78; — globosa n. Japan; **Jones & Preston** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 140.

Euhadra (Pilsbry) pseudopapuina n. Mansongebirge, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 74; — oshimae n. Oshima; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 346; — mercatoria var. daemonorum n. Osumi, Japan; id. p. 545; — luhuana var. pachya n. und var. nesiotica n. Osumi; id. p. 614; — anceyi nom. nov. für Eu. pseudocampylaea Ancey nec Middff.; **Gude** 1902 J. Mal. IX p. 8; — gereti n. Japan; **Gude** Ann. N. H. X p. 332; — grata var. zonata n., Prov. Uzen, Japan; **Gude** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 196; — sadoensis n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVI p. 115; — euterpe n. ibid., iid. XVII p. 45; — okinerabuensis n. Osumi, Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 p. 626; — euterpe n. Japan; iid. 1903 Naut. XVII p. 44; — quasita var. decorata n. ibid., iid. p. 52; — connivens var. diversa n. ibid., iid. p. 53; — submandarina var. migakejimana n. ibid., iid. p. 53; var. nijimana n. ibid., iid. p. 53.

Helicostyla fasciata nom. nov. für Bulimus effusus Pfr. nec Brug.; **Pilsbry** 1902 Manual Index p. LXXI.

Moellendorffia (Ancey) *spurca* subsp. *deflexa* n. Mansongebirge, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 74.

Satsuma (Adams) *pulchella* n. Mansongebirge, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 72; — *eximia* n. ibid., id. p. 72; — *concavospira* n. ibid., id. p. 73; — *straminea* n. ibid., id. p. 73; — *oxytropis* n. Kebao, ibid.; id. p. 114; — *platyconus* n. ibid.; id. p. 114; — *fausta* (*Ganesella*) n. Suruga, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 546; — *adelinae* n. Oshima; id. p. 546; — *tanegashima* var. *dulcis* n. ibid., id. p. 565; — *selasia* n. Prov. Kii; id. p. 566; — *cristata* n. ibid., id. p. 566; — *japonica* var. *granulosa* n. und var. *carinata* n. Prov. Omi; id. p. 567; — (*Ganesella*) *procera* n. Tonking; **Gude** 1902 Ann. N. H. X. p. 323; abgeb. Pr. mal. Soc. V t 7 f. 21—24; — (*Coliolus*) *weiskei* n. Britisch Neu-Guinea; **Fulton** 1902 Ann. N. H. IX p. 184; — (*G.*) *sororecula* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Naut. XV p. 116; — *optima* n. ibid., id. p. 116; — *notoënsis* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVI p. 116; — *moellendorffiana* n. ibid., iid. XVII p. 78; — (*Gan.*) *tokunoshimana* n. Osumi, Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 629; — *myomphala* var. *okinoshumana* n. ibid., iid. p. 630; — *selasia* var. *textilis* n. Tosa; iid. p. 630; var. *zonata* n. ibid., iid. p. 630.

Trishoplita (Jacobi) *dacostae* var. *awajensis* n. Awaji, Japan; **Pilsbry** 1901 p. 403; — *goodwini* var. *strigata* n., Hizen, Kiusiu; id. p. 403; — *hilgendorfi* var. *tenuis* n. Omi; id. p. 547; — *collinsoni* var. *okinoshimae* n. Okinoshima, Tosa; id. p. 547; — *hilgendorffii* var. *ohikubushima* n., Biwasee; id. p. 564; — *tosana* var. *anozoa* n. Mino; id. p. 565; — *cretacea* var. *decuassata* n. Liukiu Inseln; **Gude** 1901 p. 194 t. 21 f. 7—9; var. *bipartita* Psbry. ibid., id. p. 194; — *tosana* Gude zuerst abgebildet ibid. t. 21 f. 1—3; — *dacostae* Gude desgl. t. 21 f. 4—6; — *goodwini* var. *carinata* n. ibid., id. p. 194; — *nitens* n. Osumi, Japan; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 628; — *minima* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVII p. 106.

Plectotropis (Marts.) *shikokuënsis* n. Yoshida, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 545; — *omiensis* n. Omi; id. p. 545; — *pannosa* n. Uzen, ibid.; id. p. 563; — *deflexa* n. Prov. Uyo; id. p. 563; — *conica* Gude znerst abgebildet bei **Gude** 1901 Pr. mal. Soc. IV t. 21 f. 13—15; — *kinsinensis* Pilsbry desgl. t. 21 f. 10—12; — *hachyoënsis* n. Japan; **Pilsbry** 1902 Naut. XVI p. 45; — *diprogramme* n. Siam; **Moellendorff** 1902 Nachrbl. v. 34 p. 158; — *marginata* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Naut. XVII p. 44; — *conomphala* n. ibid., iid. p. 45; — *omiensis* var. *echizensis* n. ibid., iid. p. 76; — *kobensis* var. *gotoensis* iid., ibid. p. 76.

Plectopylidae.

Plectopylis (Benson) *dautzenbergi* n. Tonking; **Gude** 1901 J. de C. p. 198 t. 6 f. 1, Textfig. 1; — *bavayi* n. ibid., id. p. 200 t. 6 f. 2, Textfig. 2; — *tenuis* n. ibid., id. p. 202 t. 6 f. 3, Textfig. 3; — *fischeri* n. ibid., id. p. 204 t. 6 f. 4, Textfig. 4; — *emigrans* **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 75 abgeb. t. 6 f. 5, Textfig. 5; — *anceyi* n. ibid., id. p. 208 t. 6 f. 6, Textfig. 6; — *persimilis* n. ibid., id. p. 209 t. 6 f. 7; — (*Endoplön*) *choanomphala* n. Thamnoi, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 75; — (*Sinicola*) *emigrans* n. ibid., id. p. 75; — (*Sinicola*) *fruhstorferi* n. Tongking; id. p. 114; — (*Endoplön*) *hirsuta* n. Insel Bahmun, ibid., id. p. 115; — *levida* Gude zuerst abgeb. bei **Gude** 1901 J. Mal. VIII p. 49 Textfig. 4; — *plectostoma* var. *exserta* n. Khasi Hills; id. p. 49 Textfig. 5; —

pilsbryana nom. nov. für *villedaryi* Psbry & Gude nec Ancey; **Gude** 1901 J. Mal. VIII p. 110; — *hirsuta* Mlldff. abgeb. ibid. p. 111 Textfig.; — *fruhstorferi* Mlldff. p. 113 Textfig. 2; — (*Endoplon*) *moellendorffii* n. Tongking; id. p. 115 Textfig. 4; — *choanomphala* Mlldff. = *villedaryi* Ancey; id. p. 116. — (*Sinicola*) *hirasei* n. Liu-kuo-Inseln; **Pilsbry** 1904 *Nautilus* XVIII p. 58.

Bulimidae.

Bulimus (Scopoli)? *illustris* n. Huancabamba, Peru; **Rolle** 1904 Nachrbl. p. 36 t. 5 f. 3.

Placostylus (Beck) *porphyrochila* (Leucocharis) n. Noumea; **Dautzenberg & Bernier** 1901 J. C. p. 215 t. 7 f. 5, 6; — *porphyrostomus* abnorm abg. bei **Dautzenberg** 1901 J. C. p. 217 t. 7 f. 7; — *fibratus* var. *insignis* monstr. desgl. t. 7 f. 8; — *porphyrochila* var. *rubicunda* n. Houailou; **Dautzenberg** 1901 J. C. p. 301 t. 8 f. 6; — *houailouensis* n. ibid.. id. p. 301 t. 8 f. 4, 5.

Porphyrobaphe (Shuttl.) *grandis* n. unsicheren Fundorten; **Rolle** 1902 Nachrbl. p. 211; — *sarcostoma* n., *Columbia?*; **Ancey** 1903 *Nautilus* XVII p. 83 (= *yatesi* Pfr., id. ibid. p. 104).

Achatinidae.

Achatina (Lam.) *marteli* n. Kongostaat; **Dautzenberg** 1901 Ann. Soc. Belg. v. 36 p. 3 t. 1 f. 1, 2; — *machachensis* n. Basutoland; **Smith** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 169 Textf. — *parthenia* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. XII t. 32 f. 10; — *lhottellerii* Bourg. var., Oukoueré, abgeb. bei **Ancey** 1902 J. C. v. 50 p. 274 Textfig. 1; — *marieei* Ancey desgl. p. 275, Textfig. 2; — *fulminatrix* Marts. p. 276 Textf. 3; — *craventi* Smith p. 277 Textfig. 5; — *fragilis* Smith p. 278 Textf. 6; — *albopicta* Smith p. 279, Textf.; — *bisculpta* Smith p. 280, Textfig.

Pilsbry 1904 beginnt im vol. 17 der zweiten Serie von Tryons Manual die Bearbeitung der Achatinidae. Wir berichten darüber im Zusammenhang im Jahresbericht für 1905.

Limicolaria (Schum.) *keniana* n. Berg Kenia; **Smith** 1903 J. C. Leeds X p. 318 t. 4 f. 17; — *dohertyi* n. Uganda; id. 1901 J. Mal. VIII p. 95 Textfig. 4; — *joubini* n. Kongo; **Rochebrune & Germain** 1904 in Bull. Mus. Paris v. 10 p. 142.

Pseudachatina (Albers) *perelongata* n. Kamerun; **Rolle** 1902 Nachrbl. p. 211; — *daillyana* n. Kamerun; **Pilsbry** 1904 in Tryon, Manual v. 16 p. 214.

Bulimulidae.

Bulimulus (Leach) *jousseaumi* (Drymaeus) n. Huallaga, Peru; **Dautzenberg** 1901 J. C. p. 308 t. 9 f. 3, 4; — *scoloides* n. ibid., id. p. 309 t. 9 f. 6, 7; — (*Ataxus*) *huayaboënsis* n. Huayabo, Peru; id. p. 311 t. 9 f. 8, mit var. *attenuata* n. f. 11, und var. *rudis* n. f. 10; — (*Dryptus*) *filocinctus* n. Peru; **Rolle** 1901 Nachrbl. p. 93; — *icterostomus* n. Urubambatal Peru; **Martens** 1901 Nachrbl. p. 149; — *luteolus* n. Südamerika; **Ancey** 1901 Natural. p. 83; — *turritella* var. *pliculosa* n. ibid., id. p. 93; — (*Rhinus*) *argenteus* n. ibid., id. p. 92; — (*Drymaeus*) *gereti* n. ibid., id. p. 93; — (*Scutalus*) *steeri* Psbry. abgeb. ibid. t. 18 f. 50—52; — *dentaxis* n. Peru; id. p. 143 t. 25 f. 16, 17; — *stilbe* n. São Paulo;

id. p. 145 t. 25 f. 18; — haematospira Psbry. abgeb. t. 25 f. 19—21; — hoodensis n. Galapagos; **Dall** 1900 Pr. Phil. p. t. 8 f. 1; — laxostylus n. Huancabamba; **Rolle** 1904 Nachrbl. p. 37 t. 5 f. 4; — pergracilis n. ibid., id. p. 37 t. 5 f. 5; — compactus n. Bolivia; **Fulton** 1902 Ann. nat. Hist. IX p. 69; — bonneti n. Bolivia; **Ancey** 1902 J. Conch. v. 50 p. 40 Textfig.; — ephippium n. Brasilien; **Ancey** 1904 Nautilus vol. 17 p. 21; — goniotropis n. ibid., id. p. 22.

Corona (Albers) pfeifferi var. gracilis n. Südost-Columbien; **Smith** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 170, Textfig.

Drymaeus (Albers) cognatus n. Bogota, Columbia; **Pilsbry** 1901 Manual p. 155 t. 23 f. 3—7; — succinea n. Amazonasthal, id. p. 160 t. 26 f. 38; — sanctae-marthae n. Sierra Santa Martha; id. p. 161 t. 48 f. 49, 50; — roseatus var. montanus n. ibid., id. p. 161 t. 48 f. 51; — expansus var. perenensis n. Tarapoto, Peru; **da Costa** 1901 Pr. Mal. Soc. IV p. 239 t. 24 f. 5; — subventricosus n. Bogota, id. p. 239 t. 24 f. 4; — exoticus n. Oberer Magdalenas; id. p. 239 t. 24 f. 10; — elsteri n. Chachapoyas, Amazonas; id. p. 238 t. 24 f. 6; — obliquistriatus n. San Pablo, Peru; id. p. 157 t. 48 f. 45; — cylindricus n. ibid., id. p. 157 t. 48 f. 46; — chiriquiensis n. Chiriqui, Panama; id. p. 162 t. 48 f. 47; — abruptus n. Huancabamba, Peru; **Rolle** 1904 Nachrbl. p. 35 t. 5 f. 1; — multispira n. Chuco Chaca, Bolivia; **da Costa** 1904 Pr. Mal. Soc. V p. 5 t. 1 f. 4; — nubilus Preston = recluzianus var. mertensianus; **Ancey** 1904 Nautilus XVIII p. 22.

Macrodontes (Swains.) paulistus Pilsbry & von Jhering, zuerst abgebildet bei **Pilsbry** 1901 Man. XV t. 13 f. 93, 94; — dautzenbergianus Psbry. desgl. t. 13 f. 95—97; — degeneratus Psbry. desgl. t. 13 f. 98, 99.

Odontostomus (Beck) piriformis n. Argentinien (= doeringii Kobelt 1882 nec 1878); **Pilsbry** 1901 Manual p. 72 t. 12 f. 71, 72; — squarrosus n. Brasilien; **Ancey** 1904 Nautilus XVII p. 103; — glabratus n. Argentinien; id. p. 103; — deraini n. ibid., id. p. 103; — (Moricandia) toleratus n. Brasilien; **Fulton** 1903 J. Mal. v. 10 p. 100.

Peronaeus (Albers) baeri n. Jocos, Peru; **Dautzenberg** 1901 J. C. p. 131, 214 t. 8 f. 3, 4; — jocosensis n. ibid., id. p. 131, 213 t. 8 f. 1, 2.

Oxychonus (Moerch) bifasciatus var. minarum n. Minas Geraes, Brasilien; **Ancey** 1901 Natural. p. 93.

Strophocheilus (Spix) pilsbry Jher. zuerst abgebildet bei **Pilsbry** Manual p. 118 t. 17 f. 46, 47; — milleri var. kronei n. Jhering mss., São Paulo; ibid. p. 118 t. 19 f. 58, 59; var. iguapensis n. ibid., id. p. 119 t. 18 f. 48, 49; — calus n. Brasilien; id. p. 119 t. 18 f. 46, 47; — (Borus) yporanganus n. Jhering & Psbry. mss., São Paulo; id. p. 120 t. 19 f. 56, 57; — (B.) fragilior n. Jhering mss., ibid., id. p. 121 t. 20 f. 60, 61; — (B.) sanctaepauli Jher. & Psbry. abg. t. 20 f. 63; — (Thaumastus) granocinctus nom. nov. für filocinctus Rolle nec Reeve; id. p. 126; — (Dryptus) indentatus n. Ecuador; **da Costa** 1901 Pr. mal. Soc. p. 239 t. 24 f. 8; — mertensianus nom. nov. für Bulimus grandis Marts. nec Deshayes; **Pilsbry** 1902 Manual Index p. LXXI. — (Borus) separabilis n. Peru?; **Fulton** 1903 J. Mal. X p. 100, fig.; — (Eurytus) auriformis n. Columbien; **da Costa** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 5 t. 1 f. 1; — miersi n. Minas Geraes, Brasilien; id. p. 5 t. 1 f. 2; — mabillei Crosse = pulicarius Reeve; **Ancey** 1904 J. Conch. v. 52 p. 300.

Buliminidae.

Buliminus hirasei Pilsbry = *reticulatus* Rve., der Fundort Guinea für letzteren irrthümlich; *Ancey* 1901 J. C. p. 138; — (*Petraeus*) *acbensis* n. Akbes, Nordsyrien; *Naegele* 1901 Nachrbl. p. 23 (cf. Iconogr. no. 1631); — (*P.*) *eliae* n. Cheikle, ibid.; id. p. 23 (cfr. Iconogr. no. 1598); — *exquisitus* n. Nordsyrien; id. p. 25 (cfr. Iconogr. no. 1627, 1628); — (*Sulzebrinus*) *purus* var. *sinistrorsa* n. Urmia, Persien; id. p. 27 (cfr. Iconogr. no. 1703). — (*S.*) *nipponicus* n. Prov. Osumi, Japan; *Moellendorff* 1901 Nachrbl. p. 40; — (*Coccoderma*) *messageri* var. *mansonensis* n. Mansongebirge, Annam; id. 1901 Nachrbl. p. 76; — (*Choudrula*) *tridens* var. *tenuilabiata* n. Südrussland; *Lindholm* 1901 Nachrbl. p. 172; — (*Mirus*) *cantori* var. *corneus* n. Sytschuan, Westchina; *Moellendorff* 1901 Mus. Petersb. p. 316; — (*M.*) *gracilispirus* n. ibid., id. p. 317 t. 12 f. 1, 2; — (*M.*) *transiens* Ancey abgeb. t. 12 f. 5, 6; — (*M.*) *schuensis* nom. nov. für *B. setschuanensis* Heude nec Hilber; p. 323; — (*M.*) *brizoides* n. ibid., id. p. 323 t. 12 f. 7, 8; — (*M.*) *acuminatus* n. Gansu; id. p. 323 t. 12 f. 9, 10; — (*M.*) *alboreflexus* subsp. *nodulatus* n. Shensi; id. p. 325 t. 12 f. 11, 12; subsp. *striolatus* n. Gansu; id. p. 325; subsp. *perforatus* n. Sytshuan; id. p. 325 t. 12 f. 13, 14; — (*M.*) *pyrinus* n. Gansu; id. p. 327 t. 12 f. 17, 18; — (*Subzebrinus*) *postumus* subsp. *ventricosulus* n. Hunan, Hubei; id. p. 329; — (*S.*) *saccatus* n. Sytshuan; id. p. 330 t. 12 f. 19, 20; — (*S.*) *davidi* subsp. *novemgyratus* n. ibid., id. p. 334 t. 12 f. 21, 22; — (*S.*) *fultoni* n. Schm. & Bttg. mss., ibid., id. p. 334 t. 12 f. 23—25; — (*S.*) *umbilicaris* n. ibid., id. p. 335 t. 12 f. 26, 27; — (*S.*) *beresowskii* n. ibid., Gansu; id. p. 336 t. 13 f. 1, 2; — (*S.*) *macrostoma* n. Gansu; id. p. 336 t. 13 f. 3—5; — (*S.*) *substrigatus* n. Sytshuan; id. p. 337 t. 13 f. 6, 7; — (*S.*) *ottonis* subsp. *convexospirus* n. ibid., id. p. 338 t. 13 f. 10—12; — (*S.*) *dolichostoma* n. Gansu; id. p. 338 t. 13 f. 13, 14; — (*S.*) *bretschneideri* n. Sy-tschuan; id. p. 339 t. 13 f. 15—17; — (*S.*) *melinostoma* n. Gansu; id. p. 341 t. 13 f. 20—22; mit subsp. *subcylindricus* n.; — (*Pupinidius* n.) *obrutschewi* subsp. *eurystoma* n. Gansu; id. p. 342 t. 13 f. 23, 24; subsp. *contractus* n. Gansu; id. p. 343 t. 13 f. 25—27; — (*P.*) *streptaxis* n. ibid., id. p. 343 t. 13 f. 28, 29; — (*P.*) *pupinella* n. Gansu; id. p. 344 t. 14 f. 1—3; subsp. *altispirus* n. ibid., id. p. 344 t. 14 f. 4, 5; — (*P.*) *pupinidius* n. ibid.; id. p. 345 t. 14 f. 6—8; — (*P.*) *gregorii* n. Sytshuan; id. p. 345 t. 14 f. 9, 10; — (*P.*) *anocampetus* n. Gansu, id. p. 346 t. 14 f. 11, 12; — (*P.*) *nanpingensis* n. ibid., id. p. 346 t. 14 f. 13—17; subsp. *ambigua* n. ibid., id. p. 347 t. 14 f. 18, 19; — (*P.*) *orrectus* n. Sytshuan; id. p. 347 t. 14 f. 20—22; — (*Petraeomastus* n.) *scmfartus* n. ibid., id. p. 350 t. 15 f. 1—5; — (*P.*) *mucronatus* n. Gansu; id. p. 351 t. 15 f. 9—11; — (*P.*) *breviculus* n. ibid., id. p. 351 t. 15 f. 12, 13; subsp. *anoconus* n. ibid., id. p. 352 t. 15 f. 14, 15; — (*P.*) *xerampelinus* subsp. *laetus* n. (= *moellendorffi* Gredler nec Hilber), ibid. id. p. 354 t. 15 f. 17; — (*P.*) *platychilus* n. ibid., id. p. 354 t. 15 f. 18—20; mit subsp. *malleatus* n. ibid., id. p. 355; — (*P.*) *oxyconus* n. ibid., id. p. 355 t. 15 f. 21, 22; — (*Serina*) *microconus* n. ibid., id. p. 357 t. 16 f. 1, 2; — (*S.*) *diplochilus* n. ibid., id. p. 358 t. 16 f. 3, 4; — (*S.*) *solutus* n. Sytshuan; id. p. 361 t. 16 f. 15—18; mit subsp. *stenochilus* n. ibid. p. 362; — (*Holeauchen* n.) *rhabdites* subsp. *aculus* n. Gansu; id. p. 363 t. 16 f. 21, 22; — (*rhusius* n. Sy-tschuan; id. p. 364 t. 16 f. 26, 27; — (*H.*) *clausiliiformis* n. ibid., id. p. 364 t. 16 f. 28, 29; — (*H.*) *rhaphis* n. ibid., id. p. 365 t. 16 f. 30, 31; — (*H.*) *micropreas* n. ibid., id. p. 366 t. 16 f. 32, 33; — (*H.*) *sulcatus* n. Gansu; id. p. 366 t. 16 f. 34—36; — (*H.*) *entocraspedius* n. Sytshuan;

id. p. 367 t. 16 f. 37; — (H.) strangulatus n. Gansu; id. p. 367 t. 16 f. 38—40; — (*Clausiliopsis* n.) phaeoraphe n. Gansu; id. p. 371 t. 17 f. 3—5; — (Cl.) clathratus n. ibid., id. p. 371 t. 17 f. 6—8; — (Cl.) elamellatus n. ibid., id. p. 372 t. 17 f. 9—11; — (Cl.) buechneri n. ibid., id. p. 372 t. 17 f. 11, 13; — (Cl.) kobelti n. Sytshuan; id. p. 373 t. 17 f. 14, 15; — (*Pupopsis*) torquilla n. Gansu; id. p. 376 t. 17 f. 19, 20; — (P.) soleniscus n. ibid., id. p. 376 t. 17 f. 21, 22; — (*Lophauchen* n.) cristatellus n. Gansu; id. p. 377 t. 17 f. 23—25; — (*Coccoderma* n.) granifer n. Sytschuan; id. p. 379; — (*Mirus*) reinianus var. hokkaidonis n. Hokkaido, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 402; — roseni n. Turkestan; **Kobelt** 1901 Mart. Chemn. p. 704 t. 105 f. 7, 8; — schuschaënsis n. Karabagh, Transkaukasien, id. p. 727 t. 107 f. 9, 10; — (*Napaeus*) silvestris n. Zentralasien; **Rosen** 1904 Nachrbl. p. 109; — (N.) karagoianus n. ibid., id. p. 109.

Kobelt hat in den Berichtsjahren 1901 u. 1902 die Monographie der Buliminidae zu Ende geführt und im Verein mit **Moellendorff** einen Katalog derselben (Nachrbl. 1903) herausgegeben. — In der Monographie sind zum erstenmal abgebildet: (*Petraeus*) *exquisitus* Naegele t. 104 f. 1—4 (auch Icon. IX. 1627, 1628); — (Ena) *andersonianus* Mlldff. t. 104 f. 5, 6; — *rarus* Naegele (= *eliae* Naegele nec Kobelt) t. 104 f. 7—9; Ic. 1638; — (*Mastus*) *hispalensis* West. t. 104 f. 10, 11; Ic. 1654; — (*Petraeus*) *naegelei* Bttg. t. 104 f. 12—15; Ic. 1625, 1626; — *acbensis* Naegele t. 104 f. 16, 17; Ic. 1631; — (*Subzebr.*) *kasnakowi* Westerl. t. 105 f. 3, 4; — (*S.*) *otostomus* Westerl. t. 105, f. 5, 6; — (*Chondrulopsis*) *drymaeus* Westerl. t. 105 f. 9—11; — (*Mastoides*) *errans* Westerl. t. 105 f. 12, 13; — (*Pseudopod*) *diplus* Westerl. t. 105 f. 17, 18; Ic. 1646; — (*Subz.*) *warentzowi* Rosen t. 105 f. 22, 23; — (*Chondrula*) *pindica* Westerl. t. 105 f. 24, 25; Ic. 1632; — (*Ch.*) *munitus* Westerl. t. 105 f. 26, 27; Ic. 1633; — (*Mastus*) *giurieus* Westerl. t. 105 f. 28, 29; Ic. 1635; — (Ena) *callistoderma* Psbry t. 106 f. 4, 5; — (*Napaeus*) *djurjdurensis* Ancey t. 106 f. 10, 11; — (N.) *hilberi* Gredler = *anceyi* Gredl. nec Hilber = *postumus* Gredl. t. 106 f. 17, 18; — (*Mirus*) *cantori* var. *taivanicus* Mlldff. t. 107 f. 7, 8; — (*Chondrula*) *libanica* Naegele t. 107 f. 11, 12; — (*Ch.*) *limbodontatus* var. *ajax* Westerl. t. 107 f. 15—17; — var. *consobrinus* Westerl. t. 107 f. 18, 19; — (*Amphiscopus*) *continens* Rosen t. 107 f. 20, 21; Ic. 1662; — (*Ch.*) *sodalis* Westerl. t. 107 f. 22, 23; — (*Ch.*) *oribatha* West. t. 107 f. 24, 25; Ic. 1658; — (*Ch.*) *sexdentatus* Naegele t. 107 f. 26, 27; — miser var. *misellus* Westerl. t. 107 f. 28, 29; Ic. 1660; — (*Brephulus*) *narcissei* Galland t. 118 f. 3—5; Ic. 1665; — (*Amphiscopus*) *eudoxinus* Naegele t. 118 f. 6, 7; Ic. 1663; — (*Medea*) *raddei* var. *minor* n. p. 807 t. 118 f. 8, 9; — (*Petraeus*) *egregius* Naegele mss., p. 808 t. 118 f. 12—14; Icon. 1725; — (*Zebrinus*) *purus sinistrorsus* Naeg. t. 118 f. 15, 16; — (*Subzebrinus*) *nippensis* Mlldff. t. 108 f. 20—22; — (*Coccoderma*) *glandula* var. *camarota* Mlldff. Java; p. 886 t. 126 f. 19, 20; — (*C.*) *thraustes* Mlldff. t. 126 f. 21, 22; — (Ena) *tenggericus* Mlldff. t. 126 f. 25, 26; — (*Mastus*) *robustus* Naegele t. 12S f. 14, 15; — (*Coccoderma*) *prillwitzii* Mlldff. t. 128 f. 16, 17; — (*Pseudonapaeus*) *scalaris* Naegele t. 128 f. 18, 19; — (Ena) *hanleyanus* n. Nilgiris; id. p. 931 t. 131, f. 3—5; — (*Serinus*) *prostomus* Ancey t. 131 f. 8—10; — (*Subzebrinus*) *mainwaringianus* n. Nevill mss., id. p. 937 t. 132 f. 1, 2; — (*Subg.*) *kuluensis* West-Himalaya; id. p. 938 t. 132 f. 3, 4; — (*S.*) *tandjanensis* n. ibid., id. p. 939 t. 132 f. 5, 6; — (*S.*) *beddomeanus* n. Nev. mss., ibid., id. p. 939 t. 132 f. 15, 16; — (*Zebrina*) *funkei*

Bttg. p. 952 t. 133 f. 10, 11; — (Ena) krueperi Boettger t. 133 f. 14, 15; — (Ch.) foveicollis Bttg. t. 133 f. 16, 17.

(Mastus) giuricus n. Giura, Sporaden; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 40; — (Chondr.) limboidentatus var. ajax n. und var. consobrinus n. Cypern; id. p. 41; — sodalis n. ibid. id. p. 42.

Bothriembryon (Pilsbry) martensi n. Neuholand; **Kobelt** 1901 Mart. Ch. p. 764 t. 112 f. 3, 4; — durus n. ?; id. p. 930 t. 131 f. 1, 2.

Cerastus (Albers) erlangeri n. Gara Mulata Abessynien; **Kobelt** 1901 Nachrbl. p. 86; M. Ch. t. 109 f. 1—3; — malleatus n. Harrar; id. p. 87; M. Ch. t. 109 f. 9, 10; — neumannni n. ibid., id. p. 88; M. Ch. t. 110 f. 3, 4; — rüppellianus n. Gara Mnlata; id. p. 89 M. Ch. t. 110 f. 5, 6; — erlangeri n. Gara Mnlata, Abessynien; id. M. Ch. p. 735 t. 109 f. 1—3; — bambuseti Marts. t. 127 f. 1—3; var. ukingensis n. ibid. t. 127 f. 4, 5; — arctistrius n. Martens mss. Massagebiet, D. O. Afrika; id. p. 891 t. 127 f. 10, 12; — schweinfurthi n. Martens mss., Menaha, Südarambien; id. p. 893 t. 127 f. 19—21; var. menahensis n. p. 894 t. 127 f. 22, 23; — tenuis n. ?; id. p. 932 t. 131 f. 6, 7; — anshawi n. Senna bei Aden; **Sykes** 1902 Pr. mal. Soc. V p. 338, Textfig.; — logariensis n. Britisch Ostafrika; **Smith** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 68, Textfig.

Rachis (Albers) fülleborni n. südliches Deutsch-Ost-Afrika; **Martens** Nachrbl. p. 148; abgeb. bei **Kobelt** M. Ch. t. 110 f. 23, 24; — succinctus Marts. desgl. t. 111 f. 9—11; — zonulatus var. lombocensis, abgeb. t. 110 f. 14, 15; — sanguineus Barcl. desgl. t. 110 f. 20—22; — dimerus n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1901 Ann. N. H. VII t. 2 f. 13.

Pupinidius subgen. nov. Bulimini; **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. p. 341 (t. aut concolor aut distanter strigata, interdum taeniata; anfractus superiores conum latinsculum apice mucronato efficienes, ultimi 2 plus minusve deviantes, habitum generis Pupinae imitantes; peristoma late expansum, plerumque reflexiusculum). Typus Br. pupinidius n.

Petraeomastus nov. subgen. Bulimini; **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. p. 348 (t. superne conico-acuminata, subtus plus minusve subcylindrica, plus minusve nitens; peristoma late expansum, marginibus conniventibus callo junctis; nodulus distinctus). Typus B. heudeanus Ancey.

Coccoderma nov. subg. Bulimini; **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. p. 378 (t. tenuis, granulosa; peristoma tenuis; nodulus nullus). Typus B. granulosus Mlldff.

Holcauchen nov. subg. Bulimini; **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. p. 362 (t. graciliter turrita, anfractus ultimus dorso sulco spirali plus minusve impresso munitus, cui interdum lamella parietalis correspondet). Typus B. sulcatus Mlldff.

Clausiopsis nov. subg. Bulimini; **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. p. 368 (t. elongata, fusiformis aut subfusiformis, columella intus lamellata, paries dente a margine remoto, interdum obsoleto munitus, lamella palatales in meram taeniolam obsoleta). Typus B. szecsenyi Bttg.

Pachnodus (Albers) burnupi n. Zululand, Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. XIII p. 605 t. 31 f. 5.

Stenogyridae.

Clavator (Montf.) heimburgi n. Madagaskar; **Kobelt** 1901 Nachrbl. p. 96; M. Ch. t. 107 f. 13, 14.

Curvella (Smith) *calloglypta* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1901 Ann. N. H. VIII p. 320 t. 2 f. 12.

Hypolysia n. gen. *Stenogyridarum* für *H. florentiae* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1901 Ann. N. H. p. 318 t. 2 f. 8 (*T. gracilis*, *fusiformis*, *attenuata*, sicut in *Subulina*, sed apud suturas undique incrassata; anfractu ultimo anguste sed distinete evoluto).

Leptinaria (Shuttle.) *tamaulipensis* n. Tamaulipas; **Pilsbry** 1903 Pr. Philad. p. 776 t. 50 f. 8.

Neobeliscus Pilsbry anatomisch zunächst mit *Atopocochlis exaratns* verwandt; **Pilsbry** 1901 Pr. Philad. p. 142.

Obeliscus (Beck) *lynnaeformis* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1901 Ann. nat. Hist. VIII p. 317 t. 2 f. 5.

Opeas (Alb.) *amodoanum* n. Gansu; **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. p. 390; — *lenta* n. Ost-Uganda; **Smith** 1903 J. C. Leeds X p. 319 t. 4 f. 20; — *venusta* n. ibid., id. p. 319 t. 4 f. 21; — *crenulata* n. Uganda; **Smith** 1901 J. Mal. VIII p. 96; Textfig. 6; — *brevispira* n. Harima, Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 637; — *kyotoensis* n. Kyoto, ibid., id. p. 637; — *obesispira* n. Liukius; id. p. 638; — *henshawi* n. Hawaii; **Sykes** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 112 Textfig. 2; — *prestoni* var. *hawaiensis* n. ibid., id. p. 113 Textfig. 3; — *macbeani* n. Transvaal; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. XII p. 604 t. 31 f. 8; — *rhoodsae*, *odiosum*, *patzcuarens* abgeb. bei **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 775, Textfig.

Perrieria (Tapp-Can.) *canefriana* n. Obi; **Sykes** J. Mal. v. 11 p. 91 fig.

Plicaxis nom. nov. für *Rhodina de Morgan* nec *Guénée*; **Sykes** 1903 J. Mal. X p. 1.

Prosopeas (Moerch) *macilentum* n. Ancey mss., Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 J. Conch. v. 51 p. 220 t. 9 f. 23, 24.

Rhodina (Morgan) ? *mirabilis* n. Kelantan, Malakka; **Sykes** 1902 J. Mal. IX p. 22. — (Der Name, bei *Guénée* präoccupiert, wird von demselben 1903 J. Mal. X p. 1 in *Plicaxis* umgeändert).

Rhodea (Ad.). **Sykes** 1901 J. Mal. VIII p. 20 giebt ein Verzeichniss der bekannten (8) Spezies.

Spiraxis (C. B. Ad.) *pilsbryi* n. Ancey mss., Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 J. Conch. v. 51 p. 218 t. 9 f. 15, 16; — *permira* n. Ancey mss. ibid., iid. p. 219 t. 9 f. 17—20, mit var. *multiplicata* t. 9 f. 21—22; — *borealis* n. Mexiko; **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 775 t. 50 f. 6; — *uruapamensis* Psbry. abgeb. ibid. p. 775, Textfig.

Subulina (Schum.) *uncta* n. Lagari, Britisch-Ost-Afrika; **Smith** 1903 J. C. Leeds X p. 318 t. 4 f. 18; — *dohertyi* n. Uganda; id. p. 319 t. 4 f. 19; — *purcelli* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1901 Ann. N. H. VII p. 317 t. 2 f. 6; — *strigilis* n. ibid., iid. p. 318 t. 2 f. 7; — *lagariensis* n. Britisch-Ostafrika; **Smith** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 69 t. f.; — *kassaiana* n. Kassaigebiet, Centralafrika; **Rochebrune & Germain** Bull. Mus. Paris v. 10 p. 142.

Stenogyra (Swains) *retteri* n. Rosen mss.; **Kobelt** 1904 Nachrbl. p. 87.

Tornatellina (Beck) *kitaiwojimana* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Nautil. XVII p. 53; — *macromphala* n. Maui, Oahu, Ancey 1903 J. Conch. v. 51 p. 296 t. 12 f. 3, 4; — *baldwini* Ancey abgeb. ibid. t. 12 f. 1, 2; — *cincta* n. Sandwichinseln; id. p. 297 t. 12 f. 5, 6; — *abbreviata* n. Maui; id. p. 298 t. 12 f. 7, 8; — *henshawi* n. Hawaii; id. p. 299 t. 12 f. 9, 10; — *procerula* n. Maui; id.

p. 302 t. 12 f. 13, 14; — subangulata n. *ibid.*, id. p. 303 t. 12 f. 15, 16; — terebra n. *ibid.*, id. p. 303 t. 12 f. 17, 18; — pyramidata n., Hawaii; id. p. 304 t. 12 f. 19, 20; — macroptychia n. *ibid.*, id. p. 305 t. 12 f. 21, 22; — fusca u. *ibid.*, id. p. 306 t. 12 f. 23, 24.

Pupidae.

Anisoloma n. subg. Pupae für *P. ponsonbyana* und Verwandte von Südafrika; *Ancey* 1901 J. C. p. 140.

Bifidaria (Sterki) *armigerella* var. *luchuana* n. Okinawa, Liukiu; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 484 t. 28 f. 54; — *macleayi* Braz. zuerst abgeb. bei **Hedley** Pr. L. S. N. S. Wales v. 27, Textfig.

Boysidia (Bens.) *kelantanense* n. Kelantan; **Sykes** 1902 J. Mal. IX p. 61 t. 3 f. 61; — *messageri* n. Tongking; **Bavay & Dautzenberg** 1903 J. C. v. 51 p. 211 t. 9 f. 1—4; — *gereti* n. *ibid.*, iid. p. 212 t. 9 f. 5—8.

Coryna (Hartm.) *biarmata* var., Höhle bei Zavala; **Sturany** 1904 Nachrbl. v. 36 p. 106, Textfig.

Fauxulus (Ad.) *Macbeanianus* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1901 Ann. N. H. VIII p. 319 t. 2 f. 1; — *crawfordianus* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. XII p. 605 t. 31 f. 6.

Hypselostoma (Benson) *crossei* subsp. *endodonta* n. und *brevituba* n., Langson, Tongking; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 76; — *hupeanum* n. Hupe, China; **Gredler** 1901 Nachrbl. p. 151; — *laidlawi* n. Jalor, Malacca; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 83 t. 5 f. 29, 30.

Lyropupa (Bttg.) *clathratula* n. Hawaii; *Ancey* 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 125 t. 7 f. 19; — *carbonaria* n. *ibid.*, id. p. 125 t. 7 f. 21; — *mirabilis* n. *ibid.*, id. p. 126 t. 7 f. 18; — *microthauma* n. *ibid.*, id. p. 126 t. 7 f. 20; — *perlonga* Pease zuerst abgeb. *ibid.* t. 7 f. 15.

Nesopupa (Pilsbry) *dedecora* n., Japan; **Pilsbry** 1902 Pr. Philad. p. 31; — *tamegonari* n. *ibid.*, id. 1903 Nautilus XVII p. 118; — *baldwini* n. Hawaii *Ancey* 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 122 t. 7 f. 13; — *plicifera* n. *ibid.*, id. p. 122 t. 7 f. 14; — *thaanumi* n. *ibid.*, id. p. 123; — *wesleyana* n. *ibid.*, id. p. 123 t. 7 f. 16; — *kauaiensis* n. Kauai; id. p. 124 t. 7 f. 7.

?*Pholeoteras* n. gen. für eine seltsame neue Höhlenschnecke aus der Herzogowina (enthrix); **Sturany** 1904 Nachrbl. vol. 36 p. 106, Textfig. — Die Stellung bei den Pupiden wegen der Gitterskulptur unsicher.

Pupa (Drp.) *vergniesiana* var. *provida* n. Pyrenäen; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 39; — *cadica* n. Fagot mss., id. p. 39; — *tuxensis* n. Fagot mss., Tuxon, Catalonië; id. p. 40; — *insulivaga* n. Osume, Liukius; **Pilsbry & Hirase** 1904 Pr. Phil. p. 631; — *endoplax* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1901 Ann. N. H. VIII p. 319 t. 2 f. 10; — *ridibunda* n. *ibid.*, iid. p. 320 t. 2 f. 11.

Pupilla (Leach) *muscorum* subsp. *asiatica* n. Hochasien; **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. p. 381; — *heudeana* subsp. *grandis* n. Gausu; id. p. 381.

Vertigo (Müll.) *hirasei* n. Kiusiu; **Pilsbry** 1901 Nautil. XIV p. 128; Pr. Phil. t. 28 f. 53; — *japonica* n. Japan; **Pilsbry & Hirase** 1903 Nautilus XVII p. 118; — *hirasei* var. *glans* und var. *okinerabuensis* n. *ibid.*, iid. 1904 Pr. Phil. p. 631.

Clausiliidae.

Clausilia (Drp.) *leonisorum* n. Creta; **Boettger** 1901 Nachrbl. p. 127; — *staundingeri* Bttg. zuerst abgeb. bei **Kobelt** Icon. IX no. 1617; — (*Euxinastra*) *dilatata* n. Samsun; **Westerlund** 1901 Syn. p. 25; — (*Euxina*) *mordella* n. Chios; id. p. 31; — (*Micropontica*) *roseni* n. Kaukasus; id. p. 52; — (*Medora*) *matalici* n. Herzegowina; **Sturany** Ann. Hofmns. 1902 p. 67; — (*Euxina*) *cilicica* n., *Cilicien*; **Naegele** Nachrbl. 1902 p. 7; — *wiedermayeri* n. Tirol; **Gredler** 1902 Nachrbl. p. 17; — (*Albinaria*) *heterochroa*, *arcadica*, *menelaos*, abgebild. bei **Sturany**, Verh. Wien 51, Textfig.; — *porroi* var. *expansa* n. Corsica; **Caziot** 1903 Corse p. 288; — (*Serrulina*) *collari* n. Korfu; **Sturany** 1904 Nachrbl. p. 104, Textfig.; — (*Albinaria*) *holtzi* n. Candia; id. p. 110, Textfig.; — (*Oligoptychia*) *bicarinata* var. *tessellata* n. Sindik, Cilicien; **Naegele** 1903 Nachrbl. p. 176; — *filialis* n. Ost-Borneo; **Martens** 1903 SB. Ges. Berlin p. 425.

Nenia (Adams) *huancabambensis* n. Huancabamba, Peru; **Rolle** 1904 Nachrbl. p. 39 t. 5 f. 6; — *pilsbryi* n. Collanga, Peru; **Sykes** 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 222 Textfig. II.

Phaedusa (Adams) *eurystoma* (*Stereostoma*) subsp. *brachyptycha* n. Nippon; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 41; — (*Megalophaedusa*) *fultoni* subsp. *clavula* ibid., id. p. 41; — (*Hemiphaedusa*) *breviluna* n. Awadshi, Japan; id. p. 43; — (*H.*) *omiensis* n. Omi auf Kiushiu; id. p. 42; — (*Rufospira*) *mansonensis* n. Mansongebirge; **Moellendorff** 1901 Nachrbl. p. 76; — (*Hemiphaedusa*) *diplochilus* n. ibid., id. p. 77; — (*H.*) *falciformis* subsp. *montana* n. ibid., id. p. 77; — (*H.*) *gastrum* n. ibid., id. p. 77; subsp. *ventriculus* n. ibid. p. 78; — (*H.*) *gastrodes* n. ibid., id. p. 78; — (*H.*) *grangeri* subsp. *apiostoma* n. ibid., id. p. 78, subsp. *lyteostoma* p. 79; — (*H.*) *gisota* var. *platyloma* n. ibid., id. p. 79; — (*Oospira*) *rhopaloides* n. Tongking; id. p. 115; var. *leptospira* n., *microtbyra* n., *kebarica* n. ibid., id. p. 116; — (*Pseudonenia*) *stenothyra* n. ibid., id. p. 116; — *hensiensis* n. Hensan, Prov. Hunan, China; **Gredler** 1901 Nachrbl. p. 153; — (*Eup.*) *beresowskii* n. Sytschuan; **Moellendorff** 1901 Ann. Petersb. p. 386 t. 17 f. 31—33; — (*Hemiphaedusa*) *potanini* n. ibid., id. p. 388 t. 17 f. 28—30; — (*Luchuphaedusa* n.) *callistochila* n. Okinawa, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 413 t. 22 f. 1—3; — (*L.*) *nesiothaura* n. Oshima; id. p. 414 t. 22 f. 19—21; — (*L.*) *oshimae* n. ibid., id. p. 415 t. 22 f. 5, 6; — (*L.*) *pseudoshimae* n. ibid., id. p. 416 t. 22 f. 7—10; — (*L.*) *mima* n. ibid., id. p. 417 t. 23 f. 37—39; — (*Hemiphaedusa*) *crenilabrum* n. Okinawa; id. p. 421 t. 23 f. 26—29; — (*H.*) *munus* n. Oshima; id. p. 423 t. 23 f. 34—36; — (*Tyrannophaedusa*) *joptyx* var. *clava* n. Awaji, Japan; **Pilsbry** 1901 Naut. XIV p. 108; Pr. Phil. t. 27 f. 36, 37; — (*T.*) *micropreas* var. *perpallida* n. Uzen, Japan; id. Naut. p. 108; Pr. Phil. t. 28 f. 50—52; var. *hokkaidensis* n. Hokkaido; id. Naut. p. 108; Pr. Phil. t. 28 f. 47—49; — (*T.*) *harimensis* n. Harima, Japan; id. Naut. p. 108; Pr. Phil. t. 26 f. 16—18; — (*T.*) *perignobilis* n. Shikoku; id. Pr. Phil. p. 481 t. 26 f. 13—15; var. *kochiensis* n. p. 482; — (*Stereophaedusa*) *japonica* var. *perobscura* n. Buzen, Japan; id. p. 482; — (*Megalophaedusa*) *hiraseana* n. Okinoshima; id. p. 483 t. 26 f. 24—26; — (*Hemiphaedusa*) *oscariana* n. Kiusiu; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 499 t. 36 f. 30, 31; — (*H.*) *higoensis* n. Higo, Kiusiu; id. p. 499 t. 39 f. 1—4; — (*H.*) *ischna* n. mit var. *neptis* n. Tosa, Japan; id. p. 500 t. 35 f. 15, 16; — (*H.*) *tanegashimae* n. Tanegashima, Liukiu; id. p. 500 t. 37 f. 32—34; — (*H.*) *ptychoeyma* n. mit var. *yacushima* n. ibid., id. p. 501

t. 35 f. 7—11; — (H.) entospira n. ibid., id. p. 501; t. 39 f. 72—75; — (H.) pinto n. ibid., id. p. 501 t. 35 f. 12—14; — stereoma n. Yakushima, Liu-kuu; id. p. 502 t. 39 f. 70, 71; — (Reinia) variegata var. nesiotica n. Hachyo Island, Japan; id. p. 474; — (Zaptyx) hachyoensis n. Hachyo-Insel, Japan; id. p. 466 t. 28 f. 39, 40; — (Euphaedusa) tryoni n. ibid., id. p. 467 t. 25 f. 1—3; — (Eu.) euholostoma n. Puruga; id. Naut. p. 108; Pr. Phil. t. 25 f. 6—8; — (H.) sericina var. rhopalia n. Suruga; id. p. 624; — (H.) surugensis n. ibid., id. p. 633 t. 36 f. 25—27; — (Tyr.) oxyeyima n. Satsuma; id. p. 634 t. 37 f. 35—38; — (T.) orthotracta n. Prov. Mino; id. p. 636 t. 37 f. 44—46; — (Ster.) addisoni n. Süd-Kiusiu; id. p. 641 t. 38 f. 56, 57; — (Ster.) jacobiana n. Tane-ga-shima; id. p. 641 t. 38 f. 58—62, t. 39 f. 66—69; — (Ster.) stereoma var. cognata n. ibid., id. p. 644; var. nugax n. t. 39 f. 78, 79; — (Eu.) holotrema n. Nachi, Kii; id. p. 654; — (Eu.) subignobilis n. Hizen; id. p. 655; — (H.) tantilla n. Goto, Uzen; id. p. 655; — (H.) aulacopoma n. Hizen; id. p. 656; — (H.) bigeneris n. Goto, Uzen; id. p. 656; — (F.) dalli n. Shikoku; id. p. 656; — (Ster.) una n. Goto, Uzen; id. p. 656; — (Pseudonenia) kelantanensis n. Kelantan, Malakka; Sykes 1902 J. Mal. IX p. 22. — (Hemiphaedusa) sadoensis n. Japan; Pilsbry 1903 Pr. Phil. p. 305 t. 14 f. 6—10; — (H.) shikokuensis var. inskuchiensis n. ibid., id. p. 316; — (H.) sus n. ibid., id. p. 316 t. 14 f. 1—5; — (H.) aratorum n. ibid., id. p. 316 t. 14 f. 15—18; — (H.) aenea n. ibid., id. p. 316 t. 14 f. 15—18; — (H.) bilabrata var. tosaensis n. ibid., id. p. 318; — (Sterephaedusa) echigoensis n. ibid., id. p. 318; — (St.) japonica var. perstriata n. ibid., id. p. 319; — duella Mab. zuerst abgebildet bei Bavay & Dautzenberg 1903 J. C. v. 51 t. 9 f. 12—14; — filialis n. Ost-Borneo; Martens 1903 SB. Ges. Berlin p. 425; — auregani n. (= fargesiana Bavay & Dautz. nec Heude = dautzenbergi Mldff. (Sykes nec Morlet) Tongking; Bavay & Dautzenberg 1903 J. C. v. 53 p. 213 t. 9 f. 9—11.

Temesa (H. & A. Ad.) magnifica n. Sorato, Bolivia; Sykes 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 222, Textfig. III; — clausilioides Roc. abgebildet ibid. Textfig. II.

Exbalea Jouss. = Temesa Ad.; Sykes 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 220.

Zaptyx Pilsbr. bildet ein eigenes Phylum von Phaedusa, das besonders auf den Liukiu (Ryukyu)-Inseln entwickelt ist, mit 7 Sektionen, von denen Stammbaum und Schlüssel gegeben werden; Pilsbry 1904 Pr. Phil. p. 823;

Hemizaptyx n. sect. p. 824 (Differs from Zaptyx in lacking sutural plicae and accessory lamellae, and often in the texture of the shells; they are all small, mostly under 11 mm long). Typus Cl. pinto Psbry.

Metazaptyx n. sect. Pilsbry 1904 p. 831 (Similar to Zaptyx, except that the inferior lamella ascends spirally within and in the mouth is visible as a fold approaching the superior lamella; the base of the shell is somewhat sack-like. The clausilium is broad, strongly curved distally, shorter than that of Zaptyx, and rounded at the apex). Typus Claus. hachyoensis Psbry.

Parazaptyx n. sect., Pilsbry 1904 p. 834 (the shell is similar to Zaptyx, except that the inferior and subcolumellar lamellae ascend spirally, as in Metazaptyx; fulcrum and parallel lamella and sutural plicae are absent. The Clau-silium is wide, tapers strongly to the apex, and is strengthened by a transverse lamellar rib on the convex side). Typus: P. thaumatopoma n.

Oligozaptyx n. sect., Pilsbry 1904 p. 835 (the shell is very small, fusiform, with no superior lamella. The inferior lamella forms a squarish fold in the

throat and the subcolumellar lamella is obsolete below. There is a long palatal plica and a short upper united with the lunella. Sutural plicae and a lamella fulcrans are developed. The clausilium is notched on the palatal side of the projecting apex and excised on the columellar side of the filament). Typus C. *hedleyi* n.

Diceratoptyx n. sect. *Phaedusae*; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 836 (the glossy shell is zaptychoid, the superior lamella developed, inferior lamella receding, calloused below. Subcolumellar lamella rising high on the palatal wall, dilated in a lateral position. Upper palatal plica very long, an extremely short lunella descending from near its inner end. Lamella fulcrans et paralella and sutural plicae are developed. Clausilium deeply excised as usual at the filament, and with a deep notch excavated near the apex on the palatal side). Typus D. *cladoptyx* n.

Luchuphaedusa nov. subg. *Phaedusae*; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 411. (Shell fusiform, the right margin of the peristome usually crenate, outer margin excavated above to form a sinulus, superior lamella marginal, projecting, continuous with the long spiral lamella; inferior lamella strongly spiral within, calloused below; subcolumellar lamella dilated adjacent to the very long and strong lower present; principal plica long; upper palatal plica developed, sometimes coalescent with the lunella. Clausilium wide, truncated or notched distally, and with a thickened lobe or finger-like process on the columellar side of the apex standing at nearly a right angle with the body of the plate). — Typus ?. Erste Art: *Th. callistochila* n. — Cfr. id. Pr. Phil. p. 816

Nesiophaedusa n. sect. *Phaedusae*; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 815 (*Phaedusoid* *Clausiliae* of normal contour, with a tendency to weak interlamellar plication; inferior lamella prominent in the mouth, spirally ascending, thick, sometimes indistinctly doubled within; palatal armature lateral, the lunella arising from the middle of a strong lower palatal plica, and curving inward above in a short upper palatal plica. Clausilium very convex on the palatal side, tapering distally to a blunt, thickened apex, channelled on the outer face). — Typus: *Clausilia bernardii* Pfr.

Ophaedusa n. sect. *Phaedusae*; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 820 (the clausilium is well curved, spatulate, with a thick rib near the columellar side of the distal half, continued and finger-like at the apex; the shell is short, oblong, of few whorls (6—6½ in the species known), the summit very obtuse, entire. Superior continuous with the spiral lamella. Inferior lamella strongly spiral within, bifid below. Upper and lower palatal plicae long, the latter united with an oblique lunella). Typus: *Claus. ophidoön* n.

Urocoptidae.

Pilsbry gibt in vol. 15 von Tryons Manual die Monographie der Familie, welche er in zwei Unterfamilien scheidet, *Eucalodiinae* vom Festland. und *Urocoptinae* von den westindischen Inseln und Süd-Florida; eine Ausnahme bildet nur *Archegocoptis* von Haiti.

Archegocoptis n. gen. *Eucalodiinarum* für *A. eximia* Pfr. und *A. crenatum* Weinl. & Mrts., beide von West-Haiti, anatomisch von allen Westindiern verschieden; **Pilsbry** Manual 1903 p. 301

Autocoptis n. subg. *Urocoptidis*; **Pilsbry** 1902 Manual p. 112; (Shell rather large, capacious, the axis straight and simple, its base encircled in the last whorl by a low ridge, sometimes united with axis). Typus *U. monilifera*.

Coelocentrum (Crosse & Fischer) *arctispira* var. *estefaniae* n. Misautla, Mexiko; **Pilsbry** Manual p. 43 t. 14 f. 28—32; — *dispar* n. Guatemala; id. p. 44 t. 17 f. 16—19; — *astrophorea* Dall (= *acanthophorea* Marts. Biol. amer. p. 634) ibid. p. 45; — (*Elasmocentrum* n.) *exlex* n. Mexiko; id. p. 50 t. 17 f. 20—23.

Eucalodium (Crosse & Fischer) *hippocastaneum* Dall, zuerst abgebildet bei **Pilsbry** Manual t. 1 f. 6—9.

Elasmocentrum n. subg. *Coelocentri*, **Pilsbry** 1902 Manual p. 50; (Like typical *Coelocentrum* in the general form and the large hollow column; but the latter is smooth externally, and in the last two whorls there runs a spiral lamella like that developed in *Anisospira*). Typus *C. exlex* n.

Haplocion n. subg. *Holospirae*; **Pilsbry** 1902 Manual p. 89 (Internal axis smooth, the interior of the whorls without plaits or lamellae; latter part of the last whorl straighthened, not sinuous; the aperture not obstructed by folds or prominences of any kind). — Typus *H. paxonis* Dall.

Fibricutis n. sect. *Gongylostomatis*, **Pilsbry** 1903 Manual p. 186. (Shell small, cylindric, truncate, roughly striate and crenate at the sutures, with a spinose axial lamella; the rejected whorls numerous, forming a slender, attenuate spira; 2 $\frac{3}{4}$ nepionic whorls vertically costulate). Typus *Ur. scabrosa* Gld.

Paracollonia n. sect. *Gongylostomatis*; **Pilsbry** 1902 Manual p. 197 (with 3 axial lamellae subequal in the median whorls; the lower lamella denticulate, at least in the upper whorls; basal keel of the last whorl week). Typus *U. albocrenata*.

Tetrentodon n. sect. *Gongylostomatis*; **Pilsbry** 1903 Manual p. 267 (Sh. attenuate, entire or short truncate, the neck cylindric, rounded beneath; axis very weekly one- or two-plicate, the spirals not crenulate; apex swollen, smooth). — Typus: *Ur. plicata* Poey.

Holospira (Marts.) *tetrelasmus* nom. nov. für *H. pilocerei* Pfr. Monogr. nec *Symbolae*; **Pilsbry** Manual p. 73; — *nelssoni* n. Sierra Guadeloupe, Mexiko; id. p. 79 t. 22 f. 42—44; — (*Coelostemma*) *dalli* n. ibid., id. p. 26 t. 26 f. 28—31; — (*C.*) *strebelineana* n. ibid.; id. t. 26 f. 24—27; — (*Haplostemma*) *hamiltoni* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 28 f. 2, 11.

Spirocoptis n. sect. *Gongylostomatis*; **Pilsbry** 1902 Manual p. 113 (Urocoptis with the shell rather large and stout, the internal pillar distinctly twisted or with a single smooth obtuse spiral plait). Typus *Ur. sanguinea* Pfr.

Spirostemma (*Pilsbry* & *Vanatta*) *bellevueensis* n. Jamaica; **Pilsbry** Manual p. 288 t. 34 a f. 7, 8 (= *propinqua* Vendries, nec *Arango*); — *inusitata* n. Jamaica; **Vendries**, 1901, *Nautilus* XV p. 1 t. 1 f. 1, 2; **Man.** t. 34 a f. 1, 2; — *ipswichensis* n. Jamaica; **Pilsbry** Manual p. 291 t. 35 f. 52—54; — (*Anoma*) *abnormis* n. ibid., **Vendries** 1901 *Nautilus* XV p. 3 t. 1 f. 5, 6; **Man.** t. 34 a f. 5, 6; — *pusilla* C. B. Ad. abg. **Manual** t. 37 f. 84—87.

Urocoptis (Beck) *lata* (*Spirocoptis* n.) var. *antonionis* n. Port Antonio, Jamaica; **Pilsbry** Manual p. 115 t. 30 f. 51, 52; var. *manchionealensis* n. Portland, ibid. id. p. 116 t. 29 f. 35—37; — subsp. *ischnosteile* n. Jamaica: id. p. 116 t. 30 f. 53, 54; — (*U. s. str.*) *ovata* var. *sanctaeannae* n. ibid., id. p. 127 t. 58 f. 65, 66, t. 32 f. 81; — (*U. s. str.*) *hendersoni* n. ibid., id. p. 127 t. 35 f. 55—58,

t. 32 f. 83; — (U. s. str.) baquieana subsp. pudica n. P. sbry. & Jarvis mss., ibid., id. p. 142 t. 35 f. 42—46; — (Arangia) sowerbyana var. montetoronis n. Haiti; id. p. 164 t. 44 f. 30; — (Cochlodinella) poeyana var. lacteoflua n. Pinar del Rio, Cuba; id. p. 179 t. 42 f. 85; — (C.) mixta Wright, zuerst abgeb. t. 42 f. 91, 92; — (C.) atropurpurea Arango, desgl. p. 181 t. 42 f. 96, 97; — (Pycnoptychia) humboldtiana var. peraffinis n. West-Cuba; id. p. 193 t. 47 f. 82—86; — (Lio-collonia) guirensis Gdl. zuerst abgebildet t. 48 f. 9, 10, 15; — (L.) oligomesns n. West-Cuba; id. p. 207 t. 48 f. 13; — (Gong. s. str.) gutierrezi Arango abgeb. t. 54 f. 72, 73; — (G.) elegans var. subelegans n. West-Cuba; id. p. 222 t. 53 f. 47—50; — (G.) fortis Gdl. abgeb. t. 53 f. 54—59; — (G.) fraterna n. West-Cuba; id. p. 228 t. 55 f. 1, 6; — (G.) capillacea Pfr. abgeb. t. 55 f. 5, 8; — (G.) hidalgoi var. brevicervix n. Pinar del Rio, Cuba; id. p. 248 t. 57 f. 44; — (G.) gonzalezi n. ibid., id. p. 248 t. 57 f. 43; — (G.) joaquinii n. ibid., id. p. 248 t. 64 f. 5, 6; — (G.) unguiculata Arango abgeb. t. 57 f. 52; — (G.) discors Poey desgl. t. 57 f. 42, 45; var. lagunillensis n. ibid., id. p. 250 t. 57 f. 47, 49; — (G.) dia-phana n. Wright mss., West-Cuba; id. p. 251 t. 57 f. 48; — (G.) affinis Pfr., abgeb. t. 57 f. 41; — (G.) heynemannii n. desgl. t. 58 f. 67, 68; — (G.) ventricosa var. abnormis n. Ost-Cuba; id. p. 262 t. 58 f. 57, 58; — (Trentodon n.) ischna n. West-Cuba; id. p. 271 t. 64 f. 9—11; — (T.) rugeli var. euglypta n. ibid., id. p. 276 t. 64 f. 4.

Cerionidae.

Pilsbry Manual XV p. 174 erhebt die Gattung zur Familie.

Cerion (Bolten) caymanense n. Grand Cayman Island; **Pilsbry** (Manual) p. 196 t. 44 f. 85, 86; — crassiusculum var. smithii n. Tanamo; id. p. 202 t. 32 f. 38; — torrei var. ornatum n. P. & V., Vita, Kuba; id. p. 208 t. 28 f. 41, 42; iostomum var. arangoi n. P. & V., Cuba; id. p. 211 t. 28 f. 45, 46; — longidens n. Cabo Cruz, Cuba; id. p. 212 t. 32 f. 23, 24; — stevensoni Dall. abgeb. t. 44 f. 70, 71; — ritchei var. vannostrandi n. P. & V. Bahamas; id. p. 252 t. 39 f. 2; — eximum var. fraternum n. Gun Cay; id. p. 265 t. 38 f. 79, 80; — bryanti var. pudicum n. Jnagua; id. p. 273 t. 46 f. 17, 18; — rubicundum var. heterodon n. Jnagna; id. p. 275 t. 45 f. 96—98.

Pilsbry Manual XV zieht von den Arten, die **Maynard** (Contrib. to Science I. 1889, II. 1894 & III. 1896) beschrieben, folgende ein: fusca, intermedia, copia, perplexa, glaber, parva, linea zu pannosa Mayn.; — festiva, acuta, nitela, picta zu laevigata Mayn.; — obscura zu sagratanum Pfr.; — faxoni zu johnsoni P. sbry.; — media zu mumia Pfr.; — scripta mit var. oblitterata, fastigata, eury-stoma mit var. ignota zu chrysalis Fer.; — grayi mit var. gigantea u. pumilia zu ritchiei Mayn.; — elongata zu eburnea Mayn.; — curtissi, thorndikei, cinerea mit varr. coryi, neglecta mit varr. carlotta, regula, bimarginata, pilsbryi, restricta, crassicostata zu glans Kstr.; — cylindrica, janthina, pallida zu rubicundum.

Achatinellidae.

Newcombia (Pfr.) costata n. Molokai; **Borcherding** 1901 Nachrbl. p. 57.

Baldwinia (Ancey). — **Ancey** 1901 J. C. p. 137 vertritt die Berechtigung dieser Gruppe gegenüber Sykes.

Partulina (Pfr.) *idae* n. Molokai; **Borcherding** 1901 Nachrbl. p. 52; — *schaubinslandi* n. ibid., id. p. 54; — *meyri* n. ibid., id. p. 55; — *macrodon* n. ibid., id. p. 56; — *physa* var. *phaeostoma* n. Hawaii; **Ancey** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 121.

Amastra (H. & A. Ad.) *henshawi* n. Hawaii; **Baldwin** 1903 Naut. XVII p. 34; — *saxicola* n. ibid., id. p. 34; — *senilis* n. ibid. (subfossil), id. p. 35; — *fossilis* n. ibid. (subfossil); id. p. 35; — *luctuosa* var. *sulphurea* n. Hawaii; **Ancey** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 121 t. 7 f. 9; — *henshawi* Baldw. abgeb. ibid. p. 121 t. 7 f. 10. — (*Kauaia*) *rex* n. Kauai; **Sykes** 1904 Ann. n. H. 14 p. 159, Textfig.

Auriculella (Pfr.) *malleata* n. Hawaii; **Ancey** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 120 t. 7 f. 12; — *canalifera* n. ibid., id. p. 121 t. 7 f. 11.

Carelia (X. & A. Ad.) *turricula* var. *azona* n. Hawaii; **Ancey** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 121; — *fuliginea* var. *suturalis* u. ibid., id. p. 122.

Veronicellidae.

Veronicella (Blainv.) *fruhstorferi* n. Mt. Mansson, Tongking; **Collinge** 1901 J. Mal. VIII p. 120; — *himerta* n. ibid., id. p. 121; — *agassizi* n. Tahiti; **Cockerell** 1901 Pr. S. Nat. Mus. v. 23 p. 835.

Urocyclidae.

Atoxon (Simroth) *erlangeri* n., Gallaland; **Simroth** 1903 Zool. Jahrb. XIX p. 700 t. 39 f. 29—31, t. 41 f. 115—118.

Spirotoxon (Simroth) *elegans* n. Kingani bei Dunde; **Simroth** 1903 Zool. Jahrb. XIX p. 702 t. 39 f. 27, t. 40 f. 51—55; — *stuhlmanni* n. Ostafrika; id. p. 704 t. 39 f. 28; — *neumanni* n. Doko?; id. p. 704 t. 39 f. 26, t. 40 f. 33—50.

Varania (n. gen.) *loennbergi* n. Kamerun (im Magen eines Warans gefunden); **Simroth** 1903 Zool. Jahrb. XIX p. 710 t. 39 f. 32.

Rathouisiidae.

Atopos (Simroth) *sarasini* n. Jalor, Malacca; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 87 t. 5 f. 40—42, 56—59, t. 6 f. 60—65; — *harmeri* n. ibid., id. p. 89 t. 5 f. 43—45; — *rugosus* n. ibid., id. p. 90 t. 5 f. 46—48; — *punctata* n. ibid., id. p. 90 t. 5 f. 49—52; — *laidlaiyi* n. ibid., id. p. 90 t. 5 f. 42—55.

Prisma (Simroth) *smithi* n. Neu-Guinea; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 130 t. 9 f. 1—3.

Padangia Babor subg. von *Prisma* Srth.; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 84.

Opelta (Moerch) *polypunctata* n. Tafelberg; **Collinge** 1901 Ann. S. Afr. p. 229 t. 14

Onchidiidae.

Onchidium (Buchan.) *burnupi* n. Umlaes Lagune, Natal; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 17 Textfig. 1, 2.

Oncidiella (Gray) *flavescens* n. Chatham Ins.; **Wissel** 1904 Zool. Jahrb. Syst. v. 20 p. 668.

Myotestidae.

Myotesta n. gen., Nacktschnecken mit eingeschlossener flacher, nicht spiraler, Schale, für M. *fruhstorferi* n. Tongking; **Collinge** 1901 J. Mal. VIII p. 118; — *punctata* n. ibid., id. p. 119; — *Ibid.* 1902 IX p. 12 t. 1 f. 1—11 giebt **Collinge** die Anatomie der beiden Arten und erhebt die Gattung zur Familie.

Ostracolethe n. gen., Simroth 1901 Zool. Anz. p. 62—64, nach Collinge J. Mal. IX wahrscheinlich mit Myotesta identisch; — fruhstorferi n. ibid., Tongking. Wird vom Autor auch als eigene Familie betrachtet. Vgl. Simroth 1902 Zool. Anz. p. 355.

Succineidae.

Succinea (Dip.) hirasei n. Hondo, Japan; Pilsbry 1901 Pr. Phil. p. 348; — ogosawarae n. Bonin Inseln; id. p. 195; — punctulispira n. ibid., id. p. 195; — sokotrensis n. Sokotra; Smith 1903 Sokotra p. 112 t. 13 f. 17; — ikiana n. Japan; Pilsbry & Hirase 1904 Naut. XVII p. 117; — kuhnsi n. Hawaii; Aneey 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 117 t. 7 f. 1; — casta var. orophila n. und var. henshawi n. ibid., id. p. 117; — tenerrima n. ibid., id. p. 118 t. 7 f. 2; — apicalis n. ibid., id. p. 118 t. 7 f. 18; — tetragona n. ibid., id. p. 119 t. 7 f. 4; — quadrata n. ibid., id. p. 119 t. 7 f. 5; — globispira Marts. abgeb. bei Martens 1901 Biol. Centr. amer. t. 44 f. 12; — brumpti n. Omo, Nilgebiet; Rochebrune & Germain 1904 Bull. Mus. Paris v. 10 p. 142; — wrighti Crosse = lauta Gould; Aneey 1904 J. de Conch. v. 52 p. 306.

II. Basommatophora.

a) Terrestria s. Geophila.

Auriculidae.

Die Monographie der Familie von Kobelt im Martini - Chemnitz ist im Jahre 1901 zum Abschluss gelangt.

Carychium (Müll.) javanum Mlldff. zuerst abgebildet bei Kobelt 1901 Mart. Ch. t. 31 f. 6; — cymatoplax n. Liukiu; Pilsbry 1901 Nautil. XV p. 23; — pessimum n. Japan; id. Pr. Phil. 1901 p. 502; — hachyoense n. Japan; Pilsbry 1902 Nautilus XVI p. 57; — pessimum var. boreale n. id. 1903 Nautil. XVII p. 119.

Cassidula (Fér.) plecotrematoides var. japonica n. Hirado, Japan; Moellendorff Nachrbl. 1901 p. 44.

Leuconopsis (Hedley) inermis n. Neusüdwales; Hedley 1901, in: Pr. N. S. Wales vol. XXV p. 722, Textfig.

Melampus (Montf.) ordinarius n. Südafrika; Melvill & Ponsonby 1901 p. 321 t. 2 f. 14; — strigosus n. Mexiko; Martens 1901 Biol. Centr. Amer. t. 43 f. 9.

Pedipes (Adans.) liratulus n. Australien?; Kobelt in: Mart. & Ch. p. 297 t. 33 f. 20, 21.

Limnaeidae.

Limnaea (Drp.) cucunorica n. Kukunoor; Moellendorff 1901 Ann. Petersb. p. 393 (mit var. minor und var. minima); — woodruffi n. Michigansee; Baker 1901 Bull. Chic. p. 229, Textfig.; — sikenbergeri n. Egypten; Pallary 1903 Bull. Egypte II p. 243, Textfig.; — hawaiensis Hawaii; Pilsbry 1903 Pr. Phil. p. 790 Textfig.; — aradasi Bourg. Corsica; Caziot 1903 Moll. Corse p. 256, Textfig.; — parva nom. nov. für parvula Locard nec Hazay; Caziot 1903 Moll. Corse p. 252; — palustris var. gracilispira n. Südostrussland; Lindholm 1903 Ann. St. Petersbourg VIII p. 343; — mars n. China; Jones &

Preston 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 141 Textfig. 2; — whartoni n. ibid., id. p. 142 Textfig. 1; — shantungensis n., Prov. Schantung ibid., id. p. 142 f. 4; — pettiti n. ibid., id. p. 142 f. 3; — rochebrunei n. Germain mss., Frankreich; **Rochebrune** 1904 Bull. Mus. Paris v. 10 p. 191; — randolphi u. Alaska; **Baker** 1904 Nautilus XVIII p. 63; — nimouleensis n. Weisser Nil; **Rochebrune** 1904 Bull. Mus. Paris v. 10 p. 141.

Omphalolimnus n. subg. *Limnaei* für *O. lagorii* n. (nom. nov.); **Dybowski** 1903 Nachrbl. p. 143.

Choanomphalus (Gerstfeldt) *bicarinatus* n. Angara, Sibirien; **Dybowski** 1901 Nachrbl. p. 120; *intermedius* n. ibid., id. p. 122; — *omphalotus* n. ibid., id. p. 122; — *cryptomphalus* n. ibid., id. p. 123. — *anomphalus* n. ibid., id. p. 123.

Physidae.

Physa (Drap.) *rhomboidea* n. Vereinigte Staaten; **Randall** 1901 Nautilus vol. XV p. 44; — *walkeri* n. ibid., id. p. 57; — *zuluensis* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. XII p. 606 t. 32 f. 4.

Physopsis (Kraus) *didieri* n. Weisser Nil; **Rochebrune & Germain** 1904 Bull. Mus. Paris vol. 10 p. 142.

Ameria (A. Adams) *obiana* n. Insel Obi; **Rolle** 1903 Nachrbl. p. 23; — *plicaxis* n. Obi; **Sykes** 1904 J. Malac. XI p. 92 fig.

Isidora (Ehrbg.) *compta* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. XII p. 607 t. 32 f. 14; — *lirata* subsp. *conferta* n. Neuseeland; **Suter** 1904 Trans. N. Z. Inst. p. 275 Textfig. 7, 8.

Miratesta (Saras.) *schmalziana* n. Obi; **Rolle** 1903 Nachrbl. p. 23.

Planorbidae.

Planorbis (Guettard) *pupillus* (Gyranus) n. Finland; **Westerlund** 1902 Nachrbl. p. 43; — (G.) *mutatus* n. Amagar, Dänemark; id. p. 44; — (G.) *pristinus* n. (= *arcticus* Sell nec Beck); Bispengen bei Kopenhagen; id. p. 44; — *moellendorffii* n. Kamtschatka; **Dybowski** 1903 Ann. Petersb. VIII p. 46, Textfig.; — *leucochilus* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. XII p. 607 t. 31 f. 3; — *magnificus* n. Nord-Carolina; **Pilsbry** 1903 Nautilus XVII p. 75; — *mareoticus* Letourneux zuerst abgebildet bei **Pallary** 1903, Textfig.; — *philippianus* (Mtrs.) nom. nov. für Pl. *subangulatus* Phil. nec L.; **Caziot** 1903 (1) p. 262; — *bozasi* n. Challa-See; **Rochebrune & Germain** 1904 Bull. Mus. Paris v. 10 p. 142.

Heterodiscus n. sect. *Planorbidis*, Typus *Pl. libanicus* West.; **Westerlund** 1903 Rad. jug. Ak. p. 120.

Ancylidae.

Ancylus (Guettard) *lemoinei* n. Südamerika; **Ancey** 1901 Natural. p. 103; — *leucaspis* n. ibid., id. p. 103; — *kerklandi* n. Oststaaten von Nordamerika; **Walker** 1903 in Nautilus XVII p. 29 fig. ; — *guidoni* n. Corsika; **Caziot** 1903 Corse p. 271, Textfig.; — *letteroni* n. ibid., id. p. 272, Textfig.; — (*Ferrisia* n.) *gordonensis* n. Südafrika; **Melvill & Ponsonby** 1903 Ann. N. H. vol. XII p. 606 t. 31 f. 2; — *stenochorias* n. ibid., id. p. 607 t. 31 f. 1; — *crequii* n. Titicacasee; **Bavay** 1904 Bull. Soc. zool. France p. 156 Textfig. 7.

Ferrisia n. sect. *Ancyli*; *Typus A. uvularis* Say; **Walker** 1903 *Nautilus* XVII p. 15.

Laevapex n. sect. *Ancyli*, *Typus*: *A. fuscus* Ads.; **Walker** 1903 in *Nautilus* XVII p. 15.

Gundlachia (Pf.) ist nur ein überbildeter zweijähriger *Ancylus*; **Dall** 1903 *Nautil.* XVII p. 97; — *lucasii* n. Neuseeland; **Suter** 1904 Tr. N. Z. Inst. p. 250, Textfig. 10, 11; — *neozealanica* n. *ibid.* p. 258.

Siphonariidae.

Siphonaria (Schum.) *naufragum* Stearns = *lineolata* d'Orb. abgebildet bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 28 f. 10, 13; — *alternata* Say = *brunnea* Jones desgl. t. 28 f. 12, 14; — *subatra* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Philad. p. 36 t. 6 f. 61; — *rucuana* n. *ibid.*, id. p. 36 t. 6 f. 60.

Amphibolidae.

Ampullarina (Sow.) *africana* n. Port Alfred; **Smith** 1904 J. Mal. v. 10 p. 38 t. 3 f. 14.

C. Scaphopoda.

Cadulus (Phil.) *euloides* n. Golf von Oman; **Melvill & Standen** 1901 Pr. Z. S. p. 459 t. 24 f. 24.

Dentalium (L.) *magnificum* Smith abgeb. bei **Alcock** 1902 p. 279 Textfig.; — *thetidis* n. Süd-Australien; **Hedley** 1903 *Thetis* II p. 327, Textfig. 61; — *virgula* n. *ibid.*, id. p. 328, Textfig. 62; — *inflexum* n. Natal; **Sowerby** 1903 Mar. Invest. Cap III p. 224 t. 5 fig. 11; — *africanum* n. *ibid.*, id. p. 224 t. 5 f. 10; — *exasperatum* (*Fissidentalium*) n. *ibid.*, id. p. 225 t. 5 f. 12; — *regulare* n. Südafrika; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 393 t. 15 f. 2; — *vallicolens* n. Californien; **Raymond** 1904 *Nautilus* XVII p. 123.

D. Acephala.

(*Lamellibranchiata* s. *Pelecypoda*.)

Ridewood 1903 Phil. Trans. Roy. Soc. v. 195 theilt nach der feineren Struktur der Kiemen die kopflosen Mollusken in drei grosse Abtheilungen:

1. *Protobranchia* (wie bei Pelseneer).
2. *Eleutherorhabda* mit den Unterordnungen *Dimyacea*, *Mytilacea* und *Pectinacea*.
- 3 *Synaptorhabda*, mit den Unterordnungen *Ostracea*, *Submytilacea*, *Tellinacea*, *Veneracea*, *Cardiacea*, *Myacea*, *Pholadacea*, *Anatinacea* und *Poromyacea*.

a) Septibranchiata.

Cuspidariidae.

Cuspidaria (Nardo) *optima* n. Südafrika; **Sowerby** 1904 South Africa p. 17. — (*Cardiomya*) *gilchristi* n. *ibid.*, id. p. 18; — (*C.*) *forticostata* n. *ibid.*, id. p. 18.

Myodora (Gray) *reeeveana* Smith abgeb. bei **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. t. 41 f. 7—10.

Cetoconcha (Dall) *scapha* n. Cocosinsel, Panama; **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV p. 561, 1903 ibid. XXVI p. 951 fig.

Poromyacea.

Ridewood 1903 Phil. Trans. Roy. Soc. v. 195 erhebt die Gattung *Poromya* und ihre Verwandten (*Septibranchia*) zu einer eigenen Unterordnung *Poromyacea* bei der Ordnung *Synaptorhabda*.

Poromya (Forbes) *gilchristi* n. Südafrika; **Sowerby** 1904 Moll. South Africa p. 15; — *striata* n. ibid., id. p. 16; — *granosissima* n. ibid., id. p. 16; — *curta* n. ibid., id. p. 17.

b) Eulamellibranchiata.

Anatinidae.

Anatina (Lam.) *impura* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 208, 402 t. 19 f. 9; — *andamanica* n. Andamanen; **Smith** 1904 Ann. N. H. XIV p. 8.

Periploma (Schum.) *sulcata* n. Kalifornien; **Dall** 1904 Nautilus XVII p. 122.

Thraciopsis (Hedley) *arenosa* n. Neusüdwales; **Hedley** 1905 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales v. 29 p. 197, Textfig.

Pandora (Bing.) *bushiana* (Kennerleyia) Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 31 f. 3; — (*Clidiophora*) *gouldiana* Dall desgl. t. 32 f. 7.

Allogramma n. sect. *Lyonsia*, Typus *L. formosa* Jeffr.; **Dall** 1903 Trans. Wagn. Inst. III p. 1514.

Astenothaerus (Dall) *hemphilli* Dall abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 31 f. 9.

Aporema n. gen., Typus *Pholadomya arata* Verrill; **Dall** 1903 Trans. Wagn. Inst. III p. 1532.

Halistrepta n. sect. für *Periploma sulcata* n.; **Dall** 1904 Nautilus XVII p. 123.

Heteroclidus n. subg. *Pandorae*, Typus *Clydiophora punctata* Conrad; **Dall** 1903 Transact. Wagn. Inst. III p. 1518.

Pholadacea.

Gastrochaena (Spengler) *nowbrayi* n. Bermudas; **Davis** 1904 Nautilus XVII p. 125 f. 21.

Xylophaga (Turton) *praestans* n. Northumberland; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 328, Textfig. — Derselbe giebt ebenda eine Aufzählung der beschriebenen Arten; — *indica* n. Andamanen; **Smith** 1904 Ann. N. H. XIV p. 7.

Cardiacea.

Cardiidae.

Andrussov 1903 Mem. Ac. Peterb. XIII beginnt eine gross angelegte Monographie der Brakwasser-Cardiiden des südöstlichen Europa; er erkennt 14 Gattungen an, davon neu *Plagiadacna* für *Cardium carinatum* Desh. und bei

Monodacna der Untergattungen Apscheronia für M. propinqua, und Pseudocatillus für M. pseudocatillus (Abich.).

Cardium (L.) hungerfordi (Papyracea) n. Japan; **Sowerby** 1902 J. Mal. VIII p. 103 t. 9 f. 5; — striatum var. thetidis n. Südaustralien; **Hedley** 1902 *Thetis* I p. 322; — laevisulcatum n. Malediven; **Smith** 1903 Malediven II p. 624 fig.; — hungerfordi Sow. zuerst abgeb. bei **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 555 t. 41 f. 17; var. undatopictum n. ibid. p. 556 t. 40 f. 14, 15; var. stigmaticum n. ibid. p. 556 t. 41 f. 13, 14; — annae n. ibid., id. p. 557 t. 40 f. 20.

Tellinacea.

Tellinidae.

Tellina (L.) pristiformis (*Merisca*) n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 400 t. 19 f. 8; — (*Macoma*) pseudomera n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 481 t. 56 f. 5; — panayensis nom. nov. für Tell. truncatula Hanley nec Sow.; **Hidalgo** 1903 Obras II p. 142; — quadrasi n. Philippinen; id. p. 144; — taslensis n. ibid., id. p. 143; — consanguinea n. Japan; **Sowerby** 1903 Ann. N. H. XII p. 500; — corbis Sow. & strangei Desh. = carnicolor Hanley; **Smith** 1903 Lakhediven p. 627; — hirasei n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 554 t. 41 f. 3; — fabrefacta n. ibid., id. p. 555 t. 41 f. 11, 12; — kenyoniana n. Victoria; **Pritchard & Gatliff** 1904 Tr. R. Soc. Victoria, t. 20 f. 1—4; — gilchristi n. Südafrika; **Sowerby** 1904 South Afrika p. 12; — analogica n. ibid., id. p. 12; — irdalensis n. ibid., id. p. 13; — (*Macoma*) levior n. ibid., id. p. 13; — (*M.*) ordinaria n. ibid., id. p. 14; — (*M.*) africana n. ibid., id. p. 14; — (*M.*) inclinata n. ibid., id. p. 14.

Codakia (Scopoli) bella var. delicatula n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 555 t. 41 f. 15, 16.

Scrobiculariidae.

Cumingia (Sowerby) occatella n., Rotes Meer; **Melvill** 1901 Ann. N. H. vol. 7 p. 555 t. 9 f. 7.

Conchacea.

Veneridae.

Dall 1902 Pr. U. St. N. Mus. XXVI gibt eine Synopsis der Familie. Er rechnet dahin die Unterfamilien Dosininae Meretricinae, Venerinae & Gemminae und erkennt als Gattungen an bei den *Dosininae*: *Dosiniopsis* Conrad (eocän); *Dosinia* Scop., *Cyclina* Desh., *Clementia* Gray; bei den *Meretricinae*: *Grateloupia* Desm., *Transenella* Dall, *Tivela* Link, *Sunetta* Link, *Gastrarium* Bolten, *Lioconcha* Moerch, *Macrocyclista* Meek, *Amiantis* Carp., *Meretrix* Lam., *Callocardia* A. Ad., *Pitaria* Roemer, *Cytherea* Bolten, *Saxidomus* Conrad; — bei den *Venerinae*: *Cyprimeria* Conrad, *Thetironia* Stol., *Mysia* Lam., *Cyclinella* Dall, *Chione* Mühl., *Anomalocardia* Schum., *Venus* L., *Marcia* H. Ad., *Paphia* Bolten, *Liozyma* Dall, *Venerupis* Lam.; — bei den *Gemminae*: *Gemma* Desh., *Parastarte* Conrad, *Psephidia* Dall.

Agriopoma n. sect. Meretricis mit farbloser, rauher Schale; Typus *Cytherea texaniana* Dall; **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV p. 509; XXVI p. 353.

Anomalocardia (Schum.) *malonei* n. Südafrika; **Vanatta** 1901 Pr. Philad. p. 185 t. 5 f. 4, 5 (= *arakanensis* Nevill teste *Smith*).

Callocardia (A. Ad.) *catharia* n. Panama; **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. XXVI p. 402 t. 14 f. 3; — *zonata* n. Nord Carolina; *ibid.* p. 381.

Caryatis (Roemer) *reeeveana* nom. nov. für *Cytherea citrina* Sow. nec Lam.; **Hidalgo** 1903 Obras II p. 200.

Chione (Mühlf.) *schotti* (*Lirophora*) n. Panama; **Dall** 1902 Pr. U. St. N. Mus. p. 404 t. 16 f. 7; — (L.) *obliterata* n. *ibid.*, id. p. 405 t. 16 f. 2; — (*Timoclea*) *pertincta* n. Galapagos; id. p. 405 t. 16 f. 9; — *micra* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 552 t. 41 f. 4, 5; — *hizenensis* n. *ibid.*, id. p. 553 t. 41 f. 1, 2; — *despecta* n. Neusüdwales; **Hedley** 1904 Pr. Linn. Soc. N. S. Wales v. 29 p. 193, Textfig.

Circe (Schum.) *insularis* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 487 t. 55 f. 2.

Clementia (Gray) *solida* n. Topolobambo, Mexiko; **Dall** 1902 Pr. U. St. N. Mus. p. 401 t. 14 f. 4.

Cyclinella (Dall.) *singleyi* n. West-Mexiko; **Dall** 1902 Pr. U. St. N. Mus. p. 404 t. 15 f. 3.

Cytherea (Bolten) *fordi* (*Ventricola*) Yates abgeb. bei **Dall** 1902 t. 15 f. 7; — (V.) *magdalenae* n. Unterkalifornien; id. p. 403 t. 15 f. 6; — (*foveolata* var.?) *lepidoglypta* n. Acapulco; id. p. 403 t. 15 f. 4, 5; — *crispata* subsp. *amica* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 551 t. 39 f. 10, 11.

Gomphina (Moerch) *macrum* n. Neuseeland; **Smith** 1902 J. Mal. IX p. 109. Textfig.

Meretrix (Lam.) *aresta* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 485 t. 56 f. 1, 7; — *eulebrana* n. *ibid.*, iid. p. 486 t. 55 f. 5; — (Agriopoma n.) *texasiana* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 32 f. 1; — (*Transenella*) *conradina* Dall desgl. t. 31 f. 5, 7; — *simpsoni* Dall desgl. t. 32 f. 3.

Lioconcha (Moerch) *castrensis* subsp. *notabilis* n. Philippinen; **Hidalgo** 1903 Obras II p. 213.

Pitaria (Roemer) *tomeana* n. Tomé, Chile; **Dall** 1902 Pr. U. St. N. Mus. p. 402 t. 15 f. 2; — (*Lamellieoncha*) *callicomata* n. Panama; id. p. 402 t. 16 f. 8; — *sulfurea* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 553 t. 39 f. 7—9.

Parmulina n. sect. *Circae*, Typus *C. corrugata* Desh.; **Dall** 1903 Trans. Wagn. Inst. III p. 1250.

Psephidia (Dall) *ovalis* n. Catalina Island, Californien; **Dall** 1902 Pr. U. S. Nat. Mus. p. 407 t. 16 f. 4.

Tivela (Roemer) *alucinaus* Sow. = *natalensis* Dkr.; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 397.

Tapes (Müllf.) *platyptycha* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 206, 400 t. 19 f. 6; — *phenax* n. *ibid.*, id. p. 207, 400 t. 19 f. 5; — (*Paphia*, *Protothaca*) *staminea* var. *sulculosa* n. Unterkalifornien; **Dall** 1902 Pr. U. St. Mus. p. 406 t. 14 f. 2.

Dall 1903 Pr. U. St. N. Mus. nimmt für die Gattung den Namen *Paphia* Bolten Typus *P. alapapilionis* Bolt. an, behält aber *Tapes* als Untergattung bei.

(*Venus* (L.) *hirasei* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 205, 400 t. 19 f. 1; . 20 f. 2); — *apodema* n. Panama; **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. p. 406 t. 15 f. 8; — *malonei* Vanatta = *arakanensis* Nevill; **Smith** 1903 Pr. mal. Soc. V p. 397; — (*Anaitis*) *intersculpta* n. Südafrika; **Sowerby** 1904 South Africa p. 11 fig.

Cyprinidae.

Der Name *Cyprina* Lam. wird beanstandet wegen des älteren Namens *Arctica* Schum. und wegen *Cyprinus* L. (*Pisces*); *Arctica* ist bei den Vögeln seit 1758 präoccupirt, deshalb hat Rovereto 1900 den Namen *Cyprinidae* vorgeschlagen. **Hoyle** 1902 J. Conch. Leeds p. 214 macht darauf aufmerksam, dass *Cyprina* als Diminutiv von *κυπρις* und *Cyprinus* als latinisierte Form eines von Aristoteles gebrauchten Fischnamens etymologisch verschieden sind und ebenso gut neben einander bestehen können, wie *Picus* und *Pica*.

Basterotia (C. Mayer) *aledonica* (*Anisodonta*) var. *djibontensis* n. Djibuti, Rotes Meer; **H. Fischer** 1901 J. Conch. p. 129 Textfig.

Petricolidae.

Petricola (Lam.) *cyclus* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 204, 400 t. 19 f. 3, 4; mit var. *sculpturata* n. ibid. p. 205 t. 19 f. 7.

Myacea.

Mactridae.

Mactra (L.) *abbreviata* Lamarck abgebildet bei **Hedley** 1902 Studies VII p. 597 t. 29 f. 1—3; — *parkesiana* n. Australien; id. Studies VI p. 8 t. 1 f. 5—9; — *richmondi* Dall abgeb. bei **Dall** 1902 t. 31 f. 6; — *carneopicta* n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 551 t. 39 f. 1—3; — *delicatula* n. Ceylon; **Preston** 1904 J. Mal. vol. XI p. 78 t. 7.

Mactrella (Gray) *iheringi* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 32 f. 8.

Mulinia (Gray) *branneri* n. Brasilien; **Dall** 1901 Pr. Ac. Wash. III p. 145.

Spisula (H. & A. Ad.) *bernardi* (*Oxyperas*) n. Japan; **Pilsbry** 1904 Pr. Phil. p. 551 t. 39 f. 4—6.

Standella (Gray) *aqualis* n. Neuseeland; **Webster** 1904 Tr. N. Zeal. Inst. p. 280 t. 10 f. 13.

Zenatia (Gray) *victoriae* n. Victoria; **Pritchard & Gatliff** 1903 Pr. Soc. Victoria XVI p. 92 t. 15 f. 3.

Tridacnidae.

Tridaena (Brug.) *lamarcki* nom. nov. für *Tr. gigas* Lam. nec L.; **Hidalgo** 1903 Obras II p. 385; — *reevei* nom. nov. für *Tr. elongata* Reeve nec Lam.; id. p. 389.

Corbulidae.

Corbula (Brug.) *rugifera* n. Südafrika; **Smith** 1904 Pr. mal. Soc. London V p. 399 t. 9, 10 f. 15; — *pura* n. Neu-Seeland; **Webster** 1904 Tr. N. Zeal. Inst. p. 279 t. 10 f. 12.

Glycimeridae.

Panopaea (Menard) *globosa* Dall zuerst abgebildet bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 40 f. 1.

Panomya (Dall) *ampla* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 40 f. 3, 4.

Saxicavella (Fischer) *sagrinata* n. Portorico; **Dall & Simpson** Pr. U. St. Nat. Mus. p. 472 t. 55 f. 16.

*Leptonacea.**Leptonidae.*

Rochefortia (Velain) *lactea* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Thetis* I p. 320 Textfig.; — *donaciformis* Angas abgeb. bei **Hedley** 1902 *Pr. L. Soc. N. S. Wales* XXVII p. 7, Textfig.

Cyamium (Phil.) *subquadratum* n. Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 *Voy. Belgica* p. 15 fig.

Pseudokellya n. gen. für *Kellia cardiformis* Smith; **Pelseneer** 1903 *Voy. Belgica* p. 48.

Megaxinus (Mtrs.) *unguiculinus* n. Mittelmeer; **Pallary** 1904 *J. Conchyl.* v. 52 p. 247 t. 7 f. 21—23.

Solecardia (Conrad) *vitrea* var. *japonica* n. Japan; **Pilsbry** 1904 *Pr. Phil.* p. 558 t. 41 f. 6.

Kelliidae.

Cuna n. gen., Typus *C. concentrica* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Thetis* p. 315 Textfig. 55; — *particula* n. *ibid.*, id. p. 316 Textfig. 56; — *dalli* n. Florida; **Vanatta** 1903 *Pr. Philad.* p. 759 Textfig. 3.

Bornia (Phil.) *filosa* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Studies VI* p. 7 t. 2 f. 15—17.

Kellia (Turt.) *porculus* n. Japan; **Pilsbry** 1904 *Pr. Phil.* p. 558 t. 41 f. 18—20. — *natalensis* n. Südafrika; **Smith** 1903 *Pr. mal. Soc. V* p. 396 t. 15 f. 8.

Erycina (Lam.) *acupuncta* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Thetis* I p. 321 Textfig.; — *floridana* n. Florida; **Vanatta** 1903 *Pr. Philad.* p. 758 Textfig. 2.

Montacuta (Turton) *spitzbergensis* n. Spitzbergen; **Knipowitsch** 1902 *Ann. Mus. Petersb.* VI p. 519 t. 19 f. 43—45.

Najadea.

Sterki 1903 *Am. Nat.* unterscheidet die Najadeen in zwei Hauptgruppen: *Holodontes* mit völlig ausgebildetem Schloss, der Embryo im Glochidium mit am Bauchrand gerundeten oder abgestutzten Klappen, die sich schliessen können; und *Haplodontes* mit unvollständigem Schloss, die Glochidium-Klappen am Bauchrand spitz und jede mit einem grossen Stachel. Die Holodonten zerfallen wieder in solche mit abgesetzten Brutsäcken in den äusseren Kiemen (*Lampsilis*, *Cyprigenia*, *Ptychobranchus*, *Proptera*, alles Winterbrüter) und solche ohne Brutsäcke und in den äusseren Kiemenpaaren brütend, sämtlich Sommerbrüter (*Tritogonia*, *Unio*). — Zu den Haplodonten gehören *Strophitus* und *Alasmidonta* mit verkümmertem Schloss, erstere die Embryonen in cylindrischen Eiweissmassen austreibend, letztere ohne solche, und *Anodonta* ohne Schlosszähne.

Rochebrune 1904 *Bull. Mus. Paris X* zieht *Pharaonia*, *Zairia*, *Reneia* und *Parreysia* als Synonyme von *Nodularia* ein.

Dalliella Simpson nec Cossmann umgetauft in *Simpsonella*; **Cockerell** 1903 *Nautilus XVI* p. 118.

Diaurora nom. nov. für *Aurora Simps.* nec *Rag.*; **Cockerell** 1903 *Nautilus p. 118.*

Miodontiscus nom. nov. für *Midon Carp.* nec *Sandb.* neque *Dumeril*; **Dall** 1903 *Trans. Wagn. Inst. III* p. 1409.

Miodontopsis nom. nov. für *Miodon* Sandb. nec Carpenter neque Dumeril; **Dall** 1903 Pr. Soc. Washington XVI p. 5.

Anodonta (Lam.) *suilla* n. Tongking; **Martens** 1902 Nachrbl. p. 130; — *glaucina* Drouët abgeb. bei **Kobelt**, Iconographie 1903 v. 10 no. 1804; — *prasina* Drouët desgl. 1805; — *adusta* Drouët desgl. 1806; — *bouvieri* n. Locard mss., Charente; **Rochebrune** 1904 in Bull. Mus. Paris v. 9 p. 391; — *chivoti* n. Westfrankreich; **Germain** 1904 Bull. Soc. Ouest France XIV p. 87.

Grandidiera (Bourg.) *tsadiana* (*Unio*) n. Tsadsee; **Martens** 1903 S. Ber. Ges. Berlin p. 8.

Harmandia (Roch.) *castelnaui* n. Cochinchina; **Rochebrune** 1904 Bull. Mus. Paris X p. 140.

Hyriopsis (Conr.) *goliath* n. Rivière claire, Tonkin; **Rolle** 1904 Nachrbl. p. 26 t. 1, 2.

Spatha (Lea) *innesi* n. Oberes Nilgebiet; **Pallary** 1903 Bull. Egypte III p. 97.

Spathella (Bourg.) *furtani* n. Oberes Nilgebiet; **Pallary** 1903 Bull. Egypte III p. 96; — *bozasi* n. Rudolfsee; **Rochebrune & Germain** 1904 Bull. Mus. Paris X p. 144; — *brumpti* n. ibid., iid. p. 144.

Pseudodon (Gould) *resupinatus* n. Tongking; **Martens** 1902 Nachrbl. p. 131.

Diplodon (Spix) *websteri* n. Neuseeland; **Simpson** 1902 Nautilus XVI p. 30; — *menziesi* subsp. *lucasi* n. Lake Manapuri, ibid.; **Suter** 1904 Trans. N. Zeal. Inst. p. 239 Textfig. 2, 3.

Unio (Retz.) *messageri* n. Langson, Tonking; **Bavay & Dautzenberg** 1901 J. C. p. 7 t. 1 fig. 3, 4; — *fruhstorferi* Dautz. zuerst abgebildet ibid. t. 1 f. 1, 2; — *beauchampi* n. Tennessee; **Marsh** 1902 Naut. XVI p. 7, Textfig.; — *andrewsii* n. ibid., id. Naut. XV p. 115, XVI p. 8 Textfig. — (*Quadrula*) *salaputium* n. Tongking; **Martens** 1902 Nachrbl. p. 133; — (*Lanceolaria*) *bilirata* n. ibid., id. p. 133; — (*L.*) *laevis* n. ibid., id. p. 134; — (*Lampsilia*) *rovirosai* Psbry. abgeb. bei **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. t. 54 f. 1; — (*Quadrula*) *liedtkei* n. Rivière claire, Tongking; **Rolle** 1904 Nachrbl. p. 25 t. 3, 4 f. a; — (*Nodularia*) *gracillima* n. ibid., id. p. 26 t. 4 b, c; — *declivis* Say abgeb. bei **Fuerson** 1903 Nautilus t. 3; — (*Quadrula*) *nieuwenhousei* var. *parcesculptus* n. Ost-Borneo; **Martens** 1903 S. Ber. Ges. Berlin p. 425; — *ater* var. *irgizlaicus* n. Gouv. Kursk, Südrussland; **Lindholm** 1903 Ann. St. Petersbourg VIII p. 343; — *litoralis* var. *taginus* n. Tajo bei Toledo; **Kobelt** 1903 vol. 10 no. 1795; — *requienii* var. *taginus* n. ibid., id. no. 1796; — *subniger* n. Westfrankreich; **Germain** 1904 Bull. Soc. Ouest Fr. v. 14 p. 31; — *yliiscerus* n. Charente; **Rochebrune** 1904 Bull. Mus. Paris IX p. 390.

Cyrenacea.

Dall 1903 Pr. Biol. Soc. Washington XVI erhebt die Cyreniden zur Superfamily mit den Familien Cyrenidae und Sphaeriidae. Er giebt folgende Systematik der lebenden Arten (cfr. Nachrbl. 1904 p. 74):

a) Cyrenidae.

Cyrena Lam., Typus *C. bengalensis* Lam., mit den Sektionen; *Poly-*
mesoda Raf. für *Cyclas carolinensis* Bosc (einschliesslich *Cyprinella*
Gabb, *Diodus Gabb* & *Leptosyphon Fischer*); — *Pseudocyrena* Bourg.,
Typus *C. maritima* d'Orb. (einschliesslich *Anomala Desh* nec Hübner,
Egesta Ad., *Cyrenocapsa Fischer*); — *Gelvina* Gray für *C. coaxans*
Gmel.; — *Egetaria* Moerch für *C. pullastra* Moerch.

Corbicula Mühlf. für *Tellina fluminea* Müll., mit den neuen Sektionen
Corbiculina und *Cyrenodonax*, und der Untergattung *Cyrenocyclas*
Fér. für *C. limosa*.

Vellarita Gray, Typus *V. cyprinoides* Gray.

Batissa Gray, Typus *B. tenebrosa* Hinds.

Egeria Roissy (= *Galatea* Brug.), Typus *Venus paradoxa* Born, mit
 der Sektion *Profischeria* Dall (= *Fischeria* Bernardi nec *Robineau*),
 Typus *F. delesserti* Bern.

b) *Sphaeriidae*.

Sphaerium Scopoli, Typus *Tellina cornea* L., mit den Sektionen *Cyrenastrum* Bourg. für *Sph. solidum* Norm. und *Sphaeriastrum* Bourg.
 für *Sph. rivicola*, und den Untergattungen *Musculium* Link (= *Calyculina* Cless.) und *Eupera* Bourg. (= *Limosina* Clessin.).

Corneocyclas Fer. (= *Pisidium* C. Pfr.), Typus *C. pusilla* Gmel. mit
 den Sektionen *Phymesoda* Raf. für *Tellina virginica* Gmel.; — *Pisidium* C. Pfr. für *T. amnicum* Müll.; — *Cyclocalyx* Dall für *Pis.*
Scholtzii Cless.; — *Cymatocyclas* Dall für *Pis. compressum* Prime,
 — und *Tropidocyclas* n. (= *Fossarina* Clessin nec Ad.) für *Pis.*
henslowianum.

Cyrenidae. .

Corbicula (Mühlf.) *messageri* n. Tonking; **Bavay & Dautzenberg** 1901 J. C. p. 9 t. 1 f. 5—7; — *sadoensis* n. Sado, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 406;
 — *awajiensis* n. Awaiji, ibid., id. p. 407; — *subtriangularis* n. Philippinen?; **Bullen** 1901 p. 223 t. 23 f. 1; — *fulgida* n. ibid., id. p. 224 t. 23 f. 2; — *subrostrata* n. Java; **Bullen** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 109 t. 6 f. 7—9; — *faba* n. Richmond River, N. S. Wales; id. p. 110 t. 6 f. 10, 11; — *tsadiana* n. Tsad-See; **Martens** 1903 S. Ber. Ges. Berlin p. 9; — (*Cyrendon* n.) *formosana* n. Formosa; **Dall** 1903 Trans. Wagn. Inst. III p. 1450; — *artini* n. Oberer Nil; **Pallary** 1903 Bull. Inst. Egypte III p. 93; — *doufilei* n. Weisser Nil; **Rochebrune & Germain** 1904 Bull. Mus. Paris X p. 144.

Profischeria nom. nov. für *Fischeria* Bernardi nec Rob. Desv.; **Dall** 1903 Pr. Soc. Wash. XVI p. 6.

Batissa (Gray) *schmidti* n. Ostborneo; **Martens** 1903 S. Ber. Ges. Berlin p. 426 Textfig.

Corbiculina n. sect. *Corbiculae*, Typus *C. angasi* Prime; **Dall** 1903 Trans. Wagn. Inst. III p. 1449 & Pr. Soc. Washington XVI p. 6.

Sphaeriidae.

Sphaerium (Scopoli) *imutilis* n. Uzen, Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 406;
 — *soorense* n. Baikalsee; **Dybowski** 1902 Nachrbl. p. 91, abgeb. Iconogr. no. 1808;
 — *baicalense* n. ibid., id. p. 92, Iconogr. no. 1815; — (*Cyrenastrum*) *korotniewi* n. ibid., id. p. 92, Iconogr. no. 1811; — (*Scaldiana*) *westerlundi* n. ibid., id. p. 93, Iconogr. no. 1812; — *jalapense* n. Mexiko; **Pilsbry** 1903 Pr. Phil. p. 756 t. 53 f. 1, t. 54 f. 6; — *novoleonis* n. ibid., id. p. 787 t. 53 f. 5, t. 54 f. 6; — *tenellum* nom. nov. für *Sph. fragile* Clessin nec Meek & Heyden; **Dall** 1903 Trans. Wagner Inst. III p. 1458.

Calyculina (Clessin) *hodgsonii* n. Illinois; **Sterki** 1902 *Nautilus* XVI p. 91
— *ferrisi* n. Vereinigte Staaten; id. p. 91.

Pisidium (C. Pfr.) *baicalense* n. Baikalsee; **Dybowski** 1902 *Nachrbl.* p. 93,
abgeb. *Iconogr.* no. 1815; — *maculatum* n. mit var. *elegans* n. *ibid.*, id. p. 94,
Iconogr. no. 1807; — (*Fossarina*) *trigonoides* n. *ibid.*, id. p. 95, *Iconogr.* n. 1809;
— (F.) *raddei* n. *ibid.*, id. p. 95, *Iconogr.* no. 1810; — *ohioense* n. Ohio; **Sterki**
1903 *Nautilus* XVII p. 20; — *ashmuni* n. Neu-Mexiko; id. p. 42; — *danielseni*
n. Ohio; id. p. 42; — *complanatum* n. Washington; id. p. 79; — *rowelli* n. Kalifornien;
id. p. 80; — *cuneiforme* n. Michigan und Minnesota; id. p. 81; — (*Corneocyclas*)
hodgkini n. Neuseeland; **Suter** 1904 *Tr. N. Zeal. Inst.* p. 246 Textfig. 9;
— *supinoides* n. Zentralasien; **Clessin** 1903 in *Futterer, Centralasien*, p. 81;
— *ovale* n. *ibid.*, id. p. 82; — *futtereri* n. *ibid.*, id. p. 82; — *kukunurens* n. *ibid.*,
id. p. 82; — *obliquatum* n. *ibid.*, id. p. 82; — *lateumbonatum* n. *ibid.*, id. p. 82.

Die Sektionen *Fluminina* Clessin, *Cycladina* Clessin und *Rivulina* Clessin
überflüssig und von *Pisidium* s. str. nicht zu trennen; **Dall** 1903 *Pr. Soc. Washington*.

Crassatellidae.

Crassatellites (Conrad) *brasiliensis* n. Brasilien; **Dall** 1903 *Nautilus* XVI
p. 102, abgeb. *Pr. U. St. Nat. Mus. XXVI* p. 950; — *securiformis* n. Neusüdwales;
Hedley 1902 *Mem. Austral. Mus. IV* p. 312 Textfig.; — *scabrilarata* n.
ibid., id. p. 314, Textfig.

Carditidae.

Dall 1902 *Pr. Philad.* giebt eine Synopsis der Familie, die er mit den
Condylocardiidiae zusammen in eine Superfamily Carditacea vereinigt. Er unter-
scheidet zwei Unterfamilien Carditinae und Thecaliinae, und in ersterer die
Gattungen: *Cardita* Brug. mit den Sektionen *Cardita* s. str., *Carditamera* Conrad,
Glans Megerle und *Beguina* Bolten, *Venericardia* Lam. mit den Untergattungen
Cardiocardita Anton (= *Agaria* Gray = *Actinobolus* Mörch = *Azaria* Tryon),
Cossmannella Mayer Eymar, *Cardites* Link inclusive *Cyclocardia* Conrad (= *Arc-
turus* Gray = *Actinobolus* Morse = *Scalariocardita* Savio), *Pteromeris* Conrad
(= *Coripia de Gregorio*), *Midon* Carp. (nec Sandb.), *Neocardia* Sow.; — und
Calyptogena Dall. — Die Unterfamilie Thecaliinae umschliesst die Gattungen
Milneria Dall (= *Ceropsis* Dall olim, nec Solier), und *Thecalia* H. & A. Adams.

Cardita (Brug.) *sulcosa* (Glans) n.?; **Dall** 1902 *Pr. Phil.* p. 715; — *minima*
n. Port Alfred, Kap.; **Smith** 1904 *J. Mal. XI* p. 41 t. 3 f. 22; — *cavatica* n.
Südaustralien; **Hedley** 1902 *Thetis I* p. 318 Textfig. 58; — *umbonata* n. Sierra
Leone; **Sowerby** 1904 *Pr. mal. Soc. VI* p. 177; — *pulcherriina* n. Südafrika;
Sowerby 1904 *South Africa*, p. 7, fig.

Venericardia (Lam.) *crassidens* (*Astarte*) Brod. & Sow. abgebildet bei **Dall**
1903 *Pr. U. S. Mus. t. 63* f. 9; — *gouldii* n. San Diego; **Dall** 1902 *Pr. Phil.*
p. 714, abgeb. 1903 *Pr. U. St. Mus. t. 63* f. 3; — *alaskana* n. Alaska; id. 1902
p. 710, 1903 t. 63 f. 7; — *incisa* n. Unalaska; id. 1902 p. 714, abgeb. 1903 t. 63
f. 4; — (*Cyclocardia*) *armilla* n. Golf von Mexiko; **Dall** 1902 *Pr. Phil.* p. 713; —
(C.) *moniliata* n. Brasilien; id. p. 714; — (C.) *stearnsii* nom. nov. für *ventricosa*
Gould (ex parte); *Pr. U. St. N. Mus. XIII* t. 16 f. 5, 6.

Lutricola (Dall) *cognata* n. Albemarle Island, Galapagos; **Pilsbry &**
Vanatta 1902 *Hopkins-Stanford Exped.* p. 556 t. 35 f. 5.

Condylocardiidae.

Dall 1902 Pr. Philad. stellt hierher die fossile Gattung *Erycinella* Conrad mit den Untergattungen *Carditella* E. A. Smith und *Carditopsis* E. A. Smith — und *Condylocardia* Bernard.

Carditella (Smith) *laticosta* n. Port Alfred, Kap; **Smith** 1904 J. Mal. XI p. 41 t. 3 f. 23.

Condylocardia (Bernard) *projecta* n. Südaustralien; **Hedley** 1902 Thetis I p. 317 Textfig. 57.

Lucinacea.

Dall 1901 P. U. St. Nat. Mus. vertheilt die hierher gehörenden Arten in die Familien *Thyasiridae*, *Diplodontidae*, *Lucinidae*, *Corbidae* und *Cyrenellidae*.

Lucinidae.

Lucina (Brug.) *dalliana* n. Südafrika; **Vanatta** 1901 Pr. Phil. p. 184 t. 5, f. 10, 11; — *huttoniana* n. ibid., id. p. 185 t. 5 f. 14, 15; — *phenax* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 492.

Thyasiridae.

Thyasira (Dall) *conia* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901 Bull. Fish Comm. I p. 490.

Psammobiidae.

Psammobia (Lam.) *bertini* nom. nov. für *pulchella* Reeve nec Lam.; **Hidalgo** 1903 Obras II p. 86 (beide = *reevei* Marts., id. p. 1(2)).

Donacidae.

Donax (Lam.) *kiusinensis* n. Japan; **Pilsbry** 1901 Pr. Phil. p. 207—400 t. 21 f. 19; — *bertini* n. Kap; id. p. 189; — (*Serrula*) *epularis* n. Rotes Meer; **Melvill** 1901, Ann. nat. Hist. VII p. 534 t. 9 f. 6.

Chamacea.

Chamidae.

Chama (L.) *lactnea* Dall zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 31 f. 8, 10.

Cardiliidae.

Cardilia (Deshayes) *reeeveana* nom. nov. für *C. inermis* Reeve nec Desh.; **Hidalgo** 1903 Obras II p. 371.

Astartidae.

Dall 1903 Pr. N. Mus. gibt eine Synopsis der Familie. Er erkennt als Gattungen nur *Lirodiscus* Conrad für die eocäne *A. tellinoïdes* Conrad und *Astarte* an, letztere mit zahlreichen Sektionen und der Untergattung *Goodallia* Turton mit der Sektion *Microstagon* Cossmann.

Astarte (Sow.) *polaris* n. Alaska; **Dall** 1902 Pr. U. St. N. Mus. p. 945 t. 63 f. 5; — *alaskensis* n. ibid., id. p. 946 t. 63 f. 2; — *benneti* n. Bennet Island; id. p. 946 t. 63 f. 6; — (*laurentiana* var.?) *soror* n. Grönland; id. p. 947 t. 62 f. 11;

— subaequilatera var. whiteeavesi n. Gaspa; id. p. 948 t. 62 f. 7, 12; — liogonia n. nahe der Mississippi-Mündung; id. p. 948 t. 62 f. 9; — vernicosa n. (= warhami Leche Vega t. 32 f. 7, 8), Icy Cap; id. p. 949 t. 63 f. 1; — (Ricticyma) esquimaulti Baird nach einem ausgebildeten Exemplar abgebildet; id. t. 63 f. 11, 12; — globula Dall zuerst abgebild. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 32 f. 6.

Isocardiaidae.

In der Liste der Conchological Society (in J. C. Leeds 1901 p. 12) wird für die europäische Art der Name *Is. humana* L. ed. X angeführt.

Isocardia (Lam.) cor var. *valentiana* n. Valencia; **Pallary** 1904 Ann. Mus. Marseille VIII p. 15 t. 1 f. 13.

c) *Pseudolamellibranchiata.*

Dimyidae.

Dimya (Rouanlt) *corrugata* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Thetis* I p. 308, Textfig.

Philobrya (Velain) *pectinata* n. Neusüdwales **Hedley** 1902 *Thetis* I p. 299, Textfig., — *atlantica* Dall abgeb. bei **Dall** 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. IV; — *sublaevis* n. Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 *Voy. Belgica Moll.* p. 25; — *inornata* n. Neusüdwales; **Hedley**, 1904 *Pr. Linn. Soc. N. S. Wales* v. 29 p. 207, fig.

Philippiella (Hedley) *rubra* n. Tasmanien; **Hedley** 1904 *Pr. L. Soc. N. S. Wales* v. 29 p. 207, fig.

Pectinidae.

Amussium (Klein) *thetidis* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Rec. Austr. Mus.* IV p. 304, Textfig. 49; — *alcocki* Smith abgeb. bei **Alcock** 1902 p. 281, Textfig.; — *sibogai* n. Celebes; **Dautzenberg & Bavay** 1904 *J. Conchyl.* vol. 52 p. 207.

Cyclopecten (Verrill) *favus* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Thetis* I p. 305, Textfig.; — *obliquus* n. ibid., id. p. 306, Textfig.; — *nepranensis* n. Victoria; **Pritchard & Gatliff** 1904 *Pr. R. S. Victoria* t. 20 f. 5.

Chlamys (Bolten) *hedleyi* nom. nov. für Chl. *fenestratus* Hedley nec Fbs.; **Dautzenberg** 1901 *J. Conch.* v. 49 p. 348; — *gloriosa* Reeve var., ? Syrien; **Pallary** 1904 *Ann. Marseille* VIII p. 11 t. 1 f. 4, 5; — *hyalina* var. *radiata* n. Mittelmeer; id. p. 13 t. 1 f. 12; — *hirasei* n. Japan; **Bavay** 1904 *J. Conch.* v. 52 p. 197 t. 6 f. 1, 2; var. *ecostata* f. 7, 8; — *ambiguus* n. Ostasien; id. p. 199 t. 6 f. 15, 16; — *wilhelminae* n. Neucaledonien; — id. p. 200 t. 6 f. 14, mit var. *maculata* t. 6 f. 3, 4; — *cythereus* n. Tahiti; id. p. 102 t. 6 f. 11, 12; — *farreri* n. Shantung; **Jones & Preston** 1904 *Pr. mal. Soc.* VI p. 149, Textfig.; — *hirasei* n. Japan; **Bavay** 1904 *J. de Conch.* p. 197; — *ambiguus* n. ibid., id. p. 198; — *wilhelminae* n. Neu-Caledonien, id. p. 200; — *weberi* n. West-Afrika; id. p. 202; — *jousseaumi* n. Japan; id. p. 203; — *cythereus* n. Stiller Ozean; id. p. 204; — *gilchristi* n. Südafrika; **Sowerby** 1904 *South Africa* p. 1, fig.; — *fultoni* n. ibid., id. p. 2; — *humilis* n. ibid., id. p. 2.

Janira (Schum.) *gardineri* n. Malediven; **Smith** 1903 *Lakhediven* p. 622.

Pecten (L.) *opercularis* (Aequipecten) var. *septenvillei* n. Croisic; **Dautzenberg** 1901 *J. C.* p. 340; — *mayaguezensis* n. Portorico; **Dall & Simpson** 1901

Bull. Fish Comm. I p. 405 t. 55 f. 7—9; — colbecki n. Antarktischer Ozean; Smith 1902 Voy. Southern Cross VII p. 212 t. 25 f. 11; — hedleyi nom. nov. für Chlamys fenestrata Hedley nec Pecten fenestratus Fbs.; Dautzenberg 1901 J. C. p. 348; — (Cyclopecten) favus n. Südaustralien; Hedley 1902 Thetis I p. 305 Textfig. 50; — (C.) obliquus n. ibid., id. p. 306 Textfig. 51; — randolphi Dall zuerst abgeb. bei Dall 1902 U. St. Nat. Mus. XXIV t. 40 f. 2; — (Propeamuseum) davidsoni desgl. t. 40 f. 5, 6.

Limidae.

Lima (Brug.) hians var. hirasei n. Japan; Pilsbry 1901 Pr. Phil. p. 209, 402 t. 19 f. 10; — galapagensis n. Galapagos; Pilsbry & Vanatta 1902 Hopkins-Stanford Exped. p. 556 t. 35 f. 4; — patagonica n. Patagonien; Dall 1902 Nautilus XVI p. 16; — agassizi n. Panama; id. p. 16; — indica Smith abgeb. bei Alcock 1902 p. 281, Textfig.; — albicoma Dall abgeb. bei Dall 1902 Pr. U. St. N. Mus. XXIV p. 507 fig.; — gwyni nom. nov. für L elliptica Jeffreys nec Whiteaves; Sykes 1903 J. Malac. X p. 104; — perfecta n. Port Alfred, Kapland; Smith 1904 J. Malac. XI p. 43 t. 3 f. 28

Pinnidae.

Pinna (L.) cochlearis n. Djibuti; H. Fischer 1901 J. C. p. 126 t. 4 f. 13. Ridewood 1903 Phil. Trans. Roy. Soc. v. 195 trennt die Gattung von den Aviculidae und errichtet für sie eine eigene Familie Pinnidae.

Ostreidae.

Jhering 1902 Bull. Buenos-Aires VII p. 109 giebt die Entwicklungs-geschichte der argentinischen Austern seit dem Miocän. Heute findet sich nur noch die (p. 114 f. 8, 9) abgebildete O. puelchana d'Orb.; die miocäne O. arborea ist nach Brasilien zurückgewichen; — circumpicta n. Japan; Pilsbry 1904, Pr. Phil. p. 559 t. 40 f. 12, 13.

Spondylidae.

Spondylus (L.) occidens n. Philippinen; Sowerby 1903 J. Mal. X p. 77 t. 5 f. 9; — reesianus n. Molukken; id. p. 77 t. 5 f. 6.

Filibranchiata.

Arcidae.

Arca (L.) nipponensis n. Japan; Pilsbry 1901 Pr. Phil. p. 209, 402 f. 19 f. 2; — bicarinata n. Cebu; Sowerby 1901 Pr. mal. Soc. IV p. 211 t. 22 f. 14; — (Cucullaea) sagrinata Dall zuerst abgeb. bei Dall 1902 Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV t. 31 f. 2; — (Fossularca) adamsi var. conradiana Dall desgl. t. 31 f. 1; — kobeltiana nom. nov. für A. ocellata Kobelt nec Reeve; Pilsbry 1904 Pr. Phil. p. 559 t. 40 f. 16—19; — pharaonis Fischer = ehrenbergi Dkr.; Lamy 1903 J. Conch. vol. 51 p. 323.

Adacnarca n. gen. für Ad. nitens n. Antarktischer Ozean; Pelseneer 1903 Voy. Belgica, Moll p. 24.

Anomalocardia (Klein) malonei n. Südafrika; Vanatta 1901 Pr. Phil. p. 185 t. 5 f. 4, 5.

Bathyarca (Verrill) *perversidens* n. Südaustralien; **Hedley** 1902 *Triton* I p. 298 Textfig. 45; — *sinuata* n. Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1902 *Voy. Belgica Moll.* p. 23.

Lissarca (Verrill) *anklandica* n. Neuseeland; **Smith** 1902 *Voy. South. Cross VII* p. 212 t. 24 f. 14, 15.

Pectunculus (Lam.) *mundus* n. Japan; **Sowerby** 1903 *Ann. N. Hist. XII* p. 501. — Der Gattungsname nach **Jukes - Browne**, *J. of Conch. XI* in *Glycimeris* zu ändern.

Mytilidae.

Crenella (Brown) *megas* n. Panama; **Dall** 1902 *Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV* p. 559; — *pectinula* Gould zuerst abgeb. *ibid.* t. 31 f. 11; — *striatissima* n. Südafrika; **Sowerby** 1904 *Southafrica* p. 3, fig.

Hochstetteria (Velain) *velaini* n. Port Alfred, Kapland; **Smith** 1904 *J. Malac. XI* p. 42 t. 3 f. 24; — *limoides* n. *ibid.*, *id.* p. 42 t. 3 f. 26.

Dacrydium (Torrell) *albidum* n. Antarktischer Ocean; **Pelseneer** 1903 *Voy. Belgica, Moll* p. 26; — *fabale* n. Neusüdwales; **Hedley** 1904 *Pr. L. Soc. N. S. Wales v. 29* p. 199, Textfig.

Limopsis (Sassi) *panamensis* n. Panama; **Dall** 1902 *Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV* p. 559 fig.; — *laeviuscula* n. Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 *Voy. Belgica, Moll.* p. 24; — *longipilosa* n. *ibid.*, *id.* p. 25; — *pumilio* n. Port Alfred, Kapland; **Smith** 1904 *J. Malac. XI* p. 43 t. 3 f. 27, 28.

Modiola (Lam.) *evansi* n. Malacca; **Smith** 1903 *J. C. Leeds X* 368, Textfig. — *victoriae* n. Victoria; **Putchar & Gatleff** 1903 *Pr. Soc. Victoria* p. 93 f. 1, 2; — *tenerrima* n. Port Alfred, Kapland; **Smith** 1904 *J. Malac. XI* p. 42 t. 3 f. 26; — *samboensis* n. Borneo; **Dautzenberg** 1904 *Ann. Soc. Belgique v. 58* p. 7.

Der Name *Modiola* in *Volsella Scopoli prior* zu ändern; cfr. **List Brit. Moll. J. Conch. Leeds v. X** p. 181.

Modiolaria (Beck) *splendida* zuerst abgeb. bei **Hedley** 1902 *Pr. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI* p. 706.

Mytilus (L.) *orbicularis* n. Mittelmeer; **Pallary** 1904 *Ann. Mus. Marseille VIII* p. 14 t. 1 f. 14.

e) Protobranchiata.

Ledidae.

Leda (Schum.) *hamata* Carpenter zuerst abgeb. bei **Dall** 1902 *Pr. U. St. Nat. Mus. XXIV* t. 40 f. 9; — *miliacea* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Thetis I* p. 295 Textfig.; — *ecaudata* n. Antarktischer Ozean; **Pelseneer** 1903 *Voy. Belgica Moll.* p. 22; — *oblonga* n. *ibid.*, *id.* p. 23.

Cyrilla (A. Ad.) *dalli* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 *Thetis I* p. 296, Textfig.

Nucula (Lam.) *superba* nom. nov. für *obliqua* Hanley & Smith nec Lam.; **Hedley** 1902 *Thetis I* Textfig.; — *fultoni* Smith abgeb. bei **Alcock** 1902 p. 292, Textfig.; — *irregularis* n. Südafrika; **Sowerby** 1904 *South Afrika* p. 7, fig.; — *sculpturata* n. *ibid.*, *id.* p. 7.

Nuculana (Link) *lamellata* n. Südafrika; **Sowerby** 1904 *South Africa* p. 5, fig.; — *gemmaulata* n. *ibid.*, *id.* p. 6, fig.; — *compta* n. *ibid.*, *id.* p. 6, fig.

Yoldia (Moeller) *keppelliana* n. unsicheren Fundortes; **Sowerby** 1904 Pr. mal. Soc. VI p. 176, Textfig.; — *angulata* Sow. abgeb. bei **Alcock** 1902 p. 282, Textfig.

Pronucula n. gen. für Pr. *decorosa* n. Neusüdwales; **Hedley** 1902 Thetis I p. 290 Textfig.

IV. Biologie, Verwendung etc.

Biologie.

Interessante Beobachtungen über die Lebensweise von *Nautilus* macht **Willey** (1899 Pr. Zool. Soc. p. 7).

Anpassung.

Nordenskiöld 1903 Zool. Anz. XXVI p. 590 hat in Gewässern des Gran Chaco an der Grenze von Bolivia und Argentinien eine merkwürdige Anpassung eines *Ancylus* beobachtet, welcher beim Austrocknen der Lachen seine Mündung mit einem Deckel schliesst und sein Gehäuse in der nächsten Regenperiode weiter baut. — **Dall** 1903 Naut. XVII p. 97 vertritt daraufhin die Ansicht, dass *Gundlachia* nur eine derartige zweijährige überbildete Form von *Ancylus* sei.

Geographische Räthsel.

In den Listen der Ausbeute des Challenger werden von einem Fundort auf der Höhe von Sydney eine ganze Anzahl europäischer Arten aufgeführt, die im pacifischen Ozean völlig fehlen. Nach **Hedley** 1901 handelt es sich dabei wahrscheinlich um einen Schreibfehler bei der Etikettirung.

Verschleppungen.

Green J. C. Leeds X p. 185 hat *Helix pisana*, *guamartemes*, *carthusiana* und *pyramidata* bei Belfast in Irland eingeschleppt gefunden, *Physa acuta* im Dubliner botanischen Garten. — **Swanton** 1902 ibid. p. 195 berichtet, dass *Hel. pisana* am Kap sehr schädlich wird und Vertilgungsmassregeln erfordert.

Limax maximus L. nach Hawaii verschleppt; **Collinge** 1902 J. Mal. IX p. 138.

Keep 1901 *Nautilus* XIV p. 114 zählt die in Kalifornien vorkommenden exotischen Arten auf.

Die Einwanderung von *Petricola pholadiformis* an den Küsten von Essex und Kent berichtet **Cole** 1902 Essex Natur. XI; die nach Belgien **Dupuis & Putseys** Ann. S. Mal. Belg. XXXVII Bull. p. IV. & **Loppens** ibid. p. XLI.

Fälle von Verschleppung von Mollusken durch Wasservögel berichtet **Finn** 1902 Nature v. 65 p. 534.

Einen sehr interessanten Beitrag zur Verschleppung und passiven Wanderung der Mollusken liefert **Caziot** 1902 Faune Corse p. 26—30. Er hat am Strand des Hafens von Bastia in Korsika nicht nur, sondern auch vor demselben im offenen Meer zahlreiche auf Korsika fehlende, meist aus Ligurien und Mittelitalien stammende Mollusken gefunden und nach und nach über vierzig Arten gesammelt, die meistens bei Scirocco antreiben; manche von ihnen überstehen bei günstigem Winde die Reise ohne Schaden.

Austernzucht etc.

Grave 1901 J. Hopkins Circ. vol. 20 p. 50 giebt einen Bericht über die Austerbetten an der Küste von Nord Carolina; — **Henking** 1901 Abh. D. Seefisch. Verein VI p. 173 über die Austernfischerei in Norwegen; — **Kellogg** 1901 Bull. U. S. Fish Comm. XIX beschäftigt sich mit der Clam (*Mya arenaria*), ihrer Zucht und wirtschaftlichen Bedeutung; — **Meek** 1900 Rep. North Sea Fish. Comm. mit der Meeresschnecke in Northumberland. — **Kellogg** 1902 Bull. N. Y. Mus. VIII berichtet über den Stand der Clams und Scallops (*Pecten*) verarbeitenden Industrien im Staate New York. — Ein populäres Werk über die Austernzucht hat **Pottier** 1902 Paris veröffentlicht. — **Holt** 1903 Rep. Fish Ireland 1901 II giebt einen Bericht über die Austernbänke der Grafschaften Wicklow und Wexford in Irland.

Perlmuscheln und Perlen.

Ueber die Perlenfischerei bei Ceylon berichtet **Collett** im Ceylon Observer 1900. — **Jameson** 1901 Pr. Z. S. p. 372 erörtert die Synonymie der verschiedenen Perlmuscheln. — Mit der Perlmuschel beschäftigt sich **Seurat** 1901 Rev. Sci. nat. appl. und Enc. Sci. Aide-Memoire. — Ueber die Entstehung der Perlen **Jameson** 1902 Pr. z. S. I. p. 140—166. Er unterscheidet ächte Perlen, Blisters (angewachsene Perlmuttbildungen, welche sich über Fremdkörper bilden, die zwischen Schale und Wand liegen), und Concretions, unregelmässige Bildungen innerhalb der Gewebe. — **Dubois** 1903 C. R. Ac. Sci. vol. 136 p. 611, und **Perrier** ibid. p. 681 machen Vorschläge wegen der Ansiedelung und künstlichen Zucht der in dem Golf von Gabès bereits eingewanderten Perlmuschel des Roten Meeres. — **Dubois** ibid. p. 178 bespricht die Perlenbildung bei *Mytilus galloprovincialis*. — Die von Seurat vertretene Entstehung der Perlen durch Parasiten bestätigt **Giard** 1903 C. R. Soc. Biol. LV p. 1222. — Auch **Herdmann** 1903 Nature p. 126 hat den Parasiten in Ceylon gefunden. Der selbe 1903 giebt einen offiziellen Bericht über die Perlenfischerei im Golf von Mnaar und einen Auszug in Nature vol. 68 p. 620. — Auch **Imthurn** 1903 Spolia Zeylan. I p. 56 giebt eine Skizze des Standes der Perlenfischerei in Ceylon.

Die Flussperlmuschel in West-Frankreich behandelt eingehend **Letaeq** 1901 im Naturaliste 1901. — Ueber die nordschleswigsche Perlemuschel *Unio pseudolitoralis* Cless. berichtet ein Anonymus im Prometheus 1903 XIV p. 63. — Ueber das Sammeln der Muscheln im Mississippi für die immer wichtiger werdende Perlmutter-Industrie macht **Baker** 1903 Nautilus XVI p. 106 interessante Angaben. — Eine riesige Perle von 24 mm Durchmesser und 185 g Gewicht wurde nach einer Notiz im Nautilus bei Genoa in Wisconsin gefunden und für 2675 Dollars verkauft.

Unsere Kenntniss der Perlmutterbildung hat einen erheblichen Fortschritt gemacht durch die Forschungen von **Jameson** (1902 Pr. zool. Soc. 1901 u. 1902). Er bestätigt die Entdeckung von **Philippi**, dass es sich bei der Perlenbildung um Unschädlichmachung eines Parasiten (*Distoma duplicatum*) handelt, und hat diese Trematode bei *Margaritana margaritifera* L., *M. maxima* Jam., *Pinna nigrina* Lam., *Hippopus hippopus* L. und *Tridacna gigas* Lam. nachgewiesen, bei *Mytilus edulis* ist es die Larve von *Leucithodendrium somateriae* Levinson, das in erwachsenem Zustand im Darm der Eiderente, auch bei *Oedemia nigra* lebt. Es gilt dies übrigens nur für die ächten freiliegenden Perlen, nicht auch für die mehr oder minder angewachsenen und die zwischen Schale und Mantel liegenden, durch welche Fremdkörper unschädlich gemacht werden. — **Dubois** (1901 u. 1903) hält den Trematoden bei *Mytilus* für eine eigene Art (*D. margaritarum*) und nimmt an, dass mit dem Tode des eingekapselten Schmarotzers meistens der Reiz zur Ablagerung von Perlenmasse aufhört und die Perle zerfällt, was die Seltenheit grosser Perlen erklärt.
