

XI. Mähren.

(excl. des Höhenrückens des mähr. Gesenkes.)

Referent: Ad. Oborny.

Literatur.

1. C. Haussknecht, Monographie der Gattung *Epilobium*. Jena 1884.
2. A. Oborny, Flora von Mähren und Oesterreichisch-Schlesien II. Brünn 1884.
3. E. Formánek, Beitrag zur Flora der Beskiden und des Hochgesenkes (Oesterr. botan. Zeitschr. 1884. No. 5—10).
4. E. Formánek, Correspondenzen in der österr. botan. Zeitschrift 1884.
5. H. Braun, Ueber *Melampyrum Moravicum* n. sp. (Oesterr. bot. Zeitschr. 1884. S. 422.)

Neu für das Gebiet:

Dianthus caesius Sm. Felsen des Rokytnathales bei Kromau!!

Epilobium montanum × *parviflorum* Michal. (*E. limosum* Schur.) Mokrá hora bei Brünn (Schur) [1]; *E. Lamyi* F. Schultz. Eichhorn (Schur sub *E. tetragon.* in herb. Par.) [1]; *E. obscurum* × *palustre* Hausskn. (*E. Schmidtianum* Rostk.). Teufelschlucht bei Brünn (Schur) [1].

Valerianella carinata Loisl. bei Bystřitz und bei Lhotka [3].

Carlina vulgaris L. var. *nigrescens* Formánek. In den mähr. Karpathengegenden häufig [3]. [Die Identification dieser, auch in Schlesien, West-Galizien und Nordwest-Ungarn, also in dem westlichen Karpathen-Gebiet verbreiteten Form mit *C. intermedia* Schur durch V. von Borbàs (Oesterr. Botan. Zeitschrift 1884, S. 268 ist unrichtig. Ich besitze auch die Schur'sche Form, die ebenfalls in Schlesien vorkommt, aus Mähren (Mokrá hora bei Brünn 1870). R. v. Uechtritz]; *Hieracium auriculiforme* Fr. (II. *Schulziorum* Ng. et Pet.). Böhm. Rudoletz [2]. Wsetin (Bubela) [2]. *H. flagellare* Willd. sbsp. *glatzense* Ng. et Pet. Ameisenhügel bei Wiesenberg. *H. auriculoides* Láng = *H. pannonicum* Naeg. et Pet. Kühberge bei Znaim, bei Mühlfraun, Sokolnitz, Schlapanitz etc. [2]. *H. nigriceps* Ng. Pet. subsp. *iseranum* Uechtr. Lehmbaude, finsterer Graben bei Wiesenberg, in [2] irrthümlich als *H. floribundum*

× *Pilosella* Uechtr. angeführt; *H. norvegicum* Fr. f. *moravica* Oborny bei Ptačov nächst Trebitsch (Zavřel) [2].

Pulmonaria obscura Du Mort. Weit verbreitet im nördlichen und mittleren Mähren [2]; *P. obscura* × *angustifolia* (*P. notha* Kern.) Wald Háj bei Bisenz (Bubela) [2]; *Symphytum bohemicum* Schmidt. Wiesen bei Poschkau und Bodenstadt [3].

Verbascum phlomoides × *austriacum* (*V. phlomoides* × *orientale* Neilr., *V. danubiale* Simk.) zwischen Adamsthal und Wranau (Theimer) und bei Schlapanitz (Czižek) [2]; *V. phlomoides* × *nigrum* Engler. Kleintesswitz [2]; *V. speciosum* × *Lychnitis* Oborny. Schloss Neuhäusel a. d. Thaja [2]; *V. nigrum* × *austriacum* Rehb. Gaissteig bei Luggau [2]; *Melampyrum bohemicum* Kern. bei Kunststadt und Oels (Člupek) [2]; *M. moravicum* H. Braun n. sp. Wsetin (Bubela) [5].

Orobanche minor Sm. bei Nebowid (G. Beck) [2].

Mentha paludosa × *candicans* (*M. Braunii* Oborny) im Leskathale bei Znaim!! [2]; *M. palustris* Mnch. in den Formen *M. plicata* Opiz, *M. M. ballotaeifolia* Opiz, *M. ovalifolia* Opiz, *M. subspicata* Whe. im südlichen Gebiete, namentlich um Znaim weit verbreitet [2]; *M. paludosa* Schreb. um Znaim, Zlabings, Mühlfraun, Iglau, Bärn, Brünn etc.; *M. parietariaefolia* Becker um Znaim, Kl. Tesswitz, Brünn, Obřan, Bisenz (Bubela) Datschitz, Kromau etc. [2]; *M. verticillata* L. Nikolsburg, Znaim, Kl. Tesswitz [2]; *M. austriaca* Jacq. Znaim [2]; *M. rubra* Smith. Olmütz, Göding (Braun) [2]; *Salvia pratensis* × *silvestris* (*S. elata* Host). Znaim, Pöltenberg, Tesswitz, Kromau [2].

Rumex stenophyllus Led.? (*R. biformis* Menyh.) zwischen Tellnitz und Satschan [2]; *R. maritimus* × *conglomeratus* (*R. Knafii* Čelak. bei Brünn (Schur) [2].

Alnus glutinosa × *incana* Krause. Wiesenberg [2].

Salix cinerea × *purpurea* Wimm. (*S. Pontederana* Koch) um Znaim [2]; *S. caprea* × *aurita* Wimm. (*S. Capreola* Kern.) Luggau [2]; *S. aurita* × *repens* Wimm. (*S. ambigua* Ehrh.) bei Wsetin und Bisenz (Bubela) [2].

Stipa Grafiana Stev. am Stierfelsen bei Znaim, am Tunold bei Nikolsburg, Weinberg bei Zaisa!! *Melica picta* C. Koch. Teufelsmühle und Kopanina bei Gr. Maispitz, Stierfelsen bei Znaim, Gaissteig bei Luggau!! Bisenz (Ansorge in Herb. Uechtritz); *Molinia serotina* Mert. Koch. Abhänge des Pöltenberges bei Znaim!! Kreuzberg bei Kromau (H. Zimmermann).

Verwildert:

Alnus serrulata Willd. Zwischen Blansko und Katharein (Theimer) [2].

Wichtigere neue Fundorte:

Thalictrum flexuosum Bernh. Wiesenabhang bei Grumviř nächst Klobouk bei Auspitz [4]; *Helleborus viridis* L. Wallachisch-Meseritsch (Klanič) [3].

Dentaria glandulosa W. K. Wsetin, Frankstadt, Rožnau, Wall-Meseritsch [3]; *Lunaria rediviva* L. Radhost, Kičera und bei Polična [3].

Cucubalus baccifer L. Knibitz (Klanič) [3]; *Spergularia salina* Presl. v. *genuina* Čelak. bei Czeitsch [4].

Oxytropis pilosa DC. Wiesenabhang bei Grumviř nächst Klobouk und bei Morkuwek [4].

Epilobium Dodonaei Vill. Wsetin, Zubří, Frankstadt, Pošlá, Poschkau, Bodenstadt [3].

Callitriche stagnalis Scop. bei Budkau und Waltersdorf [2]; Jorns-dorf (Paul) [2] und Freiberg (Czižek) [2]; breiter Busch bei Domstadt [3].

Chrysoplenium oppositifolium L. bei Domoraz (Klanič) [3].

Dipsacus pilosus L. bei Knibitz, selten [3]; *Scabiosa Columbaria* L. massenhaft auf dem Kotouč bei Stramberg [3].

Inula Oculus Christi L. Grumviř bei Auspitz und am Misskogel bei Wedrowitz [4]; † *Galinsoga parviflora* Cav. bei Olmütz [3]; † *Rudbeckia laciniata* L. Ufer der Oskava bei Knibitz verwildert [3]; *Cirsium eriophorum* Scop. am Čáb und auf anderen Bergen um Rožnau [3]; *Arnoseris minima* Lk. Umgebung von Zlabings, Modes im westlichen und Mährisch-Schönberg im nördlichen Landestheile [2]; *Hypochaeris glabra* L. Kunststadt und Oels (Člupek), Stallek, Modes, Waltersdorf, Stadt Liebau [2]; bei Zubří, Kuntschitz, Sternberg [2 und 3]; *Taraxacum leptcephalum* Rehb. Neu-Prerau massenhaft (Ripper) [2]; *T. serotinum* W. Kit. Wiesenabhang bei Grumviř nächst Auspitz [4]; *Lactuca quercina* L. Hoja-Auen bei Grussbach (Ripper) [2]; *L. sagittata* W. K. Hoja-Auen bei Grussbach [2]; *Mulgedium alpinum* Cass. Kněhina-Abhang bei Trojanowitz [2]; *Crepis rigida* W. K. bei Schütbořitz (Šebesta, Bubela) [2]; † *C. nicaeensis* Balb. um Wsetin verschleppt (Bl.); *Hieracium flagellare* Willd. Hohenstadt (Panek) Bobrek bei Wsetin (Bubela) [2]; *H. floribundum* W. Gr. Kotěřov bei Prossnitz (Spitzner), bei Sternberg (Uechtr. sen.), Niederungen bei Bisenz (An-sorge, Bubela) [2]; *H. cymosum* × *Pilosella* Kr. = *H. canum* Ng. et Pet. um Znaim und Brünn nicht selten; *H. Schmidtii* Tausch. Königsstuhl bei Znaim [2]; *H. styriacum* Kern. bei Klobouk nächst Auspitz (Steiger) [2]; *H. racemosum* W. K. Durchlasser Wald bei Znaim, bei Luggau [2]; *H. barbatum* Tausch. Christianshain am Babylon bei Brünn (Czižek), Turas, Schembera-Höhe bei Obřan, Frauenholz bei Freiberg

[2], Wsetin (Bubela) Hohenstadt (Panek) [2]; und sonst zerstreut in Nord-Mähren [3]; *H. tenuifolium* Host. Granitz-, Leska- und Thajathal bei Znaim [2].

Campanula latifolia L. am Radhost, auf der Černa hora, auf dem Ondřejník bei Friedland, auf der Kičera bei Frankstadt [3]; *C. Cervicaria* L. bei Wsetin, Bobrek, Pošlá und Jasenitz (Bubela) [2], bei Rožnau, Dužná, Trojanowitz, Frankstadt, Weisskirchen [3]; bei Bärn (Gans), am Kosíř, und im Walde Pošlá bei Prossnitz (Spitzner) [2]; *C. sibirica* L. Wiesenhang bei Grumviř nächst Klobouk [4].

Chimophila umbellata Nutt. bei Weisskirchen (Ripper) [2]; Gaisdorf [3].

Gentiana asclepiadea L. Berg Ondřejník bei Friedland, auf dem Smrk bei Čeladna und bei Ružanka [2]; *G. obtusifolia* Willd. var. *spatulata* (Bartl.) auf dem Javorník [2].

Echium rubrum Jacq. Bergholz bei Znaim [2], bei Auspitz [4].

Verbascum Lychnitis × *austriacum* (*V. Hausmannii* Čelak.). Weinberg bei Zaisa, Traussnitzmühle bei Znaim [2].

Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. Hügel Kosíř bei Prossnitz (Spitzner) [2]; *O. Kochii* Schultz. Grumviř bei Klobouk [4].

Mentha Pulegium L. Neu-Prerau und Fröllersdorf [2]; *Lycopus exaltatus* L. fil. Neusiedel a. d. Thaja (Ripper) [2]; *Stachys alpina* L. Wall.-Meseritsch (Reissek), Wsetin (Bubela) [2], um Hostein, bei Rožnau, Frankstadt, Weisskirchen, Thein, Bodenstadt etc. [3]; *St. arvensis* L. Hohenstadt (Panek), Kunststadt (Člupek) [2]; *Phlomis tuberosa* L. Naschetitz und Tasswitz [2]; *Scutellaria hastifolia* L. zwischen Neusiedel und Grussbach (Ripper) [2]; *Teucrium montanum* L. am heiligen Berge bei Nikolsburg, selten (Ripper) [2].

Utricularia neglecta Lehm. bei Bodenstadt [3].

Trientalis europaea L. auf der Černá hora, auf der Tanečnice und auf dem Javorník in den Karpathen [2]; *Lysimachia thyrsiflora* L. um Zlabings, Datschitz häufig [2]; *Samolus Valerandi* L. bei Neu-Prerau [2].

Amarantus silvestris Desf. bei Znaim, Pöltenberg [1]; bei Bisenz und Veselí (Bubela) [2]; *Salicornia herbacea* L. bei Guttenfeld (Ripper) [2]; *Kochia prostrata* Schrad. zwischen Mautnitz und Těšchan [2].

Rumex Hydrolapathum × *aquaticus* (*R. maximus* Schreb.) bei Obřan nächst Brünn (Czižek) [2]; *R. arifolius* All. Černá hora, am Cáb, am Radhost bei M. Weisskirchen [3]; am Ondřejník bei Friedland und auf dem Javorník [2]; *Polygonum danubiale* Kern. Ufer der Thaja [2]; und Bečva (Bubela) [2]; *Fagopyrum tataricum* Gärtn. um Wsetin (Bl.), Friedland und im westlichen Gebiet häufig um Zlabings [2].

Daphne Cneorum L. Hosterlitz [2]; am Kosíř bei Prossnitz (Spitzner) [2].

Thesium intermedium Schrad. am Kosíř bei Prossnitz (Spitzner) [2];

T. ramosum Hayne bei Kromau (Zimmermann) [2]; *T. pratense* Ehrh. am Ondřejník bei Friedland [2].

Euphorbia stricta L. Ostrawitzthal unterhalb Friedland [2]; am Kotouč bei Stramberg und Gr. Kuntschitz [3]; *E. pilosa* L. var. *leiocarpa* bei Watzlawitz nächst Prossnitz (Spitzner) [2]; *E. virgata* W. K. Bei Prossnitz (Spitzner) [2].

Quercus pubescens Willd. bei Morkuwek [4]; *Q. Cerris* L. Thiergarten bei Kromau (Zimmermann) [2], Kuketai bei Esseklec [2].

Betula carpathica Willd. Rosenau bei Datschitz [2].

Salix daphnoides Vill. Bečva-Ufer bei Wsetin (Bubela) [2]; Schönau, Zubří [3]; *S. purpurea* × *viminalis* Wimm. (*rubra* Huds.) bei Wsetin (Bubela) [2]; bei Prossnitz (Spitzner) [2]; v. *angustifolia* (Tausch) bei Mährisch-Schönberg [2].

Calla palustris L. feuchte Stellen am Gipfel der Rybničky im Čerwinkathale [3].

Epipogon aphyllus Swartz. auf der Suchá hora bei Brünn [4]; *Epipactis rubiginosa* Koch. bei Stramberg [3]; *E. palustris* Crantz. Hoštalkau, Semetín, Dužná, Rožnau, Frankstadt, Bodenstadt, Poschkau etc. [3].

Carex Davalliana Smth. um Wsetin (Widimský) [3].

Poa silvatica Chaix var. *remota* Fr. auf der Černá hora und Tanečnice in den Karpathen [3].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf

Artikel/Article: [Mähren CXLIV-CXLVIII](#)