

Neusiedel! *Orobanche elatior* Sutt. Grafendorf am Trabinger Hofe, im Hohlwege zwischen Kl. Tesswitz und Znaim! *O. ramosa* L. Grafendorf [sämmtlich 4].

Mentha serrulata Opiz Znaim! Brünn; *M. montana* Host Znaim! *M. austriaca* Jacq. var. *sparsiflora* H. Braun Znaim! var. *prostrata* Host Znaim! *M. palustris* Mneh. var. *silvicola* H. Braun Brünn; Hadiberg bei Obřan; Lilienfeld!, Fröllersdorf!, Neusiedel!, Czernowitz; *M. arvensis* L. var. *Marrubiastrum* F. Schultz Brünn: Adamsthal; † *M. rubra* Smith Olmütz, Znaim und Iglau; var. *resinosa* Opiz Olmütz und Göding; *M. Pauliana* F. Schultz Thajathal bei Znaim! † var. *variegata* Sole Bauerngärten um Nikolsburg; *M. gentilis* L. Klobouk; Kaschwitz; Auspitz [sämmtlich 2]; *M. Braunii* Oborny im Verlaufe des ganzen Granitzthales bei Znaim an vielen Stellen! [4]; *Salvia austriaca* Jacq. zwischen Bilowitz und Czeikowitz und bei Mutenitz [4]; *S. Aethiopsis* L. Obrowitzer Friedhof bei Brünn [6]; *Teucrium Scordium* L. Neusiedel und Höflein [4].

Trientalis europaea L. Ober-Bory nächst Křižanau [3]; *Hottonia palustris* L. Eisenbahngräben zwischen Göding und Lužitz [4].

† *Kochia Scoparia* Schrad. Höflein und Grafendorf; bei Joslowitz [4].

Rumex pratensis M. et Koch Neu-Prerau und Höflein [4].

Salix repens L. Wiesen zw. Gr. Ullersdorf und Reutendorf [4].

† *Elodea canadensis* Rich. in der Valová bei Kralitz; Gräben in den Niederungen um Zwittau, 1889 zuerst bemerkt [4].

Arum maculatum L. Wälder bei Schirmsdorf nächst Zwittau.

Orchis Rivini Gouan Musslau auf Wiesen und bei Brüsau; *O. ustulata* L. zwischen Trübau und Zwittau und um Zwittau! *O. mascula* L. Zwittau [4].

Gagea bohemica Schult. Grafenberg bei Gnadlersdorf, Nähe der niederösterr. Landesgrenze! [4].

XVII. Nieder-Oesterreich.

Referent: G. Ritter Beck von Mannagetta.

Litteratur:

1. bis 9. Oesterr. botan. Zeitschr. XL. 1. V. v. Borbás, Notiz (S. 26). 2. V. v. Borbás (s. Allg. I). 3. H. Braun und G. Sennholz, *Calamintha mixta* (S. 158—160). 4. R. v. Wettstein, C. Rechinger, Notizen (S. 248). 5. C. Fritsch, Notiz (S. 279). 6. R. v. Wettstein (s. Allg. ee). 7. V. v. Borbás, L. Wiedermann, F. Höfer, E. Hackel, Notizen (S. 427—428). 8. E. v. Halácsy, Neue Brombeerformen aus Oesterreich (S. 431—434). 9. G. v. Beck, Bericht über die floristische Durchfor-

schung Niederösterreichs, 1890 (S. 277—279, 385, 386). **10. G. v. Beck** (s. Allg. f). **11. M. v. Elchenfeld**, Floristisches (Sitzungsber. Zool.-Bot. Ges. Wien. XL, S. 42). **12. H. Braun** (s. Allg. m). **13. R. Walz**, Zur Flora des Leithagebirges (Abh. d. Zool.-Bot. Ges. Wien. XL, S. 549—570, nicht excerptirt!). **14. G. v. Niessl**, Zur Flora von Marbach bei Persenbeug (Sitzungsber. naturf. Ver. Brünn XXVII, S. 32, 33). **15. G. v. Beck**, Die Nadelhölzer Niederösterreichs (Blätter des Ver. für Landeskunde von Niederösterreich. 1890, S. 34—81) **16. V. v. Borbás**, *Quercus Budenziana* et species Botryobalanorum (Termész. Füzet. XIII 1, S. 26). **17. G. v. Beck** (s. Allg. e, nicht excerptirt!). **18. V. v. Borbás** (s. Allg. k). **19. H. Sabransky** (s. Allg. bb2). **20. V. v. Borbás**, *A Lathyrus affinis* és *L. gramineus* (Termész. Füzet. XII, S. 4). **21. V. v. Borbás**, *Symbolae ad Thymos Europae mediae praesertim Hungariae cognoscendos* (Math Termész. Közlem. Tudom. Akad. XXIV, S. 39—116). **22. G. v. Beck** (s. Allg. d; da dieses Quellenwerk eine völlige Neubearbeitung der Flora von Niederösterreich enthält, habe ich aus demselben nur die wichtigsten für das Land neuen Arten und Hybriden im Folgenden namhaft gemacht; bezüglich der zahlreichen neuen Varietäten, Umtaufungen, Standorte etc. muss auf das Werk verwiesen werden).

Vgl. auch Allg. No. 1, 3, 5, 6, 13, 15—21, 27, 29, 30, 42—45, 48, 50—53, 55, 57, 61, 62, 65, 67—71, 74—76, 79, 82—87, 92—94, 96, 99, 101—107.

Neu für das Gebiet:

Pulsatilla nigricans × *vulgaris* (*P. affinis* Lasch) Wien: Türken-
schanze; *Anemone nemorosa* × *ranunculoides* (*A. lipsiensis* G. Beck = *A.*
intermedia Winkl. nicht Schult.) Wien: Neuwaldegg; (*A. vindobonensis*
G. Beck) Wien: Hermannskogel; *Batrachium Rionii* Nym. Feldsberg:
Nimmersattteich; *Ranunculus cassubicus* L. Sebar: Zeiselberg [22].

Nymphaea candida Presl Teiche bei Gmünd; Litschau; *Nuphar*
pumilum Sm. Reissbach bei Schönau nächst Litschau [22].

Viola odorata L. var. *variegata* DC. Königswarte bei Wolfsthal;
V. scotophylla × *cyanea* (*V. Hallieri* Borb.) (s. oben S. (97) um Kalks-
burg [18]; *V. ambigua* W. K. var. *gymnocarpa* Janka bei Mödling;
V. revoluta Heuff. Hundsheim; var. *gymnogynia* Borb. Kalkberge von
Kalksburg bis Mödling; *V. gymnocarpa* × *perfibriata* (*V. Neilreichiana*
Borb. nicht = *V. Neilreichii* C. Richt.) Kalksburg bis Mödling, bei Neu-
dorf; *V. collina* × *perfibriata*? (*V. atrichocarpa* Borb.) bei Kalksburg;
Rodaun [2]; *V. mirabilis* × *Riviniana* (*V. Uechtriziana* Borb.) auf den
Hundsheimer Bergen; *V. lucorum* × *Riviniana* (*V. neglecta* Schmidt)
bei Mautern; Kalksburg [18]; *V. Ruppii* All. bei Breitenfurt; Kalks-
burg [1].

Polygala amarella Crantz var. *orbicularis* Chodat bei Redlschlag
und am Semmering; *P. Chamaebuxus* L. var. *heterochroa* Borb. bei
Bernstein [7].

Cytisus Laburnum L. vgl. [6] u. oben S. (98); *Lathyrus Nissolia*
Neilr. u. Kovats nicht L. = *L. gramineus* A. Kern. bei Neuwaldegg [20].

Rubus Kelleri Hal. am Eichberge bei Gloggnitz; *R. styriacus* Hal.
in der Rams bei Kranichberg; *R. macrocalyx* Hal. und *R. Richteri* Hal.

am Eichberge bei Gloggnitz [8]; *R. polyacanthus* Greml. auf der Rams gegen Kirchberg am Wechsel [19].

Orobanche vgl. [17].

Mentha vgl. [12]; *Calamintha Acinos* × *alpina* (C. mixta Ausserd.) auf der Hohen Wand bei Mayersdorf [3]; *Thymus Chamaedrys* Fr. var. *parvifolius* Opiz; *Th. Marschallianus* Willd. var. *calvifrons* Borb. u. Braun bei Mödling; *Th. lanuginosus* Mill. var. *badensis* H. Braun auf dem Mitterberge bei Baden [21].

Primula longiflora All. ein Exemplar in den Donauauen bei Emmersdorf [5].

Rumex pratensis × *maritimus* (R. Heimerlii G. Beck) bei Maria-Lanzendorf [22].

Quercus asterotricha Borb. in Niederösterreich [16]; *Qu. pubescens* × *sessiliflora* (*Qu. intercedens* G. Beck) bei Hainburg und im Pürscherwalde bei Bruck an der Leitha; (*Qu. Tiszae* Simk. et Fek.) bei Hainburg, Vöslau; (*Qu. badensis* G. Beck) bei Baden; *Betula rotundata* (Čel.) bei Litschau; Karlstift; Gutenbrunn [22].

Salix retusa × *Jacquiniana* (S. semiretusa G. Beck) auf der Raxalpe; *S. grandifolia* × *purpurea* (?) (S. intercedens G. Beck) auf dem Föllbaumberge bei Gaming; auf dem Oehler; *S. syntriandra* G. Beck [= *S. Mauternensis* A. Kern. fl. exs. austro-hung. nr. 1468]; *S. nigricans* × *purpurea* (S. Beckeana G. Beck) = *S. vandensis* A. Kern. nicht Forbes [22]; *Populus alba* × *tremula* (P. ambigua G. Beck) im Wiener Prater [22].

Orchis speciosa × *pallens* (O. erythrantha G. Beck) bei Rabenstein an der Pielach [22]; *O. palustris* × *incarnata* (O. Eichenfeldii G. Beck [22] = *O. Uechtriziana* Eichenf. [11] nicht Hausskn.).

Einige wichtigere neue Fundorte:

† *Gypsophila perfoliata* L. bei der St. Marxer Linie von Wien [22]; † *Stellaria viscida* M. B. bei Wilfleinsdorf an der Leitha [13]; *Cerastium brachypetalum* Desp. var. *C. tauricum* Spr. am Hundsheimer Berge; bei Hardegg [18].

Rosa subglobosa Sm. in der Mittelzone des Leithagebirges; *R. eriostyla* Rip., *R. comosa* Rip., *R. apricorum* Rip. um Mannersdorf; *R. Jundzilliana* Bess. f. *reticulata* A. Kern. zwischen Mannersdorf und Burbach; *Rubus suberectus* And., *R. plicatus* W. N., *R. sulcatus* Vest, *R. thyrsoideus* Wimm., *R. bifrons* Vest, *R. pyramidalis* Kalt. Leithagebirge bei Mannersdorf [13].

† *Erechthites hieraciifolia* Raf. am Schiedberge zwischen Böheimkirchen und St. Pölten [7]; *Xeranthemum annuum* L. an der Bahn zwischen Seiring und Olberndorf [7].

Vinca herbacea W. K. Zeilerberg zwischen Bruck und Winden [7].

Primula elatior × *pannonica* (P. fallax C. Richt.) im Klosterthale hinter Guttenstein [4].

Salix grandifolia × *Caprea* (*S. dendroides* A. u. J. Kern.) im Klosterthale bei Guttenstein [4].

Koeleria glauca DC. zwischen Weikendorf und Siebenbrunn; *Festuca vaginata* × *pseudovina* (*F. Hackelii* G. Beck) [22].

Pinus nigra Arn. f. *hornotina* G. Beck in der Weikendorfer Remise; *Juniperus sibirica* Burgsd. (*J. nana* Willd.) var. *imbricata* G. Beck [15].

XVIII. Ober-Oesterreich.

Referent: Fr. Vierhapper.

Quellen:

a) Litteratur:

1. V. v. Borbás (Oesterreich.-Bot. Zeitschrift XL, S. 132, 167). 2. H. Braun, (s. Allg. m) 3. I. Dörfler, Beitrag zur Flora von Oberösterreich. (Verhandlungen der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien. XL, S. 591—610.) 4. I. Dörfler, Flora von Oesterreich-Ungarn. Oberösterreich. (Oesterreich.-Botan. Zeitschrift XI, 239 bis 242, 457—461, XLI, 242—246). 5. Eug. von Halácsy, (s. Niederösterreich Nr. 8). 6. E. Ritzberger, Aufzählung der oberösterr. Cyperaceen. (XX. Jahresbericht des Vereines für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns. Linz 1891).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

7. Dr. A. Dürrnberger, Hof- und Gerichtsadvokat in Linz. 8. M. Haslberger, Pfarrer in Arbing bei Mauthausen (Mühlkreis). 9. V. Simel, Lehrer in Schlägl bei Aigen (Mühlkreis). 10. Fr. Vierhapper jun., Studirender in Ried. 11. dem Referenten.

Neu für das Gebiet:

Caltha cornuta Schott Ried; *C. laeta* Schott am Hongar [11].

Corydallis intermedia P. M. E. Unterlaussa [4].

Arabis hispida Myg. (*A. petraea* auct. germ.) Almkogel; Hinterstoder; *Teesdalea nudicaulis* R. Br. Kreuzen [7].

Viola foliosa Čelak. bei Steyr; *V. fraterna* Reichb. um Linz [1].

Rosa pendulina L. var. *parcepilosa* H. Braun; *R. pendulina* × *spinosis-sima* (*R. adjecta* Déségl.) Schieferstein; *R. rubrifolia* Vill. var. *glaucescens* Wulf.; *R. micrantha* Sm. var. *R. permixta* Déségl. und *R. tomentosa* Sm. var. *R. subglobosa* Sm.; *R. urtica* Lem. var. *trichoneura* Rip. Queraln; *R. oblonga* Déségl. et Rip. Schiffberg var. *trichostylis* H. Braun Schieferstein; *R. sphaeroidea* Rip. var. *biserrata* Mér. Queraln; *R. montivaga* Déségl. Schieferstein; *R. aciphylla* Rau; *R. canina* L. var. *fissidens* Borb. sämmtlich bei Reichraming [3]; *Rubus leucostachys* Schleich. Spital am Fusse des Pyrgas; *R. scaber* W. et N. bei Steyr; *R. Koehleri* W. et N. *β bavaricus* Focke bei Steyr; *R. Schleicheri* W. bei Steyr [5].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Beck Günther [Gunthero] Ritter von Mannagetta

Artikel/Article: [Nieder-Oesterreich 1146-1149](#)