

„waren, sodass ich für nöthig hielt, die Pflanze in einen grössern „Topf zu versetzen. Bei dieser Gelegenheit sah ich nun die „merkwürdige Gestaltung, die ich sogleich zeichnete, und von „welcher Zeichnung ich hier eine Nachbildung gebe, die das Ganze „in ungefähr der halben Grösse darstellt.“

„Athen, 10. Septbr. 1880. Dr. J. F. Julius Schmidt.

In der Zeichnung ist a. das Kopfende der Frucht; b. bis k. die vordere Partie des Kotyledonarblattes; bei k. entwickelte sich die weissgrüne Keimknospe nach oben, und unterhalb derselben sieht man die bereits kräftig entwickelte Wurzel d. mit den kleinen, fleischigen, hellfarbigen Wurzelfasern e. c. c.

Athen, den 11. Septbr. 1880.

(Originalmittheilung.)

Sammlungen.

Arnold, F., *Lichenes Jurae et aliarum regionum exsiccati*. Nr. 822—869. Mit Nachtrag. München 1880.

Diese Fortsetzung zeichnet sich durch den Inhalt an selteneren Flechten, die fast durchgehends in schönen und lehrreichen Exemplaren gegeben sind, aus. Die als Neuheiten gebotenen Formen haben ja nicht für jeden Lichenologen den gleichen Reiz. Jedenfalls erhöhen dieselben für die sich mit dem Herausgeber auf der gleichen herrschenden Anschauungsgrundlage bewegenden Lichenographen noch die Vorzüge dieser Fortsetzung. Der Herausgeber selbst hat die bei weitem überwiegende Mehrzahl von Formen, und zwar aus Baiern, Tirol und Kärnthen, geliefert.

Nach den Florengebieten sondert sich der Inhalt dieser Fortsetzung folgendermaassen:

Westfalen (Lahm und Riess):

855. *Opegrapha subsiderella* Nyl. 858. *Leprantha impolita* Ehrh.. 861. *Verucaria aethiobola* Wahlb.

Baden (von Zwackh):

825. *Imbricaria fuliginosa* (Fr.) v. *subaurifera* Nyl. 836. *Biatora lithinella* Nyl. 850. *Lecidea microstigma* Nyl. 859b. *Arthonia populina* Mass. 866. *Thelocarpon interceptum* Nyl. n. sp.

Baiern (Arnold):

829. *Callopisma lacteum* (Mass.) f. *aestimabile* Arn. 837. *Bilimbia albicans* Arn. n. sp. 847. *Lecidea platycarpa* Ach. v. *phaea* Flot. 859a. *Arthonia populina* Mass. 863. *Porina muscorum* Mass. v. *transgrediens* Arn. 867. *Collema granosum* (Wulf.) Schaer.

Tirol (Arnold):

788b. *Parmelia stellaris* L. 809b. *Lecidea albicoerulescens* Wulf. var. *flavo-coerulescens* Horn. 821b. *Biatora mendax* Anz. 822. *Usnea microcarpa* Arn. 823. *Pilophorus Cereolus* Ach.*). 826. *Parmelia obscura* (Ehrh.) v. *lithotea* Ach. 830. *Rinodina sophodes* (Ach. Nyl.) sax. 831. *Lecanora atrynea* Nyl. 833. *Aspicilia depressa* (Ach. Nyl.) v. *silvatica* Zw. 835. *Biatora vernalis* L. 838. *Lecidella armeniaca* (DC.) f. *aglaeoides* Nyl. 839. *L. Brunneri* Schaer. v. *Crombiei* Jon.. 840. *Lecidea exornans* Arn. 841. *L. panaeola* Ach. 842. *L. tenebrosa* Flot. 843. *L. obscurissima* Nyl. 844—846. *L. infirmata* Arn. n. sp. 848. *L. 'parasema* Ach. Nyl. 849. *L. intercalanda* Arn. n. sp. 852. *Catocarpus polycarpus* Hepp.. 853. *Rhizocarpon obscuratum* Ach. 854. *Rh. rubescens* Th. Fr. 856. *Lithographa tesserata* DC. 857. *L. cyclocarpa* Anz. 860. *Normandina laetevirens* Turn.. 864. *Sporodictyon clandestinum* Arn. 865. *Microthelia anthracina* Anz. 868. *Leciographa attendenda* (Nyl.) 869. *Scoliosporum umbrinum* Ach.

Kärnthen (Arnold):

834. *Pertusaria lactea* Wulf.. 851. *Catocarpus atroalbus* Wulf.

Frankreich (Lamy und Richard):

824. *Imbricaria perforata* Jacq. 827. *Gyrophora murina* DC. 828. eadem f. *grisea* Sw. 832. *Lecanora effusa* (Pers.) Ach.

Uruguay (P. G. Lorentz):

862. *Pyrenula glabrata* Ach.

In sched. rect. werden folgende Aenderungen der Bestimmung ausgesprochen.

255b. wird für *Aspicilia calcarea* (L.) a. *concreta* Schaer. erklärt. 549a. b. als *Bilimbia cinerea* v. *hypoleuca* herausgegeben, ist *Lecidea leucoblephara* Nyl. teste autore! 648. *Lecanora sarcopsis* Wahlb. wird für *L. effusa* Pers. erklärt. 662. *Lecanora Bockii* st. ? ist *L. mastrucata* Wahlb. teste Nyl. Endlich wird 796. *Biatora leprosula* Arn. v. *subglaucella* Arn. für *B. pullata* Norm. erklärt.

M i n k s (Stettin).

Personalnachrichten.

Der Lichenolog, Lehrer **Herm. Gust. Falk**, geb. am 7. Juni 1840, starb in Karlskrona am 12. Octbr. d. J.

*) Mit Unrecht citirt A., der herrschenden Sitte folgend, *P. Fibula* Tuck. als Synonym. Nach dem Ref. vorliegenden amerikanischen Expl. kann, wenigstens von dem herrschenden Standpunkte aus, die skandinavische Form, welche also auch in Tirol auftritt, und welche Ref. schon im J. 1872 oberhalb Fuscher-Bad (Salzburg) auffand, keineswegs ohne Weiteres mit der amerikanischen identificirt werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [3-4](#)

Autor(en)/Author(s): Minks Arthur

Artikel/Article: [Sammlungen 1663-1664](#)