

Subordo V.

**Lecythideae.**

*Lecythis* Loeffl.

*Lecythopsis* Schrk.

*Couratari* Aubl.

*Eschweileria* Mart.

*Bertholletia* Mart.

(Schluss folgt.)

---

Lichenologische Beiträge von Dr. J. Müller.

XV.

(Schluss.)

474 *Graphinae* sect. *Platygrammina* Müll. Arg. Characteres ut in sectione *Platygraphina*, sed peritheciū dimidiatum, basi sub lamina deficiens. Hujus loci sunt:

*Graphina* (s. *Platygrammina*) *Columbiana* Müll. Arg. L. B. n. 209. — In Nova Granata (Lindig n. 877, 897, 2685, 2732) et prope Caracas (Dr. Ernst).

*Graphina* (s. *Platygrammina*) *hololeuroides*; *Graphis hololeuroides* Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 135; Krph. Lich. Warm. n. 100. — In Nova Granata et in Brasilia (Dr. Warming).

*Graphina* (s. *Platygrammina*) *oblecta* Müll. Arg. Lich. Afr. occid. n. 32. — In Africae trop. occid. regione Quillu (Pechuel-Loesche n. 300 p. p.).

475. *Graphinae* sect. *Chlorographina* Müll. Arg. Lirellae crasse thallino-vestitae, sub strato thallino pallidae aut coloratae, margines crassi, conniventi-subclausi, haud longitrorsum sulcati, basin versus saepe expallentes v. fere indistincti; discus sub-coloratus, subvestitus, angustus, concavus. Hic pertinent praeter alias numerosas: *Graphina Balfourii*, *G. chloroleuca*, *G. triphora*, *Gr. frumentaria* Müll. Arg. loc. diversis, et:

*Graphina* (s. *Chlorographina*) *Balbisii*; *Graphis Balbisii* Fée Ess. p. 48 t. 10 fig. 5, e St. Domingo, et (ex hb. Hamp.) in cortice Cinchonae.

476. *Phaeographina* Müll. Arg. Omnia ut in genere *Graphina* sed sporae fuscae v. pallide fuscae, aut, si placet, omnia ut in genere *Phaeographide* sed sporae parenchymatice divisae. — *Leiorreuma* Auct. pr. p.

477. *Phaeographinae* sect. *Homoloma* Müll. Arg. — Genus *Thecographa* Mass. Esam. compar. p. 35. — Perithecia fusco-nigra, haud strato thallino vestita, haud sulcata, basi completa; margines crassi, conniventes; discus niger et angustus.

*Phaeographina* (s. *Homoloma*) *prosiliens*; *Opegrapha prosiliens* Montg. et v. d. Bosch in Montg. Syll. p. 349 et Lich. Jav. p. 42. — In insula Java, sed *Opegrapha sclerocarpa* Mey. et Flot. ibid. ab auctorib. citata e specim. orig. est diversissima.

478. *Phaeographinae* sect. *Diploloboma* Müll. Arg. Lirellae strato thallino vestitae, peritheciū fusco-nigrum, basi completum; margines crassi, conniventes; discus niger et angustus.

*Phaeographina* (s. *Diploloboma*) *basaltica*; *Graphis basaltica* Krplh. in Warmingii Symbol. p. 393. — Prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 7120.

*Phaeographina* (s. *Diploloboma*) *exserta*; *Graphis exserta* Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 73. In Nova Caledonia.

479. *Phaeographina* (sect. *Diploloboma*) *intricatissima* Müll. Arg. Thallus fusco- v. olivaceo-pallens, laevigatus, nitidulus, linea nigra limitatus; lirellae elongatae et dense dichotome ramoso-intricatae, emergentes, tantum  $\frac{1}{8}$  mm. latae, usque ad apicem extus thallino-vestitae, margines leviter sulcati et integri, conniventes, discus angustus et niger, peritheciū integre nigrum basi teres et ibidem vulgo tenuius at concolor; sporae in ascis octonae, subfuscæ, 15—17  $\mu$  longæ,  $6\frac{1}{2}$   $\mu$  latae, transversum lenticulari-6-loculares, loculi superiores 1—3 longitrussum divis. — In insula Java (hb. lugd. bat.).

480. *Phaeographinae* sect. *Epiloma* Müll. Arg. Peritheciī margines proprii nigri quasi superi, alte crasso-rhombeo-dilatati, circ. dimidia altitudine laminae abrupte deficientes, basi deficientes, cum disco angusto nigri v. subnigri, conniventes, thallino-vestiti.

481. *Phaeographina* (sect. *Epiloma*) *platyloma* Müll. Arg. Thallus hypophloeodes, olivaceus, laevis, linea nigra limitatus, lirellae erumpentes, 2—4 mm. longae,  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  mm. latae, simplices

v. furcatim paullo ramosae, utrinque acutae, lateraliter thallo adscendente marginatae, margines proprii nigri, valde incrassati, in sectione verticali latiores quam alti, supra convexi v. plano-convexi, integri et latiuscule nigro-nudati, sulco arcte conniventes, in parte dimidia inferiore laminae nulli v. saltem non colorati; lamina et hypothecium hyalina; sporae iu ascis solitariae, fuscae, oblongato-ellipsoideae, 110—150  $\mu$  longae, 28—40  $\mu$  latae, parenchymatice crebre multicellulosae. — Habitu thalli ad *Ph. sculpturalam* accedit, sed margines apice eximie horizontaliter dilatati sunt et discus non plano-apertus est. — In insula Java (hb. lugd. bat.).

482. *Phaeographinae* sect. *Eleutheroloma*. Peritheci margines nigri v. nigro-fusci, tenues v. subtenues, in lirellis evolutis inter se distantes, superne magis evoluti, inferne subevanescentes; discus late apertus, subplanus, nigro-fuscus. — Genus *Leiorreuma* Mass. pr. p. et *Leiogramma* Eschw. pr. p.

*Phaeographina* (s. *Eleutheroloma*) *sculpturata*; *Leiogramma sculpturatum* Eschw. Brasil. p. 97; *Graphis sculpturata* Ach. et Auct. *Graphina sculpturata* Müll. Arg. L. B. n. 150. Species latissime distributa.

*Phaeographina* (s. *Eleutheroloma*) *reticulata*; *Graphis reticulata* Fée in Bull. Soc. bot. de France 21 p. 29; *Graphina reticulata* Müll. Arg. L. B. n. 149. — In Brasilia prope Rio de Janeiro Glaziou n. 5475, et prope Xiririca: Puiggari n. 141.

*Phaeographina* (s. *Eleutheroloma*) *crassa*; *Graphis crassa* Fée in Bull. Soc. bot. de France 21 p. 30. — Prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 5034.

*Phaeographina* (s. *Eleutheroloma*) *lecanographa*; *Graphis lecanographa* Nyl. in Flora 1869 p. 123; *Graphina lecanographa* Müll. Arg. L. B. n. 151. — In Brasilia prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 2014, 5007, 6329, et prope Apiah: Puiggari n. 347, 479, 501.

483. *Phaeographis* sect. *Chromogramma* Müll. Arg. Peritheciu coloratum (fusco-purpurascens), completum, crassum, extus thallino-vestitum; discus latus, planus, nudus, coloratus.

*Phaeographina* (s. *Chromogramma*) *Montagnei*; *Graphis Montagnei* v. d. Bosch in Montg. Syll. p. 346; *Lecanactis Montagnei* Nyl. Enum. p. 134; *Graphina Montagnei* Müll. Arg. L. B. n. 156. — In insula Java: Junghuhn.

484. *Phaeographinae* sect. *Chrooloma* Müll. Arg. Lirellae strato thallino vestitae, totae pallide (chryseo-rubello-fusco-) coloratae, margines crassi, conniventia, sub thallo profunde longitrorsum sulcati; discus angustus, pallidus.

*Phaeographina* (s. *Chrooloma*) *colubrosa*; *Graphis colubrosa* Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 564. — Ad Rio Negro, et in Ceylonia (Thwaites).

485. *Porina trigastrica* Müll. Arg. Thallus virens, e laevi demum subgleboso-asperatus v. subgranosus, margine vix distincte nigro-limitatus, in parte laeviore peripherica obsolete desquamescens; apothecia crasse thallino-vestita, quasi in verruca thallina ambitu leviuscule radiatim 3—4-sulcata et triv. rarius tetragastrica sita, apice nigro-emergentia, primum vertice papilligera, demum poro aperta; paraphyses capillares, copiosae; asci 8-spori; sporae hyalinae, fusiformes, utrinque acutae v. subacuminatae, 65—85  $\mu$  longae, 13—14  $\mu$  latae, 6—9-locales, loculi subaequilongi. — Subsimilis *P. mastoideae*, sed thallus minus laevis, apothecia crassius thallino-vestita et verrucae vestientes peculiariter 3—(4)-gibbosae. — In insula Java.

486. *Porina praestantior* Müll. Arg. Thallus tenuis, linea nigra tenui v. subindistincta limitatus, argillaceo-albidus v. albido-flavicans, laevis; apothecia a verruca vestita, vertice paullo depresso nuda et fusco-atra (sicca et madefacta), intus albido-pallida, vertice tantum nigrata; paraphyses capillares; asci 8-spori; sporae hyalinae, 60—100  $\mu$  longae, absque halone 15—20  $\mu$  latae, cum halone circ. 25  $\mu$  latae, fusiformes, utrinque acuminatae, 10—16-locales, loculi ad extremitatem utramque conferti et abbreviati. — Similis *P. mastoideae*, sed thallus nonnihil flavescens, non virens, et sporae maiores, loculi numerosiores. — In insula Java.

487. *Pyrenula santensis* Müll. Arg.; *Pyrenula mamillana* v. *santensis* Willey Cat. p. 29; *Verrucaria santensis* Tuck. ad Nyl. ex huj. Esposit. Pyrenoc. p. 45, nec non *Pyrenula convexa*, s. *Verrucaria marginata* v. *connexa* Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 117, s. *Verrucaria convexa* Nyl. Lich. Husn. p. 23, et dein *Pyrenula punctella*, s. *Verrucaria punctella* Nyl. Pyrenoc. p. 46 et Prodr. Nov. Gran. p. 119, etiam in insula Java crescent (hb. lugd. bat.).

488. *Pyrenula albella* Müll. Arg. Thallus mediocris, albellus, laevis, margine subeffusus; apothecia nigra, dimidiata v. sub-

dimidiata, semiimmersa, depressa, basi  $\frac{1}{2}$  mm. lata, crassa, juniora albido-subvestita v. cinerascentia, evoluta subnuda, vertice distinete sed leviter depressa et poro aperientia, peritheciū lateraliter crassius, basi deficiens aut tenue; sporae in ascis angustis octonae, oblongo-ellipsoideae, 4-loculares, distincte fuscescentes, 16—18  $\mu$  longae et 8—9  $\mu$  latae. — Formam microcarpam simulat *Pyrenulae farreae*, sc. *Verrucariae farreae* Ach-pr. p., Nyl. Expos. Pyrenoc. p. 47, sed apothecia multo minora et sporae minores sunt. — Crescit corticola in insula Java (hb. lugd. bat.).

489. *Pyrenula sexlocularis* Müll. Arg.; *Verrucaria sexlocularis* Nyl. in Prodr. Nov. Granat. p. 118 in notula, Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 87; *Verrucaria aspista* Nyl. Lich. exot. Bourb. p. 261 (ex specim. Boryan.), non ejusd. Pyrenoc., nec Ach., nec *Pyrenula aspista* Fée. — Crescit in Nova Caledonia, et in Java (hb. lugd. bat.), nec non in insula Bourbon. (Bory in hb. Bornetiano).

490. *Polyblastia* Müll. Arg. Thallus pyrenulaceus v. tantum hypheoideus; gonidia, ubi evoluta, concatenata; apothecia angiocarpica, poro aperientia; paraphyses distinctae, convexae; sporae hyalinae, parenchymaticae. — Omnes notae corticolae. — *Polyblastiae*, *Blastodesmiae*, *Microglaenae*, *Sphaeromphalis* et *Pyrenulae* species Auct.

1<sup>o</sup>. Sporae in ascis solitariae, raro geminae, maxima.

*Polyblastia thelocarpoides*; *Verrucaria thelocarpoides* Krplh. Lich. Argentin. p. 26. — In Republica Argentinensi.

*Polyblastia intrusa*; *Verrucaria intrusa* Nyl. Pyrenoc. p. 43. — In Bolivia.

2<sup>o</sup>. Sporae in ascis geminatae, multo minores quam in praecedentibus.

*Polyblastia geminella*; *Verrucaria geminella* Nyl. Expos. syn. Pyrenoc. p. 40. — Sporae 34—38  $\mu$  longae, 14—18  $\mu$  latae. — In Mexico.

*Polyblastia dispora* Müll. Arg. L. B. n. 47 (1877). Sporae 13—23  $\mu$  longae, 7—9  $\mu$  latae. — In Texas.

3<sup>o</sup>. Sporae in ascis circ. 4nae, caeterum ut in serie 2<sup>o</sup>.

*Polyblastia Naegelii*; *Pyrenula Naegelii* Hepp Fl. Europ. n. 469 c. ic. et descript. spor. — Sporae 23—50  $\mu$  longae, circ. 12  $\mu$  latae. — Apothecia minora, sporae autem majores quam in *P. lactea*. — In Helvetia.

*Polyblastia lactea* Körb. Par. p. 336; *Blastodesmia lactea* Mass.

Ric. p. 181 (1853); *Microglaena laclea* Lönnr. in Flora 1858 p. 634. — Sporae 24—36  $\mu$  longae, 10—15  $\mu$  latae. — In Europa et America septentrionali.

*Polyblastia tropica* Müll. Arg. Diagn. Lich. Socotr. nov. p. 17. — Apothecia nuda ut demum in *P. sericea*; sporae 25—28  $\mu$  longae, 10  $\mu$  latae. — In insula Socotra.

4<sup>o</sup>. Sporae in ascis 8nae (v. simul hinc inde et pauciores).

*Polyblastia sericea* Massal. Symm. p. 99 (Framm. p. 26, nomen nudum), Körb. Par. p. 337. — Sporae 12—20  $\mu$  longae, 8—9  $\mu$  latae. — In Europa meridionali.

*Polyblastia fallaciosa* Arnold in Flora 1863 p. 8. Apothecia valde depressa. Sporae 15—18  $\mu$  longae, 6—7  $\mu$  latae. — In Europa.

*Polyblastia Frankliniana*; *Verrucaria Frankliniana* Leight. Lich. Arct. Amer. p. 199. — Perithecium dimidiatum. — In America arctica.

*Polyblastia proponens*; *Verrucaria proponens* Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 91. — Perithecium dimidiatum. Sporae 27—43  $\mu$  longae, 14—17  $\mu$  latae. — In Nova Caledonia.

*Polyblastia interponens*; *Verrucaria interponens* Nyl. Lich. Andam. p. 20. Perithecium integrum. Sporae 23—30  $\mu$  longae, 7—10  $\mu$  latae. — In Indiae Orientalis ins. Andaman.

*Polyblastia ocellata*; *Verrucaria ocellata* Leight. Lich. Amazon. p. 458. Perithecia integra, obtecta. — In regione amazonica Brasiliae.

491. *Anglica Sphaeromphale Carrollii* Mudd Man. p. 283 etiam *Polyblastiae* generis esse videtur, sed absque specimine hac de re non certus sum.

492. *Italica Arthopyrenia Quercus* Mass. Ric. p. 169 (1853), Lich. ital. n. 168, s. *Pyrenula Quercus* Trev. Caratt. di dodici nov. gen. p. 13, sporis hyalinis parenchymaticis praedita, non est *Polyblastiae* species, sed exakte idem est ac *Mycoporum miserimum* Nyl. Enum. gen. 145 (1858). Plantula ergo secundum prioritatis regulas *Mycoporum Quercus* nominanda est.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [65](#)

Autor(en)/Author(s): Müller J.

Artikel/Article: [Lichenologische Beiträge 397-402](#)