

philum, Brachythecium Geheebii fert., Plagiothecium latebricola, Eurhynch. megapolitanum, Platygyrium repens, Fontinalis gracilis, Anomodon apiculatus fert., Myurella, Bryum cyclophyllum, B. Mühlenbeckii, B. Klinggraeffii, B. lacustre, Pyramidula, Orthotrichum appendiculatum, Zygodon viridissimus, Sporledera, Trichostomum cordatum, Dicranodont. aristat. var. falcatum Milde, Dicranum circinatum, Weisia Wimmeri. J. M.

L. Rabenhorst, Lichenes europaei. Die Flechten Europa's, unter Mitwirkung mehrerer namhaften Botaniker. Fasc. XXXIII. Dresden, 1871.

Diese 25 Nummern sind gesammelt von den Herren M. Anzi, Fr. Arnold, Bausch, Ettich, Th. Fries, J. Hellbom, Karl und dem Herausgeber, nämlich Tholurna dissimilis Norm., Varicellaria rhodocarpa (Kbr.) Th. Fr., Gyrophora arctica Ach., Biatora phaeostigma Kbr., Rinodina Conradi Krbr., Lecidea arctica Sommft., Lecidella enteroleuca Ach. a. vulgaris Körb. (Forma: Rhododendri), Lecidea zeoroides Anzi, Gyrophora hyperborea Ach., Xanthoria controversa (Mass.) Th. Fr. b. lychnea (Ach.), Opegrapha atra P. b) stenocarpa Ach., Placodium Candelarium (Ehrh.) Hepp, Lecanora Hageni Ach., Lec. roboris Duf., Collema multifidum Schaer., Parmelia conspersa Ach. forma convoluta!, Ramalina calycaris v. farinacea (L. Ach.) Nyl., Ram pollinaria Ach., Polyblastia clopimoides Anzi, Lecanactis plocina (Ach.) Mass., Bacidia asserculorum (Ach.) Th. Fr., Pyrenopsis granatina (Sommft.), Phylliscum endocarpoides Nyl., Lecidea spilota Fr. und Rhizocarpon alboatrum β . margaritaceum (Sommft.).

Pyrenomycetes germanici. Die Kernpilze Deutschlands, bearbeitet von Dr. Th. Nitschke. Erster Band. 1. und 2. Lieferung. Breslau, 1867/70

(Fortsetzung.)

Fam. III. Valseae Nitschk. umfasst folgende Gattungen: Anthostoma Nitschk. Sporae octonae, monostichae, unicellulares, nigricantes. Paraphyses filiformes.

Valsa (Fr.) Sporae octonae, rarius plures vel quaternae, distichae vel conglobatae, unicellulares, plerumque cylindricae, curvulae, rarius ovatae, rectae, hyalinae vel dilute fuscescentes. Paraphyses nullae.

Diaporthe Nitschk. Sporae octonae, distichae vel monostichae, bi-quadri-vel sexcellulares, fusiformes vel ovatae, hyalinae vel nigricantes. Paraphyses nullae.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [10_1871](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Lichenes europaei. Die Flechten Europa's, unter Mitwirkung mehrerer namhaften Botaniker. 30](#)