

215. *Carbo cormoranus* Meyer (V. N. Cuervo marino. — kast. Cuervo-mar grande).
216. *Colymbus septemtrionalis* Linn. (kast. Colimbo cuellirojo). Zufällig, am Mar Menor.
217. *Uria troile* Lath. (kast. Uria patioscura). Auch sehr selten und wohl zufällig, in der Nähe des Mar Menor.
218. *Mormon fratercula* Temm. (kast. Prailecillo pequeño). Ebenso.

Bruchstück aus der Argentinischen Flora.

Von Dr. *Johann Pulacký*.

Beinahe alle Länder der Erde besitzen wenigstens einen Versuch einer Flora; nur der ungeheuerere Länderstrich Süd-Amerikas, südlich von Brasilien und Chili, besitzt nichts derart, nicht einmal eine Lokalfloora, obwohl Danoin, Gillies, Tweedie, Wilkes, Orbigny, Sellow Commerson u. A. hier sammelten. Wir theilen unsere Excerpte hauptsächlich aus Hooker zu dem Zwecke mit, wenn es Jemand, z. B. Burmeister, gefällig wäre, an Ort und Stelle etwas zu sammeln.

Clematis bonariensis Juss. (auch Cordova, Mendoza Entrerios), *Thalictrum rutidocarpum* DC. (S. Luis), *Anemone decapetala* L. (Uruguay, Mend), *triternata* Vahl (Urug, Buenos Ayres), *Ranunculus trisepalus* Gillies (B. A., Parana), *cymbalariae* Pursch (Mend), *sceleratus* L. (B. A.), *musicatus* L. (B. A., Lecuman), *peduncularis* Len. (Mend.), *apiifolius* (B. A.), *Cissampelos australis* St. Hilaire (Urug), *Berberis ruscifolia* Lam. (B. A., Cond.), *Grevilleana* (Gill- M., Anden), *empetrifolia* Lam. (detto) *Argemone mexicana* L. (B. A., Mend., Pampas), *Fumaria capreolata* L. (B. A., cult), *Draba magellanica* (Mend. Anden), *Gilliesii* Hook. (detto). *Arabis spathulata* (B. A.), *Commersonii* (dri.), *Capsella bursa pastoris* (Pampas), *Thlaspi magellanicum* Pers. (Mend), *Vesicaria arctica* Rich. (St., Luis, Mend.), *Sisymbrium Arnottianum* Gill (Mend.), *irio* L. (M.) *stenophyllum* Gill. (Cordova), *frutescens* Gill. (Mendoza), *canescens* Nutt. (M., B. Ayr., St. Luis), *Cardamine bonariensis*, *Nasturtium bonariense*, *Erysimum pusillum* Gill. (M.), *Senebiera serrata* (Monte Video = MV), *pinatifida* (B. A.), *Lepidium bonariense* L., *ruderales* L. (M.), *Hexaptera filifolia* (M.), *spathellata* Gill. (M.), *cuneata* Gill. (M.), *Crambe filiformis* (Patagonia, Wilkes) *Cleome crenopetala* (Urugzy), *hexaphylla* L. (BA.), *psoraleaefolia* DC. (St. Luis), *affinis* DC (Missionen), *Atamisquea emarginata* Miers (M.), *Victoria cruziana* Pl. (Paraguay), *Helianthemum brasiliense* Pers. (BA,

Pampas). Ferner *Viola congesta* Gill. (Mend.), *volcanica* Gill. (Cerro del Diamante), *Jonidium glutinosum* Vent, *diffusum* G. (BA.), *Polygala gnidioides* Willk (M.), *Neaei* DC. (Cordova), *polycephala* St. Hil. (BA., Meng.), *linoides* Poirlet (BA., Urug.), *dictans* St. Hil. (Urag.), *obovata* St. Hil. (Urag.) *spinescens* Gill. (M.) *Monnina pterocarpa* Raiz (M.), *cardiocarpa* St. Hil. (Urug.), *Silene gallica* BA., *Spergularia platensis*, *Sagina procumbens* BA., *Arenaria media* DC. (BA.), *bonariensis* Gill., *Cerastium vulgatum* (M.), *latifolium* (M.) *arvense* (M.), *Casearia montevidensis*, *lanceolata*, *Linum junceum* St. Hil. (Ur.) *Malva sulphurea* G. (M.), *humilis* Hook. (M.), *peduncularis* (Cordova), *crispa* (M., Bot.) *tenella* Cav. (M.), *miniata* Cav. (M.), *obtusiloba* Hook. (M.), *lonariensis* Cov. (BAyr., Cord.), *glomerata* Hook. (Parana), *geranioides* Gill. (M.), *Pavonia communis* St. Hil. Parana, *hastata* Cav. (St. Luis, BA., Ur.), *Hibiscus amoenus*, *angustifolius* Hook. (Plata), *Cristaria heterophylla* Hock. (M.) *Anoda hastata* Cav. (BA.) *Sida*, *rhombifolia* (BA.), *hastata* St. Hil. (Ur.), *Jussieuana* DC. (Entrerios), *Sida candicans* DC. (M.), *sessiliflora* Hook. (BA.), *picta* Gill. (BA.), *Grevilleana* Gill. (M.), *mollis* Ort. (Martin Garcia), *Arnottiana* Gill. (S. Luis) *densiflora* Hook. (C. Borja), *Melochia pyramidata* L. (Ur.), *Corchorus argutus* Kunth (Missionen), *Luhia divaricata* Martius (Ur.). *Ximenia americana* L. (BA.), *Hypericum connatum* (MV.), *tamariscinum* (MV.), *parviflorum* St. Hil. (Ur.), *myrianthum* (MV.), *Bunchosia multiflora* Hook (Cossientes), *Bannistaria bonariensis* Hook; *Heteropteris glabra* Hook. (Entrerios), *Tricomaria usillo* H. (M.), *Cardiospermum velutinum* H. (Missionen), *Serjania sinuata* Schumacher (U.), *Cupania uraguensis* H. (Ur.), *Schidelia edulis* St. Hil. (Corrientes), *Dodonea jamaicensis* DC. (Ur.), *Cissus bonariensis* H. (BA. Ur.), *Geranium acaule* Willd. (Mend., *dissectum* (M.), *Erodium cicutarium* (BA.) *moschatum* (BA.) *Tropaeolum pentaphyllum* Lam. (BA.), *polyphyllum* Cav. (M.) *Oxalis repens* Thbg. (Ur.), *andicola*, *lineata*, *macrorhiza*, *compacta*, *erythrorhiza*, *subcaulis* (alle Gill. Hk., M.), *geminata* Hk. (Mend.) *violacea* (BA., Ur.) *bipunctata* Graham (BA.), *autumnalis* St. Hil. (Bot.), *acetosella* (BA. ?), *adenophylla* Gill. (M.), *lasiopetala* (MV.), *Tribulus lanuginosus* (M.), *Larrea nitida* Cav. (M.), *divaricata* (M.), *cuneifolia* (M.), *Zygophyllum retama* Gill. (S. Juan, M.), *Plectrocarpa tetracantha* Gill. (Travesia (Wüste) de St. Juan), *Porlieria hygrometrica* (Ruiz, S. Luis), *Zanthoxylon coca* Gill. (St. Luis), *Guindilia trinervis* Gill. (M.), *Ilex cuneifolia* (BA.) *Todina* (Hook.) *rhombifolia* (Ur., B. Ayr., S. Luis), *Celastrus quadrangulatus* DC. (Ur. Entrerios), *Sageretia trinervis* Gill. (Mend.), *Condolia microphylla* Cav. (M.), *paradoxa* Spreng. (Montevideo, Moldonado), *Discaria americana* Hook. (BAyr., St. Luis, Cord.), *Colletia*

spinosa Lam., (M.), *ferox* Hook. (M.), *longispina* (Hook., U.), *Gouania ternifolia* (Hook., Ur.), *Caselia oblongifolia* St. Hil., (Corientes) *Dunana descendens* DC. (M.) *longifolia* (BA.), *Schinus terebintifolia* (Missionen), *ternifolius* G. (S.Luis), *Crotalaria B. Brownei* Bert. (Ur.) *Genista elegans* G. (M.), *rigida* G. (Mend.); *Medicago sativa*, *minima*, *denticulata* Willd. (nach Tweedie der gemeine Pampasklee), *Melilotus lanceolata* (BA.), *passiflora* (BA., M., St. Juan), *Trifolium obcordatum* (Ur., Bot.), *polymorphum* (BA.), *Psoralea glandulosa* (BA.), *higuerilla* G. (Cord.), *Indigofera anil* (Missionen), *Clitoria brasiliana* (dto), *Cologania heterophylla* Gill. (MV.) *Galactia Jussieuana* Kunth (Pampas), *stenophyllum* St. Hil. (Ur.), *Dalea elegans* G. (St. Luis), *pulchella*, *Glycyrrhiza astragalina* G. (M.) *Galega officinalis* BA.), *Sesbania occidentalis* Pers. (BA), *Colutea arborescens* (Mend. cult.), *Sutherlandia frutescens* (R. Br. c. M.), *Phaca inflata* G. (M.), *Arnottiana* G. (M.), *Cruikshankii* (St. H. M.), *carinata* Hook. (M.), *Astragalus Benthamianus* G. (M.), *complicatus* G. (M.), *Poiretia psoraleoides* DC. (MV., Pampas), *Zornia angustifolia* Sm. (Pampas), *Adesmia bicolor* (MO), *pendula* (BA., MVid.), *retrofracta* St. Hil. (M.), *Gilliesii* Hook. (M.), *confesta* (S.Luis), *grandiflora* G. (M.), *aspera* G. (M.), *punctata* (MV. BA.), *muricata* (Patagon), *coluteoides* (G., M.), *trijuga* (G., M.), *horrida* (G. M.), *pinifolia*, *Atpallatensis*, *trifoliolata* (dto.), *Aeschynomene montevidensis*, *latifolia* Spr., *Desmodium acuminatum* (Ur.) *cuneatum* Hook. (U.) *leiocarpum* (MV.), *Vicia tephrosivides* (M. V., Selloi (MV. *stenophylla* (MV.) *nana*, *obscura*, *montevidensis* (dto) *graminea* (Bot., Mend., St. Luis), *dentata* (G. Bot.), *bijuga* (G. M.), *Lathyrus sessilifolius* (BA.) *pubescens* (M.) *tomentosus* (BA.) *macropus* (G. M.), *subulatus* (MV. BA.), *crassipes* G. (BA.) *montevidensis*, *sericeus* (MV.), *nervosus* (MV.) *Rhynchosia mendoziensis* (G. M.), *sericea* (G., St. Luis) *senna* (Gill. Cordova), *Dolichos vexillatus* HBK., *Lablab vulgaris* (BA. MV. c.), *Canavalia paranensis*, *Camptosema rubicundum* Hook. (Ur.), *Lupinus albescens* (HK., Ur.), *aureonitens* (Gill. M.), *ancicola*, *microcarpus* (M.), *incanus* BAyr.), *multiflorus* (BA.), *bracteolaris* (MV.), *Erythrina crista galli* (c. BA. MVid.), *Swartzia ochracea* (BA.) *Mimosa adpressa* HK. (Ur., Entrerios), *uraguensis*, *asperata*, *hirsuta*, *Inga uraguensis*, *parvifolia* (HK. Ur.), *Desmanthus strictus* (BA.), *Prosopis dulcis* Kunth (S. Luis), *flexuosa* DC., *siliquastrum* (M.) *torquata* (St. Luis), *astringens* (Gill., Men., St. Juan), *humilis* Gill. (BA.), *ephedrioides* (G., S. Luis), *sericantha* (G., St. Luis), *globosa* (G. M.) *affinis*, *denudans* (Patagonien), *Calliandra bicolor* (Ur.) *Acacia strombulifera* (M.), *Sprengelii* (HK., Ur., BA., MV.), *Bonplandii* (G., BA.), *lepidota* (HK., Ur.) *adenocarpa* (HK., Ur.), *cavenia* (M. BA.), *aroma* (G., St. Juan), *furcata*

(G. BA., Mend.), *bonariensis* (G. Entrerios, BA.), *Spirolobium australe* (Orbig. Patagonien), *Enterolobium timousa* Ur.), *Coulteria tinctoria* BK., *Gourliea decorticans* (G., M. Cord., S.Luis.) *Caesalpinia praecox* (Ruiz, Mendoza), *Poinciana Gilliesii* (HK., S. Luis), *Hoffmanseggia falcata* Cav. (S. Luis), *Parkinsonia aculeata* (Entrerios), *Zuccagnia punctata* (Cav., Mend.), *Stylozanthos montevidensis*, *Cassia corymbosa* (BA., M.), *Hooke- riana* (G. S. Luis), *Arnottiana* (G. M.), *occidentalis* L. (BA.), *aphylla* Cav. (M., St. Luis), *Bauhinia forficata* (Ur.), *Frageria bonariensis*, *Margyricarpus setosus* Ruiz (BA., U., Cord.) *alatus* (Gill. C. Luis), *Acaena integerrima* (G., M.), *caespitosa* (G., M.), *pinnatifida* (Ruiz., M.), *myriophylla* (BA.), *adscendens* Vahl (M.), *sericea* (Patag., Port Désiré), *Rubus Selovii* (MV.), *Epilobium alpinum* L. M., *pedicellare* Presl (M.), *Oenothera mendocinensis* G., *longiflora* (BA., Entrerios), *odorata* (M., Patag.), *acaulis* Cav., *mollissima* BA., *centauriflora* (MV.), *australis* (Pa- tag.), *Gayophytum micranthum* Hook. (M. St. Luis), *Jussieua repens* L. (M., BA.), *montevidensis*, *multinervis* (HK., BA.), *longifolia* DC. (BA.), *bracteata* Hook. (Urug.), *bexapetala* Hook. (U.), *stenophylla* (Gill.) *My- riophyllum proserpinacoides* (G., BA.) *ternatum* (Gaud. M.), *Lythrum hyssopifolium* L. (M.), *flavum* (MV.), *Cuphea ligustrina* (BA., MV.). *glabrata* (G., BA.), *spicata* Cav. (U.) *glutinosa* Cham. (Bot.), *Heincia grandiflora* (BA.), *salicifolia* (Cord.), *Myrtus lurida* (MV.), *triflora* (MV.), *Psidium amygdalinum* Hook. (Conientes), *Tetrastemon loranthoides* Hook. (Missionen) *Eugenia Tweedii* Hook. (Ur.), *elliptica* Hook. (Ur.), *Rhexia heterophylla* Hook. (U.) *Arthrostemmanitidum* (BA.), *Clidemia paraguayensis* *Miconia Renggeri*, *Fleischeriana*, *repandocrenata* (Paraguai excl.), *Bry- onia ficifolia* (BA.), *tenuifolia* Gill. (S. Fè, BA. Cord.) *Momordica hy- strix* (G., BA.), *Cucurbita asperata* (G., M).

(Fortsetzung folgt.)

M i s c e l l e n .

** Prof. *Harting* in Utrecht hat ein neues Instrument, um den Umfang des Kopfes in verschiedener Richtung an lebenden Menschen genau graphisch darzustellen und zu vermessen, erfunden und dasselbe in einer eigenen Schrift: *Le Képhalographie* etc. (Utrecht 1861 mit Figuren) beschrieben, Prof. *Vrolík* hatte das etwas complicirte Instrument für die Anthropologen-Versammlung in Göttingen zur Einsicht und Prüfung mitgebracht.

** Im neuesten Hefte des Jahrbuches der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien (XII. Band Nr. 3 Mai - August 1862) sind noch folgende schätzbare

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Lotos - Zeitschrift fuer Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Palacky Jan Kritel Kaspar

Artikel/Article: [Bruchstücke aus der argentinischen Flora 216-219](#)