

NEUKOMBINATIONEN UND NEUE NAMEN AUS  
„NATÜRLICHE PFLANZENFAMILIEN“ BAND 20 d,  
RHAMNACEAE UND VITACEAE

von  
K. SUESSENGUTH

In dem genannten Band sind auf Seite 391/392 dieje-  
nigen Kombinationen und Namen aufgeführt, die dort erst-  
mals neu aufgestellt wurden.

Wm.T. STEARN von Museum of Natural History London  
hat den Verf. darauf aufmerksam gemacht, daß diese Neu-  
kombinationen usw. nach dem neuen "International Code  
of Botan. Nomenclature", 1952, Art. 42 erst gültig sind,  
"when the basonym (name bringing or epithet-bringing sy-  
nonym) is clearly indicated with its author and the pla-  
ce and date of publication". Im folgenden wird dieser  
neuen Forderung entsprochen.

Ampelocissus dichothrix (Miq.) Suesseng. (= *Cissus di-*  
*chothrix* Miquel, Fl.Ind.Batav. Suppl.I, 514, 1860).

" " sphaerophylla (Bak.) Suesseng. (= *Vitis*  
*sphaerophylla* Baker, Journ.Linn.Soc.22, 460, 1860).

Cayratia acuminata (A.Gray) Suesseng. (= *Cissus acumina-*  
*ta* A.Gray, Bot.U.St.Expl.Exped. I, 273, 1854).

" " anemonifolia (Zippel) Suesseng. (= *Cissus ane-*  
*monifolia* Zippel ex Miq., Ann.Mus.Bot.Lugd.Batav.  
I, 80, 1863/64).

" " apoensis (Elmer) Suesseng. (= *Cissus apoensis*  
Elmer, Leafl.Philipp.Bot. VIII, 2880, 1915).

" " auriculata (Roxb.) Suesseng. (= *Cissus auricu-*  
*lata* Roxb., Hort.beng.Serampore 11, 1814; auch  
Fl.Ind. I, 411, 1820).

" " debilis (Bak.) Suesseng. (= *Vitis debilis* Bak.  
= *Cissus debilis* Planch., DC.Monogr.Phaner. V,  
569, 1887).

" " elongata (Roxb.) Suesseng. (= *Cissus elongata*  
Roxb., Hort.beng.Serampore 11, 1814; Fl.Ind. I,  
411, 1820).

" " gracilis (Guill. & Perr.) Suesseng. (= *Cissus*  
*gracilis* Guill. & Perr., Fl.Seneg.Tent. I, 134,  
1830-33).

- Cayratia grandifolia (Warburg) Suesseng. (= *Cissus grandifolia* Warb., Engl.Bot.Jahrb. 18, 199, 1894).
- " " ibuensis (Hook.f.) Suesseng. (= *Cissus ibuensis* Hook.f. in W.J.Hook., Niger-Flora 265, 1849).
- " " lineata (Warburg) Suesseng. (= *Cissus lineata* Warburg in Engl.Bot.Jahrb. 13, 370, 1891).
- " " megacarpa (Lauterb.) Suesseng. (= *Cissus megacarpa* Lauterb., Engl.Bot.Jahrb. 59, 526, 1925).
- " " nervosa (Planch.) Suesseng. (= *Cissus nervosa* Planch., DC.Monogr.Phaner. V, 564, 1887).
- " " palauana (Hosokawa) Suesseng. (= *Columella palauana* Hosokawa, Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa 25, 244, 1935).
- " " pterita (Merrill) Suesseng. (= *Columella pterita* Merrill, Philipp.J.Sc.Bot. 11, 135, 1916).
- " " retivenia (Planch.) Suesseng. (= *Cissus retivenia* Planch., DC.Monogr.Phaner. V, 576, 1887).
- " " ridleyi Suesseng. (= *Cissus flaviflora* Ridley, Kew Bull. 1926, 63, non Sprague).
- " " ruspolii (Gilg) Suesseng. (= *Cissus ruspolii* Gilg, Notizbl.Bot.Gart.Berlin 4, 186, 1905).
- " " schumanniana (Gilg) Suesseng. (= *Cissus schumanniana* Gilg in K.Schum. & Lauterb., Flora Deutsch. Südsee 429, 1901).
- " " setulosa (Diels & Gilg) Suesseng. (= *Cissus setulosa* Diels & Gilg in Engl.Bot.Jahrb. 29, 466, 1901).
- " " simplicifolia (Merrill) Suesseng. (= *Columella simplicifolia* Merrill, Philipp.J.Bot. 11, 135, 1916).
- " " thalictrifolia (Planch.) Suesseng. (= *Cissus thalictrifolia* Planch., DC.Monogr.Phaner. V, 560, 1887).
- " " thomsoni (Lawson) Suesseng. (= *Vitis thomsoni* M. Lawson, Hook.f., Fl.brit.Ind. I, 657, 1875).
- " " vitiensis (A.Gray) Suesseng. (= *Cissus vitiensis* A.Gray, Bot.U.St.Expl.Exped. I, 272, 1854).
- " " yoshimurai (Makino) Suesseng. (= *Cissus yoshimurai* Makino, Bot.Mag.Tokyo 24, 233, 1910; = *Columella yoshimurai* Masamune, Journ.Soc.Trop.Agric. Taiwan 2, 51, 1930).
- Cissus ernstii Suesseng. (= *Cissus paucidentata* Ernst, Journ.Bot. 8, 374, 1870, non Klotzsch).
- " " glossopetala (Bak.) Suesseng. (= *Vitis glossopetala* Baker, Kew Bull. 1894, 344).

- Cissus koordersii (Backer) Suesseng. (= Vitis koordersii Backer, Schoolfl. Java, Verbeterblad, p. 10, 1911).
- " " lenticellata (Bak.) Suesseng. (= Vitis lenticellata Bak., Journ. Linn. Soc. 20, 122, 1883).
- " " leucophlea (Scott Elliot) Suesseng. (= Vitis leucophlea Sc. Elliot, Journ. Linn. Soc. 29, 12, 1891).
- " " novogranatensis (Moldenke) Suesseng. (= Vitis novogranatensis Mold., Phytologia I, 9, 1933).
- " " triternata (Bak.) Suesseng. (= Vitis triternata Baker in Journ. Linn. Soc. 20, 123, 1883).
- " " urbanii Suesseng. (= Cissus dissecta Urban & Ekman, Ark. Bot. Stockh. XXII A, Nr. 8, 72, 1929, non Craib 1926).
- " " voanonala (Baker) Suesseng. (= Vitis voanonala Baker, Journ. Linn. Soc. 22, 461, 1887).
- " " woodrowii (Stapf) Suesseng. (= Vitis woodrowii Stapf in Cooke, Fl. Bombay I, 248, 1901).
- Colletia ferox Gill. ex Hook. var. infausta (N.E.Br.) Suesseng. (= Colletia infausta N.E. Brown, Gard. Chron. Ser. III, 60, S. 132, 1916).
- " " spinosa Lam. (non Miers) emend. Suesseng.
- " " " var. assimilis (N.E. Brown) Suesseng. (= Colletia assimilis N.E. Br. l.c.).
- " " " var. miersii Suesseng. (= Colletia spinosa Miers, non Lam., Contr. Bot. I, 252, 1851-1861).
- " " " var. trifurcata (N.E. Brown) Suesseng. (= Colletia trifurcata N.E. Br., Gard. Chron. Ser. III, 60, S. 132, 1916).
- Condaliopsis lloydii (Standl.) Suesseng. (= Condalia lloydii Standley, Contr. U.S.A. Herb. 23, 714, 1923).
- " " lycioides (A. Gray) Suesseng. (= Zizyphus lycioides A. Gray, = Condalia lycioides Weberb. in Engl.-Pr., Nat. Pfl. Fam. III/5, 404, 1896).
- " " obtusifolia (A. Gray) Suesseng. (= Condalia obtusifolia Weberb. l.c. = Zizyphus obtusifolius A. Gray).
- " " parryi (Torr.) Suesseng. (= Condalia parryi (Torr.) Weberb. in Engl.-Pr., Nat. Pfl. Fam. III/5 S. 404, 1896).
- " " seleri (Loesener) Suesseng. (= Condalia seleri Loesener in Feddes Repert. 9, 355, 1911).
- " " velutina (J.M. Johnst.) Suesseng. (= Condalia velutina Johnst. in Journ. Arn. Arb. 20, 236, 1939).

- Discaria Hook. sect. Notophaena (Miers) Suesseng. (= No-  
tophaena Miers, Ann.Mag.Nat.Hist.Ser. III/5, S.  
267, 1860).
- " " sect. Ochetophila Suesseng. (= Ochetophi-  
la Pcepp.ex Reiss. in Endlicher, Genera, 1099,  
1840 und in Miers l.c. 279).
- " " prostrata (Miers) Reiche var. nana (Gay) Suesseng.  
(= Discaria nana (Gay) Benth.& Hook. ex Weberb.,  
Nat.Pfl.Fam. III/5, 423, 1896).
- " " crenata (Clos) Regel
- " " " var. andina (Spegazz.) Suesseng. (= Discaria  
andina Spegazzini in Anal.Soc.Ci.Argent. 47,230,  
1899 und Nov.Add.Fl.Patagon. I, 1901, repr.25).
- " " " var. discolor (Hook.) Suesseng. (= Discaria  
discolor Dusén in Ergeb.Schwed.Exped.Magell.III/  
V, 153; = Colletia discolor Hook.Ic.pl.t. 538,  
1843).
- " " " var. dumosa (Miers) Suesseng. (= Colletia du-  
mosa Miers in A.Mag.Nat.Hist.Ser.III/V,212,1860).
- " " " var. integrifolia (Spegazz.) Suesseng. (= Dis-  
caria integrifolia Spegazzini, Rev.Agron.La Pla=  
ta 1897, 502).
- " " " var. magellanica (Miers) Suesseng. (= Disca-  
ria magellanica Maklooskie in Rep.Princeton Univ.  
Exped.Patagon. VIII, 566, 1903-06; Miers sub No-  
tophaena mag., Contr.Bot. I, 270, 1851-1861).
- " " " var. montana (Phil.) Suesseng. (= Colletia  
montana Phil. in Linnaea 33, 37, 1864/65).
- Discypharia Suesseng. sectio nova (I) Cayratiae Juss.:  
Endospermium in sectione transversali T-forme;  
pedunculus plerumque nec articulatus nec bracteis  
instructus, saepissime terminalis inter 2 folia  
opposita; semen duobus aperturis et duobus areis  
ventralibus. Species sectionis vide: "Natürl.  
Pflanzenfamilien, 2.Aufl., Band 20 d", 280, 1953.
- Gouania discolor Benth. var. ulei (Pilger) Suesseng. (= G.  
ulei Pilger, Notizbl.Bot.Gart.Berlin 6, 315,  
1915).
- Koilosperma Suesseng. sect. (II) nova Cayratiae Juss.:  
Endospermium in sectione transversali O-forme;  
pedunculus articulatus et sub medio bracteis in-  
structus, semper axillaris; semen una apertura  
ventrali. - Cfr. "Nat.Pflanzenfamilien, 2.Aufl.,  
Band 20 d", 278, 1953.
- Neoreynosia Suesseng. subgen.nov. Reynosiae Gris.:  
Petala praesentia, species ab cl. URBAN propter

constructionem ovarii ad Reynosiam positae. Cfr. "Nat. Pflanzenfamilien, 2.Aufl., Band 20 d", 137, 1953 .

Rhoicissus usambarensis Gilg em. Suesseng. (= *Cissus usambarensis* Gilg ex Engler (sphalm.) Abhandl.Preuss. Akad.Wiss. (1894) 44 und in Englers Pflanzenwelt Ost-Afrikas A, S.31, 1895).

Sageretia yemensis (Deflers) Suesseng. (= *Berchemia yemensis* Deflers, Voy.Yemen 123).

Scutia hutchinsonii Suesseng. (= *Scutia buxifolia* Hutch.& Moss, Kew Bull. 1928, 272; non *Sc. buxifolia* Reissek, siehe SUESSENGUTH, Lilloa 4, 135, 1939).

Tetrastigma andamanicum (King) Suesseng. (= *Vitis andamanica* King, Journ.As.Soc.Beng. 65, 393).

" " curtisii (Ridley) Suesseng. (= *Vitis curtisii* Ridley, Journ.As.Soc.Straits 75, 24, 1917).

" " pubiflorum (Miq.) Suesseng. (= *Cissus pubiflora* Miq. in Fl.Ind.Batav.Suppl.I, 516, 1860).

Ventilago gamblei Suesseng. (= *V. lanceolata* Gamble, Kew Bull. 1916, 134, non *V. lanceolata* Merrill 1915).

## INHALTSVERZEICHNIS

HERMANN MERXMÜLLER und GERALD CZECH, Eine neue Gattung der Cyperaceen .....	S. 317
JOSEF POELT, Mitteleuropäische Flechten II .....	S. 323
KARL SUESSENGUTH und Mitarbeiter, Neue Taxa, Kombinationen und Vorkommen in Süd-Afrika ...	S. 333
MARTHA HOLZHAMMER, Neue Sterculiaceen aus Südwestafrika .....	S. 345
KARL SUESSENGUTH und INGE GALL, Die Verbreitung der "gefäßlosen" Angiospermen auf der Erde .....	S. 350
KARL SUESSENGUTH, Neukombinationen und neue Namen aus "Natürliche Pflanzenfamilien" Band 20 d, Rhamnaceae und Vitaceae .....	S. 352

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Suessenguth Karl

Artikel/Article: [NEUKOMBINATIONEN UND NEUE NAMEN AUS  
Â„NATÜRLICHE PFLANZENFAMILIEN" BAND 20 d. RHAMNACEAE UND  
VITACEAE 352-356](#)