

	Tiefe in Faden.	
<i>S. carinata</i> Jeffr.	690—1095	
<i>Cerithium procerum</i> Jeffr.		
= <i>Danielsoni</i> Friele	400—1450	
<i>Trophon Fabricii</i> Beck	35—1450	In der Tiefe nur Bruchstücke.
<i>Fusus attenuatus</i> Jeffr.	690—1215	
— <i>Sabini</i> Gray	100—1450	desgleichen.
<i>Pleurotoma tenuicostata</i> Sars	40—1622	
— <i>exarata</i> Möller	5—1230	
<i>Cylichna alba</i> Brown	7—1400	F. in Sicilien.
<i>Utriculus lacteus</i> Jeffr.	1443—1450	Fragmente.
— <i>substriatus</i> Jeffr.	1750	
<i>Actaeon exilis</i> Jeffr.	49—1450	F. in Sicilien.
<i>Scaphander punctostriatus</i> Migh. et Ad.	26—1450	desgl. — In der Tiefe nur Fragmente. K.

**Verzeichniss der bei dem Besuche von H. M. S. Peterel
auf den Galapagos gesammelten Mollusken.**

Von

Edg. Smith

(Aus Proc. zool. Soc. London 1877).

a. *Meermollusken.*

- Purpura patula* L.
— *Callaoensis* Gray.
Engina crocostoma Reeve.
Rhizochilus (*Coralliophila*) *parvus* n. sp.
Columbella fuscata Sow.
Latirus varicosus Reeve.
— *tuberculatus* Brod.
Strigatella tristis Swains.
Conus nux Brod.
Cerithium maculosum Kiener.

Calyptraea sp.
 Hipponyx Grayanus var.
 Rissoina striata Mke.
 Trochus (Omphalius) Cooksoni n. sp.
 Fisurella obscura Sow.
 Chiton (Lophyrus) Goodalli Brod.
 — — sulcatus Wood.
 Arca sp.

b. *Landmollusken.*

Bulimus nux Brod.
 — unifasciatus Sow.
 — eschariferus Sow.
 Succinea Bettii n. hp.

Sämmtliche Arten stammen von Charles Island; sechs davon waren in der Inselgruppe noch nicht beobachtet.

L i t e r a t u r b e r i c h t.

Proceedings of the Zoological Society of London. 1876. Part. IV.

- p. 752. Sowerby, G. B., Description of six new species of Shells from the collections of the Marchioness Paulucci and Dr. Prevost. (Conus Paulucciae von Mauritius, superscriptus von Madagascar, baccatus und reflectus unbekanntes Fundortes, Lima zealandica von Neuseeland, Cardium ornatum von Hongkong.)

Bullettino della Società malacologica italiana. Vol. II. 1876.

- p. 67. Pini, Napoleone, Molluschi terrestri e d'acqua dolce viventi nel territorio d'Esino.
 p. 207. Bellardi, L. Descrizione d'un nuovo genere della famiglia delle Bullide fossile (Sabatia).
 p. 211. Brugnone, Ab. G., Osservazioni sulle Chemnitzia pusilla e Ch. terebellum.
 p. 216. —, due specie fossili nuove de Altavilla (Drillia pseudo-sigma, Mitra De Stefani).
 p. 218. Adami, G. B., Molluschi dei Dintorni di Sassari in Sardegna. 49 Arten, darunter eigenthümlich Hyalina opaca, Helix corsica, parva, Claus. Meissneriana.

223. Paulucci, Marchesa, Osservazioni critiche sopra le specie del genere Struthiolaria Lam. Es werden nur die Lamarck-Deshayes'schen Arten, besprochen und ihre Synonymie klargestellt;

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Smith Edgar Albert

Artikel/Article: [Verzeichniss der bei dem Besuche von H. M. S. Peterel an den Galapagos gesammelten Mollasken. 90-91](#)