

Egy új *Achillea*-fajvegyülék Romániából.Ein neuer *Achillea*-Bastard aus Rumänien.

Írta: }  
 Von: } **Prodán Gyula** (Zombor).

***Achillea Wagneri* PRODAN.**

(*A. Vandasii* VEL. × *A. Neilreichii* KERN.)

(Mellékelve — beigelegt Táfel No. VI. sz. tábla.)

Adresse tomentosus-canescens. Caulis erectus, ad 22—50 cm. altus, sulcatus, foliosus. Folia caudiculorum sterilium longe et tenuiter petiolata ambitu ovato-oblonga 10—13 cm. longa et 2—3 cm. lata, bipinnatisecta, segmenta pinnatifido-dentata, dentibus mucronatis, rhachis angusta in parte inferiore edentula, in parte superiore dentata; folia caulina lineari-oblonga, pinnatisecta, segmenta pectinato-pinnatifida, pinnae 2—4 dentatae, rhachis edentula vel in parte superiore dentata. Inflorescentia corymbosa polycephala, ramis erectis adpressiuscule villosis pedicellisque brevibus. Capitula ovato-cylindracea 1½—2 mm. lata et 3 mm. longa. Squamae anthodii oblongae, apice scariose, villosae. Ligulae subcitrinae vel subsulphureae, latiores ac longae, profunde trilobae, flosculi medii sulphurei.

Habitat in Romania, in regione septentrionali Dobrogeae. In declivibus graminosis aridisque inter marginem silvae Babadagensis et pagum Caugagia (Gavgagia). Legi inter parentes die 25 m. Julii a. 1911.

Dicata in honorem JOH. WAGNER, directoris praeparandiae budapestinensis.

Az *A. Vandasii* VELEN.-tól örökölte termetét, rányomott szürkés molyhos szőrözetét, kevésbé fogas levélnyelét, a fészkek és fészeklevelek alakját és erősebb pehlyességét s a sugárzó virágok fogazatát.

Az *A. Neilreichii* KERN. befolyása mutatkozik a levelek osztottságában, a levélnyel vékonyságában, továbbá abban, hogy a levelek szeletei finomabbak, vékonyabbak és zölddebbek, a fészkei kisebbek, virágai világos ezitromsárga szí-

Dieser Bastard hat von *A. Vandasii* VEL. den Wuchs, die angedrückte, graulich wollige Behaarung, die weniger gezähnte Blattspindel, die Form der Köpfchen und der Köpfchenschuppen, mehr wollige Behaarung der letzteren und die Zähnung der strahlenden Randblüten geerbt; der Einfluss von *A. Neilreichii* KERN. hinwieder macht sich in der feineren Zerteilung der Blätter, Dünne des Blattstieles, Schmalheit, dünner Konsistenz und grünern

nűek. A szabadban az *A. Vandasii*-nál világosabb színű virágairól és az *A. Neureichii*-hoz hasonló leveleiről azonnal felismerhető.

Farbe der Blattzipfel, den kleineren Köpchen u. hellschwefelgelben Blüten bemerkbar. An ihrem natürlichen Standorte ist sie von *A. Vandasii* an ihren heller gefärbten Blüten und an den der *A. Neureichii* ähnlicheren Blättern sofort zu unterscheiden.

A VI. tábla magyarázata. — Erklärung der Tafel VI.

1. a—b—c *Achillea Neureichii* KERN. levélsúcsa, fészke és középső fészkepikkelye.  
Blattspitze, Köpfehen und mittlere Köpfehenschuppe von *Ach. Neureichii* KERN.
2. a—b—c *Achillea Wagneri* (*Vandasii* × *Neureichii*) levélsúcsa, fészke és középső fészkepikkelye.  
Blattspitze, Köpfehen u. mittlere Köpfehenschuppe von *A. Wagneri*.
3. a—b—c *Achillea Vandasii* VEL. levélsúcsa, fészke és középső fészkepikkelye.  
Blattspitze, Köpfehen u. mittlere Köpfehenschuppe von *A. Vandasii* VEL.


Ujabb adatok a Bükk-hegység és dombvidéke flórájához.  
Neuere Beiträge zur Flora des Bükkgebirges.

Irta: { Budai József (Miskolcz.)  
Von: }

Az alábbiakban néhány olyan érdekességét sorolom fel a Bükknek és előhegyeinek, melyek e területről még felemlítve nem voltak. Felveszek közleményembe néhány olyan fajt is, mely közölve volt ugyan, de azért az illető növény továbbterjedésének vagy előfordulásának megállapítása közlését indokolja. Közfajokat csak ott sorolok fel, hol az illető növény előfordulása különleges, vagyis szokott termőhelyüktől nagyon elütő.

A kritikus génuszokból inkább csak azokat öleltem fel, melyeknek összegyűjtésével legalább nagyjából elkészültem; mellőzöm azokat, melyeknek összegyűjtése és speczialisták által való feldolgozása most van folyamatban. Ez utóbbiakból legfőlebb néhányat említek föl. A nehéz *Viola*-génusz feldolgozásáért dr. GAYER GYULA úrnak, a *Quercus*-okért dr. JÁVORKA SÁNDOR úrnak, a *Centaurea*-kért WÁGNER JÁNOS úrnak mondok e helyen is hálás köszönetet.

Megjegyzem, hogy ezt az anyagot, melyen jelen dolgozatom felépült, jó nagy részben dr. DEGEN ÁRPÁD egyet. m. tanár úr szíves volt átrevídiálni. Dr. JÁVORKA SÁNDOR úr pedig az összes anyagot átnézte és javította, s így kizártnak tartom, hogy a tudomány dudváit, a hamis adatok szerepeljenek dolgozatomban. Megbecsülhetetlen fáradozásukat s azt a támogatást, melyben



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Prodan Gyula (Julius)

Artikel/Article: [Egy új Achillea-fajvegyülék Romániából. Ein neuer Achillea Bastard aus Rumänien. 314-315](#)