

1898-ban, a mikor a zanótbokrok kétszeri virágzásáról értekezését megírta, újból foglalkozott a békásmegyeri *C. millennii*vel és fenntartotta első értelmezését.

A *C. millennii* vegyüléktermészetére vonatkozólag irodalmi adat nincsen. A látott példány pedig különösen az erősen borzas, gyapjas csészéi miatt nem is lehet *austriacus* × *ratisbonensis*, hanem amennyiben vegyülekéről lehet szó, úgy a *ratisbonensis* × *leucotrichus* kombinációnak felelne meg leginkább és a *C. Vadasii*-vel össze nem téveszthető. Utóbbinak t. i. egészen rövid, odasimuló szőrözettel borított csészéje van.

men ist. Das ist umsomehr anzunehmen, als er seinen *C. millennii* 2-mal mit *C. elongatus* vergleicht, seine Publikationen nirgends korrigiert, trotzdem er sein *C. millennii* — Material bei der Verfassung seiner zitierten Abhandlung über 2-mal blühende Geisskleearten im Jahre 1898 einer Revision unterwerfen musste.

Abgesehen von alldem ist zu bemerken, dass *C. millennii* — über dessen Bastardnatur keine literarische Publikationen vorliegen — keinesfalls ein Bastard von *C. austriacus* mit *ratisbonensis* sein kann, u. zw. hauptsächlich darum nicht, weil seine Kelche mit langen abstehenden Haaren besetzt sind, welche *C. millennii* weder von *C. austriacus*, noch von dem beinahe kahlen *C. ratisbonensis* erhalten konnte. *C. millennii* scheint — wenn er überhaupt ein Bastard ist — vielmehr einer Kombination *C. ratisbonensis* × *C. leucotrichus* zu entsprechen und kann mit *C. Vadasii*, dessen Kelche mit sehr kurzen, anliegenden Haaren bedeckt sind, nicht verwechselt werden.

### Megjegyzések néhány keleti növényfajról.

#### Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.

Irta: } Dr. Degen Árpád.  
Von: }

#### LXXVII. *Achillea Prodani*

(*coarctata* × *collina*) nov. hybr.

Planta 4–5 Dm alta. *caulibus* simplicibus vel hinc inde ramosis, striatis, pilis albis longis, crispulis sat dense obtectis, tamen virescentibus; *foliis* ambitu late linearibus, utrinque sat dense pilis longis albis obsitis, tamen virescentibus, bipinnati-

sectis, rhachide angusta, denticulata; *segmentis* primariis ambitu linearibus. 4–7 Mm longis, basi in rhachidem decurrentibus, secundariis (ultimis) lineari-lanceolatis, obtusis, cca 1 Mm longis.  $\frac{1}{2}$  Mm latis, apice minute mucronulatis; foliis superioribus sensim diminutis minusque sectis; *corymbus* densus, sat compactus, *capitula* parva, cca 3 Mm alta, *involueri squamis* anguste ovato-lanceolatis, hyalinis, medio costa viridi percursis, dorso villosis, ventre glabris; *corollis* pallide luteis, ligulis radiantibus sat parvis. leviter tricenatis.

Hab. in Romaniae distr. Dobrogea. In monte «Suluc» prope Mačin inter parentes cl. 5. Jul. 1911 detexit cl. JUL. PRODAN: cui dicata. Ab *A. coarctata* POIR. differt indumento brevioris et parciore; foliorum segmentis primariis ambitu multo angustioribus magisque distantibus, secundariis paucioribus, angustioribus. foliorum rhachide tenuiori. capitulis duplo fere minoribus, corymbo laxiore. Ab *A. collina* BECKER differt indumento. foliorum sectione, corymbo magis contracto, inflorescentiae ramis crassioribus. capitulis majoribus, imprimis autem florum colore.

A simili *A. Degenii* (*coarctata* × *crithmifolia*) SEYM. (Magy. Bot. Lap. VIII. (1909): 240) differt caule, praesertim autem capitulis densius villosis, foliis ambitu angustioribus, paulo tenuius sectis, rhachide pluridentata multo angustiore, segmentis primariis magis approximatis, secundariis paulo brevioribus.

Budapestini. Idibus Junii 1915.

## Ujabb adatok Fereg-vármegye flórájához.

### Neuere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Bereger Komitates.

#### III. Közlemény (Mitteilung).

Irtta: } Margittai Antal (Stubnyafüredő).  
Vón: }

Az 1913. és 1914. évek nagy szünidejének egy részét Beregen töltöttem s amennyire a kedvezőtlen körülmények megengedték, a megye egyes részeibe néhány botanikai kirándulást végeztem. Eme kirándulásaim eredményeként a következő új adatokkal bővíthetem a már eddig e lapban közzétett adataimat.

*Calamagrostis Epigeios* (L.) ROTH. A Nagyhegyen Munkács mellett; Ujdávidháza környékén.

*Rumex conglomeratus* MURR. Rákos környékén.

*Polycnemum Heuffelii* LÁNG. Tarlókon Orosztelek körül.

*Kochia scoparia* (L.) SCHRAD. Elvadulva az utcán Iványiban.

*Melandrium noctiflorum* (L.) FR. Ujdávidházán.

*Ranunculus sardous* Cr. var. *mediterraneus* GRISEB. Orosztelek környékén.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Degen Árpád von

Artikel/Article: [Megjegyzések néhány keleti növényfajról. Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. 80-81](#)