

NOTA BREVE

**NOVAS OCORRÊNCIAS DE CRUSTÁCEOS DECÁPODOS  
NO LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL.**

P. R. NUCCI<sup>1</sup> & G. A. S. MELO<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universidade Estadual Paulista – UNESP – Rio Claro/SP. Av. 24A, 1515. Email: prnucci@ms.rc.unesp.br

<sup>2</sup> Museu de Zoologia – USP – São Paulo/SP. Av. Nazaré, 481. Email: gsmelo@usp.br

Os resultados apresentados neste trabalho fazem parte de um amplo projeto, que inventariou a macrofauna bentônica da região entremarés de praias do Canal de São Sebastião, São Paulo (NUCCI, 1998). As 6 espécies aqui apresentadas são registradas pela primeira vez no litoral paulista, ampliando assim suas distribuições até este Estado. Os dados apresentados, referentes aos itens distribuição e habitat, foram compilados de WILLIAMS (1993) e MELO (1996).

***Micropanope urinator* (A. Milne Edwards, 1881)**

**Distribuição:** Atlântico Ocidental – Carolina do Norte, Flórida, Golfo do México, Antilhas e Brasil (Pará e Maranhão).

**Habitat:** Em fundos de areia e de coral. De 150 a 460 metros de profundidade.

**Observação:** O exemplar foi coletado na região entremarés de uma praia de seixos (São Francisco).

***Parapinnixa bouvieri* Rathbun, 1918**

**Distribuição:** Atlântico Ocidental – Carolina do Sul, Flórida, Golfo do México, Antilhas e Brasil (Amapá).

**Habitat:** Fundos de coral e de areia, entre espinhos ventrais de ouriços do mar. Em profundidades de 5 a 75 metros.

**Observação:** Exemplar coletado em praia de seixos (Engenho d'Água – Ilha de São Sebastião).

***Upogebia vasquezi* Ngoc-Ho, 1989**

**Distribuição:** Atlântico Ocidental – Flórida, Bahamas, México, República Dominicana, Antilhas, Panamá, Colômbia e Brasil (do Rio Grande do Norte até a Bahia).

**Habitat:** Na região entremarés, em águas rasas em recifes coralinos.

**Observações:** Exemplares coletados em praias de seixos (Engenho d'Água e São Francisco).

***Upogebia noronhensis* Fausto-Filho, 1969**

**Distribuição:** Atlântico Ocidental – Brasil (Fernando de Noronha).

**Habitat:** No limite entre o infra e o médio litoral, embaixo de seixos, em fendas naturais ou em covas escavadas pelos próprios animais.

**Observações:** Exemplares coletados em praias de seixos (Engenho d'Água e São Francisco).

***Upogebia careospina* Williams, 1993**

**Distribuição:** Atlântico Ocidental – Brasil (Ceará).

**Habitat:** O único dado mencionado em literatura, refere-se a indivíduos coletados a uma profundidade de 27,5 metros.

**Observações:** Exemplares coletados em praia de seixos (Engenho d'Água).

*Upogebia marina* Coelho, 1973

**Distribuição:** Atlântico Ocidental – Venezuela e Brasil (do Piauí a Sergipe).

**Habitat:** Algas calcárias, recifes, areia e estuários.

**Observações:** Exemplares coletados em praia de seixos (São Francisco).

## AGRADECIMENTO

Ao CNPq pelo suporte financeiro, proc. 141.503/98-0 (P.R.N.); proc. 303.224/87-8 (G.A.S.M.).

## REFERÊNCIAS

- MELO, G.A.S. 1996. Manual de Identificação do Brachyura (Caranguejos e Siris) do Litoral Brasileiro. São Paulo. Ed. Pléiade. 603p.
- NUCCI, P.R. 1998. Biodiversidade de crustáceos da região entremarés em praias do Canal de São Sebastião (SP). Instituto de Biociências/Unesp-Rio Claro. (Dissertação de Mestrado). 60p.
- WILLIAMS, A.B. 1993. Mud Shrimps, Upogebiidae, from the Western Atlantic (Crustacea: Decapoda: Thalassinidea). Smithsonian Contributions to Zoology, 544: 1-77.