

CICLOPENTOLATO 5 MG/ML (0,5%) COLIRIO 10 ML

FORMA FARMACÉUTICA:

Colirios.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía tópica oftálmica.

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Anticolinérgico, midriático y ciclopléjico. Iritis, iridociclítis, queratitis, coroidistis, midriasis.

Exploración de fondo de ojo y examen de refracción y en cualquier afección en la que se desee un efecto midriático o cuando no pueda utilizarse la atropina (procesos inflamatorios del tracto uveal).

Cuando se busque un efecto sostenido en general se instilarán 2 gotas 3 veces al día. Para la refracción: Niños menores de 6 años: 1 ó 2 gotas de la solución, 40 ó 50 minutos antes del examen.

Niños mayores de 6 años y adultos: 1 gota de la solución, que se repetirá a los 5 minutos, 40 ó 50 minutos antes del examen.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Para una correcta administración debe destapar el frasco con las manos recién lavadas y procurando que el cuentagotas no toque ninguna superficie.

A continuación separe el párpado del ojo afectado y aplique las gotas indicadas de colirio dentro del párpado inferior.

Durante la aplicación no deberá tocar con el cuentagotas ni el ojo ni los dedos.

Tape el frasco inmediatamente después de cada aplicación y consérvelo en la nevera.

Para evitar la aparición de efectos adversos, se recomienda presionar el conducto lagrimal tras la instilación de las gotas.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación pueden presentarse manifestaciones generales de tipo anticolinérgico entre las que suele predominar la afectación del SNC que requerirá tratamiento de urgencia.

Si usted se ha administrado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-0420.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de que le administren este medicamento.

USO EN NIÑOS:

Debe vigilarse estrechamente a niños de 3 a 6 años y a ancianos después de la administración.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Puede causar visión borrosa, hasta que recupere la agudeza visual el paciente no debe conducir vehículos o manipular maquinaria peligrosa.

OTRAS:

Esta fórmula contiene como excipientes parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo, cloruro sódico y agua purificada.

CONTRAINDICACIONES:

Glaucoma o personas con ángulo estrecho. Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES:

Puede incrementar la presión intraocular. El uso continuado puede dar origen a reacciones alérgicas.

Si está en tratamiento con otro colirio, debe esperar entre 10 y 15 minutos entre la administración de uno y otro.

INTERACCIONES:

No se han descrito.

REACCIONES ADVERSAS:

Visión borrosa, irritación local, taquicardia ligera, disminución de las secreciones y acción sobre el sistema nervioso central, pudiendo ocasionar estados alucinatorios.

CONSERVACIÓN:

Conservar en nevera.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 14 días desde su elaboración conservada en nevera (4-8°C) y de 7 días desde su apertura.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Diciembre 2014.