

## Cuidados del Catéter Venoso

### Periférico corto

- Notificar al personal de enfermería cuando este despegado el apósito transparente y sus fijaciones.
- No dormir sobre el catéter.
- Mantener las extensiones del equipo para suero sobre la cama (no en el piso)
- Notificar al personal de enfermería en caso de fuga, sangrado o signos de alarma.
- Realizar lavado de manos.
- Al bañarse cubrir con una bolsa de plástico y evitar que caiga el agua de la regadera directamente sobre el catéter.




designed by freepik

¿Tienes alguna duda?



¡Te dejamos nuestro contacto!



HRAEB

Bld. Milenio #130 Col. San Carlos la Roncha, 37660  
León, Guanajuato.  
[www.hraeb.salud.gob.mx](http://www.hraeb.salud.gob.mx)

Teléfono: 2-67-2000  
Extensión: 1809  
Clínica de catéteres



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



CLINICA AL CUIDADO DE LOS  
ACCESOS VASCULARES  
HRAEB

## Cuidados del Catéter Venoso Periférico Corto


CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO  
CORTO (CVP)



**¡ Si cuido mi CVP cuido  
mis venas !**

## Objetivo del Cuidado del Catéter Venoso Periférico Corto

Proporcionar mejores condiciones al paciente desde la instalación hasta el retiro del catéter para evitar complicaciones.



**Evitar multipunciones al capacitar al paciente y su familia en el cuidado del catéter.**

## Indicaciones

- Terapia a corto plazo.
- Reposición de líquidos
- Administración de medicamentos.
- Transfusión de sangre y hemoderivados
- Mantenimiento de acceso venoso permeable.
- Realización de estudios diagnósticos.



## SIGNOS DE ALARMA



### AVISAR A SU ENFERMERA SI

- Presenta dolor
- Ardor
- Sensación de hormigueo
- Adormecimiento



- Cambio de coloración
- Salida de líquido
- Hinchazón

