

Caso_29_11

Varón de 29 años de edad. Marroquí residente en El Ejido (Almería) y trabajador agrícola.

Acude a la consulta por una úlcera localizada en el dorso del pie, junto al tobillo, de tres meses de evolución que, según nos dice, apareció como una pequeña lesión que interpretó como una picadura de algún insecto que, en lugar de curar, fue creciendo en forma de cúpula y al poco tiempo se ulceró y ha crecido hasta el aspecto actual.



El paciente reside habitualmente en España, pero tres semanas antes del episodio que refiere, fue con sus padres y hermanos a visitar a su familia residentes en un pueblo de Marruecos.

En el momento de la consulta apreciamos una lesión ulcerada en el dorso del pie, de bordes cortados a pico, rodeada de una piel de aspecto hiperqueratósico con algunas costras y un fondo de aspecto sucio, con secreción amarillenta que se condensa formando costras. A cuatro centímetros del borde interno de la úlcera mayor se aprecia otra lesión más pequeña pero con las mismas características. En el momento actual no produce síntomas. No se ha tratado.

¿Cuál sería el diagnóstico más probable?

1.- Lupus vulgar (tuberculoso).	RESPUESTA
2.- Impétigo	RESPUESTA
3.- Pioderma gangrenoso.	RESPUESTA
4.- Lepra tuberculoide.	RESPUESTA
5.- Leishmaniasis cutánea aguda	RESPUESTA

Respuesta CORRECTA.

1.- Independientemente del aspecto coinciden el antecedente de la picadura, la estancia en zona endémica y la evolución de la lesión.

2.- Se trataría de una Leishmaniasis del viejo mundo, de evolución aguda y afectación exclusivamente cutánea. Sería una "Leishmaniosis cutánea localizada aguda".

3.- Se distinguen dos formas clínicas, la forma húmeda, producida por la L. Mayor y la forma seca por la L. trópica, aunque ambos tipos pueden coexistir en el mismo paciente.

FORMA	HUMEDA	SECA
ESPECIE	L. Major	L. Tropica
AREA	Rural	Urbana
P.INCUBACIÓN	2-8 semanas	Más de 8 semanas
Nº DE LESIONES	Múltiples (en cada picadura)	Única
ULCERACION	Casi siempre, precoz y	Menos frecuente y tardía
PERIODO DE CURACIÓN	de 3 a 12 meses	El doble que las formas húmedas
TRATAMIENTO	Observación o trat ^o	Hay que tratarla, a veces sistémico