

Principes van de commerciële garnalenteelt



Het **Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center** van de Universiteit Gent heeft jarenlange ervaring met de teelt van schaaldieren zoals de tijgergarnaal (*Penaeus* soorten), de reuzezoetwatergarnaal (*Macrobrachium*), mangrovekrab en Chinese wolhandkrab. Het onderzoek omvat de ontwikkeling van betere levende en geformuleerde diëten, de studie van de eikwaliteit, ziektebestrijding en de ontwikkeling van betere kweektechnieken.

Courante benaming	Wetenschappelijke naam	Belangrijkste herkomst	Kweekduur	Oogstgewicht
Scampi reuzezoetwatergarnaal prawn (Eng.)	<i>Macrobrachium rosenbergii</i>	China India Thailand	3 à 5 maand	15-45g
Tijgergarnaal (Black) tiger shrimp (Eng.)	<i>Penaeus monodon</i>	Vietnam India Indonesië	3 à 6 maand	15-45g
Gamba Whiteleg shrimp (Eng.)	<i>Litopenaeus vannamei</i>	China, Thailand Indonesië Vietnam	3 à 5 maand	15-45g
Chineze wolhandkrab Chineze rivierkrab Mitten crab (Eng.)	<i>Eriocheir sinensis</i>	China	3 à 8 maand	30-70g

