

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



agrositos

Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ • ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

www.agrositos.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η AGROSITOS A.E. ιδρύθηκε το 2010 και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων γύρω από τον γεωργικό τομέα. Ξεκίνησε με κύρια δραστηριότητα την εμπορία δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη) και το 2012 επεκτάθηκε και στον τομέα της σποροπαραγωγής. Πλέον, η εταιρία μας κατέχει αποκλειστικές ποικιλίες σε σιτάρι σκληρό, σιτάρι μαλακό, κριθάρι, βίκο, κτηνοτροφικό μπιζέλι και κτηνοτροφικό κουκί. Το 2014, άρχισε να κάνει σημαντικά βήματα και στον τομέα των εξαγωγών κυρίως σε χώρες όπως η Κύπρος και η Ιταλία.

Σε εθνικό επίπεδο, η AGROSITOS A.E. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Σιτηρών και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την πάροδο των χρόνων η εταιρία ανέπτυξε συνεργασίες με μερικούς από τους μεγαλύτερους σποροπαραγωγικούς οίκους ανά τον κόσμο και πλέον έχει εδραιωθεί στον συγκεκριμένο κλάδο.

Επίσης, η AGROSITOS A.E. πραγματοποιεί συμβολαιακή καλλιέργεια (σύμβαση) με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Amstel, Heineken), τη μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα στον τομέα της ζυθοποιίας. Με πληθώρα παρόμοιων συνεργασιών, γεννήθηκε η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας κι έτσι η AGROSITOS A.E. έχει πλέον ένα σύγχρονο σποροκαθαριστήριο καθώς και μηχάνημα επένδυσης σπόρου. Οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτείνονται επιπλέον και στον τομέα των κτηνοτροφικών φυτών με ένα ευρύ φάσμα ποικιλιών (Sorghum, Lolium, Alfalfa, Setaria Italica, Pennisetum Glaucum) κ.α.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία δραστηριοποιείται και στο χώρο της θρέψης, παράγοντας μια πλήρη σειρά διαφυλλικών λιπασμάτων για όλες τις καλλιέργειες, έτσι ώστε να υποστηρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.

Προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας με ποιότητα, συνέπεια και ειλικρίνεια.

► ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

- Σελ. 3-4 Σκληρό Σιτάρι
- Σελ. 4-5 Μαλακό Σιτάρι
- Σελ. 6 Τριτικάλε
- Σελ. 7 Βρώμη
- Σελ. 7 Σίκαλη

► ΨΥΧΑΝΘΗ

- Σελ. 8 Βίκος
- Σελ. 8 Κτηνοτροφικό Μπιζέλι
- Σελ. 9 Κτηνοτροφικό Κουκί
- Σελ. 9 Λούπινο (Γλυκό)

► ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

- Σελ. 10 Μηδική
- Σελ. 10-11 Τριφύλλι
- Σελ. 12 Λόλιο
- Σελ. 13 Festolium
- Σελ. 13 Δακτυλίδα
- Σελ. 13 Φεστούκα
- Σελ. 13 Σούλα
- Σελ. 13 Ονοβρυχίδα
- Σελ. 14-15 Κτηνοτροφικά Μείγματα

► ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

- Σελ. 16 Πεννίζετο
- Σελ. 16 Κεχρί
- Σελ. 17 Σόργο
- Σελ. 18 Καλλιέργειες κάλυψης δενδρώνων
- Σελ. 18 Μουστάρδα
- Σελ. 19 Φυτά με νηματοδοκτόνο δράση
- Σελ. 19 Ηλιανθος
- Σελ. 19 Καλαμπόκι



▶ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (TRITICUM DURUM)

ΖΩΗ (ΖΟΙ)

Σταθερότητα Simeto και ποσότητα Μεξικάλι-81

- ▶ Γενεαλογία/Pedigree: **Simeto x Μεξικάλι - 81**
- ▶ Νέα ποικιλία του Ινστιτούτου Σιτηρών και Βάμβακος
- ▶ Πολύ πρώιμη
- ▶ Υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά
- ▶ Ασύγκριτη σταθερότητα αποδόσεων
- ▶ Ιδανική για περιοχές της χώρας με ξηροθερμικές συνθήκες
- ▶ Έτος εγγραφής ποικιλίας: 2011

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| • ΣΤΑΧΥΣ: | Πυραμοειδής, συμπαγής με λευκά άγανα |
| • ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ: | Ανοιχτό κεχριμπαρένιο |
| • ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: | Πολύ Πρώιμη |
| • ΑΔΕΛΦΩΜΑ: | Καλό |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: | Μεγάλη |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 3 ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ: | Ανθεκτική |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: | Καλή |
| • ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: | Πολύ Καλή |
| • ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: | Ευρεία |
| • ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ: | 40 gr |
| • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: | Ανοιξιόγαινη |
| • ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: | Νοέμβριος (Α' & Β' 10ήμερο) |
| • ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: | 18-20kg/στρ. |

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|-------------------------------|------|
| • ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ: | 90% |
| • ΠΡΩΤΕΪΝΗ % (P) (NX5,7): | 14,7 |
| • ΧΡΩΣΤΙΚΗ ppm (Β-ΚΑΡΟΤΙΝΙΟ): | 7,51 |
| • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ: | 93,4 |



CESARE

Ο βασιλιάς της ποιότητας

- ▶ Γενεαλογία/Pedigree: **Iride x Orobel**
- ▶ Μεσο-όψιμη
- ▶ Ιταλική ποικιλία
- ▶ Εξαιρετική και σταθερή ποιότητα
- ▶ Άριστη αντίσταση στο πλάγιασμα
- ▶ Ανθεκτικότητα στις κοινές ασθένειες του σιταριού
- ▶ Σπόρος με υψηλό ειδικό βάρος και άριστη ποιότητα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: | Μεσο-όψιμη ποικιλία |
| • ΑΔΕΛΦΩΜΑ: | Μέτριο |
| • ΥΨΟΣ: | Μέσο |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: | Υψηλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: | Πολύ καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ: | Υψηλή |
| • ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ: | 45 -50 gr |
| • ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: | 22-23κιλά/στρ. |

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| • ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: | Εξαιρετικό |
| • ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ: | Εξαιρετικό |
| • ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ: | Υψηλή (εώς 18%) |
| • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ: | Υψηλή |



ΜΕΞΙΚΑΛΙ - 81 (MEXICALI - 81)**Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά**

- ▶ Ποικιλία πολύ υψηλής απόδοσης
- ▶ Ίσως η πιο παραγωγική ποικιλία στην Ελλάδα
- ▶ Άριστη προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΥΨΟΣ:	Μέτρια
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Πολύ Πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:	Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Μεγάλη
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:	Μέτρια
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 3 ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:	Ανθεκτική
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:	Μέτρια
• ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:	Καλή
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Ευρεία
• ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ:	44gr
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Ανοιξιάτικη
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:	Πρώτο 15ήμερο Νοεμβρίου
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	18-20kg/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ:	67%
• ΠΡΩΤΕΪΝΗ % (P) (NX5,7):	13,5
• ΧΡΩΣΤΙΚΗ ppm (B-KΑΡΟΤΙΝΙΟ):	5,8

▶ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (TRITICUM AESTIVUM)**BELLINI****Μαλακό για όλες τις χρήσεις**

- ▶ Γενεαλογία/Pedigree: **Serio x Isengrain**
- ▶ Νέα Ιταλική ποικιλία
- ▶ Έχει στάχυ με άγανο
- ▶ Ανθεκτική στον παγετό, την ξηρασία και τις ασθένειες
- ▶ Άριστο εκατολιτρικό βάρος

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ:	Μεσαίο
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Μέσου βιολογικού κύκλου
• ΑΓΑΝΟ:	Μακρύ, Λευκό
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ:	Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ:	Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΩΪΔΙΟ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ:	Άριστη
• ΒΑΡΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ:	39-44 gr
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	20-22 κιλά/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ:	Άσπρο
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:	Άριστο
• ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ:	Μέσο-Σκληρό

ΒΕΡΓΙΝΑ (Παλιό νούμερο Γ84) *VERGINA***Ο ήλιος του μαλακού**

- ▶ Πολύ ανθεκτική στον παγετό
- ▶ Κατάλληλη για τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές
- ▶ Έχει στάχυ χωρίς άγανο
- ▶ Παρουσιάζει πολύ υψηλή παραγωγικότητα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΥΨΟΣ:	100±10 CM
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Μεσο-πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:	Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:	Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:	Μέτρια
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:	Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:	Ανθεκτική
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Καλή
• ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΩΝ ΚΟΚΚΩΝ:	36±5 gr.
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	20 κιλά/στρ.
• ΑΠΟΔΟΣΗ:	550±60 κιλά/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:	70,5
• ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (N X 5,7):	12,5 ± 0,5
• Zeleny test (Τιμή καθίζησης):	19 ± 2
• ΒΑΛΟΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ:	38 ± 2
• ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:	Μέτρια

**ΕΛΙΣΑΒΕΤ** (*ELISAVET*)**Η Ποιότητα στο μαλακό**

- ▶ Νέα ποικιλία του Ινστιτούτου Σιτηρών και Βάμβακος
- ▶ Πολύ ανθεκτική στον παγετό, την ξηρασία και τις ασθένειες
- ▶ Έχει στάχυ με άγανο
- ▶ Παρουσιάζει πλούσιο αδελφωμα
- ▶ Άριστη αρτοποιητική ικανότητα.
- ▶ Ιδανική ποικιλία για ενσίρωση

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΥΨΟΣ:	Μέτριο (90 ± 10 εκ)
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Πρώιμο
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:	Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΟΙΔΙΟ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΤΙΑΣΗ:	Πολύ Καλή
• ΒΑΡΟΣ 1000 ΚΟΚΚΩΝ:	35 ± 3 gr.
• ΑΠΟΔΟΣΗ:	550 ± 60 κιλά/ στρ.
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Ευρεία
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	18 κιλά/στρ
• ΕΔΑΦΟΣ:	Σε όλους τους τύπους εδαφών

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ:	Κόκκινο
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:	78-80
• ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (N X 5,7):	15 ± 2
• Zeleny test(Τιμή καθίζησης):	38 ± 4
• ΒΑΛΟΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ:	52 ± 3
• ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:	Άριστη



▶ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ (TRITICOSECALE)

ΑΛΚΜΗΝΗ (ALKMINI)

**Απόλυτη παραγωγή με άριστη ποιότητα**

- ▶ Γενεαλογία/Pedigree: **Triticale x Triticosecale Wittmack**
- ▶ Αγανοφόρος ποικιλία, με δυνατό καλάμι
- ▶ Πολύ πρώιμη
- ▶ Πολύ υψηλές και σταθερές αποδόσεις
- ▶ Σπόρος μεγάλος που γεμίζει καλά
- ▶ Είναι κατάλληλη για αρτοποιήση και πολύ καλή ως ζωτροφή
- ▶ Άριστη για βιοαέριο λόγω της υψηλής παραγωγής βιομάζας
- ▶ Κατάλληλη για ενσίρωση

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΥΨΟΣ:
 - ΣΤΑΧΥΣ:
 - ΜΗΚΟΣ ΣΤΑΧΥ:
 - ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:
 - ΑΔΕΛΦΩΜΑ:
 - ΑΝΟΤΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:
 - ΑΝΟΤΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ:
 - ΑΝΟΤΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:
 - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:
 - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
 - ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ:
 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:
 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:
 - ΑΠΟΔΟΣΗ:
 - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:
- Υψηλή
Μέτριος,
συμπαγής
Μακρύς (12-15 cm)
Πολύ πρώιμη
Πλούσιο
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Άριστη
Ειδική στα φτωχά και
όξινα εδάφη
43±2
Ανοιξιόατικη
Φθινοπωρινή-
Ανοιξιόατικη
**Πολύ υψηλή (+15%
των μαρτύρων, έως
780 kg)**
18-20 kg/στρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 76,0±2
- ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (N X 5,7): 13,5±0,5



ΒΡΥΤΩ (VRITO)



- ▶ Αγανοφόρος ποικιλία, με δυνατό καλάμι
- ▶ Πολύ πρώιμη
- ▶ Πολύ υψηλές και σταθερές αποδόσεις σε όλα τα εδάφη
- ▶ Σπόρος μεγάλος που γεμίζει καλά
- ▶ Είναι κατάλληλη για αρτοποιήση και πολύ καλή ως ζωτροφή

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΥΨΟΣ:
 - ΣΤΑΧΥΣ:
 - ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:
 - ΑΔΕΛΦΩΜΑ:
 - ΑΝΟΤΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:
 - ΑΝΟΤΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ:
 - ΑΝΟΤΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:
 - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:
 - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
 - ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ:
 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:
 - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:
- Υψηλή
Μέτριος,
συμπαγής
Πρώιμη
Μέτριο
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Άριστη
Ειδική στα φτωχά
και όξινα εδάφη
43±2
Φθινοπωρινή -
Ανοιξιόατικη
20 κιλά/στρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (N X 5,7): 13±1%

▶ ΒΡΩΜΗ (*AVENA SATIVA*)

FULVIA

- ▶ Κόκκινη, δίκλωνη βρώμη υψηλής απόδοσης
- ▶ Μεγάλη αντοχή στην Ξηρασία και στο πλάγιασμα
- ▶ Κατάλληλη για βόσκηση, ενσίρωση και παραγωγή καρπού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Πολύ πρώιμη
• ΥΨΟΣ:	85-90cm
• ΑΔΕΡΦΩΜΑ:	Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ:	Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:	Καλή
• ΑΠΟΔΟΣΗ:	Υψηλή
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Ευρεία
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	16-18kg/στρ
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:	46-48 gr
• ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΩΝ ΚΟΚΚΩΝ:	34-36 gr.
• ΠΡΩΤΕΙΝΗ:	15-16%

▶ ΣΙΚΑΛΗ (*SECALE CEREALE*)

SITO 70



- ▶ Πρώιμη ποικιλία
- ▶ Ποικιλία με εξαιρετικά αγρονομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά
- ▶ Ανθεκτική στο ψύχος, στα αλατούχα εδάφη και στα χαμηλά Ph
- ▶ Εκμεταλλεύεται πολύ φτωχά εδάφη
- ▶ Κατάλληλη για άχυρο, χλωρή χορτονομή και ενσίρωση
- ▶ Πλούσιο αδέλφωμα
- ▶ Υψηλή παραγωγικότητα
- ▶ **Μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα ύψος**

▶ **ΒΙΚΟΣ** (*VICIA SATIVA*)**MILUKA**

▶ Υψηλή θρεπτική αξία σανού

- Χώρα προέλευσης: Ιταλία
- Άνθος: Βιολετί
- Ύψος: Ψηλή
- Πρωιμότητα: Μέσου βιολογικού κύκλου
- Προσαρμοστικότητα: Σε όλα τα εδάφη της Ελλάδας
- Κλιματική αντοχή: Κουφόβραση, κρύο και ξηρασία
- Αντοχή στον παγετό: Πολύ καλή
- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο- Άνοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 13-15 κιλά/στρ για καρπό
15-17 κιλά/στρ για σανό
- Χρήση: Βόσκηση, σανό, ενσίρωση και καρπό
- Απόδοση σε καρπό: 150 - 250 kg/στρ.
- Απόδοση σε σανό: Έως 1000 kg/στρ.
- Συσκευασία: 30-40 kg

**ΛΕΩΝΙΔΑΣ** (*LEONIDAS*)

- Γενεαλογία/ pedigree: Armandes x Girlag
- Έτος εγγραφής ποικιλίας: 2016
- Άνθος: Ανοιχτό βιολετί
- Χρώμα σπόρου: Γκρι-καφέ
- Πρωιμότητα: Πολύ πρώιμη
- Κύκλος ωρίμανσης: Μεσο-πρώιμη
- Προσαρμοστικότητα: Άριστη
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
- Αντοχή στον παγετό: Καλή
- Παραγωγικότητα: Υψηλή παραγωγή σανού και καρπού
- Βαράς 1.000 κοκών: 43 - 51γρ.
- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο- Άνοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 14-16 κιλά/στρ για καρπό
16-18 κιλά/στρ για σανό
- Χρήση: Παραγωγή σανού και καρπού
- Απόδοση σε καρπό: Έως 250 kg/στρ.
- Απόδοση σε σανό: 600-700 kg/στρ.
- Συσκευασία: 30-40 kg

▶ **ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ** (*PISUM SATIVUM*)**ANDREA**

- Χώρα προέλευσης: Τσεχία
- Άνθος βιολετί
- Εξαιρετικά παραγωγική ποικιλία
- Μέσος βιολογικός κύκλος
- Ταχεία ανάπτυξη
- Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος (**έως -18°C**)
- Χρώμα σπόρου καφέ-πράσινο
- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο και Άνοιξη
- Ποσότητα Σπόρου: 14-16 kg/στρ. για καρπό
- Ποσότητα Σπόρου: 16-18 kg/στρ. για σανό
- Απόδοση σε καρπό: Έως 180-270 kg/στρ.
- Απόδοση σε σανό: 700-900 kg/στρ.
- Χρήση για σανό, ενσίρωση και καρπό
- Συσκευασία: Σάκος 30/40kg



► ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ (*VICIA FABA*)

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ (ΡΟΛΥΚΑΡΡΙ)

- Ποικιλία σταθερή και παραγωγική σε καρπό
- Πρώιμη ποικιλία
- Ο σπόρος της είναι μαύρος, μικρού μεγέθους
- Σπέρνεται με τις συμβατικές σπαρτικές μηχανές το χειμώνα
- Εποχή σποράς: Οκτώβριο - Νοέμβριο
- Ποσότητα σπόρου: 12-15kg/στρ.
- Κατάλληλο Ρh εδάφους: Ουδέτερα και Αλκαλικά
- Συμπυκνωμένη πρωτεϊνούχα ζωοτροφή για τα σιτηρέσια
- Αντικαθιστά πλήρως την σόγια στα σιτηρέσια με εκπληκτικά αποτελέσματα
- Πρωτεϊνικό περιεχόμενο: **έως 33%**
- Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο ψύχος και την ασθένεια σκληρωτίνια
- Ανθεκτική στο ψύχος και την ξηρασία.
- Ορθόκλαδη με ισχυρό στέλεχος (Αντοχή στο πλάγιασμα και εύκολη μηχανική συγκομιδή)
- Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αυξάνει το υπολειμματικό άζωτο
- Βάρος 1.000 σπόρων 300-320 γραμμάρια
- Μέση απόδοση 250 κιλά/στρ
- Χρήσεις: Παραγωγή καρπού, παραγωγή σανού, συγκαλλέργεια με διάφορα σιτηρά, χλωρά λίπανση



► ΓΛΥΚΟ ΛΟΥΠΙΝΟ (*LUPINUS ALBUS*)

- Πρώιμη ποικιλία
- Λευκά άνθη
- Σπέρνεται με τις συμβατικές σπαρτικές μηχανές το χειμώνα
- Εποχή σποράς: Σεπτέμβριο - Οκτώβριο
- Ποσότητα σπόρου: 13-15 kg/στρ.
- Ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες (Έως -10°C)
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (33,5%)
- Περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή <0,02%
- Κατάλληλο pH=6,5 (Ωστόσο, μπορεί να καλλιεργηθεί σε εδάφη από 6-7,5)
- Ανθεκτικό στην ξηρασία
- Συνίσταται ο εμβολιασμός με *Bradyrhizobium lupine*, ειδικά σε χωράφια που δεν έχει καλλιεργηθεί πρόσφατα.
- Είναι εύγεστο ως ζωοτροφή
- **Μπορεί να καταναλωθεί άμεσα από τα ζώα δίχως επεξεργασία**
- Μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την σόγια στα σιτηρέσια



► ΜΗΔΙΚΗ (*MEDICAGO SATIVA*)**RIVIERA VICENTINA**

- Συντελεστής ληθάργου: 7
- Πρώιμη ποικιλία
- Πλούσιο φύλλωμα και λεπτό στέλεχος (βλαστός)
- Μεγάλη διάρκεια παρουσίας της στο χωράφι (5-6 χρόνια)
- Υψηλός ρυθμό αναβλάστησης κατά την περίοδο της Άνοιξης
- Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος και στις ξηροθερμικές συνθήκες
- Ανθεκτικότητα στις ασθένειες
- Όρθια ανάπτυξη
- Πλούσια φυλλική επιφάνεια
- Γρήγορα αναβλάστηση
- Κατάλληλη για χλωρή χορτονομή και ενσίρωση
- Υψηλή παραγωγικότητα, ακόμη και μετά από συχνές κοπές
- Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα
- Ποσότητα σπόρου σποράς: 2,5-3,5 kg/στρέμμα
- Συσκευασία: Σάκος 10/20/25kg

**VENICE**

- Συντελεστής ληθάργου: 6
- Μεσοπρώιμη ποικιλία
- Μεγάλη διάρκεια στο χωράφι
- Υψηλός ρυθμός αναβλάστησης και γρήγορο φύτρωμα την Άνοιξη
- Μέγεθος κεντρικού φύλλου: 18-33mm
- Εξαιρετική απόδοση
- Αντοχή σε νηματώδεις
- Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος.
- Ανθεκτικότητα σε όλες τις ασθένειες.
- Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
- Υψηλή πεπτικότητα χάρη στο πολύ λεπτό στέλεχος
- Μικρή απώλεια φυλλώματος κατά το στέγνωμα
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες φυτικές ίνες
- Κατάλληλο για βόσκηση, άχυρο και ενσίρωση.
- Ποσότητα σπόρου σποράς: 2,5-3,5 kg/στρέμμα
- Συσκευασία: Σάκος 10/20/25kg

► ΤΡΙΦΥΛΛΙ (*TRIFOLIUM SPP.*)**ΛΕΥΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ή ΕΡΠΟΝ (*TRIFOLIUM REPENS*)**

- Έρπουσα ανάπτυξη
- Πολυετές φυτό (3-4 έτη)
- Προτιμά υγρές και δροσερές περιοχές
- Αντοχή στο κρύο
- Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών
- pH=5-8
- Πυκνό φύλλωμα
- Ανθεκτικό στη βόσκηση
- Σπόρος σποράς: 3,5kg/στρ.



ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ RED CLOVER (*TRIFOLIUM PRATENSE*)

- Πολυετής καλλιέργεια (3 χρόνια)
- Γόνιμα εδάφη
- pH = 6,0 - 7,5, αντέχει όμως και σε πιο όξινα εδάφη, αρκεί να υπάρχει επάρκεια ασβεστίου στο έδαφος.
- Για βόσκηση, ενσίρωμα και σανό
- Σπόρος σποράς: 2,5 - 3,5 kg/στρ.

**CRIMSON ΤΡΙΦΥΛΛΙ** (*TRIFOLIUM INCARNATUM*)

- Ετήσια καλλιέργεια
- Για εύκρατα κλίματα και βορειότερα, αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -20°C)
- Πηλώδη εδάφη
- pH = 5,5 -7,5
- Σπόρος σποράς: 3-3,5 kg/στρ.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ** (*TRIFOLIUM ALEXANDRINUM*)

- Ετήσια καλλιέργεια
- Ευπαθές στο ψύχος
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία
- Δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δυο ή περισσότερες κοπές
- Αντοχή στην ξηρασία
- Βαθιά εδάφη μέσης σύστασης
- Για αργιλώδη και αλκαλικά εδάφη
- pH = 6,0 - 8,0
- Σπόρος σποράς: 3kg/στρ.
- Περίοδος σποράς : Άνοιξη και φθινόπωρο
- 2-3 κοπές στην ξηρική καλλιέργεια
- 4-5 κοπές στην αρδευόμενη καλλιέργεια

**ΠΕΡΣΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ** (*TRIFOLIUM RESUPINATUM*)

- Ετήσιο φυτό
- Αντέχει αρκετά στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, γι' αυτό συνιστάται η καλλιέργειά του στις βοριότερες και ψυχρότερες περιοχές της χώρας μας
- Προσαρμόζεται σε βαριά και υγρά εδάφη.
- pH > 6,5 αλλά αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε ελαφρώς όξινα εδάφη (pH 5,5-5,7)
- Για αργιλώδη εδάφη
- Σπόρος Σποράς: 2-3kg/στρ.



▶ ΛΟΛΙΟ (*LOLIUM SPP.*)ΛΟΛΙΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ (*LOLIUM PERENNE*)Ποικιλίες: **Temprano**
Nui

- Πολυετής καλλιέργεια
- Κατάλληλη για βοσκή, σανό
- Αντοχή στο κρύο
- Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
- Εύγεστη για ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
- Γρήγορη αναβλάστηση
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών
- Σπόρος: 5kg/στρ.

ΛΟΛΙΟ ΥΒΡΙΔΙΟ
(*LOLIUM PERENNE X LOLIUM MULTIFLORUM*)Ποικιλία: **Rusa**

- Συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις του μονοετούς Λόλιου τα πρώτα 2 χρόνια
- Διαρκεί για 3-4 χρόνια.
- Άριστη ποιότητα ζωοτροφής

ΛΟΛΙΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ
(*LOLIUM MULTIFLORUM*)Ποικιλίες: **Grazer Nova**
Estanzuella

- **Διπλοειδής ποικιλία**, πρώιμη με μικρό βιολογικό κύκλο
- Μονοετής καλλιέργεια
- Εξαιρετικά γρήγορη εγκατάσταση καλλιέργειας
- Κατάλληλη για σανό και βόσκηση
- Αντοχή στο κρύο
- Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
- Εύγεστη για τα ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
- Μεγάλη απόδοση, ειδικά στην πρώτη κοπή
- Σπόρος: 5kg/στρ.

ΛΟΛΙΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ
(*LOLIUM MULTIFLORUM*)Ποικιλίες: **Attain**
Koga

- **Τετραπλοειδής ποικιλία**, μεσο-όψιμη με μεγαλύτερο βιολογικό κύκλο
- Μονοετής καλλιέργεια
- Ανθεκτικότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
- Μεγάλο μέγεθος φύλλων και στελέχους, μεγαλύτερη απόδοση
- Κατάλληλη για βοσκή, σανό και κυρίως για ενσίρωση
- Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
- Εύγεστη για τα ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
- Μεγάλη απόδοση, ειδικά στην πρώτη κοπή
- Σπόρος: 5kg/στρ.

ΦΕΣΤΟΛΟΛΙΟ (*FESTOLOLIUM*)**Ποικιλία: Perun**

- **Υβρίδιο (διασταύρωση) κτηνοτροφικής Φεστούκας και Λόλιου**
- Χρησιμοποιείται σε μείγματα ή και μόνο του, σε βοσκοτόπια και λειμώνες
- Έχει μεγαλύτερη απόδοση σε παραγωγή χορτονομής σε σύγκριση με το πολυετές Λόλιο (**έως και 25%**) και ταυτόχρονα διατηρεί όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματά του.
- Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος.
- Ανθεκτικότητα σε όλες τις ασθένειες.
- Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα.
- Κατάλληλο για βόσκηση, άχυρο και ενσίρωση.
- Ποσότητα σπόρου σποράς: 4-5kg / στρέμμα

**ΔΑΚΤΥΛΙΑΔΑ** (*DACTYLIS GLOMERATA*)**Ποικιλία Donata**

- Αγροστώδες
- Φθινοπωρινή σπορά (Μέσα Σεπτεμβρίου - Οκτώβριος)
- 7 χρόνια διάρκεια
- Αντέχει στην αλατότητα του εδάφους.
- Ιδανικό για χορτονομή
- Αντοχή σε κρύο κλίμα και ξηρασία.
- Χρησιμοποιείται για σανό και βόσκηση
- Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ.

**ΦΕΣΤΟΥΚΑ** (*FESTUCA ARUNDINACEA*)**Ποικιλία: Kora**

- Το πιο ανθεκτικό στην ξηρασία από όλα τα χορτονομικά αγροστώδη
- Ανοιξιότικη σπορά - τέλη Μαρτίου
- Φθινοπωρινή σπορά μόνο για παραγωγή σπόρου
- Σαν επίσπορη καλλιέργεια από ψυχανθή.
- Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ.

**ΣΟΥΛΑ** (*SULLA CORONARIA*)**Ποικιλία: Bellante**

- Για βαλτώδη, αμμοαργιλώδη εδάφη
- Βοηθάει πολύ στη δομή του εδάφους
- Προτείνεται για αμειψισπορά με σιτηρά
- Το 2ο χρόνο πιο παραγωγικό
- Να κόβεται πριν την άνθηση για να μην αναπτύσσονται πολύ τα αγκάθια στο στέλεχος
- Όχι σε ξηρές περιοχές
- Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ. την άνοιξη.

**ΟΝΟΒΡΥΧΙΑΔΑ** (*ONOBRYCHIS VICIIFOLIA*)

- **Συνίσταται για άλογα και βοοειδή**
- Πολυετές ψυχανθές
- Ισχυρό ριζικό σύστημα
- Όρθιας έκφυσης
- Ύψος 60-80 cm, με κούφια στελέχη
- Ανθεκτική σε κρύο, ζέστη καθώς και σε υγρασία και ξηρασία
- Ελαφριά και πηλώδη εδάφη
- Αντοχή σε κρύο, ζέστη, υγρασία και ξηρασία
- Διετής καλλιέργεια
- Κατάλληλη για βόσκηση και σανό
- 5 kg ανά στρέμμα αναποφλοιώτο σπόρο
- 8 kg ανά στρέμμα αναποφλοιώτο σπόρο



▶ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.20

- Πολυετές μείγμα
- Μείγμα αγροστωδών και ψυχανθών σπόρων με φεστούκα, λόλιο πολυετές, λόλιο ετήσιο, κοινό τριφύλλι, αγριοτριφύλλο τριφύλλι, κόκκινο τριφύλλι, λευκό τριφύλλι
- Παραγωγή για σανό και ενσίρωση
- Απαραίτητη η άρδευση της καλλιέργειας
- Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο/ Άνοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 6-7 kg/στρ.
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.20
15%	LOIETTO IBRIDO
20%	FESTUCA ARUNDINACEA
30%	LOIETTO PERENNE
20%	LOIETTO ITALICO
7,5%	FLEOLO PRATENSE
2,5%	TRIFOGLIO PRATENSE
2,5%	TRIFOGLIO B.REPENS
2,5%	GINESTRINO

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Ν.26

- Πολυετές Μείγμα
- Χρησιμοποιείται για βόσκηση και σανό
- Ιδανικό για Πρόβατα αλλά κατάλληλο και για αγελάδες
- Κατάλληλη περίοδος σποράς: Φθινόπωρο/Άνοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 7-8kg/στρ.
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.26
15%	LOIETTO PERENNE
20%	LOIETTORIGIDO
15%	FESTUCA ROSSA
22%	FESTUCA ARUNDINACEA
10%	FLEOLO PRATENSE
5%	FESTUCA OVINA
4%	GINESTRINO
2%	TRIFOGLIO B.REPENS
7%	LUPINELLA IN GUSCIO



ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΞΗΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.30

- Πολυετές μείγμα
- Μείγμα αγροστωδών και ψυχανθών σπόρων με φεστούκα, λόλιο πολυετές, λόλιο ετήσιο, δακτυλίδα, ονοβρυχίδα, κόκκινο τριφύλλι, λευκό τριφύλλι
- **Αντοχή στην Ξηρασία**, κατάλληλο για έδαφος με χαμηλή διαθεσιμότητα νερού
- Παραγωγή για σανό
- Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο/ Άνοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 6-7 kg/στρ.
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.30
10%	LOIETTO IBRIDO
20%	LOIETTO PERENNE
15%	LOIETTO ITALICO
25%	FESTUCA ARUNDINACEA
5%	ERBA MAZZOLINA
7,5%	FLEOLO PRATENSE
2,5%	TRIFOGLIO B.REPENS
2,5%	TRIFOGLIO PRATENSE
10%	LUPINELLA IN GUSCIO
2,5%	GINESTRINO

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ Ν.27

- Πολυετές μείγμα
- Χρησιμοποιείται για σανό και βόσκηση
- Γρήγορη εγκατάσταση στο χωράφι
- Άφθονη προσφορά υψηλής ποιότητας τροφή
- Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Άνοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 7-8kg/στρ.
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.27
15%	LOIETTO IBRIDO
25%	FESTUCA ARUNDINACEA
10%	ERBA MAZZOLINA
35%	LOIETTO PERENNE
15%	FLEOLO PRATENSE

► ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ Ν.24

- Πολυετές μείγμα
- Κατάλληλο για βόσκηση και σανό
- Πολύ ανθεκτικό στο πάτημα
- Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Ανοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 10 kg/στρ.
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ Ν.24
40%	LOIETTO PERENNE
40%	FESTUCA ARUNDINACEA
10%	ERBA MAZZOLINA
5%	POA PRATENSIS
5%	ERBA CAPRIOLA (Cynodon Dactylon)

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗ Ν.25

- Πολυετές μείγμα
- Ιδανικό για βοοειδή και πρόβατα
- Κατάλληλο για βοσκότοπους
- Πολύ ανθεκτικό στο πάτημα και στην βόσκηση
- Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Ανοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 8-9 kg/στρ.
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗ Ν.25
10%	LOIETTO IBRIDO
35%	LOIETTO PERENNE
20%	FESTUCA ARUNDINACEA
14%	FLEOLO PRATENSE
2%	TRIFOGLIO PRATENSE
5%	ERBA MAZZOLINA
2%	TRIFOGLIO B.REPENS
10%	LUPINELLA IN GUSCIO
2%	GINESTRINO



BARALDO

- Μονοετές Μείγμα
- Κατάλληλο για σανό και βόσκηση
- Κατάλληλο για αγελάδες και αιγοπρόβατα
- Περιέχει: Σίκαλη, Βίκo, Τριφύλλι Ινκαρνatum, Τριφύλλι Αλεξανδρινό
- Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο
- Ποσότητα σπόρου: 5-6kg/στρ.

%	BARALDO
40%	SEGALE
25%	VECCIA
15%	TRIF. INCARNATO
20%	TRIF. ALESSANDRINO/SQUARROSO

FRAVELO

- Μονοετές Μείγμα
- Κατάλληλο για ενσίρωμα
- Κατάλληλο για αγελάδες και αιγοπρόβατα
- Περιέχει: Λόλιο Τετραπλοειδές, Βρώμη, Σιτάρι για ενσίρωμα
- Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο

%	FRAVELO
45%	FRUMENTO MUTICO
36%	AVENA (MAX POSEIDON)
13%	AVENA (m77)
6%	LOIETTO ITA. TETRAPLOIDE, TARDIVO

TRILOPRO

- Μονοετές μείγμα
- Μείγμα με υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο
- Ιδανικό για ζωοτροφή
- Φθινοπωρινή σπορά
- Κατάλληλο για σανό, βόσκηση και ενσίρωση

%	TRILOPRO
36%	LOIETTO
11%	FRUMENTO MUTICO
19%	AVENA
4%	TRIF. INCARNATUM
30%	ALEXANDRINUM



ΠΕΝΝΙΖΕΤΟ (*PENNISETUM GLAUCUM*)

- Χώρα προέλευσης: Νότια Αφρική
- Μικρός βιολογικός κύκλος (**60 ημερών**)
- Ποικιλία που προέρχεται από την υποτροπική ζώνη με **μεγάλη ανθεκτικότητα στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες**
- Σε ευνοϊκές συνθήκες μπορούμε να πάρουμε έως 3 κοπές
- Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
- **Αν κοπεί στο σωστό ύψος (60-70cm) μπορούμε να πετύχουμε την μέγιστη πρωτεΐνη 22-23%**
- Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
- **Κατάλληλο για ενσίρωση (έως 5τ./στρ), για σανό και για βόσκηση**
- Είναι πολύ γευστικό και προτείνετε ειδικά σε αιγοπρόβατα, αγελάδες και άλογα
- Καλύτερο από στο σόργο διότι δεν περιέχει τοξικές ουσίες ή άλλους αντιδιατροφικούς παράγοντες
- Ποσότητα σποράς 3kg και βάθος σποράς 2-3cm
- Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους για σπορά 16 βαθμούς κελσίου
- Μπορεί να σπαρθεί έως και αρχές Αυγούστου, ακόμη και μετά από σιτηρά χωρίς άρωση αλλά μόνο με δισκοσβάρνα.
- Κατάλληλο για βιοαέριο



ΚΕΧΡΙ ή ΑΓΡΙΟΚΡΙΘΑΡΟ (*SETARIA ITALICA*)

- Χώρα προέλευσης: Ινδία
- **Ποικιλία μικρού βιολογικού κύκλου(50-60 ημερών)**
- Συνήθως σπέρνεται σαν δεύτερη καλλιέργεια για μία άφθονη κοπή
- Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Για μέγιστη απόδοση χρειάζεται πότισμα.
- Υψηλό στέλεχος έως και 2 m. και λεπτό στέλεχος για γρήγορο στέγνωμα
- **Κατάλληλο για σανό έως 1000 kg/στρ. Ξηρή μάζα (μάρτυρας στο Παλαμάς Καρδίτσας, καλοκαίρι 2019)**
- Ποσότητα σποράς 5kg
- Βάθος σποράς 2-3cm, όχι παραπάνω
- Περίοδος σποράς: Αρχές Απριλίου - Αρχές Αυγούστου



▶ ΣΟΡΓΟ

PACIFIC GRAZE (*Sorghum Bicolor x Sorghum Sudanense*)

- Υβρίδιο Αμερικανικής προέλευσης
- Έχει πρώιμο κύκλο (63-65 ημέρες από την σπορά)
- Ύψος 1,80-2 μέτρα
- Εξαιρετική αναβλάστηση
- 3 - 4 κοπές (υπό ιδανικές συνθήκες)
- Χρησιμοποιείται από 0,90cm και μετά
- Χρησιμοποιείται για ενσίρωμα και βόσκηση
- Ιδανικό για παραγωγή υψηλής ποιότητας σανού λόγω του λεπτού στελέχους
- Καλή αντοχή στην ξηρασία
- Ιδανική λύση για αμειψισπορά
- Ποσότητα Σπόρου: 5kg/στρ.
- Συσκευασία : Σάκος 25 kg

**LATTE** (*Sorghum Bicolor x Sorghum Sudanense*)

- Υβρίδιο Αμερικανικής προέλευσης
- Ανθεκτική στην ξηρασία
- Ύψος 3 μέτρα
- Όψιμη ποικιλία πολλαπλών κοπών
- **Μεγάλη παραγωγή βιομάζας (6-6,5 τόνους/στρ.)**
- Εξαιρετική ικανότητα αναβλάστησης
- Άριστη ζωτροφή
- **Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική είχε 20% περισσότερο πρωτεΐνη σε σχέση με τους μάρτυρες**
- Εξαιρετική πεπτικότητα
- Κατάλληλο για βόσκηση, σανό και ενσίρωμα
- Ιδανικό για βιοαέριο εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής βιομάζας
- Υψηλή αντοχή σε συνθήκες υγρασίας
- Ανοιξιάτικη σπορά (ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 16C)
- Λίπανση 10-15 μονάδες αζώτου/ στρέμμα
- Ποσότητα σπόρου: 4-5 kg/στρέμμα
- Συσκευασία : Σάκος 25 kg

**BIG KAHUNA** (*Sorghum bicolor*)

- Υβρίδιο Αμερικανικής προέλευσης
- Όψιμη ποικιλία
- Ύψος 3-4 μέτρα
- Μονής κοπής
- Μεγάλη παραγωγή βιομάζας (8-10 τόνους/στρ.)
- Υψηλή ανθεκτικότητα στις ασθένειες
- Υψηλή ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα
- Κατάλληλο για ενσίρωμα, βόσκηση, σανό και βιοαέριο
- Ιδανικό για βιοαέριο εξαιτίας της **μεγάλης παραγωγής βιομάζας (8-10 τόνους/στρ.)**
- Ανοιξιάτικη σπορά (ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 16C)
- Λίπανση 15-20 μονάδες αζώτου/ στρέμμα
- Ποσότητα σπόρου: 2-3 kg/στρέμμα
- Συσκευασία : Σάκος 25 kg



SOTTOFRUTTETO LUCIO

Συστήνεται για γόνιμα και ποτιστικά εδάφη

- Μίγμα ειδικών ποικιλιών με χαμηλή βλαστική ανάπτυξη
- Πολύ καλή κάλυψη και έλεγχο ζιζανίων
- Παρουσιάζει χαμηλό ανταγωνισμό με τον οπωρώνα σε αντίθεση με τα ζιζάνια. Εξαιρετική ικανότητα στήριξης και σημαντική μείωση διάβρωσης του εδάφους.
- Συστήνεται για οπωρώνες εντατικής φροντίδας και καλλιέργειας
- Περιέχει: Λόλιο πολυετές, 2 είδη φεστούκα και πόα

- ▶ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Μέση
- ▶ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μέση - Υψηλή
- ▶ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ STRESS: Μέση - Υψηλή
- ▶ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ): Μέση - Υψηλή
- ▶ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Φθινόπωρο, νωρίς την Άνοιξη
- ▶ ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 6-8kg/στρ.



SOTTOVIGNETO GAIO

Συστήνεται για φτωχά εδάφη με έλλειψη νερού

- Ποικιλία με φυτά χαμηλής ανάπτυξης
- Παρουσιάζει μειωμένο ανταγωνισμό με τα καλλιεργούμενα είδη
- Είναι ανθεκτική στο πάτημα και από οχήματα
- Περιορίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων και απαιτεί λίγες κοπές
- Συστήνεται για αμπελώνες και οπωρώνες μικρών εισροών
- Περιέχει: Λόλιο, 3 είδη φεστούκα και λευκό τριφύλλι

- ▶ ΧΡΗΣΗ: Χόρτα για οπωρώνες και αμπελώνες
- ▶ Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες
- ▶ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Γρήγορη
- ▶ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μέση
- ▶ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ STRESS: Μέση
- ▶ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ): Μέση - Χαμηλή
- ▶ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Φθινόπωρο, νωρίς την Άνοιξη
- ▶ ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 6-8kg/στρ.



▶ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

ANDROMEDA

- ▶ Μεσοπρώιμη ποικιλία
- ▶ Εξαιρετικά παραγωγική
- ▶ Αντοχή στους νηματώδεις
- ▶ Μικρή ανθεκτικότητα στον παγετό
- ▶ Καλή αντοχή στη σκληρωτίνια
- ▶ Καλή αντοχή στον περονόσπορο
- ▶ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου
- ▶ ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 1-1,5kg/στρ.



► ΦΥΤΑ ΜΕ ΝΗΜΑΤΟΔΟΚΤΟΝΟ & ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ποικιλίες: Brilliant και Minaret

1. Είδος σιναπιού που σπέρνεται πριν από την καλλιέργεια που θέλουμε να προστατέψουμε από την προσβολή.
2. Αφού σπείρουμε το σινάπι και περάσουνε δύο μήνες περίπου, το ενσωματώνουμε (δισκοσβαρνίζουμε) στο έδαφος, με σκοπό να μειωθεί ο πληθυσμός των νηματωδών και των σιδηροσκουλήκων.
3. Στη συνέχεια μπορούμε να σπείρουμε την καλλιέργειά μας.

- Χώρα προέλευσης: Ολλανδία
- Ριζικό σύστημα που βελτιώνει τη δομή του εδάφους
- Εποχή σποράς: άνοιξη
- Σπόρος σποράς: 2,5 kg/στρ.
- Κατάλληλο για θερμοκήπια και για υπαίθριους αγρούς



ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

► ΗΛΙΑΝΘΟΣ (HELIANTHUS)

GIRAL

- Πρώιμος βιολογικός κύκλος
- Υψηλή ανθεκτικότητα στον περονόσπορο και τη σκληρωτίνη



SPRINGBOKS

- Μεσοπρώιμος βιολογικός κύκλος
- Καλή αντοχή στην ξηρασία
- Υψηλή ανθεκτικότητα στον Περονόσπορο και το Ωίδιο



► ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ZEA MAYS)

KALMUS

- Υβρίδιο μέσου βιολογικού κύκλου (δείκτης FAO 600)
- Παραγωγική ποικιλία
- Σταθερό υβρίδιο
- Προσαρμογή σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών
- Κατάλληλο για ενσίρωση και καρπό





ΑΓΡΟΣΙΤΟΣ Α.Ε.
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ • ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

2ο χλμ. Ν.Μουδανιών - Σιθωνίας, 63200, Χαλκιδική
Τηλ: +30 2373025804 • Κιν: +30 6947895914
e-mail: vasilios.tapalis@agrositos.gr

www.agrositos.gr