

HEPATITIS D

La infección por el virus de la hepatitis Delta (VHD) puede ocurrir de dos formas, la primera es causada por la coinfección del virus de la hepatitis B (VHB) y el VHD que puede producir una hepatitis aguda mas severa con una tasa de mortalidad mas elevada que la que se presenta en una mono infección B, pero raramente evoluciona a una hepatitis crónica.

La segunda forma de presentación es la superinfección del VHD en un portador del VHB. Puede manifestarse como una severa hepatitis aguda en un portador previamente asintomático ó como una exacerbación de una hepatitis crónica B. Esta situación de superinfección con el VHD en portadores crónicos de VHB casi siempre evoluciona a una infección crónica con la presencia de ambos virus. Una alta proporción de personas con la infección crónica por VHB y VHD desarrollan cirrosis, descompensación hepática y hepatocarcinoma comparados con aquellos pacientes con hepatitis B crónica mono infectados.

Caso con resultado Reactivo para HBsAg y antiHBc

Estudiar IgM antiHBc

Reactivo:

Reactivo o NO reactivo:

NO Reactivo:

+

anti VHD REACTIVO

Notificar un nuevo estudio con la interpretación **COINFECCIÓN VHB + VHD**

+

anti VHD NO REACTIVO

Notificar un nuevo estudio con la interpretación **CASO DESCARTADO DE INFECCIÓN por VHD**

+

anti VHD REACTIVO

Notificar un nuevo estudio con la interpretación **SUPERINFECCIÓN por VHB + VHD**

*Esto no invalida la interpretación de caso Confirmado de VHB ya consignado en el evento correspondiente