



Uveítis posterior

¿Qué es la uveítis?

La uveítis ocurre cuando la capa intermedia del globo ocular se inflama (se enrojece y se hincha). En esta capa, llamada la uvea, hay muchos vasos sanguíneos que nutren al ojo. La uvea tiene tres capas. La uveítis posterior afecta a la capa trasera de la uvea, que es la que está más cerca de la retina. La uveítis posterior puede dañar la retina y los vasos sanguíneos de la parte posterior del ojo y conducir a la pérdida de visión. Esto puede provocar la pérdida de visión.

¿Cuáles son los síntomas de la uveítis posterior?


Los siguientes son algunos de los síntomas:

- enrojecimiento de los ojos
- aparición repentina de "moscas volantes" (manchas o nubes que se mueven en el campo visual)
- visión borrosa
- dolor en el ojo

Los síntomas se pueden manifestar de forma gradual y pueden durar muchos años. Comuníquese con su oftalmólogo de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

¿Qué causa la uveítis posterior?

Esta es más propenso a padecer uveítis posterior si tiene o alguna vez ha tenido las siguientes enfermedades:



- herpes zóster y otros virus del herpes
- VIH/SIDA
- una enfermedad inflamatoria sistémica, como sarcoidosis, síndrome de Behçet, síndrome de intestino irritable (SII) o lupus
- infecciones bacterianas, como enfermedad por arañazo de gato, enfermedad de Lyme o tuberculosis
- enfermedades parasitarias (como la toxoplasmosis)
- infecciones micóticas
- linfoma, un tipo de cáncer que afecta los ganglios linfáticos. Esta enfermedad puede imitar a la uveítis.

Fumar (cigarrillos, cigarros o pipas) también aumenta el riesgo de padecer uveítis posterior. En algunos casos de uveítis posterior, no se logra determinar la causa.

/ Como se diagnostica la uveitis posterior?

El oftalmólogo le examinara el interior del ojo. Como la uveitis posterior a menudo se relaciona con otras enfermedades o afecciones, puede que sea necesario hacerle algunas pruebas. Estas pueden incluir: un examen físico, análisis de sangre o pruebas cutáneas y una evaluación del líquido de los ojos. Pueden realizarle estudios de imagen, como radiografías, tomografías computarizadas, resonancias, angiografías con fluoresceína o tomografías de coherencia óptica (TCO). Es posible que el oftalmólogo le pregunte sobre otras enfermedades o problemas de salud que haya tenido.

/ Como se trata la uveitis posterior?

La uveitis posterior debe tratarse de inmediato para evitar problemas crónicos. Los oftalmólogos a menudo tratan la uveitis intermedia con medicamentos (corticosteroides) que reducen el dolor y la inflamación. Este medicamento puede administrarse por inyección o por vía oral. En algunos casos, se coloca un pequeño implante de esteroides en el ojo. Este dispositivo libera lentamente medicamento para disminuir la inflamación. Pueden recomendarse otros fármacos para suprimir el sistema inmunitario.

Cuando la uveitis posterior es causada por una infección, se puede administrar un antibiótico para combatir la infección.

Con frecuencia, su oftalmólogo trabajara con un médico especialista llamado reumatólogo para que lo ayude con el tratamiento.

Resumen

A la inflamación de la uvea cercana a la parte trasera del ojo se la denomina uveitis posterior. Es más probable que padezca uveitis posterior si ha tenido determinadas enfermedades o virus. Los síntomas pueden ser enrojecimiento del ojo, dolor y moscas volantes. Es una afección grave que debe tratarse de inmediato para no perder la visión. El tratamiento suele consistir en inyecciones, medicamentos orales o implantes de esteroides para disminuir la inflamación y el dolor.

Si tiene preguntas o inquietudes acerca de los ojos o de su visión, consulte a su oftalmólogo. Su oftalmólogo está comprometido con la protección de su vista.

Infórmese más sobre la salud ocular en OjosSanos-una publicación de la Academia Americana de Oftalmología-en aao.org/salud-ocular.

CORTESIA DE: