

## Enfermedades de transmisión sexual



**Antonio Rodríguez Pichardo**  
Coordinador del Grupo ETS-Sida. Academia Española de Dermatología. Jefe de sección. Departamento de Dermatología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

**Balanopostitis:** inflamación del glande y la superficie interna de prepucio.

**Campo oscuro:** microscopio con el que se visualiza *Treponema pallidum*.

**Cervicitis:** inflamación de la mucosa del cuello del útero.

**Chancro:** úlcera primaria relacionada con las enfermedades venéreas y localizada habitualmente en la región genital.

**Chancro blando:** úlcera genital producida por *Haemophilus ducreyi*. También conocido como chancroide.

**Chancro duro:** úlcera característica de la sífilis primaria.

**Clavos sifilíticos:** lesiones papulosas palmoplantares características de la sífilis secundaria.

**Collar de Venus:** lesiones papulosas de la sífilis secundaria, cuando se localizan en la base del cuello.

**Collarete de Bielt:** collarete descamativo que rodea las lesiones papulosas palmoplantares (clavos sifilíticos).

**Condiloma acuminado:** lesión exofítica producida por la infección por papilomavirus humano.

**Condilomas planos:** lesiones papulosas de sífilis secundaria localizadas en zonas intertriginosas.

**Corona de Venus o venérea:** lesiones papulosas en la zona de implantación del cabello, características de sífilis secundaria.

**Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI):** infección ascendente debida a la infección cervical por agentes infecciosos de transmisión sexual.

**Epididimitis:** inflamación del epidídimo. Complicación de la uretritis.

**Gonococia:** infección producida por *Neisseria gonorrhoeae* que puede localizarse en uretra, recto, cérvix y faringe.

**Inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero (FTA ABS):** prueba de detección de anticuerpos frente a *T. pallidum*.

**Leucorrea:** exceso de secreción vaginal, habitualmente blancuzca.

**Lues:** aunque significa epidemia, se utiliza para referirse a la sífilis.

**Parálisis general progresiva:** cuadro de meningoencefalitis difusa crónica con fenómenos atróficos y degenerativos de la corteza cerebral, en relación con la sífilis tardía.

**Pseudoparálisis de Parrot:** osteocondritis de los huesos largos en la sífilis congénita.

**Reagina plasmática rápida (RPR):** prueba reagínica para la detección y el seguimiento evolutivo de la sífilis.

**Reagínicas, pruebas:** pruebas analíticas que detectan anticuerpos inespecíficos (reaginas).

**Roseola:** erupción maculosa y eritematosa, al comienzo del período secundario y habitualmente poco expresiva clínicamente.

**Sifíldes:** erupción cutánea característica del período secundario de la sífilis.

**Sífilis:** infección producida por *Treponema pallidum*.

**Tabes dorsal:** sífilis de la médula espinal, inflamación de las raíces dorsales medulares causada por *T. pallidum*.

**Tinción de Gram:** usada para el diagnóstico de la uretritis.

**TPHA:** prueba de microhemaglutinación para *T. pallidum*.

**Uretritis no gonocócica (UNG):** uretritis en la que no se aísla *N. gonorrhoeae*.

**Uretritis:** inflamación uretral caracterizada por disuria y exudación.

**Vaginitis:** inflamación de las paredes vaginales, habitualmente producida por candidas o tricomonas.

**Vaginosis bacteriana:** alteración de la mucosa vaginal que cursa con inflamación de la misma.

**VDRL (*venereal disease research laboratory*):** prueba reagínica de detección de anticuerpos frente a *T. pallidum*.