



## BETÄUBUNG/TÖTUNG VON GEFLÜGEL AUF DEM HOF

Geflügel, das nicht mehr transportiert werden kann, muss auf dem Hof getötet werden. Sie müssen eventuell auch aus anderen Gründen getötet werden, beispielsweise wegen Krankheit, langsamem Wachstum oder um das Fleisch direkt an Konsumenten/Einzelhändler zu liefern. In allen Fällen ist eine vorherige Betäubung obligatorisch. Betäuben und **töten Sie die Tiere frühest möglich**, damit der Tod schmerzlos eintritt. Diese Informationen setzen keine **nationalen Richtlinien außer Kraft**, die derartige Praktiken verbieten oder einschränken.


**Das Betäuben und Töten muss von Arbeitern durchgeführt werden, die über entsprechende Kompetenzen verfügen.**

### ÜBER GEFLÜGEL

- Bei Geflügel handelt es sich um soziale Tiere, die aber schnell panisch reagieren können
- **Mögen:** gut beleuchtete Bereiche
- **Mögen nicht:** direktes Sonnenlicht, Luftzug

### DENKEN SIE DARAN

- Verletzte Vögel können sich möglicherweise nur unter Schmerzen bewegen. Betäuben und töten Sie diese, wo sie sich gerade befinden **und so schnell wie möglich**



## BETÄUBEN/TÖTEN

Sobald Sie das Geflügel ruhiggestellt haben, können Sie die folgenden Verfahren in Betracht ziehen:

### 1. ELEKTRISCHE BETÄUBUNG NUR AM KOPF


Da der Vogel bei diesem Verfahren möglicherweise nicht getötet wird, müssen Sie ihn innerhalb von 15 Sekunden entbluten.

#### Positionieren Sie die Elektroden

Elektroden werden um den Kopf des Vogels herum positioniert, **zwischen dem Auge und dem Ohr**

#### Prüfen Sie die Einstellungen

- Strom: Hühner 240 mA; Truthähne 400 mA oder mehr
- Spannung: mehr als 110 V
- Dauer: mindestens 7 Sekunden



## 2. DURCHDRINGENDER/DURCHDRINGUNGSFREIER SCHLACHTSCHUSSAPPARAT


Beim durchdringenden Schlachtschussapparat wird ein Bolzen durch den Schädel ins Gehirn geschossen. Beim durchdringungsfreien Schlachtschussapparat wird die Stirn getroffen, ohne den Schädel zu durchdringen.

### Positionieren Sie den Bolzen

- Platzieren Sie den Bolzen auf der Oberseite des Kopfes, mit Zielrichtung nach unten

### Überprüfen Sie die Parameter

- Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass Bolzen, Ladung und Druck angemessen sind
- Durchdringungsfrei: flacher Kopf bei Hühnern; konvexer Kopf bei Enten, Gänsen und Truthähnen
- Töten Sie durch Entbluten innerhalb von 1 Minute



## 3. AUSRENKEN DES HALSES

Durch Ausrenken (oder Überdehnen) des Halses wird die Wirbelsäule vom Kopf getrennt. Sie können am Tag nicht mehr als 70 Vögel auf diese Weise töten.

### Stellen Sie den Vogel ruhig und positionieren Sie ihn

- Verwenden Sie eine Hand, um den Vogel anzuheben und an den Beinen festzuhalten
- Umfassen Sie mit den Fingern der anderen Hand den Hals des Vogels von hinten
- In einer kontinuierlichen Bewegung:
  - Drehen Sie beide Hände schnell und fest in unterschiedliche Richtungen
  - Ziehen Sie den Kopf mit einer scharfen Bewegung nach hinten



## 4. VERSETZEN EINES STUMPFEN SCHLAGS AUF DEN KOPF


Sie können am Tag nicht mehr als 70 Vögel auf diese Weise töten.

### Stellen Sie den Vogel ruhig und positionieren Sie ihn

- Halten Sie den Vogel an seinen Beinen
- Legen Sie den Kopf auf eine harte Fläche
- Schlagen Sie auf die Rückseite des Vogelkopfes mit einem schweren und einfach zu handhabenden Objekt

### Prüfen Sie auf Bewusstsein

Nach Verwenden des Schlachtschussapparats, des Schlags auf den Kopf oder des Ausrenkens, prüfen Sie auf:



## NACH DEM BETÄUBEN

### Wenn der Vogel noch bei Bewusstsein ist:

- Lassen Sie ihn nicht ausbluten
- Betäuben Sie ihn erneut mit der Back-up-Methode
- Stellen Sie fest, was falsch lief
- Korrigieren Sie etwaige Probleme, bevor Sie mit dem Betäuben fortfahren

### Um den Tod des Vogels festzustellen, prüfen Sie:

- Keine spontanen Bewegungen
- Schlaffer Körper/Flügel
- Keine Atmung
- Blutung gestoppt