

# ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE OCCIDENTALIS.

---

---

**A Systematic Census of the Plants  
occurring in Western Australia.**

---

---

**CHARLES A. GARDNER,**  
**Government Botanist.**

MCMXXX.

## PREFACE.

Western Australia is to-day the only State of the Australian Commonwealth which does not possess a text book dealing with its own flora. The official standard work is still Bentham's "*Flora Australiensis*," published between 1863 and 1878. All subsequent work dealing with the plants of the country has been published either in small papers printed by various societies within Australia, or included in monographs published abroad. For many years past there has been an increasing demand for a Flora of Western Australia, or failing this a list of the species which have been described with references to the publications in which they may be found. Although Bentham's "*Flora Australiensis*" deals with about seventy-five per cent. of our indigenous species, the additions are important as representing in many cases common inland plants, and in addition the nomenclature has been much altered with the advancement of our knowledge, not to mention the changes which have been necessitated by the International Rules governing Nomenclature, so that Bentham's Flora, from the point of view of nomenclature, is now obsolete.

With the exception of a list of plants prepared by Dr. A. Morrison for the Western Australian Year Book for 1901, no sequential list of the plants indigenous to this State has hitherto been published, and it is hoped that this Census may supply a long felt want.

The arrangement of the families and genera in this work is taken from Engler's Classification as given in *Die Natürlichen Pflanzenfamilien*, the only exception being the division of the family *Leguminosae* into the three families as suggested by J. Hutchinson in his "Families of Flowering Plants" (1926). The Rules governing nomenclature have been faithfully observed, and in consequence many well-known species are given new names. The want of a good reference library has made portions of the work extremely difficult, and for the older species, specially those of Linnæus, I have been compelled to quote from more recent works concerning the name and date of the species in question.

The introduced naturalised flora has been dealt with, all the recorded species being included. These are given in italics, and instead of the name and date of the publication in which they were described, I have given the country of origin as shown in the "Index Kewensis."

It was originally intended to include geographical references, and also references to the "*Flora Australiensis*," but it was found that this would either necessitate making this work inconvenient in size, or interfering with its compactness, and thus no references to Bentham's work are given, but wherever the name of a species differs from that given in the "*Flora Australiensis*," the synonym as quoted in Bentham's work is given in italics following the original reference.

To Mr. H. G. Elliott, Assistant Plant Pathologist of the Department of Agriculture, I am indebted for assistance in tracing references, and to Mr. G. R. Meadly for assistance in making the Index, and correcting proofs.

CHARLES A. GARDNER.

State Herbarium,  
Department of Agriculture,  
Perth, W.A.

## SYSTEMA FAMILIARUM.

*Secundum Engler.*

## EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA.

## PTERIDOPHYTA.

## I. FILICALES.

- a. Leptosporangiatae.
  - i. *Eufilicinae*.
    - 1. Polypodiaceae.
    - 2. Parkeriaceae.
    - 3. Gleicheniaceae.
    - 4. Schizaeaceae.
  - ii. *Hydropteridineae*.
    - 5. Salviniaceae.
    - 6. Marsileaceae.
- b. Ophioglossales.
  - 7. Ophioglossaceae.

## II. LYCOPODIALES.

- a. Eligulatae.
  - 1. Lycopodiaceae.
- b. Ligulatae.
  - 2. Selaginellaceae.

## III. PSILOTALES.

- 1. Psilotaceae.

## IV. ISOETALES.

- 1. Isoetaceae.

## EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA.

## GYMNOSPERMAE.

- a. Cycadales.
  - 1. Cycadaceae.

- b. Coniferae.
  - 1. Podocarpaceae.
  - 2. Cupressaceae.

## ANGIOSPERMAE.

## I. MONOCOTYLEDONEAE.

- a. Pandanales.
  - 1. Typhaceae.
  - 2. Pandanaceae.
- b. Heliobiae.
  - 1. Potamogetonaceae.
  - 2. Naiadaceae.
  - 3. Aponogetonaceae.
  - 4. Scheuchzeriaceae.
  - 5. Alismaceae.
  - 6. Hydrocharitaceae.
- c. Glumiflorae.
  - 1. Gramineae.
  - 2. Cyperaceae.
- d. Principes.
  - 1. Palmae.
- e. Spathiflorae.
  - 1. Araceae.
  - 2. Lemnaceae.
- f. Farinosae.
  - 1. Flagellariaceae.
  - 2. Restionaceae.
  - 3. Centrolepidaceae.
  - 4. Xyridaceae.
  - 5. Eriocaulaceae.
  - 6. Commelinaceae.
  - 7. Pontederiaceae.
  - 8. Philodraceae.
- g. Liliiflorae.
  - 1. Juncaceae.
  - 2. Liliaceae.
  - 3. Haemodoraceae.
  - 4. Amaryllidaceae.
  - 5. Taccaceae.
  - 6. Dioscoreaceae.
  - 7. Iridaceae.
- h. Microspermae.
  - 1. Burmanniaceae.
  - 2. Orchidaceae.

## II. DICOTYLEDONEAE.

- A. Archichlamydeae.
  - a. Verticillatae.
    - 1. Casuarinaceae.
  - b. Urticales.
    - 1. Ulmaceae.
    - 2. Moraceae.
    - 3. Urticaceae.
  - c. Proteales.
    - 1. Proteaceae.
  - d. Santalales.
    - 1. Santalaceae.
    - 2. Opiliaceae.
    - 3. Olacaceae.
    - 4. Loranthaceae.
  - e. Polygonales.
    - 1. Polygonaceae.
  - f. Centrospermae.
    - 1. Chenopodiaceae.
    - 2. Amarantaceae.
    - 3. Nyctaginaceae.
    - 4. Phytolaccaceae.
    - 5. Aizoaceae.
    - 6. Portulacaceae.
    - 7. Caryophyllaceae.
  - g. Ranales.
    - 1. Nymphaeaceae.
    - 2. Ranunculaceae.
    - 3. Menispermaceae.
    - 4. Myristicaceae.
    - 5. Lauraceae.
    - 6. Hernandiaceae.
  - h. Rhoadales.
    - 1. Papaveraceae.
    - 2. Fumariaceae.
    - 3. Capparidaceae.
    - 4. Cruciferae.
    - 5. Resedaceae.
  - i. Sarraceniales.
    - 1. Droseraceae.

## k. Rosales.

1. Crassulaceae.
2. Cephalotaceae.
3. Saxifragaceae.
4. Pittosporaceae.
5. Byblidaceae.
6. Cunoniaceae.
7. Rosaceae.

## l. Leguminales.

1. Mimosaceae.
2. Caesalpiniaceae.
3. Papilionaceae.

## m. Geraniales.

1. Geraniaceae.
2. Oxalidaceae.
3. Linaceae.
4. Zygophyllaceae.
5. Rutaceae.
6. Burseraceae.
7. Meliaceae.
8. Tremandraceae.
9. Polygalaceae.
10. Euphorbiaceae.
11. Callitrichaceae.

## n. Sapindales.

1. Anacardiaceae.
2. Celastraceae.
3. Stackhousiaceae.
4. Sapindaceae.

## o. Rhamnales.

1. Rhamnaceae.
2. Vitaceae.

## p. Malvales.

1. Tillaceae.
2. Malvaceae.
3. Bombacaceae.
4. Sterculiaceae.

## q. Parietales.

1. Dilleniaceae.
2. Guttiferae.
3. Elatinaceae.
4. Frankeniaceae.
5. Cochlospermaceae.
6. Violaceae.
7. Passifloraceae.

## r. Myrtiflorae.

1. Thymelaeaceae.
2. Lythraceae.
3. Sonneratiaceae.
4. Lecvthidaceae.
5. Rhizophoraceae.
6. Combretaceae.

## 7. Myrtaceae.

8. Melastomaceae.
9. Onagraceae.
10. Halorrhagaceae.

## s. Umbelliflorae.

1. Araliaceae.
2. Umbelliferae.

B. *Sympetalae*.

## a. Ericales.

1. Epacridaceae.

## b. Primulales.

1. Myrsinaceae.
2. Primulaceae.

## c. Plumbaginales.

1. Plumbaginaceae.

## d. Ebenales.

1. Sapotaceae.
2. Ebenaceae.

## e. Contortae.

1. Oleaceae.
2. Loganiaceae.
3. Gentianaceae.
4. Apocynaceae.
5. Asclepiadaceae.

## f. Tubiflorae.

1. Convolvulaceae.
2. Hydrophyllaceae.
3. Boraginaceae.
4. Verbenaceae.
5. Labiatae.
6. Solanaceae.
7. Scrophulariaceae.
8. Bignoniaceae.
9. Pedaliaceae.
10. Orobanchaceae.
11. Lentibulariaceae.
12. Acanthaceae.
13. Myoporaceae.

## g. Plantaginales.

1. Plantaginaceae.

## h. Rubiales.

1. Rubiaceae.

## i. Cucurbitales.

1. Cucurbitaceae.

## k. Campanulatae.

1. Campanulaceae.
2. Lobeliaceae.
3. Goodeniaceae.
4. Brunoniaceae.
5. Stylidiaceae.
6. Compositae.

---

---

**ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE OCCIDENTALIS.**

**Auctore.**

**C. A. GARDNER.**

---

---

## PTERIDOPHYTA.

## FILICALES.

## Polypodiaceae.

1. *DRYOPTERIS*, Adans, Fam. des. Pl. ii. 20 (1763).  
D. gongyloides, (Schkuhr.) O. Kuntze Rev. Gen. ii. 81, 811 (1891) (*Aspidium unitum*, Swartz.)
2. *NEPHROLEPIS*, Schott, Jen. fil. t. 3 (1834).  
N. exaltata, (Linn.) Schott. Jen. fil. t. 3 (1834).
3. *MICROLEPIA*,  
M. speluncae, (Linn.) Moore, Ind. xciii. (1857) (*Davallia speluncae*, (L) Bak.)
4. *SCHIZOLOMA*, Gaud.  
S. ensifolium, J. Sm. Journ. of Bot. iii. 414 (1841) (*Lindsaya ensifolia*, Sw.)
5. *LINDSAYA*, (Dryand) J. Sm. Mem. Acad. Turin. v. 413 (1793).  
L. linearis, Swartz. Schrad. Journ. 1800 78 (1801).
6. *ASPLENIUM*, Linn. Gen. Pl. 783 (1737).  
A. flabellifolium Cav. Descr. 257 (1802).  
A. praemorsum, Swartz. Prodr. 130 (1788). (*A. furcatum*, Thunb.)  
A. bulbiferum, Forst. Prodr. 80 (1786).
7. *PLEUROSORUS*, Fee. Gen. Fil. 179 (1850-52).  
P. rutifolius, (R.Br.) Fee. Gen. Fil. 180 (1852) (*Grammitis rutaefolia* R.Br.)
8. *BLECHNUM*, Linn. Sp. Pl. ii. 1077 (1753).  
B. orientale, Linn. Sp. ed. ii. 1535 (1763).
9. *STENOCHLAENA*, J. Sm. Journ. of Bot. iii. 401 (1841).  
S. palustris, (Burm.) Bedd. Fern. Br. Ind. suppl. 26 (1876). (*Acrostichum scandens*, Hook.)
10. *GYMNOPTERIS*, Bernh.  
G. Reynoldsii, (F. v. M.) C. Christens, Ind. Fil. 341 (1906) (*Annogramma Reynoldsii*, F. v. M.)
11. *PITYROGRAMMA*, (Link.) Domin de la Fact. Sci. l'Univ. Charles, Prague. 88.3 (1928).  
P. leptophylla, (Linn.) Domin de la Fac. Sci. Univ. Charles, Prague. 88.9 (1928).
12. *CHEILANTHES*, Swartz. Syn. Fil. 5 126 (1806).  
C. Brownii, (Desv.) Domin Biblio Bot. 85 133 (1913).  
C. distans, (R.Br.) Mett. Cheil. 25 n. 19 (1859).  
C. tenuifolia, (Burm.) Swartz. Syn. Fil. 129. 332 (1806).
13. *ADIANTUM*, Linn. Gen. Pl. 782 (1737).  
A. lunulatum, Burm. Fl. Ind. 235 (1768).  
A. aethiopicum, Linn. Syst. Nat. ed. x. ii. 1329 (1759).
14. *PTERIS*, Linn. Hort. Cliff. 443 (1737).  
P. longifolia, Linn. Sp. Pl. ii. 1074 (1753).
15. *PTERIDIUM*, Gled. Scop. Fl. Carn. 169 (1760).  
P. aquilinum, (Linn.) Kuhn. v. Deck. Reisen. iii. 3; bot. 11 (1879). (*Pteris aquilina*).
16. *POLYPODIUM*, Linn. Gen. Pl. 784 (1753).  
P. phymatodes, Linn. Mant. 306 (1771).
17. *ACROSTICHUM*, Linn. Gen. Pl. 785 (1753).  
A. aureum, Linn. Sp. Pl. ii. 1069 (1753).

**Parkeriaceae.**

1. *CERATOPTERIS*, Brong. in Bull. Soc. Phil. 186 (1821).  
C. thalictroides, Brongn. in Bull. Soc. Phil. 186 (1821).

**Gleicheniaceae.**

1. *GLEICHENIA*, J. Sm. in Mem. Acad. Turin. v. 419 (1793).  
G. linearis, (Burm.) Clarke in Trans. Linn. Soc. ii. bot. i. 428 (1880) (*G. dichotoma*, Hook).  
G. microphylla, (R.Br.) Christ, Frankr. d. Erd. 339 (1897) (*Platysona microphylla*, R.Br.)

**Schizaeaceae.**

1. *SCHIZAEA*, J. Sm. in Mem. Acad. Turin v. 419 (1793).  
S. fistulosa, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 103 (1906).
2. *LYGODIUM*, Swartz, Schrad. Journ. 1800. 106 (1801).  
L. scandens, (Linn.) Swartz, in Schrad. Journ. 1800, 106 (1801).

**Salviniaceae.**

1. *AZOLLA*, Lam. Encycl. Meth. i. 343 (1783).  
A. filiculoides, Lam. Encyc. Meth. i. 343, var. rubra, Diels.

**Marsileaceae.**

1. *MARSILEA*, Linn. Gen. Pl. 799 (1753).  
M. Brownii, A. Braun, Monatsbr. Acad. Berol. 418 (1863) (*M. quadrifolia*, Benth.)  
M. angustifolia, R.Br. Prodr. 167 (1810).  
M. hirsuta, R.Br. l. c. 167.  
M. Drummondii, A. Braun, in Linnaea xxv. 721 (1852).
2. *PILULARIA*, Linn. Sp. Pl. ii. 1100 (1753).  
P. Novae-Hollandiae, A. Br. Monatsber. Akad. Berol. 435 (1863) (*P. globifera*, Benth.).

**OPHIOGLOSSALES.****Ophioglossaceae.**

1. *OPHIOGLOSSUM*, Linn. Gen. Pl. 503 (1753).  
O. coriaceum, A. Cunn. in Hook Comp. Bot. Mag. ii. 361 (1836) (*O. vulgatum*, Benth.).

**LYCOPODIALES.****Lycopodiaceae.**

1. *PHYLLOGLOSSUM*, Kunze in Mohl et Schlecht. Bot. Zeit. 721 (1843).  
P. Drummondii, Kunze in Mohl et Schlecht. Bot. Zeit. 721 (1843).
2. *LYCOPodium*, (Rupp.) Linn. Gen. Pl. 503 (1753).  
L. Drummondii, Spring. Monogr. Lycop. ii. 35 (1849).  
L. cernuum, Linn. Sp. Pl. ed. 2. ii. 1566 (1763).

**Psilotaceae.**

1. *PSILOTUM*, Swartz, in Schrad. Journ. in ii. 109 (1800).  
P. nudum (Linn.) Griseb. in Veget. d. Karaiheu 130 (1857) (*P. triquetrum*, Sw.).

**Selaginellaceae.**

1. *SELAGINELLA*, Beauv. Prodr. des. Fam. de L'Aeth. 101 (1805).  
S. Preissiana, Spring. Monogr. Lycop. ii. 61 (1849).  
S. uliginosa, Spring. l. c. 60.  
S. proniflora, (Lam.) Baker in Journ. Bot. xiv. 156 (1885). (*S. Belangeri* Spring.).

**Isoetaceae.**

1. *ISOETES*, Linn. Skanska Resa 420 (1751).  
I. Drummondii, A.Br. in Berol. Monatsber 593 (1863).

**GYMNOSPERMAE.****CYCADALES.****Cycadaceae.**

1. *CYCAS*, Linn. Hort. Cliff. 482 (1737).  
C. Lane-Poolii, Gardner in Bull. For. Dept. xxxii. 30 (1923).  
C. furfuracea, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 108 (1918).  
C. angulata, R.Br. Prodr. 348 (1810) (*C. media*, Benth.).  
C. basaltica, Gardner in Bull. For. Dept. xxxii. 31 (1923).
2. *MACROZAMIA*, Miq. Monogr. Cycad. 36 (1841).  
M. Reidlei (Gaud.) Gardner. comb. nov. (*M. Fraseri*, Miq.)  
M. Dyeri, (F.v.M.) Gardner. comb. nov. (*Encephalartos Dyeri*, F.v.M.)

## CONIFERAE.

## Podocarpaceae.

1. *PODOCARPUS*, L' Herit. Pers. Syn. Pl. ii. 580 (1807).  
P. Drouyniana, F. v. M. Fragm. iv. 86. t. 31 (1864).

## Cupressaceae.

1. *ACTINOSTROBUS*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 644 (1845).  
A. pyramidalis, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 644 (1845).  
A. acuminatus, Parlat. Ind. Sem. Hort. Florent. 25 (1862).
2. *CALLITRIS*, Vent. Decas Gen. Nov. 10 (1808). (*Frenela*, Mirb. p. p.).  
C. Roei, (Endl.) F. v. M. Census 109 (1882).  
C. Drummondii, (Parlat.) F. v. M. Census 109 (1882).  
C. Morrisoni, R. T. Baker in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxxi. 717 (1907).  
C. robusta, (R.Br.) Mirb. in Mem. Mus. Par. xiii. 74 (1825).  
C. verrucosa, (R.Br.) Mirb. l. c. 74.  
C. glauca, (R.Br.) Mirb. l. c. 74.  
C. intratropica. (F. v. M.) R. T. Baker, Pines of Australia, 172 (1910).

## ANGIOSPERMAE.

## MONOCOTYLEDONEAE.

## PANDANALES.

## Typhaceae.

1. *TYPHA* (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).  
T. angustifolia, Linn. Sp. Pl. 971 (1735).

## Pandanaaceae.

1. *PANDANUS*, (Rumph.) Linn. fl. Suppl. 64 (1781).  
P. odoratissimus, Linn. fl. Suppl. 424 (1781).  
P. aquaticus, F. v. M. Fragm. v. 40 (1856).

## HELIOBIAE.

## Potamogetonaceae.

1. *POSIDONIA*, Koenig. Ann. of Bot. ii. 95 (1805).  
P. australis, Hook. fl. Fl. Tasm. ii. 43 (1860).
2. *POTAMOGETON*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).  
P. tricarınatus, F. v. M. et A. Benn. in Brit. Journ. Bot. xxx. 229 (1892)  
(*P. natans*, Bth.).  
P. javonicus, Hassk. in Verh. Natur. K. Ver. Nedrl. Ind. i. 26 (1856).  
P. Drummondii, Benth. Fl. Austr. vii. 171 (1878).  
P. orchreatus, Raoul Ann. Soc. Nat. Ser. iii. 117 (1844). (*P. obtusifolius*,  
Mert.).  
P. pectinatus, Linn. Sp. Pl. 127 (1753).
3. *RUPPIA*, Linn. Syst. Nat. 9 (1735).  
R. maritima, Linn. Sp. Pl. 127 (1753).
4. *CYMODOCCEA*, Koenig. in Kon. & Sims Ann. Bot. ii. (1806).  
C. angustata, Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. no. 6, 19 (1916).  
C. isoetifolia, Aschers, Sitzber, Geo. Nat. Freunde Berlin 3 (1867).  
C. antarctica, (Labill.) Endl. Gen. Pl. 230 (1836).
5. *DIPLANTHERA*, Thou. Gen. Nov. Madag. 3 (1806).  
D. uninervis, (Forsk.) Aschers in Engl. et Prant. Naturpflanz. 37 (1897).
6. *ALTHENIA*, Petit. in Ann. Soc. Obs. i. (1829). (*Lepilaena*, J. Drumm.)  
A. australis, (Drum.) Aschers. in Engl. et Prantl. Natpflanz. ii. 1. (1887).  
A. Preissii, (Lehm.) Aschers et Graebn. in Engler's Pflanzenreich, Potamog.  
160 (1907).

## Naiadaceae.

1. *NAIAS*, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1015 (1753).  
N. marina, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1015 (1753) (*N. major*, All.).  
N. tenuifolia, R.Br. Prodr. 345 (1810).

## Aponogetonaceae.

1. *APONOGETON*, Linn. fl. Suppl. Pl. 32 (1781).  
A. elongatus, (F. v. M.) Benth. Fl. Austr. vii. 188 (1878).

## Scheuchzeriaceae.

1. *TRIGLOCHIN*, (Riv.) Linn. Syst. ed. i. (1735).  
T. striata, Ruiz et Pav. Fl. Peruv. iii. 72 (1802).  
T. mucronata, R.Br. Prodr. 343 (1810).  
T. calcitrapa, Hook. Ic. Pl. viii. t. 731 (1845).



- T. Stowardi, N. E. Brown in Kew Bull. Misc. 189 (1914).  
 T. turrifera, Ewart in Vict. Nat. xxiii. 43 (1906).  
 T. centrocarpa, Hook. Leon. Pl. viii. t. 728 (1845).  
 T. minutissima, F. v. M. Fragm. vi. 82 (1867).  
 T. trichophora, Nees et Essenbach in Lehm. Pl. Preiss. ii. 54 (1846).  
 T. Muelleri, Buchenau in Engl. Pflanzenreich iv. 15, 12 (1903).  
 T. procera, R.Br. Prodr. 343 (1810).  
 T. pterocarpa, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 110 (1918).

#### Alismaceae.

1. *ALISMA*, Linn. Gen. ed. I. 108 (1737).  
*A. oligocoeum*, F. v. M. Fragm. i. 23 (1858).
2. *DAMASONIUM*, Mill. Gard. Diet. ed. vi. (1752).  
*D. minor*, (R.Br.) Buchenau, Ind. Crit. in Abh. Nat. Ver. Brem, ii. 20, 39 (1868). (*D. australe*, Salisb.)

#### Hydrocharitaceae.

1. *OTTELLIA*, Pers. Syn. Plant. i. 400 (1805).  
*O. ovalifolia*, (R.Br.) L. C. Rich, in Mem. Inst. Fr. ii. 78 (1811).
2. *MAIDENIA*, (W. V. Fitzg.) Rendle, in Journ. Bot. liv. 313 (1916).  
*M. rubra*, (W. V. Fitzg.) Rendle, in Journ. Bot. liv. 313 (1916).
3. *VALLISNERIA*, (Mich.) Linn. Gen. ed. i. 300 (1737).  
*V. spiralis*, Linn. Sp. Pl. 1015 (1753).
4. *HALOPHILA*, Thou. Gen. Nov. Madag. n. 6 (1806).  
*H. ovalis*, (R.Br.) Hook. f. Fl. Tasm. ii. 45 (1860).  
*H. spinulosa*, (R.Br.) Aschers. in Nuemayer. Anleit. Wissan. Beob. 368 (1875).

#### GLUMIFLORAE.

##### Gramineae.

1. *CHIONACHNE*, R.Br. in Beauv. Pl. Jav. Rar. 15 (1838).  
*C. cyathopoda*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 516 (1878).
2. *DIMERIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 204 (1810).  
*D. ornithopoda*, Trin. Fund. Agrost. 167 (1820). (*D. tenera*, Trin.).
3. *IMPERATA*, Cyrillo, Pl. Rar. Ic. ii. 26. t. 11 (1792).  
*I. cylindrica*, (Linn.) Beauv. Agrost. 165 (1812) (*I. arundinacea*, Cyrillo).
4. *POLLINIA*, Trin. in Mem. Acad. Petersb. ser. vi. ii. 304 (1833).  
*P. fulva*, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vi. 526 (1878).
5. *ROTTBOELLIA*, Linn. fil. Nov. Gram. Gen. in Amoen Acad x. 22 (1779)  
p.p.  
*R. rottboellioides*, (R.Br.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles. 1916, 644 (1917). (*R. ophiuroides*, Benth.)  
*R. compressa*, Linn. f. Suppl. 114 (1781). (*Hemarthria compressa*, R.Br.)
6. *ISCHAEMUM*, Linn. Gen. ed. ii. 525 (1742).  
*I. nervosum* (Rottb.) Gardner n. comb. (*I. laxum*, R.Br.)
7. *ANDROPOGON*, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1045 (1753).  
*A. intermedius*, R.Br. Prodr. 202 (1810).  
*A. Ischaemum*, Linn. Sp. Pl. 1047 (1753).  
*A. sericeus*, R.Br. Prodr. 201 (1810).  
*A. affinis*, R.Br. Prodr. 201 (1810).  
*A. annulatus*, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 173 (1775).  
*A. procerus*, R.Br. Prodr. 202 (1810).  
*A. exaltatus*, R.Br. l. c. 202.  
*A. bombycinus*, R.Br. l. c. 202.  
*A. brevifolius*, Swartz. Fl. Ind. occ. i. 209 (1797) (*A. fragilis*, R.Br.).  
*A. axilis*, Hochst. in Flora xxvii. 241 (1844).  
*A. Gryllus*, Linn. Cent. Pl. ii. 33 (1759). (*Chrysopogon Gryllus*, Trin.)  
\**A. halepensis* (Linn.) Sibth. et. Sm. Reg. calid.  
*A. australis*, Spreng. Syst. i. 287 (1825). (*Holcus plumosus*, R.Br.)  
*A. stipoides*, (Ewart) Gardner n. comb. (*Sarga stipoides*, Ewart & White.)  
*A. intrans*, F.v.M. Cens. Austr. Pl. 132 (1882).
8. *HETEROPOGON*, Pers. Syn. Glum. ii. 533 (1807).  
*H. hirtus*, Pers. Syn. Glum. ii. 533 (1807). (*H. contortus*, Roem. et Schultz.)  
*H. insignis*, Thw. Enum. Pl. Ceyl. 437 (*Andropogon triticeus*, R.Br.).

9. *THEMEDA*, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 178 (1775). (*Anthistiria*, Linn. f.)  
*T. triandra*, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 178 (1775). (*A. imberbis*, Retz. & *A. ciliata*, Benth.)  
*T. avenacea*, (F.v.M.) Maiden et Betche, Cens. Pl. N.S.W. 15 (1916). (*A. avenacea*, F.v.M.)
10. *ISEILEMA*, Anderss. in Not. Act. Upsal. iii. 2. 250 (1856). (*Anthistiria*, Linn. f.)  
*I. membranacea*, (Lindl.) Anderss. in Nov. Act. Upsal. iii. 2. 250 (1856). (*A. membranacea*, Ldl.)
11. *TRAGUS*, Hall. Hist. Stirp. Helv. ii. 203 (1768). (*Lappago racemosa*, Willd.)  
*T. racemosus*, (Linn.) Hall. Hist. Stirp. Helv. ii. 203 (1768).
12. *NEURACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).  
*N. alopecuroides*, R.Br. Prodr. 196 (1810).  
*N. Muelleri*, Hack in Oest. Bot. Zeit. xlv. 329 (1895).  
*N. Mitchelliana*, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 410 (1843).  
*N. multieulmis*, R. Pilger in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 68 (1904).
13. *PEROTIS*, Ait. Hort. Kew ed. I. i. 85 (1789).  
*P. rara*, R.Br. Prodr. 172 (1810). (*P. latifolia*, Ait.)
14. *ARUNDINELLA*, Raddi. Agrost. Bras. 37. t. 1. (1823).  
*A. brasiliensis*, Raddi. Agrost. Bras. 37. t. i. Fig. 3 (1823). (*A. nepalensis*, Trin.)
15. *PASPALUM*, Linn. Syst. ed. x. 855 (1759).  
*P. scrobiculatum*, Linn. Mant. i. 29 (1767).  
*P. distichum*, Linn. Syst. Nat. ed. x. 855 (1759).
16. *ERIOCHLOA*, Humb. in H.B. et. K. Nov. Gen. et sp. i. 94. t. 30 & 31 (1815).  
*E. punctata*, (Linn.) Hamilt. Prodr. Pl. Ind. occ. 5 (?).
17. *ISACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).  
*I. australis*, R.Br. Prodr. 196 (1810).
18. *DIGITARIA*, Hall. Hist. Stirp. ii. 244 (1768). (*Panicum*, Benth. p.p.)  
*D. ctenantha*, (F.v.M.) Hughes, Kew Bull. Misc. 310 (1923). (*P. ctenanthum*, F.v.M.)  
*D. longiflora*, (Retz.) Pers. Syn. i. 85 (1805). (*Paspalum longiflorum*, Retz.)  
*D. marginata*, Link. Hort. Berol. i. 229 (1827). (*Panicum sanguinale*, Benth. p.p.)  
*D. sanguinalis* (Linn.) Seop. Fl. Carn. ed. ii. i. 52 (1772). (*P. sanguinalis*, Linn. p.p.)  
*D. Brownii*, (Roem et Schultz) Hughes, Kew Bull. Misc. 313 (1923). (*P. leucophleum*, Benth.)  
*D. ammophila*, (F.v.M.) Hughes, l. c. 313. (*P. divaricatissimum*, var.)  
*D. coenicola*, (F.v.M.) Hughes, l. c. 313. (*P. coenicolum*, F.v.M.)
19. *BRACHIARIA*, Griseb in Ledeb. Fl. Ross. iv. 469 (1853).  
*B. holsericea*, (R.Br.) Hughes, in Kew Bull. Misc. 315 (1923). (*P. holsericeum*, R.Br.)  
*B. piligera*, (F.v.M.) Hughes, l. c. 315.  
*B. distachya* (Linn.) A. Camus. Fl. Indo-China vii. 437 (1922). (*P. distachyum*, Linn.)
20. *PASPALIDIUM*, Stapf. in Prain. Fl. Trop. Afr. ix. 582 (1920).  
*P. jubiflorum*, (Trin.) Hughes, Kew Bull. Misc. 317 (1923). (*P. flavidum* & *P. gracile*, p.p.)  
*P. basi cladum*, Hughes, l. c. 318.  
*P. gracile*, (R.Br.) Hughes, l. c. 318. (*Panicum gracile*, R.Br.)
- ECHINOCHLOA*, Beauv. Agrost. 53. ii. f. 2 (1812).  
\**E. colona*, (Linn.) Link. Reg. calid. (*Panicum colonom*, Linn.)  
\**E. Crus-Galli*, (Linn.) Beauv. Reg. calid. (*P. Crus-Galli*, Linn.)
21. *PARACTAENUM*, Beauv. Agrost. 47. t. x. f. 6 (1812).  
*P. Novae-Hollandiae*, Beauv. Agrost. 47. t. x. f. 6 (1812). (*Panicum reversum*, F.v.M.)

22. *PANICUM*, Linn. Sp. Pl. 55 (1753).  
*P. cymbiforme*, Hughes, in Kew Bull. Misc. 323 (1923). (*P. antidotale*, Benth. p.p.)  
*P. capillipes*, Benth. Fl. Austr. vii. 484 (1878).  
*P. Queenslandicum*, Domin in Fedde. Repert. x. 59 (1911).  
*P. decompositum*, R.Br. Prodr. 191 (1810).  
*P. effusum*, R.Br. Prodr. 191 (1810).
23. *ICHNANTHUS*, Beauv. Agrost. 56. t. xii. f. 1 (1812).  
*I. australiensis*, (Domin) Hughes, Kew Bull. Misc. 329 (1923). (*P. australiense*, Domin.)  
*I. Muelleri*, Hughes, l. c. 329.
24. *SACCIROLEPIS*, Nash. in Britton. Man. Bot. 89 (1901).  
*S. myosuroides*, (R.Br.) Hughes in Kew Bull. Misc. 330 (1923). (*P. myosuroides*, R.Br.)
25. *SETARIA*, Beauv. Fl. Owar. ii. 80 (1807). (*Chaetochloa*, Scribn. (1897).)  
*S. glauca*, (Linn.) Beauv. Agrost. 51 (1812).  
*S. verticillata*, (Linn.) Beauv. l. c. 51.  
*S. viridis*, (Linn.) Beauv. l. c. 51.  
*S. Buchanani*, A. S. Hitchc. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. lii. (ii.) 185 (1927);  
*S. Carnei*, H. S. Hitchc. l. c. 185.  
*S. macrostachya*, H.B. et K. Nov. Gen. et Sp. i. 110 (1815).
26. *CENCHRUS*, Linn. Coroll. Gen. 20 (1737).  
\**C. tribuloides*, Linn. Am. bor.  
*C. elymoides*, F.v.M. Fragm. viii. 107 (1874).
27. *PSEUDOCHAETOCHELOA*, A. S. Hitchc. in Journ. Washgtn. Acad. Sci. xiv. 21. 492 (1924).  
*P. australiensis*, A. S. Hitchc. in Journ. Washgtn. Acad. Sci. xiv. 21. 492 (1924).
28. *PENNISETUM*, Rich. in Pers. Syn. i. 72 (1805).  
*P. villosum*, R.Br. in Salt. Abyss. App. 62 (1818).  
*P. Basedowii*, Summerhayes & Hubbard, Kew. Bull. Misc. 440 (1926).  
*P. cenchroides*, Rich. in Pers. Syn. i. 72 (1805).  
*P. arnhemicum*, F. v. M. Fragm. viii. 109 (1873).
29. *PLAGIOSETUM*, Benth. in Hook. Ic. Pl. xiii. 33 (1877).  
*P. refractum*, (F.v.M.) Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1242 (1877).
30. *CHAMAERAPHIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 193 (1810).  
*C. spinescens*, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 189 (1817).
31. *XEROCHLOA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).  
*X. imberbis*, R.Br. Prodr. 197 (1810).  
*X. barbata*, R.Br. l. c. 197.  
*X. laniflora*, (F. v. M.) Benth. Fl. Austr. vii. 502 (1878).  
*STENOTAPHRUM*, Trin. Fund. Agrost. 175 (1820).  
\**S. dimidiatum*, (Linn.) Brongn. (Trop. et. Sub. Trop. Reg.).
32. *SPINIFEX*, Linn. Mant. ii. 163 (1771).  
*S. hirsutus*, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 81. t. 230 (1806).  
*S. longifolius*, R.Br. Prodr. 198 (1810).
33. *ORYZA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*O. sativa*, Linn. Sp. Pl. 333 (1753).  
*EHRHARTA*, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 216 t. 8 (1779).  
\**E. longiflora*, Sm. (Africa aust.).  
\**E. brevifolia*, Schrad. (Africa aust.).  
\**E. calycina*, Sm. (Africa aust.).
34. *MICROLAENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 210 (1810).  
*M. stipoides*, (Labill) R.Br. Prodr. 210 (1810).
35. *TETRARRHENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 209 (1810).  
*T. laevis*, R.Br. Prodr. 210 (1810).  
*PHALARIS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
\**P. minor*, Retz. Reg. Medit.  
\**P. canariensis*, Linn. Reg. Medit.  
*ANTHOXANTHUM*, Linn. Gen. ed. I. 18 (1837).  
\**A. odoratum*, Linn. Europ. As. bor. Afr. bor.

36. *AMPHIPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 175 (1810).  
*A. debilis*, R.Br. Prodr. 175 (1810).  
*A. strictus*, R.Br. l. c. 175.  
*A. laguroides*, R.Br. l. c. 175.  
*A. cygnorum*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 100 (1846).  
*A. turbinatus*, R.Br. Prodr. 175 (1810).  
*A. restionaceus*, R. Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 72 (1904).
37. *ARISTIDA*, Linn. Sp. Pl. I. 82 (1753).  
*A. hygrometrica*, R.Br. Prodr. 174 (1810).  
*A. stipoides*, R.Br. l. c. 174.  
*A. Browniana*, Henr.  
*A. arenaria*, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 407 (1826).  
*A. calycina*, R.Br. Prodr. 173 (1810).
38. *STIPA*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 78 (1753).  
*S. elegantissima*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 24 t. 29 (1804).  
*S. juncifolia*, Hughes, in Kew Bull. Misc. 11 (1921).  
*S. eriopus*, Benth. Fl. Austr. vii. 570 (1878).  
*S. tenuifolia*, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1855).  
*S. leptophylla*, Hughes, in Kew Bull. Misc. 14 (1921).  
*S. trichophylla*, Benth. Fl. Austr. vii. 570 (1878).  
*S. falcata*, Hughes, in Kew Bull. Misc. 14 (1921).  
*S. arachnopus*, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 70 (1904).  
*S. variabilis*, Hughes, in Kew Bull. Misc. 15 (1921).  
*S. Drummondii*, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1855).  
*S. incurva*, Hughes, in Kew Bull. Misc. 16 (1926).  
*S. platychaeta*, Hughes, in l. c. 16 (1926).  
*S. scabra*, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 31 (1848).  
*S. pycnostachya*, Benth. Fl. Austr. vii. 568 (1878).  
*S. hemipogon*, Benth. l. c. 569.  
*S. nobilis*, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 70 (1904).  
*S. semibarbata*, R.Br. Prodr. 174 (1810).  
*S. eremophila*, Reader, in Vict. Nat. xvii. 154 (1901).  
*S. hirsuta*, Hughes, in Kew Bull. Misc. 22 (1921).  
*S. tenuiglumis*, Hughes, l. c. 22.  
*S. elatior*, Hughes, l. c. 24.  
*S. puberula*, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1848).  
*S. crinita*, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 407 (1826).  
*S. compressa*, R.Br. Prodr. 174 (1810).  
*S. Mc Alpinei*, Reader, in Vict. Nat. xv. 143 (1899).  
*ORYZOPSIS*, Mich. Fl. Bor. Am. i. 51. t. 9 (1803).  
*\*O. miliacea*, (Linn.) Aschers. et Schweinf. (Reg. Medit.)
39. *ECHINOPOGON*, Beauv. Agrost. 42 t. 9. f. 5 (1812).  
*E. ovatus*, (Forst.) Beauv. Agrost. 42. t. 9. f. 5 (1812).  
*PHLEUM*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*\*P. pratense*, Linn. (Reg. bor. temp.)
40. *ALOPECURUS*, Linn. Syst. ed. i. (1735).  
*A. geniculatus*, Linn. Sp. Pl. 60 (1753).
41. *SPOROBOLUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 169 (1810).  
*S. virginicus*, (Linn.) Kunth. Rev. Gram. i. 68 (1832).  
*S. indicus*, R.Br. Prodr. 170 (1810).  
*S. pulchellus*, R.Br. l. c. 170.  
*S. Lindleyi*, (Steud.) Benth. Fl. Austr. vii. 623 (1878).  
*S. actinocladius*, F.v.M. Fragm. viii. 140 (1874).
42. *POLYPOGON*, Desf. Fl. Atlant. i., 66 (1798).  
*P. monspeliensis*, Desf. Fl. Atlant. i. 66 (1798).  
*P. fugax*, Nees in Steud. Syn. Glum. i. 184 (1855).  
*P. tenellus*, R.Br. Prodr. 173 (1810).  
*AGROSTIS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*\*A. alba*, Linn. (Europ.)  
*\*A. venusta*, Trin. (Reg. Medit.)
43. *CALAMAGROSTIS*, Adans. Fam. ii. 31 (1763).  
*C. aemula*, Steud. Nom. ed. ii. i. 249 (1821). (*Deyeuxia Forsteri*, Kunth.)  
*C. quadriseta*, (Labill.) Spreng. Syst. i. 253 (1825). (*Deyeuxia cylindrica*, R.Br.)

44. *DICHELACHNE*, Endl. Prodr. Fl. Norf. 20 (1838).  
*D. crinita*, (Linn. f.) Hook. f. Fl. New Zeal. i. 293 (1853).  
*D. sciurea*, (R.Br.) Hook. f. l. c. 294.  
*AMMOPHILA*, Host Gram. Austr. iv. t. 41 (1809).  
 \**A. arenaria*, (Linn.) Link. (Europ: Amer. bor.).
45. *DIPLOPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 176 (1810).  
*D. setaceus*, R.Br. Prodr. 176 (1810).
46. *PENTAPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 173 (1810).  
*P. quadrifidus*, (Labill.) Baill. Hist. des pl. xii. 280 (1894). (*P. Billardieri*, R.Br.)  
*LAGURUS*, Linn. Gen. ed. i. 353 (1737).  
 \**L. ovatus*, Linn. (Europ.).
47. *ERIACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 183 (1810).  
*E. squarrosa*, R.Br. Prodr. 183 (1810).  
*E. pauciflora*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 115 (1918).  
*E. glauca*, R.Br. Prodr. 183 (1810).  
*E. ciliata*, R.Br. l. c. 184.  
*E. aristidea*, F.v.M. Fragm. v. 205 (1866).  
*E. festucacea*, F.v.M. l. c. 205.  
*E. ovata*, Nees in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 416 (1843).  
*E. meliacea*, F.v.M. Fragm. v. 205 (1866).  
*E. nana*, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 75 (1904).  
*E. pallida*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 631 (1878).  
*E. scleranthoides*, F.v.M. Fragm. viii. 233 (1874).  
*E. inermis*, Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 75 (1904).  
*E. obtusa*, R.Br. Prodr. 184 (1810).  
*AIRA*, Linn. Fl. Lapp. 27 (1737).  
 \**A. caryophyllea*, Linn. (Europ. Oriens.).  
 \**A. minuta*, Linn. (Europ. Oriens.).
48. *DESCHAMPSIA*, Beauv. Agrost. 91. t. 8 (1812).  
*D. caespitosa*, (Linn.) Beauv. Agrost. 91. t. 8 (1812).  
*AVENA*, Linn. Syst. ed. i. (1735).  
 \**A. fatua*, Linn. (Europ. Oriens. As. bor.).  
 \**A. barbata*, Brotero. (Reg. Mediterr. As. Min, Arab.).  
*HOLCUS*, Linn. Syst. ed. i. (1735).  
 \**H. lanatus*, Linn. (Europ.).
49. *AMPHIBROMUS*, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 420 (1843).  
*A. nervosus*, (R.Br.) Hook. f. Fl. Tasm. ii. pl. clxiii. (1860).
50. *DANTHONIA*, D. C. Fl. Franc. iii. 32 (1805).  
*D. bipartita*, F.v.M. Fragm. i. 160 (1859).  
*D. pentacillata*, (Labill) F.v.M. Fragm. viii. 135 (1873).  
*PENTASCHISTIS*, Stapf. in Dyer Fl. Cap. vii. 480 (1899).  
 \**P. Thunbergii*, (Kunth.) Stapf. (Afr. aust.).
51. *PAPPOPHORUM*, Schreb. Gen. Pl. ii. 787 (1791).  
*P. nigricans*, R.Br. Prodr. 185 (1810).
52. *TRIRAPHIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 185 (1810).  
*T. mollis*, R.Br. Prodr. 185 (1810).  
*T. pungens*, R.Br. l. c. 185.  
*T. bromoides*, F.v.M. Fragm. viii. 108 (1874).  
*T. rigidissima*, Pilger in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 72 (1904).  
*T. danthonioides*, F.v.M. Fragm. viii. 125 (1874).
53. *ELYTROPHORUS*, Beauv. Agrost. 67 (1812).  
*E. articulatus*, Beauv. Agrost. 67 (1812).
54. *TRIODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 182 (1810).  
*T. Mitchellii*, Benth. Fl. Austr. vii. 606 (1878).  
*T. pungens*, R.Br. Prodr. 182 (1810).  
*T. Cunninghamii*, Benth. Fl. Austr. vii. 606 (1878).  
*T. irritans*, R.Br. Prodr. 182 (1810).  
*T. procera*, R.Br. l. c. 182.  
*T. microstachya*, R.Br. l. c. 182.
55. *DIPLACHNE*, Beauv. Agrost. 9 (1812).  
*D. loliiformis*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 618 (1878).  
*D. fusca*, (Linn.) Beauv. Agrost. 163 (1812).  
*D. parviflora*, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 620 (1878).

56. *PHRAGMITES*, Trin. Fund. Agrost. 134 (1820).  
*P. vulgaris*, (Lam.) Druce, List. Brit. Pl. 81 (1908). (*P. phragmites*  
(Linn.) Karst); (*P. communis*, Trin.)  
*LAMARCKIA*, Moench. Meth. 201 (1794).  
\**L. aurea*, (Linn.) Moench. (Reg. Mediterr.)  
*CYNOSURUS*, Linn. Gen. ed. i. 13 (1737).  
\**C. echinatus*, Linn. (Reg. Mediterr.)  
*KOELLERIA*, Pers. Syn. Glum. i. 97 (1805).  
\**K. phleoides*, Pers. (Reg. Mediterr.)  
*AVELLINIA*, Parlât. Pl. Nov. 59 (1842).  
\**A. Michelii* (Savi.) Parlât. (Italia.)  
*TRisetum*, Pers. Syn. Glum. i. 97 (1805).  
\**T. pumilum*, Kunth. (Af. austr.).  
*BRIZA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
\**B. maxima*, Linn. (Reg. Mediterr.; Af. austr.)  
\**B. minor*, Linn. (Europ. Oriens; As. bor.)  
*DACYLIS*, Linn. Gen. ed. II. 29 (1742).  
\**D. glomerata*, Linn. (Europ.; As. bor.)
57. *ERAGROSTIS*, Beauv. Agrost. 70 (1812).  
*E. tenella*, (Linn.) Roem et Schultz. Syst. Veg. ii. 576 (1817).  
*E. leptocarpa*, Benth. Fl. Austr. vii. 644 (1878).  
*E. pilosa*, (Linn.) Beauv. Agrost. 71 (1812).  
*E. trichophylla*, Benth. Fl. Austr. vii. 644 (1878).  
*E. diandra*, Steud. Synops. Pl. Glum. i. 279 (1855).  
*E. Brownii*, Nees in Steud. Nomencl. Bot. i. 562 (1841).  
*E. speciosa*, Steud. in Synops. Pl. Glum. i. 279 (1855).  
*E. eriopoda*, Benth. Fl. Austr. vii. 648 (1878).  
*E. setifolia*, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 419 (1843).  
*E. falcata*, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 408. t. 25 (1826).  
*E. Dielsii*, Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 76 (1904).
58. *ECTROSLA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 185 (1810).  
*E. Schultzii*, Benth. Fl. Austr. vii. 633 (1878).  
*E. leporina*, R.Br. Prodr. 186 (1810).  
*SCHISMUS*, Beauv. Agrost. 73. t. 15. f. 4 (1812).  
\**S. calycinus*, (Linn.) Coss. et Dur. (Reg. Mediterr.; Afr. austr.).
59. *POA*, Linn. Gen. Pl. 20 (1737).  
*P. caespitosa*, Forst. Prodr. 89 (1786).  
*P. Maxwellii*, Benth. Fl. Austr. vii. 653 (1878).  
*P. Drummondiana*, Nees in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 418 (1843). (*P. nodosa*, Nees.)  
\**P. bulbosa*, Linn. (Europ.)  
\**P. annua*, Linn. (Cosmop.)
60. *GLYCERIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 179 (1810).  
*G. fluitans*, (Linn.) R.Br. Prodr. 179 (1810).  
*G. stricta*, Hook. fil. Fl. Nov. Zeal. i. 304 (1855).  
*G. ramigera*, F.v.M. Fragm. viii. 131 (1874).  
*G. australasica*, Steud. Syn. Glum. i. 286 (1855).
61. *FESTUCA*, Linn. Syst. ed. i. (1735).  
*F. scirpoidea*, F.v.M. Fragm. viii. 129 (1874). (*Schedonorus scirpoides*,  
Benth.)  
*F. littoralis*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 22. t. 27 (1804). (*S. littoralis*, Beauv.)  
\**F. elatior*, Linn. (Europ.; As. bor.)  
\**F. Myuros*, Linn. (Europ.; Am. et As. bor.)  
\**F. bromoides*, Linn. (Reg. temp.)  
\**F. rigida*, (Linn.) Kunth. (Europ. Austr.; Afr. bor.)
62. *BROMUS*, Linn. Syst. Nat. 8 (1735).  
\**B. maximus*, Desf. (Europ.; Reg. Mediterr. et Caucas.)  
\**B. Madritensis*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.)  
\**B. unioloides*, H.B. et K. (Am. calid.)  
*B. arenarius*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 23. t. 28 (1804).  
\**B. mollis*, Linn. (Europ.; Afr. et As. bor.)  
*BRACHYPODIUM*, Beauv. Agrost. 100 (1812).  
\**B. distachyum*, Roem et Schultz. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
63. *CYNODON*, Rich. in Pers. Syn. Glum. i. 85 (1805).  
*C. Dactylon*, Rich. in Pers. Syn. Glum. i. 85 (1805).  
*C. tenellus*, R.Br. Prodr. 187 (1810).  
*C. convergens*, F.v.M. Fragm. viii. 113 (1874).

64. *CHLORIS*, Swartz. Nov. Gen. et Sp. Plant. 25 (1788).  
*C. pectinata*, Benth. Fl. Austr. vii. 612 (1878).  
*C. divaricata*, R.Br. Prodr. 186 (1810).  
*C. acicularis*, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 33 (1848).  
*C. truncata*, R.Br. Prodr. 186 (1810).  
*C. barbata*, Swartz. Nov. Gen. et Sp. Pl. 25 (1788).  
*C. scariosa*, F.v.M. Fragm. vi. 85 (1868).  
*C. pallida*, Hack. in Engler's Botan. Jahrb. vi. 244 (1885).
65. *ASTREBLA*, (F.v.M.) Benth. Flora Australiensis, vii. 602 (1878).  
*A. pectinata*, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vii. 602 (1878).  
*A. elymoides*, Bail et F.v.M. Illustr. Queensland Grasses (1878).  
*A. triticoides*, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vii. 602 (1878).
66. *DACTYLOCTENIUM*, Willd. Enum. Hort. Berol. 1029 (1809).  
*D. australiense*, Scribn. (*D. aegyptium*, (L.) Willd.)
67. *ELEUSINE*, Gaertn. Fruct. i. 7 (1788).  
*E. racemosa*, Heyne, in Roth. Nov. Sp. Pl. 80 (1817). (*E. verticillata*, Roxb.)
68. *LEPTOCLOA*, Beauv. Agrost. 71. t. 15 (1812).  
*L. digitata*, (R.Br.) Domin, in Biblioth. Bot. lxxxv. 379 (1915). (*L. subdigitata*, Trin.)  
*LOLIUM*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*\*L. temulentum*, Linn. (Europ.; As. bor.).  
*\*L. perenne*, Linn. (Europ.; As. temp.).  
*\*L. rigidum*, Gaud. (Europ.).
69. *LEPTURUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 207 (1810).  
*L. cylindricus*, Trin. Fund. Agrost. 123 (1820).
70. *AGROPYRON*, Gaertn. in Nov. Comm. Petrop. xiv. I. 539 (1770), (*Agropyrum*, (Beauv).)  
*A. scabrum*, (Labill.) Beauv. Agrost. 102 (1812).  
*\*A. repens*, (Linn.) Beauv. (Reg. temp.).  
*HORDEUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*\*H. murinum*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.).  
*\*H. maritimum*, With. (Europ. Afr. bor.; Oriens.).

## Cyperaceae.

1. *LIPOCARPHA*, R.Br. in Tuckey's Narrative of an Exped. to Congo 459 (1818).  
*L. microcephala*, (R.Br.) Kunth. Enum. ii. 268 (1837).
2. *CARPHA*, Banks et Soland. in R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 230 (1810).  
*C. gracilipes*, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 81 (1904).
3. *CYPERUS*, (Mich.) Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*Subgenus i. Pycurus.*  
*C. flavescens*, Linn. Sp. Pl. 46 (1753). (*Pycurus flavescens*, (Linn.) Nees.)  
*C. polystachyus*, Rottb. descr. et Incon. pl. 39 (1773). (*P. polystachyus* (R.Br.) Beauv.)  
*C. Hochstetteri*, Nees, in Regensb. Fl. 755 (1845). (*P. albomarginatus*, Nees.)
- Subgenus ii. Juncellus.*  
*C. pygmaeus*, Rottb. descr. et Icon. pl. 20 (1773). (*Juncellus pygmaeus*, (Rottb.) Clarke.)  
*C. laevigatus*, Linn. Mant. 179 (1771). (*J. laevigatus*, (Linn.) C. B. Clarke.)
- Subgenus iii. Eucyperus.*  
*C. trinervis*, R.Br. Prodr. 213 (1810).  
*C. tenellus*, Linn. f. Suppl. 103 (1781).  
*C. difformis*, Linn. Amoen. Acad. iv. 302 (1759).  
*C. Haspan*, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).  
*C. leucocephalus*, Retz. observ. v. 11 (1788).  
*C. vaginatus*, R.Br. Prodr. 213 (1810).  
*C. Iria*, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).  
*C. aristatus*, Rottb. Descr. et Ic. Pl. 23. t. 6. f. i. (1773) (*C. squarrosus*, Benth.)  
*C. distans*, Linn. fil. Suppl. 103 (1781).  
*C. subulatus*, R.Br. Prodr. 217 (1810).  
*C. sporobolus*, R.Br. l. c. 215.  
*C. stenostachyus*, Benth. Fl. Austr. vii. 280 (1878).  
*C. rotundus*, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).

*Subgenus iv. Mariscus.*

- C. pennatus*, Lam. Illustr. Gen. i. 144 (1799). (*Mariscus albescens*, Gaud.)
- C. conicus*, (R.Br.) Boeckl. in Schlecht. Linnaea. xxxviii. 371 (1874). (*M. cornicus*, R.Br.)
- C. alterniflorus*, R.Br. Prodr. 216 (1810). (*M. alterniflorus*, C. B. Clarke.)
- C. lucidus*, R.Br. l. c. 218. (*M. lucidus*, C. B. Clarke.)
- C. Cunninghamii*, (C. B. Clarke) Gardner, n. comb. (*M. Cunninghamii*, C. B. Clarke.)
- C. fulvus*, R.Br. Prodr. 215 (1810). (*M. fulvus*, C. B. Clarke.)
- C. Holoschoenus*, R.Br. Prodr. 215 (1810). (*M. Holoschoenus*, C. B. Clarke.)
- C. carinatus*, R.Br. l. c. 216. (*M. carinatus*, C. B. Clarke.)
4. *FUIRENA*, Rottb. Descr. et Icon. 70 (1773).  
*F. glomerata*, Lam. Illustr. Gen. i. 150 (1791).  
*F. umbellata*, Rottb. Descr. et Icon. Pl. 70. t. 19. f. 3 (1773).
5. *SCIRPUS*, Linn. Syst. ed. I. (1753).  
*S. fluitans*, Linn. Sp. Pl. 48 (1753).  
*S. cernuus*, Vahl. Enum. ii. 245 (1806). (*S. riparius*, Benth.)  
*S. Isdellensis*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 123 (1918).  
*S. antarcticus*, Linn. Mant. ii. 181 (1771). (*S. cartilagineus*, Poir.)  
*S. arenarius*, Benth. Fl. Austr. vii. 325 (1878).  
*S. multicaulis*, (F.v.M.) C. B. Clarke, Kew Bull. Misc. Add. ser. vii. 25 (1908).  
*S. setaceus*, Linn. Sp. Pl. 49 (1753).  
*S. nodosus*, Rottb. descr. et Icon. Pl. 52. t. 8 (1773).  
*S. supinus*, Linn. Sp. Pl. 49 (1753).  
*S. erectus*, Poir. Encycl. vi. 761.  
*S. articulatus*, Linn. Sp. Pl. 47 (1753).  
*S. mucronatus*, Linn. l. c. 50.  
*S. americanus*, Pers. Syn. Pl. i. 68 (1805).  
*S. lacustris*, Linn. Sp. Pl. 51 (1753).  
*S. maritimus*, Linn. l. c. 51.  
*S. littoralis*, Schrad. Fl. Germ. i. 142 (1806).  
*S. Kochii*, Maiden et Betche, in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxxiii. 318 (1908).
6. *CROSSLANDIA*, W. V. Fitzgerald, in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 122 (1918).  
*C. setifolia*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 122 (1918).
7. *ELEOCHARIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 224 (1810).  
*E. compacta*, R.Br. Prodr. 224 (1810).  
*E. atropurpurea*, Kunth. Enum. ii. 151 (1837).  
*E. Dietrichiana*, (Boeckel) C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 105 (1908).  
*E. gracilis*, R.Br. Prodr. 224 (1810).  
*E. acuta*, R. Br. Prodr. 224 (1810).
8. *FIMBRISTYLIS*, Vahl. Enum. ii. 285 (1806).  
*F. tetragona*, R.Br. Prodr. 226 (1810).  
*F. pilifera*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 118 (1918).  
*F. pterygosperma*, R.Br. Prodr. 226 (1810).  
*F. pauciflora*, R.Br. l. c. 225.  
*F. semilevis*, (F.v.M.) C. B. Clarke. Kew. Bull. Misc. Add ser. viii. 24 (1908).  
*F. cardiocarpa*, F.v.M. Fragm. i. 194 (1859).  
*F. denudata*, R.Br. Prodr. 227 (1810).  
*F. caespitosa*, R.Br. l. c. 228.  
*F. diphylla* Vahl. Enum. ii. 289 (1806).  
*F. aestivalis*, Vahl. l. c. ii. 289.  
*F. ferruginea*, Vahl. l. c. ii. 291.  
*F. subaristata*, Benth. Fl. Austr. vii. 314 (1878).  
*F. solidifolia*, F.v.M. Fragm. i. 198 (1859).  
*F. miliacea*, Vahl. Enum. ii. 287 (1806).  
*F. quinquangularis*, Kunth. Enum. ii. 229 (1837).  
*F. rara*, R.Br. Prodr. 227 (1810).  
*F. capitata*, R.Br. l. c. 228.  
*F. Schultzei*, Boeckl. in Linnaea xxxviii. 391 (1874).  
*F. oligocephala*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 121 (1918).



- F. barbata*, (Rottb.) Benth. Fl. Austr. vii. 321 (1878).  
*F. capillaris*, (Linn.) A. Gray Man. of Bot. N.U.S. ed. 5. 567 (1867).  
*F. arthrostyloides*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 121 (1918).
9. *SCHOENUS*, Linn. Corroll. Gen. 2 (1737).  
*S. cruentus*, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 357 (1878).  
*S. Benthami*, F.v.M. Syst. Cens. Austr. pl. 127 (1882). (*S. compressus*, Benth.)  
*S. lanatus*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 19. t. 20 (1806).  
*S. flavus*, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 278 (1874).  
*S. barbatus*, Boeckl. in l. c. 277.  
*S. curvifolius*, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 358 (1878).  
*S. capitatus*, (Nees) F.v.M. Fragm. ix. 58 (1875). (*S. subbulbosus*, Benth.)  
*S. aphyllus*, Boeckl. in Linnaea xxxviii. 279 (1874).  
*S. sesquispiculus*, C. B. Clarke Kew Bull. Misc. Add. Ser. viii. 43 (1908).  
*S. Drummondii*, (Steud.) Benth. Fl. Austr. vii. 359 (1878). (*S. microstachyus*, Nees).  
*S. nitens*, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 251 (1811).  
*S. cygneus*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81 (1846).  
*S. unispiculatus*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 365 (1878).  
*S. breviculmis*, Benth. Fl. Austr. vii. 364 (1878).  
*S. pleiostomoneus*, F.v.M. Fragm. ix. 52 (1875).  
*S. trachycarpus*, F.v.M. l. c. 33.  
*S. nanus*, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 364 (1878).  
*S. Rodwayanus*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxvii. 243 (1903).  
*S. minutulus*, F.v.M. Fragm. ix. 32 (1875).  
*S. obtusifolius*, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 281 (1874).  
*S. grammatophyllus*, F.v.M. Fragm. ix. 31 (1875).  
*S. asperocarpus*, F.v.M. l. c. 29.  
*S. grandiflorus*, (Nees) F.v.M. l. c. 30.  
*S. calostachyus*, (R.Br.) Poir. Encyc. Meth. Suppl. ii. 251 (1811).  
*S. efoliatus*, F.v.M. Fragm. ix. 32 (1875).  
*S. multiglumis*, Benth. Fl. Austr. vii. 368 (1878).  
*S. acuminatus*, R.Br. Prodr. 231 (1810).  
*S. falcatus*, R.Br. l. c. 232.  
*S. laevigatus*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 111 (1904).  
*S. caespitius*, W. V. Fitzg. l. c. 110.  
*S. punctatus*, R.Br. Prodr. 232 (1810).  
*S. bifidus* (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 282 (1874).  
*S. laxus*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales xxviii. 111 (1904).  
*S. Jamisonianus*, W. V. Fitzg. l. c. xxvii. 245 (1903).  
*S. brevifolius*, R.Br. Prodr. 231 (1810).  
*S. pedicellatus*, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 369 (1878).  
*S. fascicularis*, Nees in Ann. Nat. Hist. ser. i. vi. 48 (1842).  
*S. indutus*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 372 (1878).  
*S. odontocarpus*, F.v.M. Fragm. ix. 32 (1875).  
*S. sculptus*, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 286 (1874).  
*S. humilis*, Benth. Fl. Austr. vii. 374 (1878).  
*S. axillaris*, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 251 (1811).  
*S. natans*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 375 (1878).
10. *GYMNOSCHOENUS*, Nees in Ann. Hist. Ser. i. vi. 47 (1841).  
*G. anceps*, (R.Br.) C. B. Clarke, Kew Bull. Add. Ser. viii. 92 (1908).
11. *MESOMELAENA*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 88 (1846).  
*M. stygia*, (R.Br.) Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 89 (1846).  
*M. Preissii*, Nees in l. c. 88.  
*M. uncinata* (Nees) C. B. Clarke in Kew Bull. Add. ser. viii. 48 (1908).  
*M. tetragona*, (R.Br.) F.v.M. Fragm. ix. 36 (1875).
12. *LEPIDOSPERMA*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 14 (1804).  
*L. gladiatum*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 15. t. 12 (1804).  
*L. effusum*, Benth. Fl. Austr. vii. 387 (1878).  
*L. rupestre*, Benth. l. c. 388.  
*L. tetraquetrum*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 90 (1846).  
*L. longitudinale*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 16. t. 13 (1804).  
*L. exaltatum*, R.Br. Prodr. 234 (1810).  
*L. angustatum*, R.Br. l. c. 235.  
*P. resinosum* (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 392 (1878).

- L. viscidum*, R.Br. Prodr. 234 (1810).  
*L. Drummondii*, Benth. Fl. Austr. vii. 391 (1878).  
*L. tuberculatum*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 90 (1846).  
*L. Brunonianum*, Nees. l. c. 92.  
*L. costale*, Nees. l. c. 92.  
*L. aphyllum*, R.Br. Prodr. 235 (1810).  
*L. Benthamianum*, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 91 (1908).  
*L. pubisquamum*, Steud. Syn. Glum. ii. 158 (1855).  
*L. scabrum*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 92 (1846).  
*L. gracile*, R.Br. Prodr. 235 (1810).  
*L. tenue*, Benth. Fl. Austr. vii. 397 (1878).  
*L. leptostachyum*, Benth. l. c. 397.  
*L. leptophyllum*, Benth. l. c. 398.  
*L. striatum*, R.Br. Prodr. 235 (1810).  
*L. Exsul*, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 47 (1908).  
*L. carphoides*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 400 (1878).
13. *TRICOSTULARIA*, Nees in Lehm. Pugill. viii. 50 (1844).  
*T. compressa*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 83 (1846).  
*T. Neesii*, Lehm. in l. c. 83.
14. *REEDIA*, F.v.M. Fragm. i. 240. t. 10 (1859).  
*R. spathacea*, F.v.M. Fragm. i. 240. t. 10 (1859).
15. *GLADIUM*, P. Br. Hist. Jamaica. 114 (1756).  
*C. Drummondii*, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 91 (1908).  
*C. Preissii*, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 405 (1878).  
*C. laxum*, (Nees) Benth. l. c. 405.  
*C. riparium*, (Nees) Benth. l. c. 405.  
*C. schoenoides*, R.Br. Prodr. 237 (1810).  
*C. arthrophyllum*, (Nees) F.v.M. Fragm. ix. 14 (1875).  
*C. glomeratum*, R.Br. Prodr. 237 (1810).  
*C. elynanthoides*, F.v.M. Fragm. ix. 31 (1875).  
*C. vaginale*, Benth. Fl. Austr. vii. 408 (1878).  
*C. junceum*, R.Br. Prodr. 237 (1810).
16. *RHYNCHOSPOEA*, Vahl. Enum. ii. 229 (1806).  
*R. affinis*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 124 (1918).  
*R. tenuifolia*, Benth. Fl. Austr. vii. 350 (1878).
17. *CYATHOCHAETE*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 86 (1846).  
*C. clandestina*, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 351 (1878).  
*C. australis*, (Steud.) Gardner n. comb.  
*C. teretifolia*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 109 (1904).
18. *TETRARIA*, P. Beauv. in Mem Inst. Fr. (Acad. Sc. Par) 1812 ii. 54 (1816).  
*T. australiensis*, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 80 (1904).
19. *TETRARIOPSIS*, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 45 (1908).  
*T. octandra*, (Nees) C. B. Clarke in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 81 (1904).
20. *GAHNIA*, R et G Forst. Char. Gen. 51 (1776).  
*G. trifida*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 89. t. 116 (1804).  
*G. polyphylla*, Benth. Fl. Austr. vii. 415 (1878).  
*G. deusta*, (R.Br.) Benth. l. c. 416.  
*G. aristata*, (F.v.M.) Benth. l. c. 416.  
*G. lanigera*, (R.Br.) Benth. l. c. 415.
21. *CAUSTIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 239 (1810).  
*C. pentandra*, R.Br. Prodr. 240 (1810).  
*C. dioica*, R. Br. l. c. 239.  
*C. squamellata*, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. Ser. viii. 48 (1908).
22. *EVANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 239 (1810).  
*E. aristata*, R.Br. Prodr. 239 (1810).  
*E. pauciflora*, R.Br. l. c. 239.
23. *CHRYSITHELIX*, Linn. Mant. ii. 165 (1771).  
*C. dimerostigma*, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 82 (1904).
24. *CHORISANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 221 (1810).  
*C. enodis*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 73 (1846).  
*C. multiarticulata*, Nees in Ann. Nat. Hist. ser. i. iv. 48.  
*C. cymbaria*, R.Br. Prodr. 221 (1810).

25. *CAREX*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*C. inversa*, R.Br. Prodr. 242 (1810).  
*C. appressa*, R.Br. Prodr. 242 (1810).  
*C. tereticaulis*, F.v.M. Fragm. viii. 256 (1874).  
*C. Preissii*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 94 (1846).  
*C. pseudocyperus*, Linn. Sp. Pl. 978 (1753).  
*SCHOENUS Andrewsii*, W. V. Fitzg. This species, if a valid *Schoenus*, is not sufficiently described to place it in the sequential list given for that genus.

## PRINCIPES.

## Palmae.

1. *LIVISTONA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 267 (1810).  
*L. Alfredi*, F.v.M. in Vict. Nat. ix. 112 (1892).  
*L. Eastoni*, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 36 (1923).  
*L. inermis*, R.Br. Prodr. 268 (1810).

## SPATHIFLORAE.

## Araceae.

1. *COLOCASIA*, Schott, Meletem. i. 18 (1832).  
*C. antiquorum*, Schott, Meletem. bot. 18 (1832).  
*ZANTÉDESCHIA*, Spreng. Syst. iii. 765. (1826). (*Richardia*, Kunth.)  
\**Z. aethiopica*, Spreng. l. c. (Afr. austr.). (*R. africana*).  
\**R. africana*, Kunth. (Afr. austr.)  
2. *TYPHONIUM*, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. 72 (1829).  
*T. angustilobium*, F.v.M. Fragm. x. 66 (1876).

## Lemnaceae.

1. *LEMNA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*L. trisulca*, Linn. Sp. Pl. 970 (1753).  
*L. minor*, Linn. l. c. 970.  
*L. gibba*, Linn. l. c. 970.  
*L. disperma*, Hegelm. in Engler's Botan. Jahrb. xxi. 290 (1895).

## FARINOSAE.

## Flagellariaceae.

1. *FLAGELLARIA*, Linn. Amoen. Acad. 396 (1747).  
*F. indica*, Linn. Sp. Pl. 333 (1753).

## Restionaceae.

1. *LYGINIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 248 (1810).  
*L. tenax*, (Labill) Gardner n. comb. (*L. barbata*, R.Br.)  
2. *ECDEIOCOLEA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. viii. 236 (1874).  
*E. monostachya*, F.v.M. Fragm. viii. 236 (1874).  
3. *ANARTHIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 248 (1810).  
*A. scabra*, R.Br. Prodr. 249 (1810).  
*A. laevis*, R.Br. l. c. 249.  
*A. gracilis*, R.Br. l. c. 249.  
*A. prolifera*, R.Br. l. c. 249.  
*A. polyphylla*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 63 (1846).  
4. *LEPYRODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 247 (1810).  
*L. hermaphrodita*, R.Br. Prodr. 248 (1810).  
*L. monoica*, F.v.M. Fragm. viii. 76 (1873).  
*L. Muirii*, F.v.M. l. c. 78.  
*L. heleocharoides*, Gilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 87 (1904).  
*L. stricta*, R.Br. Prodr. 248 (1810).  
*L. macra*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 60 (1846).  
*L. Drummondiana*, Steud. Syn. Glum. ii. 248 (1855).  
*L. glauca*, (Nees) F.v.M. Fragm. viii. 77 (1873).  
*L. anaectocolea*, F.v.M. Fragm. viii. 78 (1873).

5. *RESTIO*, Linn. Syst. Nat. ed. 12. ii. 735 (1767).  
*R. megalotheca*, F.v.M. Fragm. viii. 99 (1873).  
*R. applanatus*, Spreng. Syst. i. 185 (1825).  
*R. confertospicatus*, Steud. Syn. Glum. ii. 256 (1855).  
*R. sphacelatus*, R.Br. Prodr. 246 (1810).  
*R. deformis*, R.Br. l. c. 245.  
*R. stenostachyus*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 108 (1904).  
*R. crispatus*, R.Br. Prodr. 246 (1810).  
*R. nitens*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 59 (1846).  
*R. gracilior*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 226 (1878).  
*R. chaunocolus*, F.v.M. Fragm. viii. 64 (1873).  
*R. laxus*, R. Br. Prodr. 245 (1810).  
*R. ornatus*, Steud. Syn. Glum. ii. 256 (1855).  
*R. leucoblephara*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).  
*R. leptocarpoides*, Benth. Fl. Austr. vii. 229 (1878).  
*R. amblycolus*, F.v.M. Fragm. viii. 65 (1873).  
*R. Dielsii*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).  
*R. tremulus*, R.Br. Prodr. 245 (1810).
6. *DIELSLIA*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).  
*D. cygnorum*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
7. *HOPKINSIA*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 33 (1904).  
*H. calovaginata*, (Gilg.) Pilger in Engler's Pflanzenfam. Nachtrage iii. zu. ii. 4. 35 (1908). (*H. scabrida*, W. V. Fitzg.)
8. *LEPTOCARPUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 250 (1810).  
*L. scariosus*, R.Br. Prodr. 250 (1810).  
*L. tenax*, (Labill) R. Br. Prodr. 250 (1810).  
*L. Brownii*, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 73. t. 136 (1860).  
*L. canus*, Nees in Ann. Hist. ser. 1. vi. 50 (1843).  
*L. coangustatus*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 65 (1846).  
*L. humilis*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 89 (1904).  
*L. aristatus*, R.Br. Prodr. 250 (1810).  
*L. erianthus*, Benth. Fl. Austr. vii. 235 (1878).
9. *LOXOCARYA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 249 (1810).  
*L. myrioclada*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 90 (1904).  
*L. densa* (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 241 (1878).  
*L. vestita*, Benth. l. c. 241.  
*L. virgata*, Benth. l. c. 242.  
*L. pubescens*, (R.Br.) Benth. l. c. 242.  
*L. fasciculata*, (R.Br.) Benth. l. c. 242.  
*L. flexuosa*, (R.Br.) Benth. l. c. 243.  
*L. cinerea*, R.Br. Prodr. 249 (1810).
10. *HARPERIA*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 34 (1904).  
*H. lateriflora*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 35 (1904).
11. *LEPIDOBOLUS*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 66 (1846).  
*L. Preissianus*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 66 (1846).  
*L. chaetocephalus*, F.v.M. Fragm. viii. 84 (1873).  
*L. deserti*, Gilg in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 91 (1904).
12. *CHAETANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).  
*C. leptocarpoides*, R.Br. Prodr. 251 (1810).
13. *ONYCHOSEPALUM*, Steud. Syn. Pl. Glum. ii. 249 (1855).  
*O. laxiflorum*, Steud. Syn. Glum. ii. 249 (1855).
14. *HYPOLAENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).  
*H. ramosissima*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 89 (1904).  
*H. fasciculata*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 108 (1904).  
*H. gracillima*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 239 (1878).  
*H. exsulca*, R.Br. Prodr. 251 (1810).

## Centrolepidaceae.

1. *HYDATELLA*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 93 (1904).  
*H. australis* Diels, in Engler's Jahrb. xxxv. 93 (1904).  
*H. leptogyne*, Diels, in l. c. 93.
2. *TRITHURIA*, Hook. fil. Fl. Tasm. ii. 79. t. 137 (1860).  
*H. submersa*, Hook. fil. Fl. Tasm. ii. 79. t. 138 (1860). (*T. occidentalis*, Benth.)  
*T. bibracteata*, Stapf.  
*T. micranthera*, Stapf.
3. *BRIZULA*, Heiron. in Bot. Zeit. xxx. 206 (1872).  
*B. nutans*, (Hook. f.) Gardner. n. comb.  
*B. gracilis*, (Sond.) Hieron. in Abb. Naturf. Ges. Halle xii. 92 (1873).  
(*Aphelia gracilis*, Sond.)  
*B. Drummondii*, Hieron. l. c. 92.  
*B. Muelleri*, Hieron. l. c. 93.
4. *APHELLIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).  
*A. cyperoides*, R.Br. Prodr. 252 (1810).
5. *CENTROLEPIS*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 7 (1804).  
*C. humillima*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 203 (1878).  
*C. polygyna*, (R.Br.) Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges Halle. xii. 96 (1873).  
*C. alepyroides*, (Nees) Hieron. l. c. 96.  
*C. mutica*, (R.Br.) Hieron. l. c. 96.  
*C. glabra*, (F.v.M.) Hieron. l. c. 96.  
*C. aristata*, (R.Br.) Roem. et Schultz. Syst. Veg. i. 44 (1817).  
*C. basiflora*, Ostf. Det. Kgl. Danske Vidensk. Selskab. iii. 2. 13 (1921).  
*C. inconspicua*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 107 (1904).  
*C. Drummondii*, (Nees) Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges Halle. xii. 98 (1873).  
*C. Banksii*, (R.Br.) Roem. et Schultz. Syst. Veg. i. 44 (1817).  
*C. pilosa*, Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges. Halle 102 (1873).  
*C. strigosa*, (R.Br.) Roem. et Schultz, Syst. Veg. i. 43 (1817).  
*C. exserta*, (R.Br.) Roem. et Schultz. l. c. 44.

## Xyridaceae.

1. *XYRIS*, Linn. Gen. Pl. ii. (1737).  
*X. complanata*, R.Br. Prodr. 256 (1810).  
*X. pauciflora*, Willd. Phyt. 2. t. 1 (1794).  
*X. lacera*, R.Br. Prodr. 257 (1810).  
*X. flexifolia*, R.Br. l. c. 256.  
*X. lanata*, R.Br. l. c. 257.  
*X. laxiflora*, F.v.M. Fragm. viii. 203 (1874).  
*X. gracillima*, F.v.M. l. c. 203.

## Eriocaulaceae.

1. *ERIOCAULON*, Linn. Gen. Pl. ed. 2. 35 (1742).  
*E. setaceum*, Linn. Sp. Pl. 87 (1753).  
*E. quinquangulare*, Linn. l. c. 87.  
*E. cinereum*, R.Br. Prodr. 254 (1810).  
*E. nigricans*, R.Br. l. c. 254.  
*E. lividum*, F.v.M. Fragm. i. 92 (1858).

## Commelinaceae.

1. *CYANOTIS*, D. Don. Prodr. Fl. Nep. 45 (1825).  
*C. axillaris*, D. Don. Prodr. Fl. Nep. 46 (1825).
2. *COMMELINA*, (Plum.) Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*C. ensifolia*, R.Br. Prodr. 269 (1810).  
*C. lanceolata*, R.Br. l. c. 269.
3. *ANEILEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 270 (1810).  
*A. gramineum*, R.Br. Prodr. 270 (1810).
4. *CARTONEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 271 (1810).  
*C. philydroides*, F.v.M. Fragm. i. 62 (1858).  
*C. spicatum*, R.Br. Prodr. 271 (1810).  
*C. parviflorum*, Hassk. Flora Regensb. 365 (1869).

## Pontederiaceae.

1. *MONOCHORIA*, Presl. Reliq. Haenk. i. 127 (1827).  
M. cynea, F.v.M. Fragm. viii. 44 (1872).

## Philydraceae.

1. *PHILYDRUM*, Banks in Gaertn. Fruct. i. 62 (1788).  
P. lanuginosum, Banks in Gaertn. Fruct. i. 62 (1788).
2. *PRITZELIA*, F.v.M. Papuan Plants. 13 (1875).  
P. pygmaea, (R.Br.) F.v.M. Papuan Plants 13 (1875).

## Juncaceae.

1. *JUNCUS*, Linn. Gen. Pl. ed. i. 104 (1737).  
J. gracilis, R.Br. Prodr. 259 (1810).  
J. planifolius, R.Br. l. c. 259.  
J. caespitius, E. Mey. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 47 (1846).  
J. bufonius, Linn. Sp. Pl. 328 (1753).  
J. plebius, R.Br. Prodr. 259 (1810). (*J. homalocaulis*, F.v.M.)  
J. effusus, Linn. Sp. Pl. ed. i. 326 (1753). (*J. communis*, E. Mey.)  
J. pallidus, R.Br. Prodr. 258 (1810).  
J. radula, Buchenau Krit. Verzeichn. aller Juncac. 38 (1880).  
J. maritimus, Lam. Encycl. Meth. iii. 264 (1789).  
J. polyanthemus, Buchen, in Engler's Botan. Jahrb. xx. 261 (1895).  
J. holoschoenus, R.Br. Prodr. 259 (1810).
2. *LUZULA*, D. C. Fl. France, iii. 158 (1805).  
L. campestris, D. C. Fl. France, iii. 161 (1805).

## Liliaceae.

1. *BURCHARDIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 272 (1810).  
B. umbellata, R.Br. Prodr. 273 (1810).  
B. multiflora, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
2. *WURMBAEA*, Thunb. Nov. Gen. i. 18. t. 1 (1781). (*Anguillaria*, R.Br. p.p.)  
W. tubulosa, Benth. Fl. Austr. vii. 28 (1878).  
W. pygmaea (Endl.) Benth. l. c. 28.  
W. dioica, (R.Br.) F.v.M. Fragm. x. 119 (1877).
3. *IPHIGENIA*, Kunth, Enum. Pl. iv. 212 (1843).  
I. indica, Kunth. enum. Pl. iv. 213 (1843).  
*ASPHODELUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).  
\**A. fistulosus*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
4. *BULBINE*, Linn. Hort. Cliff. 122 (1737).  
B. semibarbata, (R.Br.) Haw. Rev. Pl. Suecul. 33 (1821).
5. *THYSANOTUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 282 (1810).  
T. multiflorus, R.Br. Prodr. 285 (1810).  
T. triandrus, (Labill) R.Br. l. c. 284.  
T. Bentianus, Ewart et J. White, in Proc. Roy. Soc. Vict. n. s. xxi. 546 (1909).  
T. glaucus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 38 (1846).  
T. Drummondii, Baker in Journ. Linn. Soc. xv. 341 (1876).  
T. pauciflorus, R.Br. Prodr. 285 (1810).  
T. asper, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).  
T. gageoides, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 99 (1904).  
T. chinensis, Benth. Fl. Hong kong. 37 (1861). (*T. chrysantherus*, F.v.M.)  
T. isantherus, R.Br. Prodr. 283 (1810).  
T. tenellus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 37 (1846).  
T. scaber, Endl. in l. c. 37.  
T. tuberosus, R.Br. Prodr. 282 (1810).  
T. thyrsoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 336 (1876).  
T. Patersoni, R.Br. Prodr. 284 (1810).  
T. dichotomus, (Labill) R.Br. l. c. 284.  
T. arbuscula, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 339 (1876).  
T. anceps, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
6. *DICHOPOGON*, Kunth. Enum. Pl. iv. 622 (1843).  
D. strictus, (R.Br.) J. G. Baker in Journ. Linn. Soc. xv. 319 (1876).  
D. fimbriatus (R.Br.) Macbride in Contr. Gray Herb. in. s. lvi. 2 (1918).  
(*D. Sieberianus*, Kunth.)

7. *ARTHROPODIUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 276 (1810).  
A. capillipes, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 34 (1846).  
A. Preissii, Endl. in l. c. 35.
8. *CHAMAESCILLA*, F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).  
C. corymbosa, (R.Br.) F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).  
C. spiralis, (Endl.) F.v.M. l. c. 68.
9. *TRICORYNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 278 (1810).  
T. elatior, R.Br. Prodr. 278 (1810).  
T. humilis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 36 (1846).
10. *AGROSTOCRINUM*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. ii. 95 (1860).  
A. scabrum (R.Br.) Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1119 (1893). (*A. stypanroides*, F.v.M.)
11. *CAESIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 277 (1810).  
C. vittata, R.Br. Prodr. 277 (1810).  
C. parviflora, R.Br. l. c. 277.  
C. rigidifolia, F.v.M. Fragm. x. 48 (1876).
12. *CORYNOTHECA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. vii. 68 (1870).  
C. lateriflora, (R.Br.) F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).  
C. micrantha, (Lindl.) Macbride, Contr. Grey. Herb. lvi. 3 (1918). (*C. dichotoma*, F.v.M.)  
C. acanthoclada, F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
13. *HODGSONIOLA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. ii. 176 (1861).  
H. junciformis, F.v.M. Fragm. ii. 176 (1861).
14. *STYPANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 278 (1810).  
S. imbricata, R.Br. Prodr. 279 (1810).  
S. grandiflora, Lindl. Swan Riv. App. 57 (1839).
15. *DIANELLA*, Lam. Encycl. Mèth. ii. t. 250 (1786).  
D. revoluta, R.Br. Prodr. 280 (1810).  
D. coerulea, Sims. Bot. Mag. t. 505 (1799).
16. *BARTLINGIA*, F.v.M. Fragm. vii. 88 (1870). (*Laxmannia*, R.Br. non Forst.)  
B. grandiflora, (Lindl.) F.v.M. Cens. Austr. Pl. 118 (1882).  
B. squarrosa, (Lindl.) F.v.M. l. c. 118.  
B. minor, (R.Br.) F.v.M. l. c. 118.  
B. ramosa, (Lindl.) F.v.M. Fragm. vii. 88 (1870).  
B. sessiliflora, (Dcne) F.v.M. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 116 (1877).  
B. brachyphylla, F.v.M. Cens. Austr. P. 119 (1882).  
B. sessilis, (Lindl.) F.v.M. l. c. 119.
17. *SOWERBAEA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. v. 159 (1800).  
S. multicaulis, E. Pritzel, in Engler's Jahrb. xxxv. 99 (1904).  
S. laxiflora, Lindl. Bot. Reg. t. 10 (1841).
18. *STAWELLIA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. vii. 85 (1870).  
S. dimorphantha, F.v.M. Fragm. vii. 85 (1870).  
S. gymnocephala, Diels, in Engler's Jahrb. xxxv. 100 (1904).
19. *BORYA*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 81 t. 107 (1804).  
B. nitida, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 81. t. 107 (1804).  
B. subulata Gardner Bull. For. Dep. xxxii. 38 (1923).
20. *JOHNSONIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 287 (1810).  
J. lupulina, R.Br. Prodr. 287 (1810).  
J. pubescens, Lindl. Swan. Riv. App. 57 (1839).  
J. acaulis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).
21. *HENSMANIA*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 105 (1903).  
H. turbinata, (Endl.) W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 106 (1903).
22. *ARNOCRINUM*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).  
A. Drummondii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).  
A. Preissii, Lehm. in l. c. 42.
23. *DASYPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 263 (1810).  
D. bromeliaefolius, R.Br. Prodr. 263 (1810).  
D. Hookeri, Drumm. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 168 (1843).

24. *ACANTHOCARPUS*, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 274 (1847).  
*A. Preissii*, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 274 (1847).  
*A. serra*, (Endl.) Ewart, Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 220 (1916).  
*A. fimbriata*, (F.v.M.) Ewart, l. c. 220.
25. *LOMANDRA*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 92 (1804). (*Xerotes*, R.Br.)  
*L. rigida*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 93. t. 120 (1804).  
*L. Drummondii*, (F.v.M.) Ewart, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).  
*L. Sonderi*, (F.v.M.) Ewart, l. c. 219.  
*L. odora*, (Endl.) Ewart, l. c. 219.  
*L. multiflora*, (R.Br.) J. Britt. in Bot. Cook's Voy. 95 (1905).  
*L. Ordii*, (F.v.M.) Ewart in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).  
*L. Endlicheri*, (F.v.M.) Ewart, l. c. 219.  
*L. sericea*, (Endl.) Ewart, l. c. 219.  
*L. purpurea*, (Endl.) Ewart, l. c. 219.  
*L. Preissii*, (Endl.) Ewart, l. c. 219.  
*L. effusa*, (Lindl.) Ewart, l. c. 219.  
*L. micrantha*, (Endl.) Ewart, l. c. 219.  
*L. caespitosa*, (Benth.) Ewart, l. c. 220.  
*L. hermaphrodita*, (C. Andrews) Gardner. n. comb.  
*L. pauciflora*, (R.Br.) Ewart, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).  
*L. glauca*, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.  
*L. rupestris*, (Endl.) Ewart, l. c. 220.  
*L. collina*, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.  
*L. suaveolens*, (Endl.) Ewart, l. c. 220.  
*L. spartea*, (Endl.) Ewart, l. c. 220.  
*L. leucocephala*, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.  
*L. hastilis*, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
26. *XANTHORRHOEA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 219 (1798).  
*X. gracilis*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39 (1847).  
*X. reflexa*, Herbert, in Journ. Roy. Soc. W.A. vi. pt. i. 33 (1920).  
*X. brevistyla*, Herbert, l. c. vii. 82 (1921).  
*X. Preissii*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39 (1847).  
*X. nana*, Herbert, in Journ. Roy. Soc. W.A. vii. 83 (1921).
27. *KINGIA*, R.Br. in King's Narr. and Surv. Austr. Coasts, ii. 529 (1827).  
*K. australis*, R.Br. in l. c. ii. 535, t. c. (1827).
28. *BAXTERIA*, R.Br. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 492. t. 13-15 (1843).  
*B. australis*, R.Br. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 492. t. 13-15 (1843).
29. *CALECTASIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 263 (1810).  
*C. cyanea*, R.Br. Prodr. 264 (1810).
30. *ASPARAGUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*A. racemosus*, Willd. Sp. Pl. ii. 152 (1799).
31. *RHIPOGONUM*, Forst. Char. Gen. 49. t. 25 (1776).  
*R. album*, R.Br. Prodr. 293 (1810).

#### Haemodoraceae.

1. *HAEMODORUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. 213 (1798).  
*H. sparsiflorum*, F.v.M. Fragm. vii. 117 (1870).  
*H. spicatum*, R.Br. Prodr. 300 (1810).  
*H. brevisepalum*, Benth. Fl. Austr. vi. 420 (1873).  
*H. paniculatum*, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).  
*H. laxum*, R.Br. Prodr. 300 (1810).  
*H. simplex*, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).  
*H. simulans*, F.v.M. Fragm. vii. 117 (1870).  
*H. longifolium*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 127 (1918).  
*H. flaviflorum*, W. V. Fitzg. in l. c. 128.  
*H. parviflorum*, Benth. Fl. Austr. vi. 423 (1873).
2. *PHLEBOCARYA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 301 (1810).  
*P. ciliata*, R.Br. Prodr. 301 (1810).  
*P. pilosissima*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 425 (1873).  
*P. filifolia*, (F.v.M.) Benth. l. c. 425.



## Amaryllidaceae.

1. *CRINUM*, Linn. Gen. Pl. 97 (1737).  
C. asiaticum, Sp. Pl. 292 (1753).
2. *HYPOXIS*, Linn. Syst. ed. x. 986 (1759).  
H. glabella, R.Br. Prodr. 289 (1810).  
H. occidentalis, Benth. Fl. Austr. vi. 451 (1873).  
H. leptantha, Benth. l. c. 451.
3. *MACROPIDIA*, Drumm. e. Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 57 (1855).  
M. fuliginosa, (Hook) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles, 1916, 634 (1917). (*M. fumosa*, Drumm.)
4. *TRIBONANTHES*, Endl. Nov. Stirp. dec. i. 27 (1839).  
T. brachypetala, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).  
T. uniflora, Lindl. l. c. 44.  
T. australis, Endl. Nov. Stirp. dec. i. 27 (1839).  
T. variabilis, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).  
T. longipetala, Lindl. l. c. 44.
5. *BLANCOA*, Lindl. Swar Riv. App. 45 (1839).  
B. canescens, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
6. *CONOSYLLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 300 (1810).  
C. Androstemma, F.v.M. Fragm. viii. 19 (1873). (*A. junceum*, Lindl. 1839.)  
C. Bealiana, F.v.M. Fragm. ix. 50 (1875).  
C. filifolia, F.v.M. l. c. viii. 18 (1873).  
C. spinuligera, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 438 (1873).  
C. bromelioides, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).  
C. phathyrantha, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 111 (1904).  
C. aculeata, R.Br. Prodr. 300 (1810).  
C. laxiflora, Benth. Fl. Austr. vi. 439 (1873).  
C. cymosa, (F.v.M.) Benth. l. c. 439.  
C. Harperiana, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 106 (1904).  
C. serrulata, R.Br. Prodr. 300 (1810).  
C. caricina, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).  
C. gladiata, Benth. Fl. Austr. vi. 434 (1873).  
C. seorsiflora, F.v.M. Fragm. i. 158 (1859).  
C. teretiuscula, F.v.M. l. c. viii. 18 (1872).  
C. stylidioides, F.v.M. l. c. 17.  
C. prolifera, Benth. Fl. Austr. vi. 436 (1873).  
C. racemosa, Benth. l. c. 436.  
C. candicans, Endl. Nov. Stirp. dec. 20 (1839).  
C. dealbata, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).  
C. Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).  
C. robusta, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 109 (1904).  
C. bracteata, Engl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 16 (1846).  
C. involucrata, Endl. l. c. 23.  
C. juncea, Endl. Nov. Stirp. dec. 19 (1839).  
C. vaginata, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 23 (1846).  
C. petrophiloides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 431 (1873).  
C. setosa, Lindl. Swan Riv. App. 44 t. 6 (1839).  
C. aurea, Lindl. l. c. 44.  
C. melanopogon, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).  
C. setigera, R.Br. Prodr. 300 (1810).  
C. psyllium, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 1 (1846).  
C. Dielsii, W. V. Fitzg. in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. i. n. 11 82 (1903).  
C. villosa, Benth. Fl. Austr. vi. 433 (1873).  
C. Drummondii, Benth. l. c. 433.  
C. breviscapa, R.Br. Prodr. 301 (1810).
7. *ANIGOZANTHOS*, Labill. Voy. i. 409, t. 22 (1798).  
A. rufa, Labill. Voy. i. 411. t. 22 (1798).  
A. pulcherrima, Hook. Bot. Mag. t. 4180 (1845).  
A. flavida, Redoute et D.C. Lil. t. 176 (1807).  
A. Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 26 (1846).  
A. humilis, Lindl. Swan Riv. App. 46. t. 6b (1839). (*A. Dorrienii*, Domin.)  
A. viridis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 25 (1847).  
A. Manglesii, D. Don in Sweet Brit. Fl. Gard. ser. ii. t. 265 (1836).  
A. bicolor, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 26 (1847). (*A. Gabrielae*, Domin.)

**Taccaceae.**

1. *TACCA*, Forst Char. Gen. 65 (1776).  
*T. pinnatifida*, R. et G. Forst, Char. Gen. 65 (1776).

**Dioscoreaceae.**

1. *DIOSCOREA*, (Plum.) Linn. Gen. ed. i. 306 (1737).  
*D. hastifolia*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 33 (1846).

**Iridaceae.**

*ROMULEA*, Maratti, Diss. Romul. et Saturn. Romae. 13. t. 1 (1772).

\**R. rosea*, (Linn.) Eckl. (Afr. austr.)

\**R. parviflora*, (Salisb.) J. Britten. (Europ. oec.)

*HOMERIA*, Vent. Dec. Gen. Nov. 5 (1808).

\**H. collina*, (Thunb.) Vent. (Afr. austr.).

\**H. miniata*, Sweet. (Afr. austr.)

1. *PATERSONIA*, R.Br. in Bot. Mag. t. 1041 (1807).  
*P. occidentalis*, R.Br. Prodr. 304 (1810).  
*P. umbrosa*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 31 (1846).  
*P. xanthina*, F.v.M. Fragm. i. 214 (1859).  
*P. limbata*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 29 (1846).  
*P. juncea*, Lindl. Swan River App. 58 (1839).  
*P. Maxwellii*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 405 (1873).  
*P. pygmaea*, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).  
*P. lanata*, R.Br. Prodr. 303 (1810).  
*P. rudis*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 29 (1846).  
*P. macrantha*, Benth. Fl. Austr. vi. 407 (1873).  
*P. Drummondii*, (F.v.M.) Benth. l. c. 407.  
*P. inaequalis*, Benth. l. c. 408.  
*P. graminea*, Benth. l. c. 408.  
*P. babianoides*, Benth. l. c. 408.
2. *ORTHROSANTHUS*, Sweet, Fl. Austral. t. 11 (1827).  
*O. multiflorus*, Sweet, Fl. Austr. t. 11 (1827).  
*O. Muelleri*, Benth. Fl. Austr. vi. 411 (1872?).  
*O. laxus*, (Endl.) Benth. l. c. 411.  
*O. gramineus*, (Endl.) Benth. l. c. 411.  
*O. polystachyus*, Benth. l. c. 411.

**MICROSPERMAE.****Burmanniaceae.**

1. *BURMANNIA*, Linn. Syst. Nat. 8 (1737).  
*B. disticha*, Linn. Sp. Pl. 287 (1753).

**Orchidaceae.**

## II. Monandrae-Acrotonae.

## a.—Acranthae-Convolvutae.

*Thelymitreae.*

1. *THELYMITRA*, Forst. Char. Gen. 97 (1776).  
*T. ixioides*, Swartz, in K. Acad. Stockh. Handl. 228, t. 3 (1800).  
*T. canaliculata*, R.Br. Prodr. 314 (1810).  
*T. crinita*, Lindl. Swan Riv. App. 49 (1839).  
*T. fasciculata*, Fitzg. Austr. Orc. ii. t. 29 (1888).  
*T. aristata*, Lindl. Gen. et. sp. Orch. 521 (1840).  
*T. longifolia*, Forst. Char. Gen. 98, t. 49 (1776).  
*T. pauciflora*, R.Br. Prodr. 314 (1810).  
*T. mucida*, Fitz. in Gard. Chron. ii. 497 (1882).  
*T. villosa*, Lindl. Swan Riv. App. 49, t. 8c (1839).  
*T. tigrina*, R.Br. Prodr. 315 (1810).  
*T. stellata*, Lindl. Swan Riv. App. 49 (1839).  
*T. fusco-lutea*, R.Br. Prodr. 315 (1810).  
*T. flexuosa*, Endl. Nov. Stirp. Dec. 23 (1839).  
*T. antennifera*, (Lindl.) Hook, f. Fl. Tasm. ii. 4, t. 101a (1860).  
*T. psammophila*, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 57 (1905).  
*T. carnea*, R.Br. Prodr. 314 (1810).  
*T. Maemillani*, F.v.M. Fragm. v. 93 (1865).  
*T. variegata*, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vi. 323 (1873).

2. *EPIBLEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 315 (1810).  
E. grandiflorum R.Br. Prodr. 315 (1810).

*Diurideae.*

3. *DIURIS*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 122 (1798).  
D. laevis Fitzg. in Gard. Chron. xvii. pt. i. 495 (1882).  
D. Purdei, Diels, in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. ii. 79 (1903).  
D. setacea, R.Br. Prodr. 316 (1810).  
D. emarginata, R.Br. l. c. 316.  
D. longifolia, R.Br. l. c. 316.  
D. pauciflora, R.Br. l. c. 316.  
D. carinata, Lindl. Gen et Sp. Orch. 510 (1840).
4. *MICROTIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 320 (1810).  
M. porrifolia, R.Br. Prodr. 320 (1810).  
M. truncata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlv. 326 (1920).  
M. parviflora, R.Br. Prodr. 321 (1810).  
M. media, R.Br. l. c. 321.  
M. alba, R.Br. l. c. 321.  
M. orbicularis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xxxi. 63 (1907).  
M. atrata, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).  
M. pulchella, R.Br. Prodr. 321 (1810).  
M. gymnadenoïdes, Diels, in Journ. Muell. Bot. Soc. ii. 79 (1903).
5. *GOADBYELLA*, Rogers, in Trans. Roy. Soc. South Australia, li. 294 (1927).  
G. gracilis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S.A. li. 294 (1927).
6. *PRASOPHYLLUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 317 (1810).  
P. australe R.Br. Prodr. 318 (1810).  
P. elatum, R.Br. l. c. 318.  
P. muelleri, C. Andrews, in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. Ser. I. ix. 19 (1903).  
P. regium, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlii. 27 (1918).  
P. lanceolatum, Rogers, in l. c. xlv. 325 (1920).  
P. ellipticum, Rogers, in l. c. 325.  
P. fimbria, Reichb. fl. Beitr. 60 (1871).  
P. hians, Reichb. f. l. c. 59.  
P. cyphochilum, Benth. Fl. Austr. vi. 340 (1873).  
P. ovale, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).  
P. macrostachyum, R.Br. Prodr. 318 (1810).  
P. attenuatum, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 495 (1882).  
P. plumaeforme, R. Fitzg. l. c. 495.  
P. triangulare, R. Fitzg. l. c. 495.  
P. parvifolium, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).  
P. gibbosum, R.Br. Prodr. 318 (1810).  
P. cucullatum, Reichb. fl. Beitr. 59 (1871).

*Pterostylideae.*

7. *CALEANA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 329 (1810).  
C. nigrita, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
8. *SPICULAEA*, Lindl. Swan Riv. Append. 56 (1839).  
S. ciliata, Lindl. Swan Riv. App. 56 (1839).
9. *DRAKAEA*, Lindl. Bot. Reg. xxv. App. 55 (1834).  
D. elastica, Lindl. Swan Riv. App. 55 (1839).  
D. Fitzgeraldii, Schltr. in Fedde, Repert. Spec. Nov. xvii. 81 (1921).  
D. glyptodon, Fitzg. in Gard. Chron. i. 494 (1882).  
D. Jeanensis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S.A. xlv. 322. t. 13 (1920).
10. *PTEROSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 326 (1810).  
P. nana, R.Br. Prodr. 327 (1810).  
P. pyramidalis, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).  
P. reflexa, R.Br. Prodr. 327 (1810).  
P. robusta, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. ii. 296 (1927).  
P. constricta, O. H. Sargent, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. iv. 24 (1907).  
P. recurva, Benth. Fl. Austr. vi. 360 (1873).  
P. turfosa, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 5 (1846).  
P. rufa, R.Br. Prodr. 327 (1810).  
P. Sargentii, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 57 (1905).  
P. vittata, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).

*Caladenieae.*

11. *ACIANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 321 (1810).  
A. exsertus, R.Br. Prodr. 321 (1810)—A species stated to occur in Western Australia, but no authentic record seen by me.
12. *CYRTOSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 322 (1810).  
C. reniformis, R.Br. Prodr. 322 (1810).
13. *CALOCHILUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 320 (1810).  
C. Robertsoni, Benth. Fl. Austr. vi. 315 (1873).
14. *ERIOCHILUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 323 (1810).  
E. scaber Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).  
E. tenuis, Lindl. l. c. 53.  
E. dilatatus, Lindl. l. c. 53.  
E. multiflorus Lindl. l. c. 53.
15. *LYPERANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 325 (1810).  
L. nigricans R.Br. Prodr. 325 (1810).  
L. serratus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 393 (1840).  
L. Forrestii, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. 55 (1882).
16. *LEPTOCERAS*, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).  
L. fimbriata, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).
17. *CALADENIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 323 (1810).  
C. Menziesii, R.Br. Prodr. 325 (1810).  
C. Bryceana, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xxxviii. 359. t. 18 (1914).  
C. discoidea, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).  
C. Cairnsiana, F.v.M. Fragm. vii. 31 (1869).  
C. multiclavia, Reichb. fl. Beitr. 64 (1871).  
C. reticulata, R. Fitzg. Austr. Orch. II. ix. 2 (1883).  
C. filamentosa, R.Br. Prodr. 324 (1810).  
C. Dorrieni, Domin, in Journ. Linn. Soc. xli. 251 (1913).  
C. tentaculata, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xii. 130 (1889).  
C. Patersoni, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 324 (1810) v. Longicauda, (Lindl.) Rogers.  
C. pectinata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlv. 352 (1920).  
C. lobata, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 461 (1882).  
C. dilatata, R.Br. Prodr. 325 (1810).  
C. radialis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 296 (1927).  
C. clavigera, A. Cunn. ex Lindl. Gen et Sp. Orch. 422 (1840).  
C. plicata, R. Fitzg. in Gard. Chron. vii. i. 461 (1882).  
C. cristata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlvii. 337 (1923).  
C. macrostylis, Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 462 (1882).  
C. Drummondii, Benth. Fl. Austr. vi. 383 (1873).  
C. triangularis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 10 (1927).  
C. hirta, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).  
C. lavandulacea, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 11 (1927).  
C. Roei, Benth. Fl. Austr. vi. 383 (1873).  
C. Douthae, O. H. Sargent, in Journ. Bot. lix. 175 (1921).  
C. Barbarossae, Reichb. fl. Beitr. 64 (1871).  
C. flava, R.Br. Prodr. 324 (1810).  
C. paniculata, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. I. 461 (1882).  
C. Purdieana, C. Andrews, in Journ. Proc. Muell. Bot. Soc. i. 39 (1902).  
C. unita, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 461 (1882).  
C. latifolia, R.Br. Prodr. 324 (1810).  
C. reptans, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).  
C. nana, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 7 (1846).  
C. tenuis, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 462 (1882).  
C. carnea, R.Br. Prodr. 324 (1810).  
C. aphylla, Benth. Fl. Austr. vi. 387 (1873).  
C. saccharata, Reichb. fl. Beitr. 63 (1871).  
C. deformis, R.Br. Prodr. 324 (1810).  
C. sericea, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).  
C. gemmata, Lindl. l. c. 52. (*C. Gertrudae*, Ostf.)  
C. ixioides, Lindl. l. c. 52.
18. *GLOSSODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 325 (1810).  
G. Brunonis, Endl. Nov. Stirp. Dec. 16 (1839).  
G. intermedia, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. I. 462 (1882).  
G. emarginata, Lindl. Gen et Sp. Orch. 424 (1840).

*Pogoniceae.*

19. *CORYSANTHES*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 328 (1810).  
*C. fimbriata*, R.Br. Prodr. 328 (1810).
20. *CRYPTOSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 317 (1810).  
*C. ovata*, R.Br. Prodr. 317 (1810).

*Gastrodiinae.*

21. *GASTRODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 330 (1810).  
*G. sesamoides*, R.Br. Prodr. 330 (1810).

*Rhizanthellinae.*

22. *RHIZANTHELLA*, Rogers, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiv. 1. (1929).  
*R. Gardneri*, Rogers, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiv. 1. (1929).

## Pleuranthae.

*Convolutae.**Cryptopodiinae.*

23. *EULOPHIA*, R.Br. (ex. Lindl.) in Bot. Reg. t. 686 (1823).  
*E. venosa*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 300 (1873).

## II.—DUPLICATE.—Sympodiales.

*Dendrobiinae.*

24. *DENDROBIUM*, Swartz, in Nov. Act. Upsal. vi. 82 (1799).  
*D. dicuphum*, F.v.M. Fragm. viii. 28 (1871).

*Cymbidiinae.*

25. *CYMBIDIUM*, Swartz, in Nov. Act. Upsal. vi. 70 (1799).  
*C. canaliculatum*, R.Br. Prodr. 331 (1810).

## DICOTYLEDONEAE.

## ARCHICHLAMYDEAE.

## Casuarinaceae.

1. *CASUARINA*, (Rumph.) Linn. Amoen. Acad. iv. 143 (1759).  
*C. Stowardi*, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 193 (1920).  
*C. acutivalvis*, F.v.M. Fragm. x. 61 (1876).  
*C. glauca*, Sieber, in Spreng. Syst. Veg. iii. 803 (1826).  
*C. Prinsepiana*, C. Andrews, in Journ. W. Austr. Nat. Hist. Soc. i. 43 (1904).  
*C. lepidophloia*, F.v.M. Fragm. x. 115 (1877).  
*C. Huegeliana*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 640 (1846). (*C. Dorrienii*,  
 Domin.)  
*C. campestris*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 126 (1904).  
*C. Fraseriana*, Miq. Rev. Crit. Cas. 59, t. 6d (1848).  
*C. Baxteriana*, Miq. Rev. Cas. 37. t. 3c (1848).  
*C. bicuspidata*, Benth. Fl. Austr. vi. 202 (1873).  
*C. trichodon*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 639 (1845).  
*C. corniculata*, F.v.M. Fragm. x. 62 (1876). (*C. horrida*, Herbert; *C. spinosissima*, Gardn.)  
*C. decussata*, Benth. Fl. Austr. vi. 200 (1873).  
*C. Decaisneana*, F.v.M. Fragm. i. 61 (1858).  
*C. Helmsii*, Ewart et Gordon, in Proc. Roy. Soc. Vict. n. s. xxxii, 192 (1920).  
*C. humilis*, Otto et Dietr. Allg. Gartenz. ix. 163 (1841). (*C. leptotrema*, S.  
 Moore.)  
*C. Drummondiana*, Miq. Rev. Crit. Casuar. xxvi. t. 1d (1848).  
*C. microstachya*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 642 (1845).  
*C. thuyoides*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 641 (1845).  
*C. acuaria*, F.v.M., in Journ. Bot. v. 212 (1868).  
*C. fibrosa*, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 61 (1928).  
*C. grevilleoides*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 130 (1904).

## URTICALES.

## Ulmaceae.

1. *CELTIS*, (Tourn.) Linn. Gen. ed. I. 337 (1737).  
*C. philippinensis*, Blanco, Fl. Philip. ed. i. 197 (1837).
2. *TREMA*, Lour. Fl. Cochinchin. 562 (1790).  
*T. aspera*, Blume, Mus. Bot. Ludg. Batav. ii. 58 (1851).

## Moraceae.

1. *FICUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
  - F. nesophila*, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 286 (1867).
  - F. eugenioides*, F.v.M. Docum. Intern. Exhib. 26 (1866).
  - F. leucotricha*, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 285 (1867).
  - F. puberula*, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. vi. 562 (1847).
  - F. platypoda*, A. Cunn. l. c. 561.
  - F. coronulata*, F.v.M. in Journ. Bot. Neerland. 241 (1861).
  - F. scabra*, Forst. f. Prodr. 76 (1786).
  - F. orbicularis*, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. vii. 426 (1848).
  - F. aculeata*, A. Cunn. l. c. 426.
  - F. scobina*, Benth. Fl. Austr. vi. 176 (1873).
  - F. hispida*, Linn. fil. Suppl. 442 (1781).
  - F. glomerata*, Willd. Sp. Pl. iv. 1148 (1806).

## Urticaceae.

*URTICA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1753).

\**U. urens*, Linn. (Cosmop.)

1. *POUZOLSIA*, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 503 (1826).
  - P. indica*, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 503 (1826).
2. *PARIETARIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
  - P. debilis*, Forst. fil. Prodr. 73 (1786).

## PROTEALES.

## Proteaceae.

## I.—Persoonioideae.

1. *PERSOONIA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 215 (1798).
  - P. hakeiformis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
  - P. teretifolia*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 160 (1810).
  - P. saccata*, R.Br. Prodr. Suppl. 12 (1830).
  - P. Saundersiana*, Kipp. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
  - P. diadema*, F.v.M. Fragm. x. 46 (1876).
  - P. comata*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 71 (1855).
  - P. brachystylis*, F.v.M. Fragm. vi. 221 (1868).
  - P. falcata*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 162 (1810).
  - P. trinervis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
  - P. tortifolia*, Meissn. l. c. 185.
  - P. angustiflora*, Benth. Fl. Austr. v. 386 (1870).
  - P. rudis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
  - P. microcarpa*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 160 (1810).
  - P. sulcata*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
  - P. acicularis*, F.v.M. Fragm. vi. 220 (1868).
  - P. scabrella*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
  - P. dillwynioides*, Meissn. l. c. iv. 185 (1852).
  - P. striata*, R.Br. Prodr. Suppl. 13 (1830).
  - P. quinquenervis*, Hook. Ic. Pl. t. 425 (1842).
  - P. rufflora*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
  - P. scabra*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 162 (1810).
  - P. graminea*, R.Br. l. c. 164.
  - P. longifolia*, R.Br. l. c. 164.
  - P. articulata*, R.Br. l. c. 164.
  - P. elliptica*, R.Br. l. c. 164.
  - P. leucopogon*, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 220 (1898).
2. *FRANKLANDIA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 157 (1810).
  - F. fucifolia*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 157 (1810).
  - F. triaristata*, Benth. Fl. Austr. v. 377 (1870).
3. *ISOPOGON*, R.Br. ex Knight, Prot. 93 (1809).
  - I. latifolius*, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).
  - I. cuneatus*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
  - I. linearis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).
  - I. polycephalus*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
  - I. attenuatus*, R.Br. l. c. 73.
  - I. sphaerocephalus*, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).
  - I. uncinatus*, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).

- I. buxifolius*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).  
*I. axillaris*, R.Br. l. e. 74.  
*I. tridens*, F.v.M. Fragm. vi. 239 (1868).  
*I. Baxteri*, R.Br. Prodr. Suppl. 9 (1830).  
*I. roseus*, Lindl. Bot. Reg. 37 (1842).  
*I. adenanthoides*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).  
*I. trilobus*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 72 (1810).  
*I. tripartitus*, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).  
*I. longifolius*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).  
*I. Drummondii*, Benth. Fl. Austr. v. 344 (1870).  
*I. heterophyllus*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 504 (1844).  
*I. villosus*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).  
*I. aleicornis*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 134 (1904).  
*I. teretifolius*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 71 (1810).  
*I. asper*, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).  
*I. erithmifolius*, F.v.M. Fragm. vi. 239 (1868).  
*I. formosus*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 72 (1810). (*I. occidentalis*, Herbert.)  
*I. divergens*, R.Br. Prodr. Suppl. 7 (1830).  
*I. scabriuseculus*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 182 (1852).
4. *PETROPHILA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 67 (1810).  
*P. teretifolia*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 68 (1810).  
*P. longifolia*, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).  
*P. media* R.Br. l. e. 5.  
*P. acicularis* R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 69 (1810).  
*P. megalostegia* F.v.M. Fragm. x. 61 (1876).  
*P. linearis* R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).  
*P. anceps*, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).  
*P. heterophylla*, Lindl. Swan Riv. App. 35 (1839).  
*P. biloba*, R.Br. Prodr. Suppl. 7. (1830).  
*P. propinqua*, R.Br. l. e. 7.  
*P. squamata*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).  
*P. colorata*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 246 (1847).  
*P. striata*, R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).  
*P. divaricata*, R.Br. l. e. 7.  
*P. serruriae*, R.Br. l. e. 6.  
*P. inconspicua*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 68 (1855).  
*P. trifida*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).  
*P. carduacea*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 182 (1852).  
*P. Shuttleworthiana*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 246 (1847).  
*P. macrostachya*, R.Br. Prodr. Suppl. 7 (1830).  
*P. diversifolia*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).  
*P. biternata*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).  
*P. plumosa*, Meissn. l. e. 69.  
*P. glabriflora*, Domin. New Add. Flora W.A. 3 (1923).  
*P. ericifolia*, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).  
*P. scabriusecula*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 495 (1844).  
*P. chrysantha*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 68 (1855).  
*P. fastigiata*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 76 (1810).  
*P. seminuda*, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).  
*P. circinata*, Kippist, ex. Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 67 (1855).  
*P. Drummondii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 496 (1844).  
*P. crispata*, R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).  
*P. rigida*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 69 (1810).  
*P. conifera*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 67 (1855).  
*P. semifurcata*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 335 (1870).  
*P. incurvata*, W. V. Fitzg. in Journ. Bot. 1. 22 (1912).
5. *ADENANTHOS*, Labill. Nov. Holl. Pl. sp. i. 28. t. 36 (1804).  
*A. Detmoldi*, F.v.M. Fragm. viii. 149 (1874).  
*A. barbiger*, Lindl. Swan Riv. App. 36 n. 182 (1839). (*A. intermedius*, Ostf.)  
*A. obovata*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 29. t. 37 (1804).  
*A. cuneata*, Labill. l. e. 28. t. 36.  
*A. Cunninghamii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 513 (1845).  
*A. pungens*, Meissn. l. e. 515.

- A. venosa*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).  
*A. Dobsoni*, F.v.M. Fragm. vi. 204 (1868).  
*A. Forrestii*, F.v.M. in Wing's South. Sci. Rec. ii. 230 (1882).  
*A. linearis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).  
*A. sericea*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 29. t. 33 (1804).  
*A. cygnorum*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 138 (1904).  
*A. Meissneri*, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. i. 512 (1844).  
*A. filifolia*, Benth. Fl. Austr. v. 355 (1810).  
*A. flavidiflora*, F.v.M. Fragm. i. 157 (1859).  
*A. argyrea*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 138 (1904). (*A. intricata*, Gardner).  
*A. Drummondii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 514 (1845).  
*A. apiculata*, R.Br. Prodr. Suppl. 9 (1830).
6. *STIRLINGIA*, Endl. Gen. 339 (1838). (*Simsia*, R.Br. 1810.)  
*S. simplex*, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).  
*S. abrotonoides*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 517 (1845).  
*S. teretifolia*, Meissn. in l. c. 515.  
*S. tenuifolia*, (R.Br.) Steud. Nom. ed. II. ii. 644 (1821).  
*S. latifolia*, (R.Br.) Steud. l. c. 644.
7. *SYNAPHAEA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).  
*S. polymorpha*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).  
*S. reticulata*, (Sm.) Gardner, n. comb. (*S. dilatata*, R.Br.)  
*S. favosa*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).  
*S. Preissii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 529 (1845).  
*S. acutiloba*, Meissn. in l. c. 528.  
*S. petiolaris*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).  
*S. decorticans*, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).  
*S. pinnata*, Lindl. l. c. 32.
8. *CONOSPERMUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 213 (1798).  
*C. capitatum*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).  
*C. petiolare*, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).  
*C. teretifolium*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).  
*C. flexuosum*, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).  
*C. aceroseum*, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).  
*C. amoenum*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 522 (1845). (*C. Dorrienii*, Domin.)  
*C. Croninae*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 143 (1904).  
*C. nervosum*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 71 (1855).  
*C. diffusum*, Benth. Fl. Austr. v. 367 (1870).  
*C. glumaceum*, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).  
*C. ephedroides*, (Kipp) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 70 (1855).  
*C. Todii*, F.v.M. Fragm. x. 20 (1876).  
*C. polycephalum*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 249 (1847).  
*C. leianthum*, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 141 (1904).  
*C. Etoniae*, E. Pritzel, in l. c. 141  
*C. caeruleum*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 154 (1810).  
*C. debile*, (Kipp) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 70 (1855).  
*C. scaposum*, Benth. Fl. Austr. v. 369 (1870).  
*C. Huegelii*, R.Br. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 58 (1839).  
*C. densiflorum*, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).  
*C. Brownii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 248 (1847).  
*C. distichum*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).  
*C. floribundum*, Benth. Fl. Austr. v. 373 (1870).  
*C. incurvum*, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).  
*C. brachyphyllum*, Lindl. l. c. 31.  
*C. stoechadis*, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. 208 (1838).  
*C. triplinervium*, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).  
*C. bracteosum*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 518 (1845).  
*C. crassinervium*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 184 (1852).

#### II.—Grevilloideae.

9. *GREVILLEA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 167 (1810).  
*G. pinaster*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).  
*G. obtusifolia*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 187 (1852).



- G. sparsiflora, F.v.M. Fragm. vi. 206 (1868).  
 G. macrostylis, F.v.M. l. c. i. 137 (1859).  
 G. tripartita, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).  
 G. platypoda, F.v.M. Fragm. vi. 205 (1868).  
 G. patentiloba, F.v.M. l. c. i. 137 (1859).  
 G. pectinata, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).  
 G. plurijuga, F.v.M. Fragm. iv. 84 (1864).  
 G. oncogyne, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 149 (1904).  
 G. nudiflora, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).  
 G. stenomera, F.v.M. Fragm. iv. 85 (1864).  
 C. Thelemanniana, Hueg. in Endl. Nov. Stirp. Dec. i. 6 (1839).

*Hebecygne, Benth.*

- G. concinna, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 172 (1810).  
 G. Pritzeli, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 150 (1904).  
 G. apiciloba, F.v.M. Fragm. x. 45 (1876).  
 G. Hookeriana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 546 (1845).  
 G. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 22 (1830).  
 G. eriobotrya, F.v.M. Fragm. x. 44 (1876).  
 C. pterosperma, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. 22 (1854).  
 G. stenobotrya, F.v.M. Fragm. ix. 3 (1875).  
 G. eriostachya, Lindl. Swan Riv. App. 36 (1839).  
 G. excelsior, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 151 (1904).  
 G. thyrsoides, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 77 (1855).  
 G. chrysodendron, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 176 (1810).  
 G. cirsiifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. 253 (1847).  
 G. bipinnatifida, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1810).  
 G. armigera, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).  
 G. asparagoides, Meissn. l. c. 186.

*Plagiopoda, Benth.*

- G. Treueriana, F.v.M. Fragm. ix. 123 (1875).  
 G. juncifolia, Hook. in Mitch. Trop. Austr. 341 (1848).  
 G. Wilsoni, A. Cunn in Wils. Voy. round the World, 273 (1835).  
 G. erectiloba, F.v.M. Fragm. x. 44 (1876).  
 G. asteriscoosa, Diels, in Engler's Jahrb. xxxv. 151 (1904).  
 G. insignis, Kippist, ex Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).  
 G. Brownii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 537 (1845).  
 G. crassifolia, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 10 (1923).  
 G. fasciculata, R.Br. Prodr. Suppl. 20 (1830).  
 G. aspera, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 172 (1810).  
 G. brachystylis, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 538 (1845).  
 G. saccata, Benth. Fl. Austr. v. 450 (1870).  
 G. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 536 (1845). (*G. pimelioides*  
 W. V. Fitzg.)  
 G. deflexa F.v.M. in Melb. Chem. p. 72 (1883).  
 G. disjuncta, F.v.M. Fragm. vi. 206 (1868).  
 G. Yorkkrakenensis, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. ix. pt. i. 34 (1923).  
 G. haplantha, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 451 (1870).  
 G. extorris, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 221 (1898).  
 G. pinifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).  
 G. acuarria, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 452 (1870).  
 G. Jamesoniana, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxvii. 243 (1904).  
 G. aculeolata, S. Moore in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 222 (1898).  
 G. pauciflora, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 174 (1810).  
 G. cynanchicarpa, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 75 (1855).

*Calothyrsus, Benth.*

- G. quercifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).  
 G. angulata, R.Br. l. c. 24.  
 G. Wickhami, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).  
 G. agrifolia, A. Cunn. in R.Br. Prodr. Suppl. 24 (1830).  
 G. Victori, Morrison, in Journ. Bot. l. 276 (1912). (*G. miniata*, W. V.  
 Fitzg.)  
 G. Cunninghamii, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).  
 G. Huegellii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 543 (1845).  
 G. Sarissa, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 222 (1898).  
 G. dimidiata, F.v.M. Fragm. iii. 146 (1863).

- G. heliosperma*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 176 (1810).  
*G. refracta*, R.Br. l. c. 176.  
*Cycladenia*, Benth.  
*G. annulifera*, F.v.M. Fragm. iv. 85 (1864).  
*G. leucopteris*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).  
*Cycloptera*, Benth.  
*G. pyramidalis*, A. Cunn. in R.Br. Prodr. Suppl. 25 (1830). (*G. leucacandron*, A. Cunn.)  
*G. simulans*, A. Morrison, in Journ. Bot. l. 277 (1812).  
*G. Berryana*, Ewart et J. White, in Proc. Roy. Soc. Vict. n. s. xxii. 14 (1909).  
*G. erythroclada* W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 132 (1918).  
*G. viscidula*, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 44 (1923).  
*G. striata*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 177 (1810).  
*G. mimosoides*, R.Br. in l. c. 177.  
*G. latifolia*, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 43 (1923).  
*Eriostylis*.  
*G. occidentalis*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 173 (1810).  
*G. acerosa*, F.v.M. Fragm. i. 136 (1859).  
*G. umbellulata*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 252 (1847).  
*G. pilulifera*, (Lindl.) Gardner n. comb. (*G. oxy stigma*, Meissn.)  
*G. uncinulata*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 162 (1904). (*G. lycopodina*, S. Moore.)  
*G. Candolleana*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 541 (1845).  
*G. scabra*, Meissn. in l. c. 541.  
*Lissostylis*.  
*G. commutata*, F.v.M. Fragm. vi. 207 (1868).  
*G. stenophylla*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 30 (1905).  
*G. pinnatisecta*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 473 (1870).  
*G. argyrophylla*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 75 (1855).  
*G. brachystachya*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 254 (1847).  
*G. Endlicheriana*, Meissn. in l. c. i. 546 (1845).  
*G. Manglesioides*, Meissn. in l. c. i. 547. (*G. Loboana*, Domin.)  
*G. diversifolia*, Meissn. in l. c. i. 547.  
*G. filifolia*, Meissn. in l. c. i. 547.  
*G. hakeoides*, Meissn. in l. c. ii. 252 (1847).  
*G. inconspicua*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 153 (1904).  
*G. teretifolia*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 255 (1847).  
*G. eryngioides*, Benth. Fl. Austr. v. 476 (1870).  
*G. bracteosa*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 254 (1847).  
*G. erithmifolia*, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).  
*G. trachythea*, F.v.M. Fragm. vi. 207 (1868).  
*G. brachyclada*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 30 (1905).  
*Conogyne*.  
*G. monticola*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 259 (1847).  
*G. Muelleri*, Benth. Fl. Austr. v. 479 (1870).  
*G. trifida*, (R.Br.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 553 (1845).  
*G. synapheae*, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).  
*G. flexuosa*, (Lindl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 533 (1845).  
*G. leptobotrya*, Meissn. in l. c. ii. 256 (1847).  
*G. breviscupis*, Meissn. in l. c. ii. 256.  
*G. intricata*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).  
*G. didymobotrya*, (Endl.) Meissn. in l. c. iv. 186 (1852).  
*G. polybotrya*, Meissn. in l. c. iv. 185.  
*G. nematophylla*, F.v.M. Fragm. i. 136 (1859).  
*G. Purdieana*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 154 (1904).  
*Anadenia*.  
*G. paradoxa*, F.v.M. Fragm. vi. 246 (1868).  
*G. petrophiloides*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 257 (1847).  
*G. tenuiflora*, (Lindl.) Meissn. in l. c. i. 554 (1845).  
*G. pulchella*, (R.Br.) Meissn. in l. c. i. 553.  
*G. rudis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 73 (1855).  
*G. cordata*, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. iv. pt. i. 35 (1923).  
*G. Shuttleworthiana*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 258 (1847).  
*G. integrifolia*, (Endl.) Meissn. in D. C. Prodr. xiv. 385 (1856).

- G. incrassata*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 156 (1904).  
*G. ceratocarpa*, Diels in l. c. 157.  
*G. stenocarpa*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 485 (1870).

*Manglesia*.

- G. acrobotrya*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).  
*G. glabrata*, (Lindl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 549 (1845).  
*G. ornithopoda*, Meissn. in l. c. ii. 256 (1847).  
*G. paniculata*, Meissn. in l. c. i. 550 (1845).  
*G. biternata*, Meissn. in l. c. i. 549.  
*G. triloba*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).  
*G. amplexans*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 488 (1870).  
*G. vestita*, (Endl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 548 (1845).  
*G. tridentifera*, (Endl.) Meissn. in l. c. i. 549.  
*G. phanerophlebia*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 157 (1904).  
*G. erinacea*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).

10. *HAKEA*, Schrader, Sert. Hannov. 27. t. 17 (1797).

*Grevilleoides*.

- H. chordophylla*, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 23 (1857).  
*H. Cunninghamii*, R.Br. Prodr. Suppl. 26 (1830).  
*H. suberea*, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 223 (1898).  
*H. lorea*, R.Br. Prodr. Suppl. 25 (1830).  
*H. macrocarpa*, A. Cunn. ex R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830).  
*H. arborescens*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 187 (1810).  
*H. Morrisoniana*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 134 (1918).  
*H. stenophylla*, A. Cunn. ex R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830)

*Euhakea*.

- H. cyclocarpa*, Lindl. Swan Riv. App. 36 (1839).  
*H. crassifolia*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 570 (1845).  
*H. Brooksiana*, F.v.M. in Austr. Journ. Pharm. i. 430 (1886).  
*H. pandanicarpa*, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).  
*H. Roei*, Benth. Fl. Austr. v. 499 (1870).  
*H. adnata*, R.Br. Prodr. Suppl. 26 (1830).  
*H. obliqua*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 180 (1810).  
*H. polyanthema*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 161 (1904).  
*H. Hookeriana*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).  
*H. incrassata*, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).  
*H. flabellifolia*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 116 (1855).  
*H. Brownii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 569 (1845).  
*H. Baxteri*, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).  
*H. ceratophylla*, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).  
*H. lasiantha*, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).  
*H. eriantha*, R.Br. l. c. 29  
*H. megalosperma*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 177 (1855).  
*H. clavata*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 31. t. 41 (1804).  
*H. orthorrhyncha*, F.v.M. Fragm. v. 214 (1868).  
*H. Candolleana*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 262 (1847).  
*H. trifurcata*, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 183 (1810).  
*H. erinacea*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 559 (1845).  
*H. platysperma*, Hook. Ic. Plant. t. 433 (1842).  
*H. brachyptera*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).  
*H. Kippistiana*, Meissn. in l. c. vii. 115 (1855).  
*H. Preissii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).  
*H. amplexicaulis*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).  
*H. Pritzelli*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 163 (1904).  
*H. prostrata*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810). (*H. glabella*, R.Br.)  
*H. auriculata*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 116 (1855).  
*H. cristata*, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).  
*H. linearis*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 183 (1810).  
*H. stenocarpoides*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 511 (1870).  
*H. ruscifolia*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 30. t. 39 (1804).  
*H. verrucosa*, F.v.M. Fragm. v. 25 (1865).  
*H. rhombalis*, F.v.M. l. c. x. 90 (1876).  
*H. purpurea*, Hook. in Mith. Trop. Austr. 348 (1848).  
*H. arida*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 162 (1904).

- H. recurva, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 207 (1852).  
 H. circumalata, Meissn. in l. c. vii. 114 (1855).  
 H. commutata, F.v.M. Fragm. v. 26 (1865).  
 H. strumosa, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).

*Conogynoides.*

- H. multilineata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 261 (1847).  
 H. laurina, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830). (*H. eucalyptoides*, Meissn.)  
 H. obtusa, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 209 (1852).  
 H. cinerea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 186 (1810).  
 H. corymbosa, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).  
 H. undulata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).  
 H. petiolaris, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).  
 H. neurophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 117 (1855).  
 H. loranthifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 574 (1845).  
 H. cucullata, R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830). (*H. Victoriae*, Drumm.)  
 H. ferruginea, Sweet, Fl. Austr. t. 45 (1828).  
 H. smilacifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 567 (1845).  
 H. elliptica, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 187 (1810).  
 H. ambigua, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 260 (1847).  
 H. falcata, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).  
 H. pycnoneura, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 117 (1855).  
 H. stenocarpa, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).  
 H. marginata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).  
 H. myrtoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).  
 H. costata, Meissn. in l. c. 575.  
 H. oleifolia, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).  
 H. florida, R.Br. in l. c. 183.  
 H. varia, R.Br. in l. c. 183.  
 H. dolichostyla, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 166 (1904).  
 H. sulcata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 180 (1810).  
 H. Meissneriana, Kippist ex Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 114 (1855).  
 H. subsulcata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 555 (1845).  
 H. Lehmanniana, Meissn. in l. c. i. 557.

*Manglesioides.*

- H. nitida, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).  
 H. Oldfieldii, Benth. Fl. Austr. v. 530 (1870).  
 H. suaveolens, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 182 (1810).  
 H. lissocarpha, R.Br. in Prodr. Suppl. 27 (1830).  
 H. bipinnatifida, R.Br. l. c. 28.
11. *XYLOMELUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 214 (1798).  
 X. occidentale, R.Br. Prodr. Suppl. 31 (1830).  
 X. angustifolium, Kippist in Hook. Kew Journ. iv. 209 (1852).
12. *LAMBERTIA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 214. t. 20 (1798).  
 L. uniflora, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 188 (1810).  
 L. rariflora, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 263 (1847).  
 L. inermis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 188 (1810).  
 L. ericifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830).  
 L. multiflora, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).  
 L. echinata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 189 (1810).  
 L. ilicifolia, Hook. Ic. Plant. t. 553 (1843).
13. *STENOCARPUS*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 201 (1810).  
 S. salignus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 202 (1810).  
 S. Cunninghamii, R. Br. Prodr. Suppl. 34 (1830).
14. *BANKSIA*, Linn. fil. Suppl. 15 et 126 (1781).  
*Oncostylis.*  
 B. pulchella, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 202 (1810).  
 B. Meissneri, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. i. 582 (1845).  
 B. nutans, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 203 (1810).  
 B. violacea, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 62 (1927).  
 B. sphaerocarpa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 203 (1810).  
 B. tricuspis, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 118 (1855).  
 B. occidentalis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 204 (1810).  
 B. littoralis, R.Br. in l. c. 204.

- B. verticillata, R.Br. in l. c. 207.  
 B. dryandroides, Baxter in Sweet Hort. Brit. 350 (1827).  
 B. Brownii, Baxter ex R.Br. Prodr. Suppl. 37 (1830).

*Cyrtostylis.*

- B. attenuata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 209 (1810).  
 B. Elderiana, F.v.M. et Tate, Bot. Centralbl. iv. 317 (1893).  
 B. media, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).  
 B. audax, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiii. 63 (1927).  
 B. Solandri, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).  
 B. Goodii, R.Br. l. c. 36.  
 B. petiolaris, F.v.M. Fragm. iv. 109 (1864).  
 B. repens, Labill. Voy. i. 412. t. 23 (1798).  
 B. prostrata, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).  
 B. grandis, Willd. Sp. Pl. i. 535 (1797).  
 B. quercifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 210 (1810).  
 B. Baueri, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).

*Eubanksia.*

- B. dentata, Linn. fil. Suppl. 127 (1781).

*Orthostylis.*

- B. coccinea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 207 (1810).  
 B. spectrum, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 120 (1855).  
 B. Menziesii, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).  
 B. laevigata, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).  
 B. Hookeriana, Meissn. in l. c. vii. 119 (1855).  
 B. prionotes, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).  
 B. Victoriae, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 119 (1855).  
 B. speciosa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 210 (1810).  
 B. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).  
 B. praemorsa, Andrews, in Rep. Bot. t. 258 (1802). (*B. marcescens*, R.Br.)  
 B. Lemanniana, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).  
 B. Caleyi, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).  
 B. Lindleyana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 120 (1855).  
 B. elegans, Meissn. in l. c. 119.  
 B. Candolleana, Meissn. in l. c. 118.

*Isostylis.*

- B. ilicifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 211 (1810).

16. *DRYANDRA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 211. t. 3 (1810).  
 D. quercifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).  
 D. praemorsa, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 265 (1847).  
 D. euneata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 212 (1810).  
 D. falcata, R.Br. in l. c. 213. (*D. Dorrienii*, Domin.)  
 D. armata, R.Br. in l. c. 213.  
 D. longifolia, R.Br. l. c. 215.  
 D. Fraseri, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).  
 D. floribunda, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 212 (1810).  
 D. carduacea, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).  
 D. carlinoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 267 (1847).  
 D. polycephala, Benth. Fl. Austr. v. 570 (1870).  
 D. Kippistiana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 122 (1855).  
 D. squarrosa, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).  
 D. serpa, R.Br. l. c. 38.  
 D. concinna, R.Br. l. c. 38.  
 D. foliolata, R.Br. l. c. 38.  
 D. stipposa, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).  
 D. nobilis, Lindl. l. c. 33.  
 D. mucronulata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 213 (1810).  
 D. formosa, R.Br. l. c. 213. t. 3.  
 D. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).  
 D. nivea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).  
 D. aretoidis, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).  
 D. nana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 121 (1855).  
 D. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 599 (1845).  
 D. sclerophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 123 (1855).  
 D. pulchella, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).

- D. plumosa*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).  
*D. seneciifolia*, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).  
*D. erythrocephala*, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiii. 63 (1927).  
*D. vestita*, (Kippist) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 121 (1855).  
*D. cirsioides*, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).  
*D. Purdieana*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 174 (1904).  
*D. Gilberti*, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 211 (1920).  
*D. Hewardiana*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).  
*D. patens*, Benth. Fl. Austr. v. 578 (1870).  
*D. conferta*, Benth. l. c. 578.  
*D. horrida*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 211 (1852).  
*D. serratuloides*, Meissn. in l. c. vii. 123 (1855).  
*D. comosa*, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).  
*D. Shuttleworthiana*, Meissn. l. c. vii. 122 (1855).  
*D. speciosa*, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).  
*D. tridentata*, Meissn. in l. c. vii. 120 (1855).  
*D. tenuifolia*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 215 (1810).  
*D. proteoides*, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).  
*D. runcinata*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).  
*D. obtusa*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).  
*D. bipinnatifida*, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).  
*D. pteridifolia*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 215 (1810).  
*D. calophylla*, R.Br. Prodr. Suppl. 40 (1830).
-