



GOLDEMI

CAROLI LINNÆI,

EQUIT. AUR. DE STELLÆ POLARI;  
ARCHIATR. REG. MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL. &c;

# FAUNA SVECICA

SISTENS

Animalia SVECIAE Regni:  
MAMMALIA, AVES, AMPHIBIA,  
PISCES, INSECTA, VERMES.

DISTRIBUTA

PER

CLASSES & ORDINES,  
GENERA & SPECIES,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIERUM,  
SYNONYMIS AUCTORUM,  
NOMINIBUS INCOLARUM,  
LOCIS NATALIUM,  
DESCRIPTIONIBUS INSECTORUM.

---

EDITIO ALTERA, AUCTIOR.

---

Cum Privilegio S. R. Mitis Sveciae & S. R. Mitis Poloniae ac Electoris Saxon.

---

STOCKHOLMIAE,  
Sumtu & Literis Direct. LAURENTII SALVII,

1761.

Quæ Præsenti Opusculo desunt suppletat Ætas;  
Non enim differendum est tyrocinium in Senectutem;  
Nam quotidie crescit metus,  
    Majusque fit semper quod ausuri sumus;  
Et dum deliberamus, quando incipiendum,  
    Incipere jam serum fit.  
Quare Fructum studiorum viridem  
Et adhuc dulcem promi decet,  
    Dum et Venia,  
    Et spes est,  
    Et paratus favor,  
    Et audere non dedecet.

Quintilianus.

QL

291

S:æ R:æ M:tis

158978

L 15. SUMMÆ FIDEI VIRIS  
ILLUSTRISSIMIS EXCELLENTISSIMISQUE,

1761 D:NO ANDREÆ

C.4 SONHRB VON H Ö P K E N

*Lib. BARONI*

REGIS REGNIQUE SUECIÆ  
SENATORI,  
ACADEMIÆ UPSALIENSIS CAN-  
CELLARIO,

EQUITI & COMMENDATORI Reg. Ord.

D:NO NICOLAO  
PALMSTIERNA

*Lib. BARONI*

REGIS REGNIQUE SUECIÆ  
SENATORI,  
EQUITI & COMMENDATORI Reg. Ord.

D:NO CLAUDIO  
EKEBLAAD

*COMITI*

REGIS REGNIQUE SUECIÆ  
SENATORI,  
REG. CANCELLARIAE PRÆSIDI,  
EQUITI & COMMENDATORI Reg. Ord.

Hanc, uti priorem Faunam, sed mille Animalibus auctam,  
VOBIS, Viri Excellentissimi! devotissime offero

Upsaliæ 1761  
d. 28 Julii.

)\* ( 2

C. LINNÆUS.

158978

# PRÆFATIO.

**I**nter omnia, nunquam fatis prædicanda, Orbis Terrauei Miracula, ipso HOMINE, nihil omnino illustrius, potius nihil est.

Universum REGNUM LAPIDEUM constituunt corpora, quorum particulæ fortuito vel concretæ vel segregatæ sunt, & quorum rudem massam artificiosius non instruxit natura.

Minutissimum PLANTÆ semen, mastæ cui-dam Lapidei Regni immistum, rudiora corpora illa sibi assimilata sic instruit, ut nobiliora evadant; itaque Plantæ plus artificii arguunt quam Lepides.

Ovum ANIMALCULI cujusdam, forte inter plantas exclusum, easdem corrumpit, assimilat & majori adhuc artificio instruit; ut adeo crudæ particulæ terrestres Regni Lapidei in Regno Vegetabili prius instruendæ sint, quam in Regno Animali nobilioris artificii capaces evadant; itaque Animalia plantis sunt excellentiora.

Sin autem Animalia invicem contuleris, diversos perfectionis gradus in illis itidem deprehendes; in censum heic veniunt *Vermes*, *Insecta*, *Pisces*, *Amphibia*, *Aves*, *Quadrupedia*; ut rem paucis expediā. *Aranea* est octipes, totidemque instructa oculis, cum non nisi binos & pedes & oculos habeat *Gallina*, verumtamen hæc illà nobilior est. Etenim perfectius judicandum quod paucioribus instrumentis multa efficere possit, quam quod majori apparatu vix tantumdem peragere valeat. Sic adstrui nullo negotio poterit *Hirudini* vermi *papilionem* *Insectum* Papi-

## P R A E F A T I O.

Papilioni *Salmonem* Piscem, Salmoni *Aquilam* Avem, Aquilæ demum *Bovem* aut *Leonem* antecelle-re; ita quidem ut Quadrupedia cunctis animalibus reliquis multo existant perfectiora; sed vero non est quod in demonstranda re, per se clara, multi simus.

Quod inter Animalia Quadrupedia *Hominem* referre ausim, jure mihi nemo succensebit; nimirum *Homo* neque *Lapis*, neque *Planta* est, sed *Animal*; namque eum in modum vivit & movetur; jam vero non est *Vermis*, sic enim capite cerebroque careret. Nec *Insectum*, sic enim *Antennas* habiturus esset. Nec *Piscis* est, quod careat *Pinnis*. Nec vero *Avis*, quod *Pennis* careat. Immo *Quadrupes* est, gaudet ore, similiter constituto ut in reliquis quadrupedibus, denique quatuor pedibus, quamvis duobus ingrediatur, duobus obvia prehendat; & certe si vera fatebor, qua *Historicus Naturalis* ex scientiæ principiis, nullum characterem hactenus eruere potui, unde *Homo* a *Simia internoscatur*; dantur enim alicubi terrarum *Simiae* minus, quam *Homo pilosæ*, eretto corpore, binis æque ac ille pedibus incedentes, & pedum & manuum ministerio humanam referentes speciem, prorsus ut easdem pro *Hominum* quopiam genere venditarint peregrinatorum rudio-  
res. Loquela quidem *Hominem* a reliquis anima-  
libus distinguere videtur, verum enim hæc quædam est potentia vel certe effectus, non autem nota characteristica a numero, figura, proportione aut situ defumta; ut res adeo sit perquam arduæ in-  
dagnis, propriam tradere hominis differentiam spe-  
cificam. Ast in nobis quidquam ineſt, quod visum  
non subit, unde nostri ipsorum cognitio pendet, ut-

## P R A E F A T I O.

pote nobilissima *Ratio*, qua Homo cunctis anima-  
libus immane quantum præcellit.

Quamobrem nemo facile iturus est inficias Hominem esse Animal, & illud quidem primæ Classis atque ordinis, quippe quod ceteris omnibus longe perfectius est; etiamsi enim haut munitus sit homo vel rabidis Dentibus, vel horrendis Cornibus, vel aduncis Unguis, vel venenosis Aculeis &c. ipse tamen delere atque prosternere valet sævissimos Leones, pestilentissimos Angues, voracissimos Crocodilos, robustissimos Elephantes, vastissimos Cetos, pernicissimos Sciuros; immo vero, quidquid *Avium* supremum peragrat aërem, quidquid *Piscium* maris abyssum tenet: ut nihil adeo eorum, quæ corpore gaudent animato, satis ipsi resistere queat. In orbem terraqueum prodiit Homo nudus omnino atque inermis, cum reliqua Animalia vel Pellibus, vel Plumis, vel squamis, vel loricis, vel testis, vel spinis Creator providus donaverit; aliis cesserunt *Alæ* queis in sublime se attollant; aliis *Pinnæ* quibus in profundo natent; aliis plurimi *Pedes* quorum ope alacrius cursuent; Hominem vero nudum, cunctis hilice præsidiis destitutum, nec nisi duobus insistentem pedibus, quibus reliqua Quadrupedia vix ac ne vix incedere possunt, præ ceteris unica proprietate ornavit Deus, puta Ratione; qua dexterime usum hoc Animal, tot tantaque conficiat opera, quot alia Animantia nulla, immo de sui ipsius Auctore & Creatore judicare non diffidat; Proprietas isthæc, in oculorum adspicuum non cadens, ut originis, ita indolis est divinæ. Itaque omnium. quos produxit Deus, universi orbis incolarum, hoc est, omnium om-

# P R A E F A T I O.

omnino animalium præstantissimus est Homo, cui proinde, singulari vereque paterno moderamine, præesse, & quam optime prospicere voluit Beneficentissimus ille Naturæ Auëtor.

Animali huic formosissimo, ut omnium sapientissimo, ita constituto orbis terrarum Regi & Domino, splendidissimam sedem suapte manu paratam, Deus attribuit, Paradisum loquor sive Hortum Eden, maxima omnium eorum, queis opus erat, affluentia speetabilem. Heic omnia Animalia, Plantæ omnes fuere; adeoque maxima varietas, maxima voluptas. Ecce primum vereque primarium *Hortum Botanicum*, primi Hominis jam integri summeque beati Hospitium; Ecce primas Hominis curas, delicias primas, *Animalia & Plantas*.

Primæ Hominis actiones, quas in Paradiso exercuit, duas summarias scientiæ partes complexæ sunt; hæ erant: Inspectio Creaturarum & Impositio nominum (\*); ut nomina, animalibus a se imposita, retineret ipse, oportuit habere distinctos characteres s. notas, quibus species distinguerentur, quos ut obtineret, accuratori singulorum examine, adeoque Zoologiæ cultura fuit opus; nimirum teste S:a S:a & communi experientia, concessum est homini in animalia cetera imperium, cum Hominis cauſa videatur cuncta alia genuifile natura (\*\*); Hæc animalia in usum suum plerumque converteret; usum non innatae ideæ, sed experientia sola suggerit; Experimenta vix cum aliis communicari possent,

)\*( 4

fent,

---

(\*) Verulam. aug. Scient. 25.

(\*\*) Plin. hist. mund. VII: 1.

## P R A E F A T I O.

ient, nisi per nomina; nec nomina absque chara-  
ctere; immo Magister ipse, qui nomina imposue-  
rat, quamvis propria & a se ipso confecta, retine-  
re ipse nequiverat absque charactere & differentia  
specifica; primus enim gradus sapientiae est & erat  
res ipsas nosse; nomina si perierant, perierat & re-  
rum cognitio; itaque primi hominis cura in statu  
felicissimo, cum impositione nominum, erat Zoo-  
logiae studium, adeoque hoc studium maxime na-  
turale.

Posteaquam Animalia & Plantæ per terrarum  
orbem longe lateque disseminari cœperunt, nec in-  
tra arctum Hortum omnia obtinebant Protoplasti,  
humanum genus adfixit semper penuria quorun-  
dam, quæ dominio suo primitus subiecta fuerunt;  
hic dies aliam vitam, alios mores postulabat. Jam  
tum desierat mira opportunitas Naturalem exco-  
lendi scientiam, ac species generum, in animali re-  
gno occurrentium, invicem comparandi. Ut vitæ  
sustentandæ necessaria pararentur, omnis lapis, omnis  
gleba movenda, oportebat modica dein Scientia con-  
tentos esse mortales. Sic miserum in modum nova-  
ta rerum facie, hautquam mirum est, omnia  
non tam pedetentim inclinasse, quam confessim  
ruisse in deterius.

Longa denique experientia edocti mortales,  
plus cœperunt sapere. His, qui tenuiori forte pressi,  
colendo quotannis agello suo omne studium addixe-  
re, vix aliud quidquam curare integrum fuit, quam  
sui suorumque sustentationem. Qui vero pauci vi-  
tam his curis vacuam agere potuerunt, in id maxi-  
mo incubuere nisu, ut illustriori studio illi, quod  
una

## P R A E F A T I O.

una cum felicissima vita Paradisiaca & cœpit & fere  
desit, novam quantum in se fuit, scenerarentur  
lucem.

In dignoscendis *Lapidibus* & terræ speciebus  
diversis inoffenso gradu longius processit Hominum  
industria: etenim ista nobis ubique degimus, to-  
to die sunt obvia. Seculorum etiam progresu mi-  
re succrevit *Plantarum* cognitio, quod neque illæ  
e conspectu nostro diffugiant, quin potius in eo-  
dem regionis tractu plerumque commorentur; præ-  
sertim ex quo tempore instituendis Hortis Botani-  
cis, ceu minoribus Paradisis, ubi plantæ mutuo in-  
ter se conferri possint, diligentior navata est opera.

Cur autem in Zoologia, inde ab Adami ætate  
hucusque progressus omnium minimos fecerimus,  
in promptu caussa est: quippe Sylvis se abscondunt  
*Quadrupedia*, avolant *Aves*, abyssum petunt *Pisces*,  
latebras querunt *Amphibia*, *Insecta* denique cur-  
su, saltu, volatu, nostris se se subtrahunt oculis; ver-  
bo: hominis adspectum refugit omne Animal, nec  
*Lapidum* instar & *Plantarum*, fixis hæret sedibus.  
Hæc jam diu fuit atque etiamnum est caussa, cur  
scientiarum operum nobilissima consideret, naturæ  
vel maxime consentanea, & innoxiae voluptatis  
plenissima ad hæc usque tempora ruditis, incon-  
dita atque indigesta permanserit, prorsus ut  
hac ex parte Barbari simus, quantumcunque in  
aliis versati literis. Roganti quibus usibus vel  
*Lapis* vel *Planta* quædam inserviat, plurimi,  
dato responso, facient satis. Si quis autem percon-  
tatus fuerit, cui bono sit *Insectorum* aliquod? pe-  
rinde ac si indictum foret silentium, presso ore ob-

## P R A E F A T I O.

mutescunt omnes, aut certe, si quid omnino regerendum est, de stupendo omnipotentis Creatoris opere non verebuntur regerere, quod nullius sit usus: Postea vero, quum Animalia (haut sine prægravi sumtu, si in vivis essent alenda) Museis suis Viveriorum supplentibus vicem, ad servare cœperunt curiosi, speramus olim fore tempus, quo nobilissima hæc Historiæ naturalis pars ad optatum denique culmen perducatur; sic fortasse feris Nepotibus concedatur luce meridiana clarioribus facibus eos per vestigare Naturæ mæandros, in quibus hodie, tenebricosa caligine circumdati, palpando viam inquirimus.

Studii hujus amor, quem initio, ante hos triginta annos, modicum sane nec satis fervidum in me persensi, paullatim animum meum usque adeo cepit, ut nihil supra. Sæpius quidem ipse mihi dictum putabam illud Poetæ:

Studium quid inutile quæris?  
neque aliter me dehortabant amici. Ad hæc inimici, me studiumque meum habentes despiciatui, subridebant, nec sine fastu & fastidio; sed ut ipsis quidem videbatur, non sine sale tamen, identidem oggerebant: muscos & muscas curet, cui, quod agat, nihil aliud est reliquum. Verum tamen ista omnia refrenandæ studii hujus cupidini avidissimæ neutiquam satis erant; quin me quotidie Doctissimi Raji effata in hoc studium ex stimulabant.

Quod DEI opera sint, in quibus contemplandis mèmet exerceo.

Quod Divinæ artis & potentiae sint effecta, quibus inquirendis successivas horas addico.

Quod ille me in hunc mundum introduxerit,  
tam

## P R A E F A T I O.

tam inexplicabili rerum varietate instructum & ornatum.

Quod oculis, quos mihi contulit ea videnda, animo & consideranda objecerit.

In Dei ergo contumeliam redundat, quod hæc, quæ Eum creasse negare non audes, supervacanea & inutilia esse affirmes.

Mundum hunc sublunarem, omniaque quæ in ea sunt, Hominis causa condita fuisse recepta Theologorum sententia est; ergo & ipsa Infecta.

Quam autem potiorem Hominibus usum præstent, quam ut ea contemplentur, divinæque artis vestigia in iis efformandis observent & mirentur.

Quod si omnia ad corpus referas, omniaque ei vel pascendo, vel tegendo, vel ornando vel mendendo comparata esse contendas, suum etiam in his usum habent hæc genera, ut facile esset omnia percurrente ostendere.

Si majora dices & magis necessaria studia esse, quæ hominem; uti hodie vivitur, totum requirunt; scias me tantum hisce studiis & inquisitionibus me recreare & oblectare; quod alii Venationibus, Confabulationibus, Tesseris, Chartis, Lusibus, Compotationibus insumunt, illud ego Animalculis indagandis, colendis, contemplandis impendo.

Recreat & refocillat animum, quamvis laboriosum sit, illud quocunque oblectatur.

Ne itaque humanis rationibus divina opera curiosius excutiamus, sed ex operibus manuducti admiremur artificem.

In magnis corporibus facilior officina sequaci materia fuit; in Infectis vero tam parvis atque tam nullis,

## P R A E F A T I O.

nullis, quæ ratio? quanta vis? quam in extricabilis perfectio? Turrigeros Elephantorum miramur humeros, Taurorumque colla & truces in sublime jactus, Tigriumque rapinas, Leonumque jubas, cum tamen rerum natura numquam magis quam in minimis tota sit. Qua propter quælo ne hæc legentes, quoniam in his spernunt multa, etiam relata fastidio damnent, cum in contemplatione Naturæ nil possit videri supervacaneum.  
*Plin.*

---

*Prior Editio prodiit anno 1746, ea vero distra-  
cta hanc auctiorem reddidi circiter Mille Ani-  
malculis, quæ stupendo labore investigavi, nec mi-  
nor studio descripsi, plane convictus ejusmodi  
descriptionibus optime inter se distingui Species  
ne hæc confundantur, eoque ruat artis funda-  
mentum, specierum vera diagnosis.*

*Upsaliæ 1761.*

AU-

# AUCTORES.

## ZOOLOGI.

ANONYMUS.

Description of 300 Animales.

Lond. 1737. Oct. p. 212. c. figuris.

BRADLEY Richard.

Philosophical account of works of natur.

Lond. 1721. Quart. p. 194. t. 28.

PETIVER Jacobus.

Centuriæ Musei Petiveriani.

Lond. 1695. Oct. p. 96. t. 2.

Gazophylacii Naturæ & Artis Decades.

Lond. 1702. Oct.

MERRIT Christ.

Pinax rerum naturalium Britannicarum.

Lond. 1667. Oct. p. 223.

CHARLETON Gualter.

Onomasticon Zooicum.

Lond. 1668. Quart.

BAUHINUS Johannes.

Historia fontis Bollensis.

Montisb. 1598. Quart. p. 222.

WAGNERUS Joh. Jac.

Historia naturalis Helvetiæ.

Tigur. 1680. Duod. p. 390.

SCOTTUS P. Casp.

Physica curiosa s. Mirabilia naturæ & artis.

Heribp. 1662. Quart. p. 1583.

KLEYNIUS Jac. Theodor.

Classis Quadrupedium & Amphibiorum.

Gedan. 1743. Quart.

WORMIUS Olaus.

Museum Wormianum.

Haffn. 1655. Folio.

OLEARIUS Adamus.

Gottorffische Kunst-Kammer.

Sleswig. 1666. Quart. Obl. p. 88.

SEBA Albertus.

Thesauri rerum naturalium.

Amstel. 1734. Fol. Vol. 1.

Amstel. 1735. Fol. Vol. 2.

LINNÆUS Carol.

Animalia Sueciæ.

Act. upsal. 1736. q. Quart.

QUA-

# MAMMALIA.

ÆLIANUS Claud.

Historia Animalium.

Coloniæ. 1616. Oct.

GESNERUS Conrad.

Historia Animalium de Quadrupedibus.

Tigur. 1551. Fol.

Gesnerus redivivus auctus & emendatus.

Francf. 1669. Fol. germ. Vol. 4. per Christium.

JONSTONUS.

Historia naturalis de Quadrupedibus.

Francf. 1652. Fol.

RAJUS Johannes.

Synopsis animalium Quadrupedum & Serpentum.

Lond 1693. Oct. p. 336.

\* \* \*

PAULINUS Christ. Franc.

Lagographia curiosa.

Aug. vind. 1691. Oct.

Lycographia.

Francfurt. 1694. Oct.

Cynographia.

Norib. 1685. Quart.

De Afino.

Francf. 1695. Oct.

Talpa.

Francf. 1689.

GRABA Joh. Andr.

Elaphographia s. Descriptio Cervi.

Jen. 1668. Oct.

AGRICOLA Joh. Georg.

Cervi natura & proprietates.

Amberg. 1617. Quart. german. p. 243.

LEOPOLD J. F.

Diss. acad. de Alce.

Basel. 1700. Quart.

SCHROECKIUS Lucas.

Historia Moschi.

Aug. vind. 1682. Quart.

CAJUS Johannes.

Libellus de Canibus britannicis.

Norib. 1685. Quart. cum Paulini cynogr.

CASTELLUS Petrus.

Hyæna odorifera.

Francf. 1693. Oct. p. 80, t. 5.

WAL.

**WALDUNGIUS** Wolffg.

Lagographia.

*Amberg.* 1619. Quart.

**MARIUS** Johannes.

Castrologia.

*Aug. vind.* 1685.

**WORMIUS** Olaus.

Historia animalis e Norvegia.

*Haffn.* 1653. Quart. t. I. est *Mus Lemnis.*

## AVES.

**BELLONIUS** Petrus.

Portraits des Herbes, Oyseaux, Serpens.

*Paris* 1618 & 1557. Quart.

**GESNERUS** Conradus.

Historia animalium de Avium natura.

*Francf.* 1586. Fol. p. 806.

**ALDROVANDUS** Ulysses.

Ornithologia.

*Francf.* 1610. Fol. vol. 3.

**JONSTORUS** Johannes

Historia naturalis de Avibus.

*Francf.* 1650. Fol. p. 227. t. 62.

**WILLUGBY** Franciscus.

Ornithologia reformata a J. Rajo.

*Lond.* 1676. Fol. p. 307. t. 77. f. 353.

**RAJUS** Johannes.

Synopsis methodica Avium.

*Lond.* 1713. Oct. p. 198. t. 2. f. 24.

**ALBIN** Eleasar. Piſſer. notis Derhamii.

Natural History of Birds.

*Lond.* 1738. Quart. vol. 1. p. 96. t. 101.

1738. Quart. vol. 2. p. 92. t. 103.

1740. Quart. vol. 3. p. 95. t. 101.

**EDWARD** Georg.

Historia naturalis Avium.

*Lond.* 1746. quart. anglice.

**MARSILIUS** Comes.

Danubius Pannonic-Mysius: Volumen V.

*Amsterd.* 1724. Fol.

## AMPHIBIA.

**WURFFBAINIUS** Joh. Paulus.

Salamandrologia.

*Noriberg.* 1683. Quart.

**PAULLINUS** Christ. Franc.

Bufo curiosus.

*Noriberg.* 1686.

# P I S C E S.

BELLONIUS Petrus.

Libri duo de Aquatilibus.

Paris. 1553. Oct - oblong. p. 448.

RONDELETIUS Guilielm.

Libri duo de Piscibus marinis.

Lugd. 1554. Fol. p. 583.

GESNERUS Conradus.

Historia Animal. de Piscibus & Aquatilibus.

Francf. 1604. Fol.

Francf. 1620. Fol. auctior.

Francf. 1598. Fol. germanice.

ALDROVANDUS Ulysses.

Libri V de Piscibus.

Bonon. 1738. Fol. p. 732.

JONSTONUS Johannes.

Historia naturalis de Piscibus.

Francf. 1649. Fol.

Amsterd. 1657. Fol.

Amsterd. 1716. Fol. Theatrum Animalium.

SCHONEVELDE Stephanus.

Ichthyologia.

Hamburg. 1624. Quarto.

WILLUGBY Franciscus.

Historia Piscium.

Lond. 1686. Fol. p. 343.

RAJUS Johannes.

Synopsis methodica Piscium.

Lond. 1713. Oct. p. 166. t. 2.

PAULLINUS Christ. Francisc.

Anguilla.

Francf. 1689.

ARTEDIUS Petrus.

Ichthyologia.

Lugd. 1738. Oct. Partes 5.

# I N S E C T A.

RAJUS Johannes.

Historia Insectorum.

Lond. 1710. Quart. p. 398.

FRISCH Johan Leoh.

Beschreibung von Insecten in Teutschland.

Berolin. 1720. Quart. Vol. 13 singulo t. 3.

a 1666. Mart. 19. Sulzbach. o. 1743. Mart. 21.

REAUMUR.

Histoire des Insectes,

Paris. 1734. &c. Vol. 5. Quart.  
Amstel. 1737. &c. Vol. 5. Octavo.

DE GEER Carolus.

Histoire des Insectes.

Holmiae 1752. Quart.

SWAMMERDAM Johannes.

Historia Insectorum.

Ultraject. 1693. Quart. Latine.

Ultraject. 1695. Quart. Gallice.

Ultraject. 1699. Quart. Belgice.

Biblia Naturæ.

Lugdb. 1738. Fol.

ROESEL Aug. Joh.

Inseetten belustigung.

Norib. 1746. Quart.

WILKES Beniam.

The English Moths and Butterflies.

Lond. 1747. Quart.

MERIANA Maria Sibylla.

Erucarum Ortus & paradoxa Metamorphosis.

Norib. 1679. Quarto.

Francf. 1683. Quarto.

Amsterd. 1730. Quarto.

Metamorphosis Insectorum Surinamenium.

Amsterd. 1705. Fol. p. 60. t. 60.

GOEDART Johannes, Pictor Medioburgensis.

Metamorphosis naturalis s. de Insectis.

Middelb. . . . Oct. belg. Vol. 3. t. 80. 51. 24.

Lond. 1685. Oct. Latine. p. 356. per Listerum.

ALBINUS Eleasar.

Historia naturalis Insectorum Anglicanorum.

Lond. 1710. quart. t. 100.

Lond. 1731. quart. latine; notis Derhami.

BLANCARD Stephanus.

Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden.

Amsterd. 1688. Oct. I. Belg. p. 282. t. 17.

Lipsie 1690. Oct. germanice.

HOEFNAGEL Johannes. Pictor.

Icones Insectorum volatilium.

. . . . 1630. quart. obl. t. 16.

Francf. 1692. quart. obl. vol. 4. singulo t. 12.

ROBERT Nicolaus. Pictor.

Species Florum variae æneis tabulis.

Paris. . . . Fol. t. 30.

MOUFFETUS Thomas.

Theatrum Insectorum.

Lond. 1634. Folio. p. 326. fig. sparsis.

)\*\* (

LI-

LISTER Martin.

Historia Animalium Angliae.

Lond. 1678. quart. p. I. I - 100. I. I. de Araneis.

Appendix ad historiam animalium Angliae.

Lond. 1685. Oct. 2. 3. mutæ cum Goedartio.

Appendix de Scarabæis Britannicis.

Lond. 1710, quart. cum Raj. bīst. insect.

JUNGIUS Joachim.

Historia Vermium.

Hamburg 1691. Quart.

CLERCK Carolus.

Aranei Svecici.

Holm. 1757. quart. tab. 6.

Icones Insectorum rariorum.

Holm. 1759. quart. tab. 7.

ALDROVANDUS Ulysses.

Libri VII de animalibus Insectis.

Bonon. 1638. Fol. p. 767.

JONSTONUS Johannes.

Libri III historiæ naturalis de Insectis.

Franç. 1653. 1658. Folio.

REDUS Francisc.

Experimenta circa generationem insectorum.

Amsterd. 167. 1636. 1712. Duod.

Animalia in animalibus vivis.

Florent. 1684. Quart.

BONANNUS

Micrographia s. Animalia viva in vivis.

Rome 1691. Quart.

VALISNERIUS Antonius.

Observationes & Experim. circa hist. nat. & medic.

Patau. 1726. Quart.

JOBLOT

Descriptions & Usages des plusieurs microscopes.

Paris 1718. Quart.

LEUWENHOEK Anton.

Arcana naturæ.

Delfph. 1695. Quart. latine vol. 4.

\* \* \*

CLUTIUS Theodorus.

Van de Byen.

Leid. 1597. Octavo.

BUTTERUS Carolus.

Monarchia femina s. Historia Apum.

Lund. 1673.

TRIEWALD Martinus.

Tractat om Bij.

Stockholm 1728. Oct.

A-

## ANONYMUS.

Histoire naturelle des Abeilles.

Paris. 1744. Duodec. iconibus Reaumuri.

## CLUTIUS Augerius.

Opusculum de Hemerobio & Verme majali.

Amsterd. 1634. Quart p. 103.

## SWAMMERDAM Johannes.

Vita Ephemeræ.

Amsterd. 1674. Oct. belgice.

## WILLICHIUS Johannes.

Dialogus de Locustis.

- 1544. Octavo.

## RAPPOLT Carolus Henricus.

An Damnum per Locustas compensetur?

Berolin. 1730. Quart.

## REMBOLDUS.

Tractatus de Locustis.

Berol. 1731. Octavo.

## BARTHIUS Johan Matth.

Dissertatio de Culice.

Ralif 1737. Fol. p. 8. t. 2.

## MOSCHETTI.

De Pulice.

1544. Octavo.

## RANGO Corn. Tiburt.

De Curculionibus.

Berolin. 1665. Dusd. german. p. 94.

## SACHS Phil. Jacob.

Gammarologia.

Franct. 1665.

## BREYNIUS J. Phil.

Historia naturalis Coccii radicum tintorii.

Norib. 1733. in App. E N. C. tom. 3.

Gedani 1739. Quart. cum prodromo. append.

## V E R M E S.

## BONANNUS.

Recreatio mentis & oculi.

Rom 1681. Quart. Italice.

Rom. 1684. Quart. latine. figuris 540.

## LISTER Martinus.

Historia Conchyliorum.

Lond. 1635 Folio.

Historiae Animalium Angliae pars posterior.

Lond. 1678. Quart. latine. p. 100-250. t. 8.

Exercitatio anatomica de Cochleis.

Lond. 1694. Oct. )\*\* ( 2

Exer-

Exercitatio anatomica de Buccinis.

Lond. 1695. Octav.

RUMPHIUS Georg. Everhard.

Amboiniske rariteten Kammar.

Amsterd. 1700. folio belgice.

D'ARGENWILLE.

Histoire naturelle la lithologie & conchyliologie.

Paris 1742. Folio p. 491. t. 33.

GVALTIER Nicolaus.

Index Testaceorum.

Florent. 1742. Fol. tab. 110.

PLANCUS Janus.

Liber de Conchis minus notis.

Venet. 1739. Quart. tab. 5.

LANGIUS Carolus.

Methodus testacea marina.

Lucern. 1722. Quart. p. 102.

COLUMNA Fabius.

Observationes aquatilium & terrestrium animalium.

Romæ 1610 Quarto.

HARDERUS Johan Isac.

Examen Cochlearum terrestr. domiportæ.

Basil. 1674. Quart.

Epistola de partibus genitalibus cochlearum.

Aug. vind. 1684. Quart.

MAJOR Joh. Dan.

Columna de purpura cum methodo.

Kilon. 1675. Quart.

HEBENSTREIT Ernest.

Diff. aead. de ordinibus Conchyliorum ; méthodice.

Lips. 1728. Quart.

ALDROVANDUS Ulysses.

Libri IV de Exsanguibus.

Bonon. 1642. fol. p. 593.

PAULLINUS Christ. Francif.

Schediasma de Lumbrico terrestri.

Francf. 1703.

LINCKIUS Joh. Henric.

Liber de Stellis marinis.

Lips. 1733. Fol.

STOBÆUS Kilian.

Diff. epistol. de Nummulo Brattensburghensi.

Lund. 1732. Quart. p. 22. t. 1.

TER-

# TERMINI ARTIS.

## QVADRUPEDIA.

*Palmae* pedes anteriores.

*Planta* pedes posteriores.

*Elongata* cauda quæ longitudinem corporis attingit.

*Abrupta* s. *Truncata* cauda, quæ corpore longe brevior.

## A V E S.

*Cera* tunica nuda frontis basin rostri cingens.

*Uropygium* locus inter dorsum & caudam.

*Rectrices* Pennæ majores caudam constituentes.

*Remiges* Pennæ majores in ala, quibus volitat avis.

*Primariae* a flexura alæ ad apicem sitæ.

*Secundariae* inter flexuram alæ & corpus dispositæ.

*Tectrices* pennæ quæ alas tegunt.

*Papillosa* facies nuda papillis tecta.

*Artus* sunt alæ, cauda, pedes.

*Palmati* Pedes digitis membrana intertextis.

*Lobati* Pedes digitis utrinque membrana auctis.

*Tridactyli*, *Tetradactyli* digitis 3, 4 &c.

## A M P H I B I A.

*Scuta* Abdominis singula seu squamæ latæ Abdomen subtus transversim cingentes.

*Verticillata* cauda ex squamis in annulos disposita.

*Anceps* cauda utrinque acie instrueta.

## P I S C E S.

*Dorsalis* pinna in dorso collocata.

*Pectorales* pinnæ ad latera corporis juxta caput.

*Ventrales* pinnæ in abdomine sitæ.

*Ani* pinna pone exitum excrementorum inserta.

*Caudæ* pinna corpus piscis terminans.

*Monopterygius*, *Dipterygius*: pinna unica, gemina.

*Branchioptega* membrana operculo branchiarum adnexa, radiis instructa, quæ in conspectum prodit dum opercula levantur.

IN-

# TERMINI ARTIS.

## INSECTA.

*Larva*, Vermiculus e semine insecti enatus, antequam subierit metamorphosin.

*Pupa*, Larva quam primam metamorphosin subierit, antequam in perfectum statum pervenerit.

*Coleoptera* insecta quorum alæ elytris tectæ sunt.

*Hemiptera* insecta quorum alæ non ex toto, sed ex parte, tectæ sunt elytris.

*Gymnoptera* insecta elytris destituta.

*Elytron* ala superior cornea s. crustacea, quæ alas inferiores teniores tegit.

*Scutellum* crux parva inter elytrorum aut alarum paria ad basin thoracis collocata; quasi thoracis apex a tergo.

*Sutura elytrorum* rima qua coeunt vel cum thorace vel inter se invicem.

*Antennæ* organa mobilia insectorum, ad oculos posita: a figura clavatae, pectinicornes, prismaticornes, subulatae.

*Palpi* quasi Antennulae ad os collocati.

*Halteres* capitella petiolata sub alis Dipterorum.

*Elinguis*, os nullum, unde insectum edere nequit.

*Spiralinguis*, os lingua spirali simplici vel duplo.

*Tetrapus*, Pedes 4 unguiculati, licet sæpe duo alii absque ungibus.

Alæ *Primores* in papilionibus sunt majores seu anteriores, *Secundariae* in iisdem alæ posteriores.

FAU-

# FAUNULA SUECICA.

## *Classis I.*

### MAMMALIA.

#### *I. MAGNATES.*

HOMO	1 <i>Sapiens</i>	1
Vespertilio	2 <i>murinus</i>	18
	3 <i>auritus</i>	

#### *III. FERÆ.*

Phoca	4 <i>vitulina</i>	11
Canis	5 <i>familiaris</i>	12
	6 <i>Lupus</i>	13
	7 <i>Vulpes</i>	14
	8 <i>Lagopus</i>	
Felis	9 <i>Catus</i>	3
	10 <i>Lynx</i>	4
	11 <i>Kattlo</i>	5
Viverra	12 <i>Lutra</i>	10
	13 <i>Lutreola</i>	
Mustela	14 <i>Gulo</i>	6
Mustela	15 <i>Martes</i>	7
	16 <i>Putorius</i>	8
	17 <i>Erminea</i>	9
	18 <i>nivalis</i>	
Ursus	19 <i>Arctos</i>	2
	20 <i>Meles</i>	15

#### *IV. BESTIÆ.*

Sus	21 <i>Scrofa</i>	36
Erinaceus	22 <i>europæus</i>	16
Talpa	23 <i>europæa</i>	17
Sorex	24 <i>Araneus</i>	33

#### *V. GLIRES.*

Lepus	25 <i>timidus</i>	19
	26 <i>Caniculus</i>	20
Castor	27 <i>Fiber</i>	23
	28 <i>moschatus</i>	24

#### *Mus*

29 Lemmus	26
30 agrestis	27
31 terrestris	29
32 amphibius	25
33 Rattus	28
34 Musculus	31
35 avellanarius	32
36 sylvaticus	30
37 vulgaris	21
38 volans	22

#### *Sciurus*

#### *VI. PECORA.*

Cervus	39 Alces	37
	40 Elaphus	38
	41 Tarandus	39
	42 Dama	40
	43 Capreolus	41
Capra	44 Hircus	42
Ovis	45 Aries	43
Bos	46 Taurus	44

#### *VII. BELLUÆ.*

Equus	47 Caballus	34
	48 Monodon	26
	49 Balæna	26
	50 Physalus	26
Delphinus	51 Delphinus	26
	52 Catodon	26
	53 Orca	26
	54 Macroceph.	26

#### *Classis II.*

#### *AVES.*

#### *I. ACCIPITRES.*

Falco	54 Chrysaëtos	56
	55 Albicilla	58
	56 rusticulus	
	57 Milvus	59
	58 gen.	

# FAUNULA SVECICA.

	58 gentilis	60		101 medius	82
	59 Subbuteo	64		102 minor	83
	60 Buteo	65		103 tridactylus	84
	61 Tinnunculus	67	Sitta	104 europaea	182
	62 Lararius	61	Upupa	105 Eops	85
	63 Haliætus	57	Certhia	106 familiaris	213
	64 Gyrfalco	62			
	65 Apivorus	66			
	66 cinginosus	63	Anas	107 Cygnus	88
	67 Palumbarius			108 Cygnoides	89
	68 Nisus	68		109 fusca	106
Strix	69 Bubo	45		110 nigra	
	70 scandica	46		111 Marila	
	71 Otus	47		112 spectabilis	
Strix	72 Aluco	48		113 Tadorna	93
	73	49		114 Anser	90
	74	50		115 Bernicla	91
	75 funerea	51		116 erythropus	92
	76 Nyctea	54		117 mollissima	94
	77 Stridula	55		118 moschata	98
	78 Ulula	52		119 clypeata	102
Lanius	79 passerina	53		120 platyrhynchus	103
	80 Excubitor	181		121 Strepera	101
	81 Collurio	180		122 Clangula	100
	82 Garrulus	179		123 Glaucion	104
	83 caudatus	243		124 Penelope	105
	84 biarmicus			125 hyemalis	25
				126 acuta	96
				127 ferina	107
				128 Querquedula	103
Corvus	85 Corax	69		129 Crecca	109
	86 Corone			130 Circia	111
	87 frugilegus	70		131 Boschas	97
	88 Cornix	71		132 Fuligula	99
	89 Monedula	72		133 obscura	110
	90 Glandarius	74		134 rufa	112
	91 Caryocatactes	75	Mergus	135 Merganser	113
	92 Pica	76		136 ferratus	114
	93 infaustus	187		137 Albellus	
Coracias	94 Garrula	73		138 minutus	115
	95 Oriolus			139 Torda	120
Cuculus	96 Canorus	77	Alca	140 impennis	119
Jynx	97 Torquilla	78		141 arctica	118
Picus	98 martius	79		142 Alle	
	99 viridis	80		143 pelagica	249
	100 major				144

# FAUNULA SVECICA.

Pelecanus	144	glacialis	Charadrius	187	Hiatricula	159	
	145	Carbo		188	Morinellus	158	
	146	aristotelis		189	apricarius	156	
	147	Bassanrus		190	Pluvialis	157	
Colymbus	148	Grylle	Recurvirost.	191	Avesetta	137	
	149	Troille	Hæmatopus	192	ostrealegus	161	
	150	arcticus	Fulica	193	atra	130	
	151	cristatus	Rallus	194	Crex	162	
Larus	152	auritus	Otis	195	aquaticus		
	153	canus		196	Tetraz		
	154	fucus					
	155	marinus					
	156	parasiticus	V. GALLINÆ.				
	157	tridactylus	Pavo	197	cristatus	163	
Sterna	158	Hirundo	Meleagris	198	Gallipavo	164	
	159	nigra	Phasianus	199	Gallus	165	
			Tetrao	200	Urogallus	166	
				201	hybridus	167	
				202	Tetrix	168	
				203	Lagopus	169	
				204	Bonasia	170	
				205	Perdix	172	
				206	Coturnix	173	
			VI. PASSERES.				
Platelea	160	Leucorod.	Columba	207	Oenas	174	
Ardea	161	Grus		208	Palumbus	175	
	162	Ciconia	Alauda	209	arvensis	190	
	163	nigra		210	pratensis	191	
	164	stellaris		211	arborea	192	
	165	cinerea		212	campestris	193	
	166	alba	Sturnus	213	vulgaris	183	
Scolopax	167	Tetanus		214	Cinclus	216	
	168	Arquata	Turdus	215	pilaris	188	
	169	Phæopus		216	viscivorus		
	170	Rusticola		217	musicus		
	171	Glöttis		218	iliacus	189	
	172	limosa		219	roseus		
	173	Gallinago		220	Merula	184	
	174	lapponica		221	torquatus	185	
Tringa	175	Pugnax	Loxia	222	Coccothraustes		
	176	Vanellus		223	Enucleator	176	
	177	Gambetta		224	Curvirost.	177	
	178	interpres		225	Pyrrhula	178	
	179	lobata		226	Chloris	202	
	180	Ocrophus		Emberiza	227	nivalis	194
	181	alpina					
	182	Hypoleucus					
	183	Canutus					
	184	Glareola					
	185	littorea					
	186	Squatatarola					

# FAUNULA SVECICA

	228	Calandra	206	273	riparia	247	
	229	Hortulana	208	Caprimulg.	274 europaeus	248	
Fringilla	230	Citrinella	205	<i>Classis III.</i>			
	231	Schoeniclos	211	AMPHIBIA.			
	232	cœlebs	199	I. REPTILLA.			
	233	Montifring.	198	Rana	275	Bufo	253
	234	lulensis	197		276	Kubeta	
	235	lapponica	196		277	Bombina	251
	236	Carduelis	195		278	temporaria	250
	237	Spinus	203		279	esculenta	
	238	flammea	201	Lacerta	280	arborea	252
	239	flavirostris	204		281	palustris	256
Motacilla	240	Cannabina	209		282	aquatica	257
	241	Linaria	210		283	vulgaris	254
	242	domestica	212		284	agilis	1352
	243	montana		<i>II. SERPENTES.</i>			
	244	Luscinia	221	Coluber	285	Chersea	261
	245	modularis	223		286	Berus	260
	246	Schoenob.	222		287	Prester	
	247	Curruca	233	Anguis	288	Natrix	259
	248	Hippolais	234		289	fragilis	258
	249	Salicaria		<i>III. NANTES.</i>			
	250	Sylvia	228	Petromyz.	290	fluviatilis	273
	251	Ficedula	231		291	branchialis	274
	252	alba	214		292	marinus	
	253	flava	215	Raja	293	clavata	268
	254	Oenanthe	217	Chimæra	294	monstrosa	
	255	Rubetra	218 230	Squalus	295	Acanthias	269
	256	Atricapilla	229		296	Spinax	
	257	Phoenicurus	224	Lophius	297	Pristis	270
	258	Erythacus	225	Acipenser	298	piscatorius	
	259	suecica	220		299	Sturio	271
Parus	260	Rubecula	226		300	ruthenus	272
	261	Troglodyt.	232	<i>Classis IV.</i>			
	262	Regulus	235	PISCES.			
	263	Acredula	237	I. APODES.			
	264	Trochilus	236	Muraena	301	Anguilla	290
	265	major	238	Ammodydt.	302	Tobianus	303
	266	cristatus	239			Xiphias	
Hirundo	267	cæruleus	240				
	268	ater	241				
	269	palustris	242				
	270	rustica	244				
	271	urbica	245				
	272	Apus	246				

## FAUNULA SVECICA.

Xiphias	303	Gladius	288		342	Tænia	333				
<i>II. IUGULARES.</i>											
Callionym.	304	Lyra	283	Silurus	343	fossilis	291				
Trachinus	305	Draco	282	Salmo	344	Glanis	291				
Gadus	306	Aeglefinus	297		345	Salar	306				
	307	Callarias	193		346	Eriox	307				
	308	Morrhua	295		347	Trutta	308				
	309	virens	296		348	Fario	309				
	310	Merlangus	294		349	alpinus	310				
	311	barbatus			350	Eperlanus	311				
	312	Pollachius			351	Wimbra					
	313	Molva			352	Lavaretus	312				
	314	Meluccius		Esox	353	Albula	313				
Blennius	315	Lota	292		354	Thymallus	314				
	316	raninus			355	Lucius	304				
	317	viviparus			356	Belone	305				
Ophidion	318	Gunellus		Clupea	357	Harengus	315				
	319	imberbe	289		358	Sprattus	316				
<i>III. THORACICI.</i>											
Cyclopter.	320	Lampus	275	Cyprinus	359	Carpio	317				
Cottus	321	quadricorn.	278		360	Brama	318				
	322	Gobio	279		361	Aspius	319				
	323	Scorpius	280		362	Idus	320				
	324	cataphract.			363	Tinca	321				
Pleuronect.	325	maximus	298		364	Carassius	322				
	326	Solea	299		365	Ballerus	323				
	327	Fleſus	300		366	Erythroph. t.	324				
	328	Plateffa	301		367	Griflagine	325				
	329	Hippogloss.	302		368	Wimba	326				
Labrus	330	suillus			369	Farenus	327				
	331	exsoletus			370	cultratus					
Perca	332	fluvialis	284		371	Biorkna	328				
	333	marina			372	Rutilus	329				
	334	Lucioperca	285		373	Alburnus	330				
Gasterost.	335	Cernua	286		374	Aphya	331				
	336	aculeatus	276	<i>V. BRANCHIOSTEGI.</i>							
	337	Pungitius	277	Syngnathus	375	Ophidion	334				
	338	Spinachia			376	Acus	335				
Scomber	339	Scombrus	287		377	Typhle	336				
Trigla	340	Hirundo	281	<i>Classis IV.</i>							
<i>IV. ABDOMINALES.</i>								<i>INSECTA.</i>			
Cobitis	341	Barbatula	332	<i>I. COLEOPTERA.</i>							
				Scarabæus	378	naficornis	340				
					379	lunaris	341				
					380	cylindricus	342				

# FAUNULA SVECICA.

381	nuchicornis	354		425	melanocep.	369
382	subterrān.			426	murinus	365
383	erraticus			427	Pilula	536
384	Fosfor	352		428	Scaabæoid..	
385	fimetarius	355		429	Scrophul	412
386	hæmorrhoid	358		430	museorum	411
387	conspurcatus			431	paniceus	
388	stercorarius	349		432	stercoreus	375
389	vernalis	350		433	ferrugineus	
390	fabulosus			434	pedicularius	441
391	Horticola	351		435	pulicarius	370
392	Melolontha	345		436	psyllius	
393	solstitialis	346		437	icanicus	376
394	Fullo	343		438	colon	
395	fasciatus	348		439	niger	
396	brunneus		Hister	440	unicolor	410
397	quisquilius			441	pygmaeus	
398	quadrimacul.			442	bimaculat.	
399	farinosus			443	4-maculat.	
400	auratus	344	Silpha	444	vespillo	347
401	nobilis			445	bipustulat.	363
402	variabilis			446	4-pustulat.	364
403	rufipes	356		447	Seminulum	
404	aquaticus	357		448	agaricina	
405	Cervus	337		449	russica	
406	tridentatus	339		450	littoralis	380
407	caraboides			451	atrata	385
Dermestes	408	lardarius	360	452	thoracica	386
	409	elongatus		453	4-punctat.	
	410	undulatus	361	454	opaca	383
	411	Pellio	362	455	rugosa	379
	412	peñtinicornis		456	fabulosa	382
	413	clavicornis		457	obscura	
	414	pertinax	384	458	ferruginea	387
	415	mollis		459	grossa	
	416	Capucinus		460	oblonga	381
	417	Calcograph.		461	aquatica	
	418	Typograph.	366	462	colon	
	419	Micrograph.	367	463	depressa	
	420	Poligraphus		464	grisea	
	421	Piniperda		465	æstiva	
	422	violaceus	373	466	pedicularia	
	423	fenestralis	443	467	viridis	377
	424	domesticus	368	468	nebulosa	378
			Cassida			

# FAUNULA SVECICA.

Coccinella	469 nobilis	513 Padi	434
	470 unipunctat.	514 Betulæ	415
	471 bipunctat. 388	515 Armoraciæ	
	472 tripunct.	516 Hypochærid.	
	473 hebræa	517 vulgatissim.	
	474 5-punctat. 392	518 staphylea	422
	475 trifasciat. 390	519 Vitellinæ	426
	476 hieroglyph.	520 Polygoni	440
	477 7-punctat. 391		( 421
	478 9-punctat.	521 pallida	413
	479 10-punctat.	522 polita	427
	480 11-punctat. 394	523 Populi	428
	481 13-punctat. 395	524 Viminalis	429
	482 14-punctat. 396	525 10-punct.	436
	483 16-punctat.	526 lapponica	431
	484 ocellata 398	527 Boleti	
	485 19-punctata	528 collaris	417
	486 2-punctata 401	529 sanguinol.	
	487 24-punctata 402	530 marginata	
	488 25-punctata	531 marginella	437
	489 conglobata. 403	532 coccinea	
	490 conglomer. 404	533 minuta	
	491 guttato-punct.	534 oleracea	
	492 14-guttata 397	535 chrysocceph.	
	493 16-guttata 399	536 Hyoscyami	540
	494 18-guttata.	537 atricilla	
	495 20-guttata. 400	538 erythroceph.	
	496 oblongo-gut 389	539 Modeeri	
	497 oblitterata	540 Helxines	539
	498 bipustulata 409	541 exoleta	535
	499 4-pustulata 408	542 nitidula	
	500 6-pustulata 407	543 nemorum	542
	501 10-pustulat. 404	544 holsatica	544
	502 14-pustulat. 406	545 rufipes	
	503 16-pustulat.	546 tridentata	
	504 pantherina	547 4-punctat.	432
	505 tigrina 405	548 2-punctat.	
Chrysomela	506 goettingens.	549 4-pustulat.	
	507 Tanaceti 413	550 Moræi	
	508 hæmorrhoid 414	551 nitens	
	509 Graminis 419	552 Barbareæ	
	510 ænea 420	553 labiata	
	511 Alni 416	554 sericea	418
	512 hæmoptera	555 Coryli	

## FAUNULA SVECICA.

556	Pini	600	4-maculat.
557	bothnica	601	5-maculat.
558	cordigera	602	pericarpius 461
559	6-punctata	603	Scrophul. 460
560	10 punctata	604	paraplectic. 445
561	obscura	605	Betulae 456
562	longinana	606	Populi
563	merdigera 425	607	Beccabung.
564	tenella	608	Alni 473
565	Nymphææ 444	609	Fagi 469
566	caprea 424	610	Salicis
567	Asparagi 430	611	Segetis 464
568	12-punctat.	612	Pomorum 458
569	Phellandrii 438	613	ovalis
570	Cerasi 435	614	carbonarius
571	4-maculat.	615	Abietis 446
572	cyanella	616	Nucum
573	melanopa	617	Druparum
574	caraboides	618	5-punctatus
575	corvina	619	hispidus
576	ceramboides	620	pedicularius
577	murina	621	Ligustici
578	hirta	622	tortrix
Curculio	579 violaceus 451	623	Pyri 449
	580 Alliariae 468	624	argentat. 459
	581 cyaneus 467	625	oblongus
	582 aterrimus 466	626	ovatus
	583 Cerati 465	627	cervinus
	584 acridulus 463	628	atomarius
	585 purpureus 457	629	viridis 455
	586 frumentar. 474	630	lineatus 450
	587 granarius 462	631	incanus 452
	588 dorsalis 475	632	albinus
	589 Pini 447	633	cloropus
	590 Rumicis 454	634	rufipes 453
	591 Lapathi	635	nebulosus 448
	592 scaber 471	636	ruficornis
	593 cupreus	637	ater
	594 T. album	638	Coryli 476
	595 ruficollis	639	Monoceros
	596 Quercus	640	Betulae
	597 Polygoni	641	formicarius 477
	598 Viscariae	642	mollis
	599 12-punctatus 470	643	Ceramboides
		644	Buprestoid 554
			Ceram-
Attelabus			

# FAUNULA SVECICA.

Cerambyx	645	planatus	687	4-fasciata	505
	646	Faber	688	attenuata	
	647	coriarius	689	nigra	503
	648	meridianus	690	virginea	552
	649	lamed	691	collaris	551
	650	nebulosus	692	rustica	
	651	hispidus	693	mystica	
	652	moschatus	694	detrita	
	653	ædilis	695	arietis	507
	654	alpinus	696	arcuata	
Leptura	655	Sutor	697	scalaris	494
	656	Textor	698	præusta	506
	657	Fur	699	Noctiluca	584
	658	Curfor	700	fusca	586
	659	inquisitor	701	livida	585
		(486)	702	Dermestoid.	
	660	carcharias	703	rufa	
	661	Populneus	704	sanguinea	587
	662	cylindricus	705	coccinea	
	663	linearis	706	obscura	
Elater	664	oculatus	707	lateralis	
	665	ferraticorn.	708	ænea	598
	666	rusticus	709	bipustul.	589
	667	violaceus	710	pedicularia	
	668	striatus	711	fasciata	590
	669	variabilis	712	biguttata	591
	670	testaceus	713	minima	592
	671	Curculioid.	714	testacea	593
	672	bajulus	715	peñinicorn.	
		(490)	716	cærulea	
	673	sanguineus	717	viridisima	
	674	fennicus	718	navalis	
	675	undatus	719	melanura	
	676	castaneus	720	Cardiaca	
	677	aquatica	721	brunneus	
	678	melanura	722	cruciatus	
		(501)	723	linearis	582
	679	sanguinolent:	724	ruficollis	576
	680	testacea	725	mesomelus	
	681	rubra	726	aterrimus	
	682	virens	727	castaneus	573
	683	sericea	728	liven's	
	684	4-maculat.	729	ferrugineus	
	685	interrogation	730	germanus	579
	686	6-maculata	731	sanguineus	574
					732

# FAUNULA SVECICA.

	732	balteatus	580		776	uliginosus
	733	marginatus	581		777	maculatus
	734	sputator	583		778	minutus
	735	obscurus			779	Natator
	736	tristis		Carabus	780	intricatus
	737	fasciatus			781	granulat.
	738	inurinus				(512) 513
	739	tessellatus			782	clatratus
	740	aeneus	578		783	hortensis
	741	pectinicorn.	575		784	leucophth.
	742	buprestoid.			785	nitens
	743	niger	577			(518)
	744	minutus			786	auratus
	745	pulchellus			787	violaceus
Cicindela	746	campestris	548		788	cephalotes
	747	hybrida			789	Inquisitor
	748	sylvatica	549		790	Sycophanta
	749	riparia	550		791	lividus
	750	flavipes			792	crepitans
	751	4-maculata			793	spinipes
Buprestis	752	aquatica	558		794	cyanoceph.
	753	8-guttata			795	melanocep.
	754	mariana	557		796	vaporiar.
	755	chrysostig.	556		797	meridianus
	756	rustica	555		798	ferrugineus
	757	nitidula			799	vulgaris
	758	aenea				(530)
	759	4-punctata	559		800	cærulescens
	760	minuta			801	cupreus
	761	Tenebrionis			802	piceus
	762	viridis			803	velox
Dytiscus	763	granularis			804	marginat.
	764	piceus	561		805	multi-punct.
	765	caraboides	562		806	bipunctat.
	766	fuscipes	563		807	6-punctat.
	767	luridus			808	Crux major
	768	latifissimus	564		809	Crux minor
	769	marginalis	565		810	ustriatus
	770	striatus			811	4-pustulat.
	771	cinereus	566		812	testaceus
	772	semistriat.	567		813	4-maculat.
			(568)		814	truncatellus
	773	fulcatus	569	Tenebrio	815	Molitor
	774	erythroceph.	570		816	culinaris
	775	palustris			817	Fotior
						543
						818

# FAUNULA SVECICA.

	818	<i>Cursor</i>	<i>Gryllus</i>	864	<i>bipunctatus</i>	623	
	819	<i>erraticus</i>		865	<i>subulatus</i>	624	
	820	<i>pallens</i>	531	866	<i>Grylloalp.</i>	619	
	821	<i>quisquilius</i>		867	<i>domesticus</i>	620	
	822	<i>mortisagus</i>	594	868	<i>brachyterus</i>		
	823	<i>rostratus</i>		869	<i>viridissimus</i>		
	824	<i>gibbus</i>		870	<i>verrucivor</i>	621	
Meloë	825	<i>Caraboides</i>	595	871	<i>migratorius</i>		
	826	<i>Proscarab.</i>	596	872	<i>stridulus</i>	625	
	827	<i>vesicatorius</i>		873	<i>apricarius</i>	628	
	828	<i>bimaculatus</i>		874	<i>viridulus</i>	626	
	829	<i>antherinus</i>		875	<i>biguttulus</i>		
	830	<i>floralis</i>		876	<i>rufus</i>	629	
Mordella	831	<i>paradoxa</i>		877	<i>grossus</i>	627	
	832	<i>aculeata</i>	534	878	<i>pedestris</i>		
	833	<i>humeralis</i>					
	834	<i>frontalis</i>					
	835	<i>thoracica</i>					
	836	<i>flava</i>					
Necydalis	837	<i>minor</i>	597	Cicada	879	<i>cornuta</i>	641
	838	<i>major</i>			880	<i>coleoptera</i>	
Staphylinus	839	<i>hirtus</i>	601		881	<i>spumaria</i>	636
	840	<i>murinus</i>	602		882	<i>nervosa</i>	632
	841	<i>maxillosus</i>	603		883	<i>leucophthal.</i>	638
	842	<i>erythropter</i>	604		884	<i>albifrons</i>	
	843	<i>politus</i>	605		885	<i>leucoceph.</i>	640
	844	<i>rufus</i>	606		886	<i>lateralis</i>	639
	845	<i>lunulatus</i>			887	<i>striata</i>	642
	846	<i>riparius</i>	607		888	<i>lineata</i>	637
	847	<i>bipustulat.</i>			889	<i>interrupta</i>	631
	848	<i>lignorum</i>	608		890	<i>Populi</i>	
	849	<i>subterrani.</i>			891	<i>flavicollis</i>	
	850	<i>flavescens</i>	610		892	<i>Lanio</i>	
	851	<i>biguttatus</i>			893	<i>vittata</i>	634
	852	<i>littoreus</i>	611		894	<i>aptera</i>	
	853	<i>sanguineus</i>	612		895	<i>leporina</i>	
	854	<i>Caraboides</i>	613		896	<i>viridis</i>	630
	855	<i>chrysomelin</i>	614		897	<i>flava</i>	643
	856	<i>flavipes</i>	615		898	<i>bifasciata</i>	633
	857	<i>fuscipes</i>	616		899	<i>aurata</i>	635
	858	<i>rufipes</i>	609		900	<i>Ulmi</i>	644
	859	<i>Boleti</i>			901	<i>Coryli</i>	
Forficula	860	<i>Auricularia</i>	599		902	<i>Rosæ</i>	645
	861	<i>minor</i>	600	Notonecta	903	<i>glaucha</i>	683
Blatta	862	<i>orientalis</i>	617		904	<i>striata</i>	689
	863	<i>lapponica</i>	618	Nepa	905	<i>minutissim.</i>	690
				(*** )	906	<i>cinerea</i>	691
					907		

# FAUNULA SVECICA.

Cimex	907	cimicioides	692	951	umbratilis	673	
	908	linearis		952	crassicornis		
	909	lectularius	646	953	nemorum		
	910	grylloides		954	saltatorius	676	
	911	clavicornis	687	955	arenarius	678	
			(545)	956	Pini	674	
	912	Scarabæoid.		957	Rolandri		
	913	maurus		958	lævigatus	679	
	914	fuliginosus		959	dolabratus	681	
	915	littoralis		960	striatus	680	
	916	rugosus		961	erraticus	682	
	917	corticalis	649	962	ferus	668	
	918	Betulæ		963	Populi	669	
	919	Filicis		964	Ulmi	670	
	920	Cardui	660	965	sylvestris	671	
	921	bidens	652	966	gothicus		
	922	rufipes	651	967	mutabilis		
	923	marginatus	662	968	calcaratus		
	924	punctatus		969	Abietis	672	
	925	hæmorrhoid.		970	lacustris	684	
	926	griseus	657	971	stagnorum	685	
	927	interstinct.	658	972	vagabundus	683	
	928	Baccarum	650	973	tipularius	686	
	929	duinosus		974	Coryli	675	
	930	Juniperinus	648	Aphis	975	Ribis	704
	931	prasinus		976	Ulmi	705	
	932	Morio		977	Pastinacæ	706	
	933	cæruleus		978	Sambuci	707	
	934	oleraceus	654	979	Rumicis	708	
	935	biguttatus		980	Lychnidis	719	
	936	bicolor	655	981	Padi		
	937	ornatus	661	982	Rosæ	710	
	938	ruber	653	983	Nymphææ	711	
	939	acuminatus	656	984	Tiliæ	712	
	940	leucocephal.		985	Brassicæ		
	941	minutus	659	986	Cracæ		
	942	personatus	647	987	Cirsii	713	
	943	annulatus		988	Cardui	714	
	944	ater	677	989	Tanaceti		
	945	Hyoscyami	665	990	Absinthii	715	
	946	equestris	664	991	Jaceæ	716	
	947	pabulinus		992	Betulæ	717	
	948	Kalmii	665	993	Rotoris		
	949	pratensis	666	994	Pini	718	
	950	campestris		995	Salicis		
						996	

# FAUNULA SVECICA.

	996	Populi	1039	Cardamin.	801
	997	Tremulæ	1040	Hyale	
	998	bursaria.	1041	Palæno	
	999	Aceris	1042	Rhamnus	795
	1000	Atriplicis	1043	Hyperanth.	788
Chermes	1001	graininis	1044	Pamphil.	9 789
	1002	Ulmi	1045	Arcania	
	1003	Cerastii	1046	Hippothoë	
	1004	Pyri	1047	Hero	790
	1005	Calthæ	1048	Jo	776
	1006	Urticæ	1049	Mæra	785
	1007	Betulæ	1050	Ligea	787
	1008	Alni	1051	Semele	784
	1009	Quercus	1052	Jurtina	786
	1010	Fagi	1053	Janira	
	1011	Abietis	1054	Cardui	778
	1012	Salicis	1055	Populi	
	1013	Fraxini	1056	Antiopa	772
	1014	Aceris	1057	polychlorus	773
Coccus	1015	Hesperid.	1058	Urticæ	774
	1016	Quercus	1059	C album	775
	1017	Betulæ	1060	Atalanta	777
	1018	Carpini	1061	Lucina	
	1019	Ulmi	1062	Maturna	
	1020	Coryli	1063	Cinxia	783
	1021	Tiliæ	1064	Paphia	779
	1022	Salicis	1065	Aglaja	780
	1023	polonicus	1066	Cydippe	
	1024	Pilosellæ	1067	Niobe	
	1025	Uvæ ursi	1068	Lathonia	781
	1026	Phalaridis	1069	Euphrosyne	782
Thrips	1027	Physapus	1070	Betulæ	792
	1028	minutissima	1071	Pruni	
	1029	Juniperina	1072	Quercus	
	1030	fasciata	1073	Arion	
			1074	Argus	863
			1075	Idas	804
					(805)
			1076	argiolus	
Papilio	1031	Machaon	1077	Rubi	806
	1032	Apollo	1078	Phlæas	807
	1033	Mnemosyne	1079	Virgaureæ	808
	1034	Cratægi	1080	Comina	793
	1035	Brassicæ	1081	Malvæ	794
	1036	Rapæ	1082	Tages	
	1037	Napi			
	1038	Sinapis			

# FAUNULA SVECICA.

Sphinx	1083	ocellata	1128	chrysorrhœa
	1084	Populi	1129	Salicis 822
	1085	Tiliæ	1130	Monacha
	1086	Euphorbiae	1131	Caja 820
	1087	Ligustri	1132	Plantaginis 821
	1088	Pinastri	1133	aulica
	1089	Elpenor	1134	grammica
	1090	Porcellus	1135	Sannio 837
	1091	Stellatarum	1136	Cribrum
	1092	fuciformis	1137	lota
	1093	apiformis	1138	lubricipeda 823
	1094	culiciformis	1139	Oo
	1095	vespiformis	1140	Graminis 826
	1096	tipuliformis		(886)
	1097	Filipendul	1141	Celsia 816
	1098	Statices	1142	helvola
Phalæna	1099	pavonia	1143	libatrix 833
	1100	Tau	1144	capucina
	1101	Populi	1145	camelina
	1102	Nestria	1146	palpina
	1103	Rubi	1147	Humuli 917
	1104	Pini	1148	Hecta
	1105	lanestris	1149	lupulina
	1106	Quercus	1150	Pyrina
	1107	dumi	1151	sylvina
	1108	Catax	1152	lucernea
	1109	ilicifolia	1153	complana 918
	1110	quercifolia	1154	rubicollis 885
	1111	versicolor	1155	Jacobææ 869
	1112	Vinula	1156	russula
	1113	Fagi	1157	trapetzina
	1114	Coffus	1158	Batis
	1115	bucephala	1159	fuliginosa
	1116	ziczac	1160	parthenias
	1117	cæruloceph.	1161	glyphica 847
	1118	pudibunda	1162	Mi
	1119	fascelina	1163	Vitis ideaæ
	1120	antiqua	1164	meticulosa 815
	1121	Tremula	1165	Fraxini
	1122	furcula	1166	paæta
	1123	Coryli	1167	pronuba 870
	1124	curtula	1168	Myrtilli
	1125	anastomosæ	1169	chrysitis 875
	1126	Cratægi	1170	Festucæ
	1127	mendica	1171	gamma 873
				1172

# FAUNULA SVECICA.

1172	interrogationis		1217	polymita
1173	Fulvago		1218	retusa
1174	citrago		1219	polyodon
1175	pallens		1220	nigricans
1176	Leporina		1221	turca
1177	ludifica		1222	Sambucaria
1178	aprilina		1223	amataria
1179	Aceris		1224	falcataria
1180	Chi		1225	putatoria
1181	Psi	879	1226	laetearia
1182	Absinthii		1227	vernaria
1183	conspicillaris		1228	vibicaria
1184	umbratica		1229	lacertinaria
1185	exfoleta		1230	Alniaria
1186	Verbasci		1231	pennaria
1187	putris		1232	Pruniaria
1188	Pinastris		1233	Piniaria
1189	Tragopog.		1234	Tiliaria
1190	exclamat.		1235	elinguaria
1191	comma		1236	hirtaria
1192	gothica		1237	Betularia
1193	C nigrum	874	1238	defoliaria
1194	leucomelas		1239	Ribearia
1195	typica		1240	melanaria
1196	Atriplicis		1241	papilionar.
1197	oleracea	877	1242	fasciaria
1198	perspicillar.		1243	pulveraria
1199	strigilis		1244	pendularia
1200	Rumicis		1245	atomar.
1201	lucipara		1246	carbonaria
1202	triplasia		1247	fuliginaria
1203	occulta		1248	wavaria
1204	flavicornis		1249	margaritaria
1205	Brassicae		1250	punctaria
1206	Pisi		1251	pusaria
1207	Oxyacanthæ		1252	prosapriaria
1208	Perficariæ		1253	4-fasciaria
1209	hepatica		1254	purpuraria
1210	plebeja		1255	bidentaria
1211	Triticis		1256	viridata
1212	Vaccinii		1247	emarginata
1213	litura		1258	notata
1214	depuncta		1259	dubitata
1215	oculea		1260	repandata
1216	plecta		1261	Grossular.
				849
				1262

# FAUNULA SVECICA.

1262	testata		1307	viridana	895
1263	Chenopod.	856	1308	clorana	
1264	comitata		1309	hamana	
1265	Citrata		1310	Amerina	
1266	Populata		1311	ministrana	885
1267	Prunata	866	1312	Piceana	
1268	miata	863	1313	Xylosteana	
1269	Juniperat.		1314	Rosana	896
1270	didymat.		1315	oporana	
1271	plagiata		1316	Avellana	882
1272	undulata		1317	arcuana	
1273	liturata		1318	Lecheana	
1274	atrata	864	1319	Forskaleana	
1275	clathrata		1320	Branderiana	
1276	haftata	861	1321	fuscana	
1277	tristata	862	1322	Hartmanniana	
1278	albicillata.		1323	Loeflingiana	
1279	marginata.	860	1324	Bergman.	
1280	ocellata		1325	Holmiana	883
1281	fluctuata	844	1326	Rolandriana	
1282	Alchemillata.		1327	Solandriana	
1283	Cratægata		1328	Hastiana	
1284	bilineata		1329	Wahlboomiana	
1285	lividata		1330	Lediana	
1286	aversata		1331	Modeeriana	
1287	incanata		1332	Uddmaniana	
1288	immutata		1333	cruciana	
1289	remutata		1334	Heraclean.	916
1290	immorata		1335	Alströmiana	
1291	strigilata		1336	Logieana	
1292	ferrugata		1337	gnomana	
1293	brumata	921	1338	Schreberiana	
1294	succenturiata.		1339	Schalleriana	
1295	rectangulata.		1340	pupillana	
1296	Absinthiata.		1341	pariana	
1297	Urticata	746	1342	Goihana	
1298	Nymphæat.	851	1343	mundana	
1299	Potamogat.	853	1344	tentacul.	841
1300	Stratiotata	854	1345	barbalis	
1301	Lemnata	852	1346	proboscialis	
1302	purpurata		1347	rostralis	
1303	cingulata	906	1348	Farinalis	
1304	fasciana		1349	glaucinalis	
1305	uncana		1350	pingvinal	915
1306	prasinana		1351	Frument,	

# FAUNULA SVECICA.

1352	forficalis	880	1397	Mouffetella
1353	verticalis	855	1398	Albinella 901
1354	sticticalis		1399	Bonnetella 903
1355	reticularis		1400	Leuwonhoekel.
1356	purpuralis		1401	Goedartella
1357	duplaris		1402	Merianella 900
1358	colonella	912	1403	Wilkella 899
1359	sociella	905	1404	Lyonnetella 904
1360	lutarella		1405	Rhediella
1361	ironella	920	1406	Roeftella
1362	mesomella		1407	Rajella
1363	Euonymel.	891	1408	Linneella
1364	Padella		1409	Schæfferella
1365	sequella		1410	Jungiella
1366	vittella		1411	Clerkella
1367	pascuella		1412	Harrisella
1368	pinetella		1413	Granella
1369	pratella	908	1414	tapetzella 892
1370	culmella	907	1415	pellionella 894
1371	nemorella		1416	farcitella 893
1372	rhomboid.	910	1417	vestianella
1373	trigonella	911	1418	Pomonella
1374	capitella		1419	Strobilella 914
1375	foenella		1420	Turionella
1376	ramella		1421	dodecella
1377	nisella		1422	Cembrella
1378	Salicella		1423	Resinella
1379	Cynosbatelta		1424	Tædella
1380	cinctella		1425	Lapella
1381	Petiverella		1426	bracteella
1382	unguicella	890	1427	stipella
1383	Mellomella		1428	Corticella
1384	cucullatella		1429	tertianella
1385	Arbutella		1430	tesiella 897
1386	Pruniella		1431	argentella
1387	curvella		1432	Calthella
1388	gemmella		1433	pedella
1389	picarella		1434	ustella
1390	Xyløstella	909	1435	parenthesel.
1391	Swammerd.		1436	elongella
1392	Reaumurel	902	1437	punctella
1393	Degeerella		1438	bicostella
1394	Robertella		1439	fuscella
1395	Listerella		1440	minutella
1396	Frischella		1441	mercurella

# FAUNULA SVECICA.'

1442	Populella	1478	nigra
1443	porrectella	1479	mutica 752
1444	leucatella	1480	vespertina 755
1445	cinerella	Phryganea	1481 phalænoides
1446	scabrella		1482 reticulata
1447	asperella		1483 striata 738
1448	ferratella		1484 grisea 739
1449	Juniperella		1485 grandis 740
1450	gelatella		1486 rhombica 741
1451	Lichenella		1487 bimaculata 742
1452	monadactyla		1488 flavilatera 743
1453	didaætyla		1489 bicaudata 744
1454	tessaradaæt.		1490 nigra 745
1455	tetradaætyla		1491 azurea
1456	pterodaætyla		1492 longicornis 746
1457	pentadaætyla		1493 filosa
1458	hexadaætyla		1494 wæneri

## IV. NEUROPTERA.

Libellula	1459	4-maculat.	764	Hemerobicas	1504	Perla	731
	1460	flaveolata	765		1505	chrysops	732
	1461	vulgata	766		1506	albus	
	1462	rubicunda			1507	hirtus	
	1463	depressa			1508	phalænoid.	
	1464	vulgatissim.	767		1509	Formicælo	733
	1465	cancellata			1510	Humuli	734
	1466	ænea	{ 768		1511	6-punctat.	735
			{ 769		1512	flavicans	736
	1467	grandis	770		1513	lutarius	737
	1468	juncea			1514	2-punctatus	
	1469	forcipata			1515	pedicularius	
	1470	virgo	{ 756	Panorpa	1516	communis	729
			{ 757	Raphidia	1517	ophiopsis	730
			{ 758				
			{ 759				
	1471	puella	{ 760				
			{ 761				
			{ 762				
			{ 763				
Ephemera	1472	vulgata	750				
	1473	bioculata	751				
	1474	fuscata		V. HYMENOPTERA.			
	1475	culiciformis	753	Cynips	1518	Rosæ	938
	1476	horaria	754		1519	Hieracii	950
	1477	diptera			1520	Glechomæ	949

# FAUNULA SVECICA.

1521	Quercus f.	947		1566	saltuum	
1522	Quercus bacc.			1567	flava	930
1523	Querc. pet.			1568	intercus	
1524	Querc. ped.			1569	Rumicis	
1525	Querc. gem.	948		1570	Ulni	
1526	Querc. cort.			1571	Almi	
1527	Querc. ramul.			1572	Salicis	933
1528	Fagi	946	Sirex	1573	Sigas	925
1529	Viminalis			1574	Spectrum	926
1530	Amerinæ			1575	juvencus	954
1531	Capreæ	940		1576	camelus	
1532	Sal. strob.	941		1577	marisca	
Tenthredo				1578	fugillatorius	
1533	femorata			1579	raptorius	
1534	lutea	923		1580	sarcitorius	976
1535	Vitellina					(981)
1536	Amerina			1581	extensorius	980
1537	lucorum	924		1582	quæfitorius	
1538	fasciata			1583	culpatorius	
1539	nitens			1584	infractorius	
1540	Pini			1585	constrictorius	
1541	Juniperi			1586	saturatorius	
1542	ustulata			1587	molitorius	
1543	rustica			1588	crispatorius	
1544	Padi	944		1589	Pisorius	966
1545	Scrophular.					(968)
1546	Abietis	928		1590	luctatorius	983
1547	Cerafi			1591	voluntatorius	
1548	Salicis	927		1592	vaginatorius	
1549	mesomela	936		1593	persuasor.	964
1550	rufipes			1594	lituratorius	
1551	campestris			1595	designator.	965
1552	atra			1596	edictorius	960
1553	ovata			1597	deliratorius	
1554	viridis			1598	fusorius	
1555	Rosæ	929		1599	fossorius	
1556	cincta			1600	comitator	
1557	livida	955		1601	peregrinator	
1558	septentrion.			1602	incubitor	970
1559	12·punctat.			1603	reluctator	
1560	erythroceph.			1604	denigrator	
1561	sylvatica	931		1605	desertor	
1562	nemoralis			1606	coruscator	
1563	Cynosbati	937		1607	rutilator	
1564	reticulata			1608	manifestat.	959
1565	Betulae					1609

# FAUNULA SVECICA.

	1609 compunct.	957		1654 pectinipes
	1610 delusor			1655 variegata 932
	1611 titillator			1656 colon
	1612 venator			1657 sispes
	1613 extensor	986		1658 gibba
	1614 exarator			1659 rufipes
	1615 Turionellæ			1660 atenaria 994
	1616 Strobilellæ	971		1661 semiaurata
	1617 moderator			1662 fossoria
	1618 Resinellæ			1663 leucostoma
	1619 prærogator			1664 vaga
	1620 mandator		Chrysis	1665 ignita 1004
	1621 enervator	978		1666 aurata
	1622 gravidator			1667 cyanea
	1623 inculcator	972		1668 viridula
	1624 pugillator	975		1669 fulgida
	1625 ruſpator		Vespa	1670 Crabro 988
	1626 jaculator	985		1671 vulgaris 989
	1627 affector			1672 rufa 998
	1628 luteus	967		1673 parietum 990
	1629 ramidulus	969		1674 muraria 991
	1630 glaucopter.	973		1675 cribaria 997
	1631 circumflex.	974		1676 coarctata 1002
	1632 cinetus	984	Vespa	1677 campestris
	1633 Muscarum			1678 arvensis 992
	1634 Bedeguaris	939		1679 parietina 996
	1635 Juniperi	987		1680 biglumis
	1636 Puparum			1681 uniglumis 1011
	1637 Larvarum			1682 spinipes
	1638 Gallarum			1683 bifasciata
	1639 Cynipedis	942		1684 longicornis
	1640 Coccorum		Apis	1685 tumulor. 1000
	1641 Secalis			1686 clavicorn.
	1642 subcutaneus			1687 centunc. 1010
	1643 Aphidum	953		1688 cineraria
	1644 ovulorum			1689 retusa
	1645 globatus	951		1690 rufa 1009
	1646 glomeratus	952		1691 bicornis 1008
	1647 pectinicor.			1692 truncor.
Sphex	1648 sabulosa			1693 helvola
	1649 clavipes			1694 succincta 1007
	1650 figulus			1695 ænea
	1651 viatica	977		1696 cærulescens
	1652 fusca			1697
	1653 mystacea			

# FAUNULA SVECICA.

	1697	mellifica	1003		1740	oleracea	1124
	1698	cunicular.			1741	hortorum	1125
	1699	variegata			1742	variegat.	1131
	1700	rostrata	999		1743	contamin.	1134
	1701	manicata			1744	lunata	1126
	1702	lagopoda			1745	pratensis	1128
	1703	4-dentat.			1746	terrestris	1129
	1704	florisomnis			1747	cornicina	1130
	1705	conica	1006		1748	nigra	1132
	1706	annulata			1749	atrata	1127
	1707	ruficornis			1750	bimaculata	
	1708	cariosa	1001		1751	ocellaris	
	1709	terrestris	1012		1752	annulata	1122
	1710	hortorum			1753	flavesrens	1133
	1711	pratorum			1754	regelationis	
	1712	lapidaria	1015		1755	replicata	
	1713	sylvarum			1756	monoptera	
	1714	muscorum	1017		1757	arundineti	
	1715	hypnorum	1018		1758	plumosa	1135
	1716	lucorum			1759	litoralis	1140
	1717	acervorum	1013				1136
	1718	subterranea	1014		1760	motitatrix	1137
	1719	alpina	1016		1761	vibratrix	
Formica	1720	herculeana	1019		1762	tremula	
	1721	rufa	1020		1763	monilis	1139
	1722	fusca	1021		1764	macroceph.	1141
	1723	nigra	1023		1765	Marci	1143
	1724	obsoleta			1766	brevicorn.	
	1725	rubra	1022		1767	putris	1144
Mutilla	1726	cæspitum			1768	Febrilis	
	1727	europea			1769	Florilega	1146
	1728	formicaria			1770	hortulana	1147
	1729	Acarorum			1771	phalænoid.	1148
					1772	hirta	
					1773	notata	1149
Oestrus	1730	Bovis	1024		1774	Juniperina	1150
	1731	Tarandi	1025		1775	palustris	1151
	1732	nasalis	1026		1776	longicorn.	1152
	1733	hæmorrh.	1028		1777	pennicornis	
	1734	ovis	1027		1778	rufipes	
Tipula	1735	pectinicorn.		Musca	1779	plebeja	
	1736	4-maculat.			1780	chamæleo	1029
	1737	calmariens.			1781	microleon	
	1738	rivosa	1121		1782	hydroleon	
	1739	crocata	1123		1783	pantheriana	

# FAUNULA SVECICA:

1784	morio	1067	1827	meridiana	1077
1785	maura		1828	cæsar	1098
1786	tarda		1829	cadaverina	1099
1787	hottentotta		1830	mortuor.	1101
1788	scolopacea	1066	1831	vomitoria	1102
1789	tringaria		1832	carnaria	1105
1790	Conopsoides		1833	domestica	1106
1791	anilis		1834	albifrons	1107
1792	bombylans		1835	sepulchræ.	
1793	mystacea	(1069 1071)	1836	fera	
1794	lappona	1087	1837	grossa	1076
1795	pendula	1081	1838	rotundata	
1796	florea	1080	1839	Larvarum	
1797	nemorum	1078	1840	Radicum	
1798	arbustorum		1841	canicularis	
1799	tenax	1072	1842	cremterior	1108
1800	intricaria		1843	æstivationis	
1801	œstracea	1070	1844	pluvialis	1112
1802	fallax		1845	fenestralis	
1803	lucorum		1846	roralis	
1804	sylvarum		1847	ferrata	
1805	bicincta	1086	1848	cellaris	
1806	arcuata		1849	meteorica	
1807	mutabilis		1850	putris	{ 1110 1109
1808	devia		1851	Frit	
1809	icheumonea		1852	viduata	
1810	diophthal.		1853	cupraria	1103
1811	vespiformis		1854	polita	
1812	festiva		1855	pubera	
1813	glaucia		1856	petronella	
1814	noctiluca		1857	arrogans	
1815	gibbosa		1858	ungulata	1053
1816	Ribesii	1089	1859	cibaria	
1817	Pyrastri	1090	1860	scybalaria	
1818	transfuga	1094	1861	stercoraria	1068
1819	Menthastræ	1097	1862	fimetaria	
1820	scripta	1091	1863	parietina	
1821	mellina	{ 1092 1093	1864	umbrarum	
1822	pipiens	1096	1865	grossificat.	1051
1823	segnis	1104	1866	saltuum	
1824	femorata		1867	vibrans	1052
1825	inanis		1868	cynipsea	1054
1826	pellucens	1073	1869	flava	1114
			1870	æstuans	1055 1871

# FAUNULA SVECICA.

	1871 Serratulæ	1915 tipuloides 1033
	1872 Arnicæ 1057	1916 oelandicus 1037
	1873 Hyoscyami 1058	1917 morio
	1874 germinat. 1059	Bombylius 1918 major 1119
	1875 Urticæ	1919 medius
	1876 Cardui 1063	1920 minor
	1877 Heraclii	Hippobosca 1921 equina 1043
	1878 Cerasi 1061	1922 avicularia
	1879 folstitalis 1064	1923 Hirundinis 1044
	1880 florescent. 1065	1924 Ovina
	1881 frondescent.	
Tabanus	1882 Bovinus 1045	
	1883 autumn.	VII. APTERA.
	1884 Tarandin. 1046	
	1885 Bromius 1048	Lepisma 1925 saccharina
	1886 tropicus 1047	1926 terrestris
	1887 pluvialis 1050	Podura 1927 viridis 1172
	1888 cæcutiens 1049	1928 atra 1173
	1889 lugubris	1929 fusca 1174
Culex	1890 pipiens 1116	1930 plumbea 1175
	1891 bifurcatus 1115	1931 nivalis 1176
	1892 pulicaris 1117	1932 arborea 1177
	1893 reptans 1118	1933 cincta
Empis	1894 equinus 1120	1934 aquatica 1178
	1895 borealis 1038	1935 fimetaria 1180
	1896 pennipes 1041	1936 ambulans 1170
		Termes 1637 pulsator. 1168
		1938 fatidicum
	1897 livida	Pediculus 1939 Humanus 1153
	1898 forcipata	1940 Pubis 1154
Conops	1899 stercoreæ	1941 Vespertilion.
	1900 calcitrans 1042	1942 Suis
	1901 irritans	1943 Porcelli
	1902 macroceph. 1030	1944 Cervi
	1903 vesicularis	1945 Ovis
	1904 flavipes	1946 Tauri 1155
	1905 buccata	1947 Vituli
	1906 aculeata	1948 Equi
Afilus	1907 ferruginea	1949 Tinnunc. 1157
	1908 crabronif. 1031	1950 Corvi 1158
	1909 gibbosus 1034	1951 Infausti 1159
	1910 ater	1952 Anseris
	1911 flavus 1032	1953 Sternæ 1161
	1912 gilvus 1036	1954 Gruis 1162
	1913 marginatus	1955 Ciconiæ
	1914 forcipatus	1956 Recurvirostris 1163
		1957 Hæmatopis 1164

# FAUNULA SVECICA.

	1958 Meleagridis	1160	2011 extensa	1216
	1959 Gallinæ	1166	2012 fimbriata	1226
	1960 Caponis	1165	2013 6-punctata	1233
	1961 Tetraonis		2014 4 punctata	1234
	1962 Lagopi	1167	2015 holosericea	1241
	1963 Hirundin.		2016 senoculata	
	1964 Farionis		2017 icenica	1237
Pulex	1965 irrigans	1171	2018 truncorum	1236
Acarus	1966 Reduvius	1192	2019 rupestris	1238
	1967 Ricinus	1193	2020 aquatica	1240
	1968 cancroïdis	1187	2021 saccata	
	1969 crassipes	1189	2022 virescens	1225
	1970 Passerinus	1190	1023 palustris	1219
	1971 motatorius	1188	2024 viatica	1218
	1972 Aphidioidis	1191	2025 levipes	1217
	1973 coleoptratus	1211	Cancer	
	1974 telarius	1212		
	(1796		2026 Mænas	
	1975 Siro	1195	2027 rostratus	
	(1194		2028 Pagurus	1244
	1976 exulcerans		2029 hirtellus	
	1977 geniculatus	1210	2030 Araneus	1246
	1978 aquaticus	1199	2031 Maja	1345
	1979 holosericeus	1200	2032 Bernhardus	1250
	1980 Baccarum	1201	2033 Gammarus	1248
	1981 Muscarum	1209	2034 Astacus	1249
	1982 gymnopter.	1208	2035 Mantis	
	1983 Coleoptrator.	1198	2036 trigofus	
	1984 rupestris	1202	2037 Squilla	1252
	1985 longicornis	1205	2038 Crangon	
	1986 littoralis	1206	2039 norvegic.	1247
	1987 Fungorum	1207	2040 Arctus	
	1988 scaber	1197	2041 Pulex	125
	1989 Salicin.	1203	2042 Locusta	125
	1990 croceus	1204	2043 stagnalis	135
	1991 Tremellæ		Monoculus	
Phalangium	1992 Opilio	1186	2044 foliaceus	
Aranea	1993 diadema	1214	2045 piscinus	
	1994 reticulata	1221	2046 Apus	1181
	1995 curcurbitina	1224	2047 Pulex	1182
	1996 Calycina	1228	2048 pediculus	1183
	1997 bipunctat.	1222	2049 4-cornis	1184
	1998 arundin.	1243	2050 conchaceus	1185
	1999 angulata	1213	2051 lenticularis	
	2000 domeltica	1215	2052 Asilus	
	2001 lineata	1220	2053 Oeitrum	
	2002 riparia	1222	2054 Pfora	
	2003 labyrinth.	1123	2055 Entomon	1255
	2004 redimita	1227	2056 Ceti	
	2005 corollata	1229	2057 marinus	
	2006 fumigata	1231	2058 Afellus	1257
	2007 montana	1242	2059 Armadillo	
	2008 norata		2060 scopolorum	
	2009 rufipes	1230	2061 aquaticus	1258
	2010 nocturna	1235	2062 bicaudatus	
			Scolopendra	
			2063 lagura	1264
			2064 forficata	1263
			2065 electrica	1261
			Julus	

# FAUNULA SVECICA.

Julus	2066 terrestris	1260		2114 ophiura	
	2067 fabulosus	1262	Echinus	2115 caput medusa	
	2068 complanatus			2116 esculentus	1289
				2117 spatagus	1290
	<i>Classis VI.</i>			2118 Cidaris	

## VERMES.

### *I. INTESTINA.*

Gordius	2068 aquaticus	1265		Chiton	2119 punctatus
	2069 argillaceus		Lepas	2120 anatifera	1350
Furia	2070 infernalis			2121 Scalpellum	
Ascaris	2071 vermicularis	1269	Pholas	2122 Balanus	1349
	2072 lumbricoides			2123 Balanooides	1348
Lumbricus	2073 terrestris	1271		2124 Dactylus	
	2074 marinus	1270	Mya	2125 crispatá	
Fasciola	2075 hepatica	1274		2126 truncata	
	2076 intestin.	1268		2127 arenaria	
	2077 barbata			2128 Iutaria	
Hirudo	2078 sanguisuga	1272	Solen	2129 pictorum	
	2079 medicinal.		Tellina	2130 margaritifera	1331
	2080 octoculata	725		2131 Siliqua	
	2081 stagnalis			2132 radiata	
	2082 complanat.			2133 trifasciata	
	2083 geometra	1275		2134 incarnata	1337
	2084 muricata			2135 bimaculata	
	2085 heteroclit.			2136 balthica	
Myxine	2086 glutinosa			2137 pisiformis	1335
Teredo	2087 navalis	1329	Cardium	2138 cornea	1336

### *II. MOLLUSCA.*

Limax	2088 ater	1276	Donax	2142 trunculus	
	2089 rufus	1277	Venus	2143 Gallina	
	2090 maximus	1278		2144 mercenaria	
	2091 agrestis	1279		2145 exoleta	
	2092 flavus	1280		2146 literata	
	2093 papillosus		Arca	2147 barbata	
	2094 bilamellatus		Ostrea	2148 maxima	1342
Nereis	2095 cærulea			2149 edulis	1338
	2096 pelagica		Anomia	2150 craniolaris	1347
	2097 mollis			2151 squamula	
	2098 nostiluca			2152 patelliformis	
Aphrodita	2199 aculeata	1284		2153 retusa	
Lernæa	2100 Cyprinacea	1282		2154 cap. serpentis	
	2101 Atellina			2155 Terebratula	
	2102 Salmonea		Mytilus	2156 edulis	1333
Priapus	2103 fenilis			2157 barbatus	
	2104 judaicus.			2158 anatinus	1332
	2105 felinus		Bulla	2159 Hypnorum	1303
Sepia	2106 officinalis	1281		2160 fontinal.	1302
	2107 Loligo		Buccinum	2161 Lapillus	1321
Medusa	2108 capillata	1286		2162 glaciale	
	2109 aurita			2163 undatum	
	2110 cruciata		Strombus	2164 Pes pelecan.	1323
Asterias	2111 rubens	1285	Murex	2165 antiquus	
	2112 minuta			2166 despectus	
	2113 glacialis		Trochus	2167 cinereus	

# FAUNULA SVECICA:

Turbo	2168	<i>zizyphinus</i>	Tubipora	2218	<i>Urceus</i>
	2169	<i>littoreus</i>		2219	<i>repens</i>
	2170	<i>Clathrus</i>			
	2171	<i>Terebra</i>			
	2172	<i>perversus</i>			
	2173	<i>Microrum</i>			
Helix	2174	<i>Lapicida</i>	1325		
	2175	<i>albella</i>	1322		
	2176	<i>planorbis</i>	1300		
	2177	<i>complanata</i>	1301		
	2178	<i>vortex</i>	1298		
	2179	<i>cornea</i>	1299		
	2180	<i>spirorbis</i>	1306		
	2181	<i>contorta</i>	1308		
	2182	<i>hispida</i>	1307		
	2183	<i>Pomatia</i>	1304		
	2184	<i>arbutorum</i>	1305		
	2185	<i>vivipara</i>	1309		
	2186	<i>nemoralis</i>	1296		
	2187	<i>fragilis</i>	1293		
	2188	<i>stagnalis</i>	1295		
	2189	<i>putris</i>	1312		
	2190	<i>limosa</i>	1294		
	2191	<i>tentaculata</i>	1311		
Nerita	2192	<i>auriculata</i>	1310		
	2193	<i>balthica</i>	1317		
	2194	<i>Fluviatilis</i>	1314		
	2195	<i>littoralis</i>	1313		
	2196	<i>lacustris</i>	1315		
	2197	<i>glaucina</i>	1316		
Haliotis	2198	<i>tuberculata</i>	1318		
Patella	2299	<i>vulgata</i>	1320		
	2200	<i>lacustris</i>			
Dentalium	2201	<i>Eatalis</i>	1324		
Serpula	2202	<i>planorbis</i>	1326		
	2203	<i>spirillum</i>	1291		
	2204	<i>spirorbis</i>	1292		
	2205	<i>contortopl.</i>	1327		
	2206	<i>triquerra</i>			
	2207	<i>glomerata</i>	1328		
	2208	<i>ringens</i>			
<i>IV. LITHOPHYTA.</i>					
Madrepora	2209	<i>turbinata</i>			
	2210	<i>truncata</i>			
	2211	<i>stellaris</i>			
	2212	<i>favoia</i>			
	2213	<i>organum</i>			
	2214	<i>flexuosa</i>			
	2215	<i>Ananas</i>			
	2216	<i>ramea</i>			
Millepora	2217	<i>Eschara</i>			
<i>V. ZOOPHYTA.</i>					
			Isis	2220	<i>Hippuris</i>
				2221	<i>Anastatica</i>
			Gorgonia	2222	<i>Flabellum</i>
				2223	<i>Placomus</i>
			Alcyonium	2224	<i>pinnata</i>
				2225	<i>arboreum</i>
				2226	<i>digitatum</i>
				2227	<i>rubrum</i>
			Tubularia	2228	<i>gelatinosum</i>
				2229	<i>ramosa</i>
			Flustra	2230	<i>muscoidea</i>
				2231	<i>foliacea</i>
				2232	<i>fistulosa</i>
			Corallina	2233	<i>pilosa</i>
				2234	<i>officinalis</i>
				2235	<i>squamata</i>
				2236	<i>corniculata</i>
			Sertularia	2237	<i>rubens</i>
				2238	<i>crystata</i>
				2239	<i>pumila</i>
				2240	<i>tamarisca</i>
				2241	<i>abietina</i>
				2242	<i>halecina</i>
				2243	<i>myriophylla</i>
				2244	<i>falcata</i>
				2245	<i>pluma</i>
				2246	<i>echinata</i>
				2247	<i>antennina</i>
				2248	<i>lendigera</i>
				2249	<i>geniculata</i>
				2250	<i>polyzonias</i>
				2251	<i>flexuosa</i>
				2252	<i>burlaria</i>
				2253	<i>loricata</i>
				2254	<i>fastigiata</i>
				2255	<i>scruposa</i>
			Hydra	2256	<i>polypus</i>
				2257	<i>socialis</i>
				2258	<i>umbellaria</i>
			Pentatula	2259	<i>triticea</i>
				2260	<i>phosphorea</i>
			Tenia	2261	<i>mirabilis</i>
				2262	<i>vulgaris</i>
				2263	<i>lata</i>
			Volvox	2264	<i>Sodium</i>
				2265	<i>canina</i>
				2266	<i>globator</i>

*Classis*

## Classis I.

MAMMALIA  
I. MAGNATES

## Homo.

1. HOMO *Sapiens* Naturæ regnorum Tyrannus:

$\alpha$  SVECI e variis Nationibus europæis mixti.

$\beta$  GOTHI Corpore proceriore, Capillis albidis, Oculorum iridibus cinereo-cærulecentibus.

$\gamma$  FENNONES Corpore toroso, Capillis flavis prolixis, Oculorum iridibus fuscis.

$\delta$  LAPPONES Corpore parvo, Capillis nigris brevibus rectis, Oculorum iridibus nigricantibus.

Hospitantur SVECI $\alpha$ , imprimis in Urbibus populosioribus,

GOTHI $\beta$ , in remotissimis provinciis, imprimis inter Smolandiam & Blekingiam. Dalekarliam inhabitantes cum his in variis convenient, sed & in variis differunt.

FENNONES  $\gamma$ , ab orientali plaga sinus Bothnici.

LAPPONES  $\delta$ , e gente Samojedica orti, intra Lapponiæ sylvas per hyernes & inter alpes per æstates, semper in casis & tenforiis, absque domibus, palatiis, viis, sepimentis, cerealibus, vitam agentes pastoritiam inter Tarandos, pecorâ his apud nostrates propria.

## Vespertilio:

2. VESPERTILIO *murinus caudatus*, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus.

Bell. av. 147. Vespertilio.

Gesn. av. 694. Vespertilio.

Aldr. orn. I. p. 571. Vespertilio.

Jonst. av. 34. Vespertilio.

Charl. exerc. 80. Vespertilio.

Raj. quadr. 243. Vespertilio.

Alb. orn. 3. p. 95. t. 101. Vespertilio.

*Suecias Läderlapp, Flädermus. Smolandis Nattblacka.*  
*Habitat in cavis arborum & murorum rimis, noctu volitat,*  
*phalænis vicitat. Hybernat uti Ursus, Erinaceus, Talpa,*  
*eo Striges prædantur.*

*DESCR.* Dentes primores superiores 6, acuti, distantes.  
 inferiores 4, acuti contigui.  
*Laniarii* superiores 2, anteriore majore.  
 inferiores 3, antico inaximo.  
 Molares utrinque 3, tricuspidati.  
 Manus pentadactylæ palmato-alatae maximæ.  
 Palmæ pentadactylæ fistæ parvæ.  
 Maxilla inferior prominet extra superiorem.

3. VESPERTILIO *auritus* nafo oreque simplici, auriculis du-  
 plicatis capite majoribus.  
 Habitat ut præcedens in arboribus cavis.  
 Forte sola *varietas sexus*, nec distincta species; vix quid-  
 quam determino.

### III. FERÆ.

#### Phoca.

4. PHOCA *vitulina* dentibus caninis tectis. *Fn. II.*  
*Gesn. aqu. 702. Phoca s. vitulus marinus.*  
*Aldr. pise. 722. Phoca s. vitulus.*  
*Jonst. ichth. t. 44. Phoca vulgaris.*  
*Rond. pise. 1. p. 453. Vitulus marinus.*  
*Gall. adopt. 191. t. 191. Veau marin.*  
*Raj. quadr. 189. Phoca s. vitulus marinus.*  
*Ephem N. C. 1. p. 9. t. 1. Phoca.*  
*Suecias Siäl.*

Habitat in mari Bothnico & Baltico frequens.

Varietas duplex numeratur Grä-Siäl & Wikare-Siäl: hic parit Februario, ille Januario; hic solitarius incedit, ille gregarius; hic niger est, ille canus.

CAPUT Felis brevissimum; *Setæ*, supra oculos utrosve, quinque, in orbe positiæ, tanquam in verruca. *Mystaces* undulatæ, utrinque septem ordinibus. Dentes primores superiores 6, inferiores 4; *laniarii* solitarii superiores distantes; inferiores approximati. Lingua e-marginata levis. Brachia intra cutem pectoris retracta: Palmae digitis 5 vix fissis interioribus: sensim minoribus. Femera connexa cum cauda: Plantæ 5-dactylæ digitis exterioribus latioribus; interme-diis brevioribus. Cauda brevissima, planiuscula, obtusa. Auriculae nullæ: apertura auris clausilis. Mammæ unbilicales due, retractiles. Plaga supra nasum mox occiditur. It. gotl. 2 o. W-Goth 191. Capitur Re-tibus. It. Gott. 184. 270, 299. a piscatoribus editur. It. Goth. 198.

Canis  
DSI

## Canis.

5. CANIS familiaris cauda sinistrorum recurva. Fn. 12.

Gesn. quadr. 91. Canis socius & fidelis.

Raj quadr. 177. Canis cicurus, domesticus s. socius.

Charl. onom. 23. Canis villaticus.

Suecic Hund.

a Charl. onom. 23. Canis sagax.

Suecic Jagt-hund.

β Raj quadr. 176. Canis venaticus grajus. s. græcus, non nullis scoticus.

Suecic Wint-hund.

γ Raj. quadr. 176. Canis mastivus.

Gesn. quadr. 92. Canis sanguinarius,

Suecic Blod-hund.

δ Raj. quadr. 177. Canis aquaticus aviarius.

Suecic Engelsk Dogg.

ε Raj. quadr. 177. Canis melitæus.

Suecic Knå-hund.

ζ Synt. nat. 39. Canis fricator.

Suecic Mops.

η Aldr. digit. 555. Canis pantherinus.

Suecic Fogel-Hund.

ϑ Canis hispanicus. it. W-goth. 117.

ι Vulgi Canis nudus æthiopicus.

Suecic Naken-Hund.

Hospitatur in domibus, exoticæ originis, frequentissimus:

Historia Canis familiaris in Amœnit. Academ. vol. 4. p. 43.

6. CANIS Lupus cauda incurva. Fn. 13.

Syst. nat. 36. Canis cauda recta corpore breviore.

Gesn. aquat. 152. Lupus.

Aldr. quadr. 144. Lupus.

Jonst. quadr. 89. Lupus.

Charl. onom. 14. Lupus vulgaris.

Raj. quadr. 173. Lupus.

Suecic Warg, Ulf.

Habitat hodie vulgaris in sylvis, ante 26. annos rarius animal in Suecia.

COLLUM facile flectit; Unguis incurvatis incedit, inmediam diu tolerat, nec nisi summo frigore & fame lacesitus hominem adgreditur. Pediculus Pulicesve non fert. Capitur area, lupina. it. W-goth. 16.

7. CANIS Vulpes cauda erecta: apice albo. Fn. 14.

Synt. nat. 36. Canis cauda recta longitudine corporis.

Gesn. quadr. 55. Vulpes.

## MAMMALIA FERÆ. FELIS.

*Aldr. quadr. 195.* *Vulpes.*

*Jonst. quadr. t. 56.* *Vulpes.*

*Charl. onom. 14.* *Vulpes.*

*Raj. quadr. 177.* *Vulpes.*

*Suecic* Råf.

Habitat ubique in sylvis.

Varietates plurimæ dantur in nostra Suecia.

α *Fulvus*, qualis noster communis est.

β *Cruciatus*, Korsfråf.

γ *Ferrugineus*, Brandråf.

8. CANIS *lagopus* cauda recta: apicē concolore. *Syst. nat. 10.*

*p. 40.*

*Vulpes alba.* *Kalm. Babuf. 236.*

*Isatis. Act. petropol. 1760. v. 5. p. 353.*

*Suecic* Fiäll Racka.

Habitat in alpibus Lapponicis, vivitans Muribus Lemmis.

PEDES densissime hirsuti ut in Lepore. Variat Cærulescente colore.

## Felis.

9. FELIS *Catus* cauda elongata, corpore fasciis nigricantibus; dorsalibus longitudinalibus tribus: lateralibus spiralibus.

*Felis cauda elongata: auribus æqualibus.* *Fn. 3.*

*Gesn. quadr. 98.* *Felis vulgo Catus.*

*Aldrov. digit. 564.* *Felis.*

*Jonst. quadr. 180. t. 72.* *Felis domestica.*

*Charl. onom. 20.* *Felis.*

*Raj. quadr. 93.* *Felis vulgo Catus.*

*Suecic* Katta.

Hospitatur in domibus cicurata; exoticæ originis.

10 FELIS *Lynx* cauda abbreviata apice atra, auriculis apice barbatis.

*Felis cauda truncata; corpore rufescente maculato:* *Fn. 4.*

*Syst. nat. 35.*

*Gesn. quadr. 155.* *Lupus cervarius.*

*Aldrov. digit. 90.* *Lynx.*

*Jonst. quadr. t. 71.* *Lynx.*

*Charl. onom. 13.* *Lynx,*

*Raj. quadr. 166.* *Lynx.*

*Suecic* Warglo.

Habitat in sylvis densis, arbores scandens.

*SUTURA* velleris & a latere reflexo auricula ad humeros.  $\beta$  a gula versus brachium & cubitum ad latu anterius exteriusve.  $\gamma$  ab ano ad genu posticum.  $\delta$  duplicata a genu ad calcaneum: pilis interjectis reflexis, rigidulis, brevioribus.

*VERRUCA* setiferæ supra oculos 6 maiores superiores; 8 minores inferiores. Verrucæ temporum 5, quorum duæ superiores æquales; tres vero inferiores remotiores: intermedia majore. Verrucæ ad calcanea palmarum 4 inæquales.

- II. **FELIS** cauda truncata, corpore albo maculato. *Fn. 54.*  
*Act. upf. 1736. p. 2. n. 3.* *Lynx* colore albo, maculis nigris,  
 cauda truncata.

*Suecic* Kattlo.

Habitat rarius in vastissimis sylvis, arbores scandens.

Vulgo notum animal, nescio quo casu a me non visum.

### Viverra.

12. **VIVERRA** *Lutra* plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breviore.

*Lutra* digitis omnibus æqualibus. *Fn. 10.*

*Bell. aquat. 31. t. 32.* *Lutra.*

*Gesn. ichth. 515.* *Lutra.*

*Aldr. quadr. 294.* *Lutra.*

*Fonst. quadr. 104.* *Lutra.*

*Schonev. ichth. 46.* *Lutra.*

*Charl. onom. 17.* *Lutra.*

*Scott. phys. 1063. f. 45.* *Lutra.*

*Gall. adope. 147. t. 147.* *Lutra.*

*Raj. quadr. 187.* *Lutra.*

*Suecic* Utter.

Habitat in fluviis, stagnis, piscinis, passim.

13. **VIVERRA** *Lutreola* ore albo, plantis palmatis hirsutis, digitis subæqualibus *Hwitt. 79*

*Fennis* Tichuri. *Suecic* Mænk.

Habitat in Finlandia aquosis, victitans piscibus, Ranis, insectis aquaticis.

*CORPUS* fulvo-fuscum: pilis brevioribus flavescentibus; longioribus nigris. *Statira* Lutrae, sed triplo minor. *Aures* subrotundæ. *Os* album. *Lingua* testa papillis inollibus. *Vertex* canescens pilis albis immixtis. *Pedes* palmati, pentradactyli. *Ungues* non retractiles, *Cauda* in acumen attenuata, vestita pilis paullo longioribus. *Gadd.*

### Mustela.

14. **MUSTELA** *Gulo* pedibus fissis, corpore rufo-fusco: medio dorso nigro. *Fn. 6.*

6 MAMMALIA FERÆ. MUSTELA.

*Charl. onom.* 14. *Gulo.*

*Scheff. lapp.* 339. *Gulo.*

*Rzatz. polon.* 218. *Gulo.*

*Suecic Järf;* *Filfrass.*

Habitat in alpibus Lapponicis, Dalekarlicis, sylvisque vastissimis.

15. MUSTELA *Martes* pedibus fissis, corpore fulvo-nigricante, gula pallida.

*Mustela fulvo-nigricans*, *gula pallida.* Fn. 7.

*Gesn. quadr.* 151. *Martes.*

*Jonst. quadr.* t. 64. *Martes.*

*Charl. onom.* 19. *Martes.*

*Scott. phys.* 1068. t. 46. f. 3. *Martes.*

*Raj. quadr.* 200. *Martes*, aliis *Foyna.*

*Suecic Mård.*

Habitat in sylvis fageticis abietinisque.

DESCR. Duplex datur varietas Fagorum & Abietum.

Aures breues. Nasus prominens. Maxilla superior obtusa. Dentes superiores incisores 6, paralleli, parvi, obtuso-acuti; canini 2, maximi, spatio remoti; Molares 5, quorum tres anteriores simplices minores, reliqui duo spatio remoti. Inferiores incisores 6, quorum duo medi retusi, minimi, obtusi. Canini duo maximi, cum incisoribus paralleli: Molares uti superiores. Lingua longa, lavis, testa papillis acutis, molibus, retro-pectantibus,

Pedes 5-dactyli, digitis subæqualibus, undique villoso, semipalmipedes, pollice paulo breviore.

Cauda magna, longitudine corporis ad collum uique.

Color totius fuscus, collo subtus pallide albo. Mustaces ut in Fele,

16. MUSTELA *Putorius* pedibus fissis, corpore flavo-nigricante, ore auriculisque albis.

*Mustela flavescente-nigricans*, ore albo, collaris flavescens. Fn. 8.

*Gesn. quadr.* 767. *Putorius.*

*Aldr. quadr.* 330. *Putorius.*

*Jonst. quadr.* 155. t. 64. *Putorius.*

*Merr. pin.* 163. *Putorius.*

*Raj. quadr.* 199. *Putorius.*

*Scania Iller.*

Habitare fertur in Scania campestris.

17. MUSTELA *Erminea* pedibus fissis, caudæ apice atro.

*Gesn. quadr.* 149. *Mustela.*

*Aldr. quadr.* 307. *Mustela vulgaris.*

*Jonst. quadr.* t. 74. *Mustela vulgaris.*

*Raj. quadr.* 195. *Mustela vulgaris.*

*Charl.*

*Charl. onom.* 19. *Mustela sylvestris.*

*Smolandis Welsa.*

*β Raj. quadr.* 193. *Mustela candida* f. *animal Ermineum recentiorum.*

*Charl. onom.* 19. *Hermellanus.*

*Wagn. helv.* 180. *Mustela alpina candida.*

*Suecic* *Hermelin*, *Lekatt.*

*Habitat in sylvis, præsertim Lapponiæ; nec non passim ad domos.*

*Æstate griseo fusca est, sed subtus alba, Hyeme tota nivea, caudæ apice semper nigro, vix ab extremitate ad medium.*

### 18. MUSTELA *nivalis* *candæ apice vix pilis ullis nigris.*

*Suecic* *Snö-Mus.*

*Habitat in Westrobothnia.*

*Præcedenti simillima, nivea, cauda etiam alba sed pilis tantum paucissimis extimis nigricantibus, nec toto caudæ apice nigris; Corpus dimidio minus est Ermineo.*

## Ursus.

### 19. URSUS *Arctos* *cauda abrupta.* Fn. 2.

*Gesn. quadr.* 14. *Ursus.*

*Aldrov. digit.* 117. *Ursus.*

*Scott. phys.* 1093. t. 50. *Ursus.*

*Jonst. quadr.* 125. t. 55. *Ursus.*

*Charl. onom.* 13. *Ursus.*

*Gall. adopt.* 67. t. 67. *Ursus.*

*Raj. quadr.* 171. *Ursus.*

*Suecic* *Biörn.*

*Habitat in sylvis vastissimis densissimisque borealibus Sueciæ.*

*Fila e tendinibus conficiunt Lappones Tarandinis præstantiora.*

*Præter Carnes edit Angelicam & Epilobium.*

### 20. URSUS *Meles* *cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus nigro, fascia trans oculos auresque nigra.*

*Meles unguibus anticis longissimis.* Fn. 15.

*Gesn. quadr.* 686. *Meles.*

*Aldr. quadr.* 264. *Taxus.*

*Jonst. quadr.* t. 64. *Taxus.*

*Charl. onom.* 17. *Taxus & Daxus.*

*Raj. quadr.* 185. *Taxus f. Meles.*

*Merr. pin.* 168. *Taxus suillus, Meles.*

*Suecic* *Gråf-svin.*

Habitat in sylvis umbrosis depressis lapidosis, minus frequens.  
 DESCR. Corpus magnitudine Canis, supra cinereum pilis albis medio nigris; subtus fuscum una cum pedibus. Caput supra album; fascia nigra per oculos & aures. Mammae 6: in Pectore versus abdomen 2; in medio abdominis 2; ad inguina 2. Pedes pentadactyli; palmarum intermedii longiores.

Setæ supra oculos 3 nigrae. Cavitas supra anum, sub cauda, magna, subrotunda, secernens liquorem sebaceum

## IV. BESTIÆ.

### SUS.

21. SUS Scrofa dorso antice setoso, cauda pilosa. Fn. 36.

Gesn. quadr. 146. Aper.

Aldr. bisulc. 1013. Aper.

Charl. onom. 11. Aper.

Jonst. quadr. 74. Aper 96. Sus agrestis s. Aper.

Suecic Will-Swin.

$\beta$  Charl. onom. 11. Sus.

Aldr. bisulc. 937. Sus.

Jonst. quadr. 47. Scrofa.

Gesn. quadr. 872. Sus.

Raj. quadr. 92. Sus s. Porcus domesticus.

Suecic Swin.

Hospitatur ubique, at Aper in Oelandia a Rege nostro

FRIDERICO I. ibidem introductus;

Sues monungulæ s. ungulis solidis, nec bifidis, passim in uplandia occurrunt domestici.

Historia Suis Scrofæ in Amœnit. Acad. vol. 5. p. 461.

### Erinaceus.

22. ERINACEUS europæus auriculis rotundatis, naribus cristatis.

Erinaceus spinosus auriculatus. Fn. 37.

Gesn. quadr. 368. Echinus terrestris.

Aldr. quadr. 459. Echinus terrestris.

Jonst. quadr. 119. t. 68. Erinaceus.

Charl. onom. 19. Erinaceus.

Raj. quadr. 231. Echinus s. Erinaceus terrestris.

Seb. thes. I. p. 78. t. 49. f. 1. 2. Erinaceus parvus nostras.

It. gottl. Jul. 10. Erinaceus.

Suecic Igelkott.

Habitat

# MAMMALIA GLIRES. TALPA. 9

Habitat in Gotlandia & Gothia frequens; in Suecia rario; in Norlandia vix occurrit; Hybernatur.

DESCR. *Corpus* spinis undique cooperatum: spinis subcinereis vel albidis zonis fuscis variis. *Caput* (excepto vertice) & *corporis pars supina* pilis, non spinis, tecta, subcinerea. *Auriculae* rotundæ. *Oculi* parvi, nigri. *Nasus* acutus: narium foramina exteriore latere appendiculo membranaceo-carnoso criso instructa. *Manus* ursi pentadactyli & *palmæ* omnino similes, e quibus secundus longior reliquis. *Præputium* propendens. *Mammæ* osto. *Odor* ambrasiacus, etiam stercoris.

## Talpa.

23. TALPA *europæa* caudata, pedibus pentadactylis. Fn. 17.

Gesn. quadr. 931. Talpa.

Aldr. quadr. 451. Talpa.

Fonst. quad. 118. Talpa.

Charl. exerc. 25. Talpa.

Raj. quadr. 236. Talpa.

Seb. thes. I. p. 51. t. 32. f. 2. Talpa virginianus niger.

α Seb. thes. I. p. 63. t. 41. f. 1. Talpa alba nostras.

β Seb. thes. I. p. 68. t. 41. f. 4. Talpa maculata ostifrisca.

Suecias Mullvad. Smolandis Surck.

Habitat sub terra in agris, pratis, hortis.

## Sorex.

24. SOREX *Araneus* canda corpore longiore. Fn. 33.

Gesn. quadr. 747. Mus araneus.

Aldr. quadr. 441. Mus araneus.

Fonst. quadr. t. 66. Mus araneus.

Charl. onom. 25. Mus araneus.

Schwenckf. quadr. 114. Mus araneus.

Dal. pharm. 450. Mus araneus.

Raj. quadr. 239. Mus araneus.

Suecias Nabbmus.

Habitat passim in fodiinis, sylvis.

DESCR. *Corpus* cinereo-nigricans, magnitudine Muris minoris, *Cauda* exæste muris, longa. *Aures* breves, amplæ. *Rostrum* suillo magis prominens, apice naribus instructo, longissimo, undique vibrizis obvallato.

*Labium* inferius  $\frac{2}{3}$  minus superiori. *Pedes* nudi 5-5, fissi.

*Maxilla* inferioris molares 4. acuti, quadrifidi. *Incisores* 2. recti, ferrati, superioris molares 4. bifidi. *Canini* 4. minimi. *Incisores* 2. bifidi, incurvi;

## V. GLIRES.

### Lepus.

25. LEPUS *timidus* cauda abbreviata, auriculis apice nigris.

*Lepus cauda abrupta; pupillis atris.* Fn. 19.

*Gesn. quadr. 69.* *Lepus.*

*Aldr. quadr. 247.* *Lepus.*

*Fonst. quadr. t. 65.* *Lepus.*

*Charl. onom. 20.* *Lepus.*

*Raj. quadr. 204.* *Lepus.*

*Suecic Hare.*

Habitat ubique in sylvis, apud nos æstate cinereus, hyeme semper albus. Cauda vero semper alba & auricularum apices nigri. Supercilia setis 5 nigris. Mystaces setis numerosis: superioribus nigris: inferioribus albis. Sub cauda utrinque sinus magnitudine pomi, cum glandula pisiformi mobili.

Transcedentem truncum rodit; ideoque laqueo facilmente occiditur.

*Luxatio colli facillima & mox lethalis.* it. w. goth. 270.

*E* lana alba *Leporis conficitur acu pannus* (Filt dictus), retia potius dicas pulicum, in quibus pulices omnes congregantur corporis totius, Dalekarlorum experimento, corpori intra indusium scilicet admotus.

## 26. LEPUS *Cuniculus* cauda abbreviata, auriculis nudatis.

*Lepus cauda brevissima, pupillis rubris.* Fn. 20.

*Gesn. quadr. 72.* *Cuniculus.*

*Aldr. quadr. 382.* *Cuniculus.*

*Fonst. quadr. t. 65* *Cuniculus.*

*Charl. onom. 21.* *Cuniculus.*

*Raj. quadr. 205.* *Cuniculus.*

*Suecic Kanin.*

Hospitatur in domibus, aliunde advectus.

## Castor.

### 27. CASTOR *Fiber* cauda ovata plana. Fn. 23.

*Ælian. anim. 359.* *Castor.*

*Hildeg. phys. 115.* *Biber.*

*Bellon. aquat. 29. t. 30.* *Fiber.*

*Gesn. ichth. 185.* *Castor.*

*Fonst. ichth. t. 68.* *Castor.*

*Rond. ichth. 236.* *Castor.*

*Charl. onom. 17.* *Castor.*

*Gall. adopt. 131. t. 131.* *Castor.*

*Scott. phys. 979. t. 33.* *Castor f. Biber.*

*Schonev. ichth. 34.* *Fiber f. Castor.*

*Raj. quadr. 209.* *Castor f. Fiber.*

*It. lapp. maj.* 28.

*Suecic* Báfwer. *Smolandis* Biur.

Habitat in lacubus & fluviis, præsertim Lapponiæ, vicitans  
corticibus Populi, Sorbi &c.

28. CASTOR *moschatus* cauda longa compresso-lanceolata, pe-  
dibus palmatis. *Fn.* 24.

*Clus. exot.* 375. *Mus aquaticus exoticus.* *Jt. wgoth.* 161.

*Worm. mus.* *Mus aquaticus.*

*Raj. quadr.* 217. *Mus aquaticus exoticus.*

*Suecic* Dæfman.

Habitat in stagnis vadosis; visus ut fertur in Suecia, sed  
non nobis; in Russia frequens.

### Mus.

29. MUS *Lemmus* cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, cor-  
pore fulvo nigroque variegato. *Fn.* 26.

*Scheff. lapp.* 346. *Mus montanus.*

*Ol. Magni sept.* l. 18. c. 20. *Lemmus.*

*Worm. mus.* 322. t. 325. *Mus norwagicus vulgo Lemming.*  
*monogr.* 6. *Mus norwagicus.*

*Olear. mus.* 21. t. 12. f. 6. *Leming.*

*Raj. quadr.* 227. *Mus norwagicus vulgo Leming.*

*Charl. onom.* 22. *Mus norweticus.*

*Act. stockb.* 1740. p. 326. t. 6. f. 4. 5. *Mus cauda abrupta;*  
corpo fulvo nigro-maculato.

*Suecic* Fiällmus, Sabellimus. *Lappis* Lumwick.

Habitat in alpibus Lapponicis; non omni anno descendit gre-  
gatim in adjacentes Provincias, incertis temporibus & annis.

30. MUS *agrestis* cauda abbreviata, corpore nigro-fusco, abdo-  
mine cinerascente. *Fn.* 27.

Habitat in Agris, frequens sub messe.

31. MUS *terrestris* cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere brevioribus.  
*Mus cauda longa pilosa*; auribus subrotundis vellere bre-  
vioribus. *Fn.* 29.

*Suecic* Molle.

Habitat plerumque sub terra ad pedis profunditatem, cunicu-  
los pañim ejiciens & ad aquas, hortis admodum noxius.

*DESCR.* Magnitudo & facies ferme precedentis; at *cauda* minime glabra  
& nuda, sed pilosa uti corpus, nec est ejusdem longitudinis ac in Ratto,  
cum in hoc vix dimidiā corporis longitudinem adtingit. *Dorsum* fu-  
scum

scum f. nigrum. *Abdomen* cinereo-fuscum. *Aures* parvæ, pilosæ, uti reliquum corporis. *Dentes* superiores buxei coloris. *Pedes* 5-5: pollice manuum minimo.

32. *MUS amphibius* cauda elongata pilosa, plantis palmatis.  
*Castor* cauda linearis tereti. *Fn. 25.*  
*Raj. quadr. 217.* *Mus major aquaticus* f. *Rattus aquaticus*.  
*Habitat* in fossis, paludibus & ad aquas lutofas rarius.  
*Obscurum* nobis Animal, nec rite visum; an cum præcedenti idem?
33. *MUS Rattus* cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis.  
*Mus cauda longa* subnuda, corpore fusco-cinerascente:  
*Gesn. quadr. 109.* *Mus domesticus major*,  
*Jonst. t. 66.* Glires.  
*Raj. quadr.* *Mus domesticus major* f. *Rattus*.  
*Suecic Rotta*.  
*Habitat* ubique in Suecia, excepta Lapponia, in domibus tædiosus.  
*DESC.* *Corpus* griseum, subtus album. *Aures* subovatae, pilis brevibus testæ. *Verruca* supra oculos pilis 2. longis *Mystacei* albæ, longitudine capitis. *Pedes* 4-5 fissi, supra pilis albis brevissimis testi, subtus papilloso-verrucosi; *Digiti* compressi. *Ungues* laterales breviores, *cauda* longitudine corporis, subnuda, squamosa, pilis brevissimis scabra.
34. *MUS Musculus* cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, pollice mutico.  
*Mus cauda longa* nudiuscula; corpore cinereo-fusco, ab domine subalbescente. *Fn. 31.*  
*Raj. quadr. 218.* *Mus domesticus vulgaris* f. *minor*.  
*Jonst. quadr. t. 66.* *Mures*.  
*Suecic Mus*.  
*Habitat* ubique in domibus & sylvis glandiferis, noxiū animalium rebus esculentis.  
*Corpus* subtus albidum. *Pedes* 4-5, sub singulis verrucæ 6. *Cauda* longitudine corporis pilosiuscula,
35. *MUS avellanarius* cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante. *Fn. 32.*  
*Raj. quadr. 220.* *Mus avellanarum minor*.  
*Habitat* in sylvis, hortis sæpe infestus.
36. *MUS sylvaticus* cauda elongata, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido.  
*Mus cauda longa*, corpore nigro-flavescente, abdomine albo. *Fn. 30.*  
*Raj. quadr. 218.* *Mus domesticus medius*.  
*Habitat* in domibus & sylvis.

Sciurus

Sciurus.

37. SCIURUS *vulgaris* auriculis apice barbatis, palmis tetradae-  
ctylis, plantis pentadactylis.  
Sciurus palmis solis saliens. Fn. 21.  
Gesn. quadr. 13. Sciurus.  
Jonst. quadr. t. 66. Sciurus.  
Raj. quadr. 214. Sciurus vulgaris.  
Suecic Ikorn. Østrobosnienfibus Gråskinn.  
Habitat in arboribus frequens; æstate ruber, hie me incanus;  
Gråwerck dictus.  
Varietas nivea rarissima. it. wgoth. 222. Navigat stipula &  
caudam dat ventis It. gotl. 222.
38. SCIURUS *volans* hypochondriis prolixis volitans. Fn. 22.  
Seb. thes. 1. p. 67. t. 41. f. 3. Sciurus volans.  
Aet. petrop. 5. p. 210. Quadrupes volatile Russiæ.  
Habitat in *Finlandia* & *Liapponia*, licet rarius.

VI. PECORA.

Cervus.

39. CERVUS *Alces* cornibus acaulibus palmatis, caruncula gut-  
turali. Fn. 37.  
Gesn. quadr. 39. Alces.  
Aldr. bisulc. 836. Alce.  
Jonst. quadr. 65. t. 30. Alce.  
Charl. onom. 9. Alce.  
Scott. phys. 901. t. 24. Alce.  
Gall. adopt. 169. t. 169. Alce.  
Raj. quadr. 39. Alce.  
Olear. mus. 12. t. 9. f. 2. Alces cornu.  
Suecic Ælg.  
Habitat in sylvis rarius obvius hodie, quam olim.
40. CERVUS *Elaphus* cornibus ramosis teretibus recurvatis.  
Fn. 38.  
Gesn. quadr. 79. Cervus, Cerva, Hinnulus.  
Jonst. quadr. t. 31. Cervus.  
Charl. onom. 8. Cervus.  
Raj. quadr. 84. Cervus.  
Suecic Hiort, Kronhiort.

Habi-

# 14 MAMMALIA PECORA. CERVUS.

Habitat in sylvis rarius, in vivariis Regis frequens.

*JUBA* dorsalis, supra humeros erectiuscula, nigra. *Caruncula* sub gula, magnitudine pollicis, tecta barba nigra, tereti. *Ungulae* succenturiatae ad palmas divaricatae ad plantas parallelae, retrospectantes.

41. **CERVUS Tarandus cornibus ramosis teretibus: summitatis palmatis.** Fn. 39.

*Gesn. quadr. 130.* Rangifer.

*Aldr. bisulc.* 859. Tarandus.

*Jonst. quadr. t. 37.* Cervus palmatus.

i. 36. Cervus mirabilis. fig. bona.

t. 34. Tragelaphus.

t. 34. Hippelaphus.

*Olear. mus. 16. t. 10. f. 3.* Rhangifer. (fig. bona)

*Raj. quadr. 88.* Cervus rangifer.

*Charl. onom. 9.* Rangifer & Tarandus.

*Suecias Rhen.*

Habitat in alpibus Lapponicis plane spontaneus; licet & ciceres pecora sint unica Lapponum.

Hujus femina æque ac mas cornuta est, quamuis huic cornua minora: reliquæ species feminis ineribus gaudent. Ruminat æque ac aliæ species sui generis; vietitatem præfertim Lichenibus per hyemem.

Historia Cervi Tarandi in *Amœnit. Acad. vol. 4. p. 144.*

42. **CERVUS Dama cornibus ramosis compressis: summitate palmata.** Fn. 40.

*Bell. itin. clus. 57.* Dama.

*Gesn. quadr. 84.* Dama vulgaris platyceros.

*Aldr. bisulc.* 741. Dama.

*Jonst. belg. t. 31.* Dama.

*Raj. quadr. 81.* Cervus platyceros.

*Suecias Dof.* Dofhiort.

Habitat in vivariis Regis & Magnatum; nec non interdum in sylvis.

43. **CERVUS Capreolus cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida.** Fn. 41.

*Gesn. quadr. 64.* Capra, Capreolus s. Dorcas.

*Aldr. bisulc.* 738. Caprea Plinii. Capreolus.

*Jonst. quadr. t. 33.* Capreolus marinus.

t. 33. Capriolus.

*Charl. onom. 9.* Dorcas.

*Raj. quadr. 89.* Caprea plinii, Capreolus vulgo:

*Suecias Rådjur.*

Habitat in sylvis, rarius hodie, quam olim.

Capra

## Capra.

44. CAPRA *Hircus cornibus carinatis arcuatis.* Fn. 42.

Gesn. quadr. 57. Capra.

Aldr. bisulc. 619. Caper.

Fonst. quadr. 27. Hircus.

Charl. onom. 7. Hircus domesticus.

Raj. quadr. 77. Capra domestica.

Suecic Get.

Hospitatur culta frequens, vietitans tenellis ramulis fruticum.

Castratio pedum ne sepimenta supersiliat. it. Wgoth. 117.

## Ovis.

45. OVIS *Aries cornibus compressis lunatis.* Fn. 43.

Aldr. bisulc. 370. Ovis.

Gesn. quadr. 138. Ovis.

Fonst. quadr. 38. Ovis.

Raj. quadr. 73. Ovis domesticus.

Charl. onom. 6. Ovis.

Suecic Får.

Hospitatur ubique culta; vivit præsertim in aridis steriliſſimis: imprimis lætatur Festuca ovina.

Historia Ovis in Amaen. acad. vol. 4. p. 169.

## Bos.

46. BOS *Taurus cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis.* Fn. 44.

Charl. onom. 5. Bos domesticus.

Aldr. bisulc. 13. Bos.

Gesn. quadr. 25. Bos.

Raj. quadr. 70. Bos domesticus.

Suecic Ko, Nöt.

Habitat ubique culta; nullibi apud nos Ursus sylvestris est: vietit præsertim plantis paludosis.

## VII. BELLUÆ.

### Equus.

47. EQUUS *Caballus cauda undique setosa.* Fn. 34.

Gesn:

*Gesn. quadr.* 132. *Equus*, *Caballus*, *Equa*.

*Aldr. quadr.* 12. *Equus*.

*Fonst. quadr.* 1. t. 1. 23. 4. *Equus*.

*Charl. onom.* 2. *Equus*.

*Raj. quadr.* 62. *Equus*.

*Suecic* Hæst.

Hospitatur interdum sponte in Scania & Gottlandia, communiter cicur. Oelandi *Equi*, ex gothici maris insula, totius orbis minimi. *Fonst. quadr.* 20.

Hippomannes theophrasti: Corpus linguiforme, facie lénis, intra ós pulli, dum excluditur, frequens observatur, de quo veteres multa: magicum & antepilepticum &c.

Perit sæpe inopinato sub initio aestatis in pascua eductus ab æstris copiosis intra ventriculum habitantibus.

## VIII. CETE.

### Monodon.

48. MONODON *Monoceros*. *Art. gen.* 78. *syn.* 108. *Fn.* 263.

*Charl. onom.* 168. *Monoceros unicornu marinum*.

*Sconeſ. ichthb.* 28. *Balæna decimum genus Nahrwal*.

*Will. ichthb.* 42. *Monoceros piscis*.

*Raj. pifc.* 11. *Monoceros piscis de genere cetaceo*.

*Tulp. obs.* 14. *obs.* 59. t. 375. *Unicornu marinum*.

*Dal. pharm.* 413. *Monoceros unicornu*.

Habitat in mari atlantico.

OBS. Non datur in natura quadrupes monoceros. Fabula desumpta est ab hujus piscis dente, quem veteres crediderant Quadrupedis alterum cornu.

### Balæna.

49. BALÆNA *Mysticetus* naribus flexuosis in medio capite, dorso impenni.

Balæna fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato. *Ari. gen.* 76. *syn.* 106. *Spec.* 106. *Fn.* 264.

*Gesn. aqu.* 114. *Balæna vulgo dicta*.

*Aldr. cet.* 688. *Balæna vulgi*.

*Fonst. pifc.* 152. *Balæna vulgaris*.

*Rond. pifc.* 1. p. 475. *Balæna vulgo dicta* f. *Musculus*.

*Charl. onom.* 46. *Balæna vulgaris*.

*Schoneſ. ichthb.* 24. *Balæna bellonii*.

*Willug. ichthb.* 35. *Balæna bellonii*.

*Raj. pifc.* 6. *Balæna vulgaris edentula*; dorso non pinnato.

*Dal. pharm.* 414. *Balæna*

*Suecic*

*Suecis* Grönlands walfisk.

Habitat in mari atlantico vietitans Medusis.

§o. BALÆNA *Physeter* naribus in medio capite, dorso extremo pinna adiposa.

Balæna fistula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorso. Art. gen. 77. syn. 107. Fn. 265.

Raj. pisc. 9. 10. Balæna edentula, corpore striatiore, dorso pinnato.

Will. ichth. 41. Physeter.

Rond. ichth. 485. Physeter.

Gesn. aquat. 723. 851. Physis bellua f. Physeter:

Aldr. cet. 689. Physeter.

Jonst. pisc. 216. Physeter.

Charl. pisc. 167. Physeter f. Physis.

*Suecis* Finn-fisk. Martens. spitsb. 125.

Habitat in mari norwegico & editur ab incolis; sapiebat fere ut Sturio, qui quotidie ab incolis edebatur, dum per Finmarkiam summe septentrionalem Norvegiae peregrinabat.

## Delphinus.

§1. DELPHINUS *Phocæna* corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtuso. Art. gen. 75. syn. 104. Fn. 266.

Bellon. aqu. 16 Tursio.

Gesn. aqu. 711. Phocæna f. Tursio.

Aldr. cet. 719. Phocæna f. Tursio.

Jonst. pisc. 220. t. 41. Phocæna;

Will. ichth. 31. Phocæna.

Raj. pisc. 13. Phocæna.

*Suecis* Marfwin, Tumblare.

Habitat ubique in mari vulgaris; sed à nostris rarius capitur.

it. Gotl. 198. Scan. 116.

§2. DELPHINUS *Orca* rostro sursum repando; dentibus lati ferratis. Art. gen. 76. syn. 106. Fn. 267.

Gesn. aqu. 635. Orca.

Aldr. cet. 698. Orca.

Jonst. pisc. 217. Orca.

Rond. pisc. 483. Orca.

Schonef. ichth. 53. Orca.

Charl. onom. 168. Orca.

Will. ichth. 40. Orca.

Raj. pisc. 10. Orca.

*Suecis* Lópare

Habitat in mari occidentali.

OBS. Sunt procul dubio longe' plures hujus ordinis Pisces in mari occidentali & septentrionali, quorum notitia nos fugit, cum raro capiantur, & mortui a solo vulgo observentur & negligantur.

### Catodon.

53. CATODON *macrocephalus* dorso impenni, fistula in cervice.

Catodon fistula in cervice. *Art. gen.* 79. *Syn.* 108. *Fn.* 262.

*Clus. exot.* l. 6. c. 17. Cete.

*Willug. ichth.* 41. Cete clusio descriptum.

*Raj. pisc.* 11. Cete Pot-walfisch batavis maris accolis dictum.

Habitat in mari norvegico.

## Classis. II.

## AVES.

## I. ACCIPITRES.

## Falco.

4. FALCO *Chrysaëtos* cera lutea; pedibus lanatis; corpore fuscō ferrugineoque vario, cauda nigra basi cinereo-undulata. Fn. 56.

Will. orn. 27. t. I. Chrysaëtos.

Raj. av. 6. n. I. Chrysaëtos.

Suecic Orn.

Habitat in petris altis & præruptis. Ova 4.

DESCR. *Corpus magnitudine Anseris majoris, ferrugineo-fuscoque nebulosum. Caput collumque supra magis nigricantia. Remiges nigrae: secundariae parum albido nebulosae. Cauda rotundata: Rectricibus nigris, versus basin cinereo-undulatis s. nebulosis. Apud regio ferruginea. Pedes ferruginei, testi usque ad digitos. Rostrum breve, apice aduncum, nigro, mystacis setis constructæ, supra quas cera lutea, in qua nares transversæ.*

55. FALCO *Albicilla* cera flava; rectricibus albis; intermediis nigris. Fn. 58.

Bell. icon. 15. Pygargus.

Gesn. av. 205. Pygargus.

Will. orn. 31. Pygargus s. Albicilla; quibusdam Hinularia.

Raj. av. 7. n. 5. Pygargus.

Suecic Hafc-Orn.

Habitat passim in sylvis.

DESCR. *Corpus testaceum; pennæ capitis & colli acutæ; pennarum magno albicat s. pallescit. Abdomen brunneum. Remiges nigrae, quarum maiores introrsum albæ; harum duodecim versus apicem albæ, extiorsum vero nigræ. Tibiae, rostrum & cera lutea; magnitudo anseris. Femina albidior est.*

56. FALCO *ruficollis* cera palpebris pedibusque luteis; corpore cinereo alboque undulato, collari albo.

Habitat in Suecia.

**DESCR.** Magnitudo Gallinæ. *Rostrum* plumbeum. *Gula* alba immaculata. *Corpus supra* cinereum albo undulatum. Collum ferme annulo albo cinctum. *Subtus* corpus album, adspersum maculis fuscis cordatis parvis. *Cauda* rotundata fasciis 12. s. 13. albis fuscisque. *Ungues* nigri.

57. **FALCO Milvus** cera flava; cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidiore. *Fn.* 59.

*Gesn.* av. 610. *Milvus..*

*Aldr. orn.* 368. t. 1. *Milvus..*

*Will. orn.* 41. t. 6. *Milvus..*

*Raj. av.* 17. n. 6 *Milvus..*

*Albi. orn.* 1. p. 4. t. 4. *Milvus..*

*Suecic* Glada.

Habitat ubique vulgaris.

**DESCR.** *Corpus supra & infra* ferrugineum, *pennis a tergo & supra* alas in medio nigra macula, versus basin albis; in capite *pennæ* albae acuminatæ rachi nigra apicibusque albidis. *Pectus & femora* longis peritinis ferrugineis rachi nigra veltita sunt. *Remiges primores* 10: quarum 1-5. supra nigrae, at 6-10. nigro-ferruginea, subtus omnes 1-10 pone albent; *remiges secundariae* 11-20 supra nigricantes apicibus ferrugineis, subtus cinereæ, fasciis nigricantibus, *Cauda* longa, forcipata, rufa, remige 1 supra margine exteriore nigricante. *Pedes* flavi, unguis nigri. *Rostrum* nigrum, cera flava.

58. **FALCO gentilis** cera pedibus flavis, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. *Fn.* 60.

*Will. orn.* 46. *Falco gentilis i. e. nobilis dictus.*

45. t. 5. *Falco montanus.*

*Raj. av.* 13. *Falco gentilis i. e. nobilis dictus.*

*Falco montanus.*

*Suecic* Falk.

Habitat in alpibus Dalekarlicis copiose, ubi quotannis capitur a Germanis.

**DESCR.** Magnitudo Gallinæ aut Corvi. *Pedes, Cera, Iris oculorum* flava. *Corpus totum* cinereum maculis fuscis: *Cauda* cinerea; fasciis quatuor transversis fuscis. *Capitis penne* nigra lateribus ferrugineis. Collum, dorsum & alæ supra fuscæ apicibus pennarum ferrugineis; subtus flavescens maculis rariis oblongis fuscis sub gula, collo, pectori, abdomine; adhuc angustioribus in femoribus. *Remiges fuscæ a latere nudo*, at interiori latere albide cum punctis cinerascentiis & fasciis fuscis 5 vel 6. *Rectrices extra* & subtus oxines fuscæ, fasciis latis 5 vel 6 nigricantibus, equalibus, apice obsoleus: *rectrices* subtus albido-flavescentes lineolis longitudinibus rariis fuscis.

59. **FALCO Subbuteo** cera pedibusque flavis, capite fuscō, nucha alta, abdome pallido maculis oblongis fuscis. *Fn.* 64.

*Alt. orn.* 1. p. 6. t. 6. *Subbuteo.*

*Andr. piæ.* Dendro-Falco.

Habitat in Scania. *J. Leche.* nidificat in cavis arborum; inmittitur ad aucapium Alaudarum.

**DESCR.**

**DESCR.** Femina. *Rostrum* cæruleum; *cera* flava, *palpebrae* luteæ; *iris* rubra. *Caput* nigro-fuscum, *nucha* albicante; *gula* & *latera* *capitis* albida. *Abdomen* albicans cum macula oblonga in singula penna. *Femora* ferruginea. *Cauda* subtus albicante ferruginea. *Alæ* cauda longiores.

*Remiges* nigro cinereoque cærulescentes, exceptis primoribus nigris apicis *margine* albicante. *Remiges* 1-20 maculis 5 ad 10 albidis a latere interiore, excepto 21.

*Cauda* acuminata rectricibus subtus maculatis, exceptis intermediis duabus longioribus & immaculatis; in singula rectrice macula 9. pallide ferruginea, præsertim in latere interiore conspicua.

*Pedæ* nudi, lutei. *pennæ* omnes totius corporis versus basin cinereo-cærulescentes.

60. **FALCO Buteo** *cera* pedibusque luteis, corpore fusco, ab domine pallido maculis fuscis. *Fn. 65.*

*Gesn. av. 46.* *Buteo.*

*Will. orn. 38. t. 6.* *Buteo vulgaris.*

*Raj. av. 16. n. 2.* *Buteo vulgaris* s. *Triorchis.*

*Uplandis Quidfogel.*

Habitat pastum, frequens *Upsaliæ* ad *Gottsfunda*. Pulli me dio *Juñii* mensis sepibus nostris insident, continuo ejulatu, unde *Uplandis Quidfogel* dicitur.

**DESCR.** Magnitudo Gallinæ. *Rostrum* unguisque nigra, *cera* pedesque flavi. Tota avis capite, collo supra fusca: pennarum marginibus ferrugineis; subtus tota avis ex albido flavescens, maculis longitudinalibus fuscis, quarum posteriores fere cordatae. Iris exalbida; membrana nictitans cærulescens. *Remiges* nigricantes, latere interiore inferne albi, horum 1. 2. 3. 4. absque, reliqua cum fasciis 5. vel 6. magis obscuris latere interiore externe & interne pinguntur. *Rectrices* nigro-cinereæ, aquales, fasciis plurimis obscurioribus, præsertim supra conspicuis, apice obsolete ferrugineæ; basin versus subtus albae sunt rectrices. Ova alba maculis subrufis paucis.

61. **FALCO Tinnunculus** pedibus ceraque flavis, lateribus rufescentibus: punctis nigris, pectore striis fuscis, cauda rotundata. *Fn. 67.*

*Gesn. av. 54.* *Tinnunculus* | *Aldr. orn. 1. 5. c. 6.* *Tinnunculus*  
accipiter. | s. *Cenchrus.*  
*Will. orn. 50. t 5.* *Tinnunculus*  
s. *Cenchrus.*  
*Raj. av. 16. n. 16.* *Tinnunculus.*  
*Alb. orn. 1. p. 7. t. 7.* *Tinnunculus.*

*Suecic Kyrko-falk.*

Habitat in turribus & muris præaltis. Ova 4. albida maculis rubentibus crebris. columbas devastat audacissimus.

*MARIS* caput canum fibris tenuissimis nigris striatum, constantibus ex rachi singulae pennæ nigra. *Rostrum* breve, curvum, cæruleo-atrum; cuius maxilla superior utrinque denticulo, uti inferior sinu, notata. *cera* flava, uti & regio nuda circum oculos flava. *Gula* albida.

*Dorsum* & *rectrices* alarum rufæ s. ferrugineæ, singula pluma versus apicem macula nigra acuta notata.

*Pectus*, venter & femora dilutius rufa s. ferruginea, maculis longitudinalibus nigris linearibus in pectore, ovatis in abdomen, miliaribus rarioribus in femore.

Sub cauda regio pallida immaculata. regio a dorso ad caudam cana.

*Tibiae* maxima ex parte nudæ luteæ.

*Remiges* 22. quorum secundus longissimus, reliqui deinde gradu breviores; omnes fasci supra, subtus cani, antice immaculati (exceptis secundariis parum ferrugineis), postice finibus seu maculis albidis septem vel octo.

*Rectrices* longæ, laterales breviores, omnes canæ, versus apicem fascia lata nigra notatae; omnes antice immaculatae, at pone s. introrsum linea octo nigris latiusculis notatae, exceptis pennis 2 intermediis, quæ his maculis defixauntur & totæ canæ sunt, excepta fascia ad apicem, ut in reliquis nigra.

*Teſſeræ* alarum subtus albæ maculis parvis nigris.

**FEMINA.** Magnitudo Columbae. omnia ut in mare, sed caudæ color præcipue diversus est, & corpus magis obscurum.

*Rectrices* 12. ferrugineaæ, apice macula magna nigra terminata, & singula 9 vel 10 lineis transversis nigris notatae. harum 6. 6. seu intermediae summo apice non albent, ut reliquæ 1. 2. 3. 4. 5.

62. **FALCO Lanarius** cera lutea, pedibus rostroque cæruleis, corpore maculis nigris longitudinalibus. *Fn.* 61.

*Gesn.* av. 76. *Lanarius*.

*Aldr. orn.* 1. 7. c. 10. *Lanarius gallorum*.

*Will. orn.* 48. *Lanarius* cuius mas *Tertiarius*.

*Raj. av.* 15. n. 13. *Lanarius*.

*Alb. orn.* 2. p. 7. t. 7. *Lanarius*.

Habitat in sylvis, rario ayis migratoria.

**DESCR.** Dorsum & Alæ ferrugineaæ; Caput & corpus totum subtus cinereo-alba maculis nigris longitudinalibus. Cauda longa maculis oppositis albidis. Tibiae ultra medium vellite. Pedes cærulei. Rostrum cæruleoscens. Hinc distinctissimus a Lanario Italico.

63. **FALCO Haliætus** pedibus ceraque cæruleis; corpore supra fuscō, subtus capiteque albo. *Fn.* 57.

*Gesn.* av. 74. *Falco*, cui pedes cærulei, *Cyanopoda*.

*Aldr. orn.* 1. 2. c. 3. *Haliætus*.

1. 2. c. 7. *Morphnos*.

*Will. orn.* 37. t. 6. *Balbusardus*.

*Raj. av.* 16. n. 3. *Balbusardus anglorum*.

*Suecic Blåfot*, *Fisk-örn*.

Habitat hujini inter arundines juxta aquas; Ova 4. alba, elliptica, magna. Vicitat piscibus.

**DESCR.** Cera cæruleoscens. Iris flava. Nares oblongæ. Pedes cæruleoscentes; digitus extimus retrosum quasi versatilis; corporis color supra fuscus, excepto capite albo. Corpus subtus totum album; unguis subtus testiculus.

64. **FALCO Gyrfalco** cera cærulea, pedibus luteis, corpore fuscō fasciis cinereis, caudæ lateribus albis. *Fn.* 62.

*Rudb.*

*Rudb. piæ.* Falco albo-cinereus viridis, pedibus luteis.

*Will. orn. 44.* Gyrfalco.

*Raj. av. 13. n. 3.* Gyrfalco.

Habitat rarius apud nos, Columbis infestus.

DESCR. Dorsum nigro-cinereum, Venter albo-cinereus maculis transversis. Pedes lutei. *Magnitudo Galli.*

65. FALCO *Apivorus* cera nigra; pedibus seminudis flavis; capite cinereo; caudæ fascia cinerea, apice albo. *Fn. 66.*

*Will. orn. 38. t. 3.* Buteo apivorus s. vespivorus.

*Raj. av. 16. n. 2.* Buteo apivorus s. vespivorus.

*Alb. orn. 2. p. 8. t. 8.* Accipiter palumbarius.

*Suecic Slaghök.*

Habitat in sylvis. Ova cinerea maculis obscuris.

DESCR. Rostrum nigrum: cera nigra rugosa, iris oculorum crocea. Caput cinereum, Dorsum ferrugineo-fuscum. Caudæ rectrices apice albæ, tum linea transversa nigra, dein fascia lata cinerea. Peñus & abdomen alba maculis nigricantibus. Pedes flavi.

66. FALCO *aeruginosus* cera fusca, corpore griseo, vertice gula axillis pedibusque luteis. *Fn. 63.*

*Will. orn. 42. t. 7.* Milvus aeruginosus.

*Raj. av. 17. n. 4.* Milvus aeruginosus.

*Alb. orn. 1. p. 3. t. 3.* Milvus aeruginosus.

*Suecic Hóns-tjuf.*

Habitat in sylvis.

DESCR. Corpus testaceum. Vertex, Gula & Axillæ flavæ, Tibiæ nudæ flavæ.

67. FALCO *palumbarius* cera nigra margine pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus pallide fasciatis apiceque albis.

*Raj. av. 18.* Accipiter palumbarius.

Habitat in Suecia, Gallinis infestus.

DESCR. *Magnitudo Gallinæ.* Corpus fuliginosum. Caput. ab oculis ad nucham cinetum fascia obsoleta albicante. Subtus corpus album fasciis fuscis undulatis copiosissimis; sub Gula vero lineolæ longitudinales fuscæ. Digitus extimus membrana connexus.

68. FALCO *Nisus* cera viridi; pedibus flavis; pectore albido fuscoque undulato; cauda fasciis nigricantibus. *Fn. 63. 8*

*Albin. orn. 3. p. 4 t. 4.* Accipiter fringillarius.

*Alb. orn. 1. p. 5. t. 5.* Accipiter fringillarius.

*Gesn. av. 51.* Falco fringillarius.

*Gesn. av. 52.* Accipiter minor mas, quem vulgo Nisum s. Sparverium appellant.

*Aldr. orn. l. 5. c. 2.* Acci-  
piter Fringillarius.

*Bell. ic. 19. 6.* Accipiter  
Fringillarius.

*Will. orn. 51. t. 5.* Acci-  
piter Fringillarius s. recen-  
tiorum Nisus & Sparve-  
rius.

*Raj. av. 18. n. 2.* Fringil-  
larius accipiter, recentio-  
rum Nisus & Sparverius.

*Suecic* Sparfhök.

Habitat in antiquis turribus & alibi passim.

*DESCR.* Cauda fusca fasciis nigris quinque. Pectus, abdomen, collum  
subtus alba undulis transversis fuscis. Dorsum & corpus supra fuscum,  
Pedes slavi. Cera viridis.

*Aldr. orn. 345.* Moschetus,

## Strix.

69. STRIX *Bubo capite aurito, corpore ruso.* Fn. 45.

*Gesn. av. 234.* Bubo primus.

*Bell. av. 25. a.* Bubo.

*Willugb. orn. 62. n. 12.* Bubo primus.

*Alb. orn. 2. p. 9. t. 9.* Bubo.

*Suecic* Uf.

Habitat in petris sylvaticis præruptis, arcibus ac turribus  
præaltis, ruderatis, Viætitans leporibus, muribus.

*DESCR.* Magnitudo circiter anseris domesticæ. Corpus testaceo-rufum  
lineolis omnibus transversis undulatis nigris & majoribus longitudina-  
libus icidem nigris. Cauda alis longior fasciis folididis. Alæ maculis  
nigris adpersæ. Tibia & pedes crasso vellete, leporis instar, vestitæ.  
Restrum nigrum basi fetis loco ceræ vestitum.

70. STRIX *scandiaca capite aurito, corpore albido.* Fn. 46.

*Rudb. pict.* Bubo scandianus.

Habitat in alpibus Lapponicis.

*DESCR.* Magnitudo Meleagridis; corpus totum album nigris maculis  
adpersum. Similis Strigi Nyctea, ni supercilia aurita adest in hoc  
Bubone.

71. STRIX *Otus capite aurito pennis sex.* Fn. 47.

*Bell. icen. 25. 6.* Afio, Otus.

*Will. ornith. 64. t. 12.* Otus s. Noctua aurita.

*Raj. av. 25. n. 2.* Otus s. Noctua aurita, Afio latinis.

*Alb. orn. 2. p. 10. t. 10.* Otus s. Afio.

*Suecic* Horn-uggla.

Habitat

Habitat in fylvis, cavis arboribus & domibus desertis.

72. STRIX *Aluco* capite lœvi, corpore ferrugineo, iridis atris, remigibus primoribus ferratis. *Fn. 48. it. oel. 69.*

*Will. ornith. 67. t. 13. Aluco minor.*

*Raj. av. 25. n. t. Aluco minor.*

*Alb. av. 2. t. II. Aluco.*

Habitat in cavis arborum.

DESCR. Magnitudo fere Gallinæ; *Color* dorſi, caudæ, alarum griseus, *Caput* e griseo albo nigroque maculatum. Pone aures circuli segmentum nigrum e pennis singularis strukturæ. *Maculae* albae ad latera dorſi & in tegetibus alarum. *Remiges* 1. 2. 3. sensim breviores, & exteriori marginè ferratae; omnes 1-24 griseæ fasciis latis fulcis. *Rectrices* subgriseæ fasciis 5 subfuscis, exceptis duabus intermediis. *Abdomen* albicans maculis oblongis griseis nigricantibus. *Pedes* albidi punctis nigricantibus.

73. STRIX capite lœvi; corpore luteo. *Fn. 49.*

*Rudb. piæt. Strix tota flammea.*

Habitat Upsaliæ rarius. *Rudbeck.*

An præcedentis varietas?

74. STRIX capite lœvi; corpore fusco; iridibus oculorum fulvis. *Fn. 50.*

*Rudb. piæt. Noctua major, oculorum iridibus croceis.*

Habitat in Suecia boreali.

DESCR. Magnitudo Cuculi, mihi non satis perspecta.

75. STRIX *funerea* capite lœvi, corpore fusco, iridibus oculorum flavis. *Fn. 51.*

*Frisch. av. 1. 98. Ulula flammeata?*

*Rudb. piæt. Noctua major, oculorum iridibus pallide luteis.*

DESCR. Antecedenti similis, sed paulo maior. *Magnitudo* corvi. *Corpus* totum supra fardido-cinereum maculis pisiformibus albis. *Caput* utrinque annulo fardido-nigricante cinctum; intra annulos singulos color fuscoalbicans; infra circulos albidum est caput cum tintura e fardido fusca. *Iris* oculorum pallide lutea. *Rostrum* albidum; *ungues* nigri.

76. STRIX *Nyctea* capite lœyi, corpore albido. *Fn. 54.*

*Rudb. piæt. Noctua scandiana maxima ex albo & cinereo variegata.*

*Edw. av. 61. t. 61.*

*Suecæ Harfång.*

Habitantem reperi *Aresie* in prædio Fulleröa.

DESCR. Gallo duplo major; *Corpus* totum fere niveum; *Pectus* & abdomen lineis undulatis transversis fuscis, utræ & testrices alarum eodem modo piætæ. *Remiges* expansi nivei, secundum longitudinem alarum duplex ordine macularum parvarum, subrotundarum, cinerearum, quibus & interdum tertius macularum ordo accedit. *Caput* fere album,

ut & cauda, quæ tamen nigris minimis punctis aut maculis temere notantur. *Variat* maculis lunatis fuscis uti in Svecia; in Alpibus lapponicis tota nivea.

77. STRIX *Stridula* capite lævi, corpore ferrugineo, remigie tertio longiore. *Fn. 55.*

*Aldr. orn. 561. t. 563.* Strix.

*Will. orn. 65.* Strix.

*Raj. av. 25. n. 2.* Strix.

*Svecis Skrik Uggla.*

Habitat in fylvis frequens per Sueciam.

78. STRIX *Ulula* capite lævi, corpore supra fusco albo-maculata, rectricibus fasciis albidis. *Fn. 52.*

*Gesn. av. 773.* Ulula.

*Aldr. orn. 68. c. 6.* Ulula.

*Will. orn. 68. t. 13.* Ulula aldrovandi,

*Raj. av. 26. n. 4.* Ulula latinis.

Habitat inter Pithoam & Luloam urbes Westrobothniæ.

DESCR. Multa habet cum antecedenti communia, ut forte vel sexu vel ætate sola differat. *Corpus* supra fuscum maculis albis majusculis adspersum; subtus tota avis cinereo-alba lineis transversis subundulatis fuscis, ita ut singula penna fasciis 5 vel 6 fuscis piæta sit. *Alæ* fuscæ maculis raris albis, quin remiges fuscæ a lateribus maculis subrotundis albis notentur. *Cauda* pedalis fere, angusta, fusca, fasciis 9. vel 12. albidis cincta. *Caput* cinereum punctis 5 undulis conglobatis tegitur. Regio temporum cinereo-alba. *Canthus oculi* uterque niger; a regione aurium macula nigra oblonga descendit usque ad maxillam inferiorem, sensim angustata, quam excipit macula oblonga cinerea undulis raris nigris, dein & alia nigra primæ simillima, quæ basi cum prima coit. *Mentum* f. gula macula parva nigra tegitur. *Tibiae* plumosæ cinereæ lineis pallidis tectæ. *Ungues* acutissimi, pallido-nigricantes. Magnitudo avis corvi est.

79. STRIX *passerina* capite lævi, corpore fusco, remigibus maculis albis quinque ordinum. *Fn. 53.*

*Gesn. av. 620.* Noctua.

*Aldr. orn. 1. 8. c. 7.* Noctua.

*Will. orn. 69. t. 13.* Noctua minor & minima.

*Raj. av. 26. n. 6.* Noctua minima.

*Alb. orn. 2. p. 12. t. 12.* Noctua minima.

Habitat in cavis arborum. Ova 4. maculata.

DESCR. Magnitudo Merulæ. *Corpus* totum supra fusco-cinereum punctis albicantibus; infra vero totum albicans cum maculis longitudinalibus fuscis. *Alæ* subtus maculis albis per 5. ordines dispositis, quarum extimæ minores sunt, extus in aliis puncta albida per 5. vel 6. ordines disposita. *Cauda* lineis 4 albis transversis. *Caput* punctis numerosis albis; tempora alba. *Rostrum* luteum vibrissis nigris. *Pedes* albidi subtus lutei, unguibus nigris.

LANIUS.

## Lanius.

80. LANIUS *Excubitor* cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba.

Ampelis cærulescens, alis caudaque nigricantibus. Fn. 181.

Will. orn. 53. t. 10. Lanius cinereus major.

Raj. av. 18. n. 3. Lanius f. Collurio cinereus major.

Alb. orn. 2. p. 12. t. 13. Lanarius cinereus major.

*Acupibus* Warfogel.

Habitat paßim in arboribus minus frequens. Hac ad Falcones indigitandos utuntur Falconarii.

DESCR. Magnitudo merulæ. Caput & dorsum canum. Macula longa atra a rostro per oculos ad aures. Gula & totum corpus subtus albus. Remiges 1-9 nigri, a basi ad medium albi, 10 similis primoribus, sed latere tantum interiore infra medium albus. 11-13 similes primoribus. Cauda cuneiformis. Rectrices intermediæ nigrae exceptis summis apicibus; laterales quo exteriores eo magis basi & apice albæ, ut extimæ tantum in medio nigrae.

81. LANIUS *Collurio* cauda cuneiformi, dorso griseo, rectribus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.

Ampelis dorso griseo, macula ad oculos longitudinali. Fn. 180,

Will. orn. 54. Lanius tertius.

Raj. av. 18. Lanius minor rufus f. tertius aldr.

Alb. orn. 2. p. 14. Lanarius tertius.

Habitat in arbustis pratorum. Ova 6. alba versus extremitatem obtusiorem circulo fusco-rufescente.

DESCR. Rostrum conico cultratum, maxilla superiore longiore utrinque apice emarginata. Caput & uropygium cara tunt. dorsum griseo, f. rufotestaceum. Venter a gula ad sterni finem, ut & latera corporis, e dilute rubicundo alba. Venter pone sternum albus. Linea a fronte & basi rostri per oculos ad aures nigra & supra hanc linea minor alba. Remiges nigricantes, 3 4 5 6 7 8 basi levissime albæ; hinc macula alarum alba. Rectrices nigrae, at a basi ad medium, ut & apicibus extimis omnes albæ, exceptis intermediis quatuor omnino nigris. Pedes nigri. Rostrum nigrum, rectrices narium nigrae, faux alba. Lingua bifida lacera, ergo non œnanthes f. Mothacillæ species. Magnitudo Pyrrhulæ.

FEMINA hujus diverso colore a mare gaudet & est.

Raj. av. 19. n. 5. Lanius minor.

Alb. orn. 2. p. 14. t. 15. Lanarius tertius femina.

DESCR. Rostrum, magnitudo & facies praecedentis, imo & locns. Caput griseum, dorsum griseo-testaceum lineolis transversis nigris. in singula penna prope apicem singularis, venter & pectus ad gulam usque albicans, manifesta lutei mixtura; lineolis undulatis crebris. Remiges nigricantes immaculati. Rectrices griseæ, margine & apice albæ, exceptis 4 intermediis unicoloribus; penæ rectrices extimæ solitariae breviores ut in praecedenti. adeoque MAS rectribus nigris basi apiceque albis quatuor intermediis unicolo-

28 AVES. ACCIPITRES. LANIUS.

*coloribus; FEMINA rectricibus cinereis margine apiceque albis: intermodiis quatuor immaculatis.*

82. *LANIUS Garrulus* remigibus secundariis apice membranaceo colorato, cauda integra.

*Ampelis* remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis. Fn. 179.

Gesn. av. 703. *Garrulus bohemicus.*

Jonst. orn. 44. *Garrulus bohemicus gesneri*, *Ampelis aldr. t. 43. Picæ glandariæ genus.*

*t. 17. Picæ glandariæ species alia.*

Will. orn. 90. *t. 20. Garrulus bohemicus.*

Raj. av. 85. *Garrulus bohemicus.*

Alb. orn. 2. p. 25. *t. 126. Garrulus bohemicus.*

Suecic SidenSwantz. *Uplandis Snötuppa.*

Habitat in sylvis; accedit instante hyeme; æstate migrat vel nidificat in Boreales terras.

**DESCR.** *Rostrum* nigrum, convexum. *Maxilla superior* longior, incurva, utraque apice utrinque emarginato. *Lingua cartilaginea*, acuta, bifida. *Caput ferrugineum*, pennis longioribus versus nucham. *Linea alba* ad canthum oris. *Cinereum totum corpus* est, at versus caput magis castaneum. Nigra sunt *gula*, *tempora* s. *oculorum regio*, *rectrices narium*, *rostrum*, *pedes*, *reniges*, *rectrices*. *Grisea* sunt *rectrices inferiores caudæ* (frons & regio sub oculis in quibusdam); pennis longiores capitis dum erigit cristata est. *Rectrices nigrae*, æquales, apicæ flavæ, costa rubicunda. *rectrices caudæ* croceo-fuscae, vel supra cinerea, subtus ferruginea: *Reniges nigri*: quorum 1 2 3 4 apice anterius albi, 5 6 7 8 apice anterius albo-flavescientes. 10 11 12 13 14 15 16 apice anterius albi. 17 18 immaculati, at 11 12 13 14 15 16 terminati membranula oblonga coccinea. *Rectrices alarum nigrae*, quarum majores anteriores apicibus albis. Differt a *Turdis* rostro breviore & vibrissis nullis. An hujus generis genuina species? Parus 1758

83. *LANIUS caudatus*, cauda elongata, capite hirsuto.

*Parus* vertice albo, cauda corpore longiore. Fn. 243.

Gesn. av. 642. (non fig.) *Parus caudatus.*

Aldr. orn. l. 17. c. 15. *Parus caudatus* s. *monticola.*

Merr. pin. 178. *Parus caudatus.*

Gesn. av. 642. f. infim. *Parus caudatus.*

Will. orn. 176. *t. 43. Parus caudatus.*

Raj. av. 74. n. 8. *Parus caudatus.*

Alb. orn. 2. p. 53. *t. 57. f. 1. Parus caudatus.*

Suecic Ahltita.

Habitat in alnetis. Nidus ovalis latere infimo apertus.

**DESCR.** *Caput levissime hirsutum* una cum *pectore* album. *Venter* incarnatus. *Cauda* longa nigra, *Alæ* e cæruleo, nigro & albo variegata: *Flexura* inter *collum* & *dorsum* nigra. *Dorsum* fulcum maculis nigris. *Avis pulcherrima.*

*Pars proposita p. 7 s. 6*

84. *LANIUS biarmicus* vertice cano, cauda corpore longiore.  
*Edw. av. 55. l. 55.* *Lanius minimus.*  
*Alb. av. 1. p. 46. l. 48.* *Parus beardedmanicus.*  
 Habitat in Scania, mihi non visa, ideoque hæreo utrum sit eadem cum *Pendulino*, nec ne.  
 Avis in Scania a D. Lecheo visa & depicta priori minus pulchra erat, cæruleo colore omni destituta. Caput, gula, pectus albicantia, nucha nigra, dorsi color æneo-nigricans. Abdomen æneo-pallidum. Remiges omnes nigricantes, at 12-19 margine exteriore albi, quæ tamen albedo in 18 maximelata. Reñtrices nigrae, sed 1 2 3 latere exteriore albae.

## II. PICÆ,

### Corvus.

85. *CORVUS Corax* ater, dorso cærulescente, cauda subrotunda data. *Fn. 69.*

*Gesn. av. 334.* *Corvus.*

*Jonst. orn. 38. t. 16.* *Corvus.*

*Aldr. orn. l. 12. c. 1.* *Corvus.*

*Vill. orn. 82. t. 18.* *Corvus.*

*Raj. av. 39. n. 1.* *Corvus.*

*Alb. orn. 2. p. 19. t. 20.* *Corvus.*

Suecis Korp.

Habitat in densis sylvis; super arborum, præsertim abietum ramiñ nidificat; mira sagacitate cadavera subolfacit, licet remotissima, quibus vescitur. Sancta avis a nostris habetur, nec facile ab ullo occiditur. In Smolandia & australibus provinciis cœlo sereno alte volitat & singularem clangorem seu tonum (elong) remotissime sonantem excitat.

DESCR: Magnitudo fere Galli. *Corpus* totum atrum, dorso parum cærulescens. remiges 20, quo rum duo primi paulo breviores: reñtrices æquales.

86. *CORVUS Corone* atro-cærulescens, cauda rotundata; reñtricibus acutis

*Raj. av. 39. n.* *Cornix.*

*Alb. av. 2. p. 20. l. 21.* *Cornix.*

Habitat in Westrobothnia, semel occisa a. D. Adlerheim, rara avis in nostris terris.

Tota atro-cærulecens etiam abdomine, quod non in Corace; plumæ ad rostrum detrita.

87. *CORVUS frugilegus* ater, fronte cinerascente. *Fn. 70.*  
*It. oel. 67.*

*Aldr.*

*Aldr. orn. l. 12. c. 3.* Cornix frugilega.

*Will. orn. 84. t. 18.* Cornix frugivora & frugilega.

*Raj. av. 39. n. 3.* Cornix frugilega.

*Alb. orn. 2. p. 21. t. 22.* Cornix frugilega.

*Oelandis Roka.*

Habitat in Oelandia, Scania campestri & australibus maritimis provinciis, nidificat in arboribus, satæ segeti noxia avis, vicitans frugibus.

88. CORVUS *Cornix cinerascens*, capite gula alis caudaque nigris. *Fn. 71.*

*Aldr. orn. l. 2. c. 4.* Cornix cinerea frugilega.

*Will. orn. 84. t. 77.* Cornix cinerea frugilega.

*Raj. av. 39. n. 4.* Cornix cinerea frugilega.

*Alb. orn. 2. p. 22. t. 23.* Cornix cinerea.

*Suecic Kråka.*

Habitat in nemoribus; communiter in Alnis; parit quatuor ova; edit insecta & varia cadavera, volat gregatim, erucas depascitur, hinc purgant pascua & prata a vermisibus, qui foenum consumunt; futuræ tempestatis & venti nuncia in maritimis; edit etiam Conchas & Ranartum capita; eradicit gramina sub quibus larvæ latent. respicit sedens adversum ventum.

*DESCR.* Caput, gula, alæ, cauda, pedes, rostrum nigra sunt. Reliqua omnia cinerea, a gula ad medium collum subtus nigra.

89. CORVUS *Monedula fronte fusca*; occipite incano; fronte alis caudaque nigris. *Fn. 72.*

*Will. orn. 85. t. 19.* Monedula s. Lupus.

*Raj. av. 40. n. 5.* Monedula s. Lupus.

*Alb. orn. 1. p. 14. t. 14.* Monedula.

*Suecic Kaja.*

Habitat paucim; ad pagos frequens; autumno migrat e Smolandia, in Uplandia remanet & per hyemem gregaria in turribus pernoctat; vicitat frugibus, cadaveribus.

*DESCR.* Nigra rostrum, frons, gula, alæ, cauda, pedes, Remiges, Restrictores.

*cinerea* caput pone, collum.

*nivea* Iris oculorum.

*nigricans* dorsum.

*obscure cinereum* pectus, abdomen.

90. CORVUS *glandarius* tectricibus alarum cæruleis: lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato.

*Fn. 74.*

*Ges. orn. 700.* Pica glandaria 1. Garrulus ávis.

*Aldr.*

*Aldr. orn. l. 12. c. 14.* Pica glandaria.

*Will. orn. 88. t. 19.* Pica glandaria.

*Raj. av. 41. n. 22.* Pica glandaria.

*Albin. orn. I. p. 16. t. 16.* Pica glandaria.

*Suecic* Ållonskrika. O:gothis Kornskrika.

Habitat in Quercubus communiter.

**DESCR.** Caput griseo-ferrugineum. Scapularum regio, pectus & abdomen ferruginea. Frons ferrugineo-albicans maculis longitudinalibus nigris. Maxillæ inferiores extus nigrae. Gula in quibusdam albida, remiges nigri, at 1-9 margine exteriore maxima ex parte albidi; 10-14 a basi ultra medium, exteriori latere, nivei; reliqui omnes remiges nigri, quorum per gradus 5 reliquis longiores. Tectrices alae exteriore latere cæruleæ lineis transversis nigris. Cauda nigra tectricibus albis. Rostrum nigrum, vibrissæ utrinque ex 5. s. 6. setis nigris; Lingua membranacea, binda.

91. **CORVUS Caryocatactes** fuscus albo punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis: intermediis apice detritis.

*Corvus cinereus*, cauda alisque nigris. Fn. 75.

*Gesn. av. 245.* Caryocatactes.

*Will. orn. 90. t. 20.* Caryocatactes gesneri & turneri.

*Raj. av. 42. n. 5.* Caryocatactes.

*Suecic* Nöttecka, Nötkraka.

Habitat in coryletis, quercetis; vicitans glandibus.

**DESC:** Corpus totum fuscum macula in singula penna alba obovata, versus ejusdem apicem. Alæ nigrae supra nitentes. Remiges 5-8 latere inferiore macula magna alba marginali: Secundariæ omnes apice tantum albae. Uropygium nigrum immaculatum. Ani regio alba. Cauda subrotunda: Tectrices apice albæ: intermediis apice detritis. Caput supra immaculatum;

92. **CORVUS Pica** albo nigroque varius, cauda cuneiformi.

*Gesn. av. 695.* Pica.

*Lonic. hist. 343. a.* Pica.

*Jonst. orn. 44. t. 17.* Pica.

*Will. orn. 87. t. 19.* Pica varia s. caudata.

*Raj. av. 41. n. 1.* Pica varia s. caudata.

*Albin. orn. I. p. 15. t. 15.* Pica varia caudata.

*Suecic* Skata. *Uplandis* Skiura, *Gotlandis* Skåra.

Habitat in arboribus juxta domos vulgatissima per totum Sueciæ regnum; exsulat vero e sola Lapponia & Scanora. Nidus artificiose struit ovis sæpius 7. hæc a Corvis genere distinguui non debet.

Caput, collum, dorsum, uropygium, anus, femora, rostrum, pedes, atra. pectus, latera, tectrices basi alarum alba. Remiges 1-10 exteriori latere nigri, inferiori albi. Reliqui nigri extrorsum sericeo-cæruleescens

tes. Cauda cuneiformis, longitudine corporis. Complicatae pennæ omnes supra visibilis sericeo-virescentes.

93. CORVUS *infans* dorso cinereo, rectricibus rufis: intermediis duabus cinereis: fascia nigricante.

Turdus rectricibus rufis, duabus intermediis cinereis fascia nigricante, proxima apice cinerea. Fn. 187.

Will. orn. 145. t. 36. Merula saxatilis.

Raj. av. 63. n. 3. Merula saxatilis Sturni generis.

Alb. orn. 3. p. 51. t. 55. Merula saxatilis.

Succis Lappskata, Olycksfogel. Jemtiis Ród-tiuxa.

Habitat in iylvis acerotis, præsertim Lapponiæ sylvaticæ, ubi audacissima avis, quæ nobis prandentibus spæ coram cibum abripuit.

DESCR. rostrum nigrum, crassum, breve, subtrigonum, basi setis testum ut in corvis, nares ovatae testæ setis. Caput fuscum; dorsum pallide cinereum plumis pinnatis, pennis raris nec contiguis. Remiges 18, fuscae; basi testaceo-rufæ; rectrices anteriores testaceo-rufæ, remiges tres prime per gradus berviores. cauda rotundata lateralibus brevioribus, longitudine corporis, integra testaceo-rubra exceptis intermediis dubibus cinereis fascia nigricante proxima utrinque apice cinerea, huic proxima vix apice cinerea. rectrices caudæ testaceo-rufæ. Latera testacea. Pedes nigri, polito firme: ungue majore, unges omnes compressi, medio introrium marginati. Apex rostri utrinque emarginatus. Lingua emarginata; lobis bifidis; Magnitudo Turdi.

## Coracias.

94. CORACIAS *Garrula* cærulea, dorso rubro, remigibus nigris.

Corvus dorso sanguineo; remigibus nigris; rectricibus viridis. Fn. 73 It. scan. 321.

Gessi av. 335. Cornix cærulea.

Aldr. orn. l. 12. c. 18. Garrulus argentoratensis.

l. 12. c. 5. Cornix cærulea.

Will. orn. 85. t. 20. Cornix cærulea.

Worm. mus. 296. Cornix cærulea.

Raj. av. 41. n. 3. Garrulus argentoratensis:

Succis Spansk Kråka. Smolandis Bläkråka. Scanis Ållekråka.

Habitat in Smolandia, Scania &c. edit Ranas, Scarabæos.

DESCR. Avis inter nostrates omnium splendidissima & pulcherrima. Rostrum nigrum: mandibula superiore basi minime testa penitus, sed apice incurva. Caput colore viridi æris, virescente dilute cæruleo. Oculorum orbita nuda. Cilia parum ramosa. Dorsum griseo-ferrugineum. Abdomen & Alæ subtrus dilute cærulecentia. Uropygium subviolaceo-cæruleum. Alarum basis nitidissime cærulea. Rectrices superiores dilute cæruleæ. Remiges nigri antice obscure cærulecentes & basi cærulei. Rectrices æquales,

quales, viridi-cærulescentes, extrosum albidores, sed 1, i apice nigrae; 6, 6 colore uniformes. Lingua lacera;

95. CORACIAS *Oriolus flava*, alis caudaque nigris.

*Amphilis flava*; artubus nigris; tectricibus exterioribus postice flavis. *L. aet. Holm.* 1750. p. 127. t. 3.f. 5. *descri.*

*Aldrov. orn.* 854. t. 857. 858.

*Will. orn.* t. 36. f. 6. *Picus nidum suspendens.*

*Raj. av.* 68. *Picus nidum suspendens.*

Habitat in Finlandia, ubi occisa & ad me delata; rarissima atque pud nos avis:

## Cuculus:

96. CUCULUS *cænorus* cauda æquali nigricante albo punctata:

*Fn.* 77.

*Gesn. av.* 363. *Cuculus.*

*Aldr. orn.* l. 5. c. 107. *Cuculus.*

*Bell. ic.* 22. 6. *Cuculus.*

*Will. orn.* 62. t. 77. *Cuculus.*

*Raj. av.* 23. *Cuculus.*

*Alb. orn.* l. p. 8. t. 8. *Cuculus.*

*Suecic Gjök.* *Lappis Geecka.*

Habitat frequens per Sueciam; educatur communiter a Motacilla alba, cantat super ramos aridos arborum, vescitur Larvis Lepidopterorum; autumno capit aviculas; petit aviarium, occidit Enucleatorem & pullum Pavonum; hinc sclopeto perfossus.

DESCR. Variant Cuculi colore, sed utrum hoc sexu, ætate vel specie, adhuc hæreo, sic descripsi.

1732. V: 16. Caput obscurè canum; ut & collum, & totum dorsum peninis hic inde griseis interlucentibus; collum subtus coloris cinerei undulati luteo mixti; uropygium ejusdem coloris cum dorso, sed dilutorius; Venter albescens, lineis transversis fusco-nigrescentibus; similiter penitus sub cauda albantes, sed adhuc magis albido. Cauda respectu corporis sat longa; rectricibus 12 nigrescentibus, apicibus albis, ab altero latere, & in medio, albo maculata fuit. Alæ longæ, superne fusco-nigrescentes, subtus obscurè canæ lineolis albis transversis; remiges nigricantes. Rostrum patum incuvatum: maxilla superior longior nigra; inferior pallidior subvirescens. Nares patulæ prominentes nudæ. Tibiae anterius quoad partem rectæ, una cum pedibus flavæ. Lingua sagittata plana. Digihi duo antici; totidemque postici. Palpebrae marginé nudo flavæ. FÆMINA erat, in qua duo ova magnitudine semilunis pisi majoris; venter eruditus pilosis plenus.

1733. VI: 2, & IX. 16. MAS similis praecedenti in omibus, at differebat rostro ad angulum oris membrana lutea laxi inölli, ut in pullis pastorini generis. (An itaque hoc anno pullus?) Caput cinereum s. canum absque ullis griseis maculis, utr & dorsum, quod tamen certo simili-

positum versus lucem splendebat. *Collum* totum, etiam subitus, absque maculis canum, *venter* obscurior quam in præcedente; sub *canda* flave-scens. *pedes* flavi.

1734. VII. 7. *Caput*, dorsum, & totum corpus supra canum, penna singula cinereo-nigra apice lineola alba terminata, disco unica alterave fascia testacea picta. *Remiges* cinereo-nigræ, maculis septem pluribusve albis, *gula* nigricans, *collum* & peñtus subitus albicantia lineis transver-sis cinereo-albis. *Venter* albus. *Rectrices* nigrae maculis albis & testaceis obscurioribus variegatae. *Teñtrices* caudæ superiorcs dorso concolores, inferiores albæ maculis nigris. *Tibiae* feminudæ, uti etiam *pedes* & unguis flavi. *Rostrum* nigrum intus flavum. *Lingua* integra, non bi-furca; sub cantu occidebatur.

*FÆMINA* habet lineas fuscas ad latera colli, quibus *MAS* destituitur.

### Jynx.

#### 97. JYNX Torquilla.

*Cuculus* subgrisea maculata, rectricibus nigris fasciis undu-latis. *Fn.* 78.

*Bell. ic.* 76. a. *Jynx*, *Torquilla*. *Turbo*, *Sisopigis*.

*Gesn. av.* 573. *Jynx*.

*Aldr. orn.* l. 12. c. 42. *Jynx*. f. *Torquilla*.

*Jonst. orn.* t. 42.

*Will. orn.* 95. t. 22. *Jynx*. f. *Torquilla*.

*Raj. av.* 44. n. 8. *Jynx* f. *Torquilla*.

*Rudb. lapp.* 66. t. 66. *Jynx*.

*Alb. orn.* 1. p. 21. t. 21. *Torquilla*.

*Suecic* Gjóktyta. *Smålandis Sæd-Gjök*.

Habitat in Truncis arborum putrescentibus vermes legens, verè canorus, collum undique contorquens, adventantes Accipitres Passeribus indicans.

*DESC.* optimam & figuram laudabilem dedit O. Rudbeck *Lapp.* I. c. *Remiges* fuscæ: latere exteriore fasciis ferrugineis æqualibus 6 ad 7. *Rectrices* 10, æquales, punctis nigricantibus adspersæ: fasciis 4 vel 5 nigris undulatis.

### Picus.

#### 98. PICUS martius niger, pileo coccineo. *Fn.* 79.

*Gesn. av.* 708. *Picus maximus* vel *niger*.

*Althr. orn.* l. 12. c. 31. *Picus maximus*.

*Will. orn.* 92. t. 21. *Picus niger maximus*.

*Raj. av.* 42. n. 1. *Picus niger maximus*.

*Alb. orn.* 2. p. 26 t. 27. *Picus maximus niger*.

*Suecic* Spillkråka, Tillkråka. *Gotlandis Toile*.

Habitat in arboribus antiquis aridis,

*DESCR.* *Corpus* totum atrum: a basi rostri ad occiput macula oblonga purpurea. *Rostrum* & *pedes* cinereo-cærulescentes.

99. *PICUS viridis* viridis, vertice coccineo. *Fn. 80:*

*Gesn. av. 710.* *Picus viridis.*

*Aldr. orn. l. 12. c. 34.* *Picus viridis nostras.*

*Will. orn. 93. t. 21.* *Picus viridis.*

*Raj. av. 42. n. 2.* *Picus viridis major.*

*Alb. orn. 1. p. 18. t. 18.* *Picus viridis.*

*Suecic* Wedknarr, Grönsplik, Grönjöling.

Habitat in exaridis arboribus.

*DESCR:* variat vertice purpureo maculis nigris, vertice purpureo maculis albis, & vertice purpureo innaculato.

*Rostrum* acuto-compressum; maxilla superiori carinata trigona. *Nares* oblongæ setis testæ; *Lingua* cylindracea, apice acuto, tendinosa, intra cylindraceam tunicam retrotracta; *Caput & collum* albican punctis nigricantibus, quæ puncta in maxillis magis nigra per lineas disposita. *Vertex* purpureus est maculis constans plurimis cinereis apicibus purpureis aut sanguineis, sub sinu oris utrinque linea purpurea. *Dorsum*, cum alarum rectricibus, viride a medio dorso usque ad caudam extinat. *Tealices* luteo-virides. *Venter* albus maculis nigris transversis undulatis virore perfusus.

*Remiges* supra nigrae maculis candidis; subtus nigricantes maculis albicantibus per series digestis. *Cauda* nigricat cum mixtura sordide viridi versus basin. Hæc descriptio FÆMINÆ erat.

*MAS* differt a Fæmina, quod tempora & oculorum regio nigra sunt; *Gula* alba. *Pectus & venter* subviridia undulato-variegata.

100. *PICUS major* albo nigroque varius, ano occipiteque rubris.

*Picus* albo nigroque variegatus, vertice nigro, rectricibus tribus lateralibus utrinque albescientibus. *Fn. 81:*

*Gesn. av. 708.* *Picus varius major.*

*Aldr. orn. l. 12. c. 32.* *Picus major.*

*Will. orn. 94. t. 21.* *Picus varius major.*

*Raj. av. 43. n. 4.* *Picus varius major.*

*Alb. orn. 1. p. 19. t. 19.* *Picus varius major.*

*Suecic* Gyllenfenna.

Habitat ruri in arboribus.

*DESCR.* *Rostrum* maxilla superiore carinata acuta; lateribus angulatis; apex rostri compressus. *Lingua* longissima, apice tenui osse. *Caput* nigrum, fronte pallida; tempora alba; a rostro ad nucham extenditur nigredo. *Mas* in occipite maculis coccineis notatur. *Collum* a tergo in medio album. *Remiges* nigrae utrinque maculis 3-6 albis. *Rectrices atræ* 10, quarum 1. 2. 3. utrinque albescentes; sub cauda coccinea est.

101. *PICUS medius* albo nigroque varius, ano verticeque rubris.

*Picus* albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus a pice albo-variegatis. *Fn. 82.*

*Will. orn. 94. t. 21.* *Picus varius minor.*

*Raj. av. 43. n. 5.* *Picus varius minor.*

*Gesn. av. 708. Picus varius minor.*

*Aldr. orn. l. 12. c. 33. Picus varius minor.*

*Habitat cum præcedenti passim.*

*DESCR.* Præcedenti similis, sed minor. *Caput* magna coccineâ tegitur, quæ antice extenditur inter oculos. *Occiput* nigra trianguli macula, quæ non extenditur ad rostrum; gula & collum subtus uræ & pectus alba; tempora albo-cinerea. *Cauda* nigra bifida; *rectrices* 10: quarum 5 nigræ, 1, 2, 3. obtusiores, apice albo nigroque varia; subtus fuscæ; sub *cauda* ruber est. *ala* nigræ, *remigibus* maculis utrinque 3-6 albis pictis.

*Convenit* medius cum majore fronte albida maculaque magna alba in tegetibus alarum; *Differit* vero, quo *Medii*: *Caput* supra totum coccineum; *Majoris* vîto maris occiput tantum coccineum. *Pectus* medii strias fuscas longitudinales habet, quæ in majore deficiunt. *Abdomen* *Medii* minus saturate sanguineum.

102. *PICUS minor* albo nigroque varius, ano testaceo.

*Picus* albo nigroque varius; *rectricibus* tribus lateralibus feminigris. *Fn. 83.*

*Raj. av. 43. Picus varius tertius.*

*Alb. orn. l. p. 20. t. 20. Picus varius minor.*

*Habitat* cum præcedenti in Scania. *D. Leche.*

*DESCR.* Magnitudo passeris. *Caput* inter oculos versus nucham nigrum conjunctum lineolâ a tergo colli cum nigro capite; *vertex* inter oculos albus aut coccineus. *Frons* grisea; gula, pectus, abdomen grisea. macula alba supra oculos. *Tempora* grisea. *ala* nigræ tex ordinibus macularum albicanium. *Rectrices* 4. 5. nigræ; 1. 2. 3. feminigræ quibusdam maeulis nigris.

Dum cōplicatis alis quiescit *ala* fasciis albis pinguntur. *Pectus* lineatis sparsis fuscis, ut in medio. *Sinciput* coccineum; sed neque occiput; neque frons.

103. *PICUS tridactylus* albo nigroque varius, pedibus tridactylis. *Fn. 84.*

*Acad. stock. 1740. p. 222. Picus pedibus tridactylis.*

*Edw. av. 114. t. 114. Picus tridactylus.*

*Habitat* in *alpibus Dalekarlicis.*

*DESCR.* Descriptionem inferni actis Academiæ stockholmensis, quam hic contrastant exhibeo. Magnitudo proxime præcedentis & ejusdem etiam facit. *Corpus* nigrum, maculatum: a *finu oris* linea alba utrinque versus nucham extensa, ubi conjugebatur, dein descendebat dilatata per collum dorsumque ad caudam usque. *Pectus* & *abdomen* subtus nigro alboque varium, *remiges* supra nigræ: 3 vel 5. ordinibus macularum albarum minimarum; subtus vero cinereæ: 7. vel 8. ordinibus macularum albarum majorum. *Rectrices* alarum superiores nigræ. *Cauda* brevis, rigida, *rectricibus* atris, extima utrinque albo maculata. *Vertex* croceus. *Rostrum* angulatum apice compresso cuneo. *Pedes* tridactyli, conitantes digitis duobus anticis æqualibus, nisi quod interior paulo minor; posticus unicus est, nec duo, ut in reliquis, hieque longior & crassior.

## Sitta.

104. SITTA europæa rectricibus nigris: lateralibus quatuor intra apicem albis. Fn. 182.

Gesn. av. 711. Picus cinereus f. Sitta.

Aldr. orn. 1. 12. c. 38. Sitta.

Will. orn. 98. t. 23. Sitta f. Picus cinereus.

Raj. av. 47. n. 4. Sitta f. Picus cinereus.

Alb. orn. 2. p. 27. t. 28. Sitta f. Picus cinereus.

Suec. Nótwåcka, Nôtpacka.

Habitat in tec̄tis, parietibus truncisque arborum.

DESCR. Rostrum subulatum. Lingua lacero-emarginata. Caput cinereum linea atra latitudine rostri a naribus ad nucham longitudinaliter signatum. Collum, dorsum, tec̄trices alarum superiores & uropygium cinerea. Gula, pectus, abdomen alba. Tec̄trices inferiores rectricum & latera abdominis maculis ferrugineis & albis tincta. Remiges 17 cinereæ, primæ 6 a basi ad quartam fere partem albæ: tec̄trices subalares albido-cinereæ macula atra. Cauda integra, mollis. Rectrices 12 quarum quatuor extremae sunt signatae macula alba apicem verticaliter ad dimidiam partem tecans; duæ secundariae fuscae, apice solunimodo canæ; duæ tamen mediae totaliter canæ. Rinnan.

## Upupa.

105. UPUPA Eops crista variegata. Fn. 85.

Bell. ic. 72 a. Upupa.

Gesn. av. 776. Upupa.

Aldr. orn. 17. c. 11. Upupa.

Charl. onom. 92. t. 93. Upupa.

Will. orn. 100. t. 24. Upupa.

Raj. av. 48. n. 6. Upupa.

Jonst. orn. t. 42. 27. Eops, Upupa.

Alb. orn. 2 p. 39. t. 42. 43. Upupa.

Suec. Hårfogel. Scanis Popp.

Habitat in vallisimis sylvis, sono proprium nomen recitans, unde facile dignoscitur; rusticis nostratis Bellonæ omen.

Ova ponit in cavis arboribus duo cinerea.

DESCR. Rostrum nigricans, eretiusculum, convexum, compressum, obtusiusculum. Corolla duplex (ut in Psittaco cristato plicatilis) e pennis rostro longioribus, testacea, apicibus nigris. Collum & pectus flavescens. Remiges 1-10. nigrae, versus basin albæ. Dorsum nigro flavoque mixtum. uropygium album. Cauda nigra linea transversa alba. Abdomen albidum. Pedes subpurpurascentes. Remiges nigrae. 1 brevior, 2-6 æquales: fascia transversa nivea. 7 brevior a latere, interiore macula magna nivea, 8 marginè exteriore inaculis tribus niveis triangularibus & una linearis versus apicem. 9, 10 fasciis quatuor albidis transversis. 18. macula alba versus apicem. Rectrices decem æquales nigrae: fascia alba versus basin; extima utrinque a latere interiore macula nivea.

## Certhia.

106. CERTHIA *familiaris* supra grisea, subtus alba, remigibus fuscis: decem macula alba. *Fn.* 213.

*Gesn.* av. 251. Certhia.

*Aldr. orn.* l. 12. c. 44. Certhia.

*Jonst. orn.* t. 42. Certhia.

*Will. orn.* 100. t. 22. Certhia.

*Raj. av.* 47. n. 5. Certhia.

*Alb. orn.* 3. p. 24. t. 25. Certhia.

*Bell. ic.* 98. a. Certhias, Certhius, Reptatrix.

*Suecic* Krypare.

Habitat in arbórum truncis, inque eorum rimis legit insectorum ova & larvas, homines minus metuens quam alias aviculæ.

DESCR. *Rostrum* tenue, arcuatum, compressum. *Corpus*, dorsum, cauda supra grisea: maculis nigricantibus albidoisque; subtus albicans. *Cauda* longa, rigida, angusta, cuneiformis: rectricibus acutis, cinereo-fuscis, exteriori margine pallidiori. *Uropygium* flaveiens. *unguis posticus* longitudine digiti & longissimus. *Remiges* fuscae: 4-14 macula in media transversa albida. *Remiges* 1-23 sensim breviores. *Lingua cartilaginea*, acuminata, arcuata. *Nares* semitectæ absque vibrizis.

## III. ANSERES.

## Anas.

107. ANAS *Cygnus* rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo. *Fn.* 28. *It. Wigob.* 143.

*Bell. ic.* 30. a. *Cygnus*, *Cycnus*.

*Gesn.* av. 372. *Cygnus*.

*Aldr. orn.* l. 19. c. 1. *Cycnus*.

*Will. orn.* 212. *Cygnus ferus*.

*Raj. av.* 136 n. 2. *Cygnus ferus*.

*Alb. orn.* 3. p. 31. t. 91. *Cygnus*.

*β Will. orn.* 271. t. 69. *Cygnus mansuetus*.

*Raj. av.* 136. n. 1. *Cygnus mansuetus*.

*Suecic* Swan.

Habitat in *Scania*, uti prope Malmogiam copiose, *Ekholsfjund*, passimque in *Lapponiae* fluviis æstate. Hospitatur rarius ad prædia magnatum. Pulli matris dorso insident. pescatur *It. scan.* 186. 228.

108. ANAS *Cygnoides* rostro semicylindrico, basi gibbo. *Fn.* 89. *Raj.*

*Raj. av. 138. Anser cygneus guineensis.*

*Will. orn. 275. Anser hispanicus, an potius guineensis?*

*Suecic Turcisk Gås, Siberisk Gås.*

Hospitatur tantum apud nos, ab exteris regionibus allata.

*DESCR.* Color variat. Anser domesticus major, gutture crassiore & raucose.

109. *ANAS fusca nigricans*: macula pone oculos lineaque alarum albis. *Fn. 106. It. goth. 215, 271.*

*Rudb. pict. Anas fera nigra.*

*Will. orn. 278. l. 70. Anas niger.*

*Raj. av. 141. n. 4. Anas niger.*

*Suecic Swärta.*

Habitat in mari occidentali & Balthico.

*DESCR.* *MAS.* magnitudo circiter minoris anseris. *Rostrum anserinum, incarnatum, ad basim vero nigrum & gibbum est. macula alba sub oculis. Corpus totum nigrum. Remiges primores nigræ, secundarie vel tercieres albæ. Cauda brevis. Pedes rubri membrana nigra.*

*FÆMINA.* *Rostrum fuscum absque gibbo, marginibus maxillarum lamellato-dentatis: Lingua ad latera ciliata. Corpus fuscum pennarum apicibus pallidioribus. Remiges 1-10 primores atræ; 11 nigra; 12-20 albæ apicibus fere nigricantibus, 21 undecimæ simillima. Pedes rubri membrana nigra palmata, cauda brevis; pone oculos macula alba rotunda; tempora exalbida.*

110. *ANAS nigra* basi rostri gibba, corpore toto nigra.

*Will. orn. 280. l. 74. Anas niger minor.*

*Raj. av. 141. Anas niger minor.*

Habitat in *Lapponia* aquis.

111. *ANAS Marila nigra*, humeris cinereo-undatis, abdomine maculaque alari alba.

*Raj. av. 142. Fuligula forte gesneri.*

Habitat in *Lapponia*. *D. C. Solander.*

*DESCR.* *Magnitudo vix anatis Boschæ. Rostrum crassum. Nigra sunt Rostrum, Caput, collum, pectus, Thorax, cauda, uropygium supra infraque, Remiges extus, Pedes. Alba vero macula alarum, Abdomen quod postice undatum. Remiges primores primæ nigræ; posteriores inrus albide. Secundarie albæ, apice nigræ. Dorsum ex albo & nigro undatum.*

112. *ANAS spectabilis* rostro basi gibbo compresso: carina penacea nigra, capitite canescente.

*Edw. av. 154. l. 154. Anas canadensis, capite griseo-cæruleo.*

Habitat in *Norlandia* rarius, inde infarcta S. Regi allata.

113. *ANAS Tadorna* rostro fimo, fronte compressa, corpore albo variegato.

Anas albo-variegata, pectoris lateribus ferrugineis, abdomine longitudinaliter cinereo maculato. *Fn. 93.*

Tadorna. *It. scđn. 212 \* W:goth. 214. \**

*Will. orn. 278. t. 70 71*

*Alb. orn. 90. t. 94. Vulpanser.*

*Raj. av. 140. n. 1. Tadorna bellonii, Vulpanser quibusdam.*

*Clus. exot. 368. Brandgås.*

*Gotlandis Jugås.*

Habita hætem reperimus in sola Gotlandia. Plumæ mollissimæ, ut in Anat. inolissima.

*DESCR.* Anser domesticus paulo minor. *Fæmina* alba: Pectus superne ferrugineum; Venter longitudinaliter cinereo-maculatus. Caput & Collis superior pars subcinerea. Remiges versus apicē ferrugineæ: hinc macula alatum transversalis lata ferruginea. Rostrum anseris domestici, sed magis simum.

*Marem non vidi;* dicebatur ab incolis aliter coloratum & pulchriorem esse cum caruncula s. crista carnosa ad basin rostri.

¶14. ANAS *Anser* rostro semicylindrico, corpore supra cinereo, subtus pallidiore, collo striato. *Fn. 90.*

*Gesn. av. 158. Anser ferus.*

*Aldr. orn. l. 19. c. 18. Anser ferus.*

*Will. orn. 274. t. 69. Anser ferus.*

*Raj. av. 136. n. 4. Anser.*

*Suecic Willgås.*

β *Gesn. av. 141. Anser domesticus.*

*Will. orn. 273. t. 73. Anser domesticus.*

*Raj. av. 136. n. 3. Anser domesticus.*

*Suecic Gås.*

Habitat in Lapponia præsertim, avis migratoria, vere accedens, hyeme discedens.

β Hospitatur ubique. in Oelandia plumæ quotannis velluntur. *It. oel. 83.*

*DESCR.* Tota cinerea, dorso magis fusco margine pennarum exteriore albo; collum, pectus; latera cinerea margine albidiore. Pone femora & sub cauda albida. caput griseo-cinereum immaculatum: margine frontis albo. Remiges nigrae: rectrices fuscae apice albo. Rectrices cinereæ apice & margine albo: rectrices omnino albae.

¶15. ANAS *Bernicla* fusca, capite collo pectoraque nigris, lateri albō. *Fn. 91.*

*Gesn. av. 110. Branta s. Bernicla.*

*Aldr. orn. l. 19. c. 33. Branta s. Bernicla.*

*Jonst. orn. t. 49. Bernicla, Brenta.*

*Will. or. 274. Bernicla s. Bernacla.*

275. f. 10. Branta.

*Raj.*

Raj. av. 137. Bernicla s. Bernacla.

Valent. mus. 495. Anser scoticus verus, Bernicla.

Alb. orn. 89. t. 93. Brenta

Belgis Rotgans. *Calmariensibus* Prutgås.

Habitat in *Scania*, *Calmariae*, marina, migratoria.

DESC. Magnitudo Anseris minoris. Corpus totum nigro-fuscum. Nigra sunt Rostrum, collum, caput, pectus. Collare angustum, album. Remiges & Restrices supra atrae, subtus fuscæ: Alba sunt Abdomen pone pedes, restrices inferiores caudæ & latera uropygii. Sapidissima omnium est avium aquaticarum.

116. ANAS erythropus cinerea, fronte alba. Fn. 92.

Clus. exot. 368. Helsingegas.

Rudb. pict. Anser cinereus ferus, torque inter oculos & rostrum albo, erythrops.

W:botniensibus Fiællgås.

Habitat in *Helsingia*, *Lapponiae* alpibus.

DESC. MAS. Caput & collum ad sternum usque nigra. Frons tempora gula alba. Dorsi pennæ cinereæ apicibus nigris, margine albis. Pectus, Abdomen, cauda subtus alba. Femora cinerea. Remiges cinereo fuscæ. Restrictæ nigrae: restrictæ caudæ superiores albae. FÆMINA Rostrum sordide carneum: frons sola alba. Caput, collum, dorsum, cauda cinerea; pectus & abdomen candida: maculæ in sterno nigrescentes; Pedes fanguinei.

117. ANAS mollissima rostro semicylindrico: ungue obtuso, cera postice bifida rugosa. Fn. 94.

Barth. aet. 1. p. 90. Anas plumis mollissimis, vulgo Eider.

Worm. mus. 310. Anas plumis mollissimis.

Will. orn. 277. Anas plumis mollissimis.

278. Anas cuberti s. farnensis.

Raj. av. 141. n. 3. Anas cuberti s. farnensis.

Suecic Ada, Eider, Gudunge. *Babuosis* Æra.

Habitat in alto mari, nidificat in maritimis, præsertim *Gotlandiæ*; ovis 5 vel 6 sub juniperis sæpius nidificans.

Plumæ e nido collectæ omnium molissimæ, maxime elasticae & pretiosissimæ. It. goth. 213.

DESCR. MARIS Corpus maxima ex parte album, excepto pileo capitis nigro: pone bipartito, antice tripartito, angulos versus sinus certæ, maxilla superioris, emitente. Sternum, abdomen, tota pars postica atra; femora, uropygium, restrices & remiges nigrae. Capitis postica pars juxta pileum virescit. Pedoris antica pars ex albo incarnata. Magnitudo ferre anseris. FÆMINÆ Corpus totum Scopacis s. cinereum maculis testaceis & nigris undulatum. Linea alarum transversa angustissima alba,

118. ANAS moschata facie nuda papillosa. Fn. 98. it. scan. 93.

Raj. av. 150. n. 3. Anas moschata.

Gesn. av. 122. Anas indica mas.

Aldr. orn. 1. 19. c. 26. Anas indica.

*Will. orn.* 294. *Anas libyca bellonii.*

*Alb. orn.* 3. p. 92. t. 97. 98 *Anas moschata.*

**Hospitatur in prædiis Magnatum culta, sed rarissima.**

**DESCR.** *Anate domestica* (*Boschas*) duplo major, ex albo & nigro variegata; tota moschum olens, *Mus* pone collum s. in medio collo, a tergo, papillis rubris nudis notatur.

**119. ANAS clypeata** rostri extremo dilatato rotundatoque: ungue incurvo. *It. gotl.* 167. *Fn.* 102.

*Gesn. av.* 120 *Anas latirostra major.*

*Aldr. orn.* 3. p. 227. *Anas latirostra major.*

p. 224. *Anas latirostra Taschenmaul.*

*Will. orn.* 283. t. 74. *Anas platyrhynchos altera s. clypeata germanica.*

*Raj. av.* 143. *Anas platyrhynchos altera s. clypeata germanica.*

*Alb. orn.* 1. p. 93. t. 97. 98. *Anas clypeata germanica.*

**Habitat in Scania, Gotlandia.**

**DESCR.** *MAS.* Caput nigro-cæruleum, nitens. *Pectus album. Abdomen brunneum.* Alæ albo cæruleoque variegatae macula viridi sericea. *Remiges nigræ; secundariæ fasciæ alba.* *Rectrices albæ: intermediis nigris. Pedes crocei.*

**FÆMINA.** corpore toto scolopacino colore, *macula* alarum viridiæna inter duas lineas albas transversas. *Rostrum utriusque sexus ampliatum, extrosum rotundatum, apice adunco obtuso maxillarum marginibus ciliatis denticulis paleaceis*

**120. ANAS platyrhynchos** macula alari purpurea utrinque nigra albaque, pectore rufescente. *Fn.* 103.

*Aldr. orn.* 1. 19. c. 32. p. 232. *Anas platyrhynchos, pedibus luteis.*

*Will. orn.* 284. *Anas platyrhynchos, pedibus luteis.*

*Raj. av.* 144. n. 13. *Anas platyrhynchos, pedibus luteis.*

*Rudb. pict.* *Anas fluviatilis rufa mas, rostro superius virescente, inferius flavescente. (Mas)*

*Rudb. pict.* *Anas fluviatilis rufa, rostro subviridi, pedibus miniaceis.*

**Habitat in flavijs.**

**DESCR.** *MAS.* macula alarum violacea, nitida, utrinque nigra, extra nigredinem utrinque alba.

**FÆMINA.** macula alarum ut in mare, sed in medio magis cærulea. *Pectus* in utroque rufescit, basis & apex alarum cinerea. *Cauda alba. Dorsum fuscum totum margine ferrugineo, subtus tota ferruginea maculis obsolete fuscis. Gula pallide ferruginea immaculata. Alæ cinereo-fuscae: pennæ primores 10 immaculatæ, longiores; secundariæ 11-20 fuscae apice albae, latere exteriore violaceo nitido. harum (11-20) rectrices fuscae versus apicem albae, ipso apice nigræ. Rectrices fuscae lineolis serpentinis inequali flexu pallidis. Pedes rubescentes.*

121. ANAS *strepera* macula alarum rufa nigra alba. *Fn.* 101.

*Gesn.* av. 121. Anas strepera.

*Aldr. orn. l. 19. c. 32. p. 233.* Anas platyrhynchos, rostro nigro & plano.

*Raj. av. 145. n. 2.* Anas platyrhynchos, rostro nigro & plano.

*Will. orn. 287. t. 72.* The godwall or gray.

Habitat in aquis dulcibus.

*DESCR.* Dorsum fuscum. Caput cæruleo-nigricans. pectus albet, venter fordescit maculis transversis nigris. latera lineolis albis nigrisque variegata. Reñices albæ maxima ex parte. Remiges 1-10 fuscæ; 11-13 apicibus albis; 14-17 pinnulæ ad scapum exteriorem nigre apicibus albis; 18-20 exteriori tela a scapo. 21-25 rufo-fuscæ.

122. ANAS *Clangula* nigro alboque variegata, capite tumido nigro viridi; sinu oris alba macula. *Fn.* 100. *It. oel.* 49.

*Gesn.* av. 119. Clangula.

*Aldr. orn. l. 19. c. 42. p. 224.* Clangula *Gesneri.*

*p. 225.* Anas platyrhynchos mas.

*Will. orn. 282. t. 73.* Anas plathyryncos mas.

*Raj. av. 142. n. 8.* Anas platyrhynchos mas.

*Alb. orn. 1. p. 92. t. 96.* Clangula.

*It. oel.* 49. Anas clangula.

*Suecic Knipa.* *Scanis* Dopping.

Habitat in Aquis, urinatur egregie, viditat Cochleis & Conchis; nidificat in cavis arboribus.

*DESCR. MAS.* Caput magnum, tere cristatum, violaceo-nigrum, macula subrotunda alba ad sinus oris. Dorsum nigrum. Alæ nigre, apice medio parum albæ, macula magna alba subtus cinereo-nigra. Cauda obtusa utrinque nigra. Collum, pectus, abdomen & omnia subtus (excepto capite) alba. Femora nigricantia. Linea alba dorsum ab alis distinguit. Rostrum nigrum. Pedes rubri, membrana nigra. Oculi ænei. Remiges 1-10 nigre; 11-13 nigre apice albo; 14-21 albæ; 22-24 nigre.

*FÆMINA.* Caput cælio-rufescens. dorsum, latera, canda fusca sunt Alæ albo-cinereæ. abdomen album. pectus antice & ad latera cinereum canis marginibus seu lineolis transversis; Remiges primores nigricantes, secundariae parum apice albæ, intermediae niveæ immaculatae, ultima alba latere exteriore nigra. teñices remigum posteriorum albo nigroque variae. Trachea in medio maxime ventricosa, ad basin, antequam bifurcatur, in qualiter ventricosa;

123. ANAS *Glaucion* iridibus flavis, capite griseo, collari albo. *Fn.* 104.

*Bell. ic. 33. 6. Glaucion.* *Glaucus.*

*Aldr. orn. l. 13. c. 38.* *Glaucion bellonii.*

*Will. orn. 281.* *Glaucium bellonii.*

*Suecic Brunnacke.*

Habitat in maritimis, frequens.

*DESCR.*

*DESCR. MAS.* *Caput* sordide nigrum. *Oculorum* iridibus flavis. *macula* alarum alba.

*FÆMINA.* *Caput* sordide fuscum, in alis loco maculae pennæs distinctæ albae. *Rostrum* nigricat; *iris oculorum* glauca. *Collare* album; *pectus* ad sternum usque nebulosum. *Cauda & Alæ* nigrae. *Dorsum* fusco-nigrum. *Pedes & tibiae* sordida, *palmæ* atræ.

¶24. *ANAS Penelops* cauda acutiuscula subtus nigra, capite brunneo, fronte alba. *Fn.* 105.

*Gesn.* *av.* 108. *Penelope.*

*Aldr.* *örn.* *l.* 19. *c.* 39.

*Will.* *orn.* 283. *t.* 72. *Penelope.*

*Jonst.* *orn.* *t.* 49. *Penelope.*

*Raj.* *av.* 146. *n.* 3. *Penelope.*

*Alb.* *orn.* 2. *p.* 88. *t.* 99. *Anas fistularis.*

*Suecias* Wriand.

Habitat in Mari.

*DESCR. MAS.* *Caput* & *collum* brunneum. *frons* alba. *Macula* alarum alba magna ad basin alæ, dein nigra, tum azurea, demum nigra. *Rostrum* & *pedes* nigri; *Dorsum* cinereo nigroque undulatum. *Collum* inferne griseum. *Cauda* acutiuscula, brevis, subtus nigra. *denticuli* squamosi transversi; *Lingua* utrinque ciliata.

*FÆMINA* cinereo-nebulosa excepto pectore ventreque albo. *rostrum* & *pedes* cinerei. *Macula* alarum nulla.

¶25. *ANAS hyemalis* cauda cuneata, rectricibus intermediis longis, corpore albo, temporibus pectore dorso aliisque nigris.

*Rudb.* *piæt.* *Anas* cauda longa forcipata *Fn.* 95.

*Worm.* *mus.* 302. *Anas islandica.*

*Edw.* *av.* 156. *t.* 156. *Anas cauda acuta canadensis*

*Suecias* Winter - and.

Habitat in Borealibus Sueciæ provinciis, hyeme intensissima ad nos accedit, nescio unde.

*DESCR. MAS.* *Caput*, & *collum* album, *macula* capitis utrinque magna nigricante. *Dorsum* nigrum. *Sterni* regio nigra, quæ nigredo conjungitur cum dorsi nigredine. *Alæ* nigrae absque macula, subtus cinereæ. *Cauda* cuneiformis, supra nigra, subtus alba; rectricibus acutis, lateralibus quibusdam albis; intermedia rectrice duplo longiore reliquis. *Pedes* plumbæ. *Rostrum* convexum, semicylindraceum, obtusum, nigrum medio incarnatum. *Nares* oblongæ, Maxillarum margo squamis patulis dentatus. *Faux* dentata. *Lingua* apice trilobo obtuso; lateralibus brevioribus, margine ciliato. *Cephus* album sed nigra sunt tempora, pectus, alæ, dorsum, rectrices intermediæ quatuor; harum 5-5 acutæ, longiores; 6-6 subutrate longitudine corporis.

¶26. *ANAS acuta* cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undato.

Anas

**Anas cauda cuneiformi acuta.** Fn. 96.

Gesn. av. 121. Anas cauda acuta.

Will. orn. 289. t. 73. Anas cauda acuta.

Raj. av. 145. n. 14. Anas cauda acuta.

Suecias Aler, Ahlfogel.

Habitat in maritimis frequens per Sueciam.

DESCR. *Caput* sordidum. *Dorsum* albo nigroque tenuissime undulatum; Latera colli, *Pectus*, *Abdomen* albida. *Remiges* fuscæ. *Macula* alarum violacea, antice ferruginea, postice nigra albaque. *Cauda* cuneiformis cinerea, subtus nigra; *Rectricibus* intermediis longioribus nigris.

127. **ANAS ferina** alis cinereis immaculatis; uropygio nigro. Fn. 107.

Gesn. av. 116. Anas fera fusca vel media.

Aldr. orn. l. 19. c. 40. Anas fera fusca.

Will. orn. 288. t. 72. Anas fera fusca.

Raj. av. 143. n. 10. Anas fera fusca.

Alb. orn. 2. p. 87. c. 70. Anas fera fusca.

Habitat in aquis dulcibus.

DESCR. *Mandibula superior* plumbea ungue nigro, *inferior* nigra. *Irides* oculorum rutilæ. *Pedes* plumbæ, *caput* & *collum* sulva, *media pectoris* pars alba simbriis flavescentibus, *inferior* lineolis fuscis. *Remiges* 14 nigro-cinereæ. *Rectrices* unicolores cinereo-fuscæ. *Nigra* sunt *uropygium*, *podex* & *ima pars colli*. *Dorsum* lineolis fuscis cinereisque undulatum. Willughb.

128. **ANAS Querquedula** macula alarum viridi, linea alba supra oculos. Fn. 108.

Gesn. orn. 107. Kernell.

Ald. orn. l. 19. c. 33. Kernell argentoratensis gesneri.

Will. orn. 291. Querquedula prima.

t. 74. Querquedula altera.

Raj. av. 148. n. 9. Querquedula prima.

Habitat in lacubus.

DESCR. *Magnitudo* fore sequentis. *Rostrum* nigrum. *Pedes* lividi, vertex nigricat; a cantho interiori oculi linea alba supra oculos auresque ad medium cervicis, *gula* nigra. *Pectus* nigro cinereoque undulatum. *Dorsum* purpurco-fuscum. *Femora* nigro alboque undulata. *Remiges* 1-10 latere anteriore fuscæ, interiore murini coloris. 11-21 apicibus albæ cæterum anterius viridi nitentes. *Rectrices* 14 fuscæ, verum extimo maculis alborufis. *FÆMINA* magis decolor, *gula* nigra caret. Willughb.

129. **ANAS Crecia** macula alarum viridi, linea alba supra infra que oculoſ. Fn. 109.

Gesn. av. 105. Querquedula.

Aldr. orn. l. 19. c. 31. Phasæs f. Querquedula minor.

*Will. orn.* 290. Querquedula secunda.

*t. 74.* Querquedula.

*Raj. av.* 147. n. 6. Querquedula secunda.

*Atb. orn.* 1. p. 95. t. 100. Querquedula francia.

*2. p. 91. t. 102.* Querquedula francia fæmina.

*Suecic* Årta. *W: bothnien sibus* Kræcka.

Habitat in lacubus & fluviis, sapore præstantissima.

*DESCR.* Corpus inter aætes minimum. *Caput* ferrugineum: linea a rostro ad oculos extenditur, ubi bifurcatur & ramo altero oculum super-ascendit, altero vero infra oculum descendit; intra quam bifurcationem macula cærulea nitens descendit ab oculis versus collum & a tergo cærule-scens coadunatur. *Corpus* totum supra lineis nigris albisque undulatum. *Remiges* 1-10 fuscæ. 11-18 apicibus albis, latere anteriore nigro. 16-19 viridi-nitentes anteriore latere; 20 anteriore latere nigræ. sub uropygio macula nigra lateribus alba in mare. macula alarum viridi-sericea supra & infra nigra, ante & pone alba. *Rostrum* simum, nigrum. *pedes* nigri unguibus acutis. *Teclætrices* alarum fuscæ: infimæ albæ. *Pectus* albicans maculis rotundis nigris. *abdomen* albidum. *Rectrices* fuscæ margine albo. Adeoque *Caput* ferrugineum; macula viridi sericea ab utroque oculo descendens ad nucham ubi coadunatur & penicillum s. criftam plurimolam descendantem cæruleam nitidam format, *Macula alarum* viridis: supra & infra nigra; antice & postice alba.

130. ANAS *Circia* macula alari varia, linea alba supra oculos, rostro pedibusque cinereis. *F. III.*

*Rudb. pict.* Anas fusca media, rostro & pedibus cinereis

*Will. orn.* 291. Anas circia Gesneri. an?

*Alb. orn.* 2. p. 92. t. 103. 104. Anas circia.

Habitat - - -

*DESCR.* Ad sternum sordide nebulosa. Alæ variegatae, macula alarum cærulea supra infraque nigra, ante & post alba.

131. ANAS *Boschas* rectricibus intermediis recurvis, rostro recto.

*Fn. 97.*

*Gesn. av.* 114. Anas fera torquata minor. (mas)

115. Anas fera torquata major. (fæmina)

*Aldr. orn.* l. 19. c. 35. Boschas major s. Anas torquata minor.

*Jonst. orn.* t. 49. Anas fera Spiegel Endte.

*Will. orn.* 284. t. 72. Boschas major.

*Raj. av.* 145. n. 1. Anas torquata minor.

*Alb. orn.* 2. p. 89. t. 100. Boschas major.

*Suecic* Grås-and; Blänacke.

3 *Will. orn.* 293. t. 75. Anas domestica vulgaris.

*Raj. av.* 150. n. 1. Anas domestica vulgaris.

*Jonst. orn.* 143. t. 49. Anas domesticas.

*Gesn. av.* 96. Anas cicur.

*Aldr.*

*Aldr. orn. l. 19. c. 25.* Anas domesticus mas.

*Suecic* Ancka.

Habitat in lacubus & flaviis frequentissima; Hospitatur manus sueta ubique.

DESCR. MAS Caput azureum. Pectus ferrugineum. Collare album. Cauda subtus lateribus nigra. Uropygium virescenti-sericeum; Rectrices 8 utrinque laterales cinereo-albescentes; at 4 intermediae nigrae recurvæ. Pectus & abdomen cinereum ex albo striis undulatis minurissimis confertis. Alæ supra subfuscæ, subtus albæ. Remiges primores 1-10 cinereæ, secundariæ 11-24 supra subfuscæ, quarum 11-21 apice albæ, at 12-20 in medio violaceæ exterius nigrae, apicibus vero albis; teñtrices harum 12-20 cinereæ, in medio albæ, apice nigrae.

132. ANAS Fuligula crista dependente, corpore nigro, abdome ne maculaque alarum albis. Fn. 99.

*Gesn. av. 107.* Anas fuligula prima.

*Aldr. orn. l. 19. c. 34.* Querquedula cristata s. Colymbus bellonii.

*Will. orn. 280. t. 73.* Anas fuligula prima.

*Raj. av. 142. n. 7.* Anas cristata.

*Alb orn. l. p. 91. t. 95.* Anas fuligula.

*Suecic* Wigge.

Habitat in mari.

DESCR. Corpus totum nigrum, excepto abdomine a pectori caudam versus albo. macula transversalis alarum itidem alba. Rostrum & pedes nigro-canescentes.

133. ANAS cæuda longitudine pedum, vertice fusco, pectori exalbido nebulofo. Fn. 110. †

*Rudb. pict.* Anas varia minor.

Habitat in Norlandia rarius, mihi non visa.

DESCR. MAS. Pectus album, nebulosum: vertex capitis fuscus; cæuda longitudine pedum. convenit in reliquis multis notis cum Anate hyemali.

FÆMINA macula nulla ad alarum exortum. pectus sordidum. rostrum virescens.

134. ANAS rufa, rostro pedibusque cinereis. Fn. 112. †

*Rudb. pict.*, Anas fluviatilis rufa, rostro & pedibus cinereis. Habitat in flaviis rario, nec mihi unquam obvia.

### Mergus.

135. MERGUS Merganser crista dependente, capite nigro-canescente, collari albo. Fn. 113. It. goth. 166. oel. 49.

*Aldr.*

*Aldr. orn. l. 19. c. 63.*

Merganser.

*Will. orn. 253. t. 64.* Mer-  
ganser.

*Raj. av. 134. n. 1.* Mer-  
ganser.

*Mars. danub. 78. t. 37.*

Merganser.

*Scheff. lapp. 348.* Knipa.

*Svecic Wråkfogel, Kjörfogel.*

Skåka.

Habitat in lacubus & fluviis.

DESCR. MAS. *Rostrum* teres denticulis recurvis subulatis; *Maxilla superiore* apice elongato. *Caput* nigro-subcærulescens, crista longa dependente. *Collum* albicans. *Venter* albus. *Pectus* testaceum. *dorsum* cinereo-nigrum. *Remiges primores* nigræ, secundarie albæ, lineis duabus transversis nigris. *Rectrices* 1-10 nigræ, 11-14 nigræ apicibus albis, 15-19 albae fundo nigro, 20-26 albae apicibus nigris. *Regio urhypygii* cinerea undulata. *Cauda* nigra. *Pedes & Rostrum* rubra.

FÆMINA supra cinerea, capite griseo cristato; gula, collum pectus, abdomen subtus alba.

136. MERGUS *serratus* crista dependente, capite nigro maculæ ferrugineis; macula alari alba nigro-bitida. Fn. 114.  
It. goth. 271.

*Gesn. av. 133.* Anas longirostra gesneri.

*Aldr. orn. l. 19. c. 60.* Anas longirostra gesneri.

*Will. orn. t. 64.* Mergus cirratus minor.

p. 255. Mergus cirratus fuscus.

*Raj. av. 135. n. 4.* Mergus cirratus fuscus.

Gotlandis Pracka.

Habitat ubique in aquis.

DESCR. MAS. Caput nigrum maculis ferrugineis. *Pectus* griseum, nigris punctis; venter albus lateribus albo nigroque undulatis. *Dorsum* nigrum. *Remiges* nigræ; *rectrices* alarum albæ, inferiores s. proximæ versus basin nigræ, hinc macula alarum alba linea transverbia sit. *Cauda* fusca, crista dependens. *Rostrum* denticulis subulatis recurvis;

137 MERGUS *Albellus* crista dependente, corpore albo dorso nigro, aliis variegatis.

*Hasselq. it. 269.* Mergus Tinus.

*Raj. av. 135.* Mergus major cirratus:

*Will. orn. 254. t. 64.* Albellus alter.

Habitat in Svecia; rarissime.

DESCR. *Corpus* album. *Crista* occipitis subtus nigra. *Dorsum* nigrum. *Alæ* nigræ inacuta in medio alba, magna, & fasciæ duas albæ. *Cauda* fusca. *Pectus*, *Abdomen* alba;

138. MERGUS *minutus* capite griseo lævi. *Fn.* 115.

*Will. orn.* 261. *t.* 59. *Mergus melanoleucus*, rostro acuto brevi.

*Raj. av.* 125. *n.* 5. *Mergus melanoleucus*, rostro acuto brevi.

*Rudb. pict.* *Mergus minimus cinereus*, capite semirufo.

Habitat in maritimis.

DESCR. Caput sordidum: maxilla inferior & gula alba. Venter & pectus alba. Dorsum cinereo-nigricans. Pedes sordidi. Maculae alarum nigrae; ante & pone albae;

## Alca,

139. ALCA *Torda* rostri sulcis quatuor: linea utrinque alba a rostro ad oculos. *Fn.* 120. *It. gotl.* 286.

*Will. orn.* 243. *t.* 64. *f.* 1. *t.* 65. *f.* 2. Alca.

*Worm. mus.* 363. Alca.

*Clus. exot.* 367. Alca.

*Raj. av.* 119. Alca hojeri.

*Alb. orn.* 3. *p.* 90. *t.* 95. Alca hojeri.

*Gotlandis Tord.* *Angermannis Tordimule.*

Habitat in insulis *Carolinis Gotlandiæ*, in insula *Bonden Angerianianæ*. ovum 1.

DESCR. Magnitudo cornicis, colore toto corpore prono nigra; subtus vero pectoré, abdomine, testicibus inferioribus alatum albis. Remiges XI trinores nigrae; secundariæ XV nigrae apicibus albis. Ab oculis ad summum marginem rostri linea alba utrinque decurrit. Pedes nigri tridactyli palmati. Rostrum cultratum, obtusissimum, nigrum sulcis 4 (in superiori maxilla; at 2 in inferiori) transversis exaratum, quorum secundus albus est; maxillæ superioris apex incurvus.

140. ALCA *impennis* rostro compresso-ancipiti sulcato; macula alba ovata ante oculos. *Fn.* 119.

*Barthol. act.* 1. *p.* 91. Avis gatfuhi.

*Will. orn.* 242. *t.* 65. Penguin nautilus nostratis dicta, quæ goisugel hojeri videtur.

*Clus. exot.* 101. Anser magellanicus.

*Worm. mus.* 300. *t.* 301. Anser magellanicus f. Penguin.

*Raj. av.* 118. *n.* 1. Penguin.

Habitat in mari Norvegico rarius.

141. ALCA *arctica* rostro compresso-ancipiti quadrisulcato; oculorum orbita temporibusque albis. *Fn.* 118.

*Gesn. av.* 725. Puphinus anglicus.

*Aldr. orn.* 1. 19. *c.* 37. Fratercula marina f. Pica marina.

*Alb. orn. 2. p. 73. t. 78. 79. Pica marina.*

*Mart. spitzb. 53. t. k. f. c. Avis glacialis.*

*Clus. exot. 104. Anas arctica.*

*Olear. mus. t. 15. f. 5. Anas arctica.*

*Will. orn. 244. t. 65. Anas arctica.*

*Raj. av. 120. n. 5. Anas Arctica.*

*Worm. mus. 302. Anas arctica clusii.*

*Barthol. act. 1. p. 68. Lunda avis.*

*Oelig. mus. 2. f. 11. n. 21. t. f. 21. Avis marina Lunda dieta.*

*Ferroensibus Lunda.*

Habitat in rupibus & præcipitiis montium maris atlantici, præsertim in insulis, cum non nisi pacato mari piscari possit; uti sequentes nidificat in nudo scopulo, unico, semper in hoc genere, ovo.

Obs. *Rostrum* magis quam in Alca Torda compressum; maxilla superior non adunca; & maxillarum marge non excurrit infra oculos longiusculo processu; ut in illa.

142. ALCA *Alle rostro laevi conico, abdomine toto subtus remigumque posticorum apicibus albis pedibus nigris.*

*Alb. av. 1. p. 81. l. 85. Columba groenlandica.*

*Edw. av. 91. t. 91. Columba groenlandica.*

Habitat in Oceano septentrionali.

Punctum album supra oculos. Pectus & Abdomen alba; sed non collum subtus. supra dorsum lineolæ aliquot albæ.

## Procellaria.

143. PROCELLARIA *pelagica nigra, uropygio albo. Act. Stockh.*

*1745. p. 93. Pl. 249.*

*Alb. orn. 3. p. 87. t. 92. Petrel.*

*Dampier voyag. 3. p. 97. Petrel.*

*Suecic Stormwåders fogel.*

Habitat in mari, super undas currens, instante procella proram puppe inque navium petens, unde præfigia nautarum de instanti tempestate, quam aviculæ evitare conantur.

DESCR. *Magnitudo Hirundinis s. Motacillæ; tota nigra, in dorso magis saturata, in pectoro & abdomine magis obscure, sed tectrices rectricum infra & supra sunt albæ apicibus nigris, hinc uropygium album est. Rectrices 12 æquales nigrae, alis breviores, obtusaæ. Remiges primores accutiores. Tectrices alarum 2 di ordinis apice parum albicanter. Pedes nigri palmati; femoribus feminudis. Pollex nullus, sed unguis minimus sessilis. Digitæ tres membrana nigra connexi palmati, quorum intimus brevior duobus constans articulis; extimus longior interiore, constans quatuor articulis; intermedium paulo longior exteriore, sed 3 articulis constans. Ungues cinerei nigri, fere æquales. Rostrum nigrum, tenuem,*

*com-*

compressum, molliusculum, apice nigrum. Maxilla superior apice adunca, acuta, inferiore non longior. Nares in medio rostri, gibbæ; prominulæ (ut in Hirundine); narium foraminibus tenuissima membrana distinctis; ergo character generis Procellariæ: Rostrum tenue compressum: maxillis æqualibus: superiore apice adunco: Nares prominentes: cylindro foraminibus membranula separatis.

144. PROCELLARIA *glacialis albicans*; dorso canescente: Martens. spitsb. 68. t. N. f. C. Mallemucke.

Anderson. island. 173. n. 30. Larus marinus maximus groenlandicus.

Habitat in mari septentr. intra circulum arcticum; inhians Cetis, quorum lardum rostro excidit.

DESCR. Corpus Magnitudine Gallinæ, album cum tintura canescens incarnata. Dorsum totum magis canescens. Remiges latere interiore in agis albicantes. Cauda rotundata alba. Pedes rubri, pone æquilibrium, palmati, ungue postico absque digito. Nares constant uno cylindro, nec foraminibus duobus cordatae; Rostrum rufescens natibus fuscis, compressum; mandibulis ex 5 ossiculis.

### Pelecanus.

145. PELECANUS *Carbo cauda rotundata; corpore nigro;* rostro edentulo.

Pelecanus subtus albicans; rectricibus quatuordecim. Fn: 116.

Gesn. av: 137. Carbo aquaticus.

Aldr. orn. l. 19. c. 55. Corvus aquaticus.

Jonst. orn. t. 47. Carbo aquaticus.

Will. orn. 248. t. 63. Corvus aquaticus.

Raj. av: 122. n. 3. Corvus aquaticus.

Mars. dan. 16. t. 36. Corvus aquaticus;

Suecic Haf-s-Tjäder.

Habitat in maris scopulis, arboribusque insidet.

DESCR. Magnitudo anseris. Corpus totum atrum, Sincipit lineolis albicantibus longitudinalibus; regio oculi & gulæ cinerea: Rostrum albinans, absque dentibus, rectum, testaceo-nigrum, apice adunco acuto: Pedes nigri, tetradastyli, digitis omnibus in unum connexis;

146. PELECANUS subtus fuscus, rectricibus duodecim. Fn:

117.

Aldr. orn. l. 19. c. 58. Graculus palmipes aristotelis s. Corvus aquaticus minor.

Will. orn. 249. t. 63. Corvus aquaticus minor s. Graculus palmipes.

Raj. av. 123. Corvus aquaticus minor; Graculus palmipes dictus.

*Alb. orn. 2. p. 74. t. 81.* *Corvus aquaticus.*

Habitat in maritimis: nidificat in arboribus.

*DESCR.* Corpus totum, uti gula, rostrum, pedes Carbonis; sed a gula ad femora usque subtus maculis testaceis albidis pingitur. Forte haec avis vel junior vel carbonis femina.

147. PELECANUS *Bassanus* cauda cuneiformi, rostro scabro, remigibus tantum primoribus nigris, corpore albo.

*Will. orn. 347. t. 63.* *Anser bassanus.*

*Raj. av. 122.* *Anser bassanus.*

*Alb. av. 1. p. 82. t. 86.* *Anser bassanus.*

*Nautis Jaen von Gent.*

Habitat in Oceano Norvegico versus Marstrandiam, ad littora non accedit, sed pelagica avis.

### Colymbus.

148. COLYMBUS *Grylle* pedibus palmatis tridactylis, corpore atro, tectricibus alarum albis. *Fn. 124.*

*Martens spits. 56. l. L. f. B. Columba.*

*Will. orn. 245.* *Columba groenlandica.*

*Raj. av. 121. n. 6.* *Columba groenlandica.*

Habitat in alto mari.

*DESCR.* Corpus statura Alcae Alle, sed rostro colymbi, totum atrum, exceptis alarum tectricibus primis & secundis totis albis; unde macula alarum alba ovata. Pedes rubri.

149. COLYMBUS *Troille* pedibus palmatis tridactylis, corpore nigro, pectore abdome neque niveo, remigibusque secundariis apice albis.

*Martens. spitsb. 57. t. M. f. a. Lumbe.*

Habitat in alto mari septentrionali. A. Martin.

*DESCR.* Magnitudo Cornicis. Rostrum subulatum, nigrum: mandibula superiore subculturata pone apicem utrinque dente obsoleto. Nigra sunt Caput, collum, Alae supra, Dorsum, Remiges, Rectrices. Alba sunt Pectus, Abdomen totum etiam lateribus & apices Remigum secundiorum.

150. COLYMBUS *arcticus* pedibus palmatis indivisis, jugulo nigro purpurascente. *Fn. 121. It. goth. 341.*

*Clus. exet. 102.* *Mergus maximus farrensis s. arcticus.*

*Worm mus. 304. t. 305.* *Colymbus arcticus Lumme dictus.*

*Will. orn. 259 t. 62.* *Colymbus arcticus.*

*Raj. av. 125. n. 7.* *Colymbus arcticus Lumme wormio dictus.*

n. 4. *Colymbus maximus caudatus.*

26. n. 8. *Colymbus maximus gesneri.*

*Nieremb.*

*Nieremb.* natur. 216. *Mergus maximus farrensis* s. articus.

*Merr. pin.* 180. *Razorbill*.

*Oelig. mus.* I. f. II. n. 2. t. I. f. 2. *Colymbus a norvegicus* Lumme.

*Barth. act.* I. p. 90. *Avis aquatica*.

*Besl. gaz.* t. 16. *Hirundinis aquaticæ exoticæ singularis species*.

*Scheff. lapp.* 348. *Lom.*

*Suecic* Lomm.

Habitat in lacubus Sueciæ ubique vulgaris, nidificat in littore; ponit ova duo.

DESCR. Magnitudo fare Anseris; *Corpus* totum subtus album, supra nigrum punctis albis & nigris undulatum. *Caput* & *collum* canum, a gula ad sternum usque macula leuitorum nigro-purpurascens. *Corium* avis tenacissimum est, hinc pro Scopeti tegmento usurpatum, nec non ad cingendum pileum hyemale. Vidi corium præparatum, quod pulchre insertiones pennarum exhibet perforatis poris; ubi pennæ per quinquecim, uti arbores in campo, quo minimum spatium repleant, & circum singulam pennam in quadrato ordine plumæ 12. *Varietas* alia nobis frequens, cui caput & latera colli cinerea; tergum colli albis nigrisque lineolis, cui dorsum fuscum absque punctis albis; pectus antice cinereo alboque maculatum, quam puto esse Feminam.

151. *COLYMBUS* pedibus lobatis, capite rufo, collari nigro, remigibus nigris: secundariis albis. *Fn.* 122,

*Gesn. av.* 139. *Colymbus major*.

*Aldr. orn.* I. 19. c. 52. p. 254. 255. *Colymbus major* cristatus.

*Will. orn.* 257. t. 61. *Colymbus cristatus* & *cornutus*.

*Raj. av.* 124. n. 2. *Colymbus major* cristatus & cornutus.

*Merr. pin.* 180. *Colymbus cristatus* & *cornutus*.

*Mars. danub.* 80. t. 38. *Colymbus major* cristatus.

Habitat in mari.

DESCR. Crista bifida: caput croceum, collare atrum eminens extra reliquas pennas. *Corpus* nigrum, subtus album. *Caput* ferrugineum. *Collare* nigrum. Remiges primarie nigrae; secundarie albæ. Alarum margino anterior albus. *Pedes* trilobi, non ad basin fissi: pollex brevis.

152. *COLYMBUS* pedibus lobatis, capite nigro: auribus cristato-ferrugineis. *Fn.* 123.

*Gesn. av.* 140. *Trapazorola* vel *Mergulus*.

*Aldr. orn.* I. 19. c. 52. t. 258. 252. *Colymbus minor*.

*Will. orn.* 258. t. 61. *Colymbus* s. *Podiceps minor*.

*Raj. av.* 125. n. 3. *Colymbus* s. *Podiceps minor*.

*Sloan. hist.* 2. p. 322. t. 271. f. 1. *Colymbus* s. *Podiceps minor*.

*Mars. danub. 82. t. 39. Colymbus minor.*

*Ostro-bothniensibus Fiorna. W:bothniensibus Skrænloim.*

Habitat in mari. Ova. 4. 5.

DESCR. Auritus est auribus brunneis. Caput nigrum. Collum brunneum. Rostrum acutum. Iris rubra. Crista duplex e plurimis nigris angustis. Collare expansum, sed a tergo contractum, ad latera majus, sub gula bifidum nigricans marginibus, alias ferrugineum: pedes extra aequilibrium. Tibiae pone margine duplci ferrato. Digihi tres semipalmati fissi, præter posticum minorem absque ungue. Vertex capitis fuscus. gula fusca, ut & pars corporis superior fusca. Alba sunt abdomen, gula, aures, oculi versus rostrum. Remiges 12-26 albæ. Collum antice flavescens. Cauda omnino nulla.

MAS niger capite & collo; ab oculis deorsum versus collum linea e pennis longioribus descendit ferruginea. Dorsum nigricans. Remiges primores nigrae, quo magis interiores eo magis latere interiore albæ: Remiges secundariae albæ. Corpus sub alis ferrugineum. Cauda fere nulla. Rostrum nigrum. FÆMINA tota grisea rostro, collo, dorso; remiges paulo magis nigricantes, secundariae vix albæ.

ALIA: Caput supra nigricans. Gula sub oculis & colli initio alba. Collum & pectus antice ferruginea. Dorsum fuscum. Cauda nulla. Remiges secundariae albæ. Pedes terradactyli: tibiæ postice duplicato-ferratae.

Nidum conficit natantem in ipsa aqua marina (tamen in sinibus maris) & incubat ovis natante nido, ut me certiore fecit Rud. Hast.

## Larus.

153. LARUS canus albus, dorso cano. Fn. 125.

Alb. orn. 2. p. 77. t. 84 Larus albus.

Suecic Homåka. Gotlandic Mave. Lappis Straule.

Habitat in mari & lacubus.

DESCR. Corpus totum album, sed dorsum & ale supra dilute cinerea, iti & Remiges, quarum primores 1, 2, 3, (interdum plures) versus apicem nigrae, macula alba in medio nigredinis notatae, omnes extimo margine (exceptis primis) albæ. Cauda integra, alba. Pedes flavi, palmati, postico brevi. Femora seminuda. Iris oculorum cinerea. Palpebrarum margo nudus, coccineus. rostri maxilla superior fere corvi, convexa, cultrata, arcuata; inferior gibba. Canthus oris nudus, coccineus. Lingua sagittata, apice bifido. Rostrum flavum, palatum denticulatum. Magnitudo fere gallinæ. MAS erat, quem descripsi. Ova 3 ponit fæmina.

154. LARUS fuscus albus, dorso-fusco. Fn. 126.

Habitat in mari & lacubus præcedenti mixtus.

DESCR. Omnia ut in præcedenti, excepto quod dorsum & ale supra fusco-cinerea. Remiges secundariae (10-30) inclusive nigrae apicibus albis. Remiges primores vero eo magis versus apicem albæ, quo principio propiores, nam prima penna ale nec albo apice in hac ave notatur. Mandibula inferior, ubi subtus gibba, croceo colore tingitur. Hujus Pulli colore diversissimi, non nisi peracta prima hyeme colores mutant, patrumque velutin induunt, quorum itaque descriptionem lubet subjicere: Corpus totum teolopacino colore s. cinereo exalbido pallido, maculatum;

tum. *Pedes cinerei*, non flavi, ut in præcedentibus: *Rostrum nigrum* absque cantho oris ullo coccineo, nec palpebrarum annulo coccineo gaudet. *Collum & pectus cinerea*. *Remiges cinereæ apicibus nigris*, sed extima nulla macula alba intra apicem scatet. *Rectrices albæ inaculis fuscis*, versus apicem nigrae, summo margine albæ.

155. LARUS *marinus* albus, dorso nigro. *It. goth.* 214.

*W:goth.* 156.

*Alb. av.* 3. *p.* 89. *t.* 94. *Larus nigrescens marinus.*

Habitat in *Mari.*

156. LARUS *parasiticus* rectricibus duabus intermediis longissimis.

*Sterna rectricibus maximis nigris.* *Fn.* 129.

*Mus. dan.* I. s. II. n. 20. *Avis. norvegica Kyuffwa vel Tjufva.*

*Mart. spitz.* 63. *t.* L. s. D. *Struntjager.*

*Bart. act.* I. *p.* 91. *Truen s. Fur.*

*Raj. av.* 127. n. 2. *Struntjager i. e. Coprotherus.*

*Suecic Swartlasse.* *Angermannis Labben.* *Bahusia Elof.*

Habitat in *Angermannia*, *Bahusia*, *Finmarkia* & alibi ad mare, cibus & mores in *It. W:goth.* 182.

DESCR. *Magnitudo Columbae.* *Corpus supra oculos nigrum.* *Alba subflavescens* sunt *Gula*, *Collum*, *Pectus*, *Fusca Dorsum & Alæ.* *Cinereum Abdomen.* *Remiges nigrae*; 1, 2. rachi nivea. *Cauda nigra rotundata*; rectrices duæ intermediae ensiformes duplo longiores. *Rostrum atrum*, capite brevius; mandibula superior incurva cera nigricante ad medium testa. *Pedes tetradactyli*: postico separato.

157. LARUS *tridactylus* albidus, dorso canescente, rectricum apicibus, excepto extimo, nigris.

*Raj. av.* 128. n. 4. *Larus cinereus.*

*Alb. av.* 2. *p.* 80. *t.* 87. *Larus hybernus.*

Habitat in Oceano nostro rarer avis. Femora semidenudata & Pollex obsoletus muticus hanc speciem valde singularem reddunt.

DESCR. *Magnitudo columbae majoris.* *Rostrum fuscum*, gibbo inferiore flavescente. *Corpus albicans*, *caput inter oculos cinereum*, *Collum & tergo nigricans.* *Dorsum canum.* *Alarum rectrices cinereæ*, sed minores nigricantes. *Remiges albæ*, sed primores 4. latere exteriore nigrae; 5, 6. apice nigrae. *Cauda integra nivea*; *Rectrices apice late nigrae*, sed extima tota alba.

### Sterna.

158. STERNA *Hirundo* cauda forficata, rectricibus duabus extimus albo nigroque dimidiatis.

*Sterna rectricibus extimis maximis diimidiato - albis nigrisque.*

*Fn. 127.*

*Gesn. av. 53. S. Stern.*

*Aldr. orn. l. 19. c. 7. S. Stern.*

*Will. orn. 268. Hirundo marina, S. turneri.*

*t. 68. Hirundo marina major.*

*Jonst. av. 130. t. 46. Larus minor, S. Stern.*

*Raj. av. 131. n. 1. Hirundo marina, S. turneri.*

*Alb. orn. 2. p. 79. t. 90. Hirundo marina minor.*

*Suecic Tärna.*

Habitat ubique ad lacus & stagna.

*DESCR.* *Caput superne atrum. Dorsum cum alis superne incanum. Pectus adhuc dilutius incanum. venter, canda alae subtus albæ. Canda forficata, alba, rectricibus utrinque duabus extimis exteriore margine superne fuscis, quorum extima longissima. Remiges, quo apice alæ propiores, eo longiores. Rostrum fubulatum, versus apicem compressum, rectum, coccineum uti & pedes. Nares oblongæ, lineares; femora seminuda. Pedes palmati.* Oya 3.

159. STERNA nigra cauda forficata, corpore fusco, capite rostroque nigro, pedibus rubris. *Fn. 128.*

*Raj. av. 131. S. fusca.*

*Alb. av. 2. p. 82. t. 39. Hirundo marina minor.*

Habitat Ultunæ prope Upsaliam, in minimarum insularum catenatis.

*DESC.* *Facies & serme magnitudo prioris. Caput atrum, modice convexum, parum compressum, acuminatum. Nares oblongæ, perviae, nudæ. Color totius avis supra canus una cum gula, pectore, abdomine. Testrices alarum inferiores una cum rectricibus inferioribus caudæ niveæ. Remiges primores 1-10 acuminatæ, secundariæ 11-25 obtusæ. Canda parum forcipata; rectricibus 12, quarum exteriores inferioribus paulo longiores, nec extimæ longissimæ sunt; ut in precedente. Remiges & Testrices omnes unicolores & subtus albescentes rachi nivea. Pedes semipalmati, teretadystili, rubri, postico libero; digito interiore paulo breviore quam extimus, unguis nigri, horum intermedius introrsum marginatus.*

## IV. GRALLÆ.

### Platelea.

160. PLATELEA *Leucorodia* corpore albo.

Apas rostro plano: apice dilatato rotundatoque. *Fn. 87.*

*Gesn. av. 666. Pelecanus s. Platea.*

*Aldr. orn. l. 20. c. 13. Leucorodios s. Platea, Pelecanus ornithologi.*

*Worm.*

*Worm.* *mus.* l. f. 2. n. 10. t. 11. f. 10. *Platea ciceroni.*

*Anon. orn.* 134. f. 89. *Spoonbill.*

*Olear. mus.* 23. t. 13. f. 4. *Platina f. Cochlearia.*

*Fonst. orn.* t. 46. *Platea f. Pelecanus.*

*Merr. pin.* 181. *Platea f. Pelecanus.*

*Mars. danub.* 5. p. 28. t. 12. *Platea f. Pelecanus.*

*Will. orn.* 212. t. 52. *Platea f. Pelecanus,* *Leucorodius f.*  
*Albardeola.*

*Raj. av.* 102. n. 1. *Platea f. Pelecanus.*

*Suecic* *Pelekan.*

Habitat in *Westrobothnia & Lapponia*, æstate rarius.

DESCR. Tota alba est; *collum* longissimum; *rostrum* longum supra & infra omnino planum uti lamella, versus apicem dilatatum in figuram subrotundam.

### Ardea.

161. ARDEA *Grus* *cinerea*, occipite nudo papilloso, pileo remigibusque nigris, tectricibus alarum intimis laceris.

*Ardea* vertice papilloso. *Fn.* 131.

*Bell. ic.* 41. b. *Grus.*

*Gesn. av.* 529. *Grus.*

*Aldr. orn.* l. 20. c. 5. *Grus.*

*Fonst. orn.* 166. t. 54. *Grus.*

*Blas. anat.* t. 41. f. 8. *Grus.*

*Will. orn.* 200. t. 48. *Grus.*

*Raj. av.* 91. n. 1. *Grus.*

*Mars. danub.* 5, p. 6. t. 1. *Grus.*

*Alb. orn.* 2. p. 60. t. 65. *Grus.*

*Suecic* *Trana.*

Habitat passim in campis subhumidis.

DESCR. *Corpus canum.* *Dorsum* griseescens, *Capitis pileus niger*, occipite nudo papilloso. *Jugulum* a rostro ad medium colli fuscum, *Tempora alba*, albedine descendente versus tergum colli. *Remiges nigræ.* *Tectrices ultimæ longiores laxiores dependentes laceræ.* *Cauda nigricans.* *Femora feminuda, pedibus nigris.* *Rostrum* rectum, viride.

162. ARDEA *Ciconia* *alba*, remigibus nigris, cute sanguinea.  
*Fn.* 136.

*Bell. ic.* 45. a. *Ciconia.*

*Lonic. herb.* 341. a. *Ciconia.*

*Gesn. av.* 262. *Ciconia.*

*Aldr. orn.* l. 20. c. 1. *Ciconia..*

*Fonst. orn.* 147. t. 50. *Ciconia.*

*Will. orn.* 210. *Ciconia alba.*

*Raj. av. 97. n. 1.* Ciconia alba.  
*Mars. dan. 5. p. 26. t. 11.* Ciconia.  
*Alb. orn. 2. p. 59. t. 54.* Ciconia alba.  
*Suecis Storck.*

Habitat in Gothia, præsertim in Scania: nidificat super tectis, turribus, altis decollatis arboribus: edit ranas, serpentes, non vero bufones.

DESCR. *Alba* sunt caput, collum, venter, cauda, *nigræ* remiges. *Rostrum* pedesque rubri; facies magna ex parte alba. *Lingua* brevissima; *cuisse* tota sanguinea. *Jugulum* minus rubrum, antice album. *Palpebrae* *nigræ* basi *rubræ*.

163. ARDEA *nigra* pectore abdomineque albo. Fn. 136.

*Aldr. orn. l. 20. c. 2.* Ciconia nigra.

*Will. orn. 211.* Ciconia nigra.

*Raj. av. 97. n. 2.* Ciconia nigra.

*Gesn. av. 273.* Ciconia nigra.

*Alb. orn. 3. p. 77. t. 82.* Ciconia nigra.

*Rudb. pict.* Ardea fusca, pectore & cauda nigra, rostro & pedibus sub viridibus.

*Suecis Odenswala.*

Habitat in Svecia rarius, sed transmigrat versus arcticum, vicinitat Ranis.

DESCR. *Magnitudo* congenerum. *corporis color* supra niger; subtus albus est. *Nigra* sunt caput, collum ad sternum usque, dorsum, alæ, cauda. *Albo* vero pectus & venter: femora seuminuda una cum rostro viridia. *Pedes* semipalmati & *Rostrum* rubra. *Dorsi color* nitet; colli vero cinerascens est.

164. ARDEA *stellaris* capite læviusculo, corpore testaceo maculatis transversis, subtus maculis oblongis fuscis.

Ardea vertice nigro, pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus. Fn. 134.

*Gesn. av. 215.* Ardea stellaris minor.

*Aldr. orn. l. 20. c. 16.* Ardea stellaris minor s. Oenus.

*Will. orn. 207. t. 50. 52.* Ardea stellaris.

*Raj. av. 100. n. 11.* Ardea stellaris.

*Mars. danub. 5. p. 16. t. 6.* Ardea stellaris.

*Alb. orn. 1. p. 65. t. 68.* Ardea stellaris.

*Suecis Rördrum.*

Habitat ad aquas.

DESCR. *Rostrum* longum, convexum, obsolete nigrum, acutum. *Nares* oblongæ, valvula s. squama a latere superiore testæ, a qua canalis s. fulcus ad apicem rostri excurrit. *Lingua* angusta: acuta, triangularis. *Femora* seminuda, dilute viridia, *ungues* leviter arcuati, postico longiore. *Remiges* in singula ala 22. *Rectrices* 12 obtusæ. *Color corporis* supra rufo-testaceus maculis oblongis transversalibus; subtus vero dilutior maculis pen-

pennarum longitudinalibus. *Capitis* color luci objectus a rostro ad colum usque niger.

165. ARDEA *cinerea* occipite crista pendula, dorso cæruleo-cente, subtus albida, pectori maculis oblongis nigris.

*Ardea* crista dependente. Fn. 133.

Gesn. av. 212. *Ardea* pulla s. *cinerea*.

Fonst. orn. 151. t. 50. *Ardea* *cinerea*.

Aldr. orn. l. 20. c. 9. *Ardea* *cinerea* major.

Will. orn. 203. t. 49. *Ardea* *cinerea* major.

Raj. av. 93. n. 1. *Ardea* *cinerea* major.

Mars. danub. 5. p. 8. t. 2. *Ardea* *cinerea* major.

Alb. orn. 1. p. 46. t. 67. *Ardea* *cinerea* major s. *pulla*.

Suecic Hager.

Habitat ad aquarum ripas: nidificat in arboribus.

DESCR. *Rostrum* compressum, acutum. *Maxilla* superior nigra, inferior carnea, *crista* parva dependens nigra, macula intra oculos & *rostrum* utrinque albida, *gula* alba, *collum* a tergo & dorsum cæruleo-cana, *collum* subtus albicat maculis nigris longitudinalibus pictum. *Pectus* & *venter* albida. *Femora* flavescentia. *Remiges* 24 nigræ. *Cauda* (12) cana *Femora* *seminuda*, cinereo-incarnata. *Pedes* nigricantes. *digiti* *intermedii* *unguis* extrorsum ferratus; extimus *digitus* adnexus intermedio *digito*.

166. ARDEA *alba* capite lœvi, corpore albo, rostro rubro.

Fn. 132.

Raj. av. 99. n. 4. *Ardea* *alba* major.

Will. orn. 205. *Ardea* *alba* major.

Habitat in Scania, visa ad Araslöf.

DESCR. Tota nivea, caret crista. *Rostrum* luteum,

### Scolopax.

167. SCOLOPAX *Tetanus* rostro recto basi rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis.

*Tringa* rostro nigro basi rubra, pedibus coccineis. Fn. 149.

Gesn. av. *Totanus*.

Raj. av. 107. n. 1. *Totanus*.

Alb. orn. 3. p. 82. t. 87. *Totanus*.

Habitat ad paludes.

DESCR. *Femora* *seminuda*, plantis parum palmatis. *Cauda* albida nigro-undulata transversimi. *Remiges* *extiores* nigricantes: 11-21 albæ, *dorsum* nigro-cinereum maculatum, uti & *caput* & *collum*. *Pectus* album nigris maculis. *Abdomen* album. *Rostrum* capite longius, subulatum, lœve.

168. SCOLOPAX *Arquata* rostro arcuato, pedibus cæruleoscen-tibus, aliis nigris: maculis niveis. Fn. 139. it. Scan. 333.

Gesn.

*Gesn. av. 222.* Numenius s. Arquata.

*Aldr. orn. l. 20. c. 21.* Numenius.

*Will. orn. 216. t. 54. f. 1. 2.* Numenius aldr. s. Arquata.

*Raj. av. 103. n. 1.* Numenius s. Arquata major.

*Alb. orn. 1. p. 75. t. 79.* Arquata.

Habitat in paludibus.

*DESCR.* Pedes fusco-subcærulescentes. Rostrum arcuatum, nigricans, longissimum. Remiges primores nigræ, secundariæ albo-maculatæ. Alba sunt Venter & uropygium. Pennæ in corpore nigricantes, sed margine cinereo rufescente in dorso, albido in pectore, albo-rufescente in gula. *Arquata s. Numenius medius Rudbeckii* est hujus fæmina, quamvis colore aliam quasi avem sifstat, cujus caput, collum, pectus dilute grisea; maculis longitudinalibus fuscis; femora seminuda cærulea: pennæ dorsi nigrae maculis griseis.

169. SCOLOPAX *Phæopus* rostro arcuato, pedibus cærulescentibus, dorso maculis fuscis rhombeis. *Fn. 140.*

*Gesn. av. 500.* Phæopus altera.

*Aldr. orn. l. 20. c. 21.* Arquata minor.

*Will. orn. 217.* Arquata minor.

*Raj. av. 103. n. 2.* Arquata minor.

*Suecic Windspole.* Norlandis Spof.

Habitat in paludibus. Ova virescentia maculis testa.

*DESCR.* Rostrum maxime arcuatum, nigrum. Pedes cærulescent, Caput, collum & pectus maculis longitudinalibus acuminatis; inferioribus veluti sinu arcuatis, Venter albus; pone femora maculae distinctæ. Cauda cinerea fasciis fuscis. Remiges nigricant. Dorsum postice album.

*FÆMINA* hujus, quam a D. D. Lechio habui, sequentem subministravit descriptionem: Remiges 26 nigræ, quarum 1 rachi alba. 1-5 apice & latere exteriore nigræ, 6 & reliquæ insequentes non tantum a latere exteriore, sed & a latere interiore maculis 5-12 albis. Rectrices 14 fasciis 8, pallidioribus, totidemque obscurioribus alternis. *uropygium* album lineis nigricantibus. Caput dilutius cinereum rachidis obscurioribus, supra vero fusco-cinereum est.

170. SCOLOPAX *Rusticola* rostro recto laevi, pedibus rufis, femoribus testis, unguibus pollicum obsoletis.

Numenius rostri apice laevi, capite linea utrinque nigra, reticibus nigris apice albis. *Fn. 141.*

*Gesn. av. 502.* Rusticola s. Perdix rustica major.

*Aldr. orn. l. 20. c. 51.* Scolopax s. Perdix rustica.

*Will. orn. 213.* Scolopax.

*Raj. av. 104. n. 1.* Scolopax, Gallinago maxima.

*Alb. orn. 1. p. 67. t. 70.* Scolopax.

*Suecic Moikulla.* Anglis The Woodcock.

Habitat in appropriatis locis, volitans per noctes, quasi viam strictissimam, in ipso aëre itu redditique continuo. Per hymenes

mes in Anglia habitat, inde matrimonio juncta vere discedit. Vicitat Lumbricis, ideoque æstate deserit australes terras & hyeme boreales.

*DESCR.* *Corpus* supra griseum lineolis crassiusculis transversis nigris cum maculis saepe nigris temere sparsis; subtus albicat totum, lineis tenuioribus nigris. *Cauda* brevissima, rectricibus nigris, apicibus supra canis, subtus niveis. *Margo* lateralis exterior rectricum testaceo-variegatus; a rostro ad oculos linea nigra extenditur. *Rostrum* rectum, digitis duplo longius, ad latera rugosum, utrinque fulco exaratum; apex glaber, maxilla superior productior apice subtus gibba. *Pedes* cinerei, ad genua testi, venter maculatus ut reliquum corporis.

171. SCOLOPAX *Glottis* rostro recto basi inferiore rubro, pedibus virescentibus.

Numenius pedibus virescentibus, uropygio albo, remigibus lineis albis fuscisque undulatis. *Fn.* 142.

*Gesn.* av. 520. *Glottis*.

519. *Limosa venetorum*.

*Aldr. orn.* l. 20. c. 66. *Pluvialis major*.

*Will. orn.* 220. *Pluvialis major*.

t. 55. *Glottis* s. *Pluvialis major*.

*Raj. av.* 106. n. 8. *Pluvialis major*.

*Sloan. jam.* 2. p. 317. *Glottis* s. *Pluvialis major*.

*Suecic* *Glutt.*

Habitat in paludibus.

*DESCR.* *pedes* plumbei, *venter* albus, *pectus* griseum, *Dorsum* pennis nigris margine griseis, apicibus albis rectum. *Rostrum* nigrum, basi inferoris maxillæ rubra;

172. SCOLOPAX *limosa* rostro recto laevi, pedibus fuscis, remigibus macula alba: quatuor primis immaculatis.

Numenius uropygio albo; rectricibus nigris basi albis, remigibus transversa alba macula, exceptis quatuor primis.

*Fn.* 144.

Habitat in carectis.

*DESCR.* *Magnitudo* Vanelli: *Caput*, *collum*, *Pectus* subflavescens, transverse fusco-inaculata. *Rostrum* rectum, longissimum, apice glabro. *Abdomen* albicans maculis cinereo-flavescens. *Dorsum* cinereum maculis fuscis testaceisque, latera cinerea immaculata. *Tectrices* caudæ superiores & inferiores albæ. *Rectrices* 1-4 nigricantes, laterè interiori albæ, 8 &c. nigricantes macula transversa alba. Communicavit D. G. Wallerius.

173. SCOLOPAX *Gallinago* rostro recto apice tuberculato, pedibus fuscis, lineis frontis fuscis quaternis.

Numenius capite lineis quatuor fuscis longitudinalibus, rostri apice tuberculofo; temoribus seminudis. *Fn.* 143.

*Gesn*

*Gesn. av. 503.* Gallinago s. Rusticola minor.

*Ald. orn. l. 20. c. 53.* Scolopax s. Gallinago minor.

*Will. orn. 214.* Gallinago minor.

*Raj. av. 105. n. 2.* Gallinago minor.

*Alb. orn. 1. p. 68. t. 71.* Gailinago minor.

*Suecic* Horsgjök.

Habitat in carectis.

**DESCR.** *Caput testaceo-pallidum:* lineis quatuor fuscis longitudinalibus, quarum exteriores per oculos dueunt. *Collum* griseum maculis fuscis. *Sternum & venter* alba. *Alæ nigro-cinereæ* pennis nigricantibus: margine exteriore longitudinaliter pallide testaceo: disco punctato. *Cauda* brevis: *Rectrices nigrae* fasciis ferrugineis apice albidae femora teminuda; digito postico unico articulo brevissimo, at intermedio longitudine tibiae. *Rostrum* pallidum, longissimum; exterior atrum, apice inæqualibus punctis excavatis. *Remiges secundariæ* apicibus albent linea alba transversali, hinc clausis alis linea lateralis alba; *Remigum prima* a latere anteriore tota alba;

**174. SCOLOPAX *lapponica*** rostro subrecurvato, pedibus nigris, pectore ferrugineo. †

Recurvirostra pectore croceo. *Fn. 138.*

*Rudb. pict.* Scolopax rostro recurvo; pectore rufescente, pedibus nigris:

Habitat in Lapponia

**DESCR.** *Rostrum* longum, vix notabile recurvatur. Tota subtus crocea a rostro ad femora: *Dorsum* griseum, *Rostrum & Pedes* fusi.

## Tringa.

**175. TRINGA *Pugnax*** rostro pedibusque rubris, facie papillis granulatis carneis; rectricibus tribus lateralibus immaculatis: *Fn. 145.*

*Aldr. orn. l. 20. c. 19. f. i. 8:* Avis pugnax.

*Jonst. orn. 152. t. 51 52.* Avis pugnax.

*Will. orn. 224. t. 56.* Avis pugnax.

*Raj. av. 107. n. 3.* Avis pugnax.

*Mars. danub. 52. t. 24.* Avis pugnax.

*Alb. orn. 1. p. 69. t. 72. 73.* Avis pugnax.

*Suecic* Brushane.

Habitat ubique per Sueciam, præsertim in Scania.

**DESCR.** *Dorsum* testaceum maculis nigris cæruleoscentibus nitidis. *Alæ* supra cinereæ, subtus albæ. *Pectus* albicat, pennis nigris maculatum. *Abdomen* album. *Cauda* fusca, fasciis pallidis. *Remige* 5 utrinque nigro alboque variegata. *Pedes* rubri cum postico. *Pennæ* colli longæ albæ. *Facies* infinitis parvis papillis carneis adspersa.

**FÆMINÆ** *Corpus* ex testaceo & nigro varium s. scolopacinum: *Remiges* fusæ; *secundariæ* margine albæ; *Rectrices* 3 exteriores cinereæ immaculatae.

onata marginē albo ut in mare, speciei nota propria: *Abdomen* album.

176. TRINGA *Vanellus* pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro.

*Bell. ic.* 49. *a Capra*, *Capellus*, *Vanellus*.

*Gesn. av.* 764. *Vanellus*.

*Aldr. orn.* I. 22. c. 63. *Capella*, f. *Vanellus*.

*Jonst. orn.* 164. t. 53. 27. *Vanellus* f. *Capella*.

*Vill. orn.* 228. t. 57. *Capella* f. *Vanellus*.

*Raj. av.* 110. n. 1. *Capella* f. *Vanellus*.

*Anonym.* 138. t. 95. *Lapwing*.

*Alb. orn.* I. p. 70. t. 74. *Capella* f. *Vanellus*.

*Suecic* Wipa. Kowipa. *Gotlandis Blæcka*.

Habitat ubique in pratis depresso, copiosissima ad Scanor.

DESCR. *MAS*. *Caput* supra nigrum plumis longis pone reclinato-pendulis in cristam. *Gula* versus collum deorsum nigra. *Pectorale* nigrum. *tempora* alba. *Collum* supra cinereum. *Dorsum* e brunneo, cæruleo, viridi, ferrugineoque splendens. *Pectus* album. *Alæ* rectrices collo concolores sed magis cæruleæ. *Remiges* 24, nigrae: primariae 5 apicibus alblicant, secundariae versus basin alblicant. *Cauda* integra. *Rectrices* 12 albae, a medietate exteriore nigrae, apicibus pallidis: quarum remex extima utrinque alba, excepta macula nigra prope apicem. *Teetrices* caudæ extra & subtus ferrugineæ. *Rostrum* nigrum. *Nares* oblongæ perviae. *Pedes* rubri. *Mas* gula nigra: *Fæmina* gula alba. Maris remex extima alba, macula infra apicem nigra. Feminæ extimus remex totus albus est;

177. TRINGA *Gambetta* rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, subtus albo. *Fn.* 153.

*Aldr. orn.* I. 20. c. 26. *Gambetta*.

*Raj. av.* 107. *Gambetta*.

Habitat in desertis paludosis.

DESCR. *Corpus* luteo & cinereo maculatum; *Pectus* albo & cinereo maculatum;

178. TRINGA *interpres* pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoquelvario, pectore abdomineque albo. *Fn.* 154.

*It. gotl.* 217.

*Edw. av.* 141. t. 141. *Morinellus canadensis*.

*Gotlandis Tolk.*

Habitat in *Gotlandiæ insulis*: Heligholmen & Clasen.

DESCR. *Magnitudo Turdi*, *Venter*; *pectus*, *cauda* subtus, *alæ* subtus, *dorsum* pone alba. *Caput* magna ex parte album maculis griseis adspersum. *Collum* f. *Pectus* anterius nigrum lata macula, a qua utrinque versus partem superiorem colli, alia per oculos versus frontem, alia versus maxillæ inferiores latera. Hanc nigredinem distinguit macula alba in *gula*, alia alba inter rostrum & oculos, alia ad aures, alia in sincipite. *Cauda* brevis fusca. *Rectrices* basi apicisque albae, exceptis intermediiis

diis duabus. *Ale* superne cinereæ. *Remiges* nigricantes, versus basi albæ, at secundariæ & apice & basi albæ. *Dorsum* tegunt penæ longiores latiores nigræ maculis ferrugineis. *Rostrum* breve, subulatum, obtusum, nigrum, longitudine digitorum. *Nares* oblongæ, perviae. *Pedes* sanguinci, fissi; tetradastyli, unguibus nigris; *Femoribus* feminudis.

179. TRINGA *lobata* rostro subulato apice infexo, pedibus vire-scentibus lobatis, abdomine albido.

*Edw. av. 143. t. 143.* Tringa fusca, pedibus fulicæ.  
Habitat in *Lapponia*. P. Adlerheim.

DESCR. *Rostrum* rectum nigrum capite longius apice incurvum, basi inferiore rubra. *Fusca* sunt *Gula*, collum subtus, sed *dorsum* albo punctatum & *Pectus* lineis albis transuersis. *Abdomen* fusco albicans. *Remiges* fusca secundariis margine utroque albo maculato. *Rectrices* fusca fasciis albis plurimis; supetiore fasciis obsoletis; postica dorsi alba. *Magnitudo* Turturis.

ALIAM etiam è *Lapponia* a D. Adlerheim advestam, at sexu distinctam, adjiciam, cui *Gula* macula alba postice triloba. *Collum* subtus etiamque lateribus ferrugineum. *Pectus* antice cinereum, ceterum ut abdomen & rectrices inferiores caudæ album. Maculae ferrugineaæ in medio dorsi. *Remiges* primores fusca rachi alba. Secundariae primores margine albæ. *Rectrices* cineteæ matgine albo. *Rostrum* & *Pedes* nigri.

180. TRINGA *Ocrophus* rostri apice punctato, pedibus vire-scentibus, dorso fusco-viridi nitido. *In. 146.*

*Bell. av.* Cinclus.

*Gesn. av. 517.* Gallinæ genus, quod nomine ignoto Sametes humbe nominò.

508. Rhodopus;

511. Ochrophus mediuss.

*Adr. orn. l. 20. c. 39. p. 461.* Gallinula Rhodopus s. Phænicopus:

*l. 20 c. 54. p. 481.* Tringa:

*Will. orn. 222. t. 55.* Tringa.

*Raj. av. 108. n. 7.* Tringa.

Habitat ad carecta & ripas.

DESCR. *Rostrum* nigrum. *Crura* plumbea. *Corpus* supra fuscum, clæ subtus nigræ lineis albis undulatis. *Venter* albus. *Collum* maculatum. *Cauda* maculis transuersis. *Rectrices* 1. i penitus candidæ. 2. 2. macula prope apicem alba. 3. 3. ductu-albo non longe ab apice. 4. 4. ductibus duobus. 5. 5. ductibus duobus cuim dimidio. 6. 6. ductibus quatuor.

181. TRINGA *alpina* testaceo-fusca, pectori nigricante, rectricibus cinereo albidis, pedibus fuscenscentibus.

Habitat in *Lapponia* P. Adlerheim.

DESC. *Corpus* *Sturni* magnitudinè griseo fuscoque intime mixtis maculatum. *Sternum* nigrum. *Abdomen* album. *Remiges* primores fusca rachi alba; secundariarum primores apice margine exteriore latereque interiore alba. *Rectrices* cinereæ. *Rostrum* vix capite longius.

182. TRINGA *Hypoleucus* rostro lœvi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris, subtus albo. Fn. 147.

Gesn. av. 509. *Gallinula aquatica hypoleucus*.

617. *Motacilla* cuius iconem Kentmannus, descriptionem Fabricius ex Misnia dedere.

Aldr. orn. 3. p. 469 *Gallinula hypoleucus*.

Will. orn. 223. t. 35. *Tringa minor*.

Raj. av. 108. n. 5. *Tringa minor*.

Suec. Snæppa. *Genevensibus* Beccafin.

Habitat ad lacus.

DESCR. Cum hac forte eadem est avis Westmanni Strandfittare, quæ habitat in littoribus sabulosis (Kallstrander). Rostri apex lœvis; pedes & rostrum livida, vix capite longiora. Caput, collum postice, dorsum, alæ, uropygium & tæta supra cinerea lituris undulatisque fuscis. Gula, abdomen, femora, ani regio alba. Collum subtus album, lineis longitudinalibus subfuscis. Rectrices quatuor intermediae cinereæ totæ; quatuor laterales apice albæ, at 1, 1 & 2, 2 latere exteriore albo fasciis fulcis. 4-9 apice albæ; alias cinereæ obsolete. Remiges fuscæ; 1 immaculata, 2-20 fuscæ, inferiore latere macula alba. 11-20 fuscæ apice albæ, nullæ lineolæ undulatæ subtus; extimus digitus medio adnectitur; linea alba supra oculos. Magnitudo Motacillæ albæ;

183. TRINGA *Canutus* rostro lœvi, pedibus cincterascensibus, remigibus primoribus ferratis.

*Tringa cinerea*, remigibus secundariis basi totaliter albis; rectricibus quatuor mediis immaculatis. Fn. 150.

Habitat juxta aquas; ubi currit, caudam motacillæ instar continuo motitans.

DESCR. Magnitudo fere Sturni. Caput, dorsum, collum fuscō nigro griseo que undulata. Abdomen, pectus, gula, collum subtus, alba; Remiges 20. fuscæ; primores in medio postice albæ, secundariis in medio totaliter s. utrinque albæ; apices in his secundariis albæ; in primoribus minus manifeste albæ. Rectrices fuscæ 1, 2, 3, 4 albo-variegatae, at 5, 6 (seu quatuor intermediae) omnino albedine expetres & griseo-immaculatae. Rostrum fuscum, capite paulo longius. Pedes cincterascentes, retrorsum stylis ultimus mediò adnexus infimo articulo. Femora seminuda. Alæ subtus fascia quadruplici alba pinguntur. rectrices alæ superiores, præsertim primæ, albant apicibus. Remiges 1, 2, 3, 4, 5, 6 marginè exteriore versus apicem ferratae sunt, intacta supra oculos alba, in lingue bali octo denticuli, & in fauce plures retro spectantes denticuli.

184. TRINGA *Glareola* rostro lœvi, pedibus virgescensibus, corpore fuscō albo-punctato; pectorē subalbido.

*Tringa nigra* albo punctata, pectorē maculata; abdomine subalbido; pedibus virgescensibus. Fn. 152.

Rudb. piæt. *Gallinula aquatica minor*; pedibus soridè viridibus.

Habitat in sylvis uliginosis.

DESCR. Magnitudo Sterni; Dorsum fuscum albo punctatum; Uropygium

gium album. *Remiges fuscæ*: prima rachi nivea; secundariæ apicis marginæ albæ. *Rectrices fasciis albis fuscisque*: laterales magis albæ minusque fasciatæ. *Abdomen* albidum.

185. *TRINGA littoralis* rostro lævi, pedibus remigibusque fuscis: prima rachi nivea. *Fn.* 151.

*Rudb. pict.* *Gallinula aquatica minima*, pedibus nigricantibus.

Habitat in paludibus.

*DESCR.* *Rostrum* nigrum, capite longius. *Maxilla inferior* versus basini pallidior. *Collum* fuscum lineis obliquis albicantibus. *Dorsum* fuscum, maculis punctis ferrugineis s. griseis. *Uropygium* album, pennis tamen versus basin nigricantibus. *Tectrices alarum superiores* dorso concolores, sed punctis s. maculis dilutioribus; *tectrices inferiores* alæ exalbidæ lineis transversis cinereis. *Pectus & abdomen* albidum. *Caudæ tectrices inferiores* albæ. *Remiges nigrae*, secundariæ apice albescunt. *Remex* primus rachi nivea gaudet. *Rectrices fuscæ & albo undulato* maculatae, exterioribus maxima parte albis; intermediis maxima parte fuscis. *Pedes fuscæ*. *Magnitudo Turturis*, regio oculorum albicat; linea inter oculos & rostrum fuscæ.

186. *TRINGA Squatarola* rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo subtus albido.

*Tringa nigro-fusca* subtus alba, rostro nigro, pedibus virescentibus. *Fn.* 155.

*Raj. av. 111. n. 3. Pluvialis cinerea.*

*Alb. orn. 1. p. 72. t. 76. Pluvialis cinerea.*

*Lechei* *Tringa augusti mensis*.

Habitat in Scania.

*DESCR.* *Rostrum* nigrum. *Pedes* vitide cinctæ, incisuris transversis. *Remiges* 24 quarum 1 rachi alba; 2-4 nigriores, reliquæ magis fuscæ. Omnes margine apicum præsertim albæ; *rectrices* infuper maculis transversis notantur. *Rectrices* 12 alæ lineis transversis fuscis distantibus, exceptis intermediis duabus, in quibus lineæ latiores & propiores. *Corpus* nigro fuscum. *Pectus, abdomen, uropygium* alba. *Caput collumque* nigris parvis maculis in cinereo adpersum. *D. Leche.*

## Charadrius.

187. *CHARADRIUS Hiaticula* pectore nigro, fronte nigricante falcio alba, vertice fuscæ, pedibus luteis. *Fn.* 159.

*Jonst. orn. 166. t. 53. Charadrius.*

*Aldr. orn. 1. 20. c. 67. Charadrios s. Hiaticula.*

*Will. orn. 1. 230. t. 57. Charadrius s. Hiaticula.*

*Raj. av. 112. n. 6. Charadrius s. Hiaticula.*

*Maregr. bras. 199. Mutuiti brasiliensisibus.*

*Sivan. hist. 2. p. 314. t. 169 f. 2.*

*Alb. orn. 1. p. 76. t. 80. Charadrius.*

*Rudb.*

Rudb. piæt. Charadrius s. Hiaticula flavipes.

Suecis Strandpipare. Scaxis Grylle; Hallandensibus Trulls;  
Lappis Pago.

Habitat ad ripas ubique, & in alpibus Lapponicis frequens.

DESCR. Rostrum croceum, apice nigro. Caput cinereo-fuscum, fronte alba superius fascia atra. Tempora obscuriora; Gula & collare album, dein ad sternum usque nigra magna macula. Dorsum, alæ, cauda cinerea. Venter, pectusque alba. Pedes flavi, (in altero sexu fulvi,) remiges fuscæ, quarum i rachi alba, 5-19 apice albo. Rectrices fuscæ, sed 6, 6 immaculatae; 3, 4, 5 apice albo; 2 apice & latere exteriore alba, sed i omnino albæ macula fuscæ.

188. CHĀRĀDRIŪS Morinellus pectori ferrugineo, fascia superciliorum pectorisque linearis alba, pedibus nigris. Fn. 158.

Charadrius abdomine rufescente, pectori cinereo; vertice fusco. Fn. 160.

Alb. orn z p. 57. t. 61. 62. Morinellus.

Lappis Lahul.

Habitat ad Sernam orientalis Dalekarliæ, & Alpes Lapponiæ; quo migrans Upsaliæ mense majore transit.

DESCR. Collum, dorsum dilute cinerea. Pectus ferrugineum: ad basin sterni linea transversalis alba linea nigra superinducta. Venter nigricat; singula tamen penna interitis albescat. Gula alba, cauda, Cinerea albo margine. Alæ subtus pallidiores. Linea alba a rostro caput totum vertice fuscæ cingit. digitus extimus medio adfixus membranæ. Rectrices fuscæ, quarum 1, 2, 3 apice albae, reliquæ vix margine apicis albi. annæ. Caput supra nigricans. Magnitudo Turdi. Rostrum pedesque nigri; Mas versus feminæ niger est.

189. CHĀRĀDRIŪS apricarius pectori nigro, rostro basi gibbo, pedibus cinereis

Charadrius nigro lutecente variegatus; pectori nigro. Fn. 156. It. oel. 72.

Rudb. piæt. Pluvialis minor nigro-flavus.

Edw. av. 140. t. 140. Pluvialis viridis maculatus; ventre nigro:

Ölandis Alwargrim. Suecis Åkerhöns. Smalandis Myrpyta. Lappis Huttich.

Habitat in Ölandiæ campis sterilibus.

DESCR. Magnitudo Columbæ. Caput, collum, dorsum, alæ, cauda maculata maculis albis, nigris, luteoque fuscis mixtis: singula penna nigra maculis quibusdam luteo-fuscis ad latera, pallidioribus versus apicem, lana ad basin singulæ pennæ cinerea. Falcia alba frontis supra oculos ad aures ducta. Femora, sub alis, & sub cauda, albescant. Latera colli versus thoracem alba. Pectus & Abdomen nigrum. Collum subtus nigrum. Rostrum, longitudine capitis, nigrum, versus basin gibbum. Femora semiuncta. Pedes cinerei: digitus extimus adnexus intermedio membrana quoad primum articulum. Remiges nigricantes; primiores octo;

quarum extima longissima, reliquæ ordine breviores, acuminatæ, in medio juxta rachin albæ. Remiges secundariæ itidem fuscæ, obtusæ, æquales, apicibus albis, uti etiam rectrices; Cauda integra, rectrices 12 fuscæ, lineis lateralibus octo utrinque flavescensibus.

190. CHARADRIUS *Pluvialis* pedibus cinereis, corpore nigro viridique maculato subtus albido.

Charadrius nigro lutescenteque variegato; pectore coeolare. *Fn.* 157.

*Will. orn.* 229. *t.* 67. *Pluvialis viridis.*

*Raj. av.* 111. *n.* 7. *Pluvialis viridis.*

*Sloan. hist.* 2. *p.* 313. *t.* 269. *f.* 1. *Pluvialis viridis.*

*Alb. orn.* 1. *p.* 71. *t.* 75. *Pluvialis viridis.*

*Dalekärlis Åkerhöna.* *Lappis Huttii.*

Habitat juxta alpes Dalekarlicas in orientali Dalekärlia & in Ölandie campestribus: sonor sibilante hvit hvit.

DESCR. *Magnitudo Columbae.* *Corpus* supra nigricans inaculis parvis ovatis testaceis adspersum, inque fragula penna ad marginem delineatis. *Gula* albescens, *Collum* subtus a gula ad sternum e testaceo & fusco maculatum. *Pectus & venter* alba. *Cauda* integra, rectricibus 12 fuscis, inaculis testaceis variegatis. *Alatum remiges* nigro-fuscæ, margine apicum albicante. *Teetrices* alarum nigro-fuscæ apicibus albis. *Aixa* subtus albæ. *Femora* seminuda cinerea. *Digitus* extimus adnectitur primo articulo membrana. Aliam avem sic descripsimus: *Corpus* viridi-luteum, inaculis in dorso nigris, ramosis. *Pectus* ex flavo-viridi variegatum, *Venter* albus. *Remiges* fuscæ 1-9 medio scapo albicantes; 5- &c. basi extorsum albiantur.

## Recurvirostra.

191. RECURVIROSTRA *Avosetta* albo nigroque varia. *It.* *Öland.* 69. *Fn.* 137.

*Gesn. av.* 231. *Avosetta*, Recurvirostra.

*Altr. orn.* v. 3. l. 19. c. 64. *Avosetta italis* dicta.

*Will. orn.* 240 *t.* 60. *Recurvirostra*, *Avosetta italorum.*

*Raj. av.* 117. *Recurvirostra*, *Avosetta italorum.*

*Marf. danub.* 5. *p.* 72. *t.* 34. *Recurvirostra.*

*Alb. orn.* 1. *p.* 96. *t.* 101. *Recurvirostra.*

*Ölandis Skärfläcka.* *Gotlandis Alfit.*

Habitat in Ölandie extimo apice s. maxime australi littore prædii Ottenby & in Gotlandia. Vicitat Insectis.

DESCR. *Corpus* album, sed supra caput, collum, latera dorsi & alas nigrum. *Uropygium* breve; nigrum. *Remiges* versus apicem alarum longiores, versus basin alæ breviores: harum primores octo nigrae, sed versus basin albæ, ea proportione, ut quod breviores, eo magis albæ, ut octava solo apice sit macula nigra notata, reliqua remiges omnes albæ. *Teetrices* albæ, exceptis primis 5 apice nigris; *Rectrices* brevissimæ, albæ: *Pedes* tuberculati, cauda duplo, vel triplo longiores, palmati omnino, postico minimo; ungibus nigris. *Femora* seminuda. *Macula* alba parva sub & supra oculum

lum utrinque. *Rostrum* nigrum, depresso-planum & fere coriaceum, subulatum, acuminatissimum, recurvum versus superiora, minime rigidum, capite triplo longius, apice membranaceum, *Nares* oblongæ, luci perviae.

## Hæmatopus.

192. HÆMATOPUS ostrilegus. Fn. 161.

*Bell. obs.* 18. Hæmatopus.

*Aldr. orn. l. 20. c. 31.* Hæmatopus bellonii.

*Barth. act. I. p. 90.* Pica marina s. Kielder.

*Will. orn. 220. t. 56.* Hæmatopus bellonii.

*Raj. av. 105. n. 7.* Hæmatopus bellonii.

*Alb. orn. I. p. 74. t. 78.* Hæmatopus.

*It. oel. jun. 8.* Strandskjura.

*Gotlandis Marspitt.* *Ölandis Strandskjura.*

Habitat ad littora maris, præsertim Ölandiæ & Gotlandiæ.

DESCR. *Rostrum* sanguineum, capite longius, compressum præsertim at picè cuneo. *Nares* oblongæ perviae, palpebrae nudæ circulo coccineo. Iris rubra, pupilla nigra. *Caput*, *collum* usque ad sternum, *dorsum* ad medium & alæ superius nigra. *Pectus*, *venter*, *dorsum* posterius, *testrices* utrinque caudæ, albæ. *Rectrices* albæ, a medio ad extrellum nigrae. *Remiges* vero nigrae, at in media costa linea alba, & latus interius remigum album. *remiges secundariæ* nigrae, versus basin albæ & margine albæ, *testrices* spuriae albæ. *Femora* seminuda. *Pedes* incarnati, tridactyli.

## Fulica.

193. FULICA atra fronte calva, corpore nigro, digitis labatis.

Fulica fronte calva æquali. Fn. 130.

*Bell. ic. 36. b.* Fulica.

*Gesn. av. 390.* Fulica recentiorum.

*Aldr. orn. l. 19. c. 13.* Fulica.

*Lonic. 337. a.* Fulica.

*Will. orn. 239. t. 59.*

*Raj. av. 116. n. 1.* Fulica.

*Anon. angl.* Hoopoe.

*Mars. danub. 70.* t. 33. Fulica.

*Alb. orn. I. p. 79. t. 83.*

*Suecic Blås-klacka.*

Habitat in aquis. *Viditat* Piscibus, Insectis, seminibus.

DESCR. *Corpus* supra nigrum, subrus fuscum, *pectus* undulata canitie pinguis. *Rostrum* carneum. *Frons* calva, albo incarnata. *Rostrum* breve, *nares* oblongæ; maxilla superiore longiore acuta repta fornicata. *Cauda* brevissima. *Pedes* longi tetradactyli lateralibus membranis acuti. *Remiges* primiores nigrae; secundariæ fusco cinerascentes, albice albicantes. *Genua* postice fulva.

## Rallus.

194. RALLUS *Crex* alis rufo-ferrugineis. *Fn.* 162.

*Merr. pin.* 183. *Crex aristotelis.*

*Aldr. orn.* I. 13. c. 23. *Ortygometra.*

*Will. orn.* 522. t. 29. *Ortygometra aldr.*

*Raj. syn.* 58. *Ortygometra*

*Alb. orn.* I. p. 31. t. 33. *Ortygometra.*

*Upplandis* Ångsnärpa. Kornknarr. *Gotlandis* Seydreif-wer.

Habitat inter gramina in pratis fertilissimis æstate, ubi stridulo gemino sono crex crex continuo auditur: edit lumbricos.

*DESCR.* Magnitudo Piceæ. *Caput*, ratione corporis minimum. *Caput* collum, dorsum, canda testacea, maculis inaequalibus nigris, nam singula penna nigra est, margine unicolor testaceo, *Aæ* remiges & rectrices ferrugineæ supra & infra. *Cana* sunt gula & macula pone oculos, *pectus* griseum. *Abdomen* & latera ferruginea maculis fuscois (color exustus) albo undulata, qualia & cauda subitus. *Femora* supra genua nuda, livida, inguis nullæ. *Rostrum* utrinque basi sinuatum, lividum. *Nares* oblongæ, perciae. *Oculi* nigri, pupilla rufescente, pollice vix incedit, alæ infra nigres quam extra rafe, difficile capitur, licet facile audiatur.

Character constitit in Rostro fere gallinaceo, naribus perviis, lingua integrâ pedibus tetradactylis rotiro longioribus digitis.

195. RALLUS *aquaticus* alis griseis fusco maculatis, hypochondriis albo maculatis, rostro luteo.

*Will. orn.* 234. *Rallus aquaticus.*

*Raj. av.* 113. *Rallus aquaticus.*

*Alb. av.* I. p. 73. t. 77. *Rallus aquaticus.*

Habitat in Careætis: Pulius ster est.

*DESCR.* *Rostrum* fuscum, mandibula inferiore rubra. *Cinerea* sunt Capitis latera, Collum subitus, & *Pectus*. *Grisea* maculis fuscois sunt Dorsum, collum supra & Caput supra. *Ani* regio alba nigro maculata. *Aæ* & *Canda* cuneiformis fusca.

## Otis.

196. OTIS *Tetraz* capite juguloque lævi.

*Alb. av.* 3. p. 33. t. 41. *Anas campestris.*

Habitat in Suecia, rarius tempore vernali.

*DESCR.* Magnitudo Tetraonis Tetricis, colore scolopacino, *jugulum* pallidum. *Abdomen*, *Femora*, *Aæ* subitus alba. *Remiges* primores albae extremitate fusca: 7-10 fascia nigra infra apicem; 11-22 albae punctis aliquot linearibus nigris; 23-28 dorso concolores. *Canda* brevis rotundata: *Rectrices* 18: fasciis duabus linearibus nigris divisæ in tres areas æquales, quarum intima alba; reliquæ duæ albae lineis undulatis nigris:

*Femo-*

*Femora denudata. Pedes flavi tridactyli. Rostrum parvum, figura gallinæ imbricatum; nigrum linea transverso albida, in medio undata.*

## V. GALLINÆ,

### Pavo.

197. PAVO *cristatus* capite crista erecta.

Pavo cauda longa. *Fn.* 163.

*Gesn.* av. 656. Pavo.

*Aldr. orn.* l. 13. c. 1. Pavo.

*Jonst. orn.* 56. t. 22. Pavo.

*Valent. muj.* 464. Pavo.

*Will. orn.* 112. t. 27. Pavo.

¶ *Raj. av.* 51. n. 2. Pavo colore albo.

*Suecis* Päfogel.

Hospitatur apud nostrates rarius, præsertim in aviariis Mag-natum; in Zeylona sponte.

### Meleagris.

198. MELEAGRIS *Gallopavo* capite caruncula frontali cri-staque gulari, maris pectori barbato. *Fn.* 164.

*Lonic. herb.* 337. a. Gallo-pavo.

*Gesn.* av. 432. Gallo-pavo.

*Aldr. orn.* l. 13. c. 4. Gallo-pavo.

*Bell. ic.* 60. a. Meleagris.

*Blas. anat.* t. 46. f. 11. Gallus africanus.

*Jonst. orn.* 58. t. 24. Gallo-pavo mas.

Gallina indica.

*Will. orn.* 113. t. 27. Gallo pavo s. Meleagris & Numidica-avis.

*Raj. av.* 51. n. 3. Gallo-pavo s. avis numidica & meleagris quibusdam.

*Suecis* Kalkon.

Hospitatur apud nos ubique culta, ex America septentrio-nali, ubi niger semper est.

OBS. Mas pectori barbato est.

### Phasianus.

199. PHASIANUS *Gallus* cauda compressa adscendente.

Gallus cauda compresa adscendente. *Fn.* 165.

*Ald. orn.* l. 14. c. 1. Gallus gallinaceus & Gallina.

*Ge'n.* av. 395. Gallus gallinaceus.

340. Gallina.

427. Capus.

*Blas. anat.* t. 44. f. 9. Gallus gallinaceus.

f. 10. Gallina.

*Will. orn.* 109. t. 26. Gallus gallinaceus.

Gallina domestica.

*Raj. av.* 51. n. 1. Gallus gallinaceus.

*Suecis* Höns: Tupp & Höna.

3 Raj. av. 51. n. 1. Gallina crista in vertice plumosa densissima & undequaque diffusa spectabilis.

*Suecis* Tofshöns.

2 Raj. av. 51. n. 1. Gallina cauda s. uropygio carens.

*Will. orn.* 110. t. 26. Gallus e Persia.

*Suecis* Gumphöns.

3 Will. orn. 110. Gallina frislandica.

Raj. av. 51. n. 1. Gallina crispa, nostratisbus Frislandica penins reflexis caput versus & velut invertit.

*Suecis* Kroll-Höna.

Hospitatur ubique culta.

## Tetrao.

200. TETRAO *Urogallus* pedibus hirsutis, rectricibus exterioribus subbrevioribus, axillis albis, *Fn.* 166.

*Gesz. av.* 491. Urogallus.

495. Grygalus major. (fæmina)

*Aldr. orn.* l. 13. c. 6. Urogallus s. Tetrao major.

Urogallus fæmina.

*Will. orn.* 123. t. 30. Urogallus s. Tetrao major.

Raj. av. 53. n. 1. Urogallas s. Tetrao major.

*Nieremb. natur.* 135. Tetrao.

*Alb. orn.* 2. p. 28. t. 29. 30. Moscovian.

*Suecis* Kjäder.

Habitat in sylvis cæspitosis paludum, inter arbores acerosas Abietis & Pini.

DESCR. MAS. cinereus lineolis minimis fuscis confertis: alæ ejusmodi lineolis ferrugineis. Pedes antice viridi nitens, alias nigro alboque varium. Rectrices 18, quarum laterales sensim breviores, omnes nigrae, in medio albo maculatae. Remiges nigrae: 2-6 margine exteriore albae. Alæ subtus albae, quæ alboculo ad alas prominet, maculam albam cauifans.

201. TETRAO *hybridus* cauda bifurca, subtus albo punctata.

Act.

*Act. Stockb.* 1744. p. 181. Rackelhane rutenscholdii.

*Suecic* Racklehane. *Roslagi* Roslare.

Habitat in sylvis *Roslagi* & *Smolandiae*.

OBS. Ipse hanc vidi. Species hybrida a praecedenti & sequenti specie. Magnitudo feminæ præcedentis; colli color & caudæ structura ut in præcedenti. Præcedenti longe rarer, timidior & lingua s. sono diversus.

202. TETRAO *Tetrix* pedibus hirsutis, cauda bifurca, remigibus secundariis basin versus albis. *Fn.* 168.

*Gesn.* av. 494. *Urogallus minor*.

496. *Grygallus minor*.

*Aldr. orn.* l. 13. c. 7. *Urogallus* f. *Tetrao minor*.

*Grygallus minor* f. *Tetrix nemeshani*.

*Will. orn.* 124. t. 31. *Tetrao* f. *Urogallus minor*.

*Raj. av.* 53. n. 2. *Tetrao* f. *Urogallus minor*.

*Scheff. lapp.* 350. Orrar.

*Alb. orn.* 1. p. 22. t. 22. *Tetrao* f. *urogallus minor*.

*Suecic* Orre.

Habitat ubique in sylvis, præsertim Norlandiæ; in campis & ericetis vere feminas provocat grato sibilo & murmurè.

OBS. Maris rectrices nigrae, quarum 3 utrinque exteriores extorsum recurvatae, & sic cauda bifurca. Remiges nigricantes, sed secundariae a basi ad medium albæ, ut & apices harum, rectrices inferiores remigium & rectricum albæ, dorsum nigrum,

203. TETRAO *Lagopus* pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris apice albis; intermediis duabus albis. *Fn.* 169.

*Gesn.* av. 577. *Lagopus*.

578. *Lagopus varia*.

*Aldr. orn.* l. 13. c. 21. *Perdix alba* f. *Lagopus*.

*Will. orn.* 121. t. 32. *Lagopus avis*.

127. *Lagopus*.

*Raj. av.* 55. n. 5. *Lagopus avis*.

54. n. 3. *Lagopus altera*.

*Scheff. lapp.* 351. t. 352. *Lagopus*.

*Suecic* Snöripa. *Lappis Cheruna*.

Habitat in sylvis Norlandiæ, præsertim *Lapponiæ*, vicitans imprimis *Betula nana*, urinatur in nive, terrefacta cachinnos edit ut bajulus.

OBS. Variat magnitudine: in alpibus longe minor, variat colore: hyeme alba, æstate flavescent; Rectrices duodecim nigrae apicæ albæ; sed due, adhuc intermediis incumbentes, albæ totæ sunt, remiges albæ.

204. TETRAO *Bonasia* pedibus hirsutis, rectricibus cinereis punctis nigris fascia lata nigra; exceptis intermediis duabus.

E 5

*Gesn.*

*Gesn. av. 229.* Gallina corylorum s. Bonasia alberti.

*Aldr. orn. l. 13. c. 11.* Gallina corylorum.

*Will. orn. 126. t. 21.* Gallina corylorum.

*Raj. av. 55. n. 6.* Gallina corylorum.

*Suecic* Hiärpe.

Habitat inter Betulas præcipue, cujus amentis vicitat.

*MAS.* *Caput & collum* cinereum lineolis transversis fuscis. *gula nigra;* sub oculis versus aures a rostro alba macula oblonga. *alæ extra ferrugineæ* maculis nigris. *dorsum* cinereum punctis nigris. *abdomen* album maculis magnis cordatis fusco-ferrugineis. *Rectrices* duodecim cinereæ nigro punctatae; scilicet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versus apicem lata fascia nigra, apice albæ; at 8, 9, absque macula & fascia.

*FÆMINA.* *Tergum* canum maculis longitudinalibus nigris, reliquum anterius dorfi a capite cinereum, lineis transversis fuscis. *Alæ supra* versus basin ferrugineo & nigro maculatae. *Remiges primores* cinereæ 10, quarum 1-7 margine anteriore griseæ, reliqua non. *Remiges secundariae* 10, cinereæ, a latere anteriore dilitis ferrugineis maculis adspersæ, at remiges 8, 9, 10 immaculatae. *gula nigra,* tempora alblicant. *Rectrices* 16 cinereo & nigro maculatae transversim: versus apicem has omnes fascia nigra ambit, exceptis duabus intermediis. *Gula* in femina non nigra est.

205. TETRAO *Perdix* pedibus nudis, macula nuda coccinea posne oculos, cauda ferruginea, sterno brunneo. *Fn. 172.*

*Aldr. orn. l. 13. c. 19.* *Perdix minor* cinerea.

*Jonst. av. 68. t. 27. f. 1. bona.* *Perdix cinerea.*

*Will. orn. 119. t. 29.* *Perdix cinerea.*

*Raj. av. 57. n. 2.* *Perdix cinerea.*

*Alb. orn. l. p. 25. t. 27.* *Perdix.*

*Suecic* Rapphöna.

Habitat in cultis.

*DESCR.* *Caput superius* griseum, punctis oblongis albidis adspersum. *nares* squama testæ, macula pone oculum coccinea papillosa. *palpebra inferior* albida. *Pectus* cinereum lineis tenuissimis undulatum. *dorsum* griseum maculis linearibus undulatis bruneis. *Abdomen & Femora* albida. *alarum* testrices griseæ maculis fusco-brunneis rachi alba. *Remiges* 22. *cinereo-nigræ,* fasciis pallidis. *Macula magna* brunea ad sternum. *Venter* albus. *Rectrices* 16 ferrugineaæ. *Tibiae* flavæ. *Gula,* regio superciliorum & frontis rufa. *Mas* macula nigra in sterno a Fæminæ differt.

206. TETRAO *Coturnix* pedibus nudis, corpore griseo maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea. *Fn. 173.*

*Gesn. av. 353.* *Coturnix.*

*Aldr. orn. l. 13. c. 22.* *Coturnix latinorum.*

*Jonst. orn. 69. t. 28.* *Coturnix.*

*Raj. av. 58. n. 6.* *Coturnix.*

*Alb. orn. l. p. 28. t. 30.* *Coturnix.*

*Suecic* Wachtel.

Habitat

Habitat in arvis.

*DESCR.* Palpebræ rubræ, pedes pallide flavi, totum corpus tegitur pen-  
nis rachi flava linea notatis, iisque apice testaceis punctis nigris. Linea  
pallida longitudinalis supra oculos, pectus & collum pallide testacea ma-  
culis obtusis in singula penna utrinque solitaris, abdomen albidum. Remi-  
ges exteriores fuscae, interiores magis pallidæ a latere exteriore maculis  
dilute testaceis. Rectrices fuscae, rachi alba, adspersæ punctis testaceis  
transversis. Area lata longa nigricans sub mandibula inferiore.

## VI. PASSERES.

### Columba.

207. COLUMBA oenas cærulescens, collo supra viridi-nitente,  
fascia alarum apiceque cauda nigricante. *Fn.* 174.

*Aldr. orn. l. 15. c. 7.* Oenas f. Vinago.

*Vill. orn. 136. t. 35.* Oenæs f. Vinago.

*Raj. av. 62. n. 10.* Oenæs f. Vinago.

*Alb. orn. 3. p. 39. t. 46.* Columba vulgaris.

*Suecæ Skogsdufwa.*

$\beta$  *Will. orn. 130. t. 32.* Columba domestica f. vulgaris.

*Raj. av. 51. n. 1.* Columba domestica.

*Suecæ Dufwa, Hemdufwa*

$\gamma$  *Will. orn. 121. t. 34.* Columba gutturosa.

*Raj. av. 60. n. 2.* Columba gutturosa

*Suecæ Kroppdufva.*

$\delta$  *Will. orn. 132.* Columba Turbita dicta.

*Raj. av. 60. n. 7.* Turbitæ.

$\varepsilon$  *Will. orn. 133. t. 34.* Columba barbarica f. numidica.

*Raj. av. 60. n. 8.* Barbaricæ seu Numidicæ.

$\zeta$  *Raj. av. 60. n. 6.* Columba cucullata f. Jacobea.

*Gesn. av. 279.* Columba anglica vel russica.

$\eta$  *Raj. av. 60.* Columba percussor.

Habitat in sylvis agros frequentans; at varietates exoticæ cul-  
tæ & domesticæ sunt; nec dubito quin omnes,  $\beta$ .  $\gamma$ .  $\varepsilon$ .  $\zeta$ .  $\eta$ . ex hac ortæ sint.

*DESCR.* Oenæs sylvestris: Corpus cinereum. Collum supra cæruleo-nitens,  
subtus purpureo-cens. Alarum fascia obsoleta nigricans. Cauda rotunda-  
ta: Rectrices cinereæ, a medio apicem versus nigricantes.

208. COLUMBA Palumbus rectricibus postice atris, remigibus  
prioribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo.

Columba collo utrinque albo, pone macula fulca. *Fn.* 175.

*Aldr. orn. l. 15. c. 5.* Palumbus major torquatus.

*Will.*

*Will. orn.* 135. *t.* 35. *Palumbus torquatus.*

*Raj. av.* 62. *n.* 2. *Palumbus torquatus.*

*Alb. orn.* 2. *p.* 42. *t.* 46. *Oenas.*

*Suecic* *Ringdufwā.* *Olandis Siutūt.*

Habitat ubique in sylvis.

DESCR. *Caput* *cinereo-ceruleo*; *Collis* *latera a tergo* *nitida.* *Pectus & Abdomen* *rufo-livida.* *Dorsum & Alæ* *cinereo-fuscae;* *inacula* *alarum* *transversa* *alba.* *Remiges* *nigræ:* *primores* *margine exteriore* *albidæ.* *Rectrices* *aequales*, *extrorsum* *atrae*, *versus* *basin* *fusca*, *in medio* *pallidiores.* *Pedes & Rostrum* *rubra.* *Lingua* *carnosa*, *integra.*

### Alauda.

209. *ALAUDA arvensis* rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis. *Fn.* 190.

*Gesn.* *av.* 73. *Alauda sine crista.*

*Adr. orn.* 1. 18. c. 12. *Alauda non cristata.*

*Will. orn.* 149. *t.* 40. *Alauda vulgaris.*

*Raj. av.* 69. *n.* 1. *Alauda vulgaris.*

*Alb. orn.* 1. *p.* 39. *t.* 46. *Alauda vulgaris.*

*Suecic* *Lárka.*

Habitat in arvis continuo volatu:

*Ecce suum tirile tirile. suum tirile tractat.*

DESCR. *Rostrum* *convexum*, *tenue*: *maxilla* *subæquales* *non emarginatae.* *Lingua* *lagittata*, *obclusa*, *apie membranacea*, *acute bifida.* *Unguis* *posticus* *digitum intermedium* *longitudine superat*, *rectus*; *laterales unguis* *inflexi*; *intermedius* *satis magnus est.* *Cauda* *bifurca.* *Rectrices* 12, *Remiges* 18, *quarum* 4 *anteriores* *subæquales.* *Corpus* *totum* *fusco-testaceum* *pennis fulcis* *margine extimo* *testaceo-pallido.* *Abdomen* *albicans.* *Remiges* *fusca*: *Rectrices* *nigræ*, *at extima* (1) *alba* *margine* *interiore* *fusca*; *proxima* (2) *fusca* *margine* *exteriore* *longitudinaliter* *albo.* *Remiges* *primores integræ*, *secundariæ emarginatae* *apicibus obsolete albicanibus.* *Rectrices* *uti remiges fusca*, *sed* *duas utrinque* *longitudinaliter* *albæ.*

210. *ALAUDA pratensis* rectricibus duabus extimis introrsum albis, lineola superciliorum alba. *Fn.* 191.

*Aldr. orn.* 1. 18. c. 15. *Alunda pratorum bellonii.*

*Will. orn.* 150. *Alauda pratorum aldr.*

*Raj. av.* 69. *n.* 3 *Alauda pratorum.*

Habitat in pratis; arboribus etiam insidet.

DESCR. *Corpus* *iupra*, *ut & caput, dorsum, teætrices* *alarum*, *pectus* *scopacina* f. *griseo fusco maculata.* *Venter* *albicans.* *Lineola* *alba* *supra oculos.* *Remiges* *fusca.* *Pedes & rostrum* *pallida.* *Unguis* *posticus* *longus.* *Rectrices* *aequales*, *nigricantes*, *exceptis* *duabus* *utrinque* (1, 2) *extimis* *margine* *interiore* *longitudinaliter* *albis.*

211. ALAUDA *arborea* capite vitta alba annulari cincto.

*Alauda* rectricibus fuscis, prima oblique dimidiato alba, secunda macula cuneiformi alba. Fn. 192.

Will. orn. 149. *Alauda arborea*.

Raj. av. 69. n. 2. *Alauda arborea*.

Habitat in arboribus, volitat gregatim cantando.

DESCR. *Rostrum* supra nigrum. Tota avis supra grisea fusco-maculata. *Remiges & Rectrices* fuscæ. *Collum* subtus flavescens maculis fuscis. *Collum* fere annulo albo cinctum. *Abdomen* albicans. *Rectrices* fuscæ, breves, sed 1, 1 dimidiato albantes, at oblique, & apex tormis albus, quæ albedo angustior verius marginem exteriorem; *rectrix* 2, 3, 4, apice alba macula cuneiformi, calcar longior digito.

212. ALAUDA *campestris* rectricibus fuscis inferioti medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.

*Alauda* gula pectoreque flavescente. Fn. 193.

Will. orn. 150. *Alauda minor campestris*.

Raj. av. 70. n. 6. *Alauda minor campestris*

Habitat in Campis.

DESCR. *Magnitudo & facies Passeris Ligurini* dicti. *Corpus* supra, caput, dorsum grisea, maculis nigris s, fuscis, more scolopacum. *Gula* pectoreque flavescunt. Linea flavescens supra oculos versus occiput a rostro ducta. *Abdomen* albicans. *Rectrices* alarum nigro-fuscæ albo maculatae. *Remiges* fuscæ. *Rectrices* æquales, fuscæ; a basi ad medium omnes albae; exceptis duabus intermediis. *Unguis posticus* intermedio paulo longior; *Rostrum* & *pedes* nigrae.

## Sturnus.

213. STURNUS *vulgaris* rostro flavescente; corpore nigro punctis albis. Fn. 183.

Gesn. av. 747. *Sturnus*.

Aldr. orn. l. 16. c. 19. *Sturnus*.

Bell. ic. 81. a. *Sturnus*.

Jonst. orn. t. 40. *Sturnus*. (mas)

*Sturnus vulgaris*. (fæmina)

Merr. pin. 177. *Sturnus cinereus*. (mas)

*Sturnus vulgaris*. (fæmina)

Will. orn. 144. t. 37. *Sturnus*.

Raj. av. 67. n. 1. *Sturnus*.

Alb. orn. i. p. 38. t. 40. *Sturnus*.

Suecic Stare.

Habitat in cavis arborum, ubi nidificat. Volitat gregatim; discedit post medianam æstatem in Scaniam campestrem; Vicitat lumbricis & larvis, hortis utilis. It. scan. 63.

DESCR.

**DESCR.** *Rostrum rectum, angulato-depressum, obtusiusculum, flavescens; mandibulæ æquales. Corpus nigrum, pennarum apicibus exalbidis. Testrices inferiores caudæ nigrae, margine albo. Nares squamula semi-tectæ. Pedum unguis posticus major. Remiges nigricantes, margine exteriore obsolete testaceo. Cauda integra. Rectrices nigrae marginæ exteriore subgriseo. Lingua bifida. Videtur affinis Picarum ordini.*

**214. STURNUS Cinctus niger, pectore albo.**

*Motacilla pectore albo, corpore nigro.* Fn. 216.

*Gesn. av. 609. Merula aquatica s. Miliaria.*

*Jonst. orn. t. 53. Merula aquatica.*

*Will. orn. 104. t. 24. Merula aquatica.*

*Raj. av. 66. n. 7. Merula aquatica.*

*Alb. orn. 2. p. 36. t. 39. Merula aquatica.*

*Soc. nat. Lips. 1747. p. 444. t. 8. f. 3. Turdus musicus pavulstris dumetorum arundinaceus.*

*Suecic Watsoniae.*

Habitat aquæ nos per integrum annum, hyeme ad voragine fluviorum & cataractas degens, usq; nuenta descendit, insectis vicitans, adscenditque dexteritate summa, licet nisipes.

**DESCR.** *Corpus nigrum: Caput & collum picea; reliquum corpus nigrum: a tergo pallido undulatum, singula enim penna infra apicem nigrum exalbida est, a rostro ad sternum avis nivea. Remiges nigrae, apice vix manifeste albæ. Rectrices æquales, breves. Tibiae antice albidae. Rostrum nigrum: Cauda bifurca: Nares nudæ; squamula testæ.*

## Turdus.

**215. TURDUS pilaris rectricibus nigris: extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.** Fn. 188 It. goth. 258.

*Gesn. av. 753. Turdus pilaris.*

*Aldr. orn. l. 16. c. 1. Turdus pilaris.*

*Will. orn. 138. t. 37. Turdus pilaris.*

*Raj. av. 64. n. 31. Turdus pilaris.*

*Alb. orn. 1. p. 34. t. 36. Turdus pilaris.*

*Charl. onom. 83. Turdus trichas.*

*Merr. pin. 76. Trichas.*

*Suecic Kramsfogel. Uplandis Snöskata.*

Habitat in sylvis, maximis in arboribus nidificat, edit baccas juniperi; alebatur Holmiæ ab cenopola, bibebat e vitro vinum cum hospitibus, capite calvæcebat; at, dein per annum caveis inclusa, nec vino pota, plumas in capite recuperabat.

**DESCR.**

*DESCR.* *Magnitudo Turdi primi.* *Caput superne ut & regio uropygii cana.* *Dorsum & testrices alarum fusco-ferruginea.* *Remiges & rectrices fuscæ.* *Pectus & gula ad sternum subferrugineum maculis nigris adspersum,* *quarum gulae propiores oblongæ minores,* *sterno vero propiores latiores.* *Venter albū,* *maculis fuscis paucis.* *Rostrum flavum,* *modice convexum:* *mandibula superior vix inferiori longior,* *apice nigro utrinque emarginato:* *maxilla inferior maxima parte flava.* *Nares ovatae.* *Palpebrae nudæ.* *Lingua cartilaginea,* *sagittata,* *bifida.* *Macula nigricans inter oculos & rostrum.* *Cauda bifurca,* *alarum testrices subrūs albæ.* *Remiges nigricantes margine exteriore subcinereo.* *Rectrices nigrae,* *extimo laterali margine interiore apicem versus albicante.* *Pedes nigricantes.*

216. *TURDUS viscivorus* alis subtus flavescentibus, rectricibus tribus lateralibus apice albis.

*Turdus viscivorus major.* *Will. orn. 137.* *Raj. av. 64.*

*Suecij Biöök-Traßt.*

*Habitat in Betuletis.*

*DESCR.* *Tota supra grisea,* *subtus flavo ferruginea maculis rotundis fusciis,* *Rostrum nigrum basi flavescentis.* *Testrices albæ:* *superiores apice albicantes.* *Remiges fuscæ basi angustiore alba.* *Rectrices fuscæ, 1, 2, 3,* *utrinque apice albo.* *Pedes flavi.*

217. *TURDUS musicus* remigibus basi interiore ferrugineis.

*Turdus simpliciter dictus viscivorus minor.*

*Will. orn. 138. t. 37.* *Raj. av. 64.*

*Habitat in sylvis.*

218. *TURDUS iliacus* alis subtus ferrugineis, superciliis albican-tidus. *Fn. 189.*

*Turdus iliacus.* *Will. av. 139.* *Raj. av. 64.* *Alb. av. 1. t. 35.*

*Turdus minimus.* *Frisch av. t. 28.*

*Smolandis Klera.* *Ostrogothis Kládra.* *Westmannis Tall-Traßt.*

*Habitat in sylvis acerosis,* *e quarum summo cacumine tempore veris egregie cantillat;* *nidificat in mediis arbusculis s. sepibus.* *Ova 6,* *cæruleo-viridia maculis nigris variis.*

*DESCR.* *Corpus supra totum cinereo-fuscum.* *Linea alba, a rostro supra oculos ducta, recta.* *Pectus pallido-flavescens maculis fusciis.* *Venter albū paucis maculis.* *Cauda obtusa vix forcipata.* *Nares semitecta.* *Lingua apice bifido lacero.* *Rostrum nigrum basi flavescentis.* *Rectrices fuscæ immaculatae unicolores.* *Testrices inferiores caudæ albæ.* *Remiges fuscæ,* *latere interiore versus basin rufescentes.* *Testrices alæ inferiores ferrugineæ.*

219. *TURDUS roseus* subincarnatus, capite aliis caudaque nigris, occipite cristato.

*Alb. orn. l. 16. c. 5.* *Merula rosea.*

*Will. orn. 143.* *Merula rosea.*

*Raj.*

Raj. av. 67. Merula rosea:

Habitat in Alpibus Lapponicis. Adlerheim:

DESCR. Corpus pallide incarnatum: Rostrum albidum: Inferiore basi nigra: Caput & collum nigro subviolacea: occipitis penibus longioribus dependentes in crista: Ala totae nigrae: Cauda nigra uix manifeste bifida: Testiculus caudae inferiores apice albae.

220. TURDUS Merula ater; rostro palpebrisque fulvis: Fn. 184.

Bell. ic. 30. b. Merula nigra.

Gesn. av. 603. Merula.

Aldr. orn. l. 16, c. 6. Merula.

Alb. orn. 35. t. 37. Merula.

Will. orn. 140. t. 37. Merula vulgaris:

Raj. av. 65. n. 1. Merula vulgaris.

Suecis Trast, Kohltrast.

Habitat in sylvis densis; nec non in nemoribus; juniperetis; imo & in hortis neglectis.

DESCR. Rostrum fulvum. Margo palpebrarum fulvus: Pedes nigri-fusci: Color totius ater; sed Remiges 24 fuscae:

221. TURDUS torquatus nigricans; torque albo, rostro flavescente. Fn. 185.

Gesn. av. 607. Merula torquata.

Aldr. orn. l. 16. c. 11. Merula torquata.

Fons. orn. 106. t. 39. Merula torquata:

Will. orn. 143. t. 37. Merula torquata.

Raj. av. 65. n. 2. Merula torquata.

Alb. orn. 1. p. 37. t. 39. Merula torquata.

23 Turdus nigricans, torque fusca, rostro flavescente: Fn. 186.

Will. orn. 144. t. 30. Merula montana.

Raj. av. 65. n. 3. Merula saxatilis.

Habitat in sylvis montanis.

DESCR. Rostrum flavescens apice nigro. Color corporis niger. Annulus albus collum cingit. Remiges 1 2 3 4 5 6 7 8 lineola alba a latere exterior. Abdomen, femora & uropygium teguntur pennis albescente lineola cinctis: Varietatem g. eredem specie non distinetam;

## Loxia.

222 LOXIA Coccothraustes liraea alarum simplici alba, rectricibus basi interiore albis. It. Scæn. 332:

Gesn. av. 276. Coccothraustes

Aldr. orn. l. 16. c. 20. Coccothraustes ornithologi:

Fons. orn. t. 37. Coccothraustes:

Chark

*Charl. onom.* 84. f. 85. *Coccothraustes vulgaris.*

*Will. orn.* 178. t. 44. *Coccothraustes vulgaris gesneri & al-*  
*drovandi.*

*Raj. av.* 85. n. 1. *Coccothraustes vulgaris.*

*Alb. orn.* 1. p. 54. t. 56. *Coccothraustes vulgaris.*

*Suecic* Stenkneck.

Habitat in *Cerasetis* *Scaniae* *campestris* *recentissima* *advena*;  
ubi enucleat cerasa, hortis invisa.

223. LOXIA *Enucleator* linea alarum duplii alba, rectrici-  
bus totis nigricantibus. *Fn.* 176.

*Edw. orn.* 123. t. 123. *Rubicella maxima canadensis.*

*Suecic* Tallbit. Swånsk Papgoja. *Wbotbnis* Natt-waka.

Habitat in *Westrobotnia*, versus hyemem, australiorem sue-  
ciam petens, vietit strobilos Pini sylvestris enucleando.

DESCR. *Dorsum* & *Pectus* rubra aut lutea, pluma nigra nares tegunt,  
*Alæ* nigricantes lineis duabus obliquis albicantibus e tegetibus. *Cauda*  
nigricans;

224. LOXIA *Curvirostra* rostro forficato. *Fn.* 176.

*Gesn. av.* 592. *Loxia.*

*Charl. onom.* 68. t. 68. *opt.* *Loxia f. Curvirostra.*

*Will. orn.* 181. t. 44. *Loxia.*

*Raj. av.* 86. *Loxia.*

*Rudb. lapp.* 75. *Conirosor.*

*Alb. orn.* 1. p. 58. t. 61. *Loxia.*

*Suecic* Korsnåf, Kiägelrifvare.

Habitat in sylvis abietinis, victimans strobilos Abietis, ubi conos  
primo dejicit rostro ab arbore liberatos, quotquot unquam  
valet, dein singulum per se arripit, pedibus tenet uti *Psite-*  
*acus* vel *Sciurus*, rostri forficè per singulas squamas fran-  
gendo semina investigat; & quod singulare, magnitudine  
& colore omnino abietis conum refert & structura ro-  
stri ad semina hujus sola edenda creata videatur; licet &  
semina cannabis & baccas juniperi, sorbi, Nuces coryli  
edere queat. Mira fortitudo parvae avis, utpote quæ ba-  
cillos ligneos crassitie digiti, brevi mora levique negotio  
detruncat. Maxilla superior in hac mobilis est, ut in  
congeneribus.

DESCR. Cinerea sunt *cauda* & *alæ*; nigra remiges & rectrices supra; Fla-  
vula in femina, fulva in mare sunt *pectus*, latera ventris, *lumbi*, albicans  
*venter*, *dorsum* & *caput* e *cinereo* & *sulphureo* (in femina) seu *fulvo*  
(in mare) *nebulosum*. *Rostri* utraque maxilla acuminata, obliqua, crux-  
ciatum exserta. *Lingua* *integra*.

225. LOXIA *Pyrrhula* artubus nigris, tegeticulis caudæ remi-  
giumque posticarum albis. *Fn.* 178.

F

Gesn.

*Gesn. av. 733.* Rubicilla s. Pyrrhula.

*Aldr. orn. 1. 17. c. 31.* Pyrrhula s. Rubicilla.

*Fonst. orn. 122. t. 43* Pyrrhula s. Rubicilla.

*Will. orn. 130. t. 43.* Rubicilla s. Pyrrhula.

*Raj. av. 86. n. 5.* Rubicilla s. Pyrrhula.

*Alb. orn. 1. p. 59.* (mas) 60 (femina) Rubicilla.

*Suecic Domherre.*

Habitat in sylvis, edit avide gemmas arborum erumpentes, facile cicuratur, & egregie edocta cantillat. *Mas accipiens araneam diu tenuit in ore, dein dedit fæminæ.*

*DESCR. MAS Caput nigrum. Rubra tempora; gula; pectus, venter. Cæruleo-cinerea collum, dorsum. Cauda indivisa, nigra, superne cæruleofuscens; regio circa caudam supra & subtus alba. Rostrum nigrum, crassissimum, utrinque gibbum; maxilla utraque mobilis. Lingua integra. Nares patulæ fetis parvis testæ. Alæ nigræ linea transversali albicante. Remiges 16 nigræ, versus marginem interiorem albæ. Rectrices 12 nigræ, immaculatae. Testrices alæ nigricantes, sed 9-16 apice albæ.*

*FÆMINA. Caput ad oculos usque nigrum. Gula nigra. Alæ nigræ subtus albæ, ut & canda; regio pone femora alba. Uropygium album. Dorsum cinereum. Pectus cinerascens, Caudæ basis supra & subtus alba. Rostrum brevissimum, crassissimum, undique convexum. Lingua ovata, carnosa, apice villis lacero, ab oculis per collum & pectus ad femora cinerea. Remiges rectricesque atfæ, remigum posteriorum & caudæ testrices apice albæ.*

226. *LOXIA Chloris* flaviganti-virescens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus quatuor lateralibus basi luteis.  
*Fn. 202.*

*Gesn. av. 259.* Chloris.

*Will. orn. 129. t. 44.* Chloris.

*Raj. av. 85. n. 4.* Chloris.

*Alb. orn. 1. p. 56. t. 58.* Chloris.

*Suecic Swenska.*

Habitat in sepibus; ova sex maculis sanguineis adspersa.

*DESCR. Rostrum conicum. Lingua integra, carnosa. Corpus cinereo-testaceum, subtus magis luteum, at maris aëtate viride, abdomine flavo. Alæ & canda nigra. Remiges primores 7 antice luteæ, magis versus inferiorem pennarum partem, pone & apice omnes albicantes. Rectrices utrinque 1 2 3 a medio basin versus luteæ, apicem versus nigricantes, at 4 5 6 nigricantes margine exteriore flavescente. Mas pectore flavo.*

## Emberiza.

227. *EMBERIZA nivalis* remigibus albis: primoribus extrorum nigris, rectrieibus nigris: lateralibus tribus albis. *Fn.*

*194.*

*Mart. spitzb. 53. t. K. f, B. Avis nivalis.*

*Acad. Stockb.* 1740. p. 363. t. I. f. 9. *Alauda remigibus albis*, primoribus extrorsum nigris; rectricibus nigris, lateralibus tribus albis.

*Act. upf.* 1736. p. II. n. 16. *Passer alpino-Lapponicus s. nivalis.*

*Alb. orn.* 2. p. 50. t. 54. *Pied Chaffinch.*

*Suecic Snösparf.* *Lapponibus* *Alaipg.* *Dalekarlis* *Illwårsfogel.* *Uplandis Hardvårsfogel.*

Habitat in alpibus Lapponicis æstate, descendit ad nos interium hyeme. Caro sapidissima. Cursitat, nec arboribus infidet; vietitat etiam *Avena*

*DESCR.* *Caput*, *pectus*; *collum* *alba* vel *albo-testacea*. *Corpus* *sibius albus* vel *albicans*; *Dorsum* *nigrum*. *Variat* *sexu & anni tempore* ex *albo* in *testaceum* *colorēm*, at *nigredo* *constans* *est*. *Alae* *complicatae* *albae* *a* *albitis* *versus* *terram* *nigræ*, nec non *macula nigra* *ad* *flexuram*.

*Remiges* 1-8 *versus* *basin* *albae*, *versus* *apicem* *nigræ*, *quo* *magis introrūsum*, *eo* *minus* *nigræ*.

9-15 *totaliter* *albae*; 16 *tota nigra* *apice* *alba* *vel* *testacea*.

*Radices* 1 2 3 10 11 12 *albae*, *inacula linearis nigra* *versus* *apicem rachis*.  
4 9 *longitudinaliter latere exteriori* *albae*, *inferiori* *nigræ*.

5 6 7 8 *nigræ*.

*OBS.* *Rostro* *cum* *Emberiza* *cōvenit*; *pollicis* *ungue longiore* & *quod per terram cūsītāt ad Alaudas propius accedit*.

¶ *Alb. orn.* 3. p. 67. t. 71. *Fringilla montana.*

*Gesn. av.* 709. *Avis ignota a Piperino missa.*

*Aldr. orn.* 1. 8. c. 357 t. 15. f. 1 *Fringilla albicans.*

*Will. orn.* 187. t. 77. *Montifringilla calcaribus alaudæ s. major.*

*Raj. av.* 88. *Montifringilla calcaribus alaudæ s. major.*

*Scanicus Siolarka.*

Habitat in campestribus Scaniæ littoribus.

*OBS.* *Præcedenti simillima* *est*, *sed minor & magis testacei coloris*, *uti præcedens æstare*. *Locu* *dein* *dissert*; *hinc propono* *aliis eandem ulti* *terius* *examinandam*, *forte præcedentis* *sola varietas*. *Hanc eandem cum præcedenti speciem esse statuit J. Leche.*

## 228. EMBERIZA *Calandra grisea nigro maculata.* Fn. 206:

*Gesn. av.* *Emberiza alba.*

*Aldr. orn.* *Alaudæ congener.*

*Raj. av.* 93. n. 1. *Emberiza alba.*

*Will. orn.* 195. t. 40. *Emberiza alba.*

*Alb. orn.* 2. p. 46. t. 50. *Emberiza alba.*

*Suecic Kornlärcka.*

Habitat in agris & cultis Scaniæ. *D. Leche.*

*DESCR.* *Rostrum* *præcedentis*, *ted majus*. *Dorsum ferrugineum nigro* *maculatum*; *maculis acutis*. *Remiges* *nigricantes* *margine exteriore* *albescente*. *Rectrices* *nigro-fusca* *margine* *albescente*. *Collum & pectus* *albescentia* *maculis linearibus* *nigris*.

229. EMBERIZA *Hortulana* remigibus nigris: primis tribus margine albidis, rectricibus nigris: lateralibus duabus extorsum albis. *Fn.* 208.

*Gesn.* av. 567. *Hortulana*.

*Jonst. orn.* t. 37. *Hortulanus*.

*Will. orn.* 197. t. 40. *Hortulanus*.

*Raj. av.* 94. n. 6. *Hortulanus*.

Habitat in Suecia, transmigrans mense martio.

DESCR. *Corpus* ex nigro & testaceo variegatum; annulus pallidus oculos ambit. *Collum* virescens. *Venter* testaceus. *Gula* flava. *Pectus* pallidum. *Remiges* 16 nigræ: tribus primis margine albidis. *Rectrices* 12 nigræ: duabus utrinque extorsum albis.

230. EMBERIZA *Citrinella* rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiore macula alba acuminata. *Fn.* 205.

*Bellon. av.* *Hortulanus*.

*Aldr. orn.* Luteæ alterum genus.

*Turn. hist.* *Chloris* f. *Lutea aristotelis*.

*Gesn. av.* 653. *Emberiza flava*.

*Merr. pin.* 176. *Citrinella*.

*Will. orn.* 196. t. 40. *Emberiza flava*.

*Raj. av.* 93. n. 2. *Emberiza flava*.

*Alb. orn.* I. p. 63. t. 66. *Emberiza flava*.

*Suecic Gröning.* *Smolandis* *Golspinck*.

Habitat ubique apud nos, nidificat in pratis humi. Larvas Brassicæ aufert.

DESCR. *Corpus* griseo-flavum. *Caput* flavum. *Rectrices* nigricantes, quamvis duas laterales utrinque apicibus introrsum albis. *Uropygium* ferrugineum. *Corpus* subtus flavum. *Maxilla* superior nigra, inferior pallida. *Pili vagi* in occipite maris. *Remiges* primores margine exteriore uix flavescentes. *Rectrices* nigricantes: 1, 1 margine exteriore longitudinaliter albidæ; 2, 2 macula alba magna cuneiformi a latere inferiore apicis.

231. EMBERIZA *Schoeniclos* capite nigro, corpore griseo nigroque, rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

*Fringilla* capite nigro, maxillis rufis, torque albo, corpore rufo-nigricante. *Fn.* 211.

*Gesn. av.* 652. *Passer aquaticus* f. *Schoeniclos*.

*Raj. av.* 93. *Passer torquatus* in arundinetis nidificans.

*Suecic Säf-Sparf*.

Habitat in Arundinetis rario.

DESCR. *Rostrum* nigrum. *Caput* & *Gula* nigra. *Colli* latera albida. *Corpus* supra griseo nigroque varium. *Abdomen* album. *Remiges* sulcæ margine exteriore ferrugineo. *Rectrices* nigræ: 1, 1 latere exteriore toto & interiore dimidio albæ; 2, 2 macula alba cuneata in apice lateris inferioris, margine etiam exteriore albo. *Uropygium* griseum.

## Fringilla.

232. FRINGILLA *cœlebs* artubus nigris, remigibus utrinque albis: tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis. Fn. 199.

Gesn. av. 387. Fringilla.

Aldr. orn. l. 13. c. 6. Fringilla.

Will. orn. 186. t. 45. f. 4. Fringilla.

Raj. av. 88. Fringilla.

Alb. orn. 1. p. 60. t. 63. Fringilla.

β Fringilla *sylvatica* artubus remigibus rectricibusque nigris: duabus utrinque extimis a medio extorsum albis. Fn. 200.

Suecis Fincke, Bosinck.

Habitat ubique per Sueciam, nidificans in arbusculis. Fæmina migrat per hyemes, mas permanet. J. Leche.

DESCR. maculis purpureis a sequenti differt hæc species.

MAS pectore rubicundo a fæmita differt.

*Rostrum* plumbeum. *Caput* canum, a tergo pili nonnulli pennis longiores; *dorsum* posterior pars cinereo-viridis, anterior vero grisea; at *regio oculorum*, *gula*, *pectus*, latera ferruginea sunt. *Collum* eadem rubedine cingitur. *Alæ* nigrae macula triplici alba: alia scilicet ad flexuram alæ, alia in medio rectricum, tertia sub hac in remigibus minima.

*Rectrices* alarum nigrae apicibus albis; sunt etiam ad basin albae.

*Remiges* omnes nigricantes, latere interiore, præsertim versus basin, albæ; omnes, tribus primis exceptis, versus basin in latere exteriore alba macula notatae; secundariae remiges etiam margine exteriore linea alba aut flavescente supra medium exaratæ.

*Rectrices* fere æquales nigrae; harum exteriores à macula obliqua alba in penna extima majore: par intermedium rectricum cinereum est.

FEMINA, ni fallor, est sequens: *Rostrum* plumbeum. *Corpus* totum supra cinereo-virescens, subtus albicans. *Remiges* nigricantes; omnes (exceptis tribus primis) basi utrinque albæ & margine interiore albescentes. *Cauda* fuscipata. *Rectrices* nigricantes, intermedio pari virescente, sed extimis 1 2 versus apicem macula obliqua cuneiformi alba, quarum exterior major.

233. FRINGILLA *Montifringilla* alarum basi subtus flavissima.

Fn. 198.

Rudb. pict. Carduelis angermannica.

Jonst. orn. 99. t. 38. Montifringilla mas.

Will. orn. 187. t. 45. f. 5. Fringilla montana s. Montifringilla.

Raj. av. 88. Fringilla montana.

Alb. orn. 3. p. 60. t. 64. Montifringilla.

Suecis Norrquint.

Habitat in sylvis acerosis, præsertim Norlandiæ.

DESCR. MAS supra niger marginibus pennarum obsoleta ferrugineis. *Abdomen* album. *Pectus* fulvo-ferrugineum seu aurantium, ut & alarum basis extus, alarum basis vero subtus saturatissime flava est. Sub ano obsolete

solete ferruginea. *Remiges* nigrae margine exteriore albido; 4 & inferiores, versus basin, exteriore latere, dimidiato albae. *Rectrices* nigrae, sed 1, 1 marginē exteriore, præsertim basin versus, albae. *Digitus* pollicis intermedio vix longior.

*FÆMINA* fusca, ubi ille canus, illa cinerea, ubi ille rufus, sub ala basi etiam illa late flavicatet illa pone anum obsolete ferruginea. *Rectrices* & *Remiges* uti in mare.

234. FRINGILLA *lulensis* fusca, pectorē humerisque rufis, *nigris* macula rufa.

*Rudb. piæt. Carduelis Lulensis.*

Habitat Lulæ in W-strobothnia.

DESCR. *Corpus* cinereo-nigrum, ut & *dorsum* & *canda*; *mentum* macula alba. *Vener* albicans. *Pectus* rufum. *Alarium* basi rufa, quam macula nigra transversa, deinceps rufa, tum iterum nigra, denum alba excipit. *Remiges* nigrescunt. *Rostrum* fuscum.

235. FRINGILLA *lapponica* capite nigricante maculato, macula supra oculos alba. Fn. 196.

*Alb. orn. 3. p. 59. t. 63*

*Rudb. piæt. Carduelis Lapponica.*

Habitat Tornææ.

DESCR. *Rostrum* luteum apice nigro. *Caput* nigrum, linea alba, supra oculos orta, descendit incurvata ad collum; *collum* tergo ferrugineum. *Dorsum*, *Alæ*, *Canda* fusca litoris ferrugineis. *Pectus* albidum macula longitudinali nigra. *Cauda* bifida. *Rectrices* nigrae; 1, 1 oblique dimidiato albae apice macula cuneiformi nigra, 2, 2 macula cuneiformi alba. *Remiges* fuscae marginē exteriore pallido.

236. FRINGILLA *Carduelis* remigibus antrofsum luteis: extima immaculata; rectricibus duabus extimus toto reliquisque apice albis. Fn. 195.

*Gesn. av. 242 Carduelis.*

*Aldr. orn. 1. 18. c. 3. Carduelis*

*Zonst. orn. 97. t. 37. Carduelis.*

*Will. orn. 189. t. 46. Carduelis.*

*Raj. av. 89. n. 1. Carduelis.*

*Merian. europ. t. 173. Carduelis.*

*Aldr. orn. 1. p. 61. t. 64. Carduelis.*

*Suecis Stiglitzæ.*

Habitat in Juniperetis.

DESCR. *Rostrum* albicans apice nigro. *Caput* juxta rostrum sanguineum, vertex niger; tempora testacea alba. *Alæ* nigrae, apicibus albis, macula magna flava deflexa in medio alæ. *Remiges* nigrae, quarum 1 tota nigra; 2-10 nigrae antrofsum luteæ, 11-13 antrofum albæ. *Rectrices* nigrae, quarum 1, 1 extima medio lateris interioris albo reliqua apice albæ. Tempore autumnali *Remiges* & *Rectrices* apice albent; vere autem nigrae sunt. *Maris scapulae* nigrae, *feminæ* cinerea sunt. *Kram-*

237. FRINGILLA *Spinus* remigibus medio luteis: primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis apice nigris. *Fn.* 203.

*Gesn. av.* 1. *Achantus avicula.*

*Aldr. orn.* 353. t. 14. f. 28. *Spinus s. Ligurinus.*

*Jonst. orn.* t. 37. *Ligurinus spinus.*

*Charl.* 79. *Spinus s. Ligurinus.*

*Will. orn.* 192. t. 46. *Spinus s. Ligurinus.*

*Raj. av.* 91. n. *Spinus s. Ligurinus.*

*Alb. orn.* 3. p. 71 t. 76. *Ligurius.*

*Suecic Siska*, *Gröniska*.

Habitat in Juniperetis. Nidus rarissime reperitur. *Kram.*

DESCR. *Corpus* supra cinereo luteum, ita ut omnis penna interius cinerea, exterius lutea macula nigricante. *Corpus* subtus cinereo-album macula in singula penna nigricante. *Gula* albo flavicat. *Remiges* nigrae circa basin anterius flavæ, posterius albidae; hinc lutea macula in ala, at priuæ pennæ quatuor totæ nigrae. *Rectrices* luteæ apicibus nigris, sed singulæ utrinque extimæ & duæ intermediæ totæ nigrae.

238. FRINGILLA *flammea* fusca, crista flammea. *Rudb. pict.*  
Habitat in Norlandia.

239. FRINGILLA *flavirostris* fusca, rostro flavicante *Rudb.*  
*pict.* \*

*Suecic Riska.*

DESCR. *Corpus* cinereo-nigrum, anterius tamen dilutius fuscum. *Pedes* atri. *Alæ* nigrae, *Cauda* bifurca.

240. FRINGILLA *Cannabina* remigibus primoribus rectricibusque nigris utroque margine albis. *Fn.* 209.

*Will. orn.* 191. t. 46. *Linaria rubra major.*

*Raj. av.* 90. n. 2. *Linaria rubra major.*

*Alb. orn.* 3. p. 68. t. 72. 73. *Linaria rubra major.*

*Suecic Hämpling.*

Habitat in sylvarum nemoribus.

DESCR. *Caput* cinereum. *Dorsum* griseum. *Corpus* subtus pallidum. *Pennis* & *vertex* sanguinolenta. *Remiges* nigrae: primores 1-9 in margine utroque albæ; secundariae vero anteriore margine fuscæ apice albidae. *Cauda* bifurca. *Femina* caret macula sanguinea verticis & capitis. *Rectrices* nigrae utroque margine albæ, exceptis 6, 6 margine fuscis. *Lingua* integra, acuta. *Mares* scapulis magis rufescunt, *Feminae* magis scapulis cinerascentes sunt.

241. FRINGILLA *Linaria* remigibus rectricibusque fuscis margine obsolete pallido, litura alarum albida. *Fn.* 210.

*Gesn. av.* 591. *Linaria rubra.*

*Aldr. orn.* t. 18. c. 9. *Linaria rubra.*

*Will. orn.* 191. *Linaria rubra minor.*

*Raj. av.* 91. n. 3. *Linaria rubra minor.*

*Charl. onom.* 80. *Linaria rubra.*

*Alb. orn.* 3. p. 70. t. 75. *Linaria rubra minor.*

*Suecic* Gräfiska.

Habitat in Alnetis.

DESCR. *MAS* pectore & vertice sanguineo a *Fæmina* differt. *Corpus* fuscum alboque obsoleto cinereum. *Frons* coccinea nitens. *Rectrices* fuscæ margin'e obsoleta pallido. *Remiges* fuscæ exteriori margin'e obsolete pallido. *Tegentes* lituram transversalem alarum albicanter efficiunt.

242. *FRINGILLA domestica* remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria.

*Fringilla* remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra, temporibus ferrugineis. *Fn.* 242.

*Gesn. av.* 643. *Passer.*

*Will. orn.* 182. t. 44. *Passer domesticus.*

*Raj. av.* 86. *Passer domesticus.* Struthos.

*Alb. orn.* 1. p. 59. t. 92. *Passer domesticus.*

*Suecic* Tätting, Gräsparf. Smolandis Hamp-Spink.

Habitat in hortis & juxta domos.

DESCR. *Dorsum* testaceo-fordidum. *Caput* supra canum. *Gula nigra.* venter albicans. *Remiges* fulcae. *Cauda* bifurca. *Mas* ad aures brunneus. *Rectrices* fuscæ immaculatae.

*Fæmina* caput cinereum. *Gula* pallide cinerea. *Macula* albida pone oculos. *Humeri* soli grisei.

243. *FRINGILLA montana* remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina.

*Aldr. orn.* l. 15. c. 15 *Passer montanus.*

*Raj. av.* 87. *Passer montanus.*

Habitat in sylvis & Lapponia.

DESCR. *Caput* spadiceum. *Dorsum* griseo nigroque varium. *Uropygium* spadiceum. *Gula nigra.* *Pectus* & *abdomen* albicanter. *Remiges* fuscæ, margin'e exteriore lutescentes. *Rectrices* caudæ integræ fuscæ. *Teñtrices* alarum dupli ordine remigibus concolores, apicibus maxima ex parte albidis. *Pedes* pallidi. Differt a præcedente uropygio virescente, nec testaceo; macula nigra ad aures, nec alba retro oculum.

## Motacilla.

244. *MOTACILLA Luscinia rufo-cinerea*, genuum annulis cincereis. *Fn.* 221.

*Gesn. av.* 592. *Luscinia.*

*Aldr. orn.* l. 18. c. 2. *Luscinia.*

*Zonst. orn.* t. 45. *Luscinia.*

*Will. orn.* 161. t. 41. *Luscinia* f. *Philomela.*

*Raj. av.* 78. n. 2. *Luscinia* f. *Philomela.*

*Alb.*

*Alb. orn. 3. p. 49. t. 53.* Luscinia,  
Suecic Nacktergahl.

Habitat in nemoribus Olandie, 59, 67, Gotlandie, Scanie, 93, Swartsjölandet, Fullerön, Upsaliæ, Sigtunæ & alibi. Tanta vox? tam parvo in corpore? tantus spiritus? Spiritu prius deficiente quam cantu. Plin. vespertina maxime modulans suavissimaque avis. Modus capiendi. It. scan. 389.

DESCR. Color supra testaceo-fuscus, qui color magis rufescit in alis, adhuc magis in cauda. Gula, pectus, abdomen cinerea. Cauda subtus albicans. Femora alba; genua quasi annulis cinereis cincta.

OBS. LUSCINIA MINOR. Aldr. orn. 754. Jonst. orn. t. 45. inter Suecicas aves a Rudbeckio delineatas reperitur, quam nondum observavi.

245. MOTACILLA modularis supra griseo fusca, rectricibus alarum apice albis, pectore cæruleo-cinereo. Fn. 223.

Frisch. av. l. 21. f. 3. Curruga canu lusciniae.

Suecic Järnsparf.

Habitat in arundinetis, præsertim Septembri obvius; in caveis egregie cantillat tempore vernali & currit admodum agilis, viicitans seminibus canabinis.

DESCR. Caput & Dorsum maculis nigricantibus acutis adspersa; quarum maculae minores & confertiores in capite & collo, quam dorso, oculi purpurascentes, in gula & pectore supra oculos & aures color cæruleo-cinereus. Remiges fuscæ, latere exteriore ferrugineæ: in secundariis macula oblonga albicans ad lateris exterioris apicem. Rectrices fuscæ margine testaceo. uropygium testaceo-cineréum. Color sub cauda albus maculis acutis fuscis.

246. MOTACILLA Schœnobænus testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite maculato. Fn. 222.

Schœnobænus. D. Leche.

Habitat inter Scirpos Scaniæ.

DESCR. Magnitudo Reguli. Iris nigro-fusca. Pedes subfuscæ, digitus interior intermedio adnexus. Tibiae 17 incisuris. Color dorfi, Capitis, uropygii testaceo-fuscus, sed maculatus in dorso & præsertim capite. Gula, Abdomen, Femora, Cauda subtus pallide testacea. Cauda fusca integra. Alæ fuscæ margine exteriore testaceo.

247. MOTACILLA Curruca supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis: extima margine interiore alba. Fn. 233.

Gesn. av. 370. Curruca.

Jonst. av. Hippolais f. Curruca.

Aldr. orn. l. 17. c. 34. Hippolais f. Curruca.

Will. orn. 157. Curruca eliolæ.

Raj. av. 79. n. 6. Curruca.

26 AVES PASSERES, MOTACILLA.

*Suecis Kruka.*

Habitat præsertim in terra argilloſa, ova ponens cinerea maculis ferrugineis.

DESCR. Corpus ſupra fuſco-cinereum, iſtra album. Remiges fuſcae, marginē tenuiore albescentes. Cauda integra. Reſtrices fuſcae, ſed 1, i marginē exteriore longitudinaliter alba,

248. MOTACILLA *Hippolais* virescenti-cinerea, ſubtus flaveſcens, abdomen albido, artibus fuſcis. Fn. 234.

Raj. av. 79. n. 7. Ficedula septima aldrovandi.

Habitat in arboribus.

DESCR. forte præcedentis eſt Fæmina. Corpus ſupra cinereum, ſubtus cinereo-albicans. Collum & imprimis Alæ ſubtus virescent. Gula alba, ale clauſæ ſupra ferrugineæ. Remiges marginē exteriore ferrugineæ ſunt. Reſtrices coæquales vel exterioreſ paulo breviores, fuſcae omnes, ſed 1; ma extorſum pallida; 2 apice pallida; reliquæ vix manifeſte pallidæ.

249. MOTACILLA *Salicaria* cinerea, ſubtus alba, ſuperciliis albiſ.

Alb. av. 3. p. 56. t. 60. Salicaria gesneri.

Habitat in ſylviſ.

DESCR. Corpus ſupra cinereum, vix virescent. Abdomen exalbidum. Peſtis & reſtrices alarum inferiores flavescentes. Remiges fuſcae, marginē poſtico albidæ. Reſtrices reiniſibus concolores. linea albida ſupra oculos. Avis valde affinis *Sylvia*, modo non ſexu tantum diſtincta.

250. MOTACILLA *Sylvia* ſupra cinerea, ſubtus alba, reſtri- ce prima longitudinaliter diſimiſato - alba, ſecunda apice alba. Fn. 228.

*Suecis Skogsknetter, Mefar.*

Habitat in ſylviſ & nemoribus.

DESCR. Caput, Collum, Dorsum, Alæ, Uropygium, Cauda (verbo tota avis ſupra) cinerea. Gula, Collum, Abdomen, Pectus, Cauda ſubtus (i. e. tota avis ſubtus) alba. Remiges cinereo-fuſcae. Reſtrices cinereo-fuſicae, ſed extina diſimiſato-alba ſecundum totam longitudinalinem a latere exteriore. Reſtrix ſecunda apice alba, reliquæ immaculatae, vix Motac: Trochila major.

251. MOTACILLA *Ficedula* ſubfuſca, ſubtus alba, pectore cinereo maculato. Fn. 231.

Will. orn. 163. Ficedula quarta.

Raj. av. 81, n. 12. Ficedula.

Lift. apic. 125. Ficedula.

Charl. orn. 81. t. 81. Ficedula.

Alb. orn. 3. p. 25. t. 26. Ficedula cannabina.

Habitat in hortiſ & cultiſ rarius.

DESCR.

*DESCR.* Color supra totus e fusco castaneus, subtus alba aut àlbo-cinerascens.

252. MOTACILLA *alba* pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. *Fn. 214.*

*Bell. ic. 88. b.* Motacilla, Culicilega, Sufurada.

*Gesn. av. 618.* Motacilia, quam nostri albam cognominant.

*Jonst. orn. 120. t. 43.* Motacilla alba.

*Anon. angl. 127.* Water wagtail.

*Will. orn. 171. t. 42.* Motacilla alba.

*Raj. av. 75. n. 1.* Motacilla alba.

*Alb. orn. 1. p. 49. t. 49.* Motacilla alba.

*Suecic* Årla, Sådesårla. *Sudermannis* Isfjärna. *Ostrobothniensis* Wästråckia.

Habitat ubique. ova 6 alba maculis fuscis confertis.

*DESCR.* Caput nigrum a vertice ad nucham. Frons, latera capitis, gula alba. *Collum* subtus a gula ad sternum macula magna nigra tegitur. *Dorsum* canum. *Pectus & venter* albida cum cinerei mixtura. *Alæ* fuscæ; quarum 1-5 longiores integræ, at 6-14 fere æquales obtuse emarginatæ. 15 quæ longior & 16 margine anteriore albæ. *Rectrices* æquales, fuscæ: 1, 2 dimidiato albæ oblique versus apicem; 3, 4, 5 fuscæ immaculatae; 6 angustior acutior (margine exteriore longitudinaliter albo in quibusdam) *Tibiae & Pedes* nigri, ungue postico maximo. *Rostrum* tenuē, nigrum; maxillis subæqualibus, superiore utrinque emarginata. *nares* oblongæ nudæ. *Lingua* sagittata membranacea apice plurimis setulis laceræ.

253. MOTACILLA *flava*, pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis. *Fn. 215.*

*Gesn. av. 618.* Motacilla flava.

*Aldr. orq. 1. 17. c. 24.* Motacilla flava.

*Will. orn. 172. t. 63.* Motacilla flava.

*Raj. av. 75. n. 2.* Motacilla flava.

*Merr. pin. 178.* Motacilla flava, rostro longiusculo nigricante.

♂ Motacilla cinerea *Raj. av. 75. n. 3.*

*Edv. av. 105. l. 259* Femina est.

*Sudermannis* Sådesårla.

Habitat passim apud nos in sepibus. nidificat inter segetes; ova 5 maculis & lineolis fuscis.

*DESCR.* Gula, pectus, abdomen a rostro ad caudam subtus saturate flava. Caput supra canum cum viridi mixtura. *uropygium* viride. linea alba a rostro per oculos ducta. *alæ* fuscæ. *Remiges* 1-5 longiores, acutiores, sensim breviores; 6-14 æquales, obtuse, breviores, emarginatæ, at 15 similis magnitudine & figura 5;æ, sed 16 longitudine 1:mæ, margine anteriore alba. *Rectrices* æquales fusco-nigricantes, quarum 1-2 dimidiato oblique versus apicem albæ; sed 3 vir apice antrorsum albicans; reliqua 4, 5, 6 immaculata nigro-fuscæ. *Rostrum* subulatum, nigrum. *Lingua* in quatuor

93 AVES. PASSERES. MOTACILLA.

tuor vel quinque setas divisa, acuminata. *Pedes* fuscus, ungue postico re-  
liquis omnibus duplo longiore.

*MAS* capite viridi-cinereo, linea supra oculos alba, temporibus viridi-  
cinereis.

*FÆMINA* capite obscure cinereo, linea pone oculos albida, temporibus  
sub oculis nigris.

254. MOTACILLA *Oenanthe* dorso cano, fronte alba, ocu-  
lorum fascia nigra. Fn. 217.

Will. orn. 168. t. 41. f. 4. *Oenanthe* s. *Vitiflora*?

Jonst. av. 123. t. 45. f. 13. *Oenanthe aristoteli* & plinio.

Raj. av. 75. n. 1. *Oenanthe* s. *Vitiflora*.

Ald. orn. I. p. 53. t. 57. *Oenanthe*.

Suecic Steniquetta.

Habitat inter lapides. ova 6 cærulecentia punctis fuscis rariss.

DESCR. magnitudo Fringillæ Chloridis; os, vibrissæ, pedes, unguis, fauus  
nigra. Cinerea s. cana sunt caput, dorsum, versus uropygium tamen vi-  
rescens. abdomen album. Frons albicans, a rostro per oculos ad aures linea  
lata nigra; supra oculos (in mare) macula alba. Gula & collum subtus  
albo levissime flavescens. Remiges omnes fuscæ, immaculatæ. Rectrices a  
medio apicem versus fuscæ, basin versus albæ; albedo tamen nigredine  
longior; at rectrices 6, 7 (intermediae) longiore nigredine quam albedine  
gaudent. Uropygium utringue album.

vidimus hujus varietatem alis atris, remigibus secundariis apice albis.

255. MOTACILLA *Rubetra* nigricans, superciliis albis, ma-  
cula alarum alba, gula pectoraque flavescente. Fn. 218.  
& 230.

Aldr. orn. 735. Muscicapa tertia.

Bellon. *Rubetra*. . . . Rubetra.

Raj. av. 76. n. 4. *Oenanthe nostra* tertia.

Will. orn. 169. t. 41. f. 5. Muscicapa nostra tertia.

Habitat paßim ruri.

DESCR. Rostrum nigrum. Caput fuscum; linea a naribus per oculos al-  
ba, sub qua nigra fascia. gula alba. Collum & pectus subtus dilute fer-  
ruginosa. abdomen album. Dorsum & uropygium constat pennis fuscis  
marginé griseis. in alijs macula magna alba extrorsum nigra. Remiges  
fuscæ; primores 1-8 marginé postico & basi albæ. Rectrices fuscæ a  
medio basin versus albæ, exceptis duabus intermediis omnino fuscis.  
magnitudo Passeris domestici. rectrix extima exteriore margine fere us-  
que ad apicem albæ est.

OBS. Raj. av. 76. *Oenanthe secunda nostra* s. *Rubecula* vix ab hac specie  
differt.

256 MOTACILLA *Atricapilla* testacea, subtus subcinerea, pi-  
leo obscuro. Fn. 229.

Aldr. orn. I. 17. t. 36.

Jonst. av. t. 45. *Atricapilla* s. *Ficedula*.

Will. orn. 162. t. 41. *Atricapilla* s. *Ficedula*.

Raj.

Raj. av. 79. n. 8. Atricapilla s. Ficedula.  
Habitat præsertim in Scania.

DESCR. *MAS* vertice nigricat; dorsum testaceum; subtus cinerea.  
*FÆMINA* vertice luteo rufescit; corpore toto etiam luteo rufescit; subtus dilute albicat.

257. MOTACILLA *Phoenicurus* gula nigra, abdomine rufo,  
capite dorsoque cano. Fn. 24.

Raj. av. 78. n. 5. Ruticilla.

Will. orn. 159. Ruticilla, *Phænicurus* græc.

Alb. orn. 1. p. 48. t. 50. Ruticilla.

Suecic Rödstjert.

Habitat in arboribus frondiferis, nidificans in cavis arborum  
& parietum, egregie cantillans. Hyeme occultatur.

DESCR. *Pectus*, *uropygium*, *Cauda* rufa. *Caput*, *collum*, *dorsum* cinerea.  
*frons* alba. *Gula* & *maxillæ* sub oculis nigra. *Rectrices* duæ intermediae  
fuscæ. *Fæmina* capite & collo cinerea; pectorè magis pallida. *abdomen*  
album, remiges fuscæ. *Cauda* simillima maris.

258. MOTACILLA *Erythacus* dorso remigibusque cinereis,  
abdomine rectricibusque rubris: duabus cinereis. Fn. 225.

Habitat in pratorum arboribus. ova 9 viridi-cærulea.

DESCR. *Caput* supra canum. *Dorsum*, *Alæ*, *Remiges* cinereæ. *Gula*, *thorax*,  
*abdomen*, *uropygium*, *rectrices* rufa s. ferruginea. *Rectrices* duæ intermediae  
cinereæ in margine medio exteriore parum rufescentes. *Pedes*  
nigri, macula nulla sub gula aut in sincipite; nec supercilia alba. an præ-  
cedentis fæmina?

259. MOTACILLA *Suecica* pectorे ferrugineo: fascia cærulea,  
rectricibus fuscis versus basin ferrugineis.

Motacilla pectorе cæruleo: macula flavescente albedine cinc-  
cta. Fn. 226.

Rudb. pict. Avis Carolina mas.

Gesn. av. 796. Wegflecklin.

Aldr. orn. 749. Phœnicuro similis ornithologo.

Will. orn. 160. Ruticilla 3. Wegflecklin.

Raj. av. 78. Ruticilla Wegflecklin.

β Gesn. av. 796. Wydengyckerlin.

Rudb. pict. Avis Carolina fæmina.

Habitat *Tornioæ* & alibi in *Westrobothniaæ* & *Laponiæ* salice-  
tis & alnetis.

DESCR. *MAS*. Magnitudo Fringillæ Ligurini. *Caput*, *dorsum*, *Cauda*  
grisea. *Remiges* fuscæ apice minimo albo. *Rectrices* fuscæ apice subte-  
staceæ, a basi ad medium ferrugineæ: intermediae totæ fuscæ. *Linea* al-  
bida supra oculos. *Pectus* fulvo-testaceum: fascia in medio pectoris cæ-  
rulea, venter & *Pectus* albicant, sub ano lutescit. *Pedes* cinerei;

FÆMINA antecedenti mari similis, sed dilutior, insupor macula non ad canthum oculi, sed loco superciliorum oblonga. a gula ad sternum cinerea, sed in hujus medio alba macula; infra hanc ad sternum velut fuscō cinereo nebulosa.

**260. MOTACILLA Rubecula grisea; gula pectoreque fulvis.**

*Fn. 226.*

Alb. orn. I. p. 49. t. 51. Rubeculus.

Will. orn. 160. t. 38. Rubecula s. Erithacus.

Raj. av. 78. n. 3. Rubecula s. Erithacus.

Suecis Rotgel.

Habitat in arboribus frondiferis ad paludes, optime cantilans solitaria, (una arbor non capit duos erithacos) pugnacissima, delectatus Evonymi baccis.

DESCR. A rostro ad sternum luteo rufa. dorsum, alæ & Cauda grisea; venter albicans. unguis posticus longior. Remiges & Rectrices cinereo-fuscæ tectrices (remigum posteriorum) sex apice maculis ferrugineis. Cauda æqualis. Rostrum & Pedes fuscæ.

**261. MOTACILLA Troglodytes grisea; alis nigro cinereoque undulatis**

*Fn. 222.*

Gesn. av. 651 Passer troglodytes.

Aldr. orn. I. 17. c. 4. Passer troglodytes bellonii.

Will. orn. 164. t. 42. Passer troglodytes.

Raj. av. 80. Passer troglodytes.

Habitat rario apud nos; nidificat in terra & sepibus.

DESC. Avis supra castanei coloris; subtus pallidior. abdomen lineolis transversis fuscis undulatum. Cauda integra, alæ cinereo-nigricantes nigro undulatae.

**262. MOCACILLA Regulus remigibus secundariis exteriore margine flavis, medio nigris.**

*Fn. 235.*

Gesn. av. 643. Parus sylvaticus.

Aldr. orn. I. 17. c. 1. Regulus.

Jonst. orn. t. 42. Passerculus troglodytes.

Will. orn. 163. t. 41. Regulus cristatus.

Raj. av. 79. n. 9. Regulus cristatus.

Alb. orn. I. p. 51. t. 53. Regulus cristatus.

Suecis Kongsfogel.

Habitat in arboribus non infrequens; minima avis inter nocturnas.

DESCR. Corpus supra griseo-virens, subtus dilutius. Remiges fuscæ 12 3 4 5 margine exteriore vix flavescentes, reliquæ 6-16 in marginis exterioris medio nigrae, a medio exterrsum flavo-virescentes. Remiges omnes posteriore margine albescunt, & harum 12-16 etiam apice. Rectrices fuscæ, margine exteriore flavæ. Rostrum subulatum, nigrum. Lingua lacea, unguis posticus major. MAS macula magna verticis flava, in medio fulva, lateribus nigra.

263. MOTACILLA *Acredula* dorso cinereo-virescente, remigibus fuscis: septimo octavo nonoque apicibus albis.

*Fn.* 237.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. avicula, quam sub hac specie intellectam volo, sequenti gaudet colore. *Rostrum* tenui, flavescenti, supra magis obscurum. *Nares* ovato-oblongæ: vibrizæ setis utrinque tribus nigris. *Caput, collum, dorsum, uropygium & alarum tectrices* cinerea levissime in viride transeuntia; ad flexuram alæ, præsertim subtus, viridi-flavescenti color saturatior, quam in reliquo corpore. *Gula, pectus, abdomen* alba, sed collum subtus parvum et viridi flavevit. *Pedes* fusco-pallidi uti rostrum. *Rectrices* fuscæ & Cauda forficata. *Remiges* itidem fuscæ, sed pennæ 7 8 9 suminis apicibus vix manifeste albæ. *Lingua* setis duabus instructa; fauax flava. Supra oculos a rostri basi summa lineola pallide flavescenti utrinque. *Facies adeoque Spini*, sed duplo minor; inquietissima est in arboribus & semper salit hic illueque.

264. MOTACILLA *Trochilus* cinereo-virescens, alarum tectricibus inferioribus flavescentibus, superciliis luteis. *Fn.*

236.

*Aldr. orn. l. 17. c. 2.* Regulus aliis non cristatus.

*Will. orn. 164. t. 42.* Regulus non cristatus.

*Raj. av. 80. n. 10.* Regulus non cristatus.

*Alb. orn. 2. p. 55. t. 59.* Regulus non cristatus.

Habitat in salicetis; ova s alba rubris maculis.

DESCR. *Corpus* fusco cinereo-vitescens, linea sublutea a naribus supra oculos ad occiput. *Corpus* subtus albo-lutescens. *Remigum tectrices* inferiores e viridi flavescentes. *Remiges* fuscæ margine virescente. *Rectrices* similes remigibus. *Will.*

## Parus.

265. PARUS major capite nigro, temporibus albis, nucha lutea. *Fn.* 238.

*Gesn. av. 640.* Parus major.

*Bell. ic. 95. a.* Parus major.

*Aldr. orn. l. 17. c. 13.* Parus major.

*Merr. pin. 178.* Parus major.

*Will. orn. 174.* Fringillago s. Parus major.

*Raj. av. 73. n. 3.* Fringillago s. Parus major.

*Alb. orn. 1. p. 44 t. 46.* Fringillago s. Parus major.

*Suecis* Talg-oxe.

Habitat inter Alnos, frigidissima hyeme ad fenestras accedens.

DESCR. *Corpus* nigrum, splendens. *Tempora infra oculos* alba. *mentum* nigrum, quæ nigredo jungitur sub temporibus macula capitatis. macula gula appendicem nigrum versus pectus & ventrem recta demittit, nucha lutea, scapularum regio luteo-viridis. *Pectus & venter* flava, alæ & cauda luteana. *remiges* nigricantes, margine exteriore albicantes excepta prima.

Linea

Linea alba transversalis obliqua per alam decurrit. Rectrix i longitudinaliter extrorsum alba, at sexta utrinque cærulescens; reliqua longitudinaliter extrorsum cærulecentes, introrsum nigricantes.

**266. PARUS cristatus capite cristato.** Fn. 239:

Gesn. av. 642. f. med. Parus cristatus,

Aldr. orn. . . . Parus cristatus.

Will. orn. 175. t. 43. Parus cristatus.

Raj. av. 74. n. 6. Parus cristatus.

Alb. orn. 2. p. 53. t. 57. f. 2. Parus cristatus.

Suecis Tofsmyssa, Tofstita. Uplandis Meshatt.

Habitat in sylvis depresso.

DESC. Dorsum fusco-cinereum, ala & cauda nigro-cinerea, venter albus plumis introrsum nigris, caput vertice pennis longioribus & surrectionibus gaudet; estque caput colore mixto ex albo & nigro, pluma enim nigrae sunt apicibus albis: crista plumæ reliquis majoris, pone oculos nigredo; gula macula magna nigra; collare nigrum. Pedes cærulei.

**267. PARUS cæruleus remigibus cærulecentibus: primoribus  
margini exteriore albis, vertice cæruleo.** Fn. 240.

Bell. ic. 96. a. Parus cæruleus.

Gesn. av. 641. Parus cæruleus.

Merr. pin. 178. Parus cæruleus minor.

Will. orn. 175. Parus cæruleus.

Aldr. orn. l. 17. c. 17. Parus cæruleus.

Suecis Blâmees.

Habitat in Alnetis.

DESCR. Frons alba. Vertex cæruleus. Tempora alba, linea a rostro per oculos verius nucham coit in maculam cærulecentem, quæ collum ambit, & gula maculam nigricantem constituit. Remiges secundariae apice albae, unde fascia alarum alba. Pectus, Abdomen & latera flavescentia. Abdomen pone albicans; testrices alarum cærulecentes apicibus albis. Reñtrices nigricantes, margini exteriore cærulecentes, quarum i, i margini exteriore albae. Cauda cærulescens. collum supra albicans. dorsum virescens, pedes nigri.

**268. PARUS ater capite nigro, dorso cinereo, occipite pecto-  
re que albo.** Fn. 241.

Gesn. av. 641. Parus ater.

Aldr. orn. l. 17. c. 19. Parus ater.

Merr. pin. 178. Parus ater s. carbonarius.

Will. orn. 175. t. 45. Parus ater.

Raj. av. 73. n. 2. Parus ater.

Habitat in Alnetis.

DESCR. Caput a rostro ad nucham nigrum. Tempora alba. Sterni regio nigra; Pectus & abdomen albida; Dorsum & hypopygium cinerei. Reñtrices nigrae.

*nigres* 17, *fuscae*, *margine interiore albæ*, *fascia alba duplex in aliis*, *Remiges* 12 *fuscae*. *Pedes cœrulecentes*.

269. PARUS palustris capite nigro, temporebus albis; dorso cinereo. Fn. 242.

Gesn. av. 642. Parus palustris.

Aldr. orn. - - Parus palustris.

Will. orn. 175. t. 43. Parus palustris.

Raj. av. 73. n. 3. Parus palustris.

Alb. orn. 3. p. 54. t. 58.

Suecic Entita, Tomlinge.

Habitat in juniperetis.

DESCR. Caput a rostro adj. pucham supra oculos nigrum. Tempora infra oculos alba. Corpus supra cinereum, subtus candido-cinereum, plumæ tamen omnes nigrae, apicibus solum colorem exhibentes visibilem. Remiges nigrantes margine exteriore albido, fascia nulla per alas. Remiges & testrices dorso concolores. Rostrum nigrum. Pedes plumbæ. Rectrix 1, i marginé exteriore alba.

## Hirundo.

270. HIRUNDO rustica rectricibus, excepto pari intimo, macula alba notatis. Fn. 244.

Gesn. av. 548. Hirundo domestica.

Aldr. orn. l. 17. c. 6. Hirundo domestica.

Zonst. av. 115. t. 42. Hitundo.

Merr. pin. 177. Hirundo.

Will. orn. 155. t. 39. Hirundo domestica.

Raj. av. 71. n. 1. Hirundo domestica.

Alb. orn. 1. p. 43. t. 45. Hirundo domestica.

Suecic Ladu-Swala.

Habitat in domibus intra tectum.

DESCR. *MAS.* Corpus supra nigro-cœruleum nitidum. Venter, Pedes, testrices alarum inferiores alba. Frons & gula brunnea. Collum subtus cœrulescens. Remiges nigrae, veræ 1-6 septim longiores quo apici propiores; at testicardiae quo corpori propiores eo longiores; haec egiarginata sunt. Cauda nigra, bifurca. Rectrices 12 extimus longissimis; singula rectrice macula alba notata, excepto pari intimo seu sexto. Rostrum minimum, depresso, fau ampla, flava. Nares ovatae, nudæ. Lingua bifida, acuta. Pedes nudi,

271. HIRUNDO urbica rectricibus immaculatis; dorso nigro cœrulecente. Fn. 245.

Gesn. av. 564. Hirundo sylvestris.

Aldr. orn. l. 17. c. 7. Hirundo agrestis s. rustica Plinio dicta.

Merr. pin. 178. Hirundo agrestis s. rustica plinii.

Zonst. orn. 117. Hirundo agrestis.

*Will. orn.* 155. Hirundo agrestis plinii s. rustica.

*Raj. av.* 71. n. 2. Hirundo rustica s. sylvestris.

*It. Oeland.* 41. Hirundo dorsum nigro-cærulescente.

*Alb. orn.* 2. p. 52. t. 56. f. A. Hirundo agrestis.

*Suecic* Hus-swala.

Habitat sub margine tecti e summo pariete extra domum.

*DESCR.* Rostrum nigrum, breve, depresso. Nares nudæ. Corpus supra nigrum, sed caput, & dorsum supra nigro-cærulescens, inter oculos & rostrum atra. Remiges fuscæ, primores acutæ, secundariæ vero emarginatæ. Rectrices 12 fuscæ, exteriores tensim longiores. Uropygium, gula, Pectus, venter, rectrices inferiores rectricum alba. Pedes alba lana vestiti. Lingua marginata. Hujus domum intrat sibique sèpe vindicat Fringilla domestica, at domina domus sibi adsoiciat socias, quæ luto introitum claudunt, mox avolant ovantes; quo facto si manu aperiatur captivus reperitur suffocatus.

272. HIRUNDO *Apus* nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis. *Fn.* 246.

Hirundo nigra tota, gula albicante.

*Bell. ic.* 100. a. *Apus*, *Cypselus minor*.

*Gesn. av.* 166. *Apus*.

*Aldr. orn. l.* 17. c. 19. *Apus*.

*Jonst. orn.* 119. t. 42. *Apus*.

*Merr. pin.* 178. Hirundo apus.

*Will. orn.* 156. t. 39. Hirundo apus.

*Raj. av.* 72. n. 4. Hirundo apus.

*Alb. orn.* 2. p. 51. t. 55. Hirundo apus.

*Suecic* Ring-swala.

Habitat in turribus, templis, arcibus, nec non in sylvis evanescere arborum. Cretenses pueri aciculam hami instar incivatam per medium Cicadam figunt, extremum filum manu tenentes; Cicada sic transfixa nihilo minus in aëre volitat, quam conspiciens Hirundo, impetu in eam ruit & devorat cum acicula, qua retentus capit, sic & Ispida *Bell. obs.* 16.

*DESCR.* Magnitudo fere caprimulgii, fusco nigricans. Gula alba. Lingua emarginata. Moustaches nullæ. Alæ longissimæ. Cauda forcipata rectricibus tantum 10. Pedes rufi carnosæ, tetradactyli: digitis omnibus anticis; intimo brevissimo.

273. HIRUNDO *riparia* cinerea, gula ab domineque albis. *Fn.* 247.

*Gesn. av.* 656. Hirundo riparia s. Drepanis.

*Aldr. orn. l.* 17. c. 8. Drepanis s. riparia.

*Jonst. orn.* t. 42. Hirundo riparia.

*Merr. pin.* 178. Hirundo riparia.

*Will. orn.* 156. t. 39. Hirundo riparia.

*Raj.*

Raj. av. 71. n. 3. Hirundo riparia.

Alb orn. 2. p. 52. t. 96. f. B. Hirundo riparia.

Suecic Strand-Swala, Back-Swala.

Habitat sub terra in abruptis littoribus vel arenosis præcipitiis; ubi fodit cavitates horizontales profundas.

DESCR. Tota cum Remigibus & Restrictibus cinerea. Gula & venter alba;

## Caprimulgus.

274. CÄPRIMULGUS *europæus* narium tabulis obsoletis:

Hirundo cauda integra, ore setis ciliato. Fl. 248.

Bell. ic. 28. a. Strix, Caprimulgus, Fur nocturnus.

Gesn. av. 242. Caprimulgus Ægothelus.

Fonst. orn. 53. t. 20. Caprimulgus.

Will. orn. 70. t. 14. Caprimulgus.

Raj. av. 26. n. 1. Caprimulgus.

Aibin. ornith. 1. p. 10. t. 10. Caprimulgus.

Suecic Nattskräfva, Nattskärra. Smolandis Qvällknarren.

Habitat ubique in Sæcia, nocte sola exit, proditur facile susurro continuo. Nidificat ad prærupta umbrosaque montium latera. It. Wigoth. 27.

DESCR. Magnitudo Cuculi. Corpus supra canum, ex nigro, albo & fusco tenuissime undulatum mixtis maculatum; huic colori maculae parvæ longitudinales nigrae adspersæ. Abdomen pallide testaceum undulatis crassioribus nigris: Pectus hisdem undulis, sed minoribus. Caput ratione corporis magnum. Aures amplæ. Rostrum tenui; depresso-planum, modice inflexum, nigrum. Pedes parvi, hirsuti; digito intermedio duplo longiore. Cauda longa, integra. Rectrices 10. Pennæ omnes laxæ, molles, æquales. Unguis intermedius interiori margine squamis pectinatis notatur. Singularia in hac Ave; mystaces in margine maxillæ superioris ex 8 radiis s; setis exstantibus rigidis, quo facilis phalænis & infectis viicit. Faux amplissima, decies rostri histu amplior, ut in congeneribus. Nares prominentes cylindro elevato. Lingua minima, acutissima, integrim; palato adfixa. Cranium pellucidum. Capite magno, auribus magnis, (it. Wigoth. 215.) licet non exstantibus, oculis magnis commune huic cum reliquis nocturnis avibus; unguis intermedius squamatus. MAS gaudet macula magna alba fere in medio Remigis 2 & 3, quibus feminæ caret & apices Rectricum 1, 2 apice albæ sunt in mare;

## Classis. III.

## AMPHIBIA.

## I. REPTILIA.

## Rana.

275. RANA *Bufo* corpore verrucoso luteido fuscoque.

Rana manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis: pollice breviore. Fn. 253. It. oel. 142.

Raj. quadr. 252. *Bufo* s. *Rubeta*.

Rond. aquat. 2. p. 221. *Bufo*.

Charl. onom. 24. *Bufo*.

Bradl. nat. 1. t. 21. f. 2. *Bufo*.

Fonst. quadr. 132. *Bufo*.

Suecic Padda. *Smolandis Tässä*.

Habitat in locis umbrofis, montosis, *Acea* aut *Cotula* foetida præsertim luxuriantibus, noctu exiens.

DESCR. Manus tetradactyle, fissæ, digitis subæqualibus. Palmæ hexadactyle, palmate, digito primo & ultimo brevissimo. Corpus nigrum, verrucis hispidum, ad aures vesicula quasi inflata. Gula flava. Abdomen ventricosum, pallidum; maculis nigris adspersum, uti & ipsa femora fusca.

276. RANA *Rubeta* corpore verrucoso, ano obtuso subtus punctato. It. W:goth. 261.

Habitat in *Wermelandia*; in horto *Drotningholmeni* post pluvias frequens.

277. RANA *Bombina* corpore verrucoso, ab domine luteo nigro maculato, plica gulari.

Rana ab domine fulvo. Fn. 251.

Suecic Kläck-Groda. Scanis Sádes-Pompa.

Habitat in *Scania* compestris fossis australibus It. Jean. 122, 244, 272.

278. RANA *temporaria* dorso planiusculo subangulato.

Rana manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice longiore. Fn. 250. It. oel. 154.

Alar. ovip. 89. Rana.

Raj.

*Raj. quadr.* 247. *Rana aquatica.*

*Bell. aquat.* 54. *Rana.*

*Charl. onom.* 24. *Rana temporaria.*

*Schonef. ichth.* 59. *Rana.*

*Bradl. nat.* 21. f. 1. *Rana.*

*Gesn. ovip.* 46. *Rana aquatica sive innoxia.*

*Fonst. quadr.* 130. *Rana aquatica.*

*Suecic* Groda. *Smolandis Frō.* *Ostrobothniensisbus Kläffsa.*  
Habitat ubique in aquis & fossis vere, excepta ferme Lappo-  
nia.

*DESCR.* *Manus* tetradactylæ, digito 2 & 4 breviori *Planta* hexadactylæ  
semipalmatae, digito 1 & 5 longiore. *dorsum* planum, distinctum, lateri-  
bus utrinque linea pallida elevata ab apice rostri per palpebram superio-  
rem, versus caudam. *Tempora nigra.* maxilla superior alba ad marginem.  
*Carpus* ceterum totum livido - cinereum litoris nigris notatum; *membra*  
pallida litoris nigris transversis.

279. *RANA esculenta* corpore angulato, dorso transverse gib-  
bo, abdomine marginato.

*Roef. ran.* 51. t. 13. *Rana viridis aquatica.*

Habitat in fontibus Smoldaniæ alibiisque.

280. *RANA arborea* corpore lævi subtus punctis contiguis tu-  
berculato, pedibus fissis unguibus orbiculato-dilatatis. *A-*  
*moen. acad.* 1. p. 135.

*Rana viridis.* *Fn.* 252.

*Charl. onom.* 24. *Ranunculus viridis.*

*Fonst. quadr.* 133. *Ranunculus viridis.*

*Raj. quadr.* 251. *Rana arborea* s. *Ranunculus viridis.*

*Aldr. ovip.* 434. *Rana viridis.*

*Gesn. ovip.* 60. *Ranunculus viridis* s. *Dryopetes.*

Habitat in Scania: in Toppe ladugård, in Horto.

## Lacerta.

281. *LACERTA palustris* cauda auncipiti lanceolata, pedibus  
imuticis fissis, manibus tetradactylis. *Fn.* 256.

*Raj. quadr.* 273. *Salamandra aquatica.*

*Pet. mus.* 18. n. 111. *Lacerta aquatica* major mas s. verrucis  
albis adspersis, membranula ferrata in dorso extante.

*Lacerta aquatica* major, fæmina, s. verrucis albis adspersis,  
dorso plano.

*Wurffbain. salamandrol.* 52. t. 2. f. 3. *Salamandra aqua-*  
*tica.*

*Charl. onom.* 26. *Salamandra aquatica.*

*Seb. thes.* 1. p. 141. t. 89. f. 4. 5. *Lacerta americana*,  
*Dalekarlis Skrot-abborre*, *Skratt-abborre*.

*Persbergens*. *Grufgrabbe*.

Habitat in fossis, piscinis & aquis stagnantibus.

*DESCR.* *Corpus fusum. Abdomen fusco-maculatum, albicans sive croceum. Rostrum obtusum. Cauda compressa, anceps, acie perpendiculari, dorsum & cauda dentata in mare, genitalia utrisque prominula. gula maris litoris nigrioribus adspersa. Pedes 4-5 fissi, lateralibus brevioribus: horum digiti in plantis (in mare) margine membranaceo laterali instruuntur.*

282. *LACERTA aquatica* cauda teretiuscula mediocri, pedibus muticis fissis, manibus tetradactylis, plantis pentadactylis.  
*Fn. 257.*

*Pet. mus.* 18. n. 113. *Lacerta aquatica minor* mas s. *lævis* litoris nigris adspersa.

*Lacerta aquatica minor* *fæmina*, s. *lævis flavescentis*.

*Gesn. ovip.* 31. *Lacertus aquaticus*.

Habitat cum antecedente.

283. *LACERTA vulgaris* cauda tereti mediocri, pedibus unguiculatis fissis, manibus tetradactylis, palinis pentadactylis.  
*Fn. 254.*

*Raj. quadr.* 264. *Lacertus vulgaris*.

*Petiv. mus.* 19. n. 116. *Lacerta vulgaris velox*.

Habitat in sylvis.

OBS. Pallide livida est; a capite utrinque secundum dorsum linea fusca excurrit, abdomen flavescentis, interdum nigris maculis punctatum. cauda teretiuscula, longitudine corporis, unguis in pedibus nulli.

284. *LACERTA agilis* cauda verticillata longiuscula: squamis acutis, collari subtus squamis articulato.

*Lacerta cauda* tereti verticillata longitudine corporis, pedibus pentadactylis unguiculatis. *Fn. 1352.*

$\beta$  *Lacertus viridis*. *Aldr. quadr.* 264.

$\gamma$  *Lacertus dorso punctis albis dupli* serie,

*- Suec. Ödla. Smolandis Fyrfot*.

Habitat passim.

*DESCR.* Varietas  $\beta$  rarissima nec mihi ipsi obvia;  $\gamma$  ad templum Jockmuck Iulensis Lapponiae & prope Upsaliam seimel lecta.

## II. SERPENTES.

### Coluber.

285. *COLUBER*  $\delta$  *Chersea* scutis abdominali CL, squamis subcaudal.

# AMPHIBIA SERPENTES. COLUBER. 104

caudal. XXXIV. *Act. Holm.* 1749. p. 246. t. 6. It.  
*Scan.* 413.

*Anguis parvus rufescens à sping dictus.* Fn. 261.

Habitat in *Smolandia* Salicetis rarius.

OBS. De hujus dira pernicie stupenda narrant Smolandi: dicunt eum reperiri præsertim inter frutices Salicis; quodque vulnera omnino lethalia producat cum intumescentia corporis horrenda: vidi anguem parvum esse, nec spithami longitudinalis: esse deinceps rufi seu ferruginei coloris, omnino a Cæcilia diversum.

286. COLUBER ♂ *Berus* scutis abdominalibus CXLVI, squamis caudæ XXXIX. Fn. 260. *Amoen. acad.* I. p. 113.

n. I.

*Raj. quadr.* 285. Vipera.

*Charl. onom.* 30. Vipera.

*Pet. mus.* 17. n. 103. *Vipera anglica fusca*, dorso linea undulata nigricante conspicua.

*Act. upf.* 1736 p. 11. n. 4. *Anguis cinerea*, macula dorsi fusca longitudinali dentata.

*It. oel.* 23. Vipera.

*Suecis* Hugg-orm.

Habitat in Suecia frequens, morsu venenatissimo interdum lethalis.

DESCR. *Corpus cinereum*. *Dorsum* longitudinaliter regitur macula linearis fusca utrinque dentata; ad latera hujus macula cærulescens singulo denticulo dorsalis lineæ interjecta est. *Venter* purpurascens cum puncto nigro ad apicem singulæ squamæ. *Gula pallida*. *Labium superius secundum marginem album* est. *Oculorum iris flammæa*; pupilla nigra. *angulus acutus cæruleus* maculam longitudinalem dorsi a capite distinguit.

287. COLUBER ♂ *Prester* scutis abdominalibus CLIII, squamis caudal. XXXII.

*Pet. mus.* 17. n. 104. *Vipera anglica nigricans*.

*Smolandis* Boe.

Habitat in sylvis rario.

DESCR. *Corpus atrum*; *squamis* 21 ordinum, subcarinatis, lanceolatis; *lateralibus ovatis*, distinetis cute nigra, quæ dum contrahitur rugis albo reticulata appetet inter squamas. *Cauda brevissima*. *Os armatum* est veneno diro.

288. COLUBER *Natrix* scutis abdominalibus CLXX, squamis caudæ LX. Fn. 259. *Amoen. acad.* I. p. 116. n. 3. It. *gotl.* 227. *W:goth.* 146.

*Raj. quadr.* 334. *Natrix torquata*.

*Gesn. serp.* 43. *Anguis*.

*Aldr. serp.* 287. *Natrix torquata*.

*Charl. onom.* 33. *Natrix torquata*.

# 105 AMPHIBIA SERPENTES. ANGUIS.

*Merr. pin. 204. Anguis Coluber.*

*Pet. mus. 17. n. 101. Anguis vulgaris fuscus, collo flave-  
scente, ventre albis maculis distincto.*

*It. gotl. 226. Serpens.*

*It. vel. 6. 154. Coluber.*

*Suecic Tomt-orm. Scanis Snok. Smolandis Ring-orm.*

*DESCR. Corpus nigrum. Latera ventris notata albis maculis seu squa-  
mis ventralibus ad latera albis. Gula alba. Aurum regio flavescens.  
Tempora alba lineis nigris transversis. Dentes duplii ordine, aequales.  
Dorsi squamæ stria in medio elevata notatae (variat color: aliis squamæ  
dorsi cinereæ apice hic inde nigricante; aliis squamæ omnes nigrae sunt.)  
Nares non prominent. Algis aurum regio con vexa, nigricans, macula  
magna alba. Venter niger, nitens. Os inerme.*

## Anguis.

289. ANGUIS *fragilis* squamis abdominis caudæque CXXXV.

*Fn. 258. It. gotl. 306, 326.*

*Raj. quadr. 289. Cæcilia, Typhlinus Græcis.*

*Charl. onom. 31. Cæcilia Typhlos.*

*Gesn. serp. 60. Cæcilia Typhlos Græcis.*

*Aldr. serp. 243. Cæcilia.*

*Merr. pin. 208. Typhlos Cæcilia.*

*Pet. mus. 17. n. 10. Cæcilia anglica cinerea, squamis parvis  
mollibus compactis.*

*Suecic Ormslä, Koppar-orm.*

*Habitat satis frequens in Suecia.*

## III. NANTES.

### Petromyzon.

290. PETROMYZON *fluviatilis* pinna dorsali posteriori angu-  
lata. *Fn. 273.*

*Art. gen. 64. Jyn. 89. Spec. 99. Petromyzon unico ordine  
denticulorum minimorum in limbo oris, præter inferiores,  
majores.*

*Rond. pise. 2. p. Lampetra parva & fluviatilis.*

*Salv. aqu. 63. Lampetra minor.*

*Gesn. aqu. 598: 706. Lampetra parva & fluviatilis.*

*Aldr. pise. 581. Lampetra fluviatilis gesneri.*

*Charl. pise. 159. Lampetra fluviatilis.*

*Schonef. icthb. 41. Lampetra fluviatilis.*

*Jonsf.*

*Fonst. pisc. t. 28. f. 10.* *Lampetra fluviatilis.*

*Will. ichth. 104.* *Lampetra parva & fluviatilis.*

*Mars. danub. 4. p. 2. t. f. 1.* *Lampetra fluviatilis.*

*Suecic Nein-Öga.* *Westrobotnienibus Nätting.*

Habitat in fluviis Norlandiæ, præsertim Westrobotniæ & Ostrobotniæ.

291. PETROMYZON *branchialis* pinna dorsali posteriore linearis  
labio oris latere postico lobato. *Fn. 274.*

*Art. gen. 64. syn. 90.* Petromyzon corpore annulofo, ap-  
pendicibus utrinque duabus in margine oris.

*Will. ichth. 107.* *Lampetra cæca s. oculis carens.*

*Raj. pisc. 36.* *Lampetra cæca s. oculis carens.*

*Suecic Lin-åhl.*

Habitat in fluvio Dalelfwen, copiose intra Dalekarliam,  
sæpe obvius intra Linum, quod aqua maceratur, sæpe  
inter brachias Gadi 291.

OBS. Crassitie vix Lumbricum superat, longitudine vix ac ne vix quidem  
spithami. Pinna dorsi posterior nullo modo in angulum dilatatur, ut in præ-  
cedenti, sed modice convexa est, ad os nulli cirrhi, sed labia utrinque de-  
pendent pone in laciniam s. lobum dilatata. Striis infinitis notatur.

292. PETROMYZON *marinus* ore intuspapillofo, pinna dor-  
sali postica a cauda distincta.

Petromyzon maculosus, ordinibus dentium circiter viginti  
*Art. gen. 64. syn. 90.*

Habitat in mari, lectus Calmariæ, rario. *D. D. Wablom.*  
Crassities brachii in individuo viso.

## Raja.

293. RAJA *clavata* aculeata, dentibus tuberculosis, cartilagine  
transversa abdominali. *Art. gen. 71. syn. 99. spec. 103.*

*Fn. 268. It. Wigoth. 175. \**

*Rond. pisc. 353.* Raja clavata.

*Salv. aquat. 149.* Raja.

*Gesn. aqu. 795.* Raja clavata.

*Aldr. pisc. 460.* Raja clavata rondeletii.

*Fonst. pisc. t. 11. f. 2.* Raja clavata.

*Charl. pisc. 130.* Raja clavata.

*Schonef. ichth. 57.* Raja.

*Bell. aqu. 80.* Raja.

*Will. ichth. 74.* Raja clavata.

*Raj. pisc. 26.* Raja clavata.

*Dal. pharm. 411.* Raja.

*Suecic* Râcka.Habitat ubique in mari occidentali; Piscatura *It. W:goth.*  
193.

## Chimæra.

294. CHIMÆRA
- monstrosa*
- rostro subtus plicis pertusis.

*Chimæra Mus. Adolp. Fr. I. p. 53. t. 25.**Clus. exot. 136. t. 137. Genus Galei.*

Habitat in Oceano norvegico rarior.

## Squalus.

295. SQUALUS
- Acanthias*
- pinna ani nulla, corpore teretiusculo.

*Art. gen. 66. syn. 94. spec. 102. Fn. 269. It. Wgoth. 174. \***Rond. pesc. I. p. 373. Galeus acanthias.**Salv. aquat. 135. t. 136. Mustelus spinax.**Gesn. aquat. 607. Galeus acanthias.**Aldr. pesc. 399. Galeus acanthias f. spinax.**Fonst. pesc. 27. t. 8. f. 5. Galeus acanthias.**Charl. pesc. 128. Galeus acanthias.**Schonef. ichth. 29. Canis marinus aut Galeus.**Bell. aquat. 69. Mustelus spinax.**Will. ichth. 56. Galeus acanthias f. spinax.**Raj. pesc. 21. Galeus acanthias f. spinax.**Suecic Haj.*

Habitat in mari occidentali.

296. SQUALUS
- Spinax*
- pinna ani nulla, dorso spinoso, nari-
- 
- bus terminalibus.
- Art. gen. 67. syn. 95.*

*Will. ichth. 57. Gaieus acanthias f. spinax fuscus.**Raj. pesc. 21. Galeus idem.*Habitat in Oceano Norvegico. Martin *Dum. tener adhuc  
subvillosus* est.

297. SQUALUS
- Pristis*
- rostro lensiformi osseo piano utrinque
- 
- dentato.
- Art. gen. 66 syn. 93. Fn. 270.*

*Rond. pesc. I. p. 487. Pristis.**Gesn. aquat. 930. Serra marina.**Aldr. cet. 693. Pristis f. Serra.**Clus. exot. 136. Pristis f. Serra piscis.**Charl. pesc. 168. Pristis Serra.**Olear. mus. 41. t. 25. f. 1. Pristis f. Serra.**Will. ichth. 61. Pristis f. Serra piscis.**Raj.*

Raj. pisc. 23. Pristis s. Serra piscis.

Suecic. Sägtisk.

Habitat in mari occidentali,

## Lophius.

298. LOPHIUS piscatorius depressus, capite rotundato.

Lophius ore cirrhoso. Art. gen. 63. syn. 87. It. scan. 327.\*  
Rana piscatrix. Charl. onom. 199. t. 201. Olear. mas. 37. t.

23. f. 4.

Habitat in oceano occidentali ad Kullen.

## Acipenser.

299. ACIPENSER Sturio cirris quatuor, squamis dorsalibus undecim. Mus. Adolph. Fr. 1. p. 54. t. 18. f. 2.

Acipenser corpore tuberculis spinosis aspero. Art. gen. 65.  
syn. 91. Fn. 91. It. scan. 187. \*

Rond. pisc. 1. p. 410. Acipenser.

Gesn. aqua. 2. Acipenser.

Aldr. pisc. 517. 526. Sturio.

Jonst. pisc. 106. t. 23. f. 89. Sturio.

Schonef. ichth. 9. Acipenser.

Charl. pisc. 152. Sturio.

Salv. aquar. 113. t. 102. Sturio s. Silurus.

Will. ichth. 239. Sturio.

Raj. pisc. 112. Sturio.

Suecic. Stör.

Habitat in mari, tam orientali, quam occidentali, rarer.

300. ACIPENSER ruthenus cirris quatuor, squamis dorsalibus quindecim. Mus. Adolph. Fr. 1. p. 54. t. 27. f. 2. & t. 28. f. 1.

Acipenser ordinibus quinque longitudinalibus squamarum ossaeum: intermedio ossiculis quindecim. Fn. 272.

Klein. miss. 4. p. 13. t. 1. & forte Sturio alter gedanensis ejusdem.

Suecic. Sterlett.

Habitat in lacu Mælero, quem S. M. Rex Fridericus I. ex Russia allatum in hoc lacu plantari curavit.

OBS. Ordines ossiculorum in cute 5 sunt, sed medius tantum ordo, qui 15 circiter ossiculis constat, angulosus est; cuius nimirum singula squama ephippium forma refert, per medium dorsum secundum toram longitudinalem in processum tenuem & secantem assurgens, posterius aduncu fine terminata. Lateralia ossicula ut & ventralia rhomboidea & fere plana sunt, quilibet ordo laterum 60 prope ossicula continet, ventralium singuli 10. & 11. J. G. Gmelin.

## Classis IV.

## PISCES.

## I. APODES.

## Muræna.

301. MURÆNA *Anguilla maxilla inferiore longiore, corpore unicoloré.* Art. gen. 24. syn. 39. spec. 66. Fn. 290.

Rond. pise. 2. p. 198. Anguilla.

Salv. pise. 66. Anguilla.

Gesn. pise. 40. Anguilla.

Aldr. ichth. 544. Anguilla.

Fonst. pise. 114. t. 24. f. 7. Anguilla.

Schonef. ichth. 14. Anguilla.

Chart. onom. 153. Anguilla.

Will. ichth. 109. Anguilla.

Raj. pise. 37. Anguilla.

Mars. danub. 4. p. 4. t. 1. f. 3. Anguilla.

Sueciæ Ahl.

Habitat ubique in lacubus & flaviis, copiosissime in Scania

83, 127. nocturna. It. scan. 383, 326. Piscatura It.

goth. 340.

## Ammodytes.

302. AMMODYTES *Tobianus.* Art. gen. 36. syn. 29. spec. 55. Fn. 303. It. scan. 142. It. oel. 87.

Salv. pise. 70. t. 69. Piscis Sandilz dictus.

Gesn. paral. 3. Ammodytes piscis.

Aldr. ichth. 252. Sandilz anglorum.

Fonst. pise. t. 21. f. 1. Sandilz anglorum.

Schonef. ichth. 76. Tobianus.

Chart. onom. 146. Anguilla de arena.

Will. ichth. 113. Ammodytes gesneri.

Raj. pise. 38. Ammodytes geineri.

Sueciæ Tobis.

Habitat in mari Baltico, ad australem Oelandiæ angulum copiose, & in Scania ad urbem Cimbrishamn.

OBS. Numeravimus plures radios in pinnis, quam ichthyologus, sc. Döß. 60. pedior. 15. ani 32. Caudæ 14.

## Xiphias.

303. XIPHIAS *Gladius*. Art. gen. 30. syn. 47. Fn. 288.*Rond. pisc.* 251. Xiphias.*Gesn. pisc.* 379. s. 1049. Xiphias f. *Gladius piscis*.*Aldr. ichth.* 332. *Gladius*.*Jonst. pisc.* l. 4. f. 2. Xiphias f. *Gladius*.*Salv. pisc.* 127. t. 126. *Gladius*.*Charl. onom.* 124. Xiphias.*Schonef. ichth.* 35. *Gladius* 1. Xiphias.*Olear. mus.* 40. t. 24. f. 3. *Gladius*.*Will. ichth.* 161. Xiphias *piscis*, latinis *Gladius*.*Raj. pisc.* 52. Xiphias *piscis*, latinis *Gladius*.*Suecic* Swerd-fisk.

Habitat in mari Baltico rario.

## II. JUGULARES.

## Callionymus.

304. CALLIONYMUS *Lyra* dorsalis prioris radiis longitudine corporis.

Trachinus maxilla superiore longiore, pinna dorsali priori altissima. Fn 283.

*Groen. Act. upsal.* 1740. p. 121. t. 8. *Cottus officulo* pinnæ dorsalis primo longitudine corporis.*Pet. Gaz.* t. 22. f. 2. *Lyra harvicensis*, pinna dorsali longissima, maculis cæruleofuscis.

Habitat in Fretu Öresund, in Norvegia magis frequens.

## Trachinus.

305. TRACHINUS *Draco*. It. *Scan.* 325. \*

Trachinus maxilla inferiore longiore: cirris destituta. Art. gen. 42. syn. 70. Fn. 282.

*Salv. pisc.* 71. *Draco marinus* I. *Draco* f. *Araneus piscis*.*Rond. pisc.* 301. *Draco marinus* f. *Araneus*.*Gesn. pisc.* 77. *Draco* f. *Araneus plinii*.*Aldr. ichth.* 258. *Aranens aldrovandi alter*.*Schonef. ichth.* 16. *Araneus vel Draco marinus*.*Charl. onom.* 146. *Draco*.*Act. haffn.* 3. p. 154. *Piscis Fösing*.

Will.

### III PISCES JUGULARES GADUS.

Will. ichth. 288. *Draco* s. *Araneus plinii*.

Raj. pisc. 91. *Draco* s. *Araneus plinii*.

Suecic Färsg. Fiäfing.

Habitat in mari occidentali.

Pinnæ dorsalis mucrones punctura venenata lœdunt.

### Gadus.

306. GADUS *Eglefinus tripterygius*, cirratus, albicans, maxilla superiore longiore, cauda biloba. Art. gen. 20. syn. 36. Fn. 297. It. scan. 325.

Art. spec. 64: *Gadus cirratus albicans*, maxilla superiore longiore, cauda subbisida.

Charl. onom. 121. *Callaris*, *Galerida*.

Gesn. pisc. 86. *Eglefinus tertia asellorum species*.

Aldr. ichth. 282. *Asellus major*.

Schonef. ichth. *Asellus minor*.

Will. ichth. 170. *Onos* s. *asinus antiquorum*.

Raj. pisc. 55. *Onos* s. *asinus antiquorum*.

Suecic Kolja. Belgis Schelvis. Norvegic Hyfs.

Habitat in mari occidentali.

Linea lateralis fusca & macula fusca pone supraque pinnas pectorales.

307. GADUS *Callarias tripterygius*, cirratus, varius, maxilla superiore longiore, cauda æquali. Art. gen. 20. syn. 35. spec. 63. Fn. 293. It. scan. 221. \*

Fonst. pisc. 2. 46. f. 4. *Asellus varius*.

Schonef. ichth. 19. *Asellus varius* & *striatus*.

Will. ichth. 172. *Asellus varius* & *striatus*.

Raj. pisc. 57. *Asellus varius* & *striatus*.

Suecic Torsk. It. ael. 87.

Habitat ubique in mari & Baltico & occidentali, circa Gotlandiam & Oelandiam copiose.

DESCR. Dorsum cinereum maculis griseis: abdomen album punctis minimis nigris.

Pinna dorsi I. radiis 14. II. 19, III. 17.

anini I. radiis 20. II. 16.

ventralis 6, pectoralis 17, radiis.

Sub apice mandibulæ inferioris cirrus lumbrocidiformis tubulatus mollis.

308. GADUS *Morrhua tripterygius*, cirratus cauda subæquali: radio primo anali spinoso. Art. syn. 35. Fn. 295. It. IVgoth. 177. \*

Rond. pisc. 280. Molua.

Gesn. pisc. 88. 102. Molua vel *Morrhua altera minor*.

Aldr.

- Aldr. ichth.* 289. *Morrhua* f. *Molua altera*.  
*Jonst. pisc.* t. 2, f. 1. *Molua*, *Morrhua*.  
*Schonef. ichth.* 18. *Asellus major*.  
*Charl. onom.* 121. *Asellus major*.  
*Will. ichth.* 165. *Asellus major vulgaris*, belgis *Cabliau*.  
*Raj. pisc.* 53. *Asellus major vulgaris*.  
*Suecic* *Cabbliâ*.  
 Habitat in mari *occidentali*.

309. GADUS *virens* tripterygius, imberbis, dorso virescente.  
*Fn.* 296.

*Schonef. ichth.* 20. t. 2. *Asellus virescens*.

*Norwegis* *Sey.* *Babusis* Gräfik.

Habitat in mari atlantico copiosissime, ut ipsum hamum absque sagina arripiat avidissimus.

*DESCR.* Piscis magnitudine Percæ, glaber, dorso nigro virescente, totus alius albo-argenteus mollis & pinguis, squamæ minutissimæ. Pinna dorso prima radiis 13, secunda 20, tertia 19, ani prima 24, secunda 20, ventrales 5, pectorales 17.

310. GADUS *Merlangus* tripterygius, imberbis, albus, maxilla superiore longiore. *Art. gen.* 19. *syn.* 34. *Spec.* 62. *Fn.* 294. *It. scan.* 326. *Wgoth.* 176.

*Gesn. pisc.* 85. 99. Secunda asellorum species, *Merlanas*.

*Aldr. ichth.* 287. *Asellus minor alter*.

*Jonst. pisc.* t. 2. f. 3. *Asellus mollis*.

*Schonef. ichth.* 17. *Asellus candidus primus*.

*Charl. onom.* 121. *Asellus minor & mollis*.

*Will. ichth.* 170. *Asellus mollis major* f. *albus*.

*Suecic* *Hwitling*, *Widding*. *Scanis Hwitling*. *Belgis Molenaar*.

Habitat in mari *Norwegico*.

311. GADUS *barbatus* tripterygius cirratus, maxilla inferiore punctis utrinque septem.

*Gadus* dorso tripterygio, ore cirrato, pinna ani officulorum XXX. *Art. gen.* 21. *syn.* 37. *Spec.* 65.

*Gadus linea* excavata pone caput. *It. Wgoth.* 177. 178.

*Suecic* *Små-Torsk*. *Belgis Bolk*.

Habitat in Oceano.

312. GADUS *Pollachius* tripterygius imberbis, maxilla inferiore longiore, linea laterali curva. *Art. gen.* 20. *syn.* 35. *It. Wgoth.* 177 \*

*Suecic* *Lyrblek* f. *Zaj.*

Habitat in Oceano.

113 PISCES JUGULARES, GADUS.

313. GADUS *Molva* dipterygius cirratus; maxilla superiore longiore. Art. gen. 22. syn. 36. It. Wgoth. 177. \*  
*Suecic* Långa.  
 Habitat in Oceano.
314. GADUS *Merluccius* dipterygius cirratus, maxilla inferiore longiore. Art. gen. 22. syn. 36.  
 Habitat in Oceano occidentali.  
*Cauda fere integra. Pinnae dorsalis pars posterior longior radiis XV; Pinnae caudae pars posterior longior radiis XXIII.*
315. GADUS *Lota* dipterygius, cirratus, maxillis aequalibus.  
 Art. gen. 22. syn. 38. Fn. 292.  
 Art. spec. 107. Silurus cirro unico in mento.  
 Rond. pisc. 2. p. 164. Lota.  
 Gesn. pisc. 599. Lota Gallis dicta Stinsia f. Botarissa;  
 Aldr. ictb. 648. Lota rondeletii.  
 577. Mustela fluviatilis & lacustris.  
 Jonst. pisc. 146. t. 28. f. 6. Mustela fluviatilis & lacustris.  
 ... 168. t. 29. f. 10. Lota gallorum.  
 Salv. pisc. 213. Triscus. Bortatriæ.  
 Schonef. ictb. 49. Mustela fluviatilis.  
 Charl. onom. 159. Mustela fluviatilis.  
 Will. ictb. 125. Mustela fluviatilis. Lota.  
 Raj. pisc. 67. Mustela fluviatilis.  
 68. Lota.  
*Suecic* Lake.  
 Habitat in Lacubus Dalekarliæ (Silian) ubi maximus & præstantissimus, nec non in aliis lacubus majoribus.

Blennius:

316. BLENNIUS *rutilus* pinnis ventralibus sub sexradiatis, cirro gulari Syst. nat. 10. p. 258.  
*Suecic* Ahlkussa.  
 Habitat in Lacubus Svecicæ australioris, ingruente tempestate littora petens, quo recedunt reliqui pisces, plerisque detestabilis, nec esculentus.
317. BLENNIUS *viviparus*, ote tentaculis duobus. Mus.  
 Ad. Frid. 69.  
 Blennius capite dorsoque fusco-flavescente lituris nigris, pinna ani flava. Art. syn. 45.  
*Suecic* Tånglake. Act. Holm. 1748. p. 32. t. 2.  
 Habitat in mari Bothnico.

318.

318. BLENNIUS *Gunellus* pinna dorsi ocellis X nigris. *Mus.*  
*Ad. Fr.* 69.  
 Blennius maculis 10 nigris imbo albo; utrinque ad pinnam dor-  
 salem. *Art. gen.* 37. *Syn.* 45.  
 Habitat in Oceano.

### Ophidion:

319. OPHIDION imberbe maxillis imberbibus; cauda obtu-  
 siuscula.  
 Ophidion cirrhis carens. *Art. gen.* 25. *Syn.* 42. *Aet. stockh.*  
 1744. p. 129. *Fn.* 289.  
*Schonef. ichth.* 53. Ophidion flavum & imberbe.  
*Will. ichth.* 113. *Raj. pisc.* 39. Ophidion alterum flavum  
 & imberbe.  
 Habitat in mari Baltico & Oceano, saepe intra ostrearum te-  
 stas repertum.  
 OBS. Facies Murænae. Membrana branch. 5. Pinna dorsi radibus 79 a capite  
 ad caudam extensa, inaculis aliquot nigris in margine albidis, æquali spa-  
 tio remotis, aculeatis. Pector. II. Ventr. nullæ. Aui 41. Cauda circiter 18  
 vel 20. Posset referri ad Blennios, ad finis precedenti maculis decem.

### III. THORACICI.

#### Cyclopterus:

320. CYCLOPTERUS *Lampus* corpore squamis offeis angu-  
 lato. *Mus. Ad. Fr.* 57.  
 Cyclopterus. *Art. gen.* 62. *Syn.* 87. *Fn.* 275. *It. Scän.* 188. \*  
*Gefn. paral.* 1284. *Lampus anglorum.*  
*Aldr. pisc.* 479. *Lampus anglorum.*  
*Jonst. pisc.* 42. t. 13. f. 1. *Lampus anglorum.*  
*Charl. pisc.* 131. *Lampus anglorum.*  
*Schonef. ichth.* 41. *Lepus marinus nostras;* Orbis species.  
*Will. ichth.* 208. *Lampus anglorum.*  
*Raj. pisc.* 77. *Lampus anglorum.*  
*It. Öland.* 110. Cyclopterus s. *Lampus.*  
*Sæcis Sjurygg-Fisk.* *Scanis Stenbit.* *Babusis Quabbsu.*  
 Habitat in mari Bothnico, frequens *Malmogiae.*  
 OBS. Pulvis contra Tertianam vulgo adhebitur.

#### Cottus:

321. COTTUS quadricornis verrucis capitis quatuor offeis.  
 H *Syst.*

115 PISCES THORACICI. COTTUS.

Syft. nat. 6. p. 43. t. 4. f. 3. Mus. Ad. Fr. 70. t. 32. f. 4.  
Fn. 278.

Cottus scaber, tuberibus quatuor corniformibus in medio capite. Art. gen. 48. spec. 84.

Suecic Hornsimpa.

Habitat circa Alandiam & alibi in mari Balthico & Bothnico.

322. COTTUS *Gobio* lævis, capite spinis duabus. Art. gen. 48. syn. 76. spec. 82. Fn. 279.

Rondel. pisc. 2. p. 202. Cottus.

Gesn. pisc. 401. Cottus fluviatilis s. capitatus.

Aldr. ichth. 613. Cottus fluviatilis s. capitatus.

Fonst. pisc. t. 29. f. 11. Gobius capitatus.

Charl. onom. 157. Gobio capitatus.

Will. ichth. 137. t. H. 3. f. 3. (opt.) Gobio fluviatilis capitatus.

Raj. pisc. 76 Gobius fluviatilis.

Suecic Sten-Simpa. Fahlunensibus Slagg-Simpa.

Habitat in mari Balthico & Fahlunæ in rivulis, Upsaliæ in fluvio.

DESCR. Piscis Slagg-Simpa, qui Fahlunæ frequens, vix differt ab hac specie; est enim pisciculo Fahlunensi. Corpus duos digitos longum cincereum fasciis variis fuscis. Pinna dorsalis prior radiis 7; posterior 18; petroales 14; ventrales 4; ani 13; caudæ 10.

323. COTTUS *Scorpius* capitis spinis pluribus: maxilla superiore paulo longiore. Art. gen. 49. syn. 77. spec. 86. Mus. Ad. Fr. 70. It. scan. 325. Fn. 280.

Aldr. ichth. 201. Scorpænæ bellonii similis.

Fonst. pisc. t. 18. f. 12. Scorpænæ bellonii similis.  
t. 47. f. 4. 5. Scorpius marinus.

Schonef. ichth. 67. Scorpio marinus t. Scorpio nostras.

Will. ichth. 138. Scorpænæ bellonii similis.

Raj. pisc. 145 Scorpænæ bellonii similis.

Suecic Röt-Simpa, Skrabba, Skiälryta. Scanis Ulka. Gotthburg. Pinulka.

Habitat in mari occidentali frequens.

324. COTTUS *cataphractus* loricatus, rostro verrucis duabus bifido, capite subtus cirroso. Mus. Ad. Fr. 70.

Art. gen. 49. syn. 77. spec. 87. Cottus cirris plurimis, corpore octagono.

Bahusis Bonn-mus.

Habitat in Oceano ad Bahusiam.

### Pleuronectes.

325. PLEURONECTES *maximus* oculis sinistris, corpore aspero. Art. gen. 18. syn. 32.

Will. ichth. 94. Rhombus maximus asper non squamosus.

Raj. pisc. 31. Rhombus maximus asper non squamosus.

It. goth. 208. Butta.

Suecic Butta.

Habitat in mari Balthico.

DESCR: Oculi à latere sinistro: cutis supra aspera cinerea immaculata, membrana branchiostega radiis VII. (non vero VI.) pinna dorsi 6+, ami 48; ventrales 6. Pectorales 11 radiis constant; cauda vero 16. It. goth. 186.

326. PLEURONECTES *Solea* oculis dextris, corpore oblongo aspero, maxilla superiore longiore.

Pleuronectes oblongus, maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis. Art. gen. 18. syn. 32. Fn. 299. It. W:goth. 178.

Rond. pisc. 320. Buglossus.

Gesn. pisc. 666. 783. Buglossus vel Solea.

Aldr. ichth. 235. Buglossa vel Solea.

Jonst. pisc. 82. Solea.

Charl. onom. 145. Solea.

Schonef. ichth. 63. Solea vel Buglossus.

Will. ichth. 100 Buglossus seu Solea.

Raj. pisc. 33. Buglossus sive Solea.

Suecic Tunga, Sola.

Habitat in mari occidentali.

327. PLEURONECTES *Flesus* oculis dextris, linea laterali aspera, spinulis ad pinnas. Art. gen. 17. syn. 31. Fn. 300.

It. scan. 326.

Art. spec. 39. Pleuronectes linea laterali aspera; spinulis ad radices pinnarum à latere oculato.

Rond. pisc. 319. Passeris tertia species.

Gesn. pisc. 666. 782. 788. Passeris tertia species.

Charl. onom. 145. Passer niger.

Will. ichth. 98. Passer fluvialis vulgo Flesus.

Raj. pisc. Passer fluvialis vulgo Flesus.

Suecic Flundra. Bahusiensibus Slättskädda:

Habitat in mari occidentali.

328. PLEURONECTES *Plateffa* oculis dextris, corpore glabro, tuberculis sex capitibus.

Pleuronectes utrinque glaber, tuberculis sex à dextra capitibus.

Art. spec. 57. Fn. 301. It. W:goth. 179. It. scan. 326.

# 117 PISCES THORACICI. PLEURONECTES.

- Art. gen. 17. syn. 30. Pleuronectes oculis & tuberculis sex a dextra capitis, lateribus glabris, spina ad anum.*  
*Rond. pesc. 316. Plateffa.*  
*Gesn. pesc. 664. 670. Plateffa.*  
*Aldr. ichth. 243. Passer laevis.*  
*Zonst. pesc. t. 22. Passer laevis.*  
*Schonef. ichth. 61. Plateffa.*  
*Charl. onom. 49. Plateffa laevis.*  
*Will. ichth. 96. Plateffa.*  
*Raj. pesc. 31. Plateffa.*  
*Suecic Skalla. Babusis Rödspütta.*  
*Habitat in mari occidentali.*

329. PLEURONECTES *Hippoglossus* oculis dextris; corpore toto glabro. *Art. gen. 17. syn. 31. Fn. 302.*  
*Rond. pesc. 325. Hippoglossus.*  
*Gesn. pesc. 667. 787. Hippoglossus.*  
*Aldr. ichth. 238 Hippoglossus ab aldrovando observatus.*  
*Charl. onom. 146. Passer britannicus.*  
*Schonef. ichth. 62. Passerum genus magus.*  
*Will. ichth. 99 Hippoglossus.*  
*Raj. pesc. 33. Hippoglossus.*  
*Suecic Hålg-flundra.*

ÖBS. vidimus in Gotlandia præter has, duas alias, ni fallor species: (vide It. gotland. 186) oculis sinistris radiis dors. 59. pector. 12. venter. 6. ani 38. caudæ 16.  
 oculis dextris — — — 57. — — 9. — — 6. — 39. — — 16.  
 Prior major immaculata; scabra posterior maculis ferrugineis; utraque vulgatissima ibi, vix pro distincta specie habenda.

## Labrus.

330. LABRUS *saillus* pinna dorsi ramentacea, macula nigra super caudam, spinis dorsalibus novem. *It. Wgottb. 179.*  
*Babusis Bergsuylira.*  
*Habitat in Oceano Babusiam alluente.*  
*Linea lateralis ante caudam curva.*

331. LABRUS *exsoletus* pinna dorsi ramentacea, corpore lineis cæruleis, pinna ani spinis quinque.  
*Babusis Blästahl.*  
*Habitat in Oceano versus Gothoburgum. Joh. Cederfeldt.*

## Perca.

332. PERCA *flavatilis* pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis sedecim. *Fn. 284.* *Art.*

*Art. gen.* 39. *syn.* 66. *spec.* 74. *Perca* lineis utrinque sex nigris, pinnis ventralibus rubris.

*Rond. pise.* 2. *p.* 196. *Perca* fluviatilis.

*Salv. pise.* 226. *f.* 224. *Perca* fluviatilis.

*Gesn. pise.* 698. *Perca* fluviatilis.

*Jonst. pise.* 146. *t.* 28. *L.* 29. *f.* 8. *Perca major.*

*Schonef. ichth.* 55. *Perca major.*

*Charl. onom.* 164. *Perca major.*

*Aldr. ichth.* 622. *Perca* fluviatilis major.

*Suecic* Abborre.

Habitat in mari, lacubus, fluviis, vulgatissimus piscis; in stagnis Fahlunæ hujus singularis *varietas* est, quæ spina recurva & dorso omnino gibbo frequens reperitur.

333. *PERCA marina* pinnis dorsalibus unitis: radiis XV spinosis, XIV imuticis, corpore lituris variegato.

*Perca* lineis utrinque VII transuersis nigris, ductibus miniacis cæruleisque in capite & antica ventris. *Art. gen.* 40. *syn.* 68.

*Norvegis* Uer f. Roeder.

Habitat in Oceano Norvegico frequens.

*DESCR.* Membrana branchiostega radiis 7.

334. *PERCA Lucioperca* pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis viginti tribus. *Fn.* 285.

*Art. gen.* 39. *syn.* 62. *spec.* 76. *Perca pallide maculosa*, duobus dentibus maxillaribus utrinque majoribus.

*Gesn. paralip.* 28. 1288. *Lucio Perca.*

*Aldr. ichth.* 667. *Schilus* f. *Nagemulus germanorum.*

*Jonst. pise.* 174. *t.* 30. *f.* 15. *Schilus.*

*Schonef. ichth.* 43. *Lucioperca.*

*Charlet. onom.* 164. *Schilus*. *Nagemulus.*

*Will. ichth.* 293. *Lucioperca.*

*Raj. pise.* 98. *Lucio-Perca.*

*Mars. danub.* 4. *p.* 9. *t.* 22. *f.* 2. *Lucioperca.*

*Suecic* Giōs.

Habitat in lacubus majoribus *Uplandia*, *Westmannia*, *Sudermannia* &c.

335. *PERCA Cernua* pinnis dorsalibus coadunatis: radiis viginti septem: aculeatis quindecim, cauda bifida *Fn.* 286.

*Art. gen.* 40. *syn.* 68. *spec.* 77. *Perca* dorso monoptygio, capite cavernoso.

*Gesn. pise.* 191. 226. *Cernua* fluviatilis.

*Aldr. ichth.* 624. *Perca* fluviatilis minor.

*Jonst. pisc. t. 28. f. Perca fluviatilis minor.*

*Charl. enom. 161. 158. Perca minor, quibusdam Cernua.*

*Schon. ichth. 56. Perca minor, Porcus, Procellus, Cernua nonnullorum*

*Will. ichth. 334. Cernua fluviatilis.*

*Raj. pisc. 144. Cernua fluviatilis.*

*Suecic Giers. Fahlunensibus Snorgers.*

Habitat in lacubus passim per Sueciam.

### Gasterosteus.

336. *GASTEROSTEUS aculeatus* spinis dorsalibus tribus,

*Art. gen. 52. syn. 80. spec. 26. It. W:goth. 239. Fn. 276.*

*Rond. pisc. 2. p. 206. Pisciculi aculeati prius genus.*

*Gesn. pisc. 8. Pisciculus aculeatus: primum genus.*

*Aldr. ichth. 628. Pungitius piscis.*

*Jonst. pisc. 146. t. 28. f. dextr. Pungitius alberti.*

*Will. ichth. 341. Pisciculus aculeatus.*

*Raj. pisc. 145. Pisciculus aculeatus.*

*Suecic Spigg. Wermelandis Hornfisk.*

Habitat in lacubus Uplandie.

337. *GASTEROSTEUS Pungitius* spinis dorsalibus decem,

*Art. gen. 52. syn. 80. spec. 97. Fn. 277.*

*Rond. pisc. 2. p. 206. Pisciculi aculeati alterum genus.*

*Gesn. pisc. 8. Pisciculi aculeati alterum genus.*

*Aldr. ichth. 628. Alterum genus Pungitii.*

*Jonst. pisc. t. 22. f. sinist. alterum genus Pungitii.*

*Will. ichth. 342. Piscis aculeatus minor.*

*Raj. pisc. 145. Pisciculus aculeatus minor.*

*Suecic Benunge. Dalis Gaddsfut. Dalekarl. Gorquadd.*

Habitat ubique in rivulis Uplandie, Lapponie, Dalekarlie, Ölandie &c.

338. *GASTEROSTEUS Spinachia* spinis dorsalibus quindecim.

*Art. gen. 52. syn. 81.*

*Will. ichth. 342. Aculeatus s. pungitius marinus longus.*

*Raj. pisc. 145. Aculeatus idem.*

Habitat in Oceano ad littora Babusie, D. D. Hartman.

### Scomber.

339. *SCOMBER Scombrus* pinnulis quinis.

Scom-

*Scomber* radiis pectoralium viginti, dorsalium duodecim.  
*Fn.* 287.

*Art. gen.* 30. *syn.* 48. *spec.* 68. *Scomber* pinnulis quinque  
 in extremo dorso, spina brevi ad anum.

*Rond. pisc.* 234. *Scomber*.

*Gesn. pisc.* 341. 1012. *Scomber*.

*Aldr. ichth.* 270. *Scomber*.

*Jonst. pisc.* 92. t. 21. f. 9. 11. *Scomber*.

*Salv. pisc.* 241. t. 239. *Scombrus*.

*Schonef. ichth.* 66. *Scomber*.

*Charl. onom.* 147. *Scomber*, *Scombrus*.

*Will. ichth.* 181. *Scomber*.

*Raj. pisc.* 58. *Scomber*.

*Suecic* Makrill.

Habitat in mari occidentali copiose, vicitat Medusis. E.

*N. C.* 1742. p. 488.

OBS. Viscus in abdomen multis infinitisque appendicibus fasciculatis  
 gaudet uti *Gadus*,

## Trigla.

340. TRIGLA *Hirundo* digitis ternis, linea laterali aculeata.

*Trigla* capite aculeato, appendicibus utrinque tribus ad pin-  
 nas pectorales. *Art. gen.* 24. *syn.* 73. *It.* *W:goth.* 176. \*

*Fn.* 281.

*Salv. pisc.* 194. *Coryus*.

*Aldr. ichth.* 136. *Hirundo* aldrovandi prior.

*Jonst. pisc.* t. 17. f. 8. *Hirundo*.

*Will. ichth.* 280. *Hirundo*.

*Raj. pisc.* 88. *Hirundo*.

*Suecic* Knorrhane. *Scanis* Knoding 326. *Marstrand*. Knot.  
*Hallenibus* Smed.

Habitat in mari occidentali.

DESCR. *Caput* quadratum cinereum punctis scabris varie striatum.

*Labium superius* emarginatum, superne glabrum, utrinque tribus aculeis  
 armatum; anticus horum longior.

*Orbita oculorum* superne deliquescentes. *Iris* cæsi coloris.

*Cirri* intra pinas ventrales & pectorales tres, truncati, æquales, arti-  
 culati, inferioribus brevioribus; cum a corpore removentur, incurvantur.

*Abdomen* argenteum.

*Dorsum* cinereum. *Latera* infra lineam longitudinalem maculis parvis  
 albicantibus & obsolete rubescens adspersum, supra lineam vero  
 punctis s. mactulis albis virescens. *Linea lateralis* punctis offeis pro-  
 minentibus exasperata albida.

*Membra* brachiofemora 7 radiis,

*Vesica* natatoria antice biloba.

*Captus* in abdome inimuratur, moribundus tremit.

## IV. ABDOMINALES.

## Cobitis.

341. COBITIS *Barbatula* cirris VI, capite inermi compresso.  
Cobitis tota glabra maculosa, corpore subtereti. *Art. gen.*

2. *syn.* 2. *Fn.* 332.

*Rond. pisc.* 2. *p.* 264. Cobitis barbatula.

*Gesn. pisc.* 404. Cobitis fluvialis barbatula.

*Aldr. ichth.* 618. Cobitis barbatula.

*Jonst. pisc.* t. 26 f. 22. Cobitis barbatula.

*Charl. onom.* 157. Cobitis barbatula.

*Schones. ichth.* 31. Cobitis fluvialis.

*Will. ichth.* 265. Cobitis fluvialis barbatula.

*Raj. pisc.* 124. Cobitis fluvialis barbatula.

*Suecic.* Grönling. Germanis Grundel.

Habitat in lacu Mälaren, istuc adlatus e Germania & satus  
a Rege FRIEDERICO I.

342. COBITIS *Tænia* cirris VI, spina suboculari.

Cobitis aculeo bifurco infra utrumque oculum.

*Art. gen.*

2. *syn.* 5. *spec.* 4. *Fn.* 333.

*Rond. pisc.* 2. *p.* 264. Cobitis aculeata f. altera.

*Gesn. pisc.* 404. 482. Cobitis aculeata.

*Aldr. ichth.* 617. Cobitis aculeata rondeletii.

*Jonst. pisc.* t. 26. f. 21. Cobitis aculeata.

t. 46. f. 1. Tænia cornuta.

*Charl. onom.* 157. Cobitis aculeata.

*Schones. ichth.* 74. t. 4. f. 1. Tænia cornuta.

*Will. ichth.* 265. Cobitis barbatula aculeata.

266. Tænia cornuta.

*Raj. pisc.* 124. Cobitis barbatula aculeata.

*Mars. danub.* 4. *p.* 3. t. 1. f. 2. Cobitis aculeata.

*Suecic.* Tånglake.

Habitat in Mälero lacu.

343. COBITIS *fossilis* cirris VIII, spina supra oculari.

*Art. gen.* 2. *syn.* 3. Cobitis cærulescens, lineis utrinque 5 longitudinalibus.

*Mus. Ad. Fr.* 76. idem.

Habitat Ulricædahlæ in piscinis sata.

## Silurus.

344. SILURUS *Glavis* pinna dorsali unica, cirris VI. *It. scan.*

61. \* *Gadus*

Gadus dorso monopterygio, cirrhis maxillæ superioris duobus, inferioris quatuor. *Fn. 291.*

*Art. gen. 82. syn. 110. spec. 107.* Silurus cirrhis quatuor im-

mento.

*Rond. pisc. 2. p. 180.* Silurus.

*Salv. pisc. 210.* Glanis f. piscis barbatus.

*Gesn. pisc. 867. 872. 1047.* Silurus.

*Aldr. ichth. 569.* Glanis.

*Fonst. pisc. t. 27. f. 8.* Glanis.

*Mars. danub. 4. p. 7. t. 2.* Silurus 1. Glanis.

*Schonef. 69.* Silurus.

*Will. ichth. 128.* Silurus.

*Raj. pisc. 70.* Silurus.

*Suecic. Mahl.*

Habitat in lacubus Smolandiae & Sudermanniae, rarus piscis & maximus.

### Salmo.

345. SALMO Salar rostro ultra inferiorem maxillam prominentem. *Art. gen. 11. syn. 22. spec. 48. Fn. 306.*

*Rond. pisc. 2. p. 167.* Salmo.

*Salv. pisc. 100.* Salmo.

*Gesn. pisc. 824.* Salmo.

*Aldr. ichth. 483.* Salmo vulgaris.

*Fonst. pisc. 106. t. 23. f. 1.* Salmo.

*Schonef. ichth. 64.* Salmo nobilis.

*Charl. onom. 150.* Salmo.

*Will. ichth. 189.* Salmo.

*Raj. pisc. 63.* Salmo.

*Suecic. Lax.*

Habitat in fluviis maximis totius Sueciae, quos adscendit ovum depositurum; & quidem hoc in australioribus Provinciis maturius, at in borealis serius; in his uti Tornoë & Keimi, seu ad apicem maris Bothnic; copiosissimus est; rarius apud nos hyemes transigit, uti in lacu Siljan Dalekarliæ, tumque facie multum mutatur.

OBS. Variat maxilla vix manifeste inflexa, & maxilla inferiore angusta, digitus instar, sursumq. inflexa intra sinum maxillæ superioris; hanc notam credidere nostri speciem distinctam indigitare, at multoties differui Pisces, omnes autem maxilla adunca esse inveni intellexi, reliquas vero fæminas.

*Art. spec. 80.* SALMO minor vulgari similis. *Suecic. Laxunge.* Non inducor, ut credam hunc specie differre a precedentí, sed tantum aetate.

346. SALMO Erios maculis cinereis, caudæ extremo æquali.

*Art. gen. 12. syn. 23. Fn. 307.*

123 PISCES ABDOMINALES. SALMO.

*Will. ichth. The* *grey i. e. cinereus aut griseus.*

*Raj. pise. 63.* *Salmo cinereus aut griseus.*

*Suecic.* Grålax.

Habitat cum præcedente, a quo vix specie differre crediderim.

347. SALMO *Trutta* ocellis nigris iridibus brunneis, pinna pectorali punctis sex. *Fn. 308.*

*Art. gen. 12. syn. 24. spec. 51.* *Salmo latus, maculis rubris nigrisque, cauda æquali.*

*Charl. onom. 155.* *Trutta taurina.*

*Will. ichth. 193.* *Trutta salmonata.*

*Raj. pise. 63.* *Trutta salmonata.*

*Suecic* Örlax; Börting.

Habitat in Dalekarliæ & Norlandiæ fluviosis frequentior, quam in aliis provinciis.

DESCR. Color dorsi cinereus, pinna Dorsi 12 radiis, adspersa nigris punctis. Pectoralis 13 cinerea: punctis 6 longitudinaliter digestis. Ventralis 10 cinerea. Ani 9 vel 10 etiam cinerea; Cauda 20 integra, vix punctata, adiposa, fusca est. Venter albus est.

Latera totius pisces, etiam capitis, maculis nigris magnitudine pisii angulatis, colore brunneo cinetis adsperguntur.

Dentes maxillarum simplici ordine, lingua duplice; in singulo 5 dentes; palatum tribus ordinibus denticularum, quorum laterales simplices, at intermedius serie duplice alterna.

348. SALMO *Fario* maculis rubris, maxilla inferiore sublongiore. *Art. gen. 12. syn. 23. spec. 51. Fn. 309.*

*Rond. pise. 2. p. 169.* *Trutta fluviatilis.*

*Gesn. pise. 1002.* *Trutta fluviatilis rondeletii.*

*Aldr. ichth. 589.* *Trutta fluviatilis rondeletii, gesneri.*

*Foëst. pise. t. 26. f. 1.* *Trutta fluviatilis.*

*Salv. pise. 96.* *Salar & varius.*

*Charl. onom. 155.* *Trutta fluviatilis vulgaris.*

*Schonef. ichth. 77.* *Truta vel Trutta vulgo, Forina & Forio.*

*Will. ichth. 199.* *Trutta fluviatilis.*

*Raj. pise. 63.* *Trutta fluviatilis.*

*Suecic* Laxöring, Forell, Stenbit.

Habitat frequens in fluviosis.

DESCR. Præcedens communiter duos pedes, hic raro pedem unum adtingit: Cauda obtusa leviter bifurca. Pinna ani margine anteriore nivea. Pinnae pectorales non punctatae. Adiposa apice rufescit. Dorsum etiam maculatum est, licet obscure. Maculae supra lineam longitudinaliem confertæ, nigrae, pallido cinctæ colore; infra hanc lineam sunt maculae purpureæ & nigrae mixtæ.

349. SALMO *alpinus* dorso nigro, lateribüs cœruleis, ventre fulvo. *Fn. 310.*

*Art.*

*Art. gen.* 13. *syn.* 25. *spec.* 52. *Salmo vix pedalis*, pinnis ventris rubris, maxilla inferiore paullo longiore.

*Gesn. pisc.* 1201. *Umbla minor.*

*Aldr. ichth.* 650. *Umbla minor alia.*

*Charl. onom.* 163. *Umbla minor.*

*Will. ichth.* 196. *Umbla minor.*

*Raj. pisc.* 65. *Umbla minor.*

*Suecis* Röding. *Lapponibus Raud.*

Habitat in lacubus *alpium Lapponicarum* summis vulgatis simus & fere unicus piscis: quibus cibis vitam sustentet non video, cum nec vermiculis scatent aquæ hæ, semper gelidæ, nec herbis.

*DESCR.* *Longitudo* communiter unciarum 13. *Squamæ minutissimæ* sunt. *Caput* glabrum, ovatum, obtusum. *Maxillæ* dentatae. *Lingua* duobus ordinibus dentium, singulo hoc ordine 6 dentibus constante. *Palatum* ad latera dentatum. *Nares* parvæ dupli foranine in singulo latere, altero supra alterum, quorum inferius majus clausum. *Oculorum iris grisea* pupilla nigra; infra oculos in mala seu osse carnis vestito puncta 7 excavata longitudinaliter digesta: in eodem osse posterius puncta 3 perpendiculari ordine collocata. *Membrana branchiosæga* 10 ossiculis.

*Pinna dorsi* radiis 12: quorum 2 priores sensim longiores, tertius & quartus longissimi cum sequentibus divisi.

*Color* totius Piscis supra a *dorso* niger est, ad latera cyanens s. dilute cæruleus: *venter* vero fulvus s. rubro-luteus: *caput* & *gula* alba sunt: *pinnæ ventrales* rubræ, exteriori marginे albæ; puncta lutescentia secundum linam lateralem longitudinaliter lateribus adspersa sunt. *Cauda* bifurca colore lateris.

*Proportio* a rostro ad basin capitinis unc. 1 $\frac{1}{2}$ , a capite ad pinnam dorsi unc. 3 $\frac{1}{2}$ ; dorsalis pinnæ basis unc. 1 $\frac{1}{2}$ , ejusdem altitudo unc. 2; a dorsali pinnæ ad adiposam unc. 3; a cauda ad adiposam unc. 2 $\frac{1}{2}$ ; a cauda ad pinnam ani unc. 1 $\frac{1}{2}$ . *Caro* omnium sapidissima, ruberrimo pulchro colore.

*OBS.* De synonymis antiorum hærcō, cum descriptiones insufficientes sint; apud nos vix nisi in Lacubus Lapponiae alpinæ occurrit, aut in eorum fluijs descendantibus interdum parce.

350. *SALMO Eperlanus* capite diaphano, radiis pinnæ ani XVII.

*Osmerus* radiis pinnæ ani septendecim. *Art. gen.* 10. *syn.* 21. *Fn.* 311.

*Art. spec.* 45. *Osmerus.*

*Rond. pisc.* 2. *p.* 196. *Eperlanus.*

*Gesn. pisc.* 362. 430. *Eperlanus.*

*Aldr. ichth.* 536. *Eperlanus gesneri.*

*Fonst. pisc.* t. 24. f. 3. *Eperlanus.*

t. 47. f. 6. *Spirinchus.*

*Schonef. ichth.* 70. *Spirinchus.*

*Charl. onom.* 153. *Eperlanus.*

*Will. ichth.* 202. *Eperlanus.*

*Raj. pisc.* 66. *Eperlanus.*

*Suecic* Nors, Sloim.

Habitat frequens in *Uplandiae* & *Dalekarliæ* lacubus, ut & alibi.

OBS. Duplex est varietas: alter enim *SLOM* nostris dicitur & major est nec fœter: alter vero *NORS* nominatur, longe minor, fetidissimus, stercoris instar, quo fœtore implet plateas upplienses primo vere dum rustici urbem accedunt, ut emant hunc pisces, tumque Querqueræ regnant.

351. SALMO *Wimbra* pinna adiposa subserrata. *It, W:goth.* 231.

*Dalis* Wimma

Habitat in Dalia ad Åhmäl.

*Cauda forficata*. Linea lateralis recta.

352. SALMO *Lavaretus* maxilla superiore longiore, radiis pinnae dorsi XIV.

*Coregonus* maxilla superiore longiore plana, pinna dorsi officulorum quatuordecim. *Art. gen. 10. syn. 19. spec. 37. Fn. 312.*

*Gesn. pisc. 33. Albula nobilis.*

*Schonef. ichth. 12. Albula nobilis major f. laetus.*

*Fonst. pisc. t. 46. f. 1. Albula nobilis.*

*Raj. pisc. 60. Albula nobilis.*

61. *Lavaretus allobrogum.*

*Will. ichth. 183. Lavaretus allobrogum.*

*Suecic* Sijk, Stor-Sijk.

Habitat in lacubus variis Sueciæ.

353. SALMO *Albula* maxillis edentulis; inferiore longiore.

*Coregonus* maxilla inferiore longiore. *Art. gen. 9. syn. 13. spet. 40. Fn. 313.*

*Gesn. pisc. 34. Albula minima.*

*Aldr. ichth. 660. Albula minima.*

*Fonst. pisc. 173. t. 30. f. 7. Albula minima.*

*Charl. onom. 164. Albula minima.*

*Will. ichth. 186. Albula minima.*

*Raj. pisc. 61. Albula minima.*

*Suecic* Sjklöja, Småsjjk. *Dalekarlis Blikta. Norlandis* Stint. *Fennonibus Moiku.*

Habitat in plurimis lacubus Sueciæ; parit circa initium hymnis.

354. SALMO *Thymallus* maxilla superiore longiore, pinna dorsi radiis XXIII.

*Coregonus* maxilla superiore longiore, pinna dorsi officulorum viginti trium. *Art. gen. 10. syn. 20. spec. 41. Fn. 314. Rond.*

- Rond. pisc.* 2. p. 187. *Thymus*.  
*Salv. pisc.* 81. t. 80. *Thymus* f. *Thymallus*.  
*Gesn. pisc.* 978. *Thymallus* l. *Thymus*.  
*Aldr. ichth.* 594. *Thymallus*.  
*Fonst. pisc.* t. 26. f. 3. 4. 5. & 31. f. 6. *Thymallus*.  
*Charl. onom.* 155. *Thymallus*.  
*Will. ichth.* 187. *Thymallus*.  
*Raj. pisc.* 62. *Thymallus*.  
*Mars. danub.* 4. p. 75. t. 25. f. 2. *Thymallus*.  
*Suecis* Harr.

Habitat in *Angermannia* & variis *Norlandiae* partibus.

*DESCR.* *Facies* *Albulæ*, glabra. *Os dentibus* utrinque minutissimis: *rostrum* obtusum; *maxillæ* tere. æquales. *Membrana branchiostega* radiis 9. *Pinna* *dorsi* in medio *dorsi*, reliquis major, altitudine & longitudine eadem; radiis 21, mollibus, quorum quinque anteriores sensim breviores simplices, reliqui ramosi; pinna abrupta est; *adiposa* ut in reliquis absque radiis. *Cauda* bifurcata ad medium; radiis multis articulatis multifidis. *Pinna ani* abrupta; radiis 12 dichotomis. *Pectorales* radiis 11 dichotomis. *Ventrales* radiis 15 multifidis.  
*Intestina* hujus pisces coaguli vices supplent apud Lappones pro conficiendo caseo e lacte Rhœnonum, coagulo cum alio non intruantur.

## Esox.

355. ESOX *Lucius* rostro depresso subæquali.

*Esox* rostro plagioplateo. *Art. gen.* 14. *syn.* 26. *spec.* 53. *Fn.* 304.

- Rond. pisc.* 2. p. 188. *Lucius*.  
*Salv. pisc.* 94. *Lucius*.  
*Gesn. pisc.* 500. *Lucius*.  
*Aldr. ichth.* 630. *Lucius*.  
*Fonst. pisc.* t. 29. f. 1. *Lucius*.  
*Schönenf. icht.* 44. *Lucius*.  
*Charl. onom.* 162. *Lucius*.  
*Will. ichth.* 236. *Lucius*.  
*Raj. pisc.* 12. *Lucius*.  
*Mars. danub.* 4. p. 63. t. 22. f. 1. *Lucius*.  
*Suecis* Gjædda.

Habitat ubique in lacubus & flaviis, præsertim copiose in Lapponicis.

356. ESOX *Belone* rostro utræque maxilla subulato.

*Esox* rostro cuspidato gracili subtereti spithamali. *Art. gen.* 14. *syn.* 27. *Fn.* 305.

- Rond. pisc.* 227. *Acus* prima species;  
*Salv. pisc.* 68. *Acus* pisces.

*Gesn.*

*Gesn. pisc. 9.* *Acus prima species.*

*Aldr. ichth. 106.* *Acus vulgaris s. oppiani.*

*Charl. onom. 136.* *Acus.*

*Schonef. ichth. 11.* *Acus prima species.*

*Will. ichth. Acus vulgaris s. oppiani.*

*Raj. pisc. 109.* *Acus vulgaris s. oppiani.*

*Suecic Nåbbgjädda.* *Bahusiensibus Horngiäll.*

Habitat in mari Occidentali frequens.

**DESCR** Caput quadratum, superne viride, lateribusque argenteis glabris. Oculi albi, pupilla nigra. Nares magnæ papilla refertæ. Os subulatum capite ipso longius; maxilla inferior longior, sed apice carneo. Dentes in margine utriusque maxillæ; pauci in medio palato secundum areolam longitudinalem minimam. Membrana branchiostega ossiculis 12, non vero 14. Corpus subteres, parum compressum, flexible, superne viride, sub linea laterali argenteum.

Pinnæ pectorales ad basin capitis, radiis 13, articulatis ramosisque, excepta prima indivisa.

Pinnæ ventrales remotissimæ a capite, radiis 7, quorum primus longior indivisus.

Pinnæ ani longa, falcata, interrupta, radiis 20: quorum tres primi indivisi; horum primus minimus, secundus maximus.

Pinnæ dorsi exæste opposita pinnæ ani, ejusdemque figuræ & longitudinis, interrupta & falcata, radiis 16: primo minimo indiviso, secundo tertioque maximo.

Lineæ laterales in medio laterum, obsoletæ: Lineæ ventrales tres, quarum laterales duæ oppositæ a gula tendunt ad exteriorem marginem pinnarum ventralium versus caudam; intermedia vero a gula recta versus anum.

Maxilla utraque mobilis, superior mediante cartilagine, quo cranio annexa est, exferens utrinque extra oris finum prominentiam osseam, quæ recipitur a finu capiti insculpto;

Dentes subulati, distantes, ad oris interioris marginem majores: denticuli acerosi, minimi vix conspicui, sparsi citra ordinem maxillæ adnascentur.

Lingua glabra: Cranium pellucidum. Vertebræ 79. Ossa viridia.

## Clupea.

357. CLUPEA, *Harengus* immaculata, maxilla inferiore longiore. Art. gen. 7. syn. 14. spec. 37. Fn. 315. It. scan. 221. 325.

a *Rond. pisc. 222.* *Harengus.*

*Gesn. pisc. 408. 486.* *Harengus.*

*Aldr. ichth. 294.* *Harengus flandricus.*

*Fonst. pisc. t. 1. f. 6.* *Harengus.*

*Schonef. ichth. 36.* *Harengus.*

*Will. ichth. 219.* *Harengus.*

*Raj. pisc. 103.* *Harengus.*

*Suecic Sill.*

*Rond.*

*Rond. pisc.* 220. Membras.

*Gesn. pisc.* 74. 85. Membras.

*Aldr. ichth.* 212. Membras rondeletii.

*Jonst. pisc.* t. 19. f. 14. Membras.

*Charl. onom.* 143. Membras.

*Suecic* Strömming.

Habitat in mari, quarum & Sill major plerumque, ex mari occidentali; *β* Strömming vero minor ex mari Bothnico.

358. CLUPEA *Sprattus* pinna dorsi radiis XIII.

Clupea quadriuncialis, maxilla inferiore longiore, ventre acutissimo. *Art. gen.* 7. *syn.* 17. *spec.* 33. *Fn.* 316.

*Raj. pisc.* Spratti.

*Suecic* Hwassbuk.

Habitat in mari.

## Cyprinus.

359. CYPRINUS *Carpio* pinna ani radiis 9, cirris 4, pinnæ dorsalis radio secundo postice ferrato.

Cyprinus cirrhis quatuor, officulo tertio pinnarum dorsi ani que uncinatis. *Art. gen.* 4. *syn.* 3. *spec.* 25. *Fn.* 317.

*Rond. pisc.* 2. p. 150. Cyprinus.

*Salv. pisc.* 92. t. 91. Cyprinus rondeletii.

*Gesn. pisc.* 309. 164. Cyprinus.

*Aldr. ichth.* 637. Cyprinus.

*Jonst. pisc.* t. 29. f. 3. 4. 6. Cyprinus.

*Schonef. ichth.* 32. Cyprinus nobilis, Cyprianus, Carpa.

*Petit. act. gall.* 1733. p. 274. t. 15. Carpio.

*Charl. onom.* 162. Cyprinus.

*Will. ichth.* 545. Cyprinus.

*Raj. pisc.* 115. Cyprinus.

*Suecic* Karp.

Hospitatur in piscinis Magnatum scaniae & colitur. *It. scan.* 378.

e Germania adducti vivi venales prostat Holmiæ, cibus sapidissimus nepotum.

360. CYPRINUS *Brama* pinna ani radiis 27, pinnis fuscis.

*Fn.* 318.

*Art. gen.* 6. *syn.* 4. *spec.* 22. Cyprinus pinnis omnibus nigrescentibus; pinna ani officulorum viginti septem.

*Rond. pisc.* 2. p. 154. Cyprinus latus f. Brama.

*Gesn. pisc.* 316. 317. 165. Cyprinus latus f. Brama.

*Aldr. ichth.* 641. Cyprinus latus.

*Jonst. pisc.* 165. t. 29. f. 5. Cyprinus latus.

*Schonef.*

*Scone*. *ichth.* 33. *Cyprinus latus vel Brama.*

*Charl. onom.* 162. *Abramus; Cyprinus latus.*

*Will. ichth.* 248. *t. 2. 10. Cyprinus latus s. Brama.*

*Raj. pisc.* 116. *Cyprinus latus s. Brama.*

*Suecic* *Braxen.*

Habitat in plerisque lacubus *Sueciæ*, parit eo tempore, quo Juniperus mas floret polline inque effundit.

Varietas *gibbosa* in lacu wettero ad Askersund.

361. CYPRINUS *Aspius* pinna ani officulorum 16, maxilla inferiore longiore incurva. *Fn.* 319.

*Art. gen. 6. syn. 24. spec. 14. Cyprinus maxilla inferiore longiore cum apice elevato; pinna ani officulorum quindecim.*

*Suecic* *Asp.*

Habitat in Lacu Mælero *Uplandiaæ*; fluvium Sahlam, Uppsaliam usque, adscendit primo vere.

362. CYPRINUS *Idus* pinna ani officulis 13 arubra. *Fn.* 320.

*Art. gen. 5. syn. 14. spec. 6. Cyprinus iride sublutea; pinnis ventralibus ante rufis.*

*Suecic* *Id. Eßkelstuna Tiocksfälling.*

Habitat in lacubus, fluviis & sinibus maris Balthici, præsertim in *Uplandia* & *Sudermannia*.

363. CYPRINUS *Tinca* pinna ani radiis 25, cauda integra, corpore mucoso.

*Cyprinus* pinna ani officulis undecim, cauda integra. *Fn.* 321.

*Art. gen. 4. syn. 5. spec. 27. Cyprinus mucosus totus nigrescens, extremitate caudæ æquall.*

*Rond. pisc. 2. p. 157. Tinca.*

*Salv. pisc. 90. t. 89. Tinca.*

*Gesn. pisc. 984. Tinca.*

*Aldr. ichth. 646. Tinca.*

*Jonst. pisc. 146. t. 29. f. 7. Tinca.*

*Charl. onom. 162. Phycis vel Merula fluviatilis.*

*Schonef. ichth. 76. Tinca.*

*Will. ichth. 251. Tinca.*

*Raj. pisc. 117. Tinca.*

*Suecic* *Sutare, Linnare, Skomakare.*

Habitat in lacubus passim lutosis.

364. CYPRINUS *Carassius* pinna ani radiis 10, cauda integra, linea laterali recta.

*Cyprinus* pinna ani officulorum viginti, linea laterali recta.

*Art. gen. 4. syn. 5. spec. 29. Fn. 322.*

*Gesn.*

# PISCES ABDOMINALES, CYPRINUS 129

Gesn. pisc. 222. 166. Charax.

Aldr. ichth. 644. Cyprinus latus aliis.

Jonst. pisc. 165. t. 27. f. 12. Cyprinus latus aliis.

Will. ichth. 249. Carassius simpliciter dictus.

Raj. pisc. 116. Carassius simpliciter dictus.

Suecic Ruda. Scanis Carussa.

Habitat in lacubus lutosis passim per Sueciam.

## 365. CYPRINUS Ballerus pinna ani officulorum 40. Fn. 323.

Art. gen. 3. syn. 12. spec. 23. Cyprinus admodum latus & tenuis, pinna ani officulorum quadraginta.

Rond. pis. 2. p. 154. Ballerus.

Gesn. pisc. 24. Piscis Blicka germanorum, qui Alburnus lacustris dici potest.

Aldr. ichth. 645. Ballerus rondeletii.

Jonst. pisc. 165. t. 27. f. 7. Ballerus.

Charl. onom. 162. Ballerus aristotelis.

Schonef. ichth. 28. Ballerus.

Raj. pisc. 117. Ballerus.

Suecic Blicka, Braxenpanká, Smolandis Braxenficka.

Habitat in omnibus facile Sueciae lacubus vulgarissimus.

## 366. CYPRINUS Erythrophthalmus pinna ani radiis 14, pinnis rubris. Fn. 324.

Art. gen. 3. syn. 4. spec. 9. Cyprinus iride pinnis omnibus caudaque rubris.

Will. ichth. 249. Rootaug i. e. Erythrophthalmos germanus dictus, Bramis adfinis.

Raj. pisc. 116. Rootaug.

Suecic Sarf. Westrobotniensibus Isarf.

Habitat Upsaliæ vulgaris & Pithoæ Westrobotniae.

OBS. Puncta lineæ lateralis 60 elevata.

## 367. CYPRINUS Grislagine pinna ani radiis 11, pinnis albentibus. Fn. 325.

Art. gen. 5. Cyprinus oblongus, iride argentea, pinnis albentibus.

Art. syn. 5. spec. 12. Cyprinus oblongus; figura rutili, pinna ani officulorum decem.

Will. ichth. 263. Grislagine augustæ dictus Gobii fluviatilis species: germani enim Gobium Grefling vocant.

Raj. pisc. 123. Grislagine augustæ dictus, Gobii fluviatilis species.

Angermannis Stäm.

Habitat in Angermannia & Westrobotnia.

130 PISCES ABDOMINALES. CYPRINUS.

368. CYPRINUS *Wimba* pinna ani radiis 24, rostro nasiformi. Fn. 326.

*Art. gen. 6. syn. 14. spec. 18.* Cyprinus rostro nasiformi, dorso acuminato, pinna ani ossiculorum viginti quatuor. *Suecic* Wimba.

Habitat in lacu Mælero & amne Upsaliensi.

369. CYPRINUS *Farenus* pinna ani radiis 37, iridibus flavis. Fn. 327.

*Art. gen. 3. syn. 13. spec. 23.* Cyprinus iride flava, pinna ani ossiculorum triginta septem.

*Suecic* Faren.

Habitat in Lacu Mælero; præsertim ad pontem Oresundsbro.

370. CYPRINUS *culturatus* pinna ani radiis 30, linea laterali declinata, ventre acutissimo. It. scan. 82. t. 82.

*Scanis* Skierknif.

Habitat in M. Balthico ad Christianstad.

371. CYPRINUS *Björkna* pinna ani radiis 35. Fn. 328.

*Art. gen. 3. syn. 13. spec. 23.* Cyprinus quincuncialis pinna ani ossiculorum viginti quinque.

*Suecic* Björkna.

Habitat in Uplandie lacu Mælero.

OBS. In speciei hujus pisce numeravi radios pinnae ani triginta quinque.

372. CYPRINUS *Rutilus* pinna ani radiis 12. rubicunda. Fn. 329.

*Art. gen. 3. syn. 10. spec. 10.* Cyprinus iride pinnisque ventris ac ani plerumque rubentibus.

*Gesn. pis. 820.* Rutilus s. Rubellus fluviatilis.

*Aldr. ichth. 621.* Rutilus gesneri.

*Zonst. pis. 130. t. 26.* Rutilus fluviatilis gesneri.

*Schonef. ichth. 63.* Rutilus, Rubellio & Rubiculus.

*Charl. onom. 158.* Rutilus s. Rubellus fluviatilis.

*Will. ichth. 262.* Rutilus s. Rubellus fluviatilis.

*Raj. pis. 122.* Rutilus s. Rubellus fluviatilis.

*Suecic* Mör.

Habitat in omnibus lacubus Suecæ omnium vulgatissimus pisces, vulgo ova ponit dum Caltha florescit.

373. CYPRINUS *Alburnus* pinna ani radiis 20. Fn. 330.

*Art. gen. 6. syn. 10. spec. 17.* Cyprinus quincuncialis, pinna ani ossiculorum viginti.

*Rond. pis. 2. p. 208.* Alburnus.

*Gesn.*

*Gesn.* pisc. 23. *Alburnus ausonii.*  
*Aldr.* iuctb. 6 8. *Alburnus ausonii.*

*Jonst.* pisc. 146. s. 29. f. 13 *Alburnus ausonii.*

*Schonef.* ichth. 11. *Albula minor.*

*Charl.* nom. 161. *Alburnus ausonii.*

*Will.* ichth. 263. *Alburnus ausonii.*

*Raj.* pisc. 123. *Alburnus ausonii.*

*Suecic* Lôja.

Habitat in Suecia, omnium vulgarissimus in omni lacu.

374. CYPRINUS *Aphyia* pinna ani radiis 9; iridibus rubris, corpore pellucido. Fn. 331. It. W:goth. 132. 233.

*Art. gen.* 4. *syn.* 13. *spec.* 30. *Cyprinus biuncialis*, iridibus rubris & pinna ani officiorum novem.

*Rud.* pisc. 208. *Aphyia vera.*

*Mars.* danub. 4. p. 24. t. 9. f. 1. *Cobitis fluviatilis?*

*Suecic* Mudd, Budd. *Dalekarlis* Quidd, Iggleing. *Westro-*

*botniensibus* Glirr, Glirren. *W:gothis* Gli. *Dalis*. Alkuwa.

*O:gothis* Alkutta. *Lappis* Söllsetisodg.

Habitat in fluviis *Dalekarliæ*, *Lapponiæ*, *Uplandie*; saepius in parvis rivulis & lacubus.

OBS. an hic sit idem cum Cypriho tridactylo vario oblongo teretiusculo, pinna ani officiorum VIII Arted?

DESCR. Facies Truttae s. Salmonis; Longitudo digiti; dorso tereti pinguisimo, secundum spinam itaque concavus. Color dorsi castus, cuius maculæ fuscescunt ut in Perca. Iris oculorum alba cum rubedinis mixtura. Pinna dorsalis pone æquillbrunni, radis octo dichotomis; primo simplicissimo. Cauda bifurca radiis 19. Pinna ani paulo potie dorsalem radiis 9. Ventrales radiis 7. pectorales 11 vel 12 radiis; maxilla inferior superiore paullò brevior. Os nasale pedem bovis referens, ut in toto Cyprinaceo genere; Squamæ vix conspicuæ. Dum perit & coit caput variolis adspersum ut in congeneribus. Dorsum fulcum ad latera punctis omnium minutissimis nigricantibus veluti per fascias (uti Perca) pingitur.

OBS. In Dafnia a Magnatibus educatus fuit *Cyprinus* pinna ani duplice, cauda trifurca. Art. Stockh. 1740 p. 403. l. 1. f. 3. 4. 5. 6. 7. 8. unde eundem habuimus & descripsimus loco allegato; Non dubitamus, quia hic Piscis, colores si species omnium piscium pulcherrimus, e China in Sueciam introducatur, & toti Europæ fieri æquic vulgaris ac Pavo, in Mag- natum obiectamentum.

## V. BRANCHIOSTEGI.

### Syngnathus.

375. SYNGNATHUS *Ophidion* pinnis caudæ ani pectoralibus que nullis, corpore tereti.

132 PISCES BRANCHIOSTEGI. SYNGNATHUS.

Syngnathus teres, pinnis pectoralibus caudæque carent.

Art. gen. 1. syn. 2. spec. 1. Fn. 334.

Will. ichth. 160. Acus lumbriciformis aut septimus.

Raj. pisc. 47. Acus lumbriciformis s. Ophidion lumbriciforme.

Suecic Hafsnäh. Hallensibus Tangsnipa.

Habitat in mari Balthico & Botnico.

376. SYNGNATHUS *Acus* pinnis caudæ ani pectoralibusque radiatis, corpore septemangulato.

Syngnathus corpore medio heptagono, cauda pinnata. Art. gen. 1. syn. 2. spec. 2. Fn. 335.

Gesn. pisc. 1025. Typhle.

Will. ichth. 159. Acus aristotelis species altera major.

Raj. pisc. 46. Acus aristotelis species altera major.

Suecic Kaitnäh.

Habitat in mari Balthico.

377. SYNGNATHUS *Typhle* pinnis caudæ ani pectoralibusque radiatis, corpore sexangulato.

Syngnathus corpore medio hexagono, cauda pinnata. Art. gen. 1. syn. 1. spec. 3. Fn. 336.

Rond. pisc. 229. Acus secunda species s. Acus aristotelis.

Gesn. pisc. 9. 11. Acus secunda species s. Acus aristotelis.

Aldr. ichth. 105. Acus aristotelis.

Jonst. pisc. 52. t. 15. f. 14. Acus aristotelis.

Salv. pisc. 68. f. 2. Piscis septimus.

Will. ichth. 158. Acus aristotelis s. Acus secunda species.

Raj. pisc. 46. Acus aristotelis s. Acus secunda species.

Habitat in mari Balthico.

## Classis. IV.

## INSECTA.

## I. COLEOPTERA.

## Scarabæus.

378. SCARABÆUS *Nasicornis* thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvato.

Scarabæus capite unicorni recurvo, thorace gibbo, ab domine hirsuto. Fn. 340.

Olear. mus. 27. t. 16. f. 4. Scarabæus nasicornis.

Fonst. inf. t. 15. n. 2. Scarabæus Buceros nasicornis.

Imper. alt. p. 694. Scarabæus Rhinoceros f. 1. 2 3.

Worm. mus. p. 242. Monoceros.

Jacob. mus. dan. part. 1. f. 5. n. 20. Scarabæus nasicornis.

Barthol. unic. p. 54. Scarabæus monoceros.

Stalpart. obs. p. 468. t. 9. f. 2. mala.

Hoffn. inf. t. 13. f. antepenult. edit. alt. 3. t. 1.

Frisch. germ. v. 3. p. 6. t. 3. f. 1. Scarabæus nasicornis.

Svam. bibl. t. 27. f. 1. 2.

Habitat in ligno putrido & vaporariis Hortulanorum.

Simillimus Scar. Monoceroti, sed absque thoracis concavitate longitudinali. Pedum anteriorum dentes obtusi, excepto primo.

379. SCARABÆUS *lunaris* thorace bicorni: intermedio obtuso bifido, clypeo emarginato, cornu erecto.

Scarabæus capitis clypeo lunato margine elevato, corniculo emarginato. Fn. 341.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Facies Scarabæi stercorarii: Caput tegitur clypeo lunato, magno, margine elevato, antice emarginato, in cuius medio *Corniculum* breve, emarginatum. Thorax gibbus, laevis, in medio margine acuto proximulo, longitudinaliter linea exaratus. Elytra laevia, singula 7. f. 8. fulcis minus profundis.

380 SCARABÆUS *cylindricus* thorace antice truncato quinque dentato, capite antice cornu erecto, corpore cylindrico.

Fn. 312.

Habitat passim.

*DESCR.* Niger, parvus, fere cylindricus: *Cornu* ex apice rostri erectum, antice glabrum, pone villis fulvis hirtum. *Thorax* cylindricus, crassus; supra glaber, antice excavato-truncatus, margine quinquedentato, quo-rum dens intermedius utrinque cavitate distinctus. *Elytra* sulcata punctis excavatis scabra.

381. *SCARABÆUS nuchicornis* thorace inermi, occipite spinâ erectâ armato, scutello nullo.

*Scarabæus* capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro-nebulosis. *It. oel.* 41. *Fn.* 354.

*Raj. inf. p.* 106. *Scarabæus pilularis* 9. *wilugb.*

*Act. upf.* 136. *p. 16. n. 2.* *Scarabæus parvus*, capite collarique nigro, elytris nebulosis.

*Lift. mut. t. 18. f. 18.*

Habitat sub stercore Suillo, primo vere frequens:

Similimus *Scar. bovino*, sed *Elytra* subferruginea punctis nigris irrorata. *Scutellum* nullum.

382. *SCARABÆUS subterraneus* thorace inermi glabro, capite triplici tuberculo, elytris striis crenatis.

Habitat in collibus.

*DESCR.* Parvus, niger *Clypeus* obtusissimus. *Thorax* punctis rarioribus adspersus. *Elytra* striata striis singularibus excavato punctatis.

383. *SCARABÆUS erraticus* thorace inermi lœvi, capite tuberculo unico, elytris testaceis.

Habitat passim in viis.

*DESCR.* *Thorax* convexus, lœvis, uti totum corpus nigrum. *Elytra* testacea.

384. *SCARABÆUS Fosser* thorace inermi subretuso, capite tuberculo triplici; medio subcornuto.

*Scarabæus* ovatus ater glaber. *Fn.* 352.

*Act. upf.* 136. *p. 16. r. 4.* *Scarabæus parvus* oblongus ater, elytris striatis.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* *Corpus* odore moschi totum atrum, glabrum, lœve, nitidum. *Elytra* oblonga, concolorata, striata sed vix conspicue. *Antennæ* lamellate. *Ale* fusca. *Thorax* valde convexus.

385. *SCARABÆUS fimetarius* thorace inermi, capite tuberculato, elytris rubris, corpore nigro.

*Scarabæus* capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris. *Fn.* 355.

*Frisch. germ.* 4. *p. 35. t. 19. f. 3.* *Scarabæus equinus* medi-us, coleoptris rubris, collari nigro.

*Act. sps.* 1736. p. 16. n. 6. *Scarabæus parvus niger, elytris antennisque rubris.*

*β Scarabæus capite thoraceque nigro glabro; elytris griseis; pedibus pallidis.* *It. oel.* 41. *Fn. 353.*

*Raj. inf.* p. 106. *Scarabæus pilularis* 10.

*Act. sps.* 1736. p. 16. n. 6. *Scarabæus parvus niger, elytris cinereis.*

Habitat cum præcedentibus in stercore primo vere, ubique in viis publicis.

DESCR. *Caput* nigrum, clypeatum, subrotundum. *Thorax* niger, marginatus: lateribus pallidis. *Elytra* grisea aut rubra, novem striis singula notata. *Pedes* griseo-pallidi.

386. *SCARABÆUS hæmorrhoidalis* thorace inermi, capite tuberculato, elytris apice rubris.

*Scarabæus ater, elytris pone ferrugineis, pedibus rufis.* *Fn. 358.*

Habitat in fungis & plantis putridis.

DESCR. Magnitudo seminis milii; *totus* ater, laevis. *Elytra* striis excavatis postice versus marginem rufescantia. *Pedes* & femora obscure rufa.

387. *SCARABÆUS conspurcatus* thorace inermi: marginibus lateralibus albis, capite tuberculato, elytris lividis maculatis nigro-punctatis.

Habitat in Stercore Equino.

DESCR. Parvus, niger s. fuscus. *Elytra* livida s. glauca punctis 2, 5. s. 7. nigris, oblongiusculis. *Thoracis* latera pallida.

388. *SCARABÆUS stercorarius* muticus ater glaber, elytris sulcatis, capite rhombeo vertice prominulo. *Fn. 349.*

*Mouff. lat.* p. 151. *Pilularius.*

*Bauh. ballon.* p. 212. f. 41t.

*Wagn. helv.* p. 233. *Scarabæus pilularius.*

*Lift. mut.* t. 17. f. 4.

*loqu. p. 380. n. 4.* *Scarabæus magnus ex purpura niger, tibiis omnium pedum ferratis.*

*Raj. inf.* 90. n. 7. *Scarabæus major niger vulgatissimus, antennis globosis, elytris laevibus.*

*Raj. inf.* p. 74. n. 1. *Scarabæns magnus niger vulgatissimus, antennis articulatis.*

*Frisch. germ.* v. 4 p. 13. t. 6. *Scarabæas stercorarius niger major.*

*Merr. pin. p. 201.* *Scarabæus stercorarius vel fimarius.*

*Suecic Torndyfwel.* *Smolandis Torbagge.*

Habitat in stercore & cloacis, vespera præsertim volitans.

DESCR. Niger est a tergo & glaber; subtus ad femora villosus. *Caput* clypeo

136 INSECTA COLEOPTERA. SCARABÆUS.

clypeo munitum rhomboidē, obtuso, medio elevato, ac si esset testudinalis squama. Antennæ clavatæ, capitulo trifolio, caule rubiēndo, bulbo s. infimo articulo piloso. Thorax latus, non punctatus, in medio versus posteriora fusco-excavatus. Elytra atra striis plurimis; subtus est totum animalculum atro cœruleos; in femorum primorum antica parte macula magna ferruginea villosa. Os duabus depresso maxillis, adspersis hirsutie ferruginea.

389. SCARABÆUS vernalis muticus, elytris glabris laevissimis, capitatis clypeo rhombeo vertice prominulo. Fn. 350.

*It. oel. 41.* Scarabæus magnus vulgarissimus, antennis articulatis.

Habitat cum præcedente in stercore, e quo format pilulas, easque ad foramina trahit more Scar. pilularii.

DESCR. loco & facie adeo similis præcedenti, ut facile sola aetate differre crederetur, differt tamen a præcedenti,

1. magnitudine qua priori cedit.

2. Elytris non sulcatis.

3. colore cyaneo s. cœruleo nitido.

4. tempore solo vernali.

5. antennis totaliter nigris, nec femoribus macula ferruginea.

390. SCARABÆUS sabulosus muticus niger opacus tuberculis rugosus, antennis basi pilosis.

Habitat in Sabulo & Terra sicca.

DESCR. Simillimus Silphæ opacæ niger & rugosus, ut primo intuitu Silpham dices, sed os, antennæ & pedes Scarabæi.

391. SCARABÆUS Horticola muticus, capite thoraceque cœruleo subpiloso, elytris griseis, pedibus nigris. Fn. 351.

*It. Scanic. 116, 321.* Scarabæus frisicus.

*Aet. upf. 1736. p. 16. n. 3.* Scarabæus, medius, capite collarique cœruleo, pedibus nigris, elytris pallidis striatis.

Habitat in Hortis, ubi devastat Pomona arborēs, excepta sola Pyro communis; in Scania frequentissimus, nobis rarer.

Antennarum caulis ferrugineus est.

392. SCARABÆUS Melolontha muticus testaceus, thorace villosi, abdominis incisuris albis, cauda inflexa. Fn. 345.

*Aldr. ins. p. 454. t. Superior. f. 2.*

*Mouff. lat. p. 160. f. 2.* Scarabæus arboreus vulgaris.

*Hoffn. ins. t. I. f. II.*

*Merian lat. v. I. p. 2. f. 4.*

*Ged. belg. v. I. p. 178. f. 78.*

*List. gæd. p. 265. f. III.*

*loqu. p. 379. n. I.* Scarabæus maximus rufus, uropygio deorum inflexo.

*mut. t. 18. f. 16.*

*Alb.*

*Alb. inf. t. 60.*

*Leuwenh. arc. 1695. v. I. p. 14. f. 14.* Molitor.

*Pet. gaz. p. 29. t. 19. f. 2.* Scarabæus arboreus major castaneus.

*Raj. inf. p. 104. n. 1.* Scarabæus arboreus vulgaris major.

*Frisch. germ. 4. p. 20. t. 14.* Scarabæus julii f. vitis.

Habitat in *Scania*, ubi Larva radices frumenti, volatile se-  
pium arborumque, præsertim Fagi, Quercus, Mali, folia  
consumit.

*DESCR.* Inter majores est hic Scarabæus, cui caput, thorax & elytra testacei coloris sunt: Thorax villosus: Elytra singula & striis elevatis gla-  
briusculis Anus acuminatus, deorsum flexus. Abdomen fuscum ad late-  
ra subrufus macula acuta, in singula incisura, alba. Ovis labium superi-  
us obtusum.

393. SCARABÆUS *solstitialis* muticus testaceus, thorace vil-  
loso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus albis parallelis.

*Fn. 346.*

*Mouff. lat. p. 160. f.* Scarabæus lanuginosus arboreus alte-  
ri adfinis.

*List. mut. t. 18. f. 17.*

*løqu. p. 380. n. 2.* Scarabæus alter ex flavo cinereus.

*It. gotl. 245.* Allenborre.

*Pet. gaz. p. 36. t. 22. f. 9.* Scarabæus pectinatus minor  
villosum.

*Frisch. germ. 9. p. 30. t. 15. f. 3.* Scarabæus junii f. solsti-  
tialis.

*Suecias Allenborre. Scanis Pingborre.*

Habitat frequens circa vesperam æstate in *Rostagia, Öelandia,*  
*Gotlandia 245, Scania 238.*

*DESCR.* Totus testaceus: Oculi nigri: Antennæ lamellatae: Pectns & Ab-  
domen hispida: Elytra glabriora, pallidiora lineis albis tribus lon-  
gitudinalibus, quæ in mortuo læpe disparent.

394. SCARABÆUS *Fullo* muticus, antennarum lamellis se-  
ptenis æqualibus, corpore nigro albedine irrorato. *Fn. 343.*

*Charl. nom. 46.* Fullo.

*Mouff. lat. p. 160. f. 4.* Fullo.

*Act. n. cur. deg. 2. ann. 6. obs. 232.* Scarabæus pictus.

*Hoffn. inf. 2. t. 7.*

*Frisch. germ. II. p. 22. t. 1. f. 1.* Scarabæus julii albo ma-  
culatus.

*Raj. inf. p. 93. n. 9.* Scarabæus Fullo plinii.

Habitat in *Scanie* campis, ubi radices plantarum consumit;  
in *Belgii* dunis omnium frequentissimum insectum legi.

*MAS* antennis foliaceis oblongis, *FÆMINA* vero subrotundis. Clypeus  
antice transverse truncatus.

395. SCARABÆUS *fasciatus* muticus niger tomentoso-flavus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis.

*Mouff. lat. p. 161. f. 6.*

Habitat frequens in floribus Syringæ, Filipendulæ.

DESCR. Caput & Thorax nigricantia pilis densis erectis griseis, uti & Abdomen & Pedes. Elytra pallide grisea fasciis tribus nigris, quarum intermedia in medio angustior, interrupta, reliquis latoribus coadunatis & suturas elytrorum perreptantibus. OBS. interdum elytra glabra absque lineola ista intermedia interrupta.

396. SCARABÆUS *brunneus* muticus rufo-testaceus, elytris striatis, thorace utrinque puncto obsoleto.

Habitat Upsaliæ minus frequens.

DESCR. Statura Chrysometæ, colore brunneo. Labium s. clypeus simus. Antennæ longitudinaliter fissiles ut in Fullone. Thorax utrinque puncto fusco obsoleto notatus. Tibiae dentatae caput postice nigricans est.

397. SCARABÆUS *quisquilius* muticus ater glaber, elytris lido-testaceis.

Habitat in Quisquiliis.

DESCR. Magnitudo seminis Milii, ovatus, glaber, facie Scarabæi. Pedes picei. Elytra flavelcente-livida.

398. SCARABÆUS *quadrimaculatus* muticus niger oblongus, elytris maculis duabus rubris.

Habitat rarius ad domos.

DESCR. Corpus oblongum, nigrum. Capitis clypeus intrusus. Elytra striata; macula parva in angulo elytorum ad basin & major versus apicem elytri.

399. SCARABÆUS *farinosus* muticus niger polline virescente, elytris abbreviatis

Habitat in hortis rarius.

DESCR. Magnitudo fere Sc. Horticolæ, totus niger, obtusus, adipersus et fere rectus atomis viridibus. Elytra abdominali breviora.

400. SCARABÆUS *auratus* muticus auratus, segmento abdominis secundo lateribus unidentato.

Scarabæus corpore viridi-æneo. Fn. 344.

*Hoffn. inf. 3. t. 6. f. prior.*

*Baeh. ballon. 211. f. 3. Buprestis.*

*Worm. mus. p. 342. Scarabæus chlorochryfos.*

*Merret. pin. p. 201. Smaragdulus vel Viridulus.*

*Frisch. germ. v. 12. p. 25. t. 3. f. 1, Scarabæus arboreus viridis f. Scarabæus auratus dictus.*

Raj. ius. p. 76. n. 7. Scarabæus major, corpore breviore, alarum elytris & thoracis tegmine crustaceo, colore viridi serici instar splendentibus.

Smolandis Guldsmed.

Habitat Larva sub terra, radicibus plantarum, formicarum a cervis, & ubi plantæ congestæ in hortis; alatus delectatur Pæoniæ floribus.

401. SCARABÆUS *nobilis* muticus auratus lœvis, abdomine postice albo punctato.

Roes. ius. 2. scar. 1. t. 3. f. 3. 4. 5.

Habitat rarius in Suecia.

DESCR. Præcedente dimidio minor, totus aurato sericeus, nec glaber. Thorax obovatus. Abdomen ad latera & postice albo punctata. Elytra atomis albis adspersa.

402. SCARABÆUS *variabilis* muticus ater lœvis opacus, elytris albis punctatis.

Habitat rarius in Suecia.

DESCR. Simillimus præcedenti, sed totus ater, nisi quod in elytris puncta aliquot rarijora alba, hinc inde occurrentia.

403. SCARABÆUS *rufipes* muticus ater, antennis pallidis, elytris lœvibus. Fn. 356.

Habitat in Itcore.

DESCR. Est e parvis, licet non e minimis. Totus ater, glaber: capitis clypeo obtuso. Antennæ summo apice præsertim rufæ, alias fulco-pallide, Pedes extimis articulis rufo-pallidi. Elytra striata, nigra; postice obtusa s. inflexa. Alæ longæ.

404. SCARABÆUS *aquaticus* muticus piceus, elytris striatis, antennis flavescentibus filiformibus. Fn. 356.

Habitat in aqua & infra aquam cum *Dytiscis* frequens.

DESCR. Magnitudo feminis Oryzae majoris. Color totius niger minus saturate, subtus vero totus fuscus; in singulo Elytro striæ 10 minutissimæ.

405. SCARABÆUS *Cervus* maxillosus: maxillis exsertis apice bifurcatis latereque unifurcatis,

Scarabæus cornibus duobus mobilibus æqualibus apice bifurcatis: introrsum ramo denticulisque instructis. Fn. 337.

Mouff. lat. p. 148. Cervus volans.

Aldr. ius. p. 151. f. 1.

Fonst. ius. t. 14. Scarabæus 2. f. 1. 2.

Imper. alt. p. 694. Cervus volans.

Charl. onom. 46. Cervus volans platyceros.

Hoffn. ius. 1. t. 6. & 2. t. 1.

Merian.

*Merian. europ. gall. t. 168.*

*Merret. pin. p. 201. Scarabæus Cervus volans dictus.*

*Wagn. helv. p. 236. Scarabælaphus.*

*Olear. mus. p. 27. t. 16. f. 5. Taurus volans.*

*Worm. mus. p. 242. Scarabæus cornutus.*

*Dal. pharm. p. 398. Scarabæus cornutus.*

*Raj. ins. p. 74. n. 2. Scarabæus maximus platyceros, Taurus nonnullis, aliis Cervus volans.*

*It. oel. 69. Scarabæus Cervus volans dictus.*

*Suecic Ekoxe, Hornoxe. Blekingis Horntroll.*

*β Scarabæus maxillis lunulatis prominentibus dentatis, thorace inermi. Fn. 338. Femina.*

*Raj. ins. p. 75. n. 3. Scarabæus platyceros totus niger, cornibus brevibus unicum tantum ramum emitentibus, corpore oblongo & velut parallelogramino.*

Habitat larva in ligno putrido *Quercus*.

*DESCR. Femina Magnitudo uti maris. Os prominentis maxillis duabus, lunulatis, nigris, angulatis, prominentibus, a latere interiore duplice denticulo armatis, qui denticuli in utraque maxilla duo s. pares, quorum unus inferior, alter superior. Thorax levis, convexus, niger, marginatus, absque ulla elevatis marginibus. Elytra levia, nigro subpurpurecentia, marginata. Pedes ferrati. Thoracis margines antici & postici villis cæsis instruti.*

406. SCARABÆUS tridentatus maxillosus depresso niger, maxillis dente lateralē elevato.

*Scarabæus maxillis lunulatis prominentibus dentatis, thorace utriusque tridentato. It. oel. 152. Fn. 339.*

Habitat in *Oelandia*.

*DESCR. Habet hic multa communia cum præcedente, sed non omnia. Os maxillis lunularibus acutis, ut in præcedente. Oculi reniformes. Caput, thorax, elytra, abdomen nigro-testacea, punctis minimis excavata, etiam ut in præcedenti, sed pectus magis hirsutum. Thorax utrinque tribus validis denticulis armatum. Antennæ ut in præcedentibus laterali lamellatis. Præcedenti quadruplo minor.*

407. SCARABÆUS caraboides maxillosus: maxillis lunatis, thorace marginato.

Habitat *Upsaliæ. Loefling.*

*DESCR. Statura Carabi minoris, cæruleoscenti-niger. Thorax marginatus. Maxillæ prominentes, lunatæ. Antennæ capitulo latere 4-foliato. Pedes nigri. Femora antica ad basin macula alba mutilata.*

## Dermetes.

408. DERMESTES lardarius niger, elytris antice cinereis.  
Fn. 360.

Gad.

Gæd. belg. 2. p. 145. f. 4. Dermestes.

List. gæd. p. 276. f. 114.

Blank. belg. p. 95. t. II. f. K, L, M.

Raj. ins. p. 107. n. 4. Scarabæus antennis clavatis, clavis in angulos divisus, quartus.

Frisc. germ. 5. p. 25. t. 9. Scarabæus lardi parvus, fascia transversali elytrorum nigro-fuscum albida.

Suecic Änger.

Habitat in cadaveribus, carnibus, lardo; dilacerat avium exuvias ornithologis inimicum animal. Linteo in lixivio macerato & exsiccatu involvuntur res variæ a colonis, ne accedant Dermestes, Tenebriæ &c.

409. DERMESTES elongatus niger, elytris basi fasciaque postica lividis, antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat Upsaliæ; Is: Uzman.

DESCR. Corpus reliquis congeneribus longius; cylindricum. Thorax cum capite longitudine posterioris corporis. Caput antice supra sulco exaratum & quasi fissum. Thorax cylindricus, latus. Elytra basi ad  $\frac{1}{3}$  livida & fascia versus apicem obsoleta livida. Antennæ clavatae: clava triarticulata. Pedes etiam ferruginei, breviuscili.

410. DERMESTES undulatus niger; elytris fascia linearis duplice alba undulata. Fn. 361.

Habitat Upsaliæ rarius.

DESCR. Magnitudo, figura, facies priimi, sed elytra duplice linea transversâ alba & undulata notata, quarum altera ab altera valde remota.

411. DERMESTES Pellio niger, coleoptris punctis albis binis. Fn. 362.

Frisch. germ. v. 5. p. 22. t. 8.

Aet. upf. 1736. p. 117. n. II. Dermestes niger, elytris puncto albo.

Suecic Mahl.

Habitat in carnibus, vestimentis, cibis, parietibus, Larva cauda pilosa.

DESCR. Corpus ovatum, atrum: punctum album in singulo Elytro, ut clavis elytris duo puncta alba in dorso apparet. Sunt tamen, si probe adspicias, adhuc 5 alia puncta alba, scilicet unum ad scutum dorsale, unum utrinque ubi pedus adnectitur elytris, & unum lineare in singulo elytro versus ejus basin, quæ quinque puncta minima sunt, & in quibusdam plane absunt, excepto puncto scuti. Venter, pedes & antennæ clavatae, omnia atra. Tactus; terrefactus, aut ubi periculum videt, contrahit pedes & caput.

412. DERMESTES pectinicornis fuscus, antennis luteis pinnatis.

Habitat

Habitat paſſim in ſylvis.

*DESCR.* Magnitudo vix dupla pediculi. *Corpus* cylindricum, fuscum f. nigricans, non nitidum. *Antennæ* flavæ, utrinque pianaſæ. *Thorax* gibbus. *Tibiae* pallidae.

413. DERMESTES *clavicornis* higer, antennis clavatis piloſis.  
Habitat in Sylvis & pratis rarius.

*DESCR.* Magnitudo Pulicis, colore nigro. *Elytra* fulcata punctis. *Antennæ* clavatae, crassiores, perfoliate, pilosæ, longitudine thoracis & capitis, adeoque speciosissimæ.

414. DERMESTES *pertinax* fuscus; antennis filiformibus.  
Cafſida nigra; antennis ſetaceis, corpore teretiſculo. *Fa.*

384.

*Act. upf.* 1736. p. 17. n. 5. Dermestes corpore oblongo, elytris ſtriatis, capite clypeato.

Habitat in domibus, ubi vefimenta conſumit. Mirum animal: cum quis hoc tangat, contrahit caput & pedes, ut caput clypeo munjatur, nec appareat; pedes leſide inflebit, ut femora quaſi truncata confiſcantur; in hac ecſtaſi diutius coimmoratur, nec vi aut ullâ tortura ad tugam vel motum minimæ fibrillæ adigi potest; neque aqua, neque igne; neque corrosivis spiritibus, nec ullâ re irritari poſſunt nervi, quin haec omnia perferat, licet moriatuſ.

Solis tamen rádios minus fert.

*DESCR.* Inſectum teres, oblongum, atrum, opacum. *Antennæ* omnino ſetacea (non ut in cæteris clavatae). *Elytra* oblonga, flexilia, punctis minutissimiis, excavatis, octo ſtriarum. *Clypeus* subrotundus, magis laetus quam longus, ſuperne inæqualis marginē cruciato prominulo: ad angulos thoracis posticos f. laterales tæpe punctum villis flavum. *Abdomen* nigrum eſt; certo tamen ad lumen ſitu albiſ omnino adparet.

415. DERMESTES *mollis* testaceus, oculis fuſcis; antennis filiformibus.

Habitat rarius ad pagos.

*OBS.* Medius inter Chrysomelas & Dermest. pertinacem.

416. DERMESTES *Capucinus* niger, elytris abdomenque rubris, thorace emarginato retuso.

Habitat in ligno antiquo, quod rodit, inque cariem mutat.

*DESCR.* Major reliquis nostratibus. *Caput* parvum, angustum, basi retraſile ſub & intra thoracem, atrum. *Antennæ* nigrae, ſex articulis & clava tribus articulis, apice truncatis turbinatis. *Thorax* niger, convexus, gibbus, ſcaber & fere muricatus, dorio retuſus, anticeq; e marginatus inargine ciliato. *Scutellum* minimum, nigrum. *Elytra* rubra, excavato-punctata & fere rugosa. *Abdominis* 4 ſegmenta poſtica rubra. *Pedes* nigri.

417. DERMESTES *Calcographus* ater, elytris præmorfo-dentatis rufis: lateribus basique nigricantibus.

Habitat in truncis arborum.

DESCR. Simillimus Derm. micographo. *Antennæ testaceæ. Corpus glabrum. Elytra præmorfo-dentata, rufa, sed basi & lateribus nigra.*

418. DERMESTES *Typographus* testaceus pilosus, elytris striatis retusis præmorfo-dentatis. *It. oel. 26. 195. Fn. 366.*

*Raj. inf. p. 100. n. 10. Scarabætis antennis clavatis x.*

*Act. upf. 1736. p. 17. n. 6. Dermestes pubescens, elytris apice erofis.*

Habitat in truncis *Pini*, inter corticem & lignum; ubi labyrinthos vagas format & characteres, pulveremque s. farinam præducit.

OBS. *Antennæ clavatae nec perfoliatæ, nec fissiles, sed apice ovato solido compresso. Elytra striata, postice retusa: marginato tridentato.*

419. DERMESTES *Micographus* testaceus glaber, elytris apice villosis obtusis.

Habitat in *cadaveribus*, edit etiam insecta.

DESCR. *Corpus teres, magnitudine pediculi majoris, totum testaceum; glabrum; Elytra versus apicem pilis longis adspersa.*

420. DERMESTES *Poligraphus* testaceus pilosus, elytris glaucis obtusiusculis.

Habitat sub Arborum emortuarum cortice, efformans plates pinnatas.

DESCR. Minor Derm. micographo, cylindricus. *Elytris non striatis, magis glaucis, postice obtusis, vix rufis.*

421. DERMESTES *Piniperda* nigra subvillosum, elytris piceis integris, plantis rufis.

Habitat intra *Pini sylvestris* ramulos inferiores, quos exsiccat & cadere facit, Hortulani naturæ famulus; ramulum præcedentis anni intravit, inque eo latitat infra partem aridam.

DESCR. *Magnitudo Derm. Typographi, totus niger. Elytra striata, subvillosa, non retusa. Plantæ pedum sole ferrugineaæ.*

422. DERMESTES *violaceus* nigro-cæruleuscens, thorace villoso. *Fn. 373.*

Habitat passim in Suecia

DESCR. *Magnitudo seiniis Oryzæ; totus supra cæruleus, subtus nigricans. Thorax pilosus.*

423. DERMESTES *fenestratus* castaneus, capite nigricante, thorace fulvo. *Chrys-*

*Chrysomela fuscā*; capite nigricante. Fn. 443.  
Habitat in *feneſtris* vere.

DESCR. *Corpus* totum pulice minus est, oblongum, nec cibris elytris; *pedes* pallidiores ipsi corpore. *Color corporis* totius ē nigro castaneus; excepto capite nigricante.

424. DERMESTES *domesticus* niger; elytris griseis marginē nigris thorace villoso. Fn. 368.

Aet. upf. 1736. p. 17. n. 7. Dermestes cylindraceus; collari crasso subhirsuto; elytris testaceis;

Habitat in varia *Suppellec̄tili* & in domibus.

DESCR. *Corpus* parvum, cylindraceum. *Pectus* crassum, subrotundum; nigrum, subhirsutum. *Elytra* oblonga, apice obtusa, testacea, marginē circum circa nigra. *Alae* fusco-albae, *Abdomen* & *pedes* nigri. *Antennæ* rufescentes, clausis Elytris videntur. *Coleopira* grisea, futura nigra, marginibus lateralibus versus ventrem nigris; regio ani supra elytra nigra. *Magnitudo* majoris pediculi. Tactus se contrahit, nec se se mouet.

425. DERMESTES *melanocephalus* niger ovatus glaber, elytris griseis. Fn. 369.

Habitat passim inter quisquiliaſ.

DESCR. Totum corpus non superat pulicem. *Facies* omnino Scarabæi, sed antennæ horizontaliter perfoliatæ; totum corpus alijs, thorace, capite, antennis atrum, glabrum; sola *Elytra* castanei coloris sunt. *Silphis* affinis.

426. DERMESTES *murinus* tomentosus oblongus fusco cinereoque nebulosus, scutellō luteo. Fn. 365.

Aet. upf. 1736. p. 17. n. 9. Dermestes oblongus elytris murinis vix striatis.

Frisch. germ. 4. p. 34. t. 18. Scarabæus erucæ pinguis nigrae glabrae.

Habitat in cadaveribus, carnibus & lignis putridis.

DESCR. *Corpus* oblongum, convexum, murini coloris, cineretum s. p. tins nigrum incano maculatum, leve, non striatum. Superficies (lenite visa) hirsuta. *Sentellum* dorsi flavescens. *Pectus* & *abdomen* subtrus alba. *Antennæ* compressæ, perfoliatæ: *Caput* non retrahit, sed pectore prominet incurvato capite. *Datur* alia duplo major, magis nigricans: an *Femina*? complicat pedes miro artificio; complicatus ovatus est.

427. DERMESTES *Pilula* tomentosus ovatus fusco-nebulosus.

Mordella subrotunda, colore murino. Fn. 536.

Aet. upf. 1736. p. 18. n. 2. Mordella colore murino.

Habitat in hortis inter sata, & sub Lapidibus.

DESCR. Magnitudo dimidii pisii s. Coccionellæ, ejusdemque figura; sed colore omnino murino s. e nigro fusco; *Thorax* glaber, nitidior. *Elytra* vix manifeste striata; saltat pedibus,

428. DERMESTES *Scarabæoides* ovatus ater glaber, elytris maculis duabus obsolete ferrugineis.

Habitat in Fieribus.

DESCR. Magnitudo Sem. oryzæ, facie Scarabæi, niger, glaber, agilis; in Elytris macula ferruginea in apice & basi.

429. DERMESTES *Scrophulariae* tomentosus maculatus, sutura elytrorum rubra.

Coccinella villosa, coleopterorum margine inflexo; futuris rubris. Fn. 412.

Raj. inf. p. 85; n. 37. Scarabæus parvus, corpore subrotundo, cælio oblongo, alarum elytris nigris binis punctis albicantibus notatis.

Aet. upf. 1736. p. 18. n. 3. Gyrinus nigricans major.

Habitat frequens in *Scrophularia* 520.

DESCR. Raji descriptio optima est. Abdomen album. Corpus evatum. Thorax latus, convexus. Elytra nigricantia, albedine adpersa. Sutura elytrorum tam inter se, quam illa cum thorace, rubra. Antennæ clavatae, integræ, nec fissæ. Hæc & infequens a reliquis facie tota redundat, cum quasi hirsutæ sint, nec margine elytrorum conspicuo aut reflexo notentur.

430. DERMESTES *museorum* tomentosus maculatus, elytris puncto albo.

Coccinella villosa, coleopterorum margine inflexo; thoracis macula baseos utrinque alba. Fn. 411.

Habitat in museis, quæ destruit, teste D. De Geer.

DESCR. Præcedenti adeo similis est, ut pro eadem facile habeatur queat, licet triplo minor. Tota nigra est, ex punctis vix conspicuis, fuscis, & albis nebulosa facta. Thorax utrinque versus basi inaculam elbam fert, & duo puncta alba majora in medio elytrorum, in singulo unicum; subtus tota albicat. Thorax, caput & antennæ nigra.

431. DERMESTES *paniceus* ferrugineus, oculis rufis.

Habitat in Pane.

DESCR. Similis sequenti, sed oculi rufi & thorax latior.

432. DERMESTES *stercoreus* oblongus glaber testaceus, oculis nigris. Fn. 375.

Habitat in *stercore equino*, primo vere frequens; & in floribus Sorbi.

DESCR. Corpus magnitudine pediculi; glabrum; testaceum colore ligni pilis testum; vix nisi oculo armato conspicuis.

433. DERMESTES *ferrugineus* oblongus semicylindricus, elytris abbreviatis.

Habitat Upsaliæ; D. Prof. Forskahl.

# 146 INSECTA COLEOPTERA. DERMESTES.

DESCR. Magnitudine oryzæ, tosus lævis, Elytris abbreviatis. Thorax quadratus; caput magis obscurum.

434. DERMESTES *pedicularius* oblongus testaceus, Elytris abbreviatis.

Chrysoimela dilute testacea, hemiptera. Fn. 411.

Habitat in floribus maxima sæpe in copia.

DESCR. Magnitudo pediculi. Corpus oblongum, læve. Antennæ plurimum clavatæ. Elytra non striata sed truncata, abdominis duobus articulis breviora.

435. DERMESTES *pulicarius* oblongus niger, elytris abbreviatis, abdomine acuto. Fn. 370.

Act. apj. 1636. p. 16. n. 7. Scarabæus minimus ater florilegus.

Raj. inf. p. 108. Scarabæus antennis clavatis, clavis in annulos divisus.

Habitat copiose in floribus, facile volitans, agile currens.

DESCR. Corpus oblongo-ovatum, atrum, magnitudine majoris pediculi. Abdomen planum, apice acuminatum, elytris longius. Antennæ clavatæ, perfoliatæ. Alæ albæ.

- 436 DERMESTES *psyllius* ovatus niger, abdomine obtuso, thorace elytrisque marginatis.

Habitat in Floribus.

DESCR. Magnitudo Derm. pulicaris sed ovatus, obtusus, ater, lævis. Thorax & Elytra valde marginata, & Antennæ clavatæ, licet horizontaliter fissiles, fere Scarabæi.

437. DERMESTES *Scanicus* fuscus, thorace subtestaceo.

Habitat in Scania D. Leche.

DESCR. Magnitudo fere pediculi. Corpus totum fuscum. Antennæ clavatæ, perfoliatæ. Thorax & elytrorum basis obscure testacea.

438. DERMESTES *colon* thoracis lateribus flavis, elytris griseis puncto nigro.

Habitat in Quisquiliis.

DESCR. Corpus ovatum. Caput nigrum. Thorax fuscus lateribus flavis. Elytra obscure testacea s. grisea cum puncto nigro, in media, versus marginem inferiorem.

439. DERMESTES *niger* oblongus pilosus niger, elytris molliuscis.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Magnitudine D. piniperdæ, sed totus ater, elongatus, glaber, licet thorax & elytrorum apices pilis erectis adspersi.

## Hister.

440. *HISTER unicolor* totus ater, elytris substriatis.  
*Coccinella atra* glabra; elytris abdomine brevioribus marginé inflexis. *Fn. 410.*  
*Act. upf. 1746. n. 10.* *Dermestes subrotundus* ater nitidus; elytris brevibus.  
*Habitat in terra, atena, stercore equino* passim.  
*DESCR.* *Corpus quadratum, atrum, nitidum, glaberrimum.* *Elytra* abdomine breviora, parum truncata, glaberrima, integerrima, striis aliquot vix manifestis. *Thorax* lèvis, non striatus, sed linea excavata ambiente notatus. *Caput omnium minimum, quod, terrefacta, totum intra thoracem retrahit, ac si decollata esset, nec, ut caput exferat, ulla tormento adigitur.* *Os forcipatum dentibus duobus ecurvis.* *Antennæ clavatae, integræ.* *Posteriora abdominalis truncata, glabra, elytris paulo longiora, obtusissima; variat magnitudine.*
441. *HISTER pygmaeus* totus ater, elytris lèvisimis.  
*Habitat in Sabulosis.*  
*DESCR.* minor est Semine oryzæ, & Elytra minime striata sunt, quo a priori decuplo majore differt.
442. *HISTER bimaculatus* ater, elytris postice rubris.  
*Habitat in viis.*  
*DESCR.* Macula subovata fusco-ferruginea ad latera postica elytrorum. Magnitudo feminis oryzæ.
443. *HISTER 4-maculatus* ater, elytris bimaculatis.  
*Habitat in Terrestribus stercoratis.*  
*DESCR.* Major est primo. Macula magna ferruginea sublunata in singulis elytris, at in quibusdam est macula rubra inæqualis versus basin Elytri & alia rubra lúnata versus apicem elytri.

## Silpha.

444. *SILPHA vespillo* oblonga atra, clypeo orbiculato inæquali, elytris fascia duplci ferruginea.  
*Scarabæus clypeo marginato, elytris nigris: fasciis duabus transversis rubris.* *Fn. 349.*  
*Mouff. lat. p. 149. lin. 7. f. 3. ordine perpendic. & app. tab. ult. Cantharus tertius.*  
*Imper. alt. 692. t. 2. f. 2. Cantharis fasciata.*  
*List. mut. 117. f. 5.*  
*logu. p. 381. n. 2. Scarabæus majusculus niger, duabus luteis fasciis undulatis transversim ductis supra alarum thecas.*  
*Blank. belg. p. 168. t. 14. f. 1.*

*Frisch. germ.* 12. p. 28. t. 2. f. 2. *Scarabæus moschi odore.*  
*Raj. inf.* p. 106. *Scarabæus foetidus* i *aldrovandi.*  
*Habitat ad cadavera, quæ defodit.*

445. *SILPHA bipustulata* oblonga nigra, elytris singulis puncto unico rubro.

*Dermestes niger*, coleoptris punctis: rubris binis. *Fn.* 363.  
*Act. upf.* 1736. p. 17. n. 12. *Dermestes niger*, elytris puncto rubro.

*Habitat in Lardo similibusque.*

446. *SILPHA quadripustulata* oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugininis.

*Dermestes niger*, coleoptris punctis rubris quaternis. *Fn.* 364.

*Frisch. germ.* 9. p. 36. t. 19. *Scarabæus parvus* luteo maculatus erucæ lanigeræ.

*Habitat in arboribus, reperitur etiam in fenestris.*

*DESCR.* Corpus oblongum, nigrum totum; in singulo Elytro puncta duo longitudinalia, cubica t. quadrata, rubra, ita ut conniventibus elytris quatuor hæc puncta in figuram quadratam disposita sint.

447. *SILPHA Seminalum* ovata atra nitida immaculata, abdome rubro.

*Habitat in lignis putridis, imprimis Abietis.*

*Tacta se contrahit in figuram globosom. Minima est & glaberrima.*

448. *SILPHA agaricina* ovata atra glaberrima hemiptera.

*Habitat in Agaricis, celerrime currit.*

*DESCR.* Corpus aternum, facie Dytisci, magnitudine sem. Aquilegiae. Abdomen acutum, Elytra abdomine breviora. Antennæ angustissimæ. Pedes pallidi.

449. *SILPHA russica* oblonga rufa, antennis elytris pectoreque nigris.

*Habitat in Finlandia.*

*DESCR.* Rubra est, sed Elytra striata, glabra, uti oculi, antennæ & pedes tubitus cæruleo-nigra.

450. *SILPHA litteralis* atra, elytris levibus: lineis elevatis tribus, clypeo orbiculato nitido.

Cassida atra; elytris lineis tribus elevatis; antennis antice testaceis. *Fn.* 380.

*Frisch. germ.* 6. p. 12. t. 5. *Scarabæus campestris.*

*Habitat Aboæ D. Starck, & Lundini D. D. Leche.*

*DESCR.*

*DESCR.* *Tota nigra*, in singulo *Elytro* striae tres longitudinales, elevate, quarum extima major, antennarum tres extimi articuli ferruginei.

451. *SILPHA atrata* atra, elytris subpunctatis: lineis elevatis tribus levibus, clypeo antice integro.

*Cassida nigra*; elytris lineis tribus elevatis, levibus spatio interjecto punctato; clypeo antice integro. *Fn. 385.*

Habitat in sylvis.

*DESCR.* *Clypeus* parum convexus, antice minime truncatus, sed rotundatus; in singulo *Elytro* striae tres, aequales, elevate, minime dentate, praeter marginis striam, quae major prominet. *Totum animal supra minutissimis excavatis punctis adspersum, atrum, depresso.*

452. *SILPHA thoracica* nigra, elytris obscuris: linea elevata unica, clypeo retuso testaceo.

*Cassida nigra*; clypeo ferrugineo; elytris linea elevata. *Fn. 386.*

*Raj. inf. 90.* *Scarabaeus priori* similis parum canaliculatus, scapulis croceis.

Habitat *Upsaliæ*.

*DESCR.* Reliquis simillima, tota atra, sed *clypeus* antice truncatus, ferrugineus, pilis luteis. *Elytra* atra in singulo stria unica, elevata, acuta, semel interrupta.

453. *SILPHA quadripunctata* nigra, elytris pallidis: puncto basos medioque nigro, thorace emarginato.

*Pet. gaz. t. 12. f. 2.*

*Schreber. inf. 2. f. 5.* *Silpha quadripunctata* nigra, elytris exalbidis: maculis quatuor nigris.

Habitat in Germania, D. Schreber, in Suecia. J. Åman.

*DESCR.* Magnitudo *Silphæ thoracicæ*. *Corpus* nigrum, *thoracis* latera testacea. *Elytra* singula puncto nigro majusculo in basi & alio in medio disci.

454. *SILPHA opaca* fusca, elytris concoloribus: lineis elevatis subternis, thorace antice truncato.

*Cassida nigra*, elytris striis quinis utrinque levibus; clypeo emarginato. *Fn. 383.*

Habitat in *Drottningholm*. B. Kallenberg.

*DESCR.* Convenit omnino cum *S. thoracica* in omnibus; differt tantum striis *Elytorum* levibus, elevatis, acutis, minime dentatis; reliqua ut in precedenti omnia.

455. *SILPHA rugosa* nigricans, clytris rugosis: lineis elevatis tribus,

tribus, thorace emarginato.

*Cassida attra*; elytris striis quinque punctisque elevatis. Fn. 379.

*Act. upf.* 1736. p. 17. n. 3. *Dermestes niger*, punctis elevatis; collari cæsio.

*Raj. inf.* p. 90. n. 9. *Scarabæus inter cadavera frequens* depreclus parum canaliculatus undique niger.

Habitat in casis *Lapporum*, & in *cadaveribus* ubique. Devastat apud Lappones eorum pelles & carnes, cumque is habitat communiter in stragulis. Consumit cum Biatta *Lapponica* pisces dum exsiccantur, brevi tempore saepe omnes; apud nos circa cadavera frequens.

*DESCR.* *Corpus* ovale, parum oblongum. *Caput* ante clypeum exsertum. *Clypeus* convexus, latus, antice truncatus, margine prominulus, superficie in aliis glabra atra; in aliis pubescente lanugine cæsia & punctis prominulis duris tuberculata. *Elytra* striis quinque, elevatis, longitudinalibus (numeratis inclusive striis lateralibus, sine quibus striæ modi tres), inter singulas ordo longitudinalis punctorum elevatorum. *Aæ* nigricantes, ut & totum *Corpus* atrum (excepto in quibusdam cæsio clypeo aut capite), opacum minimeque nitidum. *Antennæ* clavatae: articulo ultimo subrotundo, penultimo lenticulari, antepenultimo conico verticali. *Larva* glabra, ovato-oblonga, constans incisuris duodecim excepto capite & cauda; tota atra est; caput parvum.

456. *SILPHA fabulosa* fusca, elytris lineis elevatis tribus utrinque dentatis, thorace subemarginato.

*Cassida nigra*; elytris striis quinque utrinque dentatis; clypeo emarginato. Fn. 382.

*Act. upf.* 1736. p. 17. *Cassida nigra*, clypeo emarginato, elytris punctatis.

Habitat communiter in fabulo & terra sicca, edit cadavera.

*DESCR.* *Corpus* nigrum, minime nitidum, sed fere cinereo-sordidum. *Caput* maxima ex parte sub clypeo latet: *antennæ* clavatae: *clypeus* antice emarginatus. *Elytra* gaudent striis quinque (inclusu[m] cum marginalibus,) elevatis, obsolete versus latera denticulatis, punctata enim non sunt, sed quasi tubercula s. puncta elevata striis adnata.

457. *SILPHA obscura* elytris punctatis: lineis elevatis tribus, clypeo truncato.

Habitat in quisquiliis.

*DESCR.* *Corpus* media magnitudinis, atrum. *Elytra* punctis excavatis testa: lineisque tribus elevatis obsoletis. *Thorax* antice truncatus, nec emarginatus, posticeque subrotundatus.

458. *SILPHA ferruginea* elytris lineis elevatis senis, thorace emarginato.

*Cassida*

*Cassida ferruginea*; elytris punctis excavatis, striisque elevatis alternis. *Fn.* 387.

Habitat in *Roslagia*.

DESCR. Mediae magnitudinis; margo thoracis coleopterorum pallidior. *Elytra* striata & inter strias punctata.

459. *SILPHA grossa nigra*, elytris confertim punctatis: lineis elevatis tribus, thorace emarginato.

Habitat in quisquiliis.

DESCR. *Corpus* simillimum Silphæ obscuræ, sed duplo majus. *Thorax* postice fere truncatus, antice valde emarginatus. *Elytra* striis tribus elevatis & inter strias confertim excavato-punctata.

460. *SILPHA oblonga nigra*, elytris striis punctatis: lineis elevatis senis, thorace emarginato.

*Cassida atra*; elytris striis decem elevatis: punctis excavatis striatis. *Fn.* 381.

Habitat interdum in plantarum acervis.

DESCR. Antecedenti minor, angustior, tota atra, glabra. Antennarum clypeique structura ut in precedentibus. *Elytra* singula striis elevatis decem, quas singulas punctorum excavatorum ordo distinguit.

461. *SILPHA aquatica cinerea*, elytris substriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente.

Habitat ad Aquas.

DESCR. *Corpus* oblongiusculum, fusco cinereum, magnitudine Cimicis. *Thorax* antice truncatus, rugosus. *Elytra* striata.

462. *SILPHA colon nigra*, elytris ferrugineo-varii, thorace emarginato: tergo duplici puncto impresso.

Habitat passim.

DESCR. *Corpus* Cimice minus. *Thorax* vix emarginatus. *Elytra* ad apicem subtestacea & pallidiora.

463. *SILPHA deppressa ferruginea*, elytris levibus, thorace emarginato.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. *Corpus* ferrugineum, magnitudine cimicis; *Elytra* non striata.

464. *SILPHA grisea grisea*, elytris levibus, thorace emarginato.

Habitat passim.

DESCR. *Corpus* magnitudine fere Cimicis, griseum & quasi ex pallido & testaceo reticulatum.

465. SILPHA *festiva* testacea tomentosa, thorace emarginato,  
oculis nigris.

Habitat in Quisquiliis.

DESCR. Corpus magnitudine pediculi, lœve, glabrum, flavum.

466. SILPHA *pedicularia* nigra, elytris levibus, thorace mar-  
ginato

Habitat in Quisquiliis.

DESCR. Corpus magnitudine Pulicis, atrum, glabrum. Thorax vix marginatus.

### Cassida.

467. CASSIDA *viridis* viridis. It. oel. 153. Fn. 377.

Aet. upf 1736 p. 17. n. 1. Cassida viridis, corpore nigro.  
Volkam hesperid. v 1 p. 166. f. 4. bona.

Raj. inf. p. 107. n. 5. Scarabæus antennis clavatis, clavis  
in annulos divisis.

Reaum. gall. v. 3. t. 18. f. 15-19.

Blank. belg. 89. t. 11. f. F. Testudo viridis.

Gæd. belg. 1. p. 94. t. 43. Testudo viridis.

List. gæd. 286. t. 116.

Merian. eur. t. 115.

Frisch germ. 13. p. 35. t. 29. Coccionella clypeata viridis.

Habitat in hortis in Lycopo, Mentha & aliis, ubi larva tecta  
incedit proprio stercore.

DESCR. Corpus ovale, superne convexum, inferne planum: convexa su-  
perficies constat elytris & clypeo viridibus, lœvibus & æqualibus, ac si  
ex unica constarent crusta, futura lamboidea divisa. Abdomen totum ni-  
grum & caput totum sub clypeo reconditum. Antennæ filiformi-clavatae,  
pallidæ, superne fusæ. Pedes pallidi. Elytra ad latera marginem pro-  
minulum exferunt & cum clypeo simul totum corpus tegunt, ut ne ve-  
stigium corporis.

468. CASSIDA *nebulosa* pallido-nebulosa.

Cassida nebulosa pallida ovalis; clypeo caput tegente in-  
tegro. Fn. 377.

Gæd. belg. 1. p. 96. t. 44.

List. gæd. 287. t. 117.  
mas. t. 17. f. 10.

Raj. inf. p. 88. n. 13. Scarabæus minor, fordide fulvus,  
punctis & maculis aliquot nigris temere sparsis uotatus.

Habitat in hortis inter plantas oleraceas. e. g. Melisse.

DESCR.

*DESCR.* admodum similis est primæ. Est enim dimidio minor, colore griseus, punctis inæqualibus nigris adspersa & inde nebulosa. *Clypeus* lunam refert, antice minime emarginatus, totus levis, nec maculatus, sed pallidus. *Elytra* rugosa punctis excavatis striata, striis curvis & flexuosis. *Corpus* nigrum, totum clypeo & elytris absconditum. *Antennæ* nigræ, filiformi-clavatæ; margo coleoptrorum, in hac, prominet ut in precedentibus.

469. CASSIDA *nobilis* grisea, elytris linea cœrulea nitidissima.  
Habitat in Hortis.

*DESCR.* Capitis clypeus integer. *Antennæ* subclavatae, nigræ, basi pallide. *Corpus* supra pallide griseum, subtus nigrum. Linea cœrulea nitidissima in singulo elytro juxta futuram longitudinalem, quæ evanescit cum vita.

### Coccinella.

470. COCCINELLA *unipunctata*, coleoptris flavescentibus: puncto communi nigro.  
Habitat in Plantis.

*DESCR.* Corpus nigrum cum capite & thorace. Elytra pallida cum puncto communi in medio futuræ. *Antennæ* nigræ. Thoracis margines laterales latescentes. Magnitudo dupla pediculi. Pedes ferruginei.

471. COCCINELLA *bipunctata* coleoptris rubris: punctis nigris duobus. Fn. 388.

Merian. europ. 3. p. 58. t. 35. f. infima. s. p. 69. t. 136.

Lift. loqu. p. 383. n. 8. Scarabæus alter niger exiguis, pennarum crustis miniatulis, in quibus mediis duæ tantum maculæ nigræ.

Raj. ins. p. 86. n. 2. Scarabæus hæmisphæricus minor; elytris e flavo rubentibus, singulis maculis s. punctis nigris media parte notatis.

Petiv. gaz. p. 34. t. 21. f. 4. Coccionella anglica bimaculata s. minor rubra.

Bradl. natur. t. 27. f. 4.

Frisch. germ. 9. p. 33. t. 16. f. 4. Coccinella secundæ magnitudinis, punctis coleoptrorum duobus.

Habitat in Alno, ubi aphides devorat Larva.

*DESCR.* Abdomen, antennæ, pedes & omnia terrani spectantia; nigra. Thorax niger macula lateralí alba: puncta duo alba minima ad basin Thoracis & rotidem similia ad antennarum insertionem. Elytra rubra punctis in utriusque medio, nigro.

472. COCCINELLA *tripunctata* coleoptris rubris: punctis nigris tribus.

Habitat in Plantis.

*DESCR.* *Corpus* præcedente paulo minus. *Thorax* ater macula alba ad utrumque latus. *Elytra* rubra cum puncto communi versus basin & solitariis versus apicem. *Caput* superius punctis duobus minimis albis.

473. COCCINELLA *hebræa* coleoptris luteis: maculis nigris sex longitudinalibus..

Habitat apud nos rarius.

*DESCR.* *Corpus* plerisque nostratis majus. *Caput* nigrum punctis duobus albis. *Thorax* niger, albido variegatus. *Elytra* lutea, margine nigra, picta lineis nigris tribus, longitudinalibus, latiusculis, quarum extima longior ad basin incurvata, in punctum definens majuscum.

474. COCCINELLA *quinquepunctata* coleoptris sanguineis: punctis nigris quinque. Fn. 392.

Habitat in agris inter segetes, & in Pruno spinosa.

*DESCR.* Magnitudo minor, in singulo elytro (excepta macula baseos nigro-alba,) duo puncta quorum quod in medio majus, quod versus apicem minus. *Thorax* niger, utrinque albus. *Frons* duobus punctis albis.

475. COCCINELLA *trifasciata* coleoptris rubris: fasciis nigris tribus. Fn. 390.

Raj. inf. 87. n. 9. Scarabæus hæmisphæricus minor, elytris ex albo liventibus: lineolis nigris in medio dorso pictis.

Habitat in Lapponia desertis.

*DESCR.* *Thorax* niger lateribus albis: puncta duo alba ad anteriarum exortum. *Elytra* rubra lineis tribus transversis latiusculis obtusis nigris, quarum quæ peccatori proxima ambo elytra conjungit; duæ autem reliquæ posteriores ad marginem inferiorem elytrorum non extenduntur, hinc abruptæ in medio dorso.

476. COCCINELLA *hieroglyphica* coleoptris luteis: maculis nigris duabus longitudinalibus sinuatis.

Habitat rarius apud nos.

*DESCR.* maxime affinis est Cocc: decempustulata.

477. COCCINELLA *septempunctata* coleoptris rubris: punctis septem nigris.

Hollar. inf. t. 7. f. 8.

Alb. inf. t. 61. f. C.

Gæd. belg. 2. p. 58. t. 18.

Lift. gæd. p. 268. f. 112.

mut. t. 17. f. 2.

Mer. europ. 2. p. 24. t. II. f. p. 76. t. 149.

*Petiv. gaz. p. 63. t. 21. f. 3.* *Cochinella anglica vulgatissima* s. *rubra*, *septem nigris maculis punctata*.

*Raj. inf. 86 n. 1.* *Scarabæus subrotundus* s. *hæmisphæricus* *rubens* *major vulgatissimus*.

*Frisch. germ. 4 p. 1. t. 1. f. 4.* *Coccionella major*.

*Suecic Akerhöns, Nyckelpiga, Jungfru Mariæ Höna.*

Habitat in sepibus & agris vulgatissima, aphides devastans.

*DESCR.* *Caput nigrum*: fronte punctis duobus albis. *Thorax niger*, utrinque ad latera albus. *Elytra rubra*, in singulo puncta tria nigra æqualiter remota; at ad basin elytrorum punctum utraque elytra conjungens nigrum antice album. *Antennæ minimiæ, clavatae*. *Animal subitus arrum*. *Larva cinerea*: maculis nigris & albis adspersa. *Pupa lutea*, maculis nigris & quasi deusta, ano adfixa.

478. *COCCINELLA novempunctata coleoptris rubris*: punctis nigris novem.

Habitat in Plantis.

*DESCR.* *Caput punctis duobus albis in fronte*, *Thorax niger* maculis solitariis lateralibus albis. *Elytra singula punctis nigris duorum parium*, & communis baseos nigra, antice alba.

479. *COCCINELLA decempunctata coleoptris fulvis*: punctis nigris decem.

Habitat in Plantis.

*DESCR.* *Caput nigrum* macula alba frontis tridentata. *Thorax maculis quatuor albidis*. *Elytra fulva* margine exteriore flavo, notata puncto nigro ad basin, tribusque transversim positis in medio, & minimo ad apicem elytri. *Pedes pallidi*.

480. *COCCINELLA undecimpunctata coleoptris rubris*: punctis nigris undecim. *Fn. 394.*

*Act. upf. 1736. p. 18. n. 2.* *Coccinella punctis undecim*.  
Habitat in sepibus.

*DESCR.* Inter minimas hujus generis species hæc est. *Puncta in singulo elytro quinque parva, sextum majus est* tene extendens ad utrumque elytron. *Thorax niger* punctis duobus albis.

481. *COCCINELLA tredecimpunctata coleoptris luteis*: punctis nigris tredecim. *Fn. 395.*

*Act. upf. 1736. p. 18. n. 3.* *Coccinella punctis duodecim*.  
Habitat in Armoracia.

*DESCR.* *Corpus magnitudine inter maximas & minimas medium*. *Thorax niger* lateribus utrinque albit-cum puncto nigro. *Elytra lutea*: puncta in singulis sex nigra, quorum duo in medio elytri fere contigua; unicum punctum nigrum ad basin elytri connectit utramque crustam, adeoque impar est. *Abdomen ad latera luteum*. *Antennæ & os at Tibiæ luteæ*. *Femora nigra*.

482. COCCINELLA *quatuordecimpunctata* coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim: quibusdam contiguis. Fn. 396.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. est inter parvas sui generis. Elytra flava, quorum in singulo puncta duo paria oblonga, distincta futura longitudinali nigra, cum una in singuli elytri medio connata quadrangularis, dein alia connata cum opposita in formam trianguli: punctum terminale elytri etiam adnexum futuræ longitudinali. Thorax a tergo postice testus macula magna nigra antrosum tetraloba!

483. COCCINELLA *sedecimpunctata* coleoptris flavis: punctis nigris sedecim: tribus infimis connexis.

Habitat Calmariae. Ad. Modeer.

DESCR. Minor est reliquis nostratis. Thorax flavus: punctis 3 utrinque connexis. Elytra flava: punctis 5 longitudinaliter prope futuram dorsalem disposita, rotunda; & 5 intra marginem inferiorem; quorum omnia, excepto primo, connexa. Sed dubium utrum haec puncta connexa sint numeranda tria aut quatuor. Femora nigra. Tibiae flavae.

484. COCCINELLA *ocellata* coleoptris luteis: punctis quindecim nigris ocellatis. Fn. 398.

Habitat in Horto Academicо rarius.

DESCR. Est inter inaequales sui generis. Caput nigrum punctis duobus in fronte. Thorax niger, utrinque albus, puncto nigro, ut in plerisque; in singulo Elytro anterior punctum 1, dein 3, iterum tria, postice nullum, his duplicatis (in binis scil. elytris) faciunt 14, adde unicum nigrum utrinque elytron tangens ad basin elytrorum; puncta omnia nigra annulo albo. Abdomen & pedes nigri; in aliis ad apicem in singulo elytro lineola longitudinalis nigra.

485. COCCINELLA *novendecimpunctata* coleoptris flavis: punctis nigris novendecim.

Habitat in Plantis.

DESCR. Corpus parvum. Thorax flavus punctis 6 nigris, quorum duo posteriores. Elytra flava, singula punctis 9 nigris, & uno communis ad basin. Pedes flavi.

486. COCCINELLA *22-punctata* coleoptris flavis: punctis nigris viginti duobas. Fn. 401.

Habitat in sepibus.

DESCR. Inter species minores numerari potest. Elytra singula flava punctis novem nigris distantibus, praeter duo vix conspicua obsoleta. Thorax notatur inaculis septem, quarum infima reliquis major, duæ autem primæ, ad antennas, minimæ. Subtus inspecta observatur margo coleopterorum prominens cum puncto nigro in medio utrinque. Abdomen, ut in reliquis, nigrum est.

487. COCCINELLA 24-punctata coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor. Fn. 402.

Habitat in Scania D. Leche.

DESCR. Inter minimas nostras numeranda. In singulo Elytro puncta duo distincta; deinde 4, quorum intermedia coalita; tum 3 coalita omnia, hinc quasi fascia; demum 2 puncta minora distincta.

488. COCCINELLA 25-punctata coleoptris rubris: punctis nigris vigintiquinque.

Habitat in Plantis.

DESCR. Thorax ruber puncto uno nigro. Elytra punctis nigris 22, praeter primum commune. Antennæ & pedes rubri.

489. COCCINELLA conglobata coleoptris rubris: punctis nigris plurimis subcontiguis.

Coccinella coleopteris rubris; punctis plurimis nigris, quibusdam connexis futura longitudinali nigra. Fn. 403.

Frisch. germ. 9. p. 34. t. 17. f. 6.

Habitat in arboribus.

DESCR. Thorax antice ruber, postice niger. Elytra rubra, maculis s. punctis plurimis (16.), quadratis, atris, connatis inter se cum margine interiore coleopterorum nigro; differt itaque paucis a sequente. LARVA hujus hispida est,

490. COCCINELLA conglomerata coleoptris flavescentibus: punctis nigris plurimis contiguis.

Coccinella coleoptris flavescentibus, punctis plurimis nigris, omnibus connexis futura longitudinali nigra. Fn. 402.

Raj. inf. 87. n. 5. Scarabæus hemisphæricus flavus, maculis nigris variae figuræ.

Lift. loqu. 383. n. 9. Scarabæus luteus, nigris maculis distinctus.

Frisch. germ. 9. t. 17. f. 4. 5.

Habitat in sepibus.

DESCR. Præcedenti magnitudine & facie simillima; sed thorax, qui niger, ad latera majoribus albis maculis, & antice macula majori alba, & in medio versus elytron albus, includens maculam duobus tribusque punctis nigris notatam. Elytra singula rubra notantur cruce, cujus radix (versus caudam) emarginato-bifida; maculæ hie fere nullæ distinctæ, sed omnes in crucem hanc coalitæ.

491. COCCINELLA guttato-punctata coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim, nigris tribus.

Habitat passim, licet rario.

Simillima Coccion, decempustulata, ut nesciam num sola sexus intercedat differentia.

492. COCCINELLA *quatuordecimpunctata* coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim. Fn. 397.

*List. log. 383. n. 10.* Scarabæus subrufus, cui in humeris pinnæ maculatæ, inque singulis alarum thecis septem maculæ albæ sunt.

*Aet. apf. 1736. p. 18. n. 5.* Coccionella punctis quatuordecim.

Habitat in nemoribus & hortis.

*DESCR.* Magnitudo ad medias accedit. Thorax ruber lineola alba longitudinali in medio, et macula utrinque alba. Elytron singulum notatur VII punctis, eo ordine a thorace versus caudam numerando puncta, ut 1, 3, 2, 1.

493. COCCINELLA *sedecimguttata* coleoptris luteis: punctis albis sedecim. Fn. 399.

Habitat in *Lapponia Lulenfi sylvatica*.

*DESCR.* Thorax luteus maculis 5 flavis, absque ulla linea intermedia. Elytron singulum luteum notatum punctis octo, a thorace numerando 2, 3, 2, 1. Caput flavum.

494. COCCINELLA *octodecim guttata* coleoptris rubris: punctis albis sedecim: duobus primis lunatis.

Habitat rarius apud nos.

495. COCCINELLA *vigintiguttata* coleoptris rubris: punctis albis viginti. Fn. 400.

Habitat in arvis.

*DESCR.* Magnitudine & facie cum præcedentibus duabus convenit. Thorax ruber ad marginem lateralem utrinque lineola arcuata alba notatus, inter has lineolas a tergo duo puncta alba minora superiora, & duo alba alia inferiora s. elytris propiora paulloque majora: in singulo Elytro, quod rubrum est, puncta decem sunt alba, quorum duo in medio fere contigua.

496. COCCINELLA *oblongo-guttata* coleoptris rubris: lineis punctisque albis. Fn. 389.

*It. oeland. 148.* Coccionella coleoptris rubris: lineis quatuor albis longitudinalibus.

Habitat in sepibus.

*DESCR.* Reliquis omnibus, hujus generis, nostris paullo major. Elytra & thorax rubra, latera thoracis utrinque alba: singulum Elytron notatur duabus lineolis longitudinalibus albis, quarum interior puncto albido aucta est, vel in medio interrupto, duobus punctis oblongis constans.

497. COCCINELLA *obliterata* coleoptris flavis: punctis quatuor rufis: anticis obsoletis.

Habitat passim, minus frequens.

498. COCCINELLA *bipustulata* coleopteris nigris, punctis rubris duobus, abdomine sanguineo. Fn. 409.  
*Frisch. germ.* 9. p. 34. t. 16. f. 6. Coccinella media nigra, punctis duobus rubris dorsalibus.  
 Habitat in *Sorbo*, mense septembri, Fahlunæ & alibi.  
 DESCR. Est magnitudine mediocris, antecedenti simillima, ambitu fere orbiculata, tota nigra, nitida, margine prominulo. Thorax absque maculis. Elytron singulum in medio fert maculam s. punctum latum sanguineum, saepe ex tribus punctis conflatum. Abdomen inferius rufescit, alias tota tubus nigra. tergum sub elytris etiam sanguineum. Pupa hispida est.
499. COCCINELLA *quadripustulata* coleopteris nigris: punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. Fn. 408.  
 Habitat in *Urtica majore*, *Rubo* aliisque.  
 DESCR. Inter minores est, ovata, nitida, atra. Caput atrum, Thorax ater cum pari punctorum excavatorum a tergo. Elytra nigra, singula juxta basin ad marginem exteriorem macula minore rubra cum puncto ferrugineo, & alia minore, in medio elytri, versus marginem interiorem, itidem rubra. Anus ruber est.
500. COCCINELLA *sexpustulata* coleopteris nigris: punctis rubris sex. Fn. 407  
*Raj. inf.* p. 87. n. 4. Scarabæus hemisphæricus minor, elytris nigris rubris maculis pictis.  
 Habitat in arboribus sat rara.  
 DESCR. Thorax totus niger. Elytra atra, nitida, singula tribus punctis sanguineis, quorum quod thoraci proximum majus est; ultimum punctum versus ipsum apicem elytri situm, at intermedium propius margini interiori, quam exteriori collocatum; varietatem absque tertia macula apud D. de Geer vidi.
501. COCCINELLA *decempustulata* coleoptris nigris: punctis fulvis decem.  
 Habitat in pascuis.
502. COCCINELLA *quatuordecim pustulata* coleopteris nigris: punctis flavis quatuordecim.  
 Habitat in floribus Centaureæ Scabiosæ frequens.  
 DESCR. Est inter minores species numeranda. Elytra nigra cum tribus paribus punctorum rubrorum & ultimo adhuc impari. Thorax nigricat cum puncto utrinque rubro.
503. COCCINELLA *sedecimpustulata* coleoptris nigris: punctis fulvis sedecim.  
 Habitat rarius apud nos.
504. COCCINELLA *pantherina* coleoptris nigris: punctis flavis octo.  
 Habitat paucum.

505. COCCINELLA *tigrina* coleopteris nigris: punctis albidis viginti. *Fn. 405. Uddni. diff. II.*  
Habitat in Scania & Smalandia.

DESCR. Capitis frons alba. Thorax niger, utrinque albus puncto nigro. Elytra nigra punctis nigris: ad basin 1, dein 3, tum 3, deum 2, ultimo 1.

## Chrysomela.

506. CHRYSOMELA *göttingensis* ovata nigra, pedibus violaceis.

Habitat in Scania.

DESCR. Corpus magnitudinis mediæ, nigrum vel atro-violaceum absque punctis conspicuis. palmae pedum & intimus antennarum articulus ferruginea.

507. CHRYSOMELA *Tanaceti* ovata atra punctata, antennis pedibusque nigris.

Chrysomela atra; punctis excavatis contiguis. *Fn. 413. It. goth. 270.*

Habitat in *Tanaceto* in insula Gotlandiæ versus austrum *Helligholmen* dicta, copiose, ut & ad fodinas lapideas *Burswiken*, tarde admodum incedens.

DESCR. Est e majoribus hujus generis. Tota atra, minime nitida; Thorax & Elytra punctis minutissimis conterrissimis excavata. Elytra fatis flexilia, mollia & obtuta sunt. Antennæ undecim articulis. Margo elytrorum prominens.

508. CHRYSOMELA *haemorrhoidalis* ovata nigra nitida, antennis basi flavescentibus, anno rubro.

Chrysomela nigra glabra; antennarum basi subflava. *Fn. 414.*

Habitat in *Roslagia*. de Geer. in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Media, punctis nec contiguis, nec striatis; in elytris color dein parum ad cæruleum vergit.

509. CHRYSOMELA *Graminis* ovata viridis nitida, antennis pedibusque concoloribus.

Chrysomela viridi-cærulea. *Fn. 419.*

*Aet. upf. 1736. p. 17. n. 1.* Chrysomela viridi-cærulea nitida.

Habitat copiose in *Gramine* prætorum primo vere juxta urbem *Hernösand* Angermanniae 1732. & Drotningholm 1753.

DESCR.

# INSECTA COLEOPTERA. CHRYSOMELA. 161

DESCR. Est animal e majoribus hujus genetis, admodum convexum, Totum e viridi & cæruleo colore sericatum & auratum. Elytra margine parum prominentia & punctis minutissimis excavatis distincta, nec contiguis (ut in antecedenti) adspersa admodum convexa sunt hæc elytra, & proin subtus magis concava. Antennæ & pedes virides. Abdomen viride.

510. CHRYSOMELA *anæa* ovata viridis nitida, ab domine postice ferrugineo.

Chrysomela viridis nitida, thorace antice excavato. Fn. 420. Habitat in *Alno*.

DESCR. Tota nitida. Thorace antice non æqualiter truncato, sed sinu excavato. Punctum excavatum in medio sterni. Pedes & Antennæ nigrae, hæ basi pallidæ.

511. CHRYSOMELA *Alni* ovata violacea, elytris punctis excavatis sparsis.

Chrysomela nigro-purpurea, punctis excavatis adspersa. Fn. 416.

Frisch. germ. v. 7. p. 13. t. 8. Scarabæus alni cæruleus.

Habitat in *Alno* frequens vere, cujus folia consumit.

DESCR. Betulae Chrysomelæ adeo similis est, ut ovum óvo, modo major, & elytris quidem punctis excavatis, sed sparsis, nec uti Bétula in strias longitudinaliter digestis. Caput & thorax subtus, uti & pedes & antennæ, nigra sunt. Color violæ martiæ odoratæ.

512. CHRYSOMELA *bæmaptera* ovata violacea, alis rubris. Habitat in *Lucis*.

DESCR. Corpus majuscum, supra nigricans s. subcærulescens; subtus una cum pedibus cæruleum. Antennæ nigrae. Alæ rubræ.

513. CHRYSOMELA *Padi* ovata nigra, elytris apice lividis.

Chrysomela elytris fuscis pone lividis. Fn. 434. Habitat in *Pruno Pado*.

DESCR. Magnitudine pulicem vix superat. Corpus nigrum; thorax & elytra fusca, sed elytra magis pallida & livida postice.

514. CHRYSOMELA *Betulae* ovata violacea, elytris punctis excavatis striatis.

Chrysomela nigro-purpurea, punctis excavatis striata. Fn. 415.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 3. Attelabus cæruleus nitidus oblongiusculus, subtus niger.

Habitat in *Betula*, cujus foliis pascitur. Larva degit sub foliis Betulae, cujus inferior superficies ab ea consumitur, relictis nervis vel vasis foliorum crassioribus durioribus que, nec non epidermide seu superficie folii superiore cœlum spectante; hocce duin nutritur paulo Abdomen

*f. caudam multoties adtollit & erigit. Consumta sic foliorum pulpa, maculam pallidam exsiccacem ostendit folium; hincque autumno vel Augusto Betulæ folia saepe maculantur. Ova plumbea, globosa, numerosa, juxta se invicem collocata, nitida, saepe reperiuntur in inferiore foliorum superficie.*

*DESCR.* Insectum atro-cæruleum ad purpuram vergens, seu proprium violaceum floris violæ martiae omnino colore; solus venter, pedes & antennæ nigra. *Caput & thorax* punctis excavatis minutissimis inordinatis fere contiguis adspersa; at *Elytra* striis vix oculis percipiendis, ex punctorum excavatorum minutissimorum serie, notantur, quibus, ut & parvitate, a sequenti differt.

*LARVA* satis similis facie est Coccinellarum Erucis; Incisuræ singulæ in medio, verrucarum ordine transversali instructæ, quæ verruce apice pilosæ sunt & humorem excernentes. Abdomen pallidius est, etiam verrucosum.

515. CHRYSOMELA *Armoraciæ* ovata nigra nitidissima subcærulescens, subtus atra.

Habitat in *Armoraciæ* foliis.

*DESCR.* Corpus magnitudine feminis Cannabis, supra cærulo aut viridi nitens, subtus una cum pedibus nigrum, nitidum, ovatum. Ad basin medianam elytrorum quasi foveola adparet.

516. CHRYSOMELA *Hypocharidis* ovata aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis. *It. scan.* 210. \*

Habitat in floribus *Hypocharidis maculatae*, frequens in Scania campestri.

517. CHRYSOMELA *vulgatissima* oblongo-ovata cærulea, antennis basi ferrugineis.

Habitat in nemoribus.

*DESCR.* Corpus colore Chr. *Armoraciæ* f. obscure cærulescens f. æneulum nitidum, at magis cylindricum, quam ovatum.

518. CHRYSOMELA *staphylea* ovata obscure testacea tota.

*Act. upsi.* 1736. p. 17. n. 3. *Fn.* 422.

Habitat in *lingno putrido* primo vere.

*DESCR.* Inter majores generis species numeranda est. Color totius corporis, elytrorum, thoracis, antennarum, abdominis & pedum unicus idemque obscure testaceus, f. castaneus; sed omnium simillimus est feminæ *Staphyleæ* f. *Staphylodendri*, nec novi aliud hujus singularis coloris, a quo similitudinem desumam. *Antennarum* extimus articulus ovatus est, reliqui breviores. *Elytra* punctis minutissimis inordinatis excavatis adspersa. *Thorax* utrinque margine crassiunculo notatus, & utrinque macula depresso. *Corpus* ovatum. *Oculi* soli nigri. *Antennæ & Pedes* magis rubent. plantæ pedum subtus albæ.

# INSECTA COLEOPTERA. CHRYSOMELA. 163

## 519. CHRYSOMELA *Vitellinae* ovata ænea.

Chrysomela ænei coloris. Fn. 416.

Habitat in *Salice tetrandra* & *Populo tremula*.

DESCR. Hæc mediocris magnitudinis, tota e rubro ænea s. ænei politi coloris, vel etiam nigrante ænei coloris.

## 520. CHRYSOMELA *Polygoni* ovata cœrulea, thorace femoribus anoque rufis. Fn. 440.

Aet. apf. 1736. p. 19. Attelabus subrotundus cœruleo-nigricans; collari testaceo.

♂ Chrysomela viridis nitida, thorace antice æquali, elytris pone contiguis. Fn. 421.

Habitat frequens ruri in *Polygono aviculari*. Ovis gradata intumescit, ut abdomen duplo majus evadat capacitatem elytrorum.

DESCR. Inter minores est hæc numeranda. Caput & Elytra nitida, viridi-cœrulea, punctis sparsis excavatis. Thorax minor, viridi-ruber seu testaceo-ruber, crassus, convexus. Antennæ nigrae, subclavatae. Femora rufa; palmae nigrae.

## 521. CHRYSOMELA *pallida* ovata flavescentia tota, oculis nigris.

Chrysomela pallido-grisea. Fn. 423.

Habitat in *Salice*.

DESCR. Color griseus s. testaceus toto corpore; Chr. staphyleæ simillima, sed paulo minor, plantæ-pedum subtus exalbescentes. Oculi nigri, præcipua nota, qua a Chr. staphylea differt, (præterquam colore longe pallidiore) consistit in singulis elytris punctis per 9 ordines longitudinaliter digestis, cum in illa puncta sparsa, nec per strias distributa.

## 522. CHRYSOMELA *polita* ovata, thorace aurato, elytris rufis.

Chrysomela viridi-ænea, elytris rubicundis. Fn. 427.

Habitat in *Salice*, *Populo*.

DESCR. Media. Caput & thorax pulchre nitent. Elytra rubro-testacea apicibus immaculatis.

## 523. CHRYSOMELA *Populi* ovata, thorace cœrulecente, elytris rubris apice nigris.

Chrysomela nigro-cœrulea, elytris rubris apice nigris. Fn. 428.

It. æl. 38. Chrysomela thorace viridi cœruleo, elytris rubris apice nigris.

Habitat in *Populo*, cujus folia consumit, primo vere frequens, unde foliorum sceleta quasi ex retibus facta, solis vatis constantia; saepè arbores ab ea omnibus foliis iuis spoliantur.

**DESCR.** Inter maximas hujus generis haec est. *Elytra* rubra, punctis minutissimis excavatis adspersa: apex elytrorum minimam maculam nigrum habet. *Thorax* glaber, viridi-nigroque cæruleus, ut & scutellum & abdomen, & Caput & pedes. *Antennæ* magis nigricantes; margo thoracis linea impressa distinctus. margo elytrorum inflexus corpus arcte ambiens. *Alae* & dorsum nigricantes. Variat elytris rubris & flavis, forte sexu? *Antennæ* Chrysoinelæ hujus non laeillatae sunt, uti à Listero descriptæ, sed ut in reliquis II articulis filiformes, infimo majori. *LARVA* tacta dimittit oleosum quoddam flaveiens per tubercula lateralia, foetidissimaque est, ut nullo modo ferri queat.

524. **CHRYSOMELA Viminalis** ovata nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis.

Chrysomela thorace elytrisque rubris. *Fn.* 429.

Habitat in *Salice caprea*.

**DESCR.** Corpus totum nigrum, uti caput, antennæ, abdomen, pectus subtus, pedes, at thorax ruber est cum duobus punctis fuscis juxta elytra, & elytra ipsa rubra; in singulo elytro 9 ordines punctorum minutissimorum vixque conspicuorum.

*LARVA* nigra est, & valde rugosa. *PUPA* vero flava.

525. **CHRYSOMELA decempunctata** ovata, thorace rubro postice nigro, elytris rufis: punctis subquinis nigris.

Chrysomela supra rufa, thoracis punctis nigris duobus, elytrorum pluribus. *Fn.* 436.

Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris. *Fn.* 1354.

Habitat in *Populo*.

**DESCR.** Corpus nigricans: puncta nigra in Elytris singulis 3 vel plura. Thorax ruber, in medio postice niger. *Antennæ ferrate*.

526. **CHRYSOMELA lapponica** ovata, thorace viridi, elytris rubris: fascia inter punctum maculamque lunatam cærulea.

Chrysomela thorace viridi, coleopteris rubris, cruce cærulea. *Fn.* 431.

*Act. upf.* 1736. p. 17. n. 4. Chrysomela viridi-aurea rubro variegata.

Habitat in *Lapponia Umensi*.

**DESCR.** Figura & facie ad Chrysomelam Populi quodammodo accedit. Caput & thorax colore aeneo-viridi. *Antennæ* nigrae, congeneribus simillimæ; Pedes nigri maxima ex parte. *Elytra* autem maxime singularia & pulcherrima, colore dilute rubra, fasciis aeneo-cæruleis picta, ita ut macula ad basi elytri subrotundata, nec connexa cum reliquis, nisi cum thorace. Margo interior elytrorum secundum longitudinem aeneo-cæruleus; in medio elytri fascia linearis transversa, utrinque margine repanda, conficit cum macula longitudinali, secundum marginem interiorem excurrente, crucem. Inter ramos hujus crucis & apicem elytrorum, seu pone fasciam intermedium est arcus fere circularis, reliquis maculis conco-

lor,

lor', cuius alterum crus innascitur macula longitudinali ad marginem interiorem elytrorum, altero crure libero anumque respiciente. Caput, thorax & elytra punctis minutissimis excavatis inordinatis adpersa sunt.

**527. CHRYSOMELA Boleti ovata nigra, elytris fasciis tribus flavis repandis.**

Habitat in *Boletis* arborum.

DESCR. *Corpus* majuscum, fere hemisphaericum, atrum, glabrum. *Elytra* fasciis tribus, flavis, repandis, latis; quorum prima in basi, ultima in apice minima.

**528. CHRYSOMELA collaris ovata violacea, thorace marginibus luteis puncto nigro.**

*Chrysomela* nigro-purpurea; thorace utrinque luteo: puncto nigro. *Fn. 417.*

*Act. upj. 1736. p. 17. n. 5.* *Chrysomela* violaceo-nigra, collari margine rubro.

Habitat in *Salice*.

DESCR. Magnitudine & fascie *Chrysomelæ Alni* simillima; color omnium idem. *Elytra* punctis minutissimis excavatis adpersa; que puncta vaga, nec striatim digesta sunt. *Thorax* levius & glaber est, ad latera ruber, in medio longitudinaliter violaceus, uti *elytra*, aut paullo magis nigricans in medio. *Caput*, *Pedes*, *Abdomen* nigra. Punctum nigrum, in medio coloris lutei, ad thoracis latera.

**529. CHRYSOMELA sanguinolenta ovata nigra, clytris margine sanguineis.**

Habitat in *salicetis*.

DESCR. *Corpus* majuscum, nigrum, nitidum. *Thorax* marginatus, *Elytra* margine exteriore sanguinea. *Pedes* nigra.

**530. CHRYSOMELA marginata nigro-cænea, elytris margine luteis.**

Habitat in *Fruticibus*.

DESCR. Colore praecedenti similis, sed magnitudo quadruplo minor, nec *Thorax* in hac marginatus est.

**531. CHRYSOMELA marginella oblonga ovata nigro-cærea, thorace elytrisque margine luteis.**

*Chrysomela* supra nigro-cænea; margine coleoptrorum luteo. *Fn. 437.*

*Raj. inf. 99.* *Scarabæus* antennis clavatis tertius.

Habitat in *Ostrogothia*. de Geer. in *Scania*. J. Leche. Upsilon in *Ranunculo echinato*. *Nos.*

DESCR. Mediae magnitudinis: margo exterior elytrorum & Thoracis flavescens; *Thorax* & *Caput* nigro-cænea; subtus tora atra, *Corpus* ovale est. *Pedes* nigri.

532. CHRYSOMELA *coccinea* ovata, thorace emarginato sanguineo: macula nigra, elytris sanguineis: maculis duabus nigris.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Magnitudo media. Caput parvum, nigrum. Thorax quadrangularis, coccineus, medio niger. Elytra coccinea, in singulis maculæ rotundæ duæ. Abdomen sanguineum. Pedes & Antennæ nigrae.

533. CHRYSOMELA *minuta* ovata nigra, elytris pedibus thoracisque lateribus griseis.

Habitat in subhumidis.

DESCR. Magnitudo Pediculi, figura coccionellæ, fascie Dytisci. Elytra pallide flavescens striis fuscis, ex punctis nigricantibus, oculo armato conspicuis.

534. CHRYSOMELA *oleracea* saltatoria, corpore virescenti-cæruleo.

Habitat in oleribus frequens.

DESCR. Magnitudine antecellit Chrys. saltatorias plerasque nocturnas. Color e viridi-cærulæ subnitens. Antennæ nigrae.

535. CHRYSOMELA *brysocephala* saltatoria: corpore atro-cæruleo, fronte pedibusque quatuor anterioribus luteis.

Habitat in Lucis

DESCR. Corpus pediculo paullo majus, nigrum. Frons, antennarum basis, pedes 4 anteriores subferruginea. Thorax ater, nitidus. Elytra striata, subcærulescenti-nigra.

536. CHRYSOMELA *Hyoscyami* saltatoria, corpore virescenti-cæruleo, pedibus testaceis, femoribus potticis violaceis.

Mordella ovata cærulea nitida; tibiis ferruginea. Fr. 540.

Raj. inf. 98. n. 9. Scarabæus antennis articulatis longis s. Capricornus exiguus saltatrix.

Act. upf. 1736. p. 18. n. 5. Gyrinus cæruleus nitidus.

Habitat inter Brassicas nuper satas, quas devastat, edit etiam *Hyoscyamum*.

DESCR. Magnitudo majoris pediculi. Tota cærulea, nitens, convexa, ovata. Femora crassa, nigra, saltatoria, alta; Tibiae ferruginea.

537. CHRYSOMELA *atricilla* saltatoria nigra, thorace elytris tibiisque testaceis.

Habitat in Plantis.

DESCR. Magnitudo pulicis. Caput, Pectus, Abdomen, Femoraque postica atra. Antennæ, Thorax, Elytra & Pedes testaceæ.

538. CHRYSOMELA *erythrocephala* saltatoria, corpore atro-cærulæ, capite geniculisque pedum rufis.

Habitat

Habitat in Lucis.

DESCR. *Corpus* pédicula paullo majus, atrum. *Frons ferruginea*. *Pedum* quatuor anteriorum genua rufa. *Elytra* cærulescenti-atra.

539. CHRYSOMELA *Modeeri* saltatoria ænea nitida, elytris apice flavis, pedibus anterioribus tibiisque posticis luteis.

Habitat Calmariæ A. Modeer.

DESCR. *Corpus* pulice minus, æneum, nitidum, *Elytra* striata, apice late flava. *Antennæ* basi luteæ.

540. CHRYSOMELA *Helxines* saltatoria, corpore viridi-æneo, antennis pedibusque omnibus testaceis.

Mordella subrotunda atro-ænea. Fn. 539.

Habitat in terra, primo vere, præsertim in cotyledonibus Polygoni *Fagopyri*.

DESCR. Pulice longe minor. *Tota supra nigra æneo-nitens*. *Elytra* punctis excavatis striata; subtrus rotundus cum pedibus nigra.

541. CHRYSOMELA *exoleta* saltatoria flavescens, pedibus testaceis, abdomine capiteque fusco.

Mordella flava. Fn. 535.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudo pediculi: facies Chrysomelæ, omnia ejusdem coloris fulvo-flavi, cum antennis, elytris, pedibus, trunco, abdomine.

542. CHRYSOMELA *nitidula* saltatoria, elytris cæruleis, capite thoraceque aureo.

Habitat in Plantis.

DESCR. *Corpus* subtrus una cum femoribus posticis atrum; *Caput & Thorax* aurata. *Elytra* cærulea, nitida, striata. *Pedes & antennarum bases* ferrugineæ.

543. CHRYSOMELA *nemorum* saltatoria atra, elytris linea flava, pedibus pallidis.

Mordella oblonga atra; elytris longitudinaliter in medio flavescens. Fn. 542.

*List. mut. t. 31. f. 29.*

*Act. upf. 1736. p. 18. n. 6. Gyrinus niger, utrinque albus.*

Habitat in *Pulmonaria*, *Dentaria*, & aliis plantis vere, præsertim in *Tetradynamis*.

DESCR. Magnitudo maximi pulicis. *Corpus* oblongum, nigrum, minime nitens. *Antennæ* setacea, truncata, articulis undecim nigris, exceptis in quibusdam secundo & tertio albis. *Elytra* nigra, singula in medio longitudinaliter flavescens, undique tamen margine nigro cincta, etiam ad futuram longitudinaliorem. *Pedes* saltatorii pallidi. *Daturque reliquis* duplo major.

544. CHRYSOMELA *holistica* saltatoria nigra nitida, elytris apice puncto rubro.

*Mordella nigra*, elytris apice rubris. Fn. 544.

A&T. upsi. 1736. n. 3. *Gyrinus niger* nitidus; elytrorum apice rubro.

Habitat inter olera, rara apud nos. in Holstia frequentissimum esse observavimus 1735.

DESCR. Magnitudo majoris pediculi, tota atra, nitida; in apice utriusque elytri punctum rubrum.

545. CHRYSOMELA *rufipes* saltatoria cærulea obovata, capite thorace pedibus antennisque rufis.

Habitat in Plantis.

DESCR. Corpus duplo major Pediculo. Elytra atro-cærulea, nitida.

546. CHRYSOMELA *tridentata* cylindrica, thorace cæruleo, elytris testaceis.

Habitat in *Populo*, *Salice*.

DESCR. Corpus mediae magnitudinis, capite, thorace & abdomine viridi s. cæruleo nitidum. Elytra pallide testacea. Antennæ nigrae, subpectinatae. Pedes nigricantes. Singularis est nota, quod thorax postice tricuspidatus dente medio, loco scutelli.

547. CHRYSOMELA *quadripunctata* cylindrica, thorace nigro, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus.

*Chrysomela oblonga nigra*, coleopteris rubris, maculis quatuor nigris. Fn. 432.

Habitat in sylvis *Lößtadiensibus*. de Geer; in *Upfaliensibus* E. Ekelund.

DESCR. Major reliquis omnibus teretior, oblongior; in singulo. Elytro puncta majora duo, quorum prius magis ovatum, posterius majus transversum. Antennæ fere pectinate. Thorax brevis.

548. CHRYSOMELA *bipunctata* cylindrica, thorace nigro nitido, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longis.

Habitat in fruticibus.

DESCR. Corpus nigrum. Thorax eter, nitidissimus, Elytra luteo-ferruginea cum puncto nigro elevato parvo ad basin, & macula orbiculata nigra, fere in medio elytri. Antennæ nigrae, longitudine corporis.

¶ Varieras cui in Elytris macula unica oblonga nigra, elytris paulo brevier.

549. CHRYSOMELA *quadripustulata* supra nigra, elytris rufo-bintaculatis.

Habitat in Suecia D. C. Solander.

DESCR.

**DESCR.** Media s. parva. Tota supra nigrior, subtus ferruginea. *Caput* ferrugineum. *Thorax* niger punctis 2 impressis. *Elytra* nigra macula ad basin majore rufa; alia ante apicem minore rufa. *Pedes & Abdomen* ferruginei.

550. **CHRYSOMELA morei** cylindrica, thorace nigro, elytris nigris: maculis duabus rubris marginalibus.  
Habitat rarius Upsaliæ. Joh. Moræus.

**DESCR.** *Caput* nigrum: fronte punctis duobus testaceis. *Thorax* ater, levius, margine antico angulisque posticis albis. *Elytra* nigra, levia, in singulis maculæ duæ flavæ: altera ad apicem; altera ad marginis exterioris medium. *Femora* antica a latere anteriore subferruginea.

551. **CHRYSOMELA nitens** cylindrica, thorace cæruleo nitido. elytris cæruleis, pedibus testaceis.  
Habitat in Plantis.

**DESCR.** Variat colore viridi, cæruleo & nigricante. *Magnitudo* semine oryzae majore vel minore. *Os* flavum. *Pedes* testacei, nunc omnes, nunc tantum anteriores. *Antennæ* basi flavæ.

552. **CHRYSOMELA Barbareæ** cylindrica ovata, antennis basi oreque ferrugineis.

Habitat in *Barbareæ* floribus. C. Blom.

**DESCR.** Magnitudo pediculi, *Antennæ* corpore vix breviores, basi ferrugineæ. *Os* flavescens. *Thorax* ater, politus. *Elytra* nigra, non nitida, punctis substriata, sed apice glabriora. *Pedes* nigri. *Femora* crassiuscula.

553. **CHRYSOMELA labiata** subcylindrica atra, thorace nitido; ore, pedibus anticis basique antennarum lutescentibus.

Habitat in Plantis.

*Magnitudo* pediculi.

554. **CHRYSOMELA sericea** cylindrica, thorace elytris pedibusque cæruleis.

*Chrysomela* viridis nitida, thorace æquali, elytris punctis excavatis contiguis pone dehiscentibus. *Fz.* 418.

*Aet. upj. 1736. p. 17. n. 2.* *Chrysomela* viridis nitida.  
Habitat in *Salice*.

**DESCR.** Insectum sericeo-viride, punctis, si lente observentur, contiguis seque invicem tangentibus, excavatis; versus anum obtusum est animal; elytra pone dehiscent. *Thorax* æqualis, minus punctatus, *antennæ & pedes* nigricantes.

555. **CHRYSOMELA Coryli** cylindrica, thorace elytrisque testaceis, pedibus nigris.

Habitat in *Corylo*.

**DESCR.** Corpus mediæ magnitudinis. *Caput* nigrum, inflexum cum linea

neola arcuata flava ante singulos oculos. *Antennæ* corpore breviores. *Thorax* rufus, glaber. *Elytra* rufa, obtusa, striata, apice inflexa.

556. CHRYSOMELA *Pini* cylindrica testacea, elytris pallidioribus, pedibus concoloribus, antennis fuscis.

Habitat in *Pino*.

DESCR. *Corpus* vix dupla pediculi magnitudine. *Thorax* glaberrimus. *Elytra* minime striata.

557. CHRYSOMELA *bathnica* cylindrica atra, thorace linea longitudinali rubra.

Habitat in *Westrobuthnia*. D. C. Solander.

DESCR. *Corpus* atrum, glaberrimum. *Frons* ferruginea. *Thoracis* margino anterior & linea dorsalis latiuscula sunt ferruginea. *Pedes* etiam magna ex parte lutei.

558. CHRYSOMELA *cordigera* cylindrica, thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris.

Habitat in fruticibus.

DESCR. *Caput* nigrum, in fronte album. *Antennæ* nigræ, basi rufescentes. *Thorax* niger, macula cordata alba ad scutellum; ante hanc linea alba. Latera thoracis alba puncto nigro. *Scutellum* nigrum. *Elytra* rubra; in singulo puncta duo, quorum anterior ab opposito remotius. *Femora* nigra, apice extrorsum alba. *Tibiae* ferruginea.

559. CHRYSOMELA *sexpunctata* cylindrica, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. *Corpus* mediæ magnitudinis. *Caput*, *Antennæ*, *Pedes*, abdomen & omnia subtus nigra. *Thorax* supra ruber maculis duabus marginique postice nigris. *Elytra* rubra; in singulo 3 puncta nigra, quorum duo anteriora paria parva; unicum posticum duplo majus.

560. CHRYSOMELA *decem-punctata* cylindrica, thorace variegato, elytris flavis: punctis quinque nigris.

Habitat in nemoribus.

DESCR. *Corpus* supra flavum, subtus nigrum. *Frons* medio flava. *Antennæ* apice nigræ. *Thorax* ad latera niger. *Elytra* singula punctis quinque majusculis nigris: quarum primum inferius glaberrimum; ultimum impar. *Pedes* subferruginei & nigri.

561. CHRYSOMELA *obscura* subcylindrica, thorace nigro, elytris pedibusque nigris.

Habitat in sylvis.

DESCR. Statura curculionis, *Corpus* atrum, minime nitens. *Thorax* rotundatus.

562. CHRYSOMELA *longimana* subcylindrica obscuræ, elytris livido flavis, pedibus anticis longissimis.

Habitat

Habitat in *Trifolio montano* frequens. *Adolph. Modeer. Phil. Mag.*

*DESCR.* *Corpus* medium, totum etiam scutello nigro-aeneum. *Antennæ* nigrae, subpestitatae. *Thorax* postice utrinque quasi mucronatus. *Elytra* basi puncto mucronato, tota triste flava. *Pedes* anteriores longiores.

563. CHRYSOMELA *merdigera* oblonga rubra, thorace cylindraceo utrinque impresso. *Fn. 425.*

*Blank. belg. p. 91. t. 11. f. 3.*

*Merr. eur. 71.*

*Reaum. gall. 3. t. 17. f. 1. 2.*

Habitat in *Lilio*, *Convallaria*, cuius larva testa legitur proprio stercore.

*DESCR.* Inter mediocres magnitudine est collocanda. *Rubra* sunt Thorax, elytra, caput superne, pedes. *Nigra* vero antennæ, oculi, pedum genicula, abdomen, scutellum, caput subtus, ut & thorax subtus. *Thorax* elytris longe angustior, teres, sed ad utrumque latus cavitate impressa notatus. *Elytra* punctis minutissimis excavatis striata sunt. *Variat* capite & pedibus nigris.

564. CHRYSOMELA *tenella* oblongiuscula ferruginea, elytris margine thoraceque flavis.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* *Similis* Chr. capreæ, sed triplo minor. *Thorax* flavus absque maculis. *Elytra* ferruginea, flavo marginata. *Antennæ* flavescentes, nec nigrae. *Pedes* flavi. *Abdomen* fuscum.

565. CHRYSOMELA *Nymphææ* oblonga fusca, elytris margine prominulo flavescentibus.

*Chrysomela coleopteris fuscis, margine flavo-pallidis. Fn. 444.*

Habitat in foliis *Nymphææ* circa 24 Junii in copula frequenter observatur, præsertim in fluvio Upsaliensi, ignavum maxime & tardum animalculum.

*DESCR.* Est mediæ magnitudinis. *Caput* fuscum. *thorax* subflavus, inæqualis. *Elytra* planiuscula nigra, opaca, punctis excavata, margine laterali & postico (non vero versus futuram) flavo. *Pedes* flavi. *Antennæ* nigro & flavo alternatae, corpore diuidio breviores. *Aleæ* fuscæ, venis nigris. *Abdomen* a tergo flavescent-linea transversa, nigra, lata, in singulo segmento, at latere terram spectante nigrum.

*LARVA* nigra est, glabra, subtus flava.

566. CHRYSOMELA *caprea* oblonga, thorace nigro-punctato, elytrisque griseis, antennis nigris longis.

*Chrysomela nigra*; thorace elytrisque griseis. *Fn. 424.*

*Act. upf. 1736. p. 19. n. 6. Attelabus subrotundus griseus.*  
Habitat in *Salice* frequentissima.

*DESCR.*

*DESCR.* Elytra grisea, mollia, flexilia, pellucida, punctis minutissimis confertissimis excavatis adspersa. Caput nigrum, ut & antennae, pedes & ipsum corpus; magnitudine reliquis plerisque cedit. Thorax a tergo nigro maculatus.

567. CHRYSOMELA *Asparagi* oblonga, thorace rubro: punctis duobus nigris, elytris flavis: cruce punctisque quatuor nigris.

Chrysomela thorace rubro cylindraceo punctis duobus nigris, coleotperis flavis cruce nigra. Fn. 430.

Frisch. germ. I. p. 27. t. 6. Scarabæus cruciatus, erucæ Asparagi.

Habitat in *Asparagi* ramis, quos consumit Larva, apud nos etiamnum rarissima, Hamburgi autem vulgatissima, Asparagus devastans, e Russia cum eo adlata, ut ab Hortulanis creditur.

*DESCR.* Est precedentibus & minor & longe angustior. Caput nigrocaraleum. Antennæ nigrae. Thorax angustus, cylindraceus, punctis quobus nigris a tergo. Elytra oblonga, flava, versus marginem exteriorem secundum totam longitudinem fulva, Macula cruciformis carulea tegit coleoptera, cuius truncus incumbit margini elytri utriusque interioris secundum totam longitudinem; at rami breves sunt, nec marginem exteriorem elytrorum adtingunt; ad basin elytri macula oblonga caralea, quæ non conjungitur cum cruce; versus apicem elytri punctum caruleum rotundatum, quod saxe adnascit basi crucis.

LARVA nigro-fusca glabra.

568. CHRYSOMELA duodecim-punctata oblonga rufa, elytris punctis sex, pectore pedumque geniculis nigris.

Frisch. inf. 12. t. 28.

Habitat in *Asparago*.

Antennæ nigrae sunt. Thorax immaculatus.

569. CHRYSOMELA *Phellandrii* oblonga nigra, thorace elytrisque lineis duabus luteis.

Chrysomela nigro-aenea; elytrorum lineis duabus luteis. Fn. 448.

Habitat in *Phellandrii* caule & radice. Pupa alba cylindrica, angulata, obtusa.

*DESCR.* oblonga admodum est, tota supra nigro-aenea: Thoracis margine laterali flavo & singula Elytra in medio & margine exteriore linea longitudinali flava. Tibiae & femorum interior pars flava; Antennæ clavatae nigrae. Structura oblonga a ceteris differt.

570. CHRYSOMELA *Cerasi* oblongiuscula grisea, oculis nigris.

Chrysomela livida; oculis nigris. de Geer. Fn. 435.

Habitat

Habitat in Pruni *Padi* foliis.

DESCR. parva; tota pallida s. livida.

571. CHRYSOMELA *quadrimaculata* oblonga; thorace pedibusque flavis, elytris flavis: maculis duabus nigris remotissimis.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Corpus oblongum, totum pallide flavum. Caput; excepta fronte, nigrum. Elytra macula rotunda nigra ad basin & majore versus apicem.

572. CHRYSOMELA *cyanella* oblonga cærulea, thorace cyanidrico: lateribus gibbis.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Corpus totum obscure cæruleum, nitidum. Antennæ solæ nigræ.

573. CHRYSOMELA *melanopa* oblonga cærulea, thorace pedibusque rufis.

Habitat in nemoribus & pratis.

DESCR. Corpus oblongum, cæruleum. Thorax subglobosus, ferrugineus. Femora ferruginea. Palmae nigræ.

574. CHRYSOMELA *caraboides* nigra, elytris subcæruleis, plantis ferrugineis.

Habitat Calmariæ. A. Modeer.

DESCR. Statura Carabi, sed Thorax antice rotundatus, postice subtrilobus angulis acutis. Elytra striata, nigro-cærulea.

575. CHRYSOMELA *corvina* longa livida, thorace postice transverso.

Habitat in arboribus.

DESCR. Corpus oblongum, supra fuscum, subtus nigrum. Thorax subovatus, postice transversus, convexus. Elytra parum marginata.

576. CHRYSOMELA *ceramboides* longa nigra, elytris testaceis, antennis ferratis.

Habitat ruri.

DESCR. Corpus nigrum. Thorax ovatus, anterius angustior, postice subtransversus. Elytra elongata, testacea, substriata.

577. CHRYSOMELA *murina* longa nigra, elytris pedibusque testaceis.

Habitat in Suecia rarius.

DESCR. Corpus precedenti dimidio minus, ovato-oblongum, nigrum. Thorax semi-ovatus, convexus, postice transversus. Pedes ferruginei. Elytra testacea, minime striata.

578. CHRYSOMELA *birta* longa villosa nigra, thorace teretiunculo, elytris testaceis.

Habitat in Suecia frequens.

DESCR. *Corpus elongatum*, pubescens, nigrum. *Antennæ corpore dimidio breviores*, *Thorax subcylindricus*. *Elytra testacea*, *subdiaphana*, omnino pubescentia.

## Curculio.

579. CURCULIO *violaceus* longirostris violaceus, proboscide thoracis longitudine. Fn. 451.

Habitat in *Roslagia* de Geer.

DESCR. Mediæ magnitudinis; punctis excavatis striatus.

580. CURCULIO *Alliariæ* longirostris violaceus totus. Fn. 468.

Habitat in Erysimi *Alliariæ* caulibus, quos perforat.

DESCR. *Magnitudo pulicis*. *caput, thorax, femora nigro-cærulescentia*, sed *elytra magis saturate*, punctorum excavatorum striis exarata. Non salit; præcedenti simillimus, sed paullo major. *Corpus (exceptis elytris non ut in præcedenti, atrum. An sexus vel ætatis ditcrimen?*

581. CURCULIO *cyaneus* longirostris ater, elytris violaceis, scutello albo.

Curculio ater; elytris nigro-cærulescentibus. Fn. 467.

Habitat in Salice.

DESCR. *Magnitudo pulicis. caput, thorax & pedes atra*, punctis minimis excavatis adspersa. *Elytra violacea s. e nigro cærulescentia*, punctorum excavatorum striis exarata. *Pedes ferruginei*, quibus non salit. *Scutellum est punctum album.*

582. CURCULIO *aterrimus* longirostris ater, elytris nitidis.

Curculio ater; coleopteris nitidiusculis. Fn. 466.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Pulice dimidio minor. *totus atér*, sed *elytra punctis striata*, *nitidiuscula*. præcedenti quadruplo minor. *Abdomen cum elytris ovatum.*

583. CURCULIO *Cerasi* longirostris ater, elytris opacis oblongis.

Curculio ater; coleopteris oblongiusculis opacis. Fn. 465.  
It. scan. 355.

Habitat in *Cerasi* foliis, quorum epidermidem exedit larva, quæ mire devastavit 1750.

DESCR. Pulice duplo major. *totus ater*, *elytris punctis striatis opacis*, nec ullo modo nitidiusculis.

584. CURCULIO *acridulus* longirostris piceus, abdomine ovato. *Fn.* 463.

Habitat in *Tetradynamis* frequens.

585. CURCULIO *purpureus* longirostris purpureus nitens. *Fn.* 457.

*Pet. gaz.* 35. t. 22. f. 5. 5. Curculio miniatus minimus.

*List. loqu.* 394. Scarabæus ex toto coccineus.

Habitat in nemoribus. *De Geer.*

*DESCR.* Minor præcedenti: rostrum longissimum.

586. CURCULIO *frumentarius* longirostris sanguineus. *Fn.* 474.

*Leuv. arc.* 1697. aug. 6. p. 83. f. 1.

Habitat in *Frumento*, maxime noxius.

*DESCR.* pediculo paullo major.

587. CURCULIO *granarius* longirostris piceus oblongus, thorace punctato longitudine elytrorum.

Curculio rufo-testaceus oblongus; thorace elytrorum fere longitudine. *Fn.* 462.

*Raj. inf.* 88. Scarabæus parvus sordide s. obscure fulvus, proboscide longa deorsum arcuata.

Habitat in *Segetum* seminibus, quibus vescitur, inprimis *Avejnæ* seminibus granulatis.

*DESCR.* Totus omnibus partibus concolor, rufo-testaceus; corpus admodum oblongum est, & quod in hac specie singulare est, thorax valde longus & magnus, ut fere longitudinem elytrorum (non tamen omnino) adtingat. Thorax punctis excavatis adspersus, & Elytra striis excavata, magnitudo pediculi.

588. CURCULIO *dorsalis* longirostris, elytris rubris: sutura nigra.

Curculio niger; elytris in medio rufescentibus. *Fn.* 175.

*Aet. upf.* 1736. p. 16. n. 6. Curculio minimus fuscus, lateribus rufescentibus

Habitat in Ranunculo *Ficaria*.

*DESCR.* Magnitudo Pulicis, Totus niger vel ex cinereo nigricans, præfertim thorace, qui villis cinerascentibus manifeste adsperrgitur. Elytra striata, maxima ex parte rufa, excepta parte thoraci & futuræ longitudinali adjacente, quæ nigra, hinc clavis elytris-latera infecti rufa conspiciuntur. Femora nigra, sed Tibiae flavæ. Antennæ nigro-fuscæ infimo articulo non majore.

589. CURCULIO *Pini* longirostris, elytris testaceis: fascijs nebulosis.

Curculio longirostris, elytris macula ferruginea. *Fn.* 447.

*List.*

*Lift. loqu. p. 393. n. 29.* *Scarabæus majusculus scaber*, e  
leucophæo nigroque varius.

Habitat in *Pivo sylvestri*, resinam edens, frequentissimus apud  
nos: tarde incedit, arcte apprehendit, tenaciter adhaeret,  
ore frustra cœtein mordere tentat captivus.

DESCR. Versus anum valde gibbum est abdomen a tergo. Animalculum totum e griseo nigru; totum corpus, rostrum, thorax, elytra &  
pedes punctis minutissimis contiguis excavatis. Signaturæ aliquæ testaceaæ in thorace ex villis tenuissimis, similes etiam in formam fasciarum duarum transversarum linearum, quarum quæ thoraci propior ad suturam elytrorum interrupta est. Antennarum apices flavescunt. Simillimus C. Abietis, sed major, nec fasciæ elytrorum adeo regulares, sed magis  
huic consuæ.

LARVA rete subglosum in foliis texit, intra quod mutatur.

590. CURCULIO *Rumicis longirostris* griseus nigro-nebulosus oblongus, pedibusque antennisque subfuscis.

Habitat in *Rumice acuto & criso*, folia consumens sub-  
tus, unde foliorum maculae & vitia; delitescit sub foliis  
& ibi nidum figit reticulare flavum, intra quod mutatur.

DESCR. Media magnitudinis; Rostrum fere longitudine thoracis. Coleoptera subacuminata; denticulus nullus in femore anteriore, licet crassiore.

LARVA supra fusca: subtus flava, demum tribus primis segmentis cor-  
poris.

591. CURCULIO *Lapathi longirostris* albo nigroque varius muricatus.

Habitat in *Rumice imprimis aquatico*.

DESCR. Corpus mediae magnitudinis. Latera capitis thoracis elytrorum  
que alba, muricata. Elytra postice contracta, albida, at a tergo nigra-  
cantia, muricata. Abdomen nigricans. Tibie rufescentes.

592. CURCULIO *scaber longirostris* cinereus, pedibus rufis,  
elytris scabris. Fn. 471.

Habitat in Plantis & Terra.

DESCR. Magnitudo dupla pediculi. Distinguitur a reliquis, quod Elytra  
fusca albo obsoleto commaculata: adspersa sint setis brevissimis, crestiu-  
sculis, albis, rigidis.

593. CURCULIO *cupreus longirostris* obscure æneus, subtus  
obscurior.

Habitat in Plantis.

DESCR. Vix mulrum pediculum superat. Color tristis cupri, qui a colo-  
re cupri pilis-adsperso dependet. Elytra punctis latis excavatis striata.

594. CURCULIO *T. Album* longirostris ater, abdominis late-  
ribus posticisque luteis.

Habi-

Habitat in Westrobothnia. D. C. Solander.

DESCR. Pediculus major. Abdominis latera juxta pectus linea alba Trenferente.

595. CURCULIO *ruficollis* longirostris ferrugineus, elytris capitisque basi atro-cæruleis.

Habitat Calmariæ. Modeer.

DESCR. Corpus pediculo majus. Caput nigrum rostro flavo. Thorax ferrugineus. Elytra nigra, fere cærulecentia, nitidissima. Abdomen & Pedes ferruginea. Antennæ subfuscæ.

596. CURCULIO *Quercus* longirostris pallide flavus, oculis nigris. Uddm. diss. 25.

Habitat in Foliis *Quercus Roboris*, subcutaneus.

DESCR. Magnitudine Pulicem superat. Elytra sèpe fasciis duabus al bicantibus ad basin & suturam triangulum rectum formantibus.

597. CURCULIO *Polygoni* longirostris testaceus, coleoptorum satura repanda. Syst. nat. 10. p. 375. n. 22.

Habitat in *Polygono aviculari*. T. Bergman.

DESCR. Thorax obscurius testaceus: lineis 3 flavis. Elytra valde striata, flava, lineis 3 nigris sèpius interruptis.

598. CURCULIO *Viscariae* longirostris subrotundus cinereus, thorace elytrisque cinereo-virentibus.

Habitat in floribus *Lychnidis Viscariae*, calycem terebrando eos exsiccans. Modeer.

DESCR. Corpus magnitudine pediculi, obovatum, villosum, cinereo-virens. Caput & Pedes nigri.

599. CURCULIO *bipunctatus* longirostris cinereus, elytris macula nigra, tibiis flavescentibus. Fn. 470.

Habitat in Salice.

DESCR. Hæc species pediculum vix magnitudine superat. Caput & rostrum atrum, glabrum. Thorax niger, villis cinereis vestitus. Elytra singula nigra, striata, villis cinereis vestita, singula in medio macula nigra notata. Femora nigra. Tibiae & pedes pallide flavi. Antennæ flavae, articulo infimo cæteris non longiore.

600. CURCULIO *quadrimaculatus* longirostris nigricans, coleoptris maculis quatuor albidis.

Habitat in pratis.

DESCR. Corpus magnitudine Cimicis, depresso-fulvus; ovatum, supra nigricans, subtrus album. Rostrum, Antennæ & Pedes nigri. Elytra macula alba communi una ad apicem, & uno loco scutelli, nec non punctum album ad marginem exteriorem singuli elytri;

601. CURCULIO *quinquemaculatus* longirostris griseus, coleoptris maculis quinque albidis.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* Corpus ovatum, pediculo vix majus, nigricans. *Rostri* apex ferrugineus, glaber. *Thorax & Elytra* subferruginea. Macula alba in postica thoracis, *Elytrorum* futura longitudinalis alba; macula alba ad basin & alia versus apicem ejus clytri.

602. CURCULIO *pericarpius* longirostris subglobosus nebulosus, coleoptris macula cordata alba. *Fn.* 461.

*Act.* upf. 1736. p. 16. n. 7. Curculio minimus cinereus subrotundus obtusus.

Habitat etiam saepe in *Scrophularia*, imprimis nodosa.

*DESCR.* Est magnitudine feminis Sinapis albi: *totus* e nigro & fusco mediis, scaber, striatus, vellere cinereo raro adspersus, ad suturas elytrorum juxta thoracem in medio macula alba, ex lineola in singulo elytro, eodem in loco alba. *Antennarum* infimus articulus longus: saepe ante maculam cordatam albam observatur punctum nigrum: saepe etiam versus caudam macula alba.

603. CURCULIO *Serophulariae* longirostris subglobosus, coleoptris maculis duabus atris dorsibus.

Curculio subglobosus, punctis duobus nigris suturæ longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido. *Fn.* 460.

*Reaum. gall.* v. 3. t. 2. f. 12.

*Act.* upf. 1736. p. 16. n. 5. Curculio globosus, proboscide reflexa.

*Lift. loqu.* 395. Scarabæus exiguis cinereus, duabus maculis nigris in alarum thecis insignitus.

Habitat in *Scrophulariae* pericarpiis immaturis, nidum globosum inflatum testaceum inter capsulas, capsulis similem, e vesica testacea formans; occurrit etiam in *Verbasco* magis canus.

*DESCR.* *Rostrum* nigricans, thorace longius, quod terrefactus sub ventre maxime inflectit. *Thorax* exalbidus, pilis cinereis vestitus, cum maculis duabus atris a tergo. *Elytra* glabra, sulcata, cinereo-testacea: singula striis quinque, interjacentibus lineis elevatis nigris, albis punctis; in medio dorso, clavis elytris, inque ipsa futura, punctum atrum cum puncto albo adnexo a parte postica; pone hunc punctum aliud punctum nigrum in ipsa sutura coleopterorum versus anum albedine cinctum; antennarum infimus articulus longus. *Pedes* nigri: plantæ ferrugineaæ.

*LARVA* livida, gelatina tota oblita limacis instar, capite nigro.

604. CURCULIO *paraplecticus* longirostris cylindricus subcinereus, elytris mucronatis.

Curculio fuscus, oblongus, elytris rectis acuminatis. *Fn.*

445.

*Act.*

*Ast. upf.* 1736. p. 16. n. 1. *Curculio acuminatus*, longus, fuscus.

Habitat in *Phellandrio*, Sio; intra caules Larva alba capite luteo, Equis lethalis.

DESCR. *Rostrum longum, teres. Thorax punctis excavatis. Elytra, minus quam in reliquis, gibba, recta, in apicem seu angulum acutum definita, oblonga, singula striae decem longitudinalibus exarata & simul excavato-punctata; haec striae coenunt per paria ante apicem in singulo elytro. Totum Corpus atrum, villis conspicuis cinereis testum, hinc rotum cinerium rorè flavo saepe pictum. Antennæ magnæ, infimo articulo longissimo, rufescente; apice nigrae.*

605. CURCULIO *Betulae* longirostris, thorace antrosum fæce spinoso, corpore viridi-aurato, subtus concolor.

*Curculio cæruleo-viridis nitens, antennis atris.* Fn. 456.

*Pet. gaz.* p. 77. n. 6. *Curculio parvus* splendide viridis. (*figura Petiveri nobis deest?*)

*Frisch. germ.* 12. p. 17. t. 8. *Scarabæus nasicornis* purpureo-auratus.

Habitat Fahlunæ in *Betulis*.

DESCR. Est e mediæ magnitudinis speciebus hic Curculio. Totus capite, thorace, rostro, elytris, abdomine, pedibus cæruleo-viridi-auratus seu sericeo nitidissimus. Versus posteriora admodum obtusus. Totum corpus punctis minutissimis excavatis perfutum. Oculi & antennæ foliæ nigrae; harum infimus articulus reliquis nullo modo longior est, ut in reliquis, clavatae ramenta sunt antennæ, ut in congeneribus. Hic minime salit.

606. CURCULIO *Populi* longirostris, thorace antrosum spinoso, corpore viridi-ignito, subus atro-cærulecente.

Habitat in *Populo tremula*.

DESCR. Simillimus præcedenti, sed dimidio minor. *Viridi-inaurata* sunt Caput, Thorax, Elytra substriata. *Nigro-virescentia* Caput tubitus, & Pectus. Antennæ nigrae, infimo articulo reliquis non longiore. Foscula inter oculos,

607. CURCULIO *Beccabungæ* longirostris fuscus, elytris subsanguineis margine caudaque fuscis.

Habitat in *Veronica Beccabunga*.

DESCR. *Corpus nigrum, magnitudine pediculi. Thorax supra fusco-cinereus. Elytra fufca disco ferrugineo; seu potius subferruginea margine omni, etiam futuræ dorsalis, fusco..*

608. CURCULIO *Alni* longirostris, pedibus saltatoriis, elytris lividis: maculis duabus obscuris.

*Curculio lividus; coleopteris maculis quatuor obscuris.* Fn. 473.

Habitat intra-folia *Alni*.

# 180 INSECTA COLEOPTERA. CURCULIO.

DESCR. Saltatrix. *Magnitudo* pediculi: *maculae* in singulo elytro duæ.

609. CURCULIO *Fagi* longirostris, pedibus saltatoriis, corpo-  
re atro, femoribus pallidis.

*Curculio ater*, femoribus exalbidis. Fn. 469. It. Scan. 112.  
Habitat in *Fago*.

DESCR. *Elytra* atra striata, minime cæruleo-*scentia*. *Femora*, sæpe &  
*tibiae*, pallida s. ex albido flava. *Antennæ* nigrae, infimo articulo pal-  
lido, vix reliquis longiore. *Caput* & *Thorax* punctis excavatis.

610. CURCULIO *Salicis* longirostris, pedibus saltatoriis, ely-  
tris atris: fasciis duabus albis.

Habitat in *Salicis* floribus.

DESCR. *Corpus* magnitudine *Pulicis* majoris, atrum. *Elytra* fascia latio-  
re, alba, undata, ad basin & alia in medio linearis transversa. *Salit* a-  
gilissime ut *Pulex*.

611. CURCULIO *Segetis* longirostris, corpore piceo, elytris  
oblongis, femoribus ferrugineis. Fn. 464.

Habitat in *Frumenti* seminibus, quæ devastat.

DESCR. Magnitudine majoris pediculi, cylindricus, oblongus, rufo-  
niger s. piceus: *Elytris* striatis; *Thorace* oblongo cum capite longitudi-  
ne corporis: *Femora* omnia clavata cum pedibus obscure ferruginea.

612. CURCULIO *Pomorum* longirostris, femoribus anticis  
dentatis, corpore griseo - nebuloso. Fn. 428.

*Frisch. germ.* I. p. 32. t. 8. Curculio in floribus arboreis.  
Habitat in *floribus Pomonæ*.

DESCR. Pediculo paullus major. Totus nebulosus s. griseo-cinereus;  
fascia dupli transversa supra elytra, quarum antica ad angulum rectum,  
in medio, ad juncturas futurarum, pone coit, & alia fascia fusca po-  
sterior magis transversa; ad apicem Thoracis a tergo punctum album;  
*Antennæ* pedesque subfuscæ: in femoris primi paris latere interiore versus  
apicem denticulus robustus, qua nota manifeste differt ab aliis.

613. CURCULIO *ovalis* longirostris, femoribus omnibus den-  
tatis, corpore ovato nigro albo maculato.

Habitat passim.

614. CURCULIO *carbonarius* longirostris, femoribus omnibus  
dentatis, corpore nigro oblongo, elytris striatis.

Habitat in pratis.

DESCR. *Corpus* totum atrum. *Antennæ* apice subpilosæ, *Thorax* punctis  
confertis, excavatis, opacis. *Elytra* profunde striata. *Magnitudo* fere  
Curc. abietis.

615. CURCULIO *Abietis* longirostris, elytris fuscis: fasciis dua-  
bus linearibus inerruptis griseis, femoribus dentatis.

Curcu-

*Curculio subfuscus*, elytris fasciis nebuloso-testaceis. *Fn.*

446.

Habitat in *Pini* cortice.

DESCR. Est Curc. Pini similis, sed dimidio minor, *totus* griseus e cano & griseo mixto. *Antennæ* nigrae. *Rostrum* thorace fere longius. *Thorax* griseus, a tergo in medio pari punctorum alborum & vix conspicuorum. *Elytra* e cano & griseo mixta intime, cum macula magna ferruginea in singuli elytri medio. *Scutellum* seu apex thoracis albus est.

616. CURCULIO *Nucum* longirostris, femoribus dentatis, corpore griseo longitudine rostri.

*Roef. suppl.* 385. t. 67. f. 5. 6.

Habitat intra *Coryli* nuces.

DESCR. Statura Curc. Pini, sed minor. *Rostrum* filiforme, tenuissimum; inflexum, rubrum, longitudine totius corporis. *Femora* omnia apice introrsum denticulo instructa, sed primora majore.

617. CURCULIO *Druparum* longirostris, femoribus dentatis, rostro rubro, elytris testaceis obsolete fasciatis.

*Curculio rectirostris.* *Syst. nat.* 10. p. 383. n. 54.

Habitat in *Cerasi Padi* nucleis.

618. CURCULIO *quinquepunctatus* longirostris, femoribus dentatis, elytris sutura alba maculisque duabus.

Habitat paßim.

DESCR. *Corpus* magnitudine Pediculi, ferrugineum abdome albo. *Thorax* ad apicem puncto albo. *Elytrorum* sutura longitudinalis alba; punctum album in singulo elytro ad angulum anteriorem, & aliud in medio elytri versus apicem.

619. CURCULIO *bispinus* longirostris, femoribus dentatis, corpore sulcato adsperso squamis erectis.

Habitat in plantis.

DESCR. *Corpus* magnitudine Pediculi, griseum. *Rostrum* rubrum *Thoracis* tergum fuscum. *Elytra* profunde sulcata, hispida squamis erectis: fascia albida linearis undata in medio. *Femora* omnia dentata, crassa, longa.

620. CURCULIO *pedicularius* longirostris, femoribus dentatis, rostro rubro, elytris albido-subfasciatis.

Habitat in nemoribus.

DESCR. *Magnitudo* dupla pediculi. *Rostrum* rubrum, rectum, longitudine fere corporis. *Elytra* grisea, obsolete fasciata. *Femora* omnia dentata.

621. CURCULIO *Ligustici* brevirostris, femoribus subdentatis, abdome subovato murino.

Habitat in *Ligustico Levisticō*.

*DESCR.* *Corpus* majusculum, cinereum s. fuso longitudinaliter maculatum. *Abdomen* magis supra convexum & ovatum, quam in reliquis. *Femora* clavata mucrone obsoleto.

622. CURCULIO *tortrix* longirostris, femoribus dentatis, corpore testaceo, pectore fusco.

Habitat intra *Populi tremulae* folia contorta, frequens.

*DESCR.* *Corpus* oblongum, subcylindricum; testaceum s. triste flavescens. *Pectus* inter femora duo postrema, nigricans. *Elytra* subtilissime striata. *Femora* omnia dentata.

623. CURCULIO *Pyri* brevirostris, femoribus dentatis, æneo-fuscus.

Curculio æneo-fuscus; rostro thorace breviore. *Fn.* 449.

*Act. upf.* 1736. p. 16. n. 2. Curculio acuminatus oblongi-fuscus æneo-fuscus.

*List. loqu.* p. 394 n. 31. Scarabæus majusculus e nigro rufescens; an?

Habitat apud nos sat frequens, imprimis in *Pyri* foliis.

*DESCR.* *Rostrum* depresso, capite ipso fere brevius. *Caput* & thorax punctis minutissimis inaequalia. *Elytra* oblonga, striis septem profande excavata, interjectis striis (fere elevatis) crenatis. *Capiti*, *thoraci* & *elytris* (quæ omnia nigra), insidet pilus vix conspicuus aureo-igneus. *Pedes* & *antennæ* rufescentes, infimo articulo longissimo. *Femina* marito duplo major, minus fusca, magis nitens.

624. CURCULIO *argentatus* brevirostris, femoribus dentatis, corpore viridi-argentato.

Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo. *Fn.* 459.

Habitat in *Quercu*, *Corylo*, *Urtica*, *Betula*, & imprimis in Foliis *Ulmarie*.

*DESCR.* Mediæ magnitudinis. *Corpo* oblongo viridi-nitente. *Rostro* thoracis longitudine. *Coleopteris* pone acutiusculis.

625. CURCULIO *oblongus* brevirostris oblongus, femoribus dentatis, antennis elytris pedibusque ferrugineis.

Habitat inter Arbores.

*DESCR.* Magnitudo sequentis. *Corpus* nigrum. *Antennæ* & *Pedes* testacei. *Femora* omnia dentata. *Elytra* livido-ferruginea, margine laterali inflexo nigra.

626. CURCULIO *ovatus* brevirostris, femoribus dentatis, ab domine ovato nigro, pedibus antennisque rufis.

Habitat in arbustis.

*DESCR.*

*Curculio niger*; elytris rubris; capite pone elongato. *It. æl.*  
*Fn. 476.*

*Aet. upf. 1736. p. 19. n. 4.* *Necydalis rubra*, capite minimo nigro.

Habitat in *Coryli* foliis, quæ involvit in cylindrum utrinque clausum, intra quem ovum.

*DESCR.* Singularis est hæc Species, nec facie ad reliquias accedens. *Caput* enim, quod totum nigrum & atrum, excoriatae vulpis caput refert, caret enim rostro elongato, sed brevissimo gaudet, cui antennæ nigrae innatae, articulo infimo reliquis non longiore: *caput* postice elongatum, nec thoraci immersum, ut in reliquis. *Thorax* antice ater est, uti caput, pone vero ruber, ut elytra. *Elytra* saturate rubra; oblonga, punctis excavatis striata: *Femora* nigra: *Scutellum* dorsi atrum est.

639. ATTELABUS *Monoceros* thorace in cornu supra caput extenso.

Habitat in *Delphinii* floribus. *Modeer*; in Scania, *Solander*.

*DESCR.* Magnitudo Culicis. *Caput* nigricans. *Antennæ* & pedes testacei. *Thorax* postice ferrugineus, antice niger, recta antrorsum exiens in cornu nigricans ultra caput extensum, unde vere monstrosa & infectis insolita facies. *Elytra* testacea: futura longitudinali nigra & fascia postica nigra puncto que antice nigro. *Corpus* supra pilis brevibus adspersum.

640. ATTELABUS *Betulae* pedibus saltatoriis, corpore toto atro.

Habitat in *Betulae* foliis, quæ rodit ut *crispa* evadant, eaque primo vere destruit.

*DESCR.* *Corpus* pediculo majus, oblongum, atrum. *Elytra* oblonga, punctis excavatis striata. *Caput* ante oculos magis angustatum. *Femora* crassa. Simillimus Curculioni.

641. ATTELABUS *formicarius* elytris fasciis duabus albis basique rubris.

*Curculio niger*; elytris nigris: fascia dupli alba, basi rubris.  
*Fn. 477.*

*Jonst. inf. t. 15.* *Scarabæus minor* 69 f. ultimus.

*Hoffn. inf. t. 16.* f. 13.

*Lift. mut. t. 31.* f. 1.

*Raj. inf. p. 103. n. 29* *Cantharis XXIX.*

Habitat ubique sat frequens, currit celerrime inter omnes.

*DESCR.* Nescio quam similitudinem habet cum *Formica*, quamvis in nulla re cum Formicis conveniat; mihi tamen semper se sifit ad normam & formam Formicæ. *Caput* nigrum est, thoraci immersum, depresso, absque ulla proboscide, ut in congeneribus. *Antennæ* clavatae, ori fere insidentes, nigrae, absque infra articulo elongato. *Thorax* rugosus.

fus est & scaber, margine caput spectante nigro. *Elytra* oblonga, obtusa, planiuscula, nigra, punctis elevatis scabra, sunt hæc basi rubra, fascia transversali linearī alba duplice; quarum thoraci superior supra mediam longitudinem antrorum flexa; altera vero fascia paullo supra apices elytrorum sita, etiam alba, sed latior, ad futuram longitudinem antrorum flexa. Capite subrotundo a reliquis differt. Durities insecti, pedum tenacitas, unguium antennarumque insertio, morde dicque conatus irritus evincunt affinitatem cum curculionibus.

**642. ATTELABUS mollis griseus pubescens, elytris fasciis tribus pallidis.**

Habitat in Lucis.

DESCR. *Caput* ferrugineum. *Thorax* niger, villosus. *Elytra* nigra, flexilia: fasciis 3 pallidis: quarum prima ad basin, tertia in apice. *Abdomen* rubrum. *Pedes* pallidi geniculis nigris. Totus subpileatus est.

**643. ATTELABUS Ceramoides ater, elytris rugosis.**

Habitat in Sylvis.

DESCR. *Corpus* magnitudine Scar. stercorarii. *Elytra* rugosa & variolosa. *Antennæ* clavatae, moniliformes. *Pedes* clavati; postici apice appendiculati 1. unguiculo.

**644. ATTELABUS Buprestoides ater, elytris nervosis, thorace subgloboso.**

Buprestis ater. Fn. 554.

Aet. upf. 1736. p. 19. n. 2. Attelabus ater maximus cylindraceus, pectori crassiusculo: ore forficato.

Frisch. germ. 13. p. 23. t. 19. Scarabæus arboreus, collo crasso.

Habitat inter quisquilias locis siccis.

DESCR. Hoc insectum singulare; an hujus generis, vix certo constat; differt enim facies, locus, noræ plurimæ. Os enim longa forifice & acuta cum uno a latere interiore denticulo. *Corpus* rotundum atrum est, punctisque minimis excavatum. *Antennæ* filiformes sunt, crassiusculæ, breves, nec thorace longiores. *Thorax* nullo modo marginatus; antice & postice, ubi articulatur, pili minutissimi rufi. *Caput* extra thoracem prominet; femorum posticorum par spatio a reliquis magis remotum est, quam in ullo e nostris nobis notis insectis. *Caput* cum thorace fere adtingit longitudinem elytrorum. *Elytra* singula duabus striis elevatis notantur.

## Cerambyx.

**645. CERAMBYX planatus thorace marginato scabro antice dentato, corpore nigro, antennis pedibusque ferrugineis.**

Habitat in Suecia.

DESCR. Magnitudo dupla pediculi. *Corpus* depresso. *Antennæ* piceæ, longi-

*DESCR.* *Magnitudo dupla pediculi.* *Antennæ & Tibie* fere piceæ s. obscure rufæ, *Thorax* convexus. *Abdomen* ovatum, & valde convexum.

627. CURCULIO *cervinus* brevirostris, femoribus dentatis, antennis basi rufescentibus.

Habitat in Plantis.

*DESCR.* *Magnitudo præcedentis, sed non gibbus,* colore sordide cinereo. *Antennæ ferrugineaæ capitulo nigro.* *Elytra* adparent quasi adspersa punctis nigris obfoletis.

628. CURCULIO *atomarius* brevirostris, elytris abbreviatis nigris atomis albis, pedibus anticus rufis; posticis dentatis.

Habitat in plantis.

*DESCR.* *Statura Curc. chinensis.* *Corpus* fuscum. *Elytra* atra punctis albis vix conspicuis. *Ani regio* albida. *Antennæ* crassiusculæ, nigræ, basi angustiore rufæ. *Femora* postica dente armata.

629. CURCULIO *viridis* brevirostris, femoribus muticis, corpore viridi: supra obscurō, subtus flavidiore.

*Curculio viridis, opacus, pedibus antennisque magis fuscis.*

*Fn. 455.*

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* *Magnitudo Curc. Pyri,* dilute viridis, non nitens, striatus subtus flavo-viridis. *Antennæ* nigrescunt, rufescentes.

630. CURCULIO *lineatus* brevirostris griseus, thorace tribus striis pallidioribus. *Fn. 450*

Habitat in hortis & pratis frequens.

*DESCR.* *Pediculo duplo major.* *Corpus* totum griseum. *Antennarum* infimus articulus rufescens. *Thorax* lateribus & dorso niger, intra quam nigredinem color griseus striarum instar ducitur, unica linea in tergo, & dein unica in utroque late, hinc thorax quasi fuscus linea tribus longitudinalibus pallidis s. cinereis exaratus. *Oculi nigri.* *Elytra* cinerea, singula striis 4 exarata. *Rostrum* breve, extra antennas brevissimum & fere nullum.

631. CURCULIO *incanus* brevirostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis. *Fn. 452.*

*Lift. loqu. p. 394. n. 30. Scarabæus fuscus, lanugine incanus.*

Habitat frequens in herbidis.

*DESCR.* *Est præcedentibus paulo minor, oblongus, ater, sed tenuis-* sumis pilis undique adspersus, hinc cinereus ad nigredinem vergens. *Elytra* oblonga, non acuta, ut in prima specie, striis ad summum octo pun-*ctato-concavis.* *Pedes* elytris concolores. *Antennæ* versus basin rufescunt, infimo articulo longissimo.

632. CURCULIO *albinus* brevirostris niger, fronte anoque albis, thorace tuberculato.

Habitat in Plantis.

DESCR. Rostrum breviusculum, planum, supra laeveum. Thorax a tergo tuberculatis tribus, mucronatis, transversis. Elytra griseo-fusca punctis nonnullis mucronatis, apice laeveo. Pedes & Antennae annulis albis & nigricantibus; haec longitudine corporis..

633. CURCULIO *chropas* brevirostris niger, antennis tibiisque ferrugineis.

Habitat in Plantis.

634. CURCULIO *rufipes* brevirostris cinereus oblongus, pedibus rufis. Fn. 453.

Habitat in Plantis.

DESCR. Curc. inicano adeo similis figura, magnitudine & colore, ut pro cedem haberi possit, sed pedes, tibiae & femora testaceo-rubra nuda, nec uillis cinereis adspersa: unguis s. duæ squamæ, in omnibus pedibus ad exortum ungvium, sole nigrae sunt. Antennarum insimus articulus longissimus. an præcedentis fæmina?

635. CURCULIO *nebulosus* brevirostris oblongus canus, elytris fasciis obliquis nigris.

Curculio albo nigroque varius; proboscide planiusculo carinato thoracis longitudine. Fn. 448.

Frisch. germ. II. p. 32. t. 23, f. 3. Curculio brevirostris.  
Habitat in Roslagia.

DESCR. Color ex niveo & nigro varie mixtus, quasi per fascias oblique quas. Thorax subferrugineus.

636. CURCULIO *ruficornis* brevirostris, femoribus muticis, corpore atro, thorace bituberculato, antennis rubris.

Habitat in Ligno sicco perforato gregarius.

DESCR. Corpus magnitudine pulicis, pulvere cinereo adspersus, qui facile abstergitur. Antennæ clavatae, rufæ, uti Tibiae & pedes.

637. CURCULIO *ater* brevirostris oblongus ater, antennis rufis.

Habitat - - -

Magnitudo pediculi. Elytra tenuissime striata.

### Attelabus.

638. ATTELABUS *Coryli* niger, elytris rubris.

Cur-

longitudine fere corporis. *Thorax* margine utrinque scabro & antice mucronato. *Elytra* opaca, striata, stria laterali elevata. *Pedes* ferruginei.

646. CERAMBYX *Faber* thorace marginato utrinque unidentato rugoso, elytris piceis.

*Frisch. inf. 13. p. t. 18. forte.*

Habitat passim.

*DESCR.* Magnitudo C. coriarii. *Antennæ* vix corporis longitudine. *Thorax* punctis excavatis rugosus, ut totum corpus nigrum. *Elytra* non striata.

647. CERAMBYX *coriarius* thorace marginato-dentato, corpore piceo, elytris mucronatis, antennis corpore brevioribus.

Cerambyx niger, thorace planiusculo: margine utrinque tridentato, coleopteris piceis. *Fn. 480.*

*Frisch. germ. 13. p. 15. t. 9. Cerambyx niger, antennis ferratis.*

*Raj. inf. 95. Cerambyx maxima, cornibus magnis articulatis & reflexis.*

Habitat ad *Medevis* acidulas.

*DESCR.* Corpore maximo, antennis longiore, planiusculo; facies ferme Scarabæi tridentati.

648. CERAMBYX *meridianus* thorace spinoso, elytris fastigiatis fusco s. antice subtestaceis, pectore nitente.

Leptura meridiana. *Syst. nat. 10. p. 398. n. 7.*

Habitat passim.

*DESCR.* Femina tota nigricans. *MAS* Pectore, Abdomine, Pedibus, exceptis geniculis nigris, testaceus. *Elytra* subtestacea, apice nigra. *Thorax* parce spinosus, etiam abdomen certo situ aureo resplendentia.

649. CERAMBYX *lamed* thorace spinosa pubescente, elytris fastigiatis lividis: fascia obscura longitudinali flexuosa, antennis brevioribus.

Leptura nigra, elytris nigricante lividoque variis. *Fn. 498.*

Habitat in *Rostlagia*.

*DESCR.* Magna. *Elytra* livida basi & medio extrorsum livido, reliquo nigricante, s. fasciae duæ latæ oblique fulce. *Corpus* totum nigrum. *Thorax* utrinque spinosus.

650. CERAMBYX *nebulosus* thorace spinoso, elytris subfastigiatis: punctis fasciisque nigris, antennis longioribus.

Cerambyx cinereus, elytris punctis nigris fasciaque nigra, antennis corpore sesquilongioribus. *Fn. 483. It. gotl. 273.*

Habitat in Gotlandia ad fodinas Burvicenses.

*DESCR.*

**DESCR.** Hic inter minores omnino numerandus est. *Caput* nigricans. *Antennæ* corpore sesquiloniores apice tenuissimæ: articulis singulis superne nigris inferne pallidis. *Thorax* utrinque denticulo notatus, superne cinereus punctis nigris maculatus. *Elytra* cinerea, punctis minimis excavata, non striata, præterea punctis inæqualibus nigris irrorata, densius versus basin; fascia dein nigra transversalis latiuscula in medio elytrorum.

**651.** *CERAMBYX hispidus* thorace spinoso, elytris subpræmoris: punctis tribus hispidis, antennis hirtis longioribus.

*Cerambyx cinereus*; elytris præmoris nigris punctis fasciæ alba, antennis corpore sesquilonioribus. *Fn.* 484. *t. I.*  
Habitat sœpe in domibus.

**DESCR.** Longitudo muscæ domesticæ, sed angustior. *Totus* cinereus est, punctisque nigris irroratus: striae aliquot elevatae in elytris, & fascia alba transversalis latiuscula in medio elytrorum, basi tamen paullo propior. *Thorax* aculeis prominulis, præsertim lateralibus. *Antennarum* articulis superne nigris, inferne cinereis. *VARIETAS* in aliis fascia albida cordata in parte anteriore coleopterorum; postica pars elytrorum retusa, acute præmorsa s. dentata.

**652.** *CERAMBYX moschatus* thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.

*Cerambyx viridi-cærulescens*, antennis corpus subæquantibus. *Fn.* 478.

*Akt. upf.* 1736. p. 120. *n. 1.* *Cerambyx viridi-æneus.*

*Mouff. lat.* p. 133. *f. ult.* *Cerambyx tertius.* p. 134.

*List. logu.* p. 384. *n. 11.* *Scarabæus magnus* suaviter olens.

*Raj. ins.* p. 81. *n. 17.* *Scarabæus Capricornus* dictus major viridis odoratus.

*Frisch. germ.* 13. p. 17. *t. II.* *Scarabæus cæruleo-viridis.*

Habitat in Salice, odorem spargens gratum & fragrantissimum.

**DESCR.** Quoad ipsum corpus inter nostras maxima est hæc species; *Totus* cæruleo-viridis aureo nitens. *Abdomen* supra cæruleum. *Alæ* nigrae. *Pedes* colore cum reliquo corpore convenienter; pedum tarsi subtus villosi, glauci; *Tibia* terminatur spina. *Thorax* utrinque mucrone gaudet, intra hos mucrones tria tubercula paullo minora, elytris propiora, & nonnulla alia tubercula adhuc minora anterius. *Elytra* minutissimis rugis, fibrisque tribus longitudinalibus parum elevatis notata, oblongo lanceolata, flexilia. *Antennæ* vix longitudinem corporis adtingunt, harum articuli per gradus versus extremitatem breviores sunt, contrarioq; in reliquis modo.

**653.** *CERAMBYX ædilis* thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis.

*Ceram-*

*Cerambyx nebulosus*, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quaternis luteis. *Fn.* 479.

*Mouff. lat. in appendice tab. penult. (Mas.)*

*p. 151. f. 2. Scarabæus VII. ex Russia.*

*Pet. gaz. 14. t. 8. f. 8. Capricornus russicus cinereus, cornubus longissimis.*

*Frisch. germ. 13. p. 18. t. 12. Scarabæus arboreus, antennis longissimis.*

*Aet. upf. 1736. p. 120. n. 2. & 3. Cerambyx fuscus, antennis corpore quater longioribus.*

*It. oel. 8. Cerambyx nebulosus &c. ut supra.*

*Smolandis* Timberman.

Habitat frequens in linteribus & arborum truncis decorticatis, dum ex his domos exstruunt ruricolæ, hinc pueris nostris dicitur Timberman, i. e. Aedilis; omnibus notissima species: vulgus hunc lædere religioni apud nos ducit.

**DESCR.** Pollicem transversum longum est corpus, totum cinereum. *Elytra* obtusa, pilis minutissimis adspersa, inter quos pilos tubercula seu puncta minutissima prominent confertissima; umbra nigricans coleoptera transversim ambit versus posteriora in medio curvata. *Thorax* etiam cinereus, mucrone utrinque prominulo, & punctis quatuor luteis transversalibus a tergo. *Oculi* nigri, punctum pone antennas nigrum. *Antennæ* ipso corpore quintuplo longiores, ex 10 articulis cinereis, versus apicem nigris, quo capiti propiores, eo breviores. *Alæ* nigricantes, venis fuscis.

Fæmina ano prominet; huic antennæ ipso corpore triplo longiores; maris autem cornua quintuplo vel sextuplo corpore longiora.

654. *CERAMBYX alpinus* thorace spinoso, coleoptris obtusis: fascia maculisque quatuor atris, antennis longis.

*Cerambyx subcærulescens*, fascia maculisque quatuor nigris.

*It. scan. 260. \**

Habitat in Scania, Blekingia.

655. *CERAMBYX Sutor* thorace spinoso, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello pallido, antennis longissimis.

*Cerambyx ater*, elytris punctatis maculis pallidis sparsis; antennis corpore longioribus, thorace spinoso. *Fn.* 482.

Habitat in sylvis.

**DESCR.** magnus & ater est. *Oculi* nigri pone antennas excurrentes. *Thorax* utrinque angulo majori armatur; macula ferruginea ad basin elytrorum introrsum. *Thorax* & *Elytra* atra punctis sparsis fere contiguis excavatis (nudo oculo manifestis). Puncta flava, sparsa super thoracem & elytra. *Mas* antennis nigris triplo aut quadruplo corpore longioribus; *Fæmina* antennis corpore sequilongioribus nigris, articulis singulis versus basin cinereis.

656. CERAMBYX *Textor* thorace spinoso, elytris obtusis convexis atris, antennis mediocribus.

Habitat in Sylvis.

DESCR. *Corpus nigrum atomis cinereis irroratum. Maculae ferrugineæ in Pectore & Abdomine.*

657. CERAMBYX *Fur* thorace spinoso gibboso, coleoptris ovatis: fascia duplici albida, antennis filiformibus mediocribus.

*Cerambyx testaceus*; elytrorum fascia duplici albida, thorace spinoso. Fn. 487.

Habitat sœpe in herbariis antiquis, ubi e foliis farinam conficit & coacervat. Destruit Musea pessimus omnium. Consumit etiam Tabacum virosum. Arsenico cum alumine usto occiditur Kramer. Frequens etiam in pane sicco diutius asservato.

DESCR. Magnitudo pediculi. *Corpus totum testaceum. Elytra vero saturatus colorata, super quæ fasciæ duæ albæ, quarum pectori propior in medio non cohæret, altera ano propior retrorsum in medio arcuatur seu flebitur. Abdomen ovarum & convexum admodum est. Thorax angustus mucrone utrinque prominulo; dum incedit anus terræ incumbit. Medius quasi est inter Dermestes & Cerambyces, cum caput sub collo retrahat & antennas non setaceas, sed filiformes gerat.*

- 658 CERAMBYX *Cursor* thorace spinoso, elytris obtusis rufis margine lineaque nigris, antennis mediocribus.

*Cerambyx rufus, coleopterorum lineis tribus nigris longitudinalibus.* Fn. 481.

Habitat in Smolandia, Scania, Dalekarlia.

DESCR. Est hæc species inter maximas hujus generis. Abdomen, pedes, os, frons obscure rubra; sed abdomen pilis canis testum. Thorax aculeis lateralibus majoribus, utrinque solitariis apice rubris; & pluribus minoribus intermediis. Inter antennas duo tubercula rubra. Elytra tuberculis elevatis scabra, villisque minimis adpersa. Elytra ad basin angulos formant, e quibus ad apicem fascia seu linea lata nigra excurrit, ut & a Scutello per utrumque elytron, secundum longitudinem futuræ; linea intermedia lata nigra usque ad apicem elytrorum.

659. CERAMBYX *inquisitor* thorace spinoso, elytris nebulosis fusco-subfasciatis, antennis brevioribus.

*Cerambyx cinereus nigro-nebulosus; antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.* Fn. 485.

A&T. upf. 1736. p. 20. n. 1. *Necydalis cinereo-maculata fulcata.*

β *Cerambyx cinereus, coleoptorum fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.*  
Fn. 486.

Habi-

## Habitat passim in Sylvis.

*DESCR.* Caput vellere cinereo punctisque vix conspicuis nigris sub vellore; pone oculos versus pectus nigrum; punctum pone antennas nigrum. Antennæ cinereæ, undecim articulis, corpore dimidio breviores, antrosum protensa; tibiae ad apicem duabus spinis armantur. Thorax cinereus, margine laterali nigro, in cujus medio mucro niger. Linea nigricans longitudinalis thoracis in medio tergi. Elytra oblonga, arcta, striis tribus longitudinalibus elevatis nitidiusculis; cæteroquin nebulosa sunt elytra ob maculas nigricantes temere sparsas; (& in quibusdam fascia duplex transversa nigra lateribus testacea). Totum corpus alias cinereum, nigro nebulosum, qui cinereus color a pilis minutissimis, ad cervinum colorem accedentibus, oritur.

(S Hic antecedenti similis magnitudine, futura, facie, sed elytra, quæ magis fusca, gaudent duabus fasciis flavis adproximatis in medio elytrorum.

660. CERAMBYX *carcharias* thorace mutico cylindrico, corpore griseo nigro-punctato, antennis mediocribus.

Cerambyx griseus nigro-punctatus, thorace inermi. *Fn.*

493.

*Pet. gaz.* 5. t. 2. f. 1. *Capricornus norvegicus nigrescens*, vaginis punctatis inaculisque pallidis adspersis.

Habitat in sylvis. *Mas* cinereus. *Femina* grisea.

*DESCR.* Totum corpus supra & infra lana grisea t. pallide-flavescenti-cinerea vestitur, per quam' puncta glabra, sparsa, conferta emergunt. Corpus præcedenti crassius, maxillæ nigræ. Antennarum articuli grisei, sed apicibus nigri.

661. CERAMBYX *Populneus* thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus.

Habitat in *Populotremula*.

- 662 CERAMBYX *cylindricus* thorace mutice cylindrico: linea albida, elytris fastigiatis nigris, pedibus anticis pallidis.

*Roef. inf.* 2. p. 21. t. 3.

Habitat intra *Coryli* lignum.

*DESCR.* Corpus minus, atrum, opacum, punctis minimis sparsis cavis. Thorax cylindricus linea longitudinali albida. Antennæ longitudine corporis. Pedum Tibiae & dimidia pars femorum anterioris paris ferruginea.

663. CERAMBYX *linearis* antennis mediocribus, thorace cylindrico mutico, niger, pedibus omnibus totis luteis.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Simillimus C. cylindrico, at duplo major, magisque niger. Antennæ longitudine corporis. Pedes toti lutei.

664. CERAMBYX *oculatus* thorace mutico cylindrico luteo: punctis duobus nigris, elytris fastigiatis linearibus nigris.  
Habitat in Sylvis.

DESCR. *Corpus testaceum uti abdomen & pedes. Thorax cylindricus a dorso punctis duobus nigris. Antennæ longitudine corporis.*

665. CERAMBYX *serraticornis* thorace mutico subovali, corpore lurido-fusco, antennis compressis ferratis mediocribus.

Habitat in Sylvis.

DESCR. *Antennæ valde compressæ & multum serratæ. Corpus totum pallide fuscum.*

666. CERAMBYX *ruficollis* thorace mutico subrotundo nudo, corpore lurido, antennis subulatis brevioribus.

*Cerambyx fuscus, punctis thoracinis impressis. Fn. 492.*

*Frisch. inf. 13. p. 21. t. 14.*

Habitat passim in sylvis.

DESCR. *Antennæ corpore paullo breviores: Corpus lineare, fere glabrum: singula Elytra striis duabus elevatis. Abdomen ferrugineo-fuscum; a tergo due cavitates impressæ, excepta linea longitudinali.*

667. CERAMBYX *violaceus* thorace mutico subrotundo pubescente, corpore violaceo, antennis mediocribus.

*Cerambyx violaceus nitens, antennis nigris, femoribus clavatis. Fn. 495.*

*Frisch. germ. 12. p. 33. t. 3. ic. 6. f. 1. Scarabæus arboreus, totus violaceus.*

*Act. upf. 1736. p. 20. n. 4. Buprestis collaris nigro: elytris æneo-cæruleis.*

Habitat in hortis & sylvis.

DESCR. *Totum corpus e violaceo nitens, colore aureo & sericeo superbit. Thorax & elytra punctis contiguis excavata. Antennæ corpore sericeo breviores, nigrae: Femora clavata cum pedibus atra. Abdomen nigruum. Thorax elytris obscurior, ad Lepturam aliquatenus accedit. Thorax planiusculus rotundatus absque spinis ullis. Elytra pone rotundata, nec præmorsa, planiuscula.*

668. CERAMBYX *striatus* thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris striatis, antennis brevibus.

Habitat in Sylvis.

DESCR. *Habitus præcedentis, sed Elytra non striata. Thorax orbicularis, convexus. Antennæ corpore breviores.*

669. CERAMBYX *variabilis* thorace mutico subrotundo inæquali glabro, pectore anoque ferrugineo, antennis mediocribus.

*Frisch. inf. 12. p. 345. t. 6. f. 3. 4.*

Habi-

## Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Similis *C. violaceo* sed minor; variat colore. Alter *violaceus*; *Thorax* subferrugineus. *Pedes ferruginei*. *Femora clava nigra*. Alter *Thorace elytrisque lividis*; *femoribus similibus*.

670. CERAMBYX *testaceus* thorace mutico subrotundo glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus.

*Cerambyx testaceus*, thorace glabro. *Fn. 491.*

*Act. upsi. 1736. p. 20. n. 3.* *Buprestis collaris* glabro, elytris testaceis.

## Habitat in Suecia non infrequens.

*DESCR.* Vix a sequenti differt, nisi sola hirsutie thoracis. Antennæ longitudine corporis, uti femora & pedes testaceo-rufescentes. Thorax inaequalis. Elytra punctis excavata, non striata, testacea.

671. CERAMBYX *curculionoides* thorace mutico: ocellis quatuor nigris elytrisque sesquialteris, antennis sublongioribus.

Habitat Calmariæ. Ad. Modeer.

*DESCR.* Magnitudo media. *Corpus* nebulosum, strigis flavis undulatis sparsum. *Thorax* a tergo ocellis quatuor atque iride flava: quorum anteriores majores prioribus approximati. *Elytra* singula, in medio, ocello simili, & inter hos ocello communis utrisque elytis.

672. CERAMBYX *bajulus* thorace mutico subrotundo villoso: tuberculis duobus, antennis brevibus.

*Cerambyx nigricans*, thorace villoso cinereo punctis duobus glabris. *Fn. 489.*

*Frisch. germ. 13 p. 17. t. 10.* *Scarabæus arboreus*, antennis parvis, collaris cinereo duobus punctis.

*Act. upsi. 1736. p. 20. n. 1.* *Buprestis collaris* villoso, elytris cinereis.

- β *Cerambyx testaceus*, thorace villoso cinereo: lineolis duabus glabris. *Fn. 490.*

Habitat in lignorum acervis.

*DESCR.* Totus niger est cum cineritiae mixtura. *Corpus* totum scabrum vel inaequale punctis prominulis inordinatis & pilis cinereis vagis. *Thorax* vero totus hirsutus, cinereus s. niger pilis albis & duobus & tergo punctis prominulis glabris, quibus ab omnibus differt. *Antennæ* nigrae, parvae, corpore dimidio breviores. *Oculi* in quibusdam deaestati. *Pedes* nigri; *tibiae* duplice spina terminatae; in dorso elytrorum fascia alba undulata sed obsoleta, ut vix visibilis sit. *Femora* clavata. *Elytra* flexilia. Denticuli nulli in thorace.

- β Facies antecedentis, sed omnino minot. *Antennæ* corpore breviores, testacea. *Thorax* villosus, cinereus s. niger pilis albis: a tergo punctis duobus oblongis, glabris. *Elytra* testacea, antennis pallidiora, punctis excavata, non tamen striata. *Femora* nigra. *Oculi* aurati. *Antennæ* pilis adspersæ, tertio articulo longissimo; tæpe fascia alba obsoleta in dorso; hinc adfinitas cum precedente suum.

673. CERAMBYX *sanguineus* thorace mutico subrotundo et lytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus  
Habitat Upsaliæ Is. Uddman.

*DESCR.* *Simillimus* C. bajulo, sed thorax magis depresso, ater, at thorax supra, scutellum, elytra & anus sanguinea, holosericea tomento vix conspicuo.

674. CERAMBYX *fennicus* thorace mutico subrotundo: tuberculis subferrugineo - obsoletis, elytris violaceis, antennis longiusculis.

Habitat in Finlandia.

*DESCR.* Thorax niger, depresso-culus, lateribus una cum pectore rufus. Abdomen nigrum apice ferrugineo. Pedes rufi: femoribus nigris.

675. CERAMBYX *undatus* thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis submediocribus.

Cerambyx niger; elytrorum fasciis duabus albis undulatis.  
*Fn.* 488.

*Act. upf.* 1736. p. 20. n. 6. Cerambyx cinereus, fasciis duabus pallidis.

Habitat in quisquiliis.

*DESCR.* Antennæ longitudine corporis. Femora atra. Caput & thorax nigra tuberculis a tergo, absque angulis lateralibus. Elytra nigra, postice pallescentia punctis excavatis, e quorum cavitatibus pilus exiurgit: duplex fascia alba transversa undulata, similiter punctis excavata.

676. CERAMBYX *castaneus* thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis mediocribus.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* Magnitudo præcedentis, sed paulo angustior. Thoracis latera rufa. Femora postica nigra. Affinis Cer. rusticus, sed minor.

## Leptura.

677. LEPTURA *aquatica* deaurata, antennis nigris, femoribus posticis dentatis. *Fn.* 509.

*Frisch. germ.* 12. p. 33. t. 3 ic. 6. f. 2. Scarabæus arboreus purpureo-aureus medius.

*Act. upf.* 1736. p. 20. n. 3. Leptura rubro-aenea.

Habitat locis humentibus, saepe in foliis *Nymphææ* & *Caricis* obvia. Pupa saepe radicibus *Phellandrii* adhaeret subglobosa brunnea.

*DESCR.* Tota cupreo-aurata; capite, thorace, elytris pedibus punctis minutissimis, fere contiguis, excavatis, sed in Elytris digesta sunt puncta in 10 circiter ordines longitudinales, vix tamen inde striata sunt elytra.

Oculi

# INSECTA COLEOPTERA: LEPTURA. 195

*Oculi nigri. Antennæ fuscæ; lente inspectum egregium plane est animal;* hæc præcedentibus omnibus minor. *Elytra truncata apice dum recens sunt Elytra rubro ænea, lateribusque viridi-ænea; punctum nigricans pone antennas prominens. Abdomen a capite versus caudam visum albo-argenteum est, a cauda vero versus caput nigrum. Femora articulantur cum corpore singulari artificio, globo scilicet intra eavitatem recepto. Pedes postici reliquis duplo longiores; horum femora compressa, versus basin angustiora, versus genua, latere interiore denticulo notata. Antennæ admodum approximatæ & basi fere contiguae; in medio circiter elytrorum tovedola depresta angulum elytri respiciens. Corpus postice angustatum.*

3 Leptura subænæo-violacea; femoribus posticis dentatis.

*Raj. inf. p. 100. Cantharis atundines frequentans tertiam.*

*Act. upf. 1736. n. 1. Leptura cæruleo-nigra*

*n. 2. Leptura viridi-ænea.*

Habitat ad ripas fabulosas & arenosas frequens, ut in *Nymphaea*.

DESCR. *Corpus oblongum\*, glabrum, vel violaceum s. e. nigro-cæruleo-scente-æneum, vel viridi-æneum (forte texus differentia). Thorax cylindraceus. Antennæ filiformes, antrosum directæ, nigrae. Abdomen cinereum, magis obscurum, a parte anteriore visum albescens. Elytra striata, punctorum decem circiter ordinum, excavatorum; lente visa sunt pulcherrima; apex elytrorum truncatus, niger. Femora postrema maxima & longitudine & crassitate, rubra, ubi crassiora nigra; hæc femora subtus uno altero denticulo acuto, ut in chelis Cancri.*

678. LEPTURA melanura elytris rubescens lividis, sutura apiceque nigris, thorace postice mucronato.

*Leptura nigra, elytris rubescens lividis Fr. 499.*

*Raj. inf. p. 97. n. 6. Cerainbyx capite, scapulis, antennis nigris, elytris flavis: extremitatibus nigris.*

*Act. upf. 1736. p. 20. n. 5. Leptura elytris testaceis, apice nigris (quæ mas).*

*n. 4. Leptura elytris rubris.*

*Pet. gaz. 46. t. 30. f. 5. Capricornus hamstad. exiguis, vaginis rubentibus apice nigro.*

Habitat sat frequens in nemoribus.

DESCR. *Corpus totum cum pedibus, antennis, omnibusque partibus, exceptis elytris, nigrum, oblongum, pone angustum. Thorax absque spinis. Abdomen & tota insinuata superficies nigra quidem est, sed certo respectu ad lumen, si anteriorius inspiciatur, alba. Elytra attenuato-premorsa apicis angulis utrisque acutis. Colore differtant elytra, aliis enim sunt saturate rubra absque ulla nigredine, & haec Fæmina sunt: aliis tubra, apice nigra ut & margine elytrorum exteriore & interiore: aliis testacea apicibus nigris & margine exteriole nigro, & hi males sunt. Elytra infinitis punctis excavata, non tamen striata, & villis quibusdam vix conspicuis, praesettim versus posteriora, adspersa. Thorax & caput in quibusdam flava hirsutie adspersum. Penis longissimus, Tibiae omnes spina terminatae.*

$\beta$  Leptura nigra: elytris thoraceque flavescente. Fn. 501.  
Gadd. diss. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytris obso-  
lete sordideque flavescentibus.

## Habitat - - -

Hæc præcedenti minor, facie eadem, & forte sola varietas; sed Elytra  
minime rubra, verum obsolete sordideque flavescentia, versus basin an-  
gulata; nec Abdomen antice visum album nitidumque adparet.

679. LEPTURA *sangvinolenta* nigra, elytris sangvineis.

## Habitat in Suecia.

DESCR. Similis L. melanuræ & rubræ, sed tota nigra, exceptis elytris  
solis & totis sangvinezis.

680 LEPTURA *testacea* nigra; elytris testaceis, tibiis rufis,  
thorace postice rotundato.

## Habitat in Europa.

DESCR. Statura Lept. melanuræ, sed paulo major. Elytra testacea, trun-  
cato-spinosa, absque nigredine ulla.

681. LEPTURA *rubra* nigra; thorace, elytris, tibiisque pur-  
pureis. Fn. 500.

Frisch. germ. 12. p. 37. t. 3. ic. 6. f. 6. Scarabæus arbo-  
reus major purpureo-ruber.

## Habitat - - -

DESCR. Lept. melanura (quæ vulgaris) duplo major eique 6millima.  
Elytra, Thorax & Tibiæ (sed non femora) coccinea; reliquum corpus  
nigrum est, & sub ventre, ante inspectum, albo lucens.

$\beta$  Leptura nigra thorace elytrisque rufis. De Geer.

## Habitat in Roslagia.

DESCR. Magna satis est. Tibiæ flavæ.

682. LEPTURA *virens* viridi-flava, antennis luteo viridiisque  
variegatis. Fn. 496.

Lift. mut. t. 18. 23?

Act. upf. 1736. p. 20. n. 6. Leptura maxima nigra, subtus  
virescens.

DESCR. Inter Species hujus generis hæc maxima nobis est. Totum  
Corpus in se spectatum atrum est, sed pectus, thorax, abdomen, pedes,  
& maxima ex parte caput vellere e viridi-flavo teſta. Elytra non striata,  
punctis tamen minutissimis adspersa; ad basin suturæ longitudinalis ely-  
trorum viliositas pectori concolor. Corpus pone attenuatum & elytra  
præmorsa. Hæc species solis antennis ab omnibus nobis notis differt,  
quarum singuli articuli inferne lutei, superne nigri; hinc monilis instar  
e nigro & luteo variegatis. Variat etiam elytris vitidibus, adeoque  
toto corpore viridi; elytrorum color luteo-vifidis dependet a vellere  
minutissimo, quo deraso elytra nigra sunt. Femora postica absque den-  
ticulo & Thorax absque angulis.

683. LEPTURA *sericea* viridi cærulea, elytris subfastigiatis.

Habi-

Habitat apud nos rarius.

DESCR. *Corpus* magnitudine Lept. aquatica, sed cæruleum, nitens totum. Antennæ nigrae vix corporis longitudine. *Thorax* quasi medius inter Lepturas & Cicindelas. *Elytra* punctato-striata.

684. LEPTURA quadrimaculata nigra, elytris lividis: maculis quatuor nigris. Fn. 502.

Habitat in sylvis. R. Haft.

DESCR. Est inter maximas. Omnia nigra, sed thorax & abdomen lana cinerea, in singulis *Elytris* macula una anterius paullo minor, altera posterior major magis quadrata & magis saturate ferrugineo-nigra.

685. LEPTURA interrogationis nigra, elytris lividis: fascia longitudinali arcuata maculisque quatuor nigris.

*Uddm. diss. 35. t. 1. f. 2.* Leptura Lamed. mas & femina.  
Habitat in Sylvis.

686. LEPTURA sexmaculata nigra, coleoptris testaceis: maculis sex nigris margine connexis. Fn. 504.

*Act. upf. 1736. p. 20. n. 7.* Leptura elytris testaceis, maculis nigris.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Totum animal nigrum est omnibus partibus, sed *Elytra* testacea, apice truncata, nigra macula terminata; in medio macula nigra margini exteriori annexa, quadrata; juxta basin macula oblonga, angulata, margini exteriori adnexa; intra hanc versus futuram longitudinali macula ovata, nigra, parva, interiori margini adnexa: ergo *elytra* testacea s. pallida margine exteriori & interiori nigro; maculæ ad apicem elytrorum clavis coleoptris conficiunt simul unicaum nigram maculam; in medio duæ maculæ quadratae margini exteriori adnexæ constituant binas distinctas maculas; maculæ ad basin elytrorum angulatae & parum sinuatae, margini exteriori adnexæ constituant binas alias maculas; sed maculæ ovatae, intra has interiori margini elytrorum adnexæ, simul coëunt in unam, adeoque sex maculæ, connexæ omnes margini elytrorum interiori nigro. Pedes spina terminati.

687. LEPTURA quadrisaciata nigra, elytris testaceis: fasciis quatuor nigris, thorace postice mucronato.

Leptura nigra, elytris macularum ferruginearum quatuor paribus. Fn. 505.

Habitat in sepibus. Malmborg.

DESCR. Est e maximis sui generis. *Corpus* totum nigrum, ut & *Elytra* quæ maculis ferrugineis quatuor parium insigniuntur, quarum intermedias undulatae sunt. *Thorax* postice complicatus quasi est, vel *Elytra* testacea, fasciis quatuor nigris undulatis transversis, ultima terminatrice,

688. LEPTURA attenuata, elytris fastigiatis attempuatis fulvis: fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis, thorace postice mucronato.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Corpus postice valde attenuatum, Caput, Thorax, Pedes nigra. Abdomen ferrugineum apice nigro. Elytra fasciis quatuor flavis, totidemque nigris.

689. LEPTURA nigra elytris fastigiatis, corpore nigro nitido, abdомине rufo, thorace postice mucronato.

Leptura nigra tota. *Fn.* 503.

Habitat ad acidulas Medevienses.

*DESCR.* Majuscula. Elytra angusta.

690. LEPTURA virginea thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdомине rufo.

Cicindela elytris viridi-cærulescentibus, abdомине fulvo. *Fn.* 552.

Habitat in nemoribus ad radices montium.

*DESCR.* Caput & Thorax cum pedibus antennisque nigra. Abdomen post pedes fulvum, Elytra viridi-cærulescentia, nitida, punctis sparsis excavata, Antennae 10 articulis,

691. LEPTURA collaris thorace globoso abdоминеque rubris, elytris nigris.

Cicindela atra, thorace rufo, elytris nigro-cæruleis. *Fn.* 551. Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Corpus totum atrum, glaberrimum, sed Thorax globosus ferrugineus, ut & Abdomen post pedes, a tergo flavum.

692. LEPTURA rustica thorace globoso tomentoso, elytris cinereis: fasciis linearibus albis undulatis.

Habitat in Sylvis rarius.

*DESCR.* Corpus mediæ magnitudinis, atro-cinereum, fere tomentosum. Coleoptera fascia una alterave, linearie, albida, undulata.

693. LEPTURA mystica thorace globoso tomentoso, elytris fusco-cinereis antice rufis; fasciis linearibus arcuatis lateque cauis.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Magnitudo media, Corpus nigrum, Elytra a basi fere ad medium ferruginina: lineæ aliquot niveæ concurrent in angulum acutum ad futuram dorsalem; ante apicem fascia albida.

694. LEPTURA detrita thorace globoso nigricante, elytris fusciis; fasciis quatuor transversis flavis, pedibus rufis.

*Uddm. diss.* 31.

Habitat passim in Sylvis.

*DESCR.*

*DESCR.* Thorax subglobosus, fuscus annulis 2 flavis. Elytra subfuscata basi linea obsoleta flava; dein interrupta; demum 2 latiores ad apicem; ipse apex flavus. Pedes & Antennæ flavæ.

695. LEPTURA *arietis* thorace globoso nigro, elytris nigris; fasciis flavis: secunda antrorsum arcuata, pedibus ferrugineis.

Leptura nigra, elytrorum lineis transversis flavis, pedibus testaceis. Fn. 507. It. scan. 183.

Raj. inf. p. 82. n. 22. Scarabæus medius, abdomine longo angusto, niger, lineolis & maculis luteis pulchre variegatus.

Frisch. germ. 12. p. 32. t. 5. f. 3.

Lift. mut. t. 31. f. 1.

Ig. p. 385. u. 14. Scarabæus niger, lineolis quibusdam luteis distinctus, subcroceis pedibus,

Act. upf. 1736. p. 20. n. 8. Leptura elytris nigris lineis flavis.

Habitat in pratis inter arbores, & in hortis.

*DESCR.* Est tota fusco-nigra, oblonga, angusta. Thorax margine superiore flavus est. Scutellum ubi elytra conjunguntur puncto flavo notatur. Ad angulos Elytrorum macula oblonga, transversa, in utroque elytro, quæ ambæ non coeunt: in medio elytri utriusque est linea flava, arcuata, flexura deorium spectante, pede interiore versus futuram cum opposita fere coeunte, hinc figura arietis; intra hanc & apicem linea transversa flava cum opposita connexa; apex elytrorum flavus, ut & anus. caput, thorax & elytra villis tenuissimis testa sunt. Elytra apice truncata, licet extus præ pilis vix conspicue. Pedes rufescentes; tibiæ spina terminatae. Antennæ rufescentes, superne fuscæ. Alæ dum parum dehiscent elytra aurato-purpurea lucent. Lineæ 4 flavæ sub abdomine.

696. LEPTURA *arcuata* thorace globoso nigro, elytris nigris; fasciis linearibus flavis tribus retrorsum arcuatis, pedibus ferrugineis.

Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 4. f. 1.

Habitat apud nos rarius.

*DESCR.* Antennæ & Pedes postici ferruginei. Corpus attum. Caput linea flava antice, & inter antennas & ad basin: Thorax antice linea flava & duabus in medio ad latera. Puncta lutea: unum Elytris commune ad basin; dein unum utrinque; tum unum commune majus; demum punctum cum lineola; tandem arcus in singulo elytro & dein arcus communis; ultimo apices elytrorum lunula lutea teruinati.

697. LEPTURA *scalaris* thorace subrotundo, coleoptris linea futurali flava dentata punctisque flavis.

Cerambyx niger, coleopterorum fascia longitudinali flava dentata: punctis flavis. Fn. 494.

*Fonst. inf. t. 15.* *Scarabæus minor* 52.

*Frisch. germ. 12. p. 29. t. 3. ic. 3.* *Scarabæus arboreus medius*, elytris nigris, ornamenti flavis.

*Aet. upf. 1736 p. 20. n. 7.* *Cerambyx cinereus*, fascia alba. Habitat in sylyvis.

*DESCR.* Tota nigra est, oblonga, laevis. Thorax vellere flavo indutus, macula nigra, quadrata in dorso; utrinque ad latera gibbus. Elytra nigra, glabra, punctis minutissimis excavatis, futura longitudinali flava, dentibus variis oppositis, quorum par primum incurvum, secundum transversum, tertium ascendens, quartum deorsum gibbum, quintum minimum, siccum ultimum descendens per marginem exteriorem; puncta aliquot difformia, flava, in medio elytrorum. Antennæ corpore paucis longiores. Flavedo omnis e villis minutissimis constat.

698 LEPTURA *præsta* thorace subgloboso fusco, elytris flavis: apice nigris, pedibus quatuor pallidis.

Leptura nigra; elytris flavis, apice nigris: *Fn. 506.*  
Habitat in Scania. D. Leche.

*DESCR.* Vix pediculo duplo major, cylindrica nigra; Antennæ longitudo fere corporis. Elytra flava, apice nigra, obtusa & fere truncata, minus rigida, ut Cantharidis speciem dixisse, nisi thorax teres fuisset. Omnia subtus & totum corpus nigrum.

### Cantharis.

699. CANTHARIS *Noctiluca* oblonga nigra, thorace fusco postice truncato, pectoreanoque flavescente.

Cantharis fæmina aptera. *Fn. 584.*

*Ald. inf. p. 492.*

*Column. ecpbr. I. p. 38. t. 36.* *Noctiluca terrestris.*

*Fonst. inf. p. 108. t. 14. f. 2.* *Cicindela Mouff.*

*Charl. exerc. p. 47.* *Cicindela.*

*Mouff. lat. p. 109. f. 1. mas. 2. fæmina.*

*Merret. pin. p. 201.* *Cicindela.*

*Wagn. helv. p. 239.* *Cicindela; Lampyris.*

*Bradl. nat. t. 26. f. 3.* *A. fæmina. B. mas.*

*Raj. inf. p. 79.* *Cicindela impennis f. fæmina.*

*p. 78.* *Scarabæus Lampyris sordide nigricans, corpore longo angusto f. Cicindela mas.*

*Dat. pharm. p. 391.* *Cicindela.*

*Suec. Lysmask.*

Habitat æstate frequens in juniperetis supra terram. *It. W:goth.*

134.

*DESCR.* Fæmina elytris & alis caret, constat incisuris undecim; quarum prima est thoracis clypeus incumbens, planus, marginatus, semiovatus, pone truncatus; sub quo caput minimum. Larva & Pupa & insectum perfectum similia, sed larva puncto albo ad latuſ cujusvis segmenti, quibus caret

# INSECTA COLEOPTERA. CANTHARIS. 201

caret perfecta. *Pupa* similis, sed pedibus immobilis; in omni statu punctata duo lucentia sub cauda, quamdiu vivit, nocte lucet; mortua lumen emittrit: in cespite gramineo viridi & succulento diutius viva servari potest.

700. CANTHARIS *fusca* thorace marginato rubro macula nigra, elytris fuscis.

*Cantharis* elytris nigricantibus; thorace rubro; nigra macula.

*It. et. 38. Fn. 586.*

*Raj. inf. p. 84. n. 29.* *Cantharus sepiarius major*, elytris nigricantibus, dorso s. thorace supino obscure rufo.

*inf. p. 101. n. 2.* *Cantharis semunciam longa.*

*Frisch. germ. 12. p. 36. t. 3. ic. 6. f. 5.* *Scarabaeus arboreus* nigro-fuscus, elytris tenuibus.

*Ephem. N. C. 1674. obs. 79.*

*Aet. upf. 1736. p. 19. n. 2.* *Cantharis elytris fuscis.*

Habitat ubique sat apud nos frequens; Larva saepe in nive.

*De Geer. Aet. Holmens. 1749. p. 77.* Animal saevit in propria speciem.

*DESCR.* Animal oblongum, molliusculum. *Caput* nigrum, planiusculum, infra oculos rufescens. *Os* minimum, forcipatum: maxillis arcuatibus, simplicibus, quibus frusta mordet. *Palpi* ad maxillas minimi. *Antennæ* communes, corpore dimidio breviores, filiformes articulis undecim, fuscæ, sed capiti propius rufescentes. *Thorax* a tergo planus, cordatus, marginibus eminentibus, rufescens, excepta macula magna nigra capiti contigua. *Elytra* plana, oblongo-linearia, mollissima, flexilia, ferricea, fusco-nigra. *Alæ* diaphano-fuscæ. *Abdomen* fuscum excepto ultimo seu septimo articulo rubicundo, ut & marginibus lateralibus rubris. Hi margines laterales compressi, singula incisura plicatim incumbente, mollissimi, apicibus incisurarum lateralium mamillaribus.

701. CANTHARIS *livida* thorace marginato, tota testacea.

*Cantharis elytris testaceis, thorace rubro immaculato. Fn.*

*585.*

*Raj. inf. p. 84. n. 28.* *Cantharus sepiarius major*, e rufo flavicans, elytris non maculatis.

*Aet. upf. 1736. p. 19. n. 1.* *Cantharis elytris testaceis.*

Habitat passim frequens.

*DESCR.* Magnitudo, figura &c omnia omnino ut in priore, excepto solo colore elytrorum luteo-pallido & thorace immaculato. *Oculi nigri sunt.*

702. CANTHARIS *dermestoides* testacea, oculis alis pectoraque nigris, antennis longitudine thoracis.

Habitat Calipharæ. *A. Modeer.*

*DESCR.* Statura precedentium, sed magis teres, tota testacea; *Pectus* & *Abdominis* prima segmenta atra. *Antennæ* filiformes, ferratæ, thoracis tantum longitudine, quo a reliquis manifeste differt. *Caput* inflebit uti dermestes, & thorax parum admodum marginatus; *Elytra* vero mollia sunt.

202 INSECTA COLEOPTERA. CANTHARIS.

703. CANTHARIS *rufa*, thorace marginato, tota rufa, epigastrio alisque nigris.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Simillima insequenti, sed duplo major, minus saturate rubra, sed tantum rufa; nec Thorax macula nigra notatus, & corporis maxima pars rufa, nec nigra.

704. CANTHARIS *sanguinea* thorace marginato macula nigra, tota rubra, elytris sanguineis.

Cantharis elytris rubris; thorace rubro nigra macula. Fn. 587.

Frisch. germ. 12. p. 41. t. 3. ic. 7. f. 2. Scarabæus arbo-reus parvus ruber, elytris longis, clypeo pectorali linea nigra.

Raj. inf. p. 101. n. 4. Cantharis prioribus similis quarta.

Aet. upf. 1736. p. 19. n. 3. Cantharis elytris ruberrimis: Habitat variis in locis, praesertim *Dannemore* in acervis minere ferreæ frequens.

DESCR. Præcedentibus minor. Totum Corpus (excepto thorace & elytris) atrum. Antennæ filiformes, sed articulis apice antrorsum prominulis: macula dorsalis thoracis atra etiam scutellum tegit. Elytra mollia, saturatissime rubra s. coccinea, tenuissime striata, costis 6 longitudinaliter elevatis, inter singulas quasi rete e maculis duplci ordine, rugis minus elevatis. Thorax ruber suturis elevatis rugosis fundo nigricante.

705. CANTHARIS *coccinea* nigra, thorace elytrisque sanguineis.

Habitat in Suecia. De Geer.

DESCR. Simillima C. sanguineæ, sed duplo major. Thoracis clypeus suborbicularius, nec tétragonus est. Elytra non striata sunt in illa.

706. CANTHARIS *obscura* thorace marginato: marginibus rubris, elytris nigris.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Parva est. Os incarnatum. Antennæ palidæ. Thorax incarnatus disco atro. Elytra obscure nigricantia. Abdominis segmenta margine flavescentia. Pedes & Femora supra nigra, subtus ferruginea.

707. CANTHARIS *lateralis* thorace marginato rubro, corpore fusco, elytris margine exteriore flavescentibus.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Parva, Fusa sunt Caput, Antennæ, Pedes, Abdomen, Elytra. Rufa vero Thorax totus, Anus, Elytrorumque margo exterior longitudinalis.

708. CANTHARIS *aenea* thorace marginato, corpore viridi-aeneo, elytris extrorsum rubris. Fn. 588.

Raj.

Raj. inf. 77. Scarabæus minor; corpore longiusculo; elytris rubicundis.

Habitat in *Urtica* majore rarius, nec non in plantis variis.

DESCR. Est hæc e mediae magnitudinis; præcedentibus minor, sequentibus major. Caput, thorax, antenæ, abdominis annuli supra & infra, elytra versus basin & marginem interiore viridi-ænea, at elytrorum pars postica versus apicem & etiam versus marginem exteriorem sive lateralem rubra, ita ut *Elytra* maxima ex parte rubra sint, & a basi versus futuram longitudinem viridi-ænea. Ad latera thoracis, ut & abdominis, utrinque vesicula coccinea bicornis. Alæ fuscæ.

709. CANTHARIS bipustulata thorace marginato, corpore æneo-viridi, elytris apice rubris. It. &c. 127. F. 589.

Raj. inf. p. 101. n. 7. Cantharis vix tres octavas uncia longa.

A&t. upf. 1736. p. 19. n. 5. Cantharis elytris viridi-æneis apice rubris.

Habitat frequens in graminibus, præsertim in *Caricibus*.  
Larva rapax vorat minima insecta.

DESCR. Præcedenti, cui facie simillima est, omnino minor. Ad latera thoracis & abdominis etiam utrinque gerit vesiculam coccineam tricuspidem. Alæ nigro-fuscæ. Antennæ nigrae. Caput, thorax & elytra æneo saturate viridia, extimis apicibus elytrorum rubris seu coccineis. Abdomen elytris longius, subtus æneum, sub alis rubrum. Variat elytrorum colore cæruleo vel magis viridi.

710. CANTHARIS pedicularia thorace marginato, corpore atro, elytris apice rubris.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Facies præcedentis, sed quadruplo minor, nec ænei coloris, verum nigra.

711. CANTHARIS fasciata thorace marginato virescente, elytris nigris: fasciis duabus rubris. A&t. upf. 1736. p. 19. n. 6. F. 590.

Habitat in Plantis.

DESCR. Magnitudo pediculi, sive decuplo minor quam antecedens. Antennæ & Pedes nigri. Caput & Thorax virescentia; Elytra atra, fascia duplice rubra transversa, altera paulo supra basin, in medio ad futuram interrupta; altera in ipsis apicibus elytrorum, vel paulo intra apices in quibusdam; hæc in medio contigua. Abdominis latera rubra.

712. CANTHARIS biguttata thorace marginato atro, elytris nigris: apice flavis. F. 591.

Habitat - - -

DESCR. Magnitudo & facies præcedentis; sed Caput & Thorax omnino atra. Elytra apicibus summis flava seu sulphurea. Abdominis latera flava.

713 CANTHARIS *minima* thorace marginato rufo macula nigra, corpore fuscō, elytris apice flavis.

*Necydalis* elytris apice puncto flavo. Fn. 598.

Habitantem reperi in *Heliantho tuberoso*.

DESCR. Pediculo paulo major. *Caput* nigrum, maxillis flavis. *Thorax* flavus, marginatus. *Elytra* nigricantia, in medio fusca apice flavo puncto terminata. *Alae* nigrae, elytris duplo longiores, cruciatim incumbentes. *Antennae* corpore breviores, filiformes, nigricantes, versus basin flavescentes. *Femora* nigra, tibiis flavis. *Abdomen* fuscum; lateribus flavis.

♂ *Cantharis fusca*, elytris apice flavis, thorace rufo. Fn. 592.

DESCR. Magnitudo pediculi. *Caput* atrum. *Thorax* rufo-ferrugineus, macula nigra. *Elytra* fusca abdomine dimidio breviora, apicibus flavis. *Femora* nigra. *Tibiae* pallidæ; abdominalibus segmentis margine flavis.

714. CANTHARIS *testacea* thorace marginato flavo macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis.

*Cantharis nigra*, elytris lividis. Fn. 593.

Habitat in plantis.

DESCR. Est e minimis generis sui. *Antennæ* pallidæ. Similis canth. livida, sed quadruplo minor.

715. CANTHARIS *pectinicornis* thorace orbiculato, elytris rufo testaceis, antennis pectinatis.

Habitat in plantis.

DESCR. Statura Canth. sanguinea, sed *Clypeus* orbiculatus, rufus puncto, in medio, fulco. *Caput*, *Corpus* & *Scutellum* nigra. *Antennæ* valde pectinatae nigrae. *Elytra* pallide rubra, non striata.

716. CANTHARIS *cærulea* thorace teretiusculo, corpore cæruleo subopaco.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Simillima sequenti, sed paullo major & *Thorax* magis depresso, sed color cæruleus totius corporis, exceptis antennis nigris, at minus nitens.

717. CANTHARIS *viridissima*, thorace teretiusculo, corpore viridi.

Habitat in Uplandia.

DESCR. *Antennæ* filiformes, nigricantes, corpore paullo breviores. *Thorax* non marginatus, sed teres Lepturæ. *Corpus*, viridi-sericeo nitens, solo *Capite* viridi-aureo,

718. CANTHARIS *navalis* thorace teretiusculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris.

*Cantharis ferruginea*, thorace rotundato, elytrorum margine extiore apiceque nigricante.

It.

*It. W:goth.* 153. t. 2. f. 2, 3, 4.

*Frisch.* inf. 13. p. 24. t. 20.

Habitat in *Querci* truncis detruncatis, rei nauticæ pessima! Historia in *It. W:goth.*

DESCR. *Corpus* teretiusculum. *Ferruginea* sunt *corpus*, *Pectus*, *Thorax*, *Elytra*, *Abdomen*, *Pedes*. *Nigra Caput*, *oculi* & *elytrorum apex* cum *margine exteriore*. *Pectus* lamina convexa tegitur.

719. CANTHARIS *melanura* thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris.

Habitat in Arboribus.

DESCR. Simillima præcedenti magnitudine, statura, colore. Sed *Thorax* planior, inæqualis, nec caput nigrum, & ultimi tantum *elytrorum* apices nigri.

720. CANTHARIS *Cardiacæ* atra, elytris apice puncto sanguineo, antennis pectinatis.

Habitat in Leonuro *Cardiaca*. Joh. Alströmer.

DESCR. Magnitudo pediculi. *Abdominis* segmenta margine, lateribus & subtus rubra.

## Elater.

721. ELATER *brunneus* thorace nigro utrinque rufo, elytris corporeque ferrugineis.

Habitat in Suecia.

DESCR. *Corpus* mædia fere magnitudinis. *Caput* & *Antennæ* nigra. *Thorax* niger, utrinque linea lata rubra longitudinali. *Elytra* lurido-testacea, obsolete striata. *Pectus* rubrum, medio nigrum. *Abdomen* nigrum, medio rufum. *Pedes* ferruginei.

722. ELATER *cruciatus* thorace nigro lateribus ferrugineo, coleoptris flavis cruce margineque nigris.

Habitat apud nos minus frequens.

DESCR. Magnitudo media s. majulcula. *Antennæ* ferruginea. *Thorax* lateribus ferrugineus. *Coleoptra* flava, sutura longitudinali late nigra. Marginibus lateralibus nigris antibus & fascia etiam obsoletius nigra. *Pectus* lateribus rufum. *Abdominis* latera posterius sanguinea. *Pedes* rubri.

723. ELATER *linearis* thorace nigro lateribus rufo, elytris testaceis linearibus.

Elater thorace rubro, elytris griseis. Fn. 582.

Habitat *Upsaliæ*.

DESCR. Est inter minores sui generis. *Caput* nigrum. *Thorax* ruber, *Elytra* grisea, singula septem puriorum excavatorum ordinibus striata. Regio tota subtus cum abdomen, pedibus, thorace fusca.

724. ELATER *ruficollis* thorace rubro nitido antice nigro, elytris corporeque nigris.

Elater niger, thorace rubro. *Fn. 576.*

*Act. upf. 1736. p. 19. n. 3.* Attelabus oblongus niger, col-lari testaceo.

Habitat apud nos ad agrorum margines, sed rarissime.

DESCR. Inter nostros minimus vel reliquis fere dimidio minor. *Totus* ater, sed Elytra, quæ etiam striata, parum ad cœruleum vergunt colore. *Thorax* maxima ex parte ruber, sed antice niger, in medio tamen magis postice levissimo margine elytra spectante etiam niger, hinc thorax quasi fascia transversali lata, rubra, lunulata, cavitate lunulæ caput spectante. *Antennæ* nigræ, non peñinatæ, sed articulis parum antice gibbis.

725. ELATER *mesomelus* thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris.

Habitat in Suecia minus frequens.

DESCR. *Corpus* nigrum, mediæ magnitudinis, angustius. *Os* ferrugineum. *Thorax* ferrugineus linea longitudinali excavata. *Elytra* nigra punctis excavatis striata, margine exteriore testacea, unde insolita facies. *Scutellum* nigrum, glaberrimum.

726. ELATER *aterrimus* ater, thorace opaco punctato, elytris striatis. *Uddm. diff. 45.*

Habitat in sylvis.

DESCR. Magnitudo media. *Corpus* totum carbonis instar aterrimum. *Thorax* scabriuscus. *Elytra* profundius striata cavitatibus quasi crenulatis.

727. ELATER *castaneus* thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigris, corpore atro

Elater thorace villoso; elytris testaceis, apice nigris. *Fn. 573.*

*Lift. loqu. p. 387. n. 18.* Scarabæus ex fusco rufescens sive castaneus.

*Raj. hist. p. 92. n. 6.* Scarabæus antennis articulatis quarto & quinto æqualis.

Habitat frequens inter segetes & in pratis.

DESCR. Pedes, alæ, antennæ ramosæ & elytrorum apices nigra. *Thorax* villis subcinereo-testaceis testus. *Elytra* rubicunda s. pallide incarnata, tenuissime striata, apice nigro.

728. ELATER *livens* niger, thoracis glaberrimi margine antico rubro, elytris testaceis.

Habitat in Suecia. *P. Forskål.*

DESCR. Statura præcedentis. *Corpus* totum etiam antennis pedibusque nigrum. *Elytra* tota triste flavescentia s. testacea. *Thoracis* margo anticus, imprimis lateribus, obscure tanguineus est.

729. ELATER *ferrugineus* thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracisque margine postico nigris.  
 Habitat apud nos minus frequens.
- DESCR. Plerisque nostratis major; *Totus niger exceptis thorace & elytris ferrugineis; Thorax margine postico, vix manifesto ater; dentesque thoracis postici obscuri sunt. Scutellum nigrum est. Antennae serratae, thorace paullo longiores.*
730. ELATER *germanus* niger, thorace elytrisque atrocæruleis.  
*Elater niger, elytris cæruleis.* Fn. 579.  
 Habitat Upsaliæ rarius; in Germania frequens.
- DESCR. Corpus totum subitus una cum pedibus antennisque atrum, Thorax et Elytra nigro-cærulecentia; hæc 10 striis exarata.
731. ELATER *sanguineus* thorace atro, elytris rubris, corpore nigro.  
*Elater niger, elytris rubris.* Fn. 574.  
 Habitat in Sylvis.
- DESCR. Magnitudine & facie ad Elat. testaceum accedit, sed Thorax glaber uti & Caput nigra. Elytra rubra striis tenuissimis, ex punctis per novem ordines in singulo elytro. Antennæ semipetinatae. Os edentulum,
732. ELATER *balteatus* thorace atro, elytris antice dimidiato rubris, corpore nigro.  
*Elater niger: elytris antice dimidiato rufis,* Fn. 580.  
 Habitat in Rostagia.  

DESCR. Est inter minores. Antennæ filiformes.

733. ELATER *marginatus* thorace subfuscō, elytris testaceis margine undique nigris.  
*Elater niger, elytrorum latere exteriore livido.* Fn. 581.  
 Habitat apud nos.

DESCR. Corpus minoris magnitudinis, subitus fuscum. Caput nigrum. Thorax fuscus, lateribus ferrugineus. Elytra pallide testacea, margine omni nigra. Pedes pallide testacei; Antennæ fusco-testaceæ.

734. ELATER *sputator* thorace fusco nitido, elytris testaceis, corpore nigro.  
*Elater niger, elytris fuscis, antennis pedibusque rufis.* Fn. 583.  
 Habitat in agris. Dum exagitatus crepitat simul ore expavit longissime Salivam. Rolander.  

DESCR. Totus niger, sed Elytra fusca seu cinerascentia. Pedes rufi, adhuc antennæ magis rufæ.

735. ELATER *obscurus* thorace fuscō obscuro, elytris obscure testaceis.

Habitat apud nos frequentissime.

DESCR. Species difficillime dignoscitur & determinatur, nisi solo colore obscure fuscō, minime nitido; statura & magnitudine Elat. lineati. Elytra obscurissime striata.

736. ELATER *tristis* thorace atro nitido, elytris basi margineque exteriore lividis.

Habitat in Suecia rarius.

DESCR. Corpus nigrum minoris magnitudinis. Elytra ad basin macula oblonga triste flava & marginē exteriore pallido s. flavo. Plantæ ferrugineæ.

737. ELATER *fasciatus* thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus fascia alba undulata.

Habitat in Suecia frequentior.

DESCR. Corpus nigrum, majusculum. Antennæ breves, Thorax inæqualis, ex nigro & pallido variegatus. Elytra nigra, non striata; sed atomis nigris punctata; pone medium fascia pallida undata, saepius interrupta, & anterius macula pallida laterali.

738. ELATER *murinus* thorace obscure cinereo, elytris cinerneo-nebulosis, plantis antennisque rufis.

Habitat apud nos rarius.

DESCR. Corpus medium i. majusculum, nigro-cinereum; solæ Antennæ & Pedum plantæ ferrugineæ.

739. ELATER *tessellatus* thorace obscure æneo, elytris fuscis: maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. Corpus mediæ magnitudinis, subtus nigrum, supra etiam nigrum sed quasi ex cinereo variegatum s. murinum ex pilis vario ad lucem aspectu nitentibus. Pedes picei s. ex rufo nigri.

740. ELATER *aeneus* thorace elytrisque cærulecenti-æneis, pedibus sanguineis.

Elater viridi-æneus, pedibus fulvis. Fn. 578.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. Inter majusculos. Elytra striata. Antennæ filiformes. Variat colore nigro, æneo, & viridi nitente.

741. ELATER *pectinicornis* thorace elytrisque æneis, antennis pectinatis.

Elater fusco-viridi-æneus. Fn. 575.

Lst. mut. t. 17. f. 15. mas. ♂ f. 14. femina.

logia

*loqu.* p. 387. n. 19. *Scarabæus e nigro virens, corniculis altero tantum versu pectinatis.* (*Mas*).

*Æt. upf. 1736. p. 15. n. 3. Notopeda nigro-ænea, antennis simplicibus.*

Habitat hinc inde in *Pino*, cuius polline vicitat.

*DESCR. MAS thorace & elytris magis saturate viret & angustior est, Antennis valde pectinatis.*

*FÆMINA* magis ænea: *Thoracē latiore nitidiore viréscente: elytris magis nigricantibus. Antennis filiformibus minime pectinatis.*

742. *ELATER buprestoides* corpore toto nigro, antennis pectinatis, thorace caput recipiente.

Habitat Calinariæ. *Modeer.* in Salice *Job. Forskål.*

*DESCR. Magnitudo e mediis vel minoribus. Corpus totum nigrum. Antennæ longitudine thoracis, pectinatae simplici serie, nec utrinque pallidiiores. Thorax gibbus recipit caput ut in Buprestide, unde facies singularis, sed postice utrinque dente notatus ut in congeneribus. Elytra renuissime striata. Pedes breves. Ex natura videtur potius generis Dermestidis.*

743. *ELATER niger* thorace lavi, elytris pedibus corporeaque nigris.

*Elater totus nigro-fuscus.* *Fn. 577.*

*Raj. inf. 78. Scarabæus minor longo & angusto corpore, totus niger, saltatrix.*

*æ Raj. inf. p. 92. n. 1. Scarabæus antennis articulatis primus maxime vulgaris.*

*Æt. upf. 1736. p. 15. n. 4. Notopeda atra, antennis simplicibus.*

*β Raj. inf. p. 92. n. 3. Scarabæus antennis articulatis tertius.*

*Æt. upf. 1736. p. 15. n. 5. Notopeda fusca; antennis simplicibus.*

*List. nat. t. 17. f. 14.*

Habitat in pastuis.

*DESCR. Totus niger vel ad cinereum s. fuscum vergens s. colore iuvenino. Antennæ in omnibus a me visis absque ramis sunt. Corpus, ratio ne magnitudinis, brevius quam in reliquis.*

744. *ELATER minutus* thoracē nigro nitido, elytris nigris obscuris.

Habitat apud nos rarius.

*DESCR. Corpus totum nigrum. Thorax glaber. Elytra obscure striata; Magnitudine precedentibus cedit, sed sequenti duplo major est.*

745. *ELATER pulchellus* thoracē capiteque atris, elytris nigris; maculis flavicantibus, pedibus flavis:

O

Habitat

Habitat in Scania. D. C. Solander.

*DESCR.* Pediculo paullo major. Caput & Thorax atra. Elytra nigra, striae ta, antice fascia repanda subinterrupta flava; pone medium punctum flavum. Prope apicem macula longitudinalis flava. Corpus nigrum. Pedes flavi.

## Cicindela.

746. CICINDELA *campestris* viridis, elytris punctis quinque albis.

Cicindela supra viridis, coleopteris punctis decem albis.

*Fn.* 548.

*Mouff.* lat. p. 145. f. infim. *Cantharis quarta.*

*Jonst.* ins. t. 16. *Cantharis Mouff.* minor 4.

*List.* mut. t. 17. f. 12.

*loqu.* p. 386. n. 17. *Scarabæus viridis*, cui decem maculæ albæ supra alarum thecas sunt.

Habitat in sterilitissimis pratis sat frequens vere; celerrime currit & ocyssime volitat.

*DESCR.* Inter Coleoptera certe hæc species unica ex præstantissimis duci debet, cum aureus nitor ex toto corpore radiet, vel fericeo fulgeat. Elytra supra viridia, planiuscula, laevia, punctis aliquot albis notata; quorum primum ad baseos angulum; secundum rotundum prope marginem; tertium lunulatum prope marginem. 4:rum oblongum ad marginem, 5:rum intra tertium, seu in medio elytri, reliquis interius; præter haec & apex elytri albicat. Alæ fuscæ. Thorax angustus, rotundatus, viridinens. Caput aureo-viride, depresso vertice. Oculi nigri, prominentes. Os prominens. Labium superius obtusum, album. Maxillæ superiores prominentes; dentibus plurimis validis; inferiores maxillæ apice unico dente armatae, sub his palporum duo paria, quorum superius constat articulis duobus, inferius quaternis. Labii inferioris loco palpi bini ex binis articulis pilosis. Abdomen viridi-aureum. Pedes longissimi, tenuissimi; ad basia femorum corpus quoddam ovale, durum. Antennæ filiformes, corpore breviores, 10 articulis.

747. CICINDELA *hybrida* subpurpurascens, elytris punctis duobus albis lineolaque terminali.

Habitat in Sylvis rarissima.

*DESCR.* Statura omnino præcedentis, sed color purpurascens-fuscus. Elytra in medio fascia alba, undata, simili sequentis speciei & ad marginem exteriorem baseos, uti etiam ad apicem, lunula alba.

748. CICINDELA *sylvatica* nigra, elytris fascia punctisque duobus albis.

Cicindela atra, coleopteris maculis sex fasciaque albis.

*Fn.* 549.

*A&Z.* upf. 1736. p. 19. n. 1. Cicindela atra, punctis quatuor fasciaque albis.

Pet.

# INSECTA COLEOPTERA. CICINDELA. 211

Pet. gaz. p. 77. t. 50. f. 5. *Cantharis chusan.* viridis-elegantissime variegatus. quod ad figuram?

Habitat in sylvis ac *Pinetis Westrobotniæ*, ubi frequens, celerrime currens & volitans per vias, rarer in reliquis provinciis, semper in sylvis acerofisis. Apud nos Upfaliæ rarer.

*DESCR.* Facies omnino primæ, sed sesquimajor. Tota atra est. Coleoptera depresso, latiuscula; ad angulum exteriorem baseos elytorum punctum album; paulo supra, juxta exteriorem marginem, aliud punctum, sed sublunulatum, versus apices elytorum in singulo elytro punctum rotundum, album; fascia linearis, flexuosa f. undulata, arcuata, versus posteriora in medio deflexa, cingit in medio elytra: Haec maculae omnes non constant ex pilis, cum elytra glabra infinitis punctis excavatis conspersa, sed translucent per ipsam crustam. Alæ membranaceæ, acutæ, venis fuscis & fascia fusca longitudinali juxta exteriorem marginem. Femora & pedes longi, tenuis, atri, setis quibusdam adspersi. Tibiae spinis duabus terminatae. Thorax angustior, teretusculus, cruce depresso, uti caput niger. Oculi prominuli. Os prominens; labium superius attum, rotundato-acutum; maxillæ superiores magnæ, prominentes, nigrae, versus basin extus albæ, dentibus plurimis (5) duris armatae.

749. *CICINDELA riparia* viridi-ænea; elytris punctis latis excavatis. It. æl. 38. 121. Fn. 550.

*Lift. logu.* p. 385. n. 12. *Scatobaenus parvus* inauratus.

*Act. upf.* 1736. p. 19. n. 3. Cicindela ænea: punctis excavatis.

Habitat ad ripas aquarum inter arenam humidam frequens, celerrimeque currens, etiam sub ipsa aqua, nec tamen natans.

*DESCR.* Est admodum parva, vix duo semina oryzæ æquans. Os prominens. Caput, thorax, abdomen, femora (non tibiae), pedes ex auro & cupro nitentia. Oculi nigri, prominentes. Thorax angustus, teretusculus. Elytra viridi-ænea, punctis latis excavata; in medio singuli puncti excavati punctum prominens. Puncta majora excavata connectunt longitudinaliter linea elevata nigricante: quum superficies sic virescens, sed punctorum fundus æneus, exsurgit singularis color.

750. *CICINDELA flavipes* obscure ænea, pedibus luteis, elytris subnebulosis.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Magnitudo Cicind. aquatice. Antennarum basis flavescens. Pedes lutei. Elytra subænea, obscure nebulosa.

751. *CICINDELA quadrimaculata* nigra, elytris fuscis: maxulis duabus pallidis, tibiis rufis.

Habitat apud nos rarius.

*DESCR.* Corpus nigrum; magnitudine pediculi. Thorax subglobosus. Elytra

*lytra fusca*: singula maculis duabus: altera anteriore; altera posteriore.  
*Antennæ Tibiæque rufæ.*

752. *CICINDELA aquatica ænea nitida*:

*Buprestis fusco-ænea glabra nitida*; thorace submarginato.  
*Fn. 558.*

*List. mut. t. 31. f. 13.*

*Act. upf. 1736. p. 19. n. 20. Cicindela minima aurea lævis.*  
*Habitat ad aquas.*

*DESCR.* Hæc minima est. *Antennæ breves, capillaceaæ. Oculi prominentes; tota nitida: Thorax latiusculus, carinatus, marginatus. Elytra nitida striis minutissimis e punctis minutissimis. Abdomen nigro-nitidum. Pedes nigri. Rostrum prominulum.*

### Buprestis.

753. *BUPRESTIS octoguttata elytris fastigiatis muticis: maculis quatuor albis, corpore cæruleo.*

*Habitat in Pinetis, rarius.*

*DESCR.* *Corpus mediocre, cæruleum. Antennæ longitudine thoracis. Thorax margine albo. Elytra striata, obtusissima, maculis albis, quatuor, longitudinaliter digestis. Abdomen ad basin utrinque lineola alba transversa & pari punctorum alborum in singulo segmento. Femora quatuor posteriora puncto albo.*

754. *BUPRESTIS mariana elytris ferratis longitudinaliter rugosis: maculis duabus impressis, thorace sulcato.*

*Buprestis æneo-nitida, supra cinerea, coleopteris apice attenuatis. Fn. 557.*

*Habitat in sylvis.*

*DESCR.* Est e maximis. *Elytra apice truncata, attenuata, supra cinerea, striata, absque maculis, interfluente aureo nitore.*

755. *BUPRESTIS chrysostigma elytris ferratis sulcatis: maculis duabus aureis impressis, thorace punctato.*

*Buprestis fusco-ænea: elytris maculis æneis impressis. Fn. 556.*

*Habitat ad ripas.*

*DESCR.* *Caput, ut in reliquis, maxima ex parte intra thoracem receptum, hinc in hisce torvus adspactus; Oculi pone virescentes, Thorax rubro æneus. Elytra fusco-ænea, singula sulcis quatuor aut quinque exarata, punctis quatuor (in singulis elytris bitis) in figuram quadratam positis, impressis, deauratis. Antennæ setaceaæ, brevissimæ. Abdomen dorso cæruleum.*

756. *BUPRESTIS rustica elytris striatis fastigiatis, thorace punctato.*

*Buprestis*

*Buprestis viridi-aenea immaculata.* Fn. 555.

*A&G. apf. 1736. p. 19. n. 4. Cicindela aenea, elytris striatis.*  
Habitat in sylvis ad aquas.

*DESCR.* Longitudo digiti transversi. *Thorax* viridi-aeneus punctis excavatis, crassus, imo crassitie coleopterorum, caput maxima ex parte intra se recipiens. *Elytra* aenea, minus viridia, immaculata, singula octo circiter striis exarata.

757. *BUPRESTIS nitidula* elytris integerrimis, thorace marginato utrinque depresso, corpore nitidissimo viridi.

Habitat paßim.

*DESCR.* Corpus Cimice paullo magius, viridissimum in quibusdam, *Thorax* rubro-aureus est, in quibusdam concolor, semper depressoculus. *Antennae* nigrae. *Subtus* tota viridis polita nitidior.

758. *BUPRESTIS aenea* elytris emarginatis, punctis excavatis cicatrisantibus: apice striatis.

Habitat paßim.

*DESCR.* Corpus majoris magnitudinis, supra griseo-aeneum, subtus cupri nitidissimi, *Thorax* & *Elytra* inæqualia punctis excavatis confluentibus in cicatrices variolaceas, unde *Elytra* striata sunt, præsertim supra dorsum & ad postica.

759. *BUPRESTIS quadripunctata* elytris integerimis punctatis, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro, *Buprestis atra*, thorace punctis impressis. Fn. 559.

Habitat in subhumidis.

*DESCR.* Hæc species parva est, tota fusca s. atra. *Thorax* a tergo quatuor punctis depresso l. concavis transversim positis notatus. *Antennæ* thorace breviores, filiformes. *Elytra* non striata, sed punctis excavata minutissimis. *Caput* obtusissimum, retropresso.

760. *BUPRESTIS minuta* elytris integerimis transverse rugosis, thorace subtrilobo laevi aeneo.

Habitat in humidis, tacta caput & pedes contrahit uti Dermestes pertinax, nulla tortura se moveans.

*DESCR.* Corpus ovatum, obtusum, magnitudine grani oryzæ, nitidum, nigrum.

761. *BUPRESTIS Tenebrionis* atra elytris, integris lineato-punctatis, thorace varioloſo dilatato.

Habitat apud nos rariſſime.

*DESCR.* Corpus fere Bupr. marianæ, statura *Tenebrionis*, totum triste atrum, *Thorax* fere elytris latior, lateribus rotundatis, superficie cicatricibus varioloſis. *Elytra* vix conspicuis punctis excavatis lineata, nec striata,

762. BUPRESTIS *viridis* elytris integerrimis linearibus, thorace deflexo, corpore viridi elongato.

Habitat in foliis *Betulae albae*, quorum margines exedit.

DESCR. *Corpus* totum viridissimum mediae vel minoris longitudinis, reliquis angustius. *Elytra* non striata, nec nisi atomis confertissime punctata.

763. BUPRESTIS *granularis* æneo-nebulosa, antennis clavatis.

Habitat in agris.

DESCR. Pulice fere minor, subtus tota nigra, supra obscure ænea cum macula fusca in medio dorso, ambo elytra tangente. *Elytra* tenuissime striata. *Thorax* & obliquis sulcis striatus. *Antennæ* clavatae ut *Dermestis*.

## Dytiscus.

\* *Antennis perfoliatis.*

764. DYTISCUS *piceus* antennis perfoliatis, corpore piceo levvi acuminato.

*Dytiscus* antennis perfoliatis fuscis. Fn. 561.

Habitat in aquis.

DESCR. *Corpus* maximum, piceum, lave, postice acuminatum.

765. DYTISCUS *carahoides* antennis perfoliatis, corpore glabro striis aliquot recurvis.

*Dytiscus* antennis perfoliatis nigris, elytris lœvibus. Fn. 562.

Habitat in aquis.

DESCR. Magnitudo media; postice minus acutus.

766. DYTISCUS *fuscipes* antennis perfoliatis, elytris striatis margine lividis, pedibus fuscis.

*Dytiscus* antennis perfoliatis nigris; pedibus fuscis; elytris striatis. Fn. 563.

Habitat in aquis.

DESCR. Hic parvus est.

767. DYTISCUS *luridus* antennis perfoliatis luridus, elytris punctis tribus fusciscentibus, thorace lateribus flavicante.

Habitat in Suecia.

DESCR. Magnitudo Chrysomelæ media, totus luridus. *Caput* æneo-nigrum. *Elytra* striata puncto nigro in medio ad marginem, duobusque obsoletis viis manifestis ad suturam longitudinalem, *Pedes* ferruginei.

\* Antennis setaceis.

768. DYTISCUS *latissimus* niger, elytrorum marginibus dilatatis linea flava. Fn. 564.

*Act. upf.* 1736. p. 14. n. 1. *Dytiscus maximus*; elytris margine prominentibus.

*Frisch. germ.* 2. p. 33. t. 7. f. 1. 2. *Scarabæus aquaticus magnus* niger, margine luteo.

Habitat in aquis.

*DESCR.* Inter nostros maximus est. Margo *Elytrorum*, præsertim a latere medio, admodum prominet flavo colore: apex sterni bifurcus, acuminatus.

769. DYTISCUS *marginalis* niger, thorace elytrorumque margine flavis. Fn. 565.

*Aldr. inf.* p. 707.

*Mouff. lat.* p. 164. fig. bona.

*Raj. inf.* p. 93. n. 1. *Hydrochantharus nostras.*

*List. mut.* t. 5. f. 2.

Habitat in aquis frequens.

*DESCR.* Totus niger, levigatus; in vertice linea lunularis s. anguli obtusus rubens. Thorax cingitur luteo margine. Elytra margine exteriore flava, duabus striis vix manifestis longitudinalibus e punctis minutissimis notata. Umbra flava vix manifesta versus apices elytrorum. Apex sterni bifurcus.

770. DYTISCUS *striatus* fuscus, elytris transverse subtilissime striatis.

Habitat in aquis frequens.

*DESCR.* *Gerus* mediae magnitudinis. *Elytra* adeo tenuibus transversis confertissimis striis, ut vix armato oculo conspicantur.

771. DYTISCUS *cinereus* cinereus: margine elytrorum thoracisque medietate flavis. Fn. 566.

*Hoffn. inf.* 2. t. 12.

*List. mut.* t. 5. f. 1.

*Raj. inf.* 94. n. 3. *Hydrochantharus minor*, corpore rotundo plano.

Habitat in aquis; an sexu solummodo a præcedenti diversus?

*DESCR.* Magnitudo maxima musca. Thorax flavus margine anteriore & posteriore (non lateribus) nigro. Elytra cinerea punctis minimis confertis lutescentibus seu subdiaphanis: margo exterior elytrorum flavescens, in Vertice macula cordata flava marginibus nigris. Sterni apex bifurcus, obtusus.

772. DYTISCUS *semistriatus* fuscus, elytris feminæ sulcis dimidiatis decem villosis.

*Dytiscus* elytris striis viginti dimidiatis. *Fn.* 567.

*Bradl. nat.* 1. 26. f. 2. l. A.

*Raj. inf.* p. 94. n. 2. *Hydrocantharus* elytris striatis s. canaliculatis.

*Frisch. germ.* 2. p. 35. t. 7. f. 4.

Habitat in aquis stagnantibus praesertim.

*DESCR.* Elytra profunde striata s. sulcata, sed non secundum totam longitudinem, reliquo spatio laevi vertus apicem; striæ haec & elytra glabra sunt; margo elytrorum pallidus; in singulo elytro decem striæ.

772. *Dytiscus* supra fuscus, subtus ater. *Fn.* 568.

Habitat in aquis.

*DESCR.* Est inter minores, totus laevissimus; *Apex sterni* bifurcus, obtusus.

773. *DYTISCUS sulcatus* elytris sulcis decem longitudinalibus.

*Fn.* 569.

*Raj. inf.* 94. f. 3. *Hydrocantharus minor*, corpore rotundo piano.

Habitat in aquis. *Malmborg.*

*DESCR.* Est inter minores, & penultima longe minor. Thorax niger, margine & linea transversa flava. Elytra nigra, singula quatuor vel quinque sulcis latis longitudinaliter excavata, & pilis griseo-cinerea, interacentibus marginibus nigris glabris. *Apex sterni* bifurcus est.

774. *DYTISCUS erythrocephalus* ovato-oblongus niger, capite pedibusque rufis. *Fn.* 570.

Habitat in aquis stagnantibus, agilis valde.

*DESCR.* Magnitudo seminis oryzae, supra laevis, niger. Caput, exceptis oculis, rufum, Pedes rufi, Antennæ nigrae.

775. *DYTISCUS palustris* niger laevissimus, elytris lituris duabus lateralibus albidis.

Habitat in Aquis.

*DESCR.* Magnitudo minor *D. erythrocephalo*. Totus niger, nitidus, at liturae flavo-exalbidæ flexuosa ad elytrorum marginem exteriorem; una in medio, altera vel versus apicem vel versus basin marginis lateralis.

776. *DYTISCUS uliginosus* ater nitidus, antennis pedibus elytrorumque latere exteriore ferrugineis.

Habitat in Aquis.

*DESCR.* Corpus vix Cimicem superans, ovatum, atrum, glaberrimum, adpersum punctis excavatis obsoletis. Elytra marginè laterali ferruginea. Pedes & Antennæ rufæ.

777. *DYTISCUS maculatus* ovatus niger, thorace nigro fascia pallida, elytris albo maculatis.

Habi-

Habitat in aquis.

DESCR. *Corpus* magnitudine seminis Cucumeris. *Thorax* pallidus, ante & postice nigricans. *Elytra* fusca striis longitudinalibus pallidis & nonnulis maculis pallidis versus latera;

778. DYTISCUS *minutus* elytris fuscis basi lateribusque pallidis, thorace flavo immaculato, corpore ovato.

Habitat in fontibus & rivulis.

DESCR. *Corpus* magnitudine seminis cuccumeris. *Thorax* pallidus. *Elytra* cinerea lateribus pallidis aliquot & obliquis.

\* *Antennis clavatis*

779. DYTISCUS *Natator* ovatus glaber, antennis capite brevioribus obtusis. Fn. 572.

Merr. pin. 203. *Pulex aquaticus*.

Pet. gaz. p. 21. t. 13. f. 9. *Scarabaeus niger nostras supra aquam velociter circumnatans.*

Raj. inf. p. 87. n. 9. *Scarabaeus aquaticus subrotundus e cæruleo viridi colore splendente undique tinctus.*

*Smolandis Watten-bagge.*

Habitat in aquis, super quas currit vel natat citissime, citosque gyros & orbes conficit, lacefitus etiam aquam subit.

DESCR. Noster niger omnino est. *Pedes* autem flavi, lati, brevissimi. *Antenne* clavatae vel certe non versus apicem angustiores, nec quantum video, fissæ,

Carabus.

\*\* *Majores.*

780. CARABUS *intricatus* violaceo-niger, elytris intricatis elevato-striatis punctatisque.

Habitat in Suecia & Germania.

DESCR. *Elytrorum* striae & puncta elevata, ita inter se connexa, ut vix distinete discerni queant. Distinguitur a *C. coriario*, quod nulla sint in coriario signa striarum.

781. CARABUS *granulatus* apterus, elytris longitudinaliter convexe punctatis.

*Carabus ater*; elytris convexe punctatis striatisque. Fn. 511.

Hoffn. inf. 2. t. 3.

Habitat in lignis putridis; citissime currit; odorem olei tabaci spargit.

DESCR. *Caput* parvum. *Oculi* prominentes. *Antennæ* fetaceæ, articulis undecim, longitudine dimidii corporis. *Os maxillæ* prominens; maxilla

læ inferiores majores, arcuatæ, acutæ, ad basin denticulo armatæ a latere interiore. Maxillæ inferiores acuminatæ, arcuatæ, denticulo ad basin interne, etiam instructæ. Palpi maxillares superiores singulæ tribus articulis constant, extimo reliquis crassiori: hæ antennulae maxillis triplo longiores sunt: antennulae maxillares inferiores unico articulo constructæ, nec maxillis longiores. Oris labium superius obtuso-emarginatum, Thorax ater, a tergo convexus, levisculus, margine laterali prominente versus basin angulato; a parte pectoris thorax compressus cartilagine ensiformi vel scutello versus abdomen. Elytra ovata, arcta, atra, margine exteriore elevata, aut dilatata; in singulo elytro tres ordines longitudinales punctorum elevatorum, ovatorum, singulo ordine duodecim communiter punctis: Abdomen glabrum, uti totum corpus; Femora teretiuscula: Tibiæ ad apicem duabus seris terminatae.

**B** *Carabus niger*, elytris subvirescentibus convexe punctatis striatisque. Fn. 512.

Habitat inter quisquilias.

DESCR. Magnitudo, statura, odor & omnia ut in præcedente, sed Elytra e nigro subvirescentia; an sexus differentia?

**γ** *Carabus niger*, elytris æneis convexe punctatis striatisque. Fn. 513.

Habitat inter ligna putrida.

DESCR. Omnia ut in primo, sed elytra, thorax & caput a tergo æneas.

782. *CARABUS clatratus* apterus nigricans, elytris porcasitis interjectis punctis excavatis longitudinalibus.

Habitat in putridis.

DESCR. Corpus majoris magnitudinis, nigrum. Elytra singula sulcis tribus latis, in quibus puncta oblonga, elevata; porcas sulcos distinguentes acuto dorso sunt.

783. *CARABUS hortensis* apterus, elytris punctis æneis excavatis triplici serie.

*Carabus purpurascente-niger*, elytris concave punctatis striatisque. Fn. 514.

Raj. inf. p. 96. n. 2. *Cerambyx purpurea* punctata.

Lift. mut. t. 18. f. 4.

A&T. upf. 1736. p. 19. n. 1. *Carabus niger*, elytris sulcatis punctatis.

Habitat inter putrida vegetabilia.

DESCR. Omnia ut in præcedentibus. Elytratribus ordinibus longitudinalibus punctorum excavatorum, rotundorum, singulo ordine duodecim punctis conitante; Lineæ longitudinales puncta distinguentes etiam concavæ sunt.

784. *CARABUS leucophtalmus* apterus, elytris lævibus: striis obsoletis octo.

*Carabus ater*, elytro singulo striis octo. Fn. 515.

Lift.

*Lift. logu.* 390. *Scarabæus ex toto niger, alarum thecis crustaceis sulcatis.*

Habitat cum præcedentibus.

DESCR. Forma & fere magnitudo cum præcedentibus convenit. Color in toto corpore niger: *Elytra* simul sedecim striis longitudinalibus, parallelis.

785. *CARABUS nitens* apterus, elytris porcatis: striis paucim interruptis sulcisque inauratis scabriusculis.

*Carabus viridis*, elytris obtuse sulcatis absque punctis, pedibus antennisque ferrugineis. *Fn.* 517.

*Aet. apf.* 1736. p. 19. n. 3. *Carabus viridis*; elytris sulcatis lœvibus.

Habitat in Oelandia.

DESCR. Omnia ut in præcedentibus, sed totus viridis est, parum ad cæruleum vergens; *Elytra* fulcis tribus latis, obtusis, longitudinalibus, absque ulla interiectis punctis; fulci s. canales elytrorum vividissime e sericeo virent, sed convexitates magis obscuræ sunt, non tamen nigrae, sed potius magis cæruleæ. *Pedes & Antennæ* in aliis ferruginea s. testacea; totum corpus viridi nitens.

β *Carabus niger*, elytris viridibus obtuse sulcatis, pedibus antennisque nigris. *Fn.* 518.

*Raj. ins.* 96. n. 6. *Cerambyx* dorso in longas rugulas divisio, omnium pulcherrimus.

*It. æl.* 96. *Scarabæus niger*, elytris viridibus obtuse sulcatis, pedibus antennisque nigris.

DESCR. Magnitudo & facies omnino præcedentis. *Corpus* totum nigrum subtus, cum antennis & pedibus. *Caput, thorax, elytra supra* viridi nitentia; *Elytra* singula fulcis 3 vel 4 rugosis exarantur pulcherrime viridi-sericeis, interiacentibus convexitatibus nigris. *Margo elytrorum exterior ignei coloris* est; *Antennæ* breves. Adeoque differt a priori corpore atro, pedibus antennisque nigris; antennis dimidio brevioribus, fulcorum, in elytris, intersticis nigris angustioribus.

786. *CARABUS auratus* apterus, elytris porcatis: striis sulcisque lœvibus inauratis.

Habitat in Suecia.

DESCR. *Similis Carab. nitenti, sed major; Colore itidem aurato supra. Elytra* porcata porcis non interruptis, nec nigris, sed lœvibus, sulcis etiam lœvibus nec punctato scabridis.

787. *CARABUS violaceus* alatus, elytris lœviusculis nigris margine aureo, thorace subviolaceo.

*Carabus violaceo-niger*, elytris lœvibus subrugosis. *Fn.* 516.

*Raj. ins.* p. 96. n. 1. *Scarabæus major*, corpore oblongo e purpura nigricans.

*Frisch. germ.* 13. p. 25. t. 23. *Scarabæus terrestris niger*,  
clypeo thoracis cordiformi marginato.

*Aet. upf.* 1736. p. 19. n. 3. *Carabus nigricans lævis*.

*Lift. mut.* t. 18. f. 5.

Habitat cum præcedentibus.

*DESCR.* Omnia ut in præcedentibus, sed margo thoracis & elytrorum e viola purpurascente cœruleus. *Elytra* & punctis & striis carent; sole rugæ longitudinales & transversales, sed lente visus puncta minutissima, nudis oculis non conspicua.

788. *CARABUS cephalotes apterus*, elytris atris lævibus, thorace exerto oblongo.

*Frisch. inf.* 13. p. 25. t. 22.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* *Corpus* majoris magnitudinis, atrum, læve. *Thorax* obovatus, lævis, vix marginatus, postice rotundatus. *Elytra* non striata.

789. *CARABUS Inquisitor* elytris striatis viridi-æneis: punctis triplici ordine.

*Roland. aet. Holmens.* 1750. p. 292. t. 7. f. 3.

Habitat in Sylvis, cursitans per plantas noctu, insecta legens.

*DESCR.* *Corpus* simillimum sequenti, sed dimidio minus, supra viridi aureum, subtus fusco-virescens. *Elytra* subtilissime striata & triplici ordine punctorum obscurissimorum notata.

790. *CARABUS Sycophanta* aureo-nitens, thorace cœruleo, elytris aureo-viridibus striatis, abdомине subatro.

*Reaum. inf.* 2. t. 37. f. 18.

*Robert. ic.* t. 20. f. 2.

Habitat in Arboribus, ubi noctu devorat larvas Lepido-pterorum.

*DESCR.* *Corpus* majus, quam in ulla alia Specie nostratum. *Antennæ* & *Pedes* nigri. *Thorax* cœruleo-æneus. *Elytra* æneo aurea striis numerosissimis. *Subtus* ater, parum virescens.

\* \* Minores.

791. *CARABUS lividus* thorace ferrugineo, elytris nigris: lateribus lividis.

Habitat inter folia decidua,

*DESCR.* *Corpus* majus mediocribus, nigrum. *Antennæ*, *Thorax* & *Pedes* pallide ferruginea. *Elytra* nigra latè limbo s, margine lateribus exteriores & politis cincta.

792. *CARABUS crepitans* thorace capite pedibusque ferrugineis, elytris cœrulecenti-nigris.

Habitat in nemoribus.

*DESCR.*

*DESCR.* *Corpus* e mediis minus, ferrugineum. *Elytra* nigro-cætulecentia, vix manifeste e cæruleo nitentia. *Thorax* congeneribus angustior. *Abdomen* fuscum. *Tibiae* postice latere postico atrocærulecentes.

793. *CARABUS spinipes* piceus, thorace linea excavata longitudinali, manibus spinosis.

Habitat in Sylvis.

794. *CARABUS cyanocephalus* thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis.

*Carabus* capite elytrisque cæruleis, thorace rubro. *Fn.* 525.

*Raj. inf.* 89. *Cantharis* s. *Scarabæus* *exiguus*, elytris & capite cæruleis, scapulis croceis.

Habitat in Campis.

*DESCR.* Est insectum vix Culice vulgari majus. *Caput* cætuleum. *Elytra* saturate cærulea, nitida, vix striata. *Thorax* ruber. *Antennæ* maxima parte nigrae. *Pedes* ex rubro & nigro varii.

795. *CARABUS melanocephalus* thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris.

*Carabus* capite elytrisque atris, thorace rubro. *Fn.* 526.

$\beta$  *Carabus niger*, thorace antennis pedibusque ferrugineis. *Fn.* 524.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Magnitudo proxime precedentis, & facies eadem: sed *caput*, nigrum. *Elytra* atra, striata. *Thorax* ruber. *Pedes* & *Antennæ* omnino unicolores, ferrugineæ,

796. *CARABUS vaporiarorum* thorace fusco, pedibus antennis elytrisque antice ferrugineis.

*Carabus* ater; elytris antice griseis. *Fn.* 529.

Habitat in vaporariis horti academici.

*DESCR.* Est inter minimos bujus generis, vix pediculo duplo maiore tortis ater: *Elytra* ad basin ante medietatem grisea, ut & futura longitudinalis grisea.

797. *CARABUS meridianus* thorace nigro, pedibus antennis que ferrugineis, elytris fuscis basi futuraque flavescentibus.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Magnitudo Pediculi. *Corpus* nigrum. *Antennæ* & *Pedes* fuscæ ferruginea. *Elytra* basi albida; futura longitudinalis testacea.

798. *CARABUS ferrugineus* ferrugineus, thorace glaberrimo.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* *Corpus* minoris magnitudinis; totum ferruginosum. *Thorax* glaberrimus, politus. *Elytra* striata. *Pedes* & *Antennæ* pallidiores,

222 INSECTA COLEOPTERA. CARABUS.

799. CARABUS *vulgaris*, nigro-æneus, pedibus antennisque nigris. Fn. 525.

ꝝ Carabus ater, pedibus antennisque nigris. Fn. 530.  
Habitat in ligno putrido. P. Kalm.

DESCR. Magnitudo & facies præcedentis, ex nigro æneus. Thorax atrior nitidior, punctis duobus concavis, obsoletis. Elytra striata, sed extrema stria elytrorum ferrata. Thorax postice latitudinem elytrorum attingit. Variat punctis impressis in elytris, & non impressis. Antennæ ad basin sœpe griseæ; subtus niger est hic Carabus.

800. CARABUS *cærulescens* viridi-cæruleus, antennis basi rubris.

ꝝ Carabus supra æneus, coleopteris punctis sex excavatis, tibiis rufis. Fn. 520.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 8. Buprestis capite nigro, collaris elytrisque nigro-æneis.

Habitat apud nos frequentissimus in pratis.

DESCR. Magnitudo circiter muscae domesticæ. Color totius animalculi a tergo viridi rubroque fusco-æneus. Elytra striata singulis tribus punctis longitudinalibus impressis. Femora nigra: tibiæ rufæ. Antennæ ad articulos inferiores tribus setis armatae.

801. CARABUS *cupreus* æneus, antennis basi rubris.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Corpus nigrum, magnitudine fere præcedentis, sed supra capite Thorace & elytris ænei coloris. Antennarum primus articolus sœpius tuber est.

802. CARABUS *piceus* niger, pedibus antennisque piceis.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Corpus Pediculo plus duplo magis, nigrum, minime nitidum. Pedes & Antennæ fere piceæ. Elytra fusco-nigra.

803. CARABUS *velox* nigricans, pedibus tibiisque pallidis. It. gotl. 207. Fn. 522.

Habitat in arena riparia maritima insulæ Fåroen in Gotlandia; currit & volitat velocissime & promissime inter omnia coleoptera.

DESCR. Musca domestica minor. Caput, Thorax & Elytra (quæ striis octo sunt) e cupro nigra. Pedes nigri, exceptis mediis tibiis pallidis.

804. CARABUS *marginatus* niger, elytris margine flavis.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Corpus torum viridissimum. Antennæ nigrae, Thoracis marginis manifeste ferrugineus. Elytra vix manifeste striata margine exteriori omnino flavo. Variat capite thoraceque æneis.

805. CARABUS *multipunctatus* subæneus, elytris punctis vagis plurimis impressis.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Corpus mediæ magnitudinis, nigrum, glabrum, subtus tubæneum. Thorax linea longitudinali excavata. Elytra margine laterali subænea, disco striata & adspersa punctis majoribus obtusis impressis.

806. CARABUS *bipunctatus* subæneus, elytris punctis duobus impressis.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Corpus vix pediculo majus, nigrum, at supra sunt Caput, Thorax & Elytra ænea. Elytra notantur punctis duobus impressis: altero anterius, altero posteriorius.

807. CARABUS *sexpunctatus* subæneus, elytris punctis longitudinalibus sex impressis.

Carabus nitens, capite thoraceque cyaneo, elytris purpureis. Fn. 519.

Aet. upf. 1736. p. 20. n. 6. Buprestis capite collarique cæruleo, elytris rubro-æneis.

Bauh. ballon. p. 212. f. 4. Cantharis auricolor.

Gad. belg. 2. p. 126. t. 31.

Habitat fat frequens Upsaliæ.

DESCR. Est magnitudine muscæ, sed angustior, atri instar fulgentissimi nitens. Caput & Thorax nitet ex viridi-cæruleo: Elytro ignei coloris, vel cupri japonici, striis nudis oculis vix manifestis, plurimis, margine laterali extimo cyaneo; subtus fusco-æneus; puncta in singulo elyro 6, longitudinaliter, inter secundam & tertiam striam a sutura, impressa. Abdomen e fusco nitet. Thorax postice angustior.

808. CARABUS *Crx major* thorace capiteque nigro rubescente, coleoptris ferrugineis cruce nigra.

Chrysomela thorace nigro, coleoptris rubris; cruce nigra. Fn. 439.

Habitat in Plantis.

DESCR. Statura Chrysomelæ, nigra. Thorax orbiculatus, convexus, pubescens. Coleoptra lutea, basi, apice & sutura nigra; fascia dein in medio lata nigra. Alienus est ab hoc genere ob pubescentiam & thorace in orbiculatum, nec succurrit aliud, cui aptius inseratur.

809. CARABUS *Crx minor* thorace luteo glabro, elytris postice nigris: maculis duabus flavis.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Corpus duplo majus pediculo, nigrum. Caput nigrum. Thorax & Pectus ferrugineo-lutea. Elytra antice lutea, postice atra cum macula rotunda lutea ad basin. Pedes lutei. Thorax etiam fere orbiculatus.

810. CARABUS *ustulatus* thorace nigricante, elytris obscuris bifasciatis.

*Carabus niger*, coleoptris postice fascia ferruginea, lateribus macula ferruginea: Fn. 528.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. *Corpus* duplo majus Pediculo; nigrum. *Pedes* ferruginei. *Elytra* nigra, postice una alterave obscura fascia: non raro etiam macula pallida versus basin in exteriore parte elytri.

811. CARABUS *quadripustulatus* alatus, capite ferrugineo, thorace atro, coleoptris nigris: maculis 4 flavis.

Habitat in Suecia. *De Solander.*

DESCR. Magnitudo vix muscae domesticæ. *Caput* e flavo ferrugineum. *Palpi* castanei. *Antennæ* longitudine thoracis, obtusiuseulæ, basi ferruginea, in thedio fusæ, apicè flavescentes. *Thorax* ater, lævis, postice latior. *Elytra* striata, nigra maculis duabus flavis: anteriore prope basin majore; posteriore pone medium transversali. *Subtus* flavus margine bdominis nigro. Alæ nigricantes, elytris duplo longiores.

Elytrorum declivitas & Antennæ obtusiuseulæ primo intuitu a Catabis alienum reddunt.

812. CARABUS *testaceus* pallide testaceus, elytris glabris. Fn. 523.

Habitat in Roslagia.

DESCR. Mediæ magnitudinis. *Elytra* absque punctis & striis. *Antennæ* filiformes.

813. CARABUS *quadrimaculatus* thorace flavo, elytris obtusifuscis fuscis: maculis duabus albis.

*Carabus niger*, thorace ferrugineo, elytrorum maculis quatuor lividis.

Habitat in Scania. *J. Leche.* in Uplandia. *L. Klase.*

DESCR. Pediculo duplo major. *Caput* nigrum. *Thorax* rufus s. ferrugineus. *Elytra* singula basi livida macula ovata (quæ in utrisque interdum coit) & alia macula in singulo elytro juxta apicem livida ovata (interdum undique distincta nigredine ipsius coleoptri). *Pedes* ferruginei s. pallidi macula fusca ad flexuram alæ; *Antennæ* ferrugineaæ.

814. CARABUS *trunctellus* niger supra subæneus, elytris apice subtruncatis.

Habitat rarius in Suecia.

DESCR. Parvus, vix Climice major. *Elytra* substriata; apice oblique trunca.

## Tenebrio.

815. TENEBRI<sup>O</sup> *Molitor* totus niger.

Mor.

Mordellä antennärum articulis lentiformibus: ultimo globo. *Fn. 547.*

*Aet. apf. 1736. p. 19. n. 1.* Attelabus ater oblongus depresso.

Habitat Larvæ pallida glabra in farina pistorum, inque Panæ martio & militari, in quo sæpe haret per duos annos antequam mutetur, ipsa Lusciniis gratissimus cibus.

*DESCR.* Longitudo digiti transversi. Tonus niger est, colore omnino piceis. Elytra parum striata. Thorax margine prominulo. Antennæ breves, obtuse & quasi moniliformes, uadecim articulis (exceptis tribus primis longiusculis) lenticiformibus; nigris, ultimo globoso, pallidiore. Os, antennæ, marco thoracis, pedes ferrugineo-astra sunt.

### 816. TENEBRIÖ *culinaris*, ferrugineus, elytris striatis.

Mordella ferrugineo-rufa, thorace antice depresso. *Fn. 546.*

Habitat in Scania. D. Leche.

*DESCR.* Non salit; magnitudo mediocris Carabi, & facies. Antennæ longitudine thoracis, ultimo globoso. Caput minimum. Thorax laevis, supra in parte antica retusus vel depresso; Hoc tamen in majoribus si facinis obtinet. Elytra singula & itriis crenata s; punctis exarata;

### 817. TENEBRIÖ *Fosfor* piceus, digitis anticis palmato-digitatis.

Mordella rufa, tibiis anticis dentatis. *Fn. 543.*

Habitat in collibus arenosis, quos petfodit; inque fagis prætridis.

*DESCR.* Corpus cimice longius, fuscum. Thorax nigra, glaber linea longitudinali; spatio distans ab elytris. Elytra picea, striata. Pedes & Antennæ ferrugineo-piceæ. Palmae antice instar Gryllotalpæ fissæ in digitos & spinas laterales;

### 818. TENEBRIÖ *Cursor* fuscus, thorace oblongo: angulis quinque denticulatis.

Habitat in vegetabilibus computrescentibus.

*DESCR.* Corpus magnitudine pediculi, oblongum, depresso, nigricans; Thorax margine denticulatus, ut in cerambyce 2:di ordinis; adeoque facie distinctissimus a Tenebrionibus.

### 819. TENEBRIÖ *erraticus* nigra, antennis thorace orbiculato elytrisque ferrugineis, elytris apice fuscis.

Habitat non infrequens, apud nos.

*DESCR.* Antennæ ferrugineæ; thorace longiores articulis lenticiformibus; Caput, Thorax & pectus nigra, Thorax suborbiculatus, depresso, antice obtusior, non marginatus. Elytra oblonga, striata, ferruginea; apice fuscescentia. Abdomen ferrugineum;

### 820. TENEBRIÖ *pallens* pallide testaceus.

Carabus pallide testaceus, oculis nigris. *Fn. 531.*

P.

Habi-

Habitat in terra primo vere.

*DESCR.* Totus pediculi majoris longitudine, teretiusculus, opacus, unicolor, pallidus ad testaceum vergens colorem, exceptis oculis nigris: minime striatus.

821. TENEBRI<sup>O</sup> *quisquilius* alatus, pedibus ferrugineo-piceis.

Habitat Calmariæ. *A. Modeer.*

*DESCR.* Corpus nigrum, magnitudine cimicis, opacum. Pedes piceo-ferruginei.

822. TENEBRI<sup>O</sup> *mortisagus* apterus, coleoptris mucronatis.

Tenebrio atra, coleopteris pone acuminatis. *Fn. 594.*

*Aldr. inf. p. 499.*

*Mouff. lat. p. 138. f. 139.* Blatta foetida tertia.

*Charl. exerc. p. 48.* Blatta foetida.

*Zonst. inf. t. 16.*

*Merr. pin. 202.* Blatta foetida.

*Pet. gaz. p. 38. t. 24. f. 7.* Scarabæus impennis tardipes.

*List. loqu. p. 383. n. 21.* Scarabæus e toto niger minime nitens foetidus?

*Raj. inf. 89.* Scarabæus niger rotundus lævis, antennis globosis.

*Frisch. germ. 13. p. 27. t. 25.* Scarabæus terrestris & stercorearius niger foetidus.

*Dal. pharm. p. 91.* Blatta officinarum.

*It. xl. 62.* Tenebrio primus.

*Suecic Skrobbæ.*

Habitat inter quisquilias hortorum & agrorum; credulum vulgus intra domos hunc ambulantem observantes mortis nuncium esse sibi perivadet.

*DESCR.* Totus ater & omnino piceus est. Elytra secundum longitudinem totam connata. Alæ nullæ. Antennæ longiusculæ, articulis lenticiformibus, ultiuo globose, saepe terminantur Elytra apicæ, in dorso, rimula Thorax marginatus, punctatus. Elytra rugosa.

823. TENEBRI<sup>O</sup> *rostratus* apterus niger, elytris læviusculis uniangulatis, thorace angustiore, capite angustissimo.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Totus ater, punctis vix conspicuis confertissimus, laterum apicibus nec carinatis præterquam latere. Thorax Carabi, valde angustus & Caput angustissimum.

824. TENEBRI<sup>O</sup> *gibbus* apterus niger lævis, thorace postice rotundato.

Habitat in quisquiliis.

*DESCR.* Magnitudo T. mortisagæ minor; valde convexus, undique lævis

vis, nec punctatus aut fulcatus, etiam lateribus. Thorax postice rotundatus parum truncata basi.

825. TENEBRI. *Caraboides* apterus, thorace ovali marginato, coleoptris carinatis.

Tenebrio atra, coleoptris pone rotundatis; maxillis prominentibus. Fn. 595.

Frijch. germ. 13. p. 27. t. 22.

Habitat in Quisquiliis.

DESCR. Minor. Thorax ut in Carabis. Femora clavata, Maxillæ capitis longitudine, cum in praecedenti breviora.

## Meloe.

826. MELOE *Proscarabæus* apterus, corpore violaceo. Fn. 596.

Mouff. lat. 164. f. med. Proscarabæus.

Jonst. inf. p. 74. t. 15. Proscarabæi fæmina.

Charl. exere. p. 46. Proscarabæus f. anti-Cantharus.

Hoffn. inf. 2. t. 9.

Merr. pin. p. 201. Proscarabæus.

Wagn. helv. p. 234.

Ged. belg. 2. p. 152. f. 42.

List. gæd. p. 292. f. 120.

loqu. Scarabæus mollis ex nigro viola nitens.

Frisch. germ 6. p. 14. t. 6. f. 5.

Dal. pharm. 5. p. 361. Proscarabæus.

Schræd. pharm. 5. p. 345. Chantharus unctuosus.

Habitat ad margines agrorum & in collibus soli expositis  
menise Majo. Edit *Anemone*, *Ranunculum* tactus oleum  
limpidissimum ex omnibus pedum geniculis emitit.

DESCR. Totum animal molle est & atrum; pedes, antennæ, abdomen  
paulo magis violacea. Elytra coriacea, mollia, rugosa, minime nitida.  
Antennæ moniliformes; in fæmina abdomen longius elytris. Alæ nullæ.

827. MELOE *vesicatorius* alatus viridissimus nitens, antennis nigris.

Cantharis officinarum. It. scan. 186.

Mouff. inf. 144. Cantharides.

Aldr. inf. 276. Cantharis major.

Jonst. inf. 76. t. 7. Cantharis major.

Raj. inf. 101. Cantharis vulgaris officinarum.

Habitat in Scania campestris extrema in *Ligustrum*, *Fraxini* excelsioris, *Sambuci*, *Lonicerae* foliis.

Vesicatoria celeberrima in omnibus officinis Europæis nomine *Centha*,  
*ridis*; veterum Cantharis vero Meloe cicoriæ.

§28. MELOE *bimaculatus* alatus niger, coleoptris luteis: maculis duabus nigris posticis.

*Uddm. diff. 32.* Cerambyx ater, elytris fusco-flavis maculis duabus nigris.

Habitat Upsaliæ rarius, primo vere, in fossis arenosis siccis.

DESCR. *Corpus* magnitudine & fere statura Lepturæ, atrum. *Antennæ* longitudine fere corporis. *Thorax* rotundatus, subpubescens. *Elytra* mollia, lutea, in parte postica macula nigra rotunda. *Feminae abdomen* subtus postice flavescens.

§29. MELOE *antherinus* alatus niger, elytris fasciis duabus ferrugineis.

Tenebrio pedicularius. *Syst. nat. 10. p. 418. n. 7.*

Habitat in floribus frequentior.

DESCR. *Corpus* magnitudine pediculi, nigrum. *Coleoptera* fascia una ferruginea obsoletiore ad basin, altera pone medium. *Thorax* subglobosus, niger.

§30. MELOE *floralis* alatus niger, elytris maculis duabus obsoletis.

Habitat in *Cardui* floribus frequens.

DESCR. *Corpus* statura precedentis, & simillimum, sed *Thorax* glaber, rimus & *Elytra* fulca maculis duabus, ovatis, transversis, pallidis, altera priore, altera posteriore, neutra marginem elytri tangente.

### Mordella.

§31. MORDELLA *paradoxa* antennis pectinatis, thoracis lateribus elytrisque testaceis.

Habitat Calmariae. *Modeer*; in Germania. *Schreber.*

DESCR. *Caput* nigrum. *Antennæ* longitudine thoracis, simplici serie pectinatae, atrae. *Thorax* gibbus: postice trilobus, lobis latefalibus testaceis; dorso lacuna profunda lata excavatus. *Scutellum* nullum. *Elytra* Lepturæ, testacea, postice attenuata, apice nigra, thoracis *Laminae* affixæ nigrae. *Alæ* fulceæ. *Abdomen* testaceum: primo segmento margine nigro & ano nigro. *Pedes* nigri. *Magnitudine* nostrates reliquas superat.

§32. MORDELLA *aculeata* atra, ano spina terminato.

Mordella oblonga atra, cauda aculeo terminata. *Fn. 534.*

*Aet. upf. 1736. p. 15. n. 1.* Mordella cauda aculeata.

Habitat communiter in floribus Hieraciorum.

DESCR. Magnitudo seminis foeniculi. *Tota* atra, glabra, oblonga. *Caput* parvum, inflexum. *Elytra* oblonga, atra, non striata. *Thorax* glaber, convexis. *Antennæ* testacea, truncate, articulatae. *Corpus* versus caudam sensim angustius. *Abdomen* compressum, desinens in aculeum s. spinam tubulatam, acutam, nigram, elytris longiore, minime punctatam. *Pedes* longiusculi, quibus saltat. *Variat* & elytris fascia una alterave canescente.

§33. MORDELLA *bumeralis* atra, lateribus thoracis baseosque elytrorum flavescentibus.

Habitat in floribus.

DESCR. Statura & magnitudo præcedentis, etiam aculeo cauda exserto. Caput flavum. Thorax flavesiens, medio nigricans. Elytra basi ferruginea.

§34. MORDELLA *frontalis* atra, fronte pedibusque flavescentibus.

Habitat in Floribus.

DESCR. Magnitudo sequentium, s. diuidio minor duabus præcedentibus, nigra; Frons flava & Pedes præsertim anteriores.

§35. MORDELLA *thoracica* nigra, capite thoraceque flavis.

Habitat in Floribus.

DESCR. Corpus nigrum, duplo magius Pulice. Caput, Thorax & Pedes flavescentes. Elytra fusca.

§36. MORDELLA *flava* *flava*, abdomine elytrorumque apicibus nigris.

Habitat in Floribus frequens.

DESCR. Magnitudo & statura præcedentis. Caput, Thorax, Antennæ & Elytra flava, solis Elytrorum apicibus nigris. Abdomen totum atrum.

## Necydalis.

§37. NECYDALIS *minor* elytris testaceis apice lineola alba, antennis corpore longioribus.

Necydalis elytris apice lineola alba. It. oel. 74. Fn. 597. Act. upf. 1736. p. 38. n. 16. Cimex longus depresso griseus: genubus globosis.

Habitat in sepibus.

DESCR. Caput nigrum. Thorax oblongus, ater, punctis duobus nitidis dorsalibus. Elytra grisea, basi angulata, abdomine diuidio breviora, apice dehiscentia inter se, & singula macula linearis alba apice notata. Alæ feminudæ, ut in hemipteris cruciatæ, nec intra elytra retractæ. Antennæ griseæ, corpore duplo longiores, setaceæ, articulo infimo crasso; secundo minimo; tertio & reliquis oblongis. Pedes grisei. Femora versus apicem valde crassa, clavata. & in eodem loco fere globosa.

Ex antennis esset Cerambyx! ex pedibus Leptura! ex elytris Forficula cum Cerambyce tamen maxime adfinis, licet extrema facie dissimilis.

§38. NECYDALIS *major* elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore brevioribus.

Habitat rarissime apud nos.

DESCR. Præcedenti octuplo major. Antennæ corpore diuidio breviores, nigrae

nigræ, basi ferrugineæ. *Palpi* ferruginei. *Caput* nigrum *Thorax* niger, lateribus puncto elevato obtuso. *Elytra* brevissima, longitudine tantum thoracis, ovata, saturate ferruginea, subvillosa, nitida, marginata. *Abdomen* tipulae, longiusculum, lineare, nigrum, quinque articulis. *Pedus* gibbum, nigricans. *Pedes* ferruginei: posticis apice femorum nigro.

## Staphylinus.

- 839. STAPHYLINUS hirtus hirsutus niger, thorace abdome neque postice flavis. Fn. 601.**

*Act. upf.* 1736. p. 15. n. 1. *Forficula hirsuta*, nigra, nitida: capite, collo, cinguloque ventris flavis.

Habitat in locis arenosis apud nos rarius, in Ost-Frisia vulgarissimum observavimus.

*DESCR.* Magnitudo Bombylii, totus valde hirsutus. *Caput* nigrum. *Thorax* flavus. *Elytra* cinerea. *Abdomen* antice nigrum; postice luteum. *Pedes* nigri, etiam hirsuti.

- 840. STAPHYLINUS murinus pubescens cinereus nigro-nebulosus. Fn. 602.**

Habitat in fimo equino.

*DESCR.* Insectum inter majores, non maximos, numerandum est, oblongum, pubescens, cinereo-æneum, maculis nigris, perlucentibus. *Antennæ* articulis IX. *Caput* depresso. *Os* forcipatum. *Thorax* angustus. *Elytra* brevia, capiti & thoraci concoloria. *Abdomen* fuscum maculis nigris. *Cauda* duabus setis villosis; abdomine presso exente ad caudam duo cornicula mollia, recurva, alba, pellucida.

- 841. STAPHYLINUS maxillosus pubescens niger: fasciis cinnereis, maxillis longitudine capitis.**

*Staphylinus* ater glaber; maxillis longitudine capitis. *Fn. 603.*

*Jonst. inf. t. 17. f. 1. 2. 3. Staphylinus.*

*Mouff. lat. p. 197. Staphylinus.*

*Lift. loqu. p. 391. n. 2. Scarabæus majusculus niger, forcipibus infestis.*

*Raj. inf. p. 109. n. 1. Staphylinus major, totus niger.*

*Act. upf. 1736. p. 15. n. 2. 3. Forficula collari nigro: elytris nebulosis.*

Habitat in sylvis, vicinitat aliis insectis, sub metu caudam reflectit & duas vesiculos cordatas exserit.

*DESCR.* Hic maximus inter nostros est. *Caput* & *Thorax* atra, glabra. *Elytra* atra, (in quibusdam cineritie levè nebulosa) obtusa. *Dorsum* abdominis caudæ concolor. *Pedes* nigri. *Os* duabus maxillis arcuatis duris acuminatissimis simplicibus capite longioribus.

842. STAPHYLINUS *erythropterus* ater, elytris pedibusque rufis. *Fn.* 604.

*Aet. upf.* 1736. *p.* 15. *n.* 6. *Forficula collari nigro*, ventre atro, elytris testaceis.

*Frisch. germ.* 5. *p.* 49. *t.* 25. *Scarabæus rapax*, elytris brevibus.

Habitat in stercore, edit alia insecta.

*DESCR.* Est inter maiores, non maximos, numerandus. *Caput & Thorax nigra*. *Abdomen nigrum* micante puncto deaurato in singulo segmento utrinque. *Elytra & Pedes rufa*. *Antennæ nigrae* basi & apice rufescentes.

843. STAPHYLINUS *politus* niger, thorace elytrisque nigricantibus nitidis.

*Staphylinus niger*, thorace æneo nitido, elytris atro-cæruleis. *Fn.* 605.

*Aet. upf.* 1736. *p.* 16. *n.* 7. *Forficula collari nigro*, ventre atro, elytris cærulescentibus.

*DESCR.* Est e mediis speciebus. *Caput & thorax polita*. *Elytra punctis minutissimis adspersa*. *Antennæ XI. articulis*.

*Variat* in hac specie color thoracis & coleoptri: in aliis thorax æneus, & elytra atro-cerulea; in aliis thorax ater nitidus, & elytra atra.

Differentia specifica essentialis consistit in thorace decem punctis excavatis, sed vix absque lente conspicendi.

844. STAPHYLINUS *rufus rufus*, capite elytrorum abdominisque posticis nigris, femoribus basi nigris. *Fn.* 606.

*Aet. upf.* 1736. *p.* 15. *n.* 8. *Forficula collari testaceo*, elytris ventreque testaceis: apicibus nigris.

Habitat frequens.

*DESCR.* Est hic media magnitudinis. *Rufa* sunt thorax, pedes, abdomen maxima ex parte & elytra antice; *Nigra* vero os, caput, elytra pone & in medio ad futuram, nec non abdominis tria ultima segmenta. *Antennæ fere clavatae*.

845. STAPHYLINUS *lunulatus rufus*, capite elytrorum abdominisque posticis nigris, femoribus totis rufis.

Habitat in Suecia.

*DESCR.* Similis Staph. rufo, sed dimidio minor; nec femora basi nigra.

846. STAPHYLINUS *riparius rufus*, elytris cæruleis, capite abdominalisque apice nigris. *It. gotl.* 173. *Fn.* 607.

Habitat in Gotlandia inter arenam ripariam.

*DESCR.* Magnitudo formicæ nigrae. Totus incarnatus, sed capite & abdominis tria quatuorve ultima segmenta atra; *Elytra tota cœrulea*; *femora incarnata geniculis nigris*. *Antennæ articulis XI*, ovalibus, caput versus angustis, excepto ultimo extrotsum angustato; sunt etiam antennæ pallide apice nigrae. *Maxillæ acutæ*: denticulo laterali interno.

847. STAPHYLINUS *bipustulatus* niger, elytris puncto ferrugineo.

Habitat Upsaliæ rarius. *Kallenberg.*

DESCR. *Corpus* valde oblongum, magnitudine minoris pediculi, omnibus partibus nigrum, *Antennæ* clavatae. *Elytra* brevia, in singuli medie punctum ferrugineum.

848. STAPHYLINUS *lignorum* fuscus, elytrorum sutura ab domine pedibusque ferruginea. Fn. 608.

Habitat in lignis putridis.

DESCR. Magnitudo minimæ formicæ; *Corpus* totum lineare, longiusculum. *Caput* & *thorax* glabra, fusca: *Thorax* versus elytra duobus punctis excavatis notatus. *Elytra* fusca, sed ferruginea ad suturam longitudinalem. *Abdomen* & *Pedes* ferruginei.

849. STAPHYLINUS *subterraneus* niger, elytris antice extrosum flavis, pedibus nigris.

Habitat saepius in Cellis subterraneis.

DESCR. *Corpus* atrum, nitidum, pediculo duplo majus. *Antennæ* filiformes, corpore dimidio breviores. *Elytra* nigra, truncaata, a medietate anteriore, sed latere exteriore, macula magna flavescente. *Thorax* laevis, convexus. *Abdomen* glabrum, elytris duplo longius, apice setis duabus parvis subulatis.

850. STAPHYLINUS *flavescens* ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. Fn. 610.

Habitat Upsaliæ. P. Kalm.

DESCR. Est inter omnes nostros minimus, utpote qui pulicem non exceededit. *Thorax* & *Elytra* late glabra, atra, margine elytrorum anum spectante rufo. *Pedes* testacei. Priori similis, sed quadruplo minor. *Abdomen* fere subulatum.

851. STAPHYLINUS *biguttatus* niger, elytris puncto fulvo.

Habitat in Quisquiliis.

852. STAPHYLINUS *littoreus* niger, elytris antice griseis, pedibus rufis. It. gotl. 173. Fn. 611.

Habitat in *Arena* riparia humida, sub qua cuniculos facit, præfertim in Gotlandia.

DESCR. Magnitudo pediculi: *Abdomen* infra elytra admodum acuminatum, nigrum. *Thorax* niger, lateribus versus basin parum testaceis. *Pedes* longiusculi, testacei. *Elytra* nigra, in medio versus basin grisea, seu macula magna testaceo-fusca, utraque elytra occupante, juxta basin. Os flavum.

853. STAPHYLINUS *sanguineus* niger, elytris sanguineis. Fn. 612.

A&S. upf. 1736. p. 15. n. 12. Forficula nigra, elytris sanguineis. Habi-

# INSECTA COLEOPTERA. STAPHYLINUS 233

Habitat paſſim, vagus.

DESCR. Magnitudo pediculi. *Totus ater, glaber, exceptis elytris sanguineis,*

## 854. STAPHYLINUS *Caraboides* flavus,

*Staphylinus totus testaceus. Fn. 613.*

Habitat in plantis & stercore.

DESCR. Magnitudo antecedentis. *Totus ejusdem coloris seu dilute testaceus aut flavescentis, excepto abdomine, a tergo pone elytra, paulo magis fuscō seu obscuro. Antennæ longiusculæ sunt & facies fere Carabi. Duas setas in cauda nondum vidi.*

## 855. STAPHYLINUS *chrysomelinus* niger, thorace elytris pedibusque subtestaceis. Fn. 614.

Habitat paſſim.

DESCR. Magnitudo pediculi. *Caput nigrum, Thorax glaber, convexus, supra & subtus cereus sive pallide testaceus. Elytra thorace concoloria, sed antice & ad marginem exteriorem nigricantia, postice omnino, uti thorax, colore & glabritie. Pedes magis saturate ferruginei. Abdomen nigrum, pone elytra pilis hispidum. Faccies Chrysomelæ, sed elytra brevia & Abdomen pilosum.*

## 856. STAPHYLINUS *flavipes* niger, elytris antennis pedibusque ferruginea. Fn. 615.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Pediculo dimidio minor, oblongus, niger, sed *Elytra ferruginea, & Antennæ & Pedes minus ferruginea, quam elytra.*

## 857. STAPHYLINUS *fusipes* niger, elytris tibiisque fusca. Fn. 616.

Habitat in Scania.

DESCR. Pediculo fere major. *Totus ater, glaber. Elytra fusca: tibie flavescentes, non vero Femora. Thorax, caput & maxillæ ratione magnitudinis insignes.*

## 858. STAPHYLINUS *rufipes* ater glaber, pedibus rufis. Fn. 609.

*Act. upf. 1736. p. 15. n. 10. Forficula tota atra.*

Habitat paſſim.

DESCR. Magnitudo formicæ. *Totus ater, glaber, exceptis rufis pedibus; nec thorax, nec elytra punctata. Os flavescentis. Caput & Antennæ nigrae. Abdomen glabrum a tergo.*

## 859. STAPHYLINUS *Boleti* fuscus, elytris pallidioribus, antennis pedibusque lividis.

Habitat in *Boleti* poris.

DESCR. Magnitudo Pulicis. *Corpus fuscum. Elytra & Cauda magis pallide fusca. Pedes & Antennæ foliæ pallidæ.*

## Forficula.

860. FORFICULA *Auricularia* elytris apice albis. Fn. 599.  
*Mouff. lat. p. 171. f. infim. Forficula s. Auricularia vulgaris.*  
*Fonst. inf. t. 16. f. 2. Forficula.*  
*Merian. europ. gall. t. 30.*  
*List. mut. t. 31. f. A.*  
*Logn. p. 391. n. 25. Scarabæus subrufus, cauda forcipata.*  
*Pet. gaz. t. 74. f. 5. Forficula vulgaris.*  
*Frisch. germ. 8. p. 31. t. 15. f. 2. mas. I. fæmina. Vermis auricularis.*  
*Act. upf. 1736. p. 15, n. 4. & 6. Forficula mollis cinerea, cauda forcipata. (Larva?)*  
*Sueci. Twestiert, Oernmask.*  
*Habitat in terra prægnanti.*  
*DESCR. Insectum oblongum. Antennæ setaceæ, longæ, tredecim vel quatuordecim articulis. Clypeus Thoracis planus; antice truncatus, pone rotundatus, pallidus, in medio niger. Elytra pallide rufa. Alæ extra elytra prominulæ, apice extrorsum alba: ovata macula. Abdomen rufescens, nudum. Cauda duobus unguibus arcuatis, apice conniventibus, corneis forcipata.*

861. FORFICULA *minor* elytris testaceis immaculatis.

Forficula alis elytro concoloribus. Fn. 600.

Habitat in sterquiliniis.

DESCR. Dimidio minor est hæc species. colore castaneo. Caput & thorax nigricantia. Elytra & Alæ (quæ complicatae apice prominent) castanea; abdomen castaneum. Forceps caudæ erectior. Antennæ X tantum articulis, non vero XIV, uti præcedens. Pedes & abdomen subtus pallidiora.

## Blatta.

862. BLATTA *orientalis* ferrugineo-fusca, elytris sulco oblongo impressis. Fn. 617.  
*Mouff. lat. p. 138. f. 2. 3. Blatta molendinaria & pistrinaria.*  
*Column. ecphr. I. p. 40. t. 36. Scarabæus alter testudinatus minor atque alatus.*  
*Fonst. inf. t. 13. f. A. Grylli.*  
*List. mut. t. 18. f. 2. fæmina.*

Barthol.

*Barthol.* act. 1671. p. 107. t. 108. *Gryllus alatus* (& repens) vermis in saccharo.

*Raj.* inf. p. 68. *Blatta prima* sive *mollis* *Mouffeti*.

*Frisch.* germ. 5. p. 11. t. 3. *Blatta lucifuga* sive *moldinaria*.

*Fennonibus* Torraka. Dracan.

Habitat in Molendinis, præsertim in fumosis hypocaustis Finnonum (Pyrten), ubi devastat panes, ocreas & varia utensilia incolarum; rarius Stockholmiae & alibi, noctu prædatur; accensa candela aufugit ocyus.

DESCR. Magnitudo Grylli, tota testaceo-fusca seu ferrugineo nigricans & quasi usta. Clypeus thoraci incumbens planus, ovalis, transversalis. Elytra diaphana, abdomine breviora, ovali-oblonga: singula tribus striis a basi excurrentibus, quarum intermedia elevata: interior excavata, incurvata conficiens cum pari spatiu ovatum inclusum; exterior excavata juxta marginem, brevis; striae absque ullo certo ordine: cauda duobus mucronibus. Pedes aculeati. MAS alas & elytra gerit. FÆMINA ejus tantum rudimenta.

863. BLATTA *lapponica* flavescentia, elytris nigro maculatis.  
Fn. 618.

AET. upf. 1736. p. 35. n. 2. *Lampyris* alis superioribus ad angulum acutum striatis.

Habitat in Casis *Lapporum* sylvaticorum inter piscium squamas frequentissima. Dum pisces absque sale a Lapponibus exsiccantur, saepe unico die, ab hac omnino consumuntur.

DESCR. Magnitudo majoris muscae. Thorax clypeus membranaceus, patens, marginatus, ovalis, diaphanus. Elytra membranaceo-pellucida, corni coloris, stria longitudinali elevata, in qua striae discuntur versus posteriores margines utrinque, ut coenant in striam longitudinali minores ad angulum acutum; puncta aliquot nigricantia temere elytris dispersa. Pedes corni coloris: tibiae spinosæ. Antennæ longæ, setaceæ. Alæ inferiores aquæ. Cornicula duo articulata, recurva supra anum.

## Gryllus.

864. GRYLLUS *bipunctatus* thoracis scutello abdominalis longitudine.

*Gryllus* elytris nullis, thorace in elytron longitudinale extenso: macula utrinque rhombea nigra. Fn. 623.

*Raj.* inf. p. 60. *Locusta minor* fuscescens, cucullo longo rhomboide.

AET. upf. 1736. p. 34. n. 9. *Gryllus* alis superioribus nullis, collari producto ad longitudinem abdominalis.

Habitat in pratis siccioribus.

DESCR.

DESCR. Est Species e minimis hujus generis. Manifeste distinguitur scuto Thoracis, producto ad longitudinem abdominis, linea longitudinali elevata, & punctis duobus oppositis atris rhombeis, saepe in medio longitudinis. Ale albae tub hac crusta absconduntur. Antennae breviores sunt in hac, quam in alia ulla. Elytra e thorace producto longitudine abdominis.

§65. GRYLLUS *subulatus* thoracis scutello ab domine longiore.

Gryllus elytris nullis, thorace producto ab domine longiore.  
Fn. 624.

Habitat in pratis ad fossas & aquas stagnantes, primo vere.

DESCR. Statura praecedentis, sed angustior & Thorax scutellaris ipso corpore fere duplo longior. Antennae breves.

§66. GRYLLUS *Gryllo-talpa* thorace rotundato, alis caudatis elytro longioribus, pedibus anticis palmatis tomentosis.

Gryllus pedibus anticis palmatis. Fn. 619.

Imp. alt., p. 692. Talpa insectum.

Aldr. inf. p. 571. Talpa ferrantis imperati.

Welsch. hecates. I. p. 39. Talpa ferrantis imperati.

Mouff. lat. p. 104. Gryllo-talpa.

Jonst. inf. t. 12. 13. Gryllo-talpa.

Hofn. inf. t. 4. f. ult. æ. edit alt. 3. t. 6.

Goed. belg. I. p. 168. t. 76. Gryllo-talpa.

Lift. gæd. p. 288. f. 119. Gryllo-talpa.

Barth. act. 4. p. 9. f. 1. Gryllo-talpa.

Worm. mas. p. 243. Gryllo-talpa.

Wagn. helv. 233. Gryllo-talpa.

Charl. exerc. p. 44. Gryllo-talpa.

Raj. inf. p. 64. 67. Gryllo-talpa Mouffeti.

Eph. N. C. dec. 2. ann. I. p. 154. Gryllo-talpa.

Frisch. germ. II. p. 28. t. 5. Gryllus campestris pedibus talpæ.

Black. herb. t. 81. f. 10.

Habitat in Scania campestri, ubi vesperi cantillat uti Rana Hyla vel Rallus Crex Hortis noxijs.

DESCR. Differt a reliquis manifeste variis notis. 1. Magnitudine, utpote omnibus nostris insectis, excepto Cancro, major. 2. Pedibus anticis villosis & palmatis. 3. Alis superioribus cinereis vasis nigrantibus: inferioribus longioribus, acuminatis. Cauda bisepta est, uti sequentis.

§67. GRYLLUS *domesticus* thorace rotundato, alis caudatis elytro longioribus, pedibus simplicibus, corpore glabro.

Gryllus cauda biseta, alis inferioribus acuminatis longioribus, pedibus simplicibus. Fn. 620.

Mouff.

*Mouff.* lat. p. 135.. *Gryllus domesticus.*

*Fouſt.* lat. t. 12. *Grylli Mouffeti & t. 13. f. D.*

*Charl.* exerc. p. 44. *Gryllus domesticus.*

*Hoffn.* inf. p. 11. f. 4.

*Raj.* inf. p. 63. *Gryllus domesticus.*

*Suecic* Syrsa.

Hospitatur apud nos in Domibus, ubi in argillaceis muris cuniculos format, & stridule cantillat, præsertim per noctes, inhabitatoribus ingratus; pellitur Nymphææ radice & Populi tremulæ ligno. *It. oel.* 84.

868. GRYLLUS *brachyterus* griseo-fuscus, elytris alisque corpore dimidio brevioribus.

Habitat in Suecia. De Geer.

DESCR. Thorax latere postico utrinque linea alba terminatus. *Totus vis* rascens. Femora linea longitudinali nigra. *Alæ Elytris, elytra abdomine breviora. Ensis adscendens.*

869. GRYLLUS *viridissimus* thorace rotundato, alis viridibus immaculatis, antennis setaceis longissimis.

*Frisch.* inf. 12. t. 2. f. 1. *Locusta major viridis.*

*Robert.* icon. t. 28.

*Raj.* inf. 61. *Locusta viridis major.*

Habitat in Pratis rarius.

DESCR. Corpus inter nostrates maximum. Caput & Thorax olivacei, Thorax levis nec angulatus, dorso planiusculus lobo scutellari obtusissimo. Alæ virides, immaculatae. *Ensis recta.*

870. GRYLLUS *verrucivorus* thorace subquadrato lævi, alis viridibus fusco maculatis, antennis setaceis longitudine corporis.

*Gryllus cauda ensifera recta, corpore subviridi.* *It. gotl.* 253. *Fn.* 621.

*Fouſt.* inf. t. 11. f. 1. 2. 3. *Locusta hewschrecken Mouf- feti.* t. 13. f. 13.

*Hoffn.* inf. t. 5. f. 16. 17.

*Rob.* ic. t. 27.

*Merian.* europ. t. 176.

*Eph.* N. C. dec. 2. anm. II. obs. 16. p. 40.

*Suecic* Wärbit.

Habitat in pratis. Rustici huic insecto verrucas manus admovent, quas præmordet & evomit in vulnus liquorem, unde verruca contabescit.

DESCR. Distinguitur a reliquis variis notis. Thoracis armatura triangulare, seu ad latera deorsum producta & a tergo versus alas dilatata. Fe-

mina

mina ad anumensem gerit bivalvem; *Mas* elytis versus basin foramine ample, membrana pellucida consolidato, quibus sonum efficit sub cantu. *Color* totius corporis maxima ex parte viridis.

- §71. *GRYLLUS migratorius* thorace subcarinato: segmento unico, capite obtuso, maxillis atris.

*Frisch. inf.* 9. *t.* 1. *f.* 8.

Habitat vix apud nos, uno alteroqve anno migrans accessit parcus.

- §72. *GRYLLUS stridulus* thorace subcarinato, alis rubris: extimo nigris, elytris nebulosis.

*Gryllus* elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris. *It. oel.* 158. *Fn.* 625.

*Uddm. diff.* 50.

*Wagn. helv.* p. 230. *Locusta prima.*

*Frisch. germ.* 9. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2. *Locustæ secunda species.*

*Act. upf.* 1736. *p.* 34. *n.* 4. *Gryllus* alis superioribus umbrosis, inferioribus rubris apicibus nigris.

Habitat in pratis mense Julio stridulus.

*DESCR.* *Antennæ* corpore dimidio breviores, fuscæ, in medio crassiores. *Elytra* nebulosa. *Alæ* plicatæ, reticulatæ, margine undulatæ, nigrae versus apicem, alias rubrae. *Femora* saltatoria angulata, ad genu fimbriata, latere interiore flava & nigra, tibiis flavis. *Pedes* primores quatuor nigrantes.

- §73. *GRYLLUS apricarius* thorace crucigero, antennis longitudine corporis. *It. oel.* 157. *Fn.* 628.

Habitat in *Oelandiæ* campis (Alvar) mense Julio, præsertim circa Borgholm copiosissime, ubi instar pulveris volatilis ante pedes ambulantis dispergitur.

*DESCR.* *Corpus* inter minima hujus generis, seu magnitudine sequentis magis dein flavum, quam virescens. *Antennæ* corpore ipso longiores. *Elytra* pallida, albo reticulata, interlucente nigredine & *Thorax* supra pallidus: macula nigra ad latera thoracis. *Femora* pallida: fascia oblonga nigricante. *Abdomen* supra pallidum, lateribus fuscum, subtus flavo-viride.

- §74. *GRYLLUS viridulus* thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. *Fn.* 616.

*Frisch. germ.* 9. *p.* 6. *n.* 7. *Locustæ septima species minima.*

Habitat copiosissime omnium ad *Burriken* juxta mare, ubi instar fementantis segetis ante pedes cadit.

*DESCR.* Hic inter minimos, (si non minimus omnium) nostros numerandus est. *Corpus* superne viride, quum caput & thorax supra saturate viridia. *Alæ* dilute virides, exteriores five elytra viridia margine exteriore

riore seu laterali albo. Abdomen, pectus, femora, facies pallida. Antennæ articulis XXIII circiter constant.

VARIAT in quibusdam angulo utrinque thoracis dorsali lineola alba & alia lineola alba inter marginem elytrorum album & discum alæ.

875. GRYLLUS *biguttulus* thorace cruciato, elytris nebulosis punto oblongo albo ad apices.

Habitat in Campis.

DESCR. Corpus minoris magnitudinis. Thorax cruce nigra. Elytra cineracentia maculis pallidis & lineola ad apicem obliqua albida.

876. GRYLLUS *rufus* thorace cruciato, corpore rufo, elytris griseis, antennis subclavatis.

Gryllus antennis subclavatis acutis. Fn. 629.

Aet. upf. 1736. p. 34. n. 6. Gryllus abdomine pallido, alis griseis unicoloribus.

Habitat in pratis *Rostlagiæ*.

DESCR. Est inter minores, non minimos. Totus rufus. Thoracis anguli nigri lineola alba. Femora rubra. Elytra grisea, immaculata. Antennæ clavatae, ut in Papilionibus diurnis, sed tamen apice parum elongatis, & summo apice exalbidis.

877. GRYLLUS *grossus* femoribus sanguineis, elytris virescenti-sub rufis, antennis cylindricis. Fn. 627.

Frisch. germ. 9. p. 5. t. 4.

Habitat in pratis rarius, ut Bolstavik & alibi iu *Rostlagia*.

DESCR. Est e maximis nostris, & reliquis pallidior & femoribus subtus rubris saturioribus; Abdomen subtus viridi-flavum. Elytra flavopallida, praesertim antico margine, alias reticulata uti alæ. Antennæ cylindraceæ 24. articulis. Tibiae posticae nigrae dentibus albis, terminatae quatuor unguibus preter unguis palmarum. Femora postica latere inferiore rubra. Totus supra obsolete brunneus seu fusco-lividus, inter pedes anticos acumen thoracis flavescens.

878. GRYLLUS *pedestris* corpore livido-incarnato aptero.

Habitat in Pratis parcius.

DESCR. Corpus magnitudine majorum nostratum, simillimum Pupæ hujus generis, quam apterum, solis alarum rudimentis, sed cum coeat perfectum individuum judicare licet, colore livido-incarnatum, lœve. Antennæ filiformes, obtuse, corpore breviores. Thorax postice subcarinatus, exaratus futuris duabus transversis. Femora postica rubra. Tibiae posticae decem paribus spinarum.

## II. HEMIPTERA.

### Cicada.

879. CICADA *cornuta* thorace bicorni postice subulato longitudo abdominis, alis nudis. Fn. 641.

Pet.

*Pet. gaz. t. 47. f. 2, 3. Ranatra cornuta.*

Habitat in Carduis. *R. Haft. Lundini. D. Leche. Upsaliæ.*  
*DESCR. Corpus nigricans. Oculi fuscæ. Thorax niger pilis griseis ad-*  
*spersus, lateribus utrinque valde mucronatus, postice productus in a-*  
*cumen longitudine abdominis, subulatum, triquetrum, flexuosum. Alæ*  
*4, lividæ, vasis fulcis striatae: inferiores miniæ. Abdomen nigrum.*  
*Femora nigra. Tibiae ferrugineaæ. Sternum oblongo mucrone. Non salit.*

880. *CICADA coleoptrata* elytris totis coriaceis alas obtegen-  
 tibus.

Habitat ad Gottsundam & alibi *D. D. Haartman.*

*DESCR. Corpus subtilis nigrum, supra totum lividum s. fertugineo-fu-*  
*scum. Elytra tota coriacea abdomen tegunt, ut in coleoptratis: fascia*  
*obsoleta ex linea fusca in rhombi formam digesta. Alæ occultatae, mini-*  
*æ, albæ. Tibiae posticæ dentibus duobus alternis validis, ut in Sca-*  
*rabæis.*

881. *CICADA Spumaria fusca*, elytris maculis binis albis late-  
 ralibus: fascia duplii interrupta albida. *Fn. 636.*

*Raj. cantabr. 112.*

*inf. p. 67. Locusta-pulex* *Svammerdamio*, nobis  
 Cicadula.

*Svamm. quart. p. 83. Locusta-pulex.*

*gall. p. 86.*

*bibl. I. p. 215.*

*Poupl. act. gall. 1705. p. 161.*

*Blank. belg. p. 97. t. II. f. N. O. P.*

*Pet. gaz. t. 61. f. 9. Ranatra bicolor, capite nigricante.*

*Frisch. germ. 8. p. 26. f. 12. Vermis spumans.*

*De Geer. act. Stockh. 1741. p. 221. t. 7. Cicada fusca, alis*  
*superioribus maculis albis, in spuma quadam vivens.*

Habitat in Salice, cuius Larva & Pupa latitat intra spumam  
 ex vesiculis quas anno evacuavit, congestam, quam vulgus  
*Gredspott* (salivam Ranæ) vocat, vide *De Geer act. Hol-*  
*mens. loc. cit.*

882. *CICADA nervosa* fusca, alis hyalinis fusco maculatis:  
 nervis punctatis. *Fn. 632.*

Habitat in Pratis.

*DESCR. Spumaria majuscula. Alæ deflexæ nervis elevatis, maculato-*  
*punctatis.*

883. *CICADA leucophthalma* nigra, oculis albis. *Fn. 638.*

Habitat in Pascuis.

*DESCR. Tota nigra s. fusco-nigra, nec atra. Oculi soli albi.*

884. CICADA *albifrons nigra*, fronte alba.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Corpus parvum, atrum. Elytra fulca. Caput subrufus & margo anticus albus. Pedes postici ciliati.

885. CICADA *leucocephala nigra*, capite albo. Fn. 640.

Habitat in pascuis.

DESCR. Tota nigra, præter maculam parvam obscuram ad marginem exteriorem juxta elytrorum apices. Caput & Thoracis dimidia anterior pars alba.

886. CICADA *lateralis nigra*, elytris latere albis. Fn. 639.

Aet. upf. 1736. p. 35. n. 13. Gryllus fuscus alarum margine albo.

Raj. inf. p. 68. n. 2. Locusta-pulex fusca.

Habitat in pascuis.

DESCR. Est etiam haec nigra seu nigro-fusca, sed linea lata alba elytrorum margines exteiiores cingit. Oculi & Os alba.

887. CICADA *striata* elytris albido nigroque ad angulum acutum futuræ dorsalis striatis. Fn. 642.

Raj. inf. p. 68. n. 1. Locusta pulex prima.

Habitat in pascuis humentibus.

888. CICADA *lineata exalbida*: linea utrinque longitudinali nigra Fn. 637.

Habitat in pascuis.

DESCR. Tota pallida seu exalbida: a fronte utrinque versus elytrorum apices juxta latera ducitur linea alba, ad posteriora latior, terminata antequam apicem alarum attingit; intra has lineas laterales ducuntur striæ versus futuram, ad angulum acutum, caudam versus.

889. CICADA *interrupta* elytris flavis: linea nigra duplii interrupta longitudinali. Fn. 631.

Pet. gaz. 61. f. 10. Ranatra bicolor ex fusco & pallido striata.

Habitat in pratis tempore fœniseccii.

DESCR. Magnitudo inter majores nostrates species. Tota flava est, sed clavis elytris, ad utrumque latus dorsi, linea longitudinalis nigra, quæ interrupitur in medio oblique, ac si linea altera a thorace ducta esset, altera ab apice alarum; ambæ licet ad eandem longitudinalem, nec tamen sibi invicem occurentes & tangentæ in medio; ambæ hæ fasciæ juxta thoracem coadunantur in unum. In Capite & Thorace macula utrinque conata nigra. Antennæ breves: Frons flava striis utrinque transversis. Caput & Thorax a tergo nigro-maculata. Elytra flava: linea longitudinali nigra, & alia ab apice basin elytri spectante, sed breviore. Abdomen flavum a tergo, utroque latere nigrum.

890. CICADA *Populi* subtus flavescens, fronte punctis duobus nigris, alis hyalinis.

Habitat in *Populo*. P. Forskål.

DESCR. Spumans media, subtus tota flavescens una cum pedibus & fronte, in qua puncta duo nigra. Scutelli apex flavescens. Alæ hyalinæ, ad quorum marginem tenuiorem elytrorum. Puncta duo alba, vix manifesta, saepe margine fuso distincta.

891. CICADA *flavicollis* fusca, capite thoraceque flavis.

Habitat in *Pascuis*.

DESCR. Spumans e minoribus. Alæ fusco-ferrugineaæ.

892. CICADA *Lanio* viridis, capite thoraceque carneis.

Habitat in *Pascuis*.

DESCR. Spumans media. Caput & Thorax supra carneæ. Elytra & Alæ viridia immaculata. Pedes quatuor anteriores parum carnea.

893. CICADA *vittata* flava: vitta nigra longitudinali duplice repando-dentata. Fn. 6 34.

Habitat in Prædio Cronstedtiano Fullerön.

DESCR. Magnitudo pediculi, adeoque minima. Corpus oblongum, depresso, sulphureum; a tergo, supra elytra, fascia nigra, quasi duo cornua nigra tauri prolixa, quorum basis esset thorax; vel aliter: ponas basin elytrorum nigram, a qua utrinque linea inscribens ovatam figuram, & apice cum pari on connexa, sed reflexa, hinc alia linea brevis reflexa: verbo fascia nigra oblonga ante medietatem macula lutea ovata, infra medietatem utrinque duplice denticulo.

894. CICADA *aptera* aptera atra, elytris abbreviatis, tibiis antennisque pallidis.

Habitat in Prædio Tessiniano Ackerœa Sudermanniaæ.

DESCR. Corpus magnitudine pulicis, atrum exceptis antennis & pedibus pallidis. Elytra abdomine breviora absque alis.

895. CICADA *leporina* alis deflexis exalbidis: antice anastomosis pallidis supra lineolam nigricantem, ano lanato.

Habitat Upsiloniæ.

DESCR. Statura Cic: lanata, sed minor & nigricans. Frons carinata, lateribus marginata. Alæ albidae: superiores lineolis transversis anastomosae constituentibus, sparsis, pallidis: & supra marginem inferiorem, versus posticam, linea parva nigra acuta. Anus valde lanatus: lana albissima mollissima.

896. CICADA *viridis* elytris viridibus, capite flavo: punctis nigris. Fn. 630.

Act. upsi. 1736. p. 34. n. 11. Gryllus alis superioribus viridibus, inferioribus fuscis, capite flavo.

# INSECTA HEMIPTERA. CICADA. 242

Raj. inf. p. 68. n. 3. Locusta-pulex tertia.

Habitat sub Augusti finem in pratis paludosis Uplandiae, copiosissima in Equiseto & Scirpo.

DESCR. Haec inter nostras Cicadas maxima est, licet mitisca domes-  
tina non major longitudine, at longe inferior latitudine. *Elytra* fateretur  
lata. *Alae* plumbeæ. *Thorax* & *scutellum* vitidia. *Caput* flavescens: duo  
puncta nigra in occipite & alia ad latera capitinis. *Frons* striis transversa-  
libus. *Abdomen* a tergo plumbeum. *Pedes* flavescentes.

## 897. CICADA flava flava compressa. Fn. 643.

Habitat Fahlunæ in pratis.

DESCR. Tora flava est, & minor. Duo puncta fusca ad basin capitis &  
tergo.

## 898. CICADA bifasciata fusca, fasciis alarum duabus albis.

Cicada nigra, fasciis tribus albis transversis æqualibus  
633.

Act. upf. 1736, p. 35. n. 14. *Gryllus* alis nigris, fasciis  
tribus transversis albis.

Habitat in pratis rarius; ad Lapidés Morenses Uplalæ pal-  
sim.

DESCR. Magis compressa, quam depressa. *Elytra* nigro-fusca fasciis du-  
abus; albis, transversis, latitudine interjacentis nigredinis. *Thorax* ma-  
ger, versus marginem superiorem lineola transversa alba. *Os* album:  
*cætera* nigra. *Abdomen* subtus nigrum. *Thorax* subtus albicans.

## 899. CICADA aurata flava; elytris fulvo pictis: maculis qua- tuor nigris, postice auratis. Fn. 635.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Oblonga est, & Cic. vittata, cui similis, duplo aut triplo ma-  
jor. flava est, sed oculi nigri; macula nigra utrinque in thorace. *Scu-  
telum* nigrum cum inclusio triangulo flavo & linea a thorace ducta  
flava. *Elytra* fulva picta & notata in medio juxta suturam pun-  
ctis duobus nigris (in singulo elyro singulis), aliisque duobus pun-  
ctis nigris, magis versus posteriora alarum, juxta marginem crassiorem:  
postice elytra auro translucent. *Corpus* nigricans est. *Pedes* flavi.

## 900. CICADA *Ulmi* alis viridi-luteis: apicibus nigricantibus inau- ratis. Fn. 644.

Habitat in *Ulmi* foliis citissime currit & anfugit.

DESCR. Differt a reliquis cicadis, quod compressa sit, magis currens  
quam saltans.

## 901. CICADA *Coryli* alis convolutis fuscis: fascia albida pone maculam cordatam cærulecentem.

Habitat in *Corylo*.

DESCR. *Frons* albido-flavescens uti & *Pedes*. *Alae* convolutæ, subfuscæ,  
æneo

æneo-subnitentes; macula communis, in medio dorso, cordata cærulea scens; fascia posterius albida. *Ungues* nigricantes.

902. CICADA *Rosea* flava; alis albis apice membranaceis.  
*Fn.* 645.

*Frisch. germ.* II. p. 13. t. 20. *Pulex foliorum.*  
Habitat in folijs *Rosea*.

DESCR. semicylindracea alba. *Abdomine* flavescente. *Alis* albis apicibus aqueis, non deauratis, hinc diversa a præcedenti, alias simillima.

### Notonecta.

903. NOTONECTA *glaucia* grisea; elytris griseis margine fusco punctatis. *Fn.* 688.

*Bradl. natur.* t. 26. f. 2. *E.*

*Hoffn. inf.* t. 12. f. 19.

*Pet. gaz.* t. 72. f. 5.

*Frisch. germ.* 6. p. 28. t. 13. *Cimex aquaticus angustior.*  
Habitat in Lacubus; inter nostrates in hoc genere maxima.

DESCR. Caput obtusum, flavum. Oculi brunnei. Thorax magnus, flavus, pellucidus. Scutellum atrum, holosericeum. Elytra flava, latera nigro punctata. Alæ inferiores albæ, pellucidae, testæ. Pedes anteriores breviores; intermedii longiores; postici longissimi, natatorii. Rostrum acutum, subulatum. Antennæ parvæ sub capite, dupli articulo tantum constantes. Venter niger, subtus hirsutus est.

904. NOTONECTA *striata* elytris pallidis: lineolis transversis undulatis striata. *Fn.* 689.

*Pet. gaz.* t. 72. f. 7. Notonecta vulgaris compressa fusca.  
Habitat in Aquis, præcedenti multoties minor, fœtens.

DESCR. Hæc oblonga, depressa; Frons & Pedes flavi. Thorax & Elytra fusca lineolis transversis undulatis parallelis numerosissimis flavescenti-pallidis. Corpus subtus flavescens. Oculi nigricantes.

905. NOTONECTA *minutissima* elytris cinereis: maculis fusco longitudinalibus.

Notonecta arenulæ magnitudine. *Fn.* 690.

*Aat. upf.* 1736. p. 37. n. 3. Notonecta cinerea vix conspicua.

Habitat in scaturiginibus & fontibus.

DESCR. Magnitudo minimæ arenulæ; alis & elytris, cineriis. Pedes posteriores longiores; primum par minimum; depresso est, dorso fusco velut transverse striata.

## Nepa.

906. NEPA *cinerea* *cinerea*, thorace inæquali, corpore ovato.

Nepa abdominis margine integro. Fn. 691.

Mouff. lat. p. 321. Scorpio palustris.

Baeh. ballon. p. 212. f. 2. Araneus aquaticus.

Hoffn. inf. t. II. f. 2. edit. alt. 3. t. 4.

Jonst. inf. t. 27. f. 1. 2. Scorpiones aquatichi Mouff.  
t. 28. f. ad verb. stello. figura bona.

Bradl. natur. t. 26. f. 2. C.

Pet. gaz. t. 74. f. 4. Scorpio vulgaris aquaticus.

Raj. inf. 58. Scorpio palustris ad cimices referendus.

Swamm. bibl. t. 3. f. 4.

Habitat in fluviis, stagnis, paludibus, loco limoso, præfer-  
tim in fluvio Sahla Upsaliæ.

907. NEPA *cimicioides* abdominis margine ferrato. Fn. 692.

Frisch. germ. 6. p. 31. t. 14. Cimex aquaticus latior.

Habitat in Aquis.

DESCR. Priori minor; facies Cimicis aut Notoneftæ; Dorsæ convexo  
absque aculeo caude. Color tuscus.

908. NEPA *linearis* *linearis*, manibus spina laterali pollicatis.

Frisch. inf. 7. p. 24. t. 16.

Habitat in Aquis nostratis rariſſime.

DESCR. Corpus lineare, convexum, cinereum, Aenclus bisetus caudes  
longitudine corporis.

## Cimex.

909. CIMEX *lectularius* apterus. Fn. 646.

Mouff. lat. p. 269. f. superiores. Cimex domesticus.

Matth. diosc. p. 257. t. 257. Cimices.

Merr. pin. p. 202. Cimex lectularius.

Bonan. microsc. t. 65.

Raj. inf. p. 7. Cimex.

Charl. exerec. p. 52. Cimex.

Aldr. inf. p. 534. Cimex.

Jonst. inf. p. 89. Cimex.

Suecis Wägglus.

Hospitatur in domibus.

OBS. Pellitur Formica rufa ejusque acervo introducto. Agaricus musca-  
riæ deliquescentia inunctus certo occidit. Cannabis virens lesto impoſita.  
Muria halecum inuncta ſepius, eos occidit & pellit.

910. CIMEX *grylloides* apterus niger, elytris ovatis margine luto, abdome brevioribus.

Habitat Ca mariæ. A. Modeer.

DESCR. Corpus nigrum, magnitudine præcedentis. Thoracis margines omnes lutei. Elytra absque alis membranaceis, ovata, margine flava, apice distantia. Alæ nullæ.

911. CIMEX *clavicornis* elytris abdomen occultantibus reticulato-punctatis, antennis clavatis.

Cimex antennis clavatis, elytris thoracisque margine reticulato punctatis. Fn. 687.

Mordella fusca opaca, elytris punctatis. Fn. 545.

Habitat in Uplandia. De Geer. in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudo pulicis, cinereus, ovatus; Alæ & margo thoracis punctis diaphanis reticulatis, vasis fuscis, cum maculis sparsis nigricantibus; margo elytrorum punctis quasi dentatus. Thorax rugosus.

912. CIMEX *Scarabæoides* scutello abdomen operiente, corpore atro, supra atro-aeneo.

Habitat rarius apud nos, in Ranunculo. D. D. Hartman.

DESCR. Corpus atrum, magnitudine Cimicis lectularii. Antennæ sub-clavatae. Thorax aeneo-niger. Scutellum magnitudine abdominalis, colorum. Elytra concoloria. Alæ albæ. Pedes spinosi.

913. CIMEX *maurus* scutello longitudine abdominalis, corpore griseo.

Habitat in Suecia rarius.

DESCR. Corpus Cim. lecturario paulo majus, totum griseum. Scutellam convexum, magnitudine abdominalis, sed paullo angustius; utrinque ad basin puncto linearie pallido. Antennæ maximam partem nigrae.

914. CIMEX *fuliginosus* scutello abdomen operiente fuliginoso; lituris quinque nigris: postica albo bifida.

Habitat Calmaria. A. Modeer.

DESCR. Corpus mediæ magnitudinis, supra fuliginosum subpubescens; subrufum, glabrum. Scutellum convexum, totum abdomen tegens, lituris utrinque duabus nigris & unica postica, divisa lineola alba.

915. CIMEX *littoralis* elytris abdomen occultantibus sordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Corpus nigrum. Elytra longitudine totius abdominalis, vix margine apicis membranacea. Alæ elytris dimidio breviores. Pedes pallidiores.

916. CIMEX *rugosus* elytris abdomen occultantibus pallidis, corpore oblongo.

Habi-

Habitat apud nos rarius.

*DESCR.* *Corpus* medium, valde oblongum. *Elytra* longitudine abdominis, ab apice *Scutellæ* ad apicem *elytrorum* interiori margine membranacea, nec ultra. *Femora* anteriora crassiora & quasi transverse striata.

917. *CIMEX corticalis* abdomine membranaceo depresso marginé imbricatum secto, corpore nigricante.

*Cimex nigricans*, abdomine plano: margine imbricatum secto. *Fn.* 649.

Habitat in truncis exaridis sylvarum vastissimarum.

*DESCR.* Magnitudine Cim: Lectulario major. *Totus* planus, exsuccus, subtus niger. *Abdominis* margo utrinque sex laciñis obtusis colore testæ testudinis. *Corpus* & thorax folidia. *Antennæ* trium articulorum. *Alæ* elytrae cinerea, abdomine longe angustiora & profundius impressa. *Caput* tricuspidatum.

918. *CIMEX Betulae* abdomine membranaceo depresso, thorace denticulato, capite muricato, elytris antice dilatatis.

Habitat in *Betula*.

*DESCR.* *Corpus* depresso-membranaceum, fusco-griseum. *Antennæ* longitudine thoracis. *Thorax* sulcatus, scaber, medio niger, lateribus griseus, margine denticulatus. *Elytra* coriacea, grisea, margine exteriore dilatata; membranaceo vero nebulosa. *Alæ* fusca. *Pedes* nigri: palmis rufis.

919. *CIMEX Filicis* abdomine membranaceo depresso, elytrorum apicibus capite pedibusque lividis, corpore nigro.

Habitat in *Polypodii Filicis maris* frondibus.

*DESCR.* *Corpus* ovatum, depresso, vix pulice majus. *Caput* lividum. *Oculi* nigri. *Thorax* niger. *Elytra* fusca, margine flavescente, apice membranaceo livido. *Abdomen* nigrum. *Pedes* lividi.

920. *CIMEX Cardui* abdomine membranaceo depresso, scutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris. *Fn.* 660.

Habitat in *Cardui* capitulis.

*DESCR.* Parva est, depresso-plana, oblongo-ovata; *Caput* parvum, cinereum. *Antennæ* 3 bus articulis, pallidæ, extimo articulo ovato nigro. *Thorax* cordatus, acuminatus, marginatus, costis tribus elevatis acutis longitudinalibus. *Alæ* s. coleoptera cinereo-nebulosa cruce elevata & linea utrinque elevata. *Abdomen* subtus & femora nigricantia. *Tibiae* pallidæ. *Sternum* nigrum, angustum, cinctum linea albida & apice rotundatum albo margine. *LARVA* cinerea antennarum apicibus nigris.

921. *CIMEX bidens* ovatus griseus, thorace acute spinoso, antennis rufis. *Fn.* 652.

Habitat Fahlunæ.

*DESCR.* *Corpus* griseum undique. *Scutelli* apex lunari-pallidus. Liturae coccineæ subtus in thorace. *Antennæ* pallide rubrae. *Pedes* corpori concolores.

922. CIMEX *rufipes* ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, pedibus rubris. Fn. 651.

Habitat circa Fahlunam, Aboam & alibi rarius.

DESCR. inter maximos est. Antennæ nigrae, versus basin rubrae. Dorsum totum griseum. Thorax angulo utrinque obtuso elevato cornutus. Scutum apex ruber. Abdominis margo acutus, nigro rubroque varius. Pedes rufi.

923. CIMEX *marginatus* oblongo-ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, antennis medio rubris.

Cimex oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque angulato. Fn. 662.

Act. upf. 1736. p. 35. n. 1. Cimex alis testaceis, abdomine rubro.

Habitat saepe in Vaccinio.

DESCR. Inter maximos nostrates hujus generis hic est. Corpus totum griseum, non nitidum. Thorax rhombeus angulis alas speciatis truncatis, rectis. Abdominis latera in aciem elevata. Antennarum secundus & tertius articulus sanguineus.

924. CIMEX *punctatus* ovatus fusco-punctatus, thorace subspinoso, tibiis annulo albo.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Corpus fuscum, magnitudine fere Cim. juniperi, subitus subflavescens. Caput. Thorax & Elytra punctis excavatis confertis adpersa. Thoracis latera subangulata: linea longitudinali flavescente. Tibia lato annulo cincta.

925. CIMEX *haemorrhoidalis* ovatus oblongus griseus, thorace acute spinoso, antennis nigris, ventre antice spinoso.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Corpus e majoribus nostratis, griseum, viridi & livido variegatum. Subitus totum lividum, ut etiam Pedes. Antennæ nigrae. Thorax gibbus, utrinque mucronatus: apice nigro. Elytra introrium grisea, extorris pallida. Abdomen supra rubrum: ano bilobo.

926. CIMEX *griseus* ovatus griseus; abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebulosis, ventre antice spinoso. Fn. 657.

Habitat frequens in Uplandia.

DESCR. Species est inter mediocres. Totus superne griseus est & punctis profundis adpersus. Scutellum versus basin magis fulcum. Alae fusco-nebulosæ. Antennæ fere clavatae, fusco-nigricantes, articulis quinque. Dorsum nigrum sub alis, margine colore albo dentatum, nigro colore interjectum.

927. CIMEX *interstinctus* ovatus griseus, abdominis lateribus rubro nigroque variis, alis albidis, ventre antice spinoso. Fn. 658.

Act.

*Aet. upf. 1736. p. 35. n. 4.* *Cimex subrotundus griseus.*  
Habitat rarius ruri.

*DESCR.* Magnitudine, facie & colore cum priore convenit, sed omnibus partibus pallidior est. *Scutellum* ad basin magis fuscum; & superficies exterior punctis excavatis impressa, ut in præcedenti. *Alæ* albæ diaphanæ. Color dorsi sub alis ruber, (quo manifeste a præcedenti differt, qui niger & viridis) versus basin nigra lata macula, versusque anum lineis transversis nigris, præsertim ad abdominis latera.

928. *CIMEX Baccarum* ovatus griseus: abdominis margine nigro maculato. *Fn.* 650.

*Raj. inf. p. 54. n. 2.* *Cimex sylvestris*, corpore breviori, fuscus, scapulis magis extantibus, macula e flavo rubente in centro crucis dorsalis. (alius Willugbæi.)

*Jenst. inf. t. 17. f. 9.*

*Lift. mut. t. 31. f. 19. (non figura 16.)*

*loqu. p. 396. n. 36.* *Cimex ex luteo virescente infuscatus*, corniculis maculatis similiter ad alvi margines nigris maculis eleganter interstitius.

*Suecis Bärfigs.*

Habitat communiter in baccis autumno, quas fædo inquinat odore, pueris invisus.

929. *CIMEX dumosus* subrotundus griseus: margine undique sanguineo.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Statura & magnitudo sequentis. *Ruber* est margo thoracis, abdominis & elytrorum. *Linea rubra* a capite ad apicem scutelli. *Scutelli* latera etiam margine rubra. *Corpus* nigrum. *Tibiae* omnes annulo rubro cinctæ.

930. *CIMEX Juniperinus* subrotundus viridis: margine undique flavo. *Fn.* 648.

*Raj. inf. p. 53. n. 1.*

Habitat ruri passim, frequens in *Junipero*.

*DESCR.* *Corpus* subrotundum. *Antennæ* articulis quinque, oblongis, viridibus, infimo unimino. *Caput*, *thorax*, *scutellum*, *elytra* viridia, scabriuscula; apex scutelli flavus. *Alæ* superiores albidiores, inferiores magis fuscæ. *Venter* rotus subrufus viridis, a dorso vero niger. *Rastrum* articulis quatuor, infimo adnato. *Lingua* feracea rostro longitudinaliter immersa: *mandibula superior* brevissima, subulata, linguam deprimens. *Est* maximus inter nostrates. *Dorsum* sub alis non rubrum, sed atrum,

931. *CIMEX prasinus* subrotundus totus viridis, scutello con colore.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Similis præcedenti, sed paulo major. *Thorax* magis angulatus. *Elytrorum* margines laterales minime flavi. *Subtus* viridis vel rufescens in alis.

932. CIMEX *Morio* ovatus ater, plantis rufis.  
Habitat in Scania. *D. C. Solander.*

*DESCR.* Statura sequentis, sed totus aterrimus membranaceis alis minime maculatis.

933. CIMEX *cæruleus* ovatus cæruleus immaculatus.  
Habitat in *Thesio alpino.*

*DESCR.* Corpus obscuro-cæruleum. Alæ superiores subfuscæ. Sulcus dorsalis Thoracis nullus.

934. CIMEX *oleraceus* ovatus cæruleo-aeneus, thorace linea-  
la, scutello apice elytrisque puncto albo rubro. *Fn.*  
*654.*

*Raj. inf. p. 59. n. 6.* Cimex *Raj. inf. 54. n. 9.* Cimex syl-  
vestris cærulescens pau-  
lo reliquis minor & ma-  
gis depresso.

vestris cærulescens paulo  
reliquis minor & magis de-  
presso, area scapularum ru-  
bra.

*Sloan. hist. 2. p. 203. t. 237.*  
*f. 36. 37.* Cimex minor  
cæruleus, lineis albis vari-  
us, testudinis forma.

Habitat in Tetrodynamis, quas facile omnes destruxit 1760.

*DESCR.* Dorsum totum cærulescens, aeneo-nitens cum capite, thorace, e-  
lytris, thoracis linea in medio dorfi longitudinalis, versus elytra desinens  
lineola transversa. Scutelli apex ut & macula e regione in singulo ely-  
tro solitaria colorata, ut & punctum parvum ad latus scutelli utrinque,  
margo denique lateralis corporis, his color vel albidus vel ruber. Pe-  
des & Antennæ nigrae. Corpus subitus nigro-cærulescens. Variat maculis  
albis & rubris, tamen eadem species ex figura ut ex copula patuit; Mas-  
ticilicet maculis albis, Fæmina vero rubris nitet.

935. CIMEX *biguttatus* ovatus niger: in margine undique albo,  
elytris puncto albo.

Habitat paucim.

*DESCR.* Statura antecedentis, sed minor; totus niger, sed in singulo ely-  
tro punctum album, minimum; margo thoracis & elytrorum albus.

936. CIMEX *bicolor* ovatus niger, elytris nigro alboque variis,  
alis albis. *Fn. 655.*

*Pet. gaz. p. 22. t. 14. f. 7.* Cimex niger nostras albo ma-  
culatus.

*Lift. loqu. p. 396. n. 37.* Cimex niger maculis candidis no-  
tatus.

*Raj.*

*Raj. inf. p. 54. n. 5.* Cimex sylvestris parvus, corpore rotundiore, colore nigro splendente, maculis albis picto. Habitat cum præcedenti in plantis.

*DESCR.* Magnitudo & figura antecedentis; *Totus* dorso niger. *Elytra* nigra, macula ad marginem exteriorem alba lunulari juxta basin, & alia macula alba juxta apicem ad marginem; antice ad marginem thoracis utrinque alba macula.

937. CIMEX *ornatus* rotundo-ovatus nigro rubroque variegatus, capite alisque nigris. *Fn. 661.*

Habitat potissimum in Suecia australi.

*DESCR.* Est inter latissimos & maximos hic Cimex. *Caput & Thorax* a tergo ruber, maculis duabus magnis bifidis dehiscentibus capiti contiguis. *Scutellum* nigrum macula oblonga versus thoracem bifurca, versus apicem capitata. *Elytra* rubra punctis duobus nigris, altero intra apicem, altero intra marginem medium exteriorem; macula nigra, oblonga secundum marginem interiorem ampliata inter duo puncta. *Alæ & pedes* nigra. *Abdominis* margo a dorso rubro nigroque variegatus.

938. CIMEX *ruber* ruber, alis fuscis, elytris lineola transversa albida. *Fn. 653.*

Habitat in Urtica & aliis plantis.

*DESCR.* Cimicis domestici magnitudo. *Totus* ruber, absque ulla notabili nigra macula. *Elytra* puncto sive macula atro-purpurea in medio. *Alæ* fuscæ. *Abdomen* sub elytris nigricans. *Lineola transversa* albida in medio elytrorum juxta marginem exteriorem.

939. CIMEX *acuminatus* ovatus antice attenuatus cinereo-exalbidus, antennis incarnatis. *Fn. 656.*

*Lift. mut. t. 31. f. 20.*

*Raj. inf. p. 56. n. 6.* Musca cimiciformis sexta Willughby. Habitat *Upsaliæ*.

*DESCR.* Ovatus est; sed *Thorax* cum acumine admodum attenuatus, apice seu fronte tamen obtusus. *Caput, Thorax, Scutellum* cinereo-exalbida, punctis minutissimis nigricantibus adspersa; a thorace per caput duæ fasciæ subfuscæ, longitudinales, versus frontem tendentes. *Antennæ* incarnatae aut rufescentes. *Abdomen* postice truncatum & fere bidentatum.

940. CIMEX *leucocephalus* ovatus niger, capite pedibusque flavis.

Habitat passim.

*DESCR.* Corpus parvum, ovatum, totum atro nitens. *Caput* flavum, Oculi nigri. *Antennæ* nigrae, basi flavae. *Pedes* flavi.

941. CIMEX *minutus* ovatus, elytris lividis; apice fuscis. *Fn. 656.*

Habitat in Scania.

*DESCR.*

*DESCR.* Magnitudo pulicis. *Antennæ* pedesque flavescentes. *Corpus* nigrum. *Elytra* livida, apice fusca. *Alæ* hyalinæ.

942. *CIMEX personatus* rostro arcuato, antennis apice capillaceis, corpore oblongo subvilloso fulvo. *Fn.* 647.

*Frisch. germ.* 10. p. 22. t. 20. *Cimex stercorarius major* oblongus.

*Raj. inf.* p. 56. n. 3. *Mulca cimiciformis* 3. tia graviter olens.

*Lift. loqu.* p. 397. n. 38. *Cimex maximus pullus* s. *atratus*, alis nudis ex toto membranaceis. an?

Habitat *Holmiae*, ubi in domo aliqua capta fuit Larva a Commissario *Carolo Clerck*; vicitat Cimice lectulario a liisque, ideoque ubi obtinetur, in domos introducatur cimicibus obnoxias.

*DESCR. LARVA* erat visu horrenda Araneum vel Phalangium referens, tota hirsuta, laetula, cinerea, arenam vel potius terram sicciam mentiens. *Caput & Antennæ* ut in reliquis erant, & nuda: proboscidem sub capite habebat incurvatum, arcuatam. *Antennæ* setaceæ, nudæ, infimo articulo villoso, articulis tribus nudis. *Pedes* sex, postici longissimi, clavati, versus unguis omnes pedes crassi: miro modo carsat, nec pares pedes simul movet sub incessu, sed diversissimos, hinc incessus admodum monstruosus. Tota spurcitie obiecta, eamque facile deponit, quam primum penna abstergitur, unde appetat non proprios esse crines, sed mutuatos & undique corpori impositos, ne a quoquam observetur. *Vicitat* raptu, edit museas & alia infecta.

943. *CIMEX annulatus* rostro arcuato, antennis apice capillaribus, corpore oblongo: subtus sanguineo maculato.

Habitat ruri.

*DESCR.* *Corpus* oblongum. *Caput* minimum, angustissimum, nigrum, exsertum. *Antennæ* setiformes, longæ. *Abdomen* margine acuto, assurgente, coccineo fatciis nigris quinque; ano rubro. *Rostrum* longum, nigrum, arcuatum. *Tibiæ* sanguineæ. *Femora* prima annulis coccineis tribus; media coccinea tota.

944. *CIMEX ater* ovatus ater, antennis apice capillaribus.

*Cimex ater*, antennis seta terminatis. *Fn.* 677.

Habitat in pratis.

*DESCR.* Differt a *C. saltatorio*, quod hic major & immaculatus, quod in seco vivat nec saltet, quod *Antennæ* clavatae terminentur seta tenuissima pallidiore. *Rostrum* ad basin flavescens.

945. *CIMEX Hyoscyami* oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis immaculatis. *Fn.* 665.

*Raub. ballon.* p. 212. f. 4. *Scarabæus parvus*.

*Pet. gaz.* t. 62. f. 2. *Cimex hyoscyamoides ruber*, maculis nigris.

*Lift.*

*Lift. mut. t. 31. f. 21.*

*loqu. p. 397. n. 39.* *Cimex miniatus nigris maculis notatus Hyoscyamo fere gaudens.*

*Raj. inf. p. 55.* *Cimex sylvestris minor, corpore oblongo angusto, colore desuper rubro nigris maculis picto.*

Habitat in foliis *Hyoscyami* 184.

*DESCR.* *Caput nigrum, in medio rubrum. Thorax ruber, antice niger, postice duabus nigris angulatis maculis. Elytra rubra; macula nigra in medio elytri sive due in medio dorsi. Scutellum nigrum apice rubro. regio abdominis sub scutello nigra; Abdomen rubrum, supra anum nigrum, subtrus lineis nigris transversis. Alae fuscæ sive nigræ, striatæ, absque maculis ullis albis. Antennæ pedesque nigri. Rostrum articulis quatuor.*

946. *CIMEX equestris oblongus rubro nigroque variegatus, alis fuscis albo maculatis.* *Fn. 664.*

*It. oel. 155.* *Cimex oblongus rubro nigroque variegatus, &c.*

Habitat in cœmiteriis frequens.

*DESCR.* *Similis est C: Hyoscyami, sed duplo major. Corpus supra rubrum. Caput in medio rubrum utrinque nigrum; Thorax ruber antice & pone niger. Scutellum medio nigrum, lateribus rubrum, nigredine aucta macula cordata nigra versus scutelli apicem. Fascia nigra, inaequalis, transversa coleopterorum in medio. Alæ fuscæ, maculis albis. Thorax subtus niger. Abdomen rubrum ad latera quinque utrinque punctis, dupli ordine, nigris & subtus utrinque tribus lineolis nigris notatum. Anus, antennæ, pedes nigra. Antennæ quatuor articulis.*

947. *CIMEX pabulinus oblongiusculus totus flavescente-viridis.*  
Habitat ubique in pascuis.

*DESCR.* *Caput, Thorax, Elytra; Abdomen & Pedes e flavo viridia. Antennæ extimis articulis angustioribus.*

948. *CIMEX Kalmii oblongus viridis, scutello macula cordata flava, elytris maculis duabus nigris.* *Fn. 663.*

Habitat in Sylvis. *P. Kalm.*

*DESCR.* *Caput nigrum nucha flavescente. Thorax flavus margine antico & postico nigro. Scutellum cordatum, flavum, cinctum nigredine baseos elytrorum. Elytra viridi-flavescentia apicibus nigris, & macula utrinque in medio crucis nigra. Alæ albescentes. Abdomen viride, lateribus & linea longitudinali nigra.*

949. *CIMEX pratensis oblongus griseus, scutello macula cordata flava, elytris apice puncto fusco.* *Fn. 666.*

Habitat in pratis.

*DESCR.* *Dilute testaceus. Scutellum tegit macula cordata flava. Elytra grisea, apice puncto minimo fuso. Alæ albæ. His notis certo dignoscitur.*

950. CIMEX *campestris* oblongus viridis, scutello macula cordata viridi, elytris macula ferruginea.

Habitat in hortis & pratis apud nos frequentissimus.

*DESCR.* Præcedenti minor & magis oblongus; versus posteriora elytrorum macula magna fusco-ferruginea. Pedes virides. Antennæ fusca & articulis; nullum punctum in apice elytrorum. Caput & Thorax fusca. Abdomen viride, a térgo lineis 7 vel 8 fuscis transversis, & totidem maculis fuscis utrinque subtus juxta marginem. Hic & præcedens macula scutelli cordata a reliquis facile distinguitur.

951. CIMEX *umbratilis* oblongus niger, elytris albo maculatis. Fn. 673.

A&T. upf. 1736. p. 36. n. 13. Cimex oblongiusculus fuscus, alis nigricantibus puncto albo.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* Totus niger. Pedes pallidi. Puncta majora & minora sparsa supra elytra, quorum posteriora majora, ut obiter intuenti duo tantum conspiciantur alba puncta.

952. CIMEX *crassicornis* oblongus griseus rubro punctatus, antennis clavatis.

Habitat paßim.

*DESCR.* Corpus oblongum, pallide griseum, supra undique irroratum. Punctis vix conspicuis rubris, etiam in alis. Antennæ apicibus clavatae nota singulari. Ad margines dorsi flavos utrinque puncta circiter 10 nigra.

953. CIMEX *nemorum* niger, pedibus testaceis, elytris alisque fusco alboque variis.

Habitat ubique in nemoribus.

*DESCR.* Corpus qualitercumque facie refert C. Abietis, sed magnitudine pediculi, totum nigrum. Caput porrectum thorace angustiore. Elytra quasi ustulata, basi alba, postice fusca disco fuscedinis pallido. Alæ macula magna fusca.

954. CIMEX *saltatorius* oblongus niger, elytris striatis, alis postice flavo maculatis. It. ael. 121. Fn. 676.

Raj. inf. p. 57. n. 2. Cimex brevis & fere rotundus nigricans.

Habitat ad ripas & littora maris, lacuum & fluviorum.

*DESCR.* A plerisque differt, quod saliat fere ut Cicada, licet non tam alte. Totus ater est, maculis obscure flavis in alis supra caudam & nigris rugis in ipsis alis. Antennæ filiformes, 4 articulis.

955. CIMEX *arenarius* oblongus niger, elytris cinereis: antice nigris, alis postice albis. It. ael. 121. Fn. 678.

Habitat in Arena.

*DESCR.*

*DESCR.* Totum *Corpus* nigrum. *Elytrorum* crux antice nigra, postice alba, lateribus cinerea punctis minutissimis nigris.

956. *CIMEX Pini* oblongus ater, elytris fuscis: macula rhombea nigra. *Fn.* 674.

*Act. upf.* 1736. p. 36. n. 11. *Cimex oblongiusculus* ater, alis fuscis macula rhomboidali nigra.

Habitat in *Pinu* frequens.

*DESCR.* *Totus* ater, uti pedes, antennæ, caput, thorax, scutellum, abdomen, alæ. *Elytra* grifeo-fusca, in quorum medio juxta centrum crucis macula rhombea figura atra, in singulo elytro singula.

957. *CIMEX rolandri* oblongus ater, elytris membranaceis: macula flava.

Habitat *Upsaliæ*. *D. Rolander.*

*DESCR.* Magnitudo media. *Corpus* totum atrum. *Elytrorum* pars alaris pone crucem, ad latus interius, macula flavo-ferruginea notata, ut complicatis alis unica macula pone crucem ferruginea conspicatur.

958. *CIMEX lœvigatus* oblongus exalbidus: lateribus albis. *Fn.* 679.

*Act. upf.* 1736. p. 35. n. 9. *Cimex oblongus* albus.

Habitat in pascuis.

*DESCR.* Maxime oblongus est; *totus* exalbidus seu virescenti exalbidus uti antennæ, elytra, thorax, caput, alæ, pedes. *Elytra* striata sunt & ad latera albidiora. *Antennæ* setaceæ, articulis tribus. *Variat* hic *Cimex* linea nigricante pone oculos utrinque per thoracem ducta & absque hac.

959. *CIMEX dolabratus* oblongus pallido-fuscus, antennis nigris, linea thoracis alba. *Fn.* 681.

*Act. upf.* 1736. p. 35. n. 8. *Cimex oblongus*, alis cinereis margine albis, scapulis nigris linea alba.

Habitat Ruri.

*DESCR.* *Antennæ* setaceæ, nigrae. *Caput* nigrum; ante oculos lineola nigra, & alia in medio frontis alba. *Thorax* a tergo niger, ad latera albidus; linea dorsalis longitudinalis alba: *scutellum* nigrum, linea longitudinali alba. *Elytra* quasi deusta vel subfuscata margine exteriori albido; longiora dein in hac specie sunt elytra, quam in reliquis.

960. *CIMEX striatus* oblongus niger, elytris luteis fusco striatis, apice pedibusque rubris. *Fn.* 680.

Habitat in foliis *Ulmi*.

*DESCR.* Facies C. lœvigati: *Antennarum* extimus articulus basi albus, *Elytra* striis nigris & flavis apice rubris.

961. *CIMEX erraticus* oblongus nigricans, elytris albis, antennis lividis: iufimo articulo nigro. *Fn.* 682.

Habi-

256 INSECTA HEMIPTERA. CIMEX.

Habitat in plantis.

*DESCR.* Abdomen & corpus totum nigrum. Thorax utrinque albidus, & præterea tribus lineis albis longitudinalibus; Antennæ lividae, 4 articulis setaceis, infimo articulo nigro. Rostrum albidum. Pedes lividi. Alæ inferiores albo cæruleo nitidae, superiores fuscæ margine coleoptriformi albo.

962. CIMEX *ferus* oblongus griseus immaculatus, antennis setaceis. Fn. 668.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* A tergo nullis punctis manifestis excavatus. Antennæ minime clavatae, sed setaceaæ. Pedes pallidi.

963. CIMEX *Populi* oblongus albo fuscoque nebulosus, antennis setaceis. Fn. 669.

Habitat in nemoribus, præsertim in truncis *Populi tremulae*.

*DESCR.* Oblongus magis quam reliqui. Caput, thorax, elytra, alæ, femora, antennæ fusco & albido mixto nebulosa sive irrorata sunt. Antennæ longitudine corporis, setaceaæ. Pedes longi albo nigroque nebulosi. Alæ depresso; non vero compressæ.

964. CIMEX *Ulmi* oblongus supra rubiginosus, elytris striis sanguineis, alis postice albo fuscoque variis. Fn. 670.

Habitat in *Ulmis campestris*.

*DESCR.* Magnitudo media. Corpus oblongum. Caput & Thorax supra rufa. Alæ pallide rufescentes striis s. venis longitudinalibus sanguineis; pone crucem alæ tuscæ albis maculis. Antennæ setaceaæ, longitudine fere corporis. Scutellum non cordatum.

965. CIMEX *sylvestris* oblongus niger, alis elytrisque albo fuscoque variis, pedibus rufis. Fn. 671.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* Caput, thorax & abdomen nigra. Pedes rubicundi seu incarnati. Antennæ superne minime attenuatae, nigrae, inferne rufescentes. Elytra quasi deusta seu versus basin alba, versus apicem fusca, in medio macula obscura fusca. Alæ fusco & albo Variegatae.

966. CIMEX *gothicus* antennis apice capillaribus, corpore oblongo nigro, scutello elytrorumque apicibus coccineis.

Habitat in nemoribus.

*DESCR.* Corpus oblongum, media magnitudinis. Antennæ nigrae, setariae, longitudine corporis. Thorax lateribus ruber. Scutellum coccineum. Elytra nigra: margine exteriore longitudinali flavescente; apice elytrorum in alis macula parva saturate sanguinea.

967. CIMEX *mutabilis* oblongiusculus niger, alis inferioribus cæruleis, antennis pedibusque flavis.

## Habitat Upsaliæ.

*DESCR.* *Corpus* atrum, magnitudine Cimicis. *Ale* membranaceæ complices cæruleæ apparent, disjunctæ vero hyalino glauceæ. *Antennæ* abdomine paullo longiores, pallide flavecentes, angustæ. *Pedes* longi, albidi.

968. *CIMEX calcaratus oblongus niger*: femoribus posticis subtus dentatis.

## Habitat ruti pâssim.

*DESCR.* *Corpus* atrum, majuscum, Antennæ filiformes, corpore paullo breviores. *Elytra* cæbra: alis striatis. *Abdomen* supra sanguineum; præter primum & ultimum segmentum nigrum: margines elevati nigri incisuris sanguineis. *Subtus* est nigro æneum. *Femora* oblonga, subtus ciliata spinis 4, f. 5.

969. *CIMEX Abietis oblongiusculus maculato-fulvus*, pedibus rufis: femoribus anticis crassioribus dentatis. *Fn. 672.*

*Act. upf.* 1736. p. 36. n. 10. *Cimex oblongiusculus*, alis flavo fulvoque variis.

Habitat in *Abietibus*.

*DESCR.* *Antennæ* filiformes, nigrae, articulis 4: infinito brevissimo. *Caput* nigrum, acuminatum. *Thorax* niger, pone rufus, nigredine tripliæ dente separata. *Scutum* nigrum. *Elytra* pallida, latetibus fulvis; versus crucem nigricante macula oblonga. *Pedes* omnes rufi. *Femora* antica crassissima deorsum dentata. *Abdomen* ferrugineum.

970. *CIMEX lacustris linearis*; supra niger depresso, pedibus anticis brevissimis. *It. gaz.* 182. *Fn. 684.*

*Bradl. natur.* t. 26. f. 2. *D.*

*Baub. ballon.* p. 213. f. 1. *Insectum Tipula dictum.*

*List. mat.* t. 5. f. 4.

*Raj. inf.* p. 57. n. 1. *Cimex aquaticus figuræ longioris.*

*Smolandis Braxen - Mygg.*

Habitat in *Aquis quietis*, cursitans supra aquas; *Propolides*, quæ alis carent, spæ copula conjunctæ observantur.

*DESCR.* *Venter* totus subtus albus, ante spæstatus, appetet, pone spæstatus niger. *Elytra* & ale superiores atræt inferiores albæ abscinditæ;

971. *CIMEX stagnorum linearis nigricans teretiusculus*, thorace medio punctis duobus subglobosis.

*Cimex linearis nigricans compressus*, pedibus anticis brevissimis. *Fn. 685.*

*Pet. gaz.* 15. t. 9. f. 12. *Tipula londinensis angustissima.*

Habitat in *Aquis apud nos rarius.*

*DESCR.* Præcedenti simillimus, sed multoties minor & angustior.

258 INSECTA HEMIPTERA. CIMEX.

972. CIMEX *vagabundus* linearis variegatus, pedibus anticis brevissimis crassis inflexis.

Cimex linearis, pedibus quatuor, antennisque longissimis albo fuscoque variis. Fn. 683.

Frisch. germ. 7. p. 11. t. 6. Cimex arborum oblongus alarum signatura alba.

Habitat in arboreis.

DESCR. Magnitudo culicis vulgaris, Alæ, Pedes, Antennæ albo & fuscō confertim variegata. Antennæ corpore longiores, setaceæ inflexæ uti pedes, quibus fibrillæ. Pedes primores multoties breviores reliquis; anteriores crassi uti chelæ, quibus non incedit, nisi in vitro & glabro corpore.

973. CIMEX *tipularius* linearis exalbidus, pedibus omnibus longissimis, femoribus clavatis, antennis biclavatis. Fn. 6-6

Aet. upf. 1736. p. 36. n. 15. Cimex linearis teretiusculus albus, genibus crassis.

Fritsch. germ. 7. p. 28. t. 20. Cimex arboreus culiciformis. Habitat præsertim in Smolandia ad Stenbrohult et alio ratiu-

DESCR. Corpus cinereum, lineare, depresso. Elytra albida, valde striata venis inconspicuis crepatis: Margo elytrorum, ubi in membranam terminatur, notatus 5. l. 6. punctis fuscis. Pedes omnes longi: posticis longissimis. Femora subclavata: clava fuscæ punctata. Antennæ articulus primus apice clavatus, sed apex summus magis clavatus, unde pedes referunt.

974. CIMEX *Coryli* oblongus niger, pedibus antennisque setaceis flavis. Fn. 675.

Habitat in *Corylo* Avellana præsertim, cursitans per folia.

DESCR. Corpus, Caput, Thorax, Scutellum, Abdomen, Elytra, Alæ nigra, immaculata; sed Alæ parum cæruleo nitent in quibusdam. At Artus pallide flavi uti rostrum antennæ, pedes. Antennæ setaceæ sunt.

### Aphis.

975. APHIS Ribis Ribis rubri. Fn. 794.

Leuvenh. arcu. epist. 90. p. 545. t. 548. f. 1. 2. 3. Ael- beseen-luyken.

Jung. verm. p. 163. 164. Ventrones ribiani s. Mellomyjæ. Blank. belg. p. 164. t. 14 f. D. E. Pediculus ribis viridis.

Frisch. germ. 11. p. 9. t. 14. Pediculus arboreus fusco-viri- dis in Ribe.

Reym. gall. 3. t. 22. f. 4.

Habi-

Habitat sub foliis *Ribis rubri*, quæ inde puçulas rubicundas obtinent.

*DESCR.* Magnitudo pédiculi. *Corpus* incubens. *Pedum* viridium genicula dorso altiora, fulca. *Antennæ* corpore longiores, tenties, rectæ; juxta caput geniculò reflexæ, nigræ. *Corpus* fusco-virens. *Pectus* a tergo nigricans. *Lineæ* tres transversæ supra clunes, fere contiguae: latera abdominis nigris punctis. *Ale* quatuor, erectæ, compressæ; albae venis nigris; quædam ducæ minimæ. *Podex* præminet. *Appendices* setaceæ alij breviores.

976. APHIS *Ulni Ulmi campestris*. *Fn.* 705. *It.* *Scam.* 203.

*Reaum. gall.* 3. t. 25. f. 4. s. 6. 7.

Habitat in foliis *Ulmi campestris* vesiculos & foliorum convolutiones cauſans.

*DESCR.* Minores subvirescentes; Majores *Corpo* cylindrico ferrugineo albâ lanugine adsperso. *Abdomine* 6 l. 7 articulis: *Appendiculis* obsoletis; ex anno vesicula.

977. APHIS *Pastinacæ Pastinacæ sativæ*. *Fn.* 706.

Habitat in *Pastinaca sativa*.

*DESCR.* *Corpus* viride. *Caput*, antennæ, gibbus thoracis, pédum extremitates nigræ. *Ale* albae: *Appendiculi* ad latera ventris immobiles,

978. APHIS *Sambuci Sambuci nigriæ*. *Fn.* 707.

*Frisch germ.* II. p. 14. t. 18.

*Reaum gall.* 3. t. 21. f. 6. 15.

*List. loqu.* p. 397. n. 40. *Cimex* exiguus cæsius; cui alæ eū toto membranaceæ prægrandes.

Habitat in *Sambuci nigriæ* petiolis.

979. APHIS *Rumicis Rumicis Lápathi*. *Fn.* 708.

Habitat in *Rumice acuto*.

*DESCR.* *Corpus* nigro-æneum. *Antennæ* nigrae vel albæ apicibus nigris; *Pedes* albidi geniculis nigris. *Cauda* acuminato cornuta. *Alarum basis* virescens; *Appendiculi* atri, filiformes, longitudine caudæ.

980. APHIS *Lychnidis Lychnidis dioicæ*.

*Aphis* *Cueubali*. *Fn.* 719.

Habitat in *Lychnide dioica* frequetis.

*DESCR.* *Tota* atra, polita, nitida, margine abdomen cingente plicata ab domine pone obtuso. *Antennæ* & *Pedes* pallidiores;

981. APHIS *Padi Pruni Padi*.

Habitat in *Pado*.

*DESCR.* *Ale* magna, *Antennæ* longæ,

982. APHIS *Rosæ* Rosæ. Fn. 710.

Habitat in ramis *Rosæ caninae*.

DESCR. Cornua longitudine fere abdominis, nigra. Corpus viride vel incinctum. Antennæ nigræ longitudine abdominis. Genicula pedum viridi-nigra.

983. APHIS *Nymphææ* plantarum aquaticarum. Fn. 711.

Habitat in *Nymphæis* & *Potamogetone natante*, mense Augusti. De Geer.

984. APHIS *Tiliæ* Tiliæ europææ. Fn. 712.

Frisch germ. II. p. 13. t. 17. Pediculus arboreus in *Tilia*.  
Habitat in *Tilia europæa*

DESCR. Corpus oblongum. Ordines quatuor longitudinales punctorum atrorum a tergo abdominis. Thoracis linea lateralis utrinque nigra. Alæ adscendentæ, compressæ; majores inferiori marginè nigrae, superiore marginè maculatae seu exteriore marginè linea nigra superne septem maculis nigris. Antennæ & Pedes alternatim albo nigroque variegati.

985. APHIS *Brassicæ* Brassicæ oleraceæ.

Frisch. germ. II. p. 10. t. 3. f. 15.

Habitat in *Brassicæ oleraceæ* foliorum aversa pagina, unde folia pallescunt.

DESCR. Corpus viride farinaceo-albidum,

986. APHIS *Craccæ* Viciæ Craccæ.

Habitat in *Vicia Cracca*.

DESCR. Corpus obovatum, marginatum, nigro-plumbeum & quasi farina canescente adpersum.

987. APHIS *Cirsii* Serratulæ arvensis.

Aphis Serratulæ. Fn. 713.

It oel. Jun. 12.

Habitat in *Serratula arvensis*.

DESCR. Corpus fuscum: punctorum elevatorum ordinibus sex in dorso. Alarum rudimenta, appendiculi, pedes, antennæ nigrae. Femora versus basin alba.

988. APHIS *Cardui* Cardui. Fn. 714.

Habitat in *Cardui* caulis.

DESCR. Tota aeneo-nigra nitida, sed pedibus antennisque nigris basi albidis. Appendiculi abdominis atri.

989. APHIS *Tanaceti* Tanaceti vulgaris..

Habitat in *Tanaceti vulgaris* foliis, distincta ab Aphide vi-

ridi in caulis Tanaceti, que communis pluribus plantis.

DESCR. Corpus rufum s. saturate ferrugineum: corniculis subfuscis. Alarum rudimenta, Antennæ & Pedes pallidiora.

990. APHIS *Absinthii Artemisiæ Absinthii*. Fn. 715.

Habitat in *Absinthiiis variis*.

DESCR. Artus, pedes, appendiculi, antennæ nigra. Corpus nigrum, tergo cinereo, cum in medio tergi supra abdomen macula magna fusca. Latera abdominis etiam parum fusca. Cauda acuminata acuta. Appendiculi errecti.

991. APHIS *Jaceæ Centauræ Jaceæ*. Fn. 716.

Habitat in caulis Centaurea Jacea.

DESCR. Tota nigra est absque ulla albedine; folia Alæ albæ; posteriora abdominis magis fusca ad rubedinem inclinantia: margo crassior alarum lineola lata alba exaratus.

992. APHIS *Betulæ Betulæ albæ*. Fn. 717.

Habitat in *Betula rarius*.

DESCR. Corpus pallide virens: puncta 4 nigricantia in margine singulæ incisuræ utrinque. Minima est: caret alis & appendiculis.

993. APHIS *Roboris Quercus Roboris, corniculis obsoletis astris medii abdominis*.

Habitat in *Quercus Roboris ramis*.

DESCR. Corpus nigrum majuscum subglobosum ovatum: corniculorum rudimentis atris; Femora purpurascens. Antennæ corpore dimidio breviores lividae, apice nigrae.

994. APHIS *Pini Pini*. Fn. 718.

Habitat in *Pino sylvestri*.

OBS. Appendiculi brevissimi.

995. APHIS *Salicis Salicis*.

Habitat in *Salicis capreae, viminalis, pentandriæ ramis*.

DESCR. Corpus majuscum, nigrum: Puncta dorsi 4 alba reliquis majora; ad latera adspersum punctis linearibus transversis albis. Subtus albicans. Cornicula egrege fulva. Antennæ corpore dimidio breviores.

996. APHIS *Populi Populi tremulæ foliorum*.

Habitat in *Populo tremula*.

DESCR. Corpus ovatum, lividum, maximum, margine utrinque punctis 5 albis prominulis. Cornicula nulla. Alarum rudimenta acuta.

997. APHIS *Tremulae Populi tremulæ ramorum*.

Habitat in caudice & ramis *Populi tremulae*.

DESCR. Corpus oblongum, maximum, livido-fuscum, marginatum. Antennæ flavescentes. Aestate mutat colores.

998. APHIS *bursaria Populi nigrae*. Fn. 1355. It. scan. 311.  
Act. holmens. 1742. p. 232.

- Jung. verm. 161, 62. Populi nigrae vermes s. Muscæ.  
*Ambros. hort.* 97. t. 96. Folliculi in pediculis foliorum Po-  
 puli nigrae.  
*Hoffm. ait. hort.* 5. Culices in Populo nigra.  
*Rupp. jen.* 3. p. 333. Culices in Populo nigra.  
 Habitat in utriculis ovatis ore perviis petiolis innatis vel in  
 sacculis coloratis superne dehiscentibus vel clavis sub  
 foliorum disco in *Populo nigra* ad Runnaby, Gothoburgi;  
 Holmiæ, nunc Upsaliæ,

999. APHIS *Aceris* Aceris platanoidis. Fn. 709.

*Reaum. gall.* 3. t. 22. f. 6-10.

Habitat in *Aceris platanoidis* foliis.

DESCR. Corpus latius. Caput & Thorax in medio nigra. Abdomen su-  
 pra verrucis adspersum, postice macula fusca cordata anterius bifida;  
 corniculus oblitteratis obtusissimus. Antennæ setaceæ.

1000. APHIS *Atriplicis* Atriplicis littoralis.

Habitat in *Atriplicis littoralis* foliis, quæ inde revolvuntur  
 longitudinaliter in cylindrum, intra quem vagantur obtecta.

DESCR. Corpus viride; corniculus minutus. Oculi nigri.

## Chermes.

1001. CHERMES graminis Airæ flexuosa. Fn. 673.

Habitat in *Aira flexuosa*.

DESCR. Magnitudo Cicadæ & ejusdem faciei, ut primo intuitu Cicadæ  
 species salutaretur. Antennæ albescant apicibus nigris. Alæ quatuor non in  
 crucem complicata, sed deflexæ, ut in phalæna. Abdomen nigricans in-  
 cituris margine albis. Pedes albi, non saltatorii. Caput obtusissimum,  
 una cum thorace griseum, lineolis albis pictum. Alæ aquæ, venis fu-  
 scis variis anaestomosis.

1002. CHERMES Ulmi Ulmi campestris. Fn. 694.

Habitat intra revoluta folia *Ulmi campestris* cum Aphidibus  
 ejusdem.

DESCR. Larva subrotunda, cinerea punctis elevatis nigris; obtecta lanu-  
 gine alba copiosa.

1003. CHERMES Ceraustii Ceraustii viscosi. Fn. 695.

Habitat in *Ceraustio viscoso monstroso* foliis ventricoso-infla-  
 xis in capitulum.

1004. CHERMES Pyri Pyri communis.

Habitat in *Pyro vulgari*.

DESCR.

*DESCR.* *Corpus* griseum. *Abdomen* breve striis transversis albidis. *Ale* in margine dorsali puncto obscuro.

1005. CHERMES *Calthæ* *Calthæ palustris*.

Habitat in *Calthæ palustris* floribus.

*DESCR.* *Antennæ* clavatae; longitudine thoracis, apice nigrae. *Thorax* Intercens: lineis duabus arcuatis ex una basi versus latera flexis & tertio arcu transversali postico priores interlacante. *Ale* albæ: superiores venis flavescentibus & puncto communij fusco.

1006. CHERMES *Urticæ* *Urticæ dioicae*. Fn. 702.

Habitat in *Urtica dioica*.

*DESCR.* *Fusca* lateribus pedibusque albidis. *Cauda* reflexa. *Antennæ* nigrae versus basin albæ. *Oculi* flavelcentes.

*LARVA* monstrosa, facies pediculi, depresso; ventre ciliato.

1007. CHERMES *Betulae* *Betulae albæ*. Fn. 697.

Habitat in *Betula alba*, iucco viridi tintorio plena.

*DESCR.* *Abdomen* incarnatum linea transversa lata nigra in singula incisura solitaria, scilicet 5 in tergo, 3 in ventre. *Pectus* pallidum, ut & caput. *Antennæ* setaceæ: *Cauda* acuta; *Ale* 4 pellucidae, nitidae. *Succus* viridis tintorius intra corpus.

1008. CHERMES *Alni* *Betulae Alni*. Fn. 698.

*Ast. upf.* 1736. p. 36. n. 27. *Cimex cauda plumosa corpus tegente.*

*Frisch. germ.* 8. p. 28 t. 13. *Vermis suctorius alni.*

Habitat in *Alno* cujus ramos vere operiant & quasi lana vestiunt pupulæ.

*DESCR.* Insectum album, acuminatum. *Oculi* laterales, prominuli. *Pedes* sex, quorum duo posteriora paria propiora. *Cauda* acuminata, bifurca, supra hanc quasi stylus prominulus. *Antennæ* variegatae. *Os* apice nigro, situm in ipso ventre inter primum & secundum par pedum. *Ale* 4 albæ venis fuscis. Salit.

*LARVA* magnitudine pediculi, corpore planiusculo, viridi-maculato, ventre obtuso, postice elevato, versus caudam nigro. *Antennæ* albæ, superne nigrae, tenues, rectæ. *Elytrorum* rudimenta. *Cauda* villis multis, reflexis, diaphanis, retroflexis, corpus tegentibus, albis. *Vesicula* sive guttula intra lanam e cauda egressa sepe observatur. *Oculi* rubri. Sedent plures in ramis alni proximæ, capite deorsum spectantes, ut alterius cauda proximam ex parte tegat.

1009. CHERMES *Quercus* *Quercus Roboris*.

Habitat in *Quercus Roboris* foliis.

*DESCR.* *Corpus* flavo-albicans. *Elytra* ad marginem exteriorem lituris quatuor fuscis & unica ad marginem interiorem.

1010. CHERMES *Fagi* *Fagi sylvaticæ*. It. scan. 65.

*Reaum.* *inf.* 3. *t.* 26. *f.* 1-6.  
Habitat in *Fagi sylvaticæ* foliis.

1011. CHERMES *Abietis Pini Abietis.* *It. goth.* 180.

*Frisch. germ.* 12. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 3. *Insectum tuberculi muri-*  
*cati arboris Taxi.*

*Flor. lapp.* *p.* 218. *n.* 347. *E.*

*Clus. pann.* *p.* 20. 21. *Picea pumila.*

*Hoffman.* *fl. altd.* 1. *Picea pumila.*

Habitat in *Abietis türionibus*, quæ fiunt in summitatibus ra-  
morum monstrosoe imbricatis, dilatatis ad basin foliolis,  
brevioribus etiam factis, apud nos frequens, similis frago  
viridi. Corpus in ipsis ramorum Abietis extremitatibus fra-  
giforme, habet exstus supra se & inter squamas foliaceas  
imbricatas, in sinu squamarum, plurima animalcula par-  
va, e quorum ano quasi lana prominet. Juxta basin hu-  
jus corpusculi s. fragi observatur lana majori in copia, in  
qua mater minorum, quæ caussat fragum. Autumno  
omnes e suis strobilis exirent alatae.

DESCR. *Corpus pallide flavescens;* *Oculi fuscæ,* & minimo puncto ni-  
gricante inter oculos. *Antennæ setaceaæ.* *Alas gerit uti Chermes Alni.*  
*Os sub thorace vel ex thorace.* Non salit.

1012. CHERMES *Salicis Salicis.* *Fn.* 701.

Habitat in *Salice varia.*

DESCR. *alba est.* *Abdomen supra maculis obsoletis.* *Thorax linea trans-*  
*versa nigra.* *Antennæ infra medium albæ,* extra medium nigrae.

1013. CHERMES *Fraxini Fraxini excelsioris.* *Fn.* 703.

Habitat in *Fraxino excelsiore.*

DESCR. *Alis thoraceque nigro maculatis.*

1014. CHERMES *Aceris Platanoidis.* *Fn.* 696.

Habitat in ramis & pedunculis *Aceris platanoidis.*

DESCR. *Est inter hujus generis minores, vix pediculum in auge magnitudine superans.* *Totum a tergo e flavo virens subtus dilute virescens.*  
*An apice subulato, dilute viridi suscescente.* *Oculi etiam dilute flaventes.*

## Coccus.

1015. COCCUS *Hesperidum Hybernaculorum.* *Fn.* 722.

*Hire. act. gall.* 1692. *p.* 14. *t.* 14.

*Frisch. germ.* 12. *p.* 12.

*Reaum. gall.* 4. *t.* 1. *f.* omnes.

*Act. upf.* 136. *p.* 37. *n.* 9. *Pediculus clypeatus.*

Hospitatur in *Citro* præsertim, in *Caldariis* sive *Hybetnaculis* vulgarissimus, caules ramosque deturpans lepræ instar; frequens in *Sapindo* aliisque.

*DESCR.* Crusta ovalis, depressa, cymbiformis, patellæ instar: postice emarginata, pro lubitu pedes exserens & retrahens.

1016. COCCUS *Quercus Quercus Roboris.*

Habitat in *Quercu Robore.*

1017. COCCUS *Betulae Betulæ albæ.* *Fn.* 723.

Habitat in *Betulæ albæ* ramorum divaricationibus solitarius.

1018. COCCUS *Carpini Carpini Betuli.* *It. scan.* 47.

Habitat in *Carpino Betulo.*

1019. COCCUS *Ulmi Ulini campestris.*

Habitat in *Ulmo campestri.*

1020. COCCUS *Coryli Coryli Avellanæ.*

Habitat in *Corylo Avellana.*

1021. COCCUS *Tiliæ Tiliæ europeæ.*

Habitat in *Tilia europaea.*

1022. COCCUS *Salicis Salicis hermaphroditæ.*

Habitat in *Salicis hermaphroditæ* ramis, quos sæpe obtagit undique.

*DESCR.* Corpus minutissimum, vix nudis oculis conspicuum, rubrum, in senioribus planiusculum cinereum.

1023. COCCUS *polonicus radicis Scleranthi peregrinis.* *Act.*

*upf.* 1742. *p.* 54. *t.* 1.

*Coccus radicum purpureus.* *Fn.* 720.

*Cornar.* *dioscor.* 1. 4. *c.* 39. *Granum zschinbitz.*

*Scalig.* *exerc.* 325. *n.* 13.

*Camer.* *epit.* 691. *Polygonum cocciferum.*

*Baub.* *pin.* 281. *Polygonum cocciferum.*

*Baub.* *bijt.* 3. *p.* 378. *Polygonum polonicum cocciferum.*

*Chabr.* *sciagr.* 454. *Polygonum polonicum cocciferum.*

*Paulli.* *quadrip.* 113. *Ova insecti incogniti.*

*Raj.* *bijt.* 186. *Polygonum Polonicum cocciferum.*

*Tykoffsch.* *phys.* 3. *s.* 10.

*Kzaczychsch.* *polon.* 95.

*Berniz.* misc. N. C. dec. I. ann. 1. obs. 8.

*Rupp.* jen. 86. Knawel folio & flore albicante.

*Dal.* pharim. 84. *Polygonum cocciferum*.

*Breyn.* comm. physico-technic. 1731. p. 413.

act. lips. 1731. p. 406.

act. angl. 421.

act. physico-med. N. C. vol. 3. app. 5. t. 1. *Coccus tinctorius radicum*.

prodr. 3 app. 1.

*Frisch.* germ. 5. p. 6. t. 2 *Cochinella germanica*.

*Reaum.* gall. 4. mem. 2 p. 1. n. 143. Progall, insectum grani scarlatini Pölonici.

Habitat apud nos rarius (uti multi me certiore fecere) circa tempus Johannis, ipse tamen non dum reperi: provenit in *Sclerantho perenni*; similis reperitur in *Pimpinella saxifraga* Loef. pruss. 194. & alias in *Potentilla fruticosa* Gerber; utrum diversæ speciei jadident avithoptæ. Semper radicibus adhæret sub terra.

1024. COCCUS *Pilosellæ* radicis Hieracii *Pilosellæ*. *Act. upf.*

1742. p. 54. t. 2.

*Pauli.* quadr. 113. ova insecti incogniti.

Habitat ad radices *Hieracii Pilosellæ*.

1025. COCCUS *Uvæ Ursi* radicis Arbuti *Uvæ ursi*. *Act. Helmensi*.

Habitat ad caules terræ immersos *Uvæ Ursi*, locis minus siccis.

DESCR. Corpus rufum, succo sanguineo, tandem indutum foliulo laxe albo ovato.

1026. COCCUS *Phalaridis* Phalaridis radicum. *Fn.* 721.

Habitat ad radices *Phalaridis canariensis* in terra prægnante, & quidem copiose, ubi Formicæ rubræ sedulo terram iodiunt & accedunt.

DESCR. Animal magnitudine feminis *Cannabis*, exalbidum, solis *Pedibus* parum incarnatis. *Antennæ* vix corporis  $\frac{1}{4}$  partem adtingunt. *Rostrum* inflexum. *Anus* retusa, vix villosa. *Volatile* non vidi, proin utrum *Coccus*, *Aphis* aut *Chermes* sit, hæreo.

## Thrips.

1027. THRIPS *Physapus* elytris glaucis, corpore atro.

*De Geer.* act. stockh. 1744. p. 3. t. 4. f. 4. *Physapus ater*,  
alis albis. Habi-

Habitat in floribus, præsertim luteis *compositis*, uti in Leon-todonte, Chrysanthemo, Chamomilla, Buphtalimo etc. autumno frequentissima. Hæc forte unde Loti corniculatæ flores clausi intumescunt & Secales spicæ sæpe abortiunt.

*DESCR.* Corpus lineare, atrum est. Antennæ rectæ, filiformes, attræ breves, sex articulis. Alæ angustissimæ, rectæ, Elytris angustissimis, albidæ griseis, tenuissimis, flexilibus, longitudine fere abdominis; margine, præsertim apice, hirsutis, basi autem pallidioribus: hæc alæ rectæ elytris efficiunt in tergo lineam angustissimam, nudis utrinque relictis abdominis lateribus nigris. Currit celerrime; saltat; variis modis abdomen flectit & vibrat, non facile volitat. Larva coccinea, capite pedibus antennisque nigricantibus, in floribus Chamomillæ frequentissima inter flosculos, incedens ac si perfectum esset animalculum.

### 1028. THRIPS *minutissima* elytris corporeque glaucis, oculis fuscis.

Habitat in Floribus.

*DESCR.* Inter congeneres omnium minima est.

### 1029. THRIPS *Juniperina* elytris niveis, corpore fusco.

*De Geer* act. stockb. 1744. p. 6. t. 1. f. 2. *Phylapsus fuscus*, alis alblicantibus.

Habitat in Junipero. *De Geer*.

### 1030. THRIPS *fasciata* elytris albis nigrisque fasciatis, corpore fusco. *En.* 727.

Habitat in floribus, uti præcedentes, sed rario rarior aliis.

*DESCR.* Omnia, ut in præcedenti, sed fasciæ transversæ albae & nigrae alias distinguunt; Animal totum atrum. præcedenti majus, Elytri nigrae fasciæ tres niveæ lecant, quarum una in apice, altera in medio, tertia versus basin elytrorum.

## III. LEPIDOPTERA.

### Papilio.

#### §. EQUITES.

### 1031. PAPILIO *Machaon* alis caudatis concoloribus flavis; fasciis fuscis; angulo ani fulvo.

Papilio hexapus; alis flavo nigroque variegatis; secundariis angulo subulaçō maculaque fulva. *En.* 791.

*Mouff.*

*Mouff. angl. p. 968.*

*lat. p. 99.*

*Hoff. inf. I. t. 12. edit. alt. t. 9. f. 10.*

*Hollar. muse. t. 5. f. 2.*

*Aldr. inf. p. 96. n. 5. 6. f. 1.*

*Jonst. inf. p. 40. n. 2. t. 5. 7.*

*Jung. verm. 134. Eruca rutacea.*

*Merian. europ. I. p. 13. t. 38. Basse la Reine.*

*Merret pin. 198. Papilio diurna maxima 2:da.*

*Misc. nat. Curios. ann. 2. dec. 2. p. 49. f. 9.*

*Column. ephbr. 2 p. 85. v. 86. Papilio erucæ rutaceæ.*

*Rob. ic. 18. male.*

*Reaum. gall. I. t. 30. f. 1.*

*Frisch. germ. 2. p. 41. t. 10. Eruca anethi.*

*Pet. mus. p. 35. n. 328. Papilio major caudatus ex nigro & luteo variegatus.*

*Raj. inf. 110. n. 1. Papilio alis amplissimis, flavicante & nigro coloribus pulchre variegatis; interioribus caudatis.*

*Habitat in Ruta, Anetho, Seseli (Fœniculo tortuoso), Pimpinella, Selino.*

*DESCR.* Alæ, pedes lingua nigra. Antennæ clavatae. Alæ primores ovatae, obtusaæ, integerriæ, nigro flavoque variegatae, seu nigras concipiæ; quibus juxta marginem crassiorem maculae tres, lunares, flavæ; juxta marginem vero posteriorem maculae 8, parvæ; & in medio inter ambos descriptos ordines, a marginé interiore versus angulum alæ, maculae 7, juxta se collocatae, quarum interiores majores. Alæ posticæ denticulatae, quarum posterior angulus linearis productus & reliquis multo longior: margo hujus alæ 6 maculis flavis lunulatis pictus, præter septimam maculam, quæ anno proxima est, & ocello fulvo cæruleo colore cincto spectabilis; discus hujus alæ flavus. Larva glabra, suaveolens, 16pus, tacta duo Tentacula fulva exserens.

### §. HELICONII.

1032. PAPILIO *Apollo* alis oblongis integerrimis albis: posticis ocellis supra quatuor; subtus sex basique rubris.

Papilio hexapus; alis rotundatis integerrimis albis; secundariis ocellis quatuor superne, septem inferne. *It. gotl. 230.*  
*Fn. 302.*

*Mouff. lat. p. 94. f. 3. Phalæna media 1.*

*Pet. mus. 49. n. 502. Papilio alpinus ex albo nigreque variegatus, iride rubente oculatus.*

*Pet. gaz. 37. t. 23. f. 8. Papilio alpinus.*

*Raj. inf. 139. n. Papilio alpina major, alis albicantibus: exterioribus maculis nigris notatis, interioribus ophthalmoidibus: iride rubra.*

*De Geer. inf. t. 18. f. 8-13.*

Habia

Habitat in *Sedo Telephio* frequens.

*DESCR.* Mole cum maximis nostris certat. *Corpus* nigricans lana cinerea. *Alæ* erectæ, rotundatae, albæ, venis pallidis & farina cinereo-nebulosa perfusa apice & margine postico membranaceo. *Alæ primariae* 3 maculis nigris versus marginem crassiorum, unica nigra versus interiorem, quæ omnes utraque superficie adparent. *Alæ secundariae* ocellos albo, (in medio) rubro, nigro, cæruleo constructos, duos utrinque conspicuos habent, & juxta basin ocellos 4 cæcos absque pupilla alba; & versus anum unicum ocellum nigrum pupilla rubra: hi posteriores subitus conspicui. *Pedes* 6. *Antennæ* clavatae apice subtus nigrae. Sub ano membrana crassa, concava, carinata.

1033. PAPILIO *Mnemosyne* alis oblongis integerrimis albis nigro nervosis: priuoribus maculis duabus nigris marginalibus.

*Udd. diff.* 55. Papilio hexapus alis rotundatis albis: primariis maculis quatuor venisque nigris.

## Habitat in Finlandia.

*DESCR.* Simillimus præcedenti, sed minor & absque ocellis. *Alæ* albæ venis nigris. *Primores* margine postico nudæ s. membranaceæ; in medio ad costam due maculae nigrae. *Posticæ* etiam maculis duabus nigris: priore ad marginem anteriorem minore; posteriore in medio disci maiore. *Anus* organo majore cartilagineo singularis structuræ in femina.

1034. PAPILIO *Cratagi* alis integerrimis rotundatis albis: venis nigris. *It. gall.* 182. *Fn.* 796.

*Aldr. inf.* p. 245. t. 246. f. 6. *mala.*

*Hoffn. inf.* t. 10. f. 14.

*Merr. europ.* 2. p. 38. t. 35. f. *superiores,*  
*gall.* t. 157. (*edit. alt.*) 85.

*Alb. inf.* t. 2. f. 2.

*Pet. mus.* p. 33. n. 301. Papilio alba, venis nigris.

*Frisch. germ.* 5. p. 16. t. 5. Eruca hyemalis luteo alboque striata.

*Raj. inf.* 115. n. 5. Papilio alba, nervis alarum nigris, brasicæ majoris figura & magnitudine.

*Reaum. gall.* 2. t. 2. f. 9. 8.

*De Geer inf.* t. 14. f. 13-19.

Habitat in *Pruno spinosa*, *Cratago Oxyacantha*. *Sorbo.*

*DESCR.* Alæ rotundatae albæ venis nigris nervosæ, margine denudatae: concolores. *Priuores* ad costam lunula nigra.

Forte & hujus speciei sit, *Papilio ex Eruca gregaria* majore proveniens sordide albicans venis nigrantibus. *Raj. hist.* 17. & *Larva labyrinthiformis* *It. aland.* 62.

1035. PAPILIO *Brassicae* alis integerrimis rotundatis albis: priuoribus bimaculatis: apicibus nigris, major. *Fn.* 799.

*Monff. lat.* p. 189. f. 1. *Eruca in Brassica.*

*Ged.*

Gæd. belg. I. p. 59. f. 11.

Lijst. gæd. p. 16. f. 7.

Mer. europ. I. p. 16. t. 45.

Blank. belg. p. 24. t. 4. f. A. B. C. D.

germ. p. 19. t. 4. f. A. B. C. D.

Alb. inf. p. 1. t. 1.

Swam. quart. p. 202. t. 13. f. 6.

fol. t. 37. n. 6.

Reaum. gall. I. t. 29. f. 1. ♂ t. 10. f. 7.

Pet. mas. p. 85. n. 825. Papilio albus vulgaris major.

gaz. t. 62. f. 3. Papilio alba major, apicibus nigris.

Raj. cantab. p. 134

inf. p. 113 n. 1. Papilio brassicaria alba major vul-

gatissima.

Raj. inf. p. 348. n. 19. Eruca brassicaria maxime vulgaris,

nigro luteo & cæruleo coloribus variegata.

Habitat in *Braffica*.

*DESCR.* Alæ supra albæ primorum apicibus nigris; subtus cinerascentes; secundariarum margine exteriore baseos flavo.

*MAS* maculis tribus nigris in *primo* prona ala; in *secundaria* prona vero unica; *FÆMINA* in prona parte nullam maculam nigram gerit excepto apice alæ.

1036. PAPILIO *Rapæ* alis integerrimis rotundatis albis: pri-

moribus bimaculatis apice nigris, minor. Fn. 798.

Mouff. angl. p. 971. f. 9. 10.

lat. p. 103 f. ultim. Papilio diurnus mediuss.

Gæd. belg. I. p. 97. f. 27.

Lijst. gæd. p. 22. f. 8

Mer. europ. 2. p. 40. t. 39. edit. gall. t. 89.

Blank. belg. p. 29. t. 5. f. A. B. C. D.

germ. p. 23. t. 5.

Rob. icon t. 6.

Alb. inf. t. 51. f. C. D. (*Mas*) ♂ E. F. (*Fæmina*.)

Reaum. gall. I. t. 29. f. 7. 8. ♂ t. 2. f. 3.

Merr. pin. 198. n. 5. Papilio corpore & antennis livescen-

tibus, capite aliquaque pallidis

Pet. mas. p. 85. n. 826. Papilio vulgaris albus minor;

gaz. p. 10. t. 64. f. 4. Papilio alba vulgaris striata,

maculis duplicibus. (*fæmina*.)

p. 10. t. 49. f. 11. Papilio albus minor, apici-

bis. nigris. (*Mas*.)

Raj. inf. 114. n. 2. Papilio alba media, alis exterioribus

albis, deabus maculis nigris infra medium longitudinem

ver-

versus interiorem marginem notatis, interioribus subtus nigricantibus.

p. 349. n. 20. Eruca Brassicam depascens viridis mediocris, linea in utroque latere e luteo albente.

p. 114. n. 3 Papilio alba media, alis omnibus albis cum macula (seu punctum mavis dicere,) leviter nigricante in exterioribus (Mas.)

Habitat in *Brassica* & *Tropaeolo*.

DESCR. Simillimus praecedenti sed dimidio minor. Alæ primores tuta apice cinereæ & in femina maculis duabus nigris.

Larva viridis, a prioris diversissima, licet utriusque Papiliones inter se adeo similes, ut demita magnitudine vix distingui queant.

1037. PAPILIO *Napi* alis integerrimis rotundatis albis: subtus venis dilute virescitibus. Fn. 797.

Mer. europ. (edit. 1) v. 2. p. 77. t. 39.

Alb. inf. t. 52. f. F. G.

Pet. mus. p. 33. n. 302. Papilio albus medius: venis latis, subtus nigricantibus.

gaz. t. 62. f. 4. nomen idem.

Raj. inf. 114. n. 4. Papilio brassicaria media, alis albis secundum nervos lineis e viridi nigricantibus subtus striatis.  
in *Brassica*.

SCR. Simillimus praecedenti, at subtus venis dilatatis obscurioribus. Femina in alis anterioribus bimaculata.

1038. PAPILIO *Sinapis* alis integerrimis rotundatis albis immaculatis: apicibus fuscescentibus. Fn. 800.

Pet. mus. 33. n. 303. Papilio albus minor.

Habitat in sylvis.

DESCR. Simillimus praecedentibus. Alæ primores apice macula fusca subrotunda.

1039. PAPILIO *Cardamines* alis integerrimis rotundatis albis: primoribus medio fulvis; posticis subtus viridi-nebulosis.

Papilio hexapus; alis rotundatis integerrimis: secundariis viridi-nebulosis; primoribus lunula nigra. Fn. 801.

Mouff. lat. p. 106. n. 5. f. 2. 3. 4.

Hoffn. inf. 2. t. 9. f. I.

Jonst. inf. t. 5.

Bry. renov. t. 22.

Rob. ic. t. 21.

Valent. herb. t. 183.

Merian. europ. t. 181.

*Petiv. mus. p. 33. n. 306.* Papilio albus subtus viridi colore marmoreatus s. inaculis croceis ornatus.

*Raj. inf. 115. n. 6.* Papilio minor alba, alis exterioribus albis macula insigni crocea splendentibus, inferioribus superne albis, subtus viridi colore variegatis.

α *Raj. inf. p. 115. n. 7.* Papilio minor alba, alis exterioribus ad imum marginem nigris aut fuscis, macula in medio nigra.

*Pet. mus. p. 33. n. 305.* Papilio alba subtus viridi colore marmoreata; fæmina.

Habitat Upsaliæ frequens.

DESCR. Antennæ clavatae, exalbidæ. Alæ albæ, sed primores extus apice fuscæ, subtus flavo-cinereæ cum inacula s. puncto lunulato fusco in medio alæ utriusque pagina. Alæ secundariae subtus viridi-nebulosæ, supra albæ, versus basin fuscæ. Oculi virescentes, maculati. Mas in ala superiori, ejusque in medio a pagina exteriore, macula lata crocea distinctus.

1040. PAPILIO *Hyale* alis integerrimis rotundatis flavis; posticis macula fulva: subtus puncto sesquialtero argenteo.

*Pet. gaz. t. 14. f. 11.*

*Raj. inf. 112. n. 6.*

*Edw. av. t. 304. f. 1, 2.*

Habitat in Scania rarissime.

DESCR. Simillimus Palænoni, sed Alæ magis flavæ. Alæ primores flavæ, apice nigræ, nigredine fascia quasi lutea in duas partes dissecta. Secundariae supra in medio puncto s. macula ferruginea, cui subtus opposita puncta duo argentea approximata, annulo ferrugineo cincta: altero puncto valde parvo. Antennæ & margo ciliaris alarum rubra ut in sequente.

1041. PAPILIO *Palæno* alis integerrimis rotundatis flavis apice nigris margineque fulvis; posticis subtus puncto argenteo.

*Uddm. diff. 56.* Papilio hexapus, alis rotundatis albis ocello parvo fuscō oblongo; apicibus fuscis.

Habitat in Pteride rarissime Upsaliæ, frequentior in Fiudania.

DESCR. Antennæ & Pedes rubri. Alæ flavescentes aut albæ marginibus exterioribus rubris. Primores apice supra late nigræ, disco utrinque puncto nigro. Posticae subtus cinerescentes, in medio puncto argenteo lunatae, imprimis in superioribus; basis alarum inferiorum subtus rubra.

1042. PAPILIO *Rhamni* alis integerrimis angulatis flavis: singulis puncto flavo: subtus ferrugineo.

Papilio hexapus; alis angulatis flavis puncto ferrugineo. Fn. 795.

*Monff. angl. p. 198.*

*lat. p. 103. p. 1.* Papilio diurnus medius t.

*Jonst.*

*Fonst.* *inf.* 42. *n.* 1. *t.* 5. 6.

*Hoffn.* *inf.* 1. *t.* aut. 12. *f.* 8. *t.* 2.

*Rob.* *ic.* *t.* 13.

*Alb.* *inf.* *t.* 2. *f.* 3.

*Pet.* *mus.* *p.* 1. *n.* 1. Papilio sulphureus (Mas.)

*Raj.* *inf.* 112. *n.* 4. Papilio præcox sulphurea f. flavo-viridis, singulis maculis ferrugineis notatis.

*De Geer.* *inf.* *t.* 15. *f.* 1-10.

β *Pet.* *mus.* *p.* 1. *n.* 2. Papilio sulphureus pallidus. (fæmina.)

*Vulgo* Papilio canicularis.

Habitat in *Rhamno* frequetis.

DESCR. *Antennæ* ferrugineaæ. *Alæ* flavæ: puncto in singulæ alæ medio utrinque ferrugineo, & ad marginem alatum primorum anteriorem puncta minutissima ferruginea. *Alarum secundiarum* apex acutus; discus utrinque puncto ferrugineo. *Pedes* albidi.

1043. PAPILIO *Hyperantus* alis integerrimis fuseis: primoribus subtus ocellis tribus: posticis utrinque quinque. *Fn.* 788.

*Pet.* *mus.* *p.* 34. *t.* 313. Papilio mediuss; omnino fuscus; plurimis ocellis nigris in circulis luteis subtus ornatus.

*Raj.* *inf.* 129. *n.* 7. Papilio medius totus pullus, prona alarum parte ocellis aliquot e puncto albo duplici circulo nigro & sordide luteo cincto compositis illustrata.

Habitat in sylvis.

DESCR. *Alæ* concolores, fuscae; margine albido. *Primores supra* punctis 2 nigris, vix ocellatis; *Subtus* ocellis 3. postico minore. *Secundariæ supra* punctis 2; *Subtus* ocellis 2 approximatis anterioribus & 3 posterioribus distinctis.

1044. PAPILIO *Pamphilus* alis integerrimis fulvis: subtus primoribus ocello unico; posticis fascia alba. *Fn.* 789.

*Pet.* *mus.* *p.* 34. *n.* 311. Papiliunculus aureus oculatus in ericetis frequens.

*Raj.* *inf.* 125. *n.* 19. Papilio parva e fulvo & fusco bicolor; fulvo medium alam, fusco oras extreimas occupante; cum ocello ad extimum angulum alarum exteriorum.

Habitat in Ericetis.

DESCR. Raji descriptio bona est. *Alæ supra* fulvae margine subfuscæ, *subtus* cinerascentes; Ocellus in ala primaria subtus unicus est & niger puncto albo annuloque nigro. *Alæ secundariæ subtus* cinereæ: antice obscuriores: in medio fascia pallida & ocellis oblitteratis quatuor notatae.

1045. PAPILIO *Arcania* alis integerrimis ferrugineis: subtus primoribus ocello unico; posticis quinis;

Habitat in Pratis & Sylvis.

*DESCR.* Parvus. *Alæ Primores supra* antice ferrugineæ, postice nigricantes margine albido; *Subtus ferrugineæ*, versus apicem ocello imputissimo. *Postice supra* fuscæ margine albido; *subtus griseæ*: postice linea argentea; medio fascia lata alba; ocellus ante fasciam, ad marginem exteriorem, niger; ocelli quatuor ad postica fasciæ albæ, pupilla argentea; horum ocelli duo anno propiores majores. Præcedenti facie accedit.

1046. PAPILIO *Hippothoë* alis integerrinis: supra fulvis immaculatis, subtus cinerascentibus punctis ocellaribus numerosis.

Habitat apud nos rarissime.

*DESCR.* Statura P. virgaureæ. *Alæ supra* omnino fulvæ immaculatae; *Subtus* luteo-cinerascentes. *Primores subtus* punctis nigris iride alba: 3. majoribus intra marginem exteriorem; 7 minoribus fere transversim positis; 6 minutissimis ad marginem posticum. *Secundariae subtus* cinerascentes punctis ocellaribus circiter 17, præter fasciam ad marginem posticum fulvam, antice nigro-punctatam.

1047. PAPILIO *Hero* alis integerrimis fuscis: subtus primoriibus ocellis duobus; posticis senis.

Papilio tetrapus, alis rotundatis fulvis: subtus cinerascentibus: fascia alba ocellisque quinis. Fn. 790.

Habitat in Dalekarlia frequentius C. Blom. Upsaliæ rarius.

*DESCR.* Corpus præcedenti paullo majus. *Alæ Primores supra* fuscæ, versus apicem ocello ferrugineo coeco. *Subtus* fuscæ versus apicem, fasciola albida, margine lutes extra lineam argenteam; ocelli duo inter marginem & fasciolam albidi, quorum exterior iride nigra pupillaque nivea; interior coecus iride lutea punctoque nigro. *Postice supra* fuscæ, versus postica ocellis sex ecceis; iride lutea pupillaque nigra. *Subtus* fuscæ, versus posteriora fascia alba, margine luteo extra lineam argenteam; Ocelli sex inter fasciam albam & marginem; omnes iride lutea, medio atri pupilla nivea. Antennæ nigrae annulis albis.

### §. §. §. §. NYMPHALES.

1048. PAPILIO *Io* tetrapus, alis angulato-dentatis fulvis nigromaculatis: singulis supra ocello cœruleo. Fn. 776.

Mouff. angl. p. 968.

lat. p. 99. f. infim. Regina omnium.

Hofn. inf. t. 12. f. 9.

Fonst. inf. p. 40. n. 4. t. 5.

Bry. renov. t. 27.

Mer. europ. I. p. 10. f. 26.

Gœd lat. I. p. 23. f. Oculus pavonis.

List. gœd. p. I. f. I.

Pet. mus. p. 34 n. 314 Papilio oculus Pavonis dictus.

Alb. inf. t. 3. f. 4.

Valent. herb. t. 57.

Anon. angl. p. 2. I. f. I.

Reaum. gall. I. t. 25. f. 2. I.

*Raj. inf.* 122. n. 13. Papilio elegantissima ad urticariam accedens, singulis alis maculis oculos imitantibus.

Habitat in *Humulo* & *Urtica dioica*.

DESCR. Alæ supra purpurascentes: primores antice nigræ cum liturâ flava & ocello majore flavo-cærulecente punctis 2 albis. Secundarie ocello majusculo nigro cærulecente. Subius omnes atro nebulolæ: Primores punctis 6 obsoletis, albidis; versus marginem exteriorem. Secundarie puncto pallido in medio.

1049. PAPILIO *Mæra* alis subdentatis fusco nebulosis; utrinque primoribus sesquiocello; posticis ocellis supra tribus. Papilio tetrapus, alis rotundatis fusco-nebulosis: primariis sesquiocello; secundariis quinque ocellis. Fn. 785.

*Mouff. angl.* 972.

*lat. p.* 104. *n. 9. f.* 10.

*Fouf. inf. p.* 58. *n. 9. t. 6*

*Merret. pin.* 198. *n. 10.* Papilio ultima parte alæ exterioris clypeolo nigro, quem medium punctum eburneum ornat, decorata.

*Merian. europ.* 2. *p.* 10. *t. 4.* (edit. ult.) *t. 54.*

*Robert. ic.* 15. *f.* 2.

*Aldr. inf.* *p.* 245. *t.* 244. *f.* 12.

*Raj. inf.* 123. *n. 15.* Papilio media, alis fulvo s. rufo & nigrante colore variis cum ocello prope extimum angulum alarum exteriorum.

*Petiv. mus.* *p.* 34. *n. 312.* Papilio oculatus ex aureo & fusco marmoratus.

Habitat in *Poa*, insidet sæpe petris & saxis.

DESCR. Alæ rotundatæ, integerrimæ, omnes supra fuscae, ocellis nigris pupilla alba, & margine extimo rufo notatæ; horum ocellorum unicus supra alas in alis primoribus: tres minores vero supra in secundariis alis; alæ etiam primores plicatæ sunt striis profundis; At alæ subtus, licet fuscae sint, primores tamen obscurioribus lineis undulatæ & singulæ notatae ocello glauco, in medio nigro, pupilla alba: juxta hunc ocellum versus angulum alæ ocellus minimus glaucus pupilla alba. Alæ secundarie fuscae, cano-undulatæ, singulæ ocellis septem notatae, quorum pupilla nigra in medio alba circulo duplice glauco circumdata; horum ocellorum duo ab domine proximi in unum coaliti sunt.

1050. PAPILIO *Ligea* alis subdentatis fuscis fascia rufa: utrinque primoribus ocellis quatuor, posticis tribus.

Papilio tetrapus, alis rotundatis fuscis: fascia transversali rufa: ocellis utrinque septem. Fn. 787.

*Alb. inf. t. V. f. 1.* Papilio fusca pratensis.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Alæ supra fuscae, subtus dilutius fuscae: Primores infra & supra fascia rufa transversa, ocellis 4 nigris; margine maculis 5 albis. Secundarie

dariae supra & infra ocellis 3 nigri ruflo cinctis: subtus minoribus, & duabus insuper maculis albis. Antennae nigrae, subtus albae.

1051. PAPILIO *Semele* alis dentatis fulvo nigroque nebulosis: primoribus ocellis utrinque duobus; posticis supra unico.

*Fn.* 784.

*Hoffn. inf.* 2. t. 8.

*Pet. mus. p.* 34. n. 307. Papilio oculis nigris subtus marmoreus.

*gaz. p.* 22. t. 14. f. 9. idem nomen.

*Raj. inf.* 128. n. 6. Papilio majuscula, alis pullis cum duplice in exterioribus macula lutea, & duplice oculo nigro. Habitat in sylvis petrosis, non infrequens.

*DESCR.* Alæ supra fuscae sunt cum fasciis obsolete flavis; Alæ primariae subtus flavæ, versus margines nebulosæ. Alæ secundariae subtus albo & nigro nebulosæ sunt. Ocelli duo nigri puncto albo in majoribus alis utrinque; in secundariis supra ocellus cæcus versus angulum ani.

1052. PAPILIO *Jurtina* alis subdentatis fuscis: primoribus supra litura flava: ocello utrinque unico.

Papilio tetrapus, alis rotundatis lœvibus fuscis: primoribus subtus fulvis ocello unico. *Fn.* 786.

*Aldr. inf.* 245. t. 246. f. 13.

*Hoffn. inf.* 1. t. 1. f. 1. & *edit. alt.* 4. t. 10.

*Pet. mus.* 34. n. 309. Papilio pratensis oculatus fuscus.

*Raj. inf.* 124. n. 16. Papilio media, alis supina facie pullis, prona ex rufo s. fulvo & fusco variis cum ocello ad extimum alarum exteriorum angulum.

*Reaum. gall.* 1. t. II. f. 1.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* Similis P. Semeli. Alæ primores supra subfuscæ area flavescente, in qua ocellus niger pupilla alba. Subtus concolores, sed pallidiores & fere flavescentes. Secundariae supra subfuscæ, subtus canescentes cum puncto fusco.

1053. PAPILIO *Janira* alis dentatis fuscis: primoribus subtus luteis ocello utrinque unico; posticis subtus punctis tribus.

Habitat in Sylvis, rarius.

*DESCR.* Simillimus precedentem. Alæ omnes supra fuscæ. Primores versus apicem ocello nigro. Subtus Primores ferrugineo-luteæ ocello, ut supra. Posticæ griseæ punctis 3. nigro-ferrugineis: quorum 1 antefius; 2 posterius.

1054. PAPILIO *Cardui* alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis; posticis utrinque ocellis quatuor.

Papilio tetrapus, alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis; secundariis ocellis quinque. Fn. 778.

Mouff. angl. p. 169.

lat. p. 101. n. 8. 9. f. 1. 2.

Hoffn. inf. t. 7. f. 3. edit. alt, 4. t. 5.

Goed. lat. 3. p. 1. f. 1.

List. goed. p. 14. f. 6.

Blank. belg. p. 21. t. 3. A. B. C. D.

germ. p. 17. t. 3. C. D.

Mer. europ. 3. p. 52. t. 15. edit. ult. 88.

Albin. inf. LVI.

Reaum. gall. 1. t. 26. f. 11. 12.

Pet. mus. p. 35. t. 326. Papilio eleganter variegatus agilis, Bella donna dictus.

Raj. inf. 122. n. 13. Papilio major pulchra, nigro rufo albo coloribus varia.

Habitat in *Carduus*.

DESCR. Alæ Primores subconcolores, subtus pallidiores, versus basin rufæ nigro-variegatae, versus apicem nigrae albo variegatae. Secundarie supra rufæ, nigro variegatae, punctis 5 nigris versus posteriora. Subtus flavescens-nebulosæ, ocellis versus marginem posticum 4, quorum intermedii minores.

1055. PAPILIO *Populi* alis dentatis fuscis albo fasciatis maculatisque; subtus luteis albo fasciatis: maculis cærulescens-tibus.

Uddm. diff. 54. t. 15. Papilio hexapus supra niger, alis omnibus ordine macularum transversali albo; inferioribus dentatis.

Clerck. act. Holmens. 1753. p. 278. t. 7.

Habitat in *Populi tremulae* summitatibus, rarius.

DESCR. Maximus facile nostratum. Alæ fere concolores, modo supra nigricantes, subtus testaceæ. Primores maculis aliquot albis sparsis. Secundarie fascia alba interrupta ex 7 maculis; posterius supra ordo ocellorum dimidiatorum iride ferruginea pupilla atra intima dupliciti. Subtus 7 puncta lunaria, nigra, in ordine; margo posticus subtus cærulescens linea nigra dimidiatus.

1056. PAPILIO *Antispa* alis angulatis nigris: limbo albido.

Fn. 772.

Hoffn. inf. t. 3. f. 2. & t. 6. f. 3.

Jonst. inf. t. 9. & 11.

Raj. inf. 135. Papilio maxima nigra, alis utrinque, tam exterioribus, quam interioribus, limbo lato albo cinctis.

136. Papilio maxima nigra, alis utrisque limbo albo lato cinctis.

De Geer. inf. t. 21. f. 8, 9.

Habitat in *Betula* frequentissimus; Larva foliis Betulae vivit.

*DESCR.* E maximis nostris Papilionibus hic est; Alæ angulato-dentatae, utrinque nigrae, sed marginie latera & posteriora respiciente albo, at margo crassior alarum superiorum antice duplice macula alba insignitus. Supra intra limbum album ordo punctorum cærulecentium. Subtus in posticarum disco punctum album adest. Antennæ & Corpus nigrum.

1057. PAPILIO *polychloros* alis angulatis fulvis nigro-maculatis: prioribus supra punctis quatuor nigris. Fn. 773.

Aldr. inf. 245. t. 246. f. 7. Polychloros.

Merr. europ. 2. p. 1. t. 52.

Gœd. lat. 1. p. 175. t. 77.

Lift. gœd. 5. f. 3.

Raj. inf. 118. n. 2. Papilio urticaria referens major, alis amplioribus, quam Ulmariam vocitare soliti sumus.

306. n. 14. Eruca mediæ magnitudinis, corpore e cinereo nigricante, spinulis raris in quolibet annulo ramosis fulvis.

Pet. mus. 34. n. 315. Papilio testudinarius major.

Alb. inf. 56.

Reaum. inf. 1. t. 23. f. 2.

Frisch. germ. 6. p. 7. f. 3. Eruca cærulescens, spinis luteis. Habitat in Salice, Ceraso, Pyro rarius.

*DESCR.* Sequenti vulgatissimo simillimus est, sed paullo major. Alæ angulatae, dentatae, fulvae Superior ala anteriore margine quatuor fasciis nigris & in disco punctis majusculis quatuor; Superiorum exterior margo, ut & alarum inferiorum margo exterior, nigra fascia cinctus; inferioris alæ basis nigra est.

1058. PAPILIO *Urticae* alis angulatis fulvis nigro-maculatis: primoribus supra punctis tribus nigris. Fn. 774.

Mouff. angl. p. 188. c. 3.

lat. p. 101. n. 11. f. 5. 6.

Hoffn. inj. 1. t. 4.

Gœd. inf. 1. p. 90. f. 21.

Lift. gœd. 3. f. 2.

Blank. belg. 13. t. 1. L. M. N. O. P. Q.  
germ. II. t. 1. N. O. P. Q.

Merian. europ. 1. p. 15. t. 44.

Rob. ic. t. 5.

Bry. renov. t. 15.

Bradl. natur. t. 2. 7. f. 2.

Anon. angl. p. 34. n. 316. Papilio testudinarius major.

Raj. inf. 117. n. 1. Papilio urticaria vulgatissima, rufo nigro cæruleo & albo coloribus varia.

p. 117. Eruca nigra s. pulla setigera urticaria.

p. 348. n. 18. idem.

Alb.

*Alb. inf. 4. f. 6.**Reaum. gall. I. t. 26. f. 6. 7.**Habitat in Urtica urente omnium vulgatissimus.**Larva spinosa, spinis spinosis.**Puppa est Chrysalis communiter deaurata.**DESCR. Præcedenti simillimus, sed dilatus alæ superioris duobus punctis minoribus & uno majore nigris notatus, & hæc ala etiam basi nigra est.***1059. PAPILIO C album** alis angulatis fulvis nigro-maculatis; posticis subtus c albo notatis. *Fn. 775.**Aldr. inf. 245. t. 244. f. 3. 4. mala.**Mouff. lat. 103. n. 2. f. 2. Papilio diurna media 2:da.]**Hoffn. inf. 2. t. 7.**Mer. inf. 1. p. 6. t. 14. ♂ 159.**Pet. mus. Papilio testudinarius, alis laceris.**Alb. inf. t. 4. f. 5. Papilio alis laciniatis.**Raj. inf. 118. n. 3. Papilio ulmariae similis, sed minor; alis laciniatis: interioribus linea alba incurva notatis.**p. 349. n. 21. ♂ p. 119. Eruca lupulacea hirsuta e rufo nigricans, macula s. areola alba longa in medio dorso notata.**Frisch. germ. 4. p. 6. t. 4. Eruca spinosa semialba, semique lutea, papilione ypsilo græco in ala.**Reaum gall. I. t. 27. f. 9. 10.**Rob. icon. t. 23.**De Geer. inf. I. t. 20. f. 1-10.**Habitat in Urtica, Humulo, Ribe aculeata.**DESCR. Alæ sinuatæ, extus fulvæ, nigro maculatae, punctis quatuor ad minimum distinetis, nigris; inferiores fere exteriorum similes, *subtus* alæ omnes griseo-cinereæ, undulatae, cum litera alba C alis inferioribus in medio adscripta. Tibiæ albae.***1060. PAPILIO Atalanta** alis dentatis nigris albo maculatis: fascia communi purpurea primoribus utrinque, posticis marginali.*Papilio tetrapus, alis denticulatis nigris albo-maculatis: omnibus fascia arcuata coccinea. Fn. 777.**Aldr. inf. p. 239. t. 240 f. 4. 5.**Hoffn. inf. I. t. 2. & edit. alt. t. 2. f. 15.**Mouff. lat. p. 100. f. 3. 4. Papilio diurna VI.**Gœd. lat. I. p. 96. f. 26.**List. gœd. p. 10. f. 4.**Mer. europ. 2. p. 41. t. 91.**Anon. angl. p. 203. f. 4.*

*Reaum. gall.* 1. t. 10 f. 9. 3.

*Petiv. mus.* p. 35. n. 327. Papilio major nigrescens, alas maculis rubris & albis pulchre illustratis.

*Blanck. belg.* p. 18. t. 2. f. A, B, C, D.  
germ. p. 15. t. 2. f. C, D.

*Fonst. inf.* t. 7. f. 6. 7. Phalæna diurna maxima.

*De Geer. inf.* t. 22. f. 1-5.

Habitat in *Urtica*.

*DESCR.* Alæ omnes supra nigrae. *Primo*res fascia in medio rubra; maculis albis inter fasciam & apicem. *Secundariæ* fascia terminali rubra cum punctis quatuor nigris & macula cœrulea didyma ad angulum ani. *Subtus* primores nigricantes, fascia rubra in medio; litura cœrulea maculisque albis inter fasciam & apicem. *Secundariæ subtus* fusco-nebulosa cum macula pallida ad marginem anteriorem & duabus fasciis subcellatis cordatis versus posteriora.

1061. PAPILIO *Lucina* alis dentatis fuscis testaceo maculatis, subtus fasciis duabus macularum albidarum.

Habitat apud nos minus frequens.

*DESCR.* Magnitudo Argi. Alæ supra fusca maculis parvis, flavescentibus, pluribus, sparsis, quarum margini postico adjacentes puncto nigro acuto postice albo notatae; *Subtus* omnes flavescentes, maculatae. *Secundariæ* fasciis duabus ex maculis albis & postice ad marginem punctis nigris acutis, basi albis.

1062. PAPILIO *Matura* alis subdentatis purpurascens nigro alboque maculatis, subtus fasciis tribus flavis: prima interrupta.

Habitat apud nos rarissime.

*DESCR.* Magnitudo sequentis. Alæ supra rubicundæ, nigro alboque maculatae & fere reticulatae. *Subtus* croceo-rutea fasciis tribus flavis: prima interrupta ex maculis inæqualibus situ & figura, 4, f. 5; Secunda quasi postice aucta virescentibus maculis f. linea latiore; ultima margini adiacet ex 7 f. 8. lunulis.

1063. PAPILIO *Cinxia* alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus fasciis tribus exalbido-flavis. Fn. 733.

Aet. upf. 1736. p. 22. n. 24. Papilio alis erectis subrotundis testaceis; punctis pallidis: lineolis undulatis fuscis, subtus albo-variegatis.

*Pet. gaz.* 28. t. 18. f. 10. Papilio fritillarius lincolniensis, fasciis subtus pallidis.

*Raj. inf.* 121. n. 9. nomine Petueri.

Habitat sat frequens in horto academico.

*DESCR.* Facies eadem cum precedentibus, magnitudo cum ultima convenit. Alæ omnes luteæ, supra nigro undulatae f. potius reticulatae. Alæ primariae subtus flavæ, parum nigro undulatae, apicibus flavis. *Secundariae*

*darice alæ subtus flavæ & nigro undulatæ, fasciis duabus fulvis undulatis: caret hæc maculis omnibus argenteis.*

1064. PAPILIO *Paphia* alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus viridibus lineis argenteis transversis. *Fn.* 779.

*Pet. mus. 35. n. 321. Papilio fritillarius major, lineis subtus argenteis.*

*Raj. inf. p. 119. n. 4. Papilio major, alis fulvis: maculis nigris in supina parte, prona transversis: areis argenteis depictis,*

Habitat in hortis.

DESCR. E majoribus hic est. *Alæ supra luteæ: Primores striis punctisque nigris, Secundarie venis & postice duplice ordine punctorum nigrorum majorum. Subtus Primores luteæ lituris & punctis nigris. Secundarie versus basin virescentes fasciis undatis argenteis; postice lutescentes duplice ordine punctorum majorum nigrantium.*

1065. PAPILIO *Aglaja* alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis 21 argenteis. *Fn.* 780.

*Mouff. angl. p. 969.*

*lat. p. 101. f. 3. 4. n. 10.*

*Aldr. inf. p. 245. t. 246. f. 8. 9.*

*Pet. mus. p. 35. n. 320. Papilio fritillarius, major, maculæ subtus argenteis.*

*Raj. inf. p. 119. n. 5. Papilio major, alis fulvis, supina parte maculis crebris, prona etiam argenteis eleganter pictis.*

Habitat in hortis.

DESCR. *Alæ posticæ subtus anterius virescentes & postico margine virescente; maculæ argenteæ in singula ala 27, quorum prima falcata est.*

1066. PAPILIO *Cydippe* alis dentatis luteis nigro maculatis, subtus maculis 23 argenteis.

Habitat in pratis.

DESCR. Similimus omnino P. Aglajæ in pagina superiore, at *Alæ posticæ subtus* maculis circiter 6 argenteis sparsis; dein quasi fascia ex 7 maculis argenteis; deinde quasi fascia ex maculis rotundis rubro-ferrugineis 6 f. 7, quarum 2, 4, 5 pro pupilla punctum argenteum habent; ultimo ad marginem posticum maculæ argenteæ septem.

1067. PAPILIO *Niobe* alis dentatis luteis nigro maculatis, subtus pallido maculatis, punctisque tribus argenteis ocellatis.

Habitat in pratis.

DESCR. Similimus praecedenti in pagina superiore. *Secundarie subtus* luteæ fusco transverse venosæ, maculis pluribus; pone has maculas ordo transversalis macularum ex maculis rufo-ferrugineis 6, f. 7, quarum

2, 4, 5 pupilla s. puncto argenteo gaudet. An sexu tantum a praecedenti diversus?

1068. PAPILIO *Lathonia* alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis 37 argenteis. Fn. 781.

Hoffn. t. 12. f. 11.

Merian. europ. 2. t. 157. f. superior. •

Rob. icon. t. 12.

Pet. mus. p. 51. n. 520. Papilio rigensis aureus minor, maculis argenteis subtus perbelle notatus.

Raj. inf. p. 120. n. 6. nomine Petueri.

Habitat frequens Upsaliæ

DESCR. Alæ omnes supra fulvæ: maculis punctiformibus, multis, distinctis, nigris. Alæ majores subtus luteæ multis maculis s. punctis nigris; versus apices notatae punctis 7 argenteis, quorum tria majora sunt. Alæ secundariae subtus habent maculas argenteas plures: quarum 19 majores, 11 vero minores, seu potius puncta sunt; nam versus marginem posteriorem septem maculae argenteæ subovatae; intra has septem puncta argentea; versus marginem interiorem alæ, duæ lineaæ argenteæ; præter has in disco septem maculae majores argenteæ, exceptis minoribus reliquis.

1069. PAPILIO *Euphrosyne* alis rotundatis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis 9 argenteis. Fn. 782.

Pet. mus. p. 35. n. 322. Papilio fritillarius maculatus præcox.

Raj. inf. 120. n. 7. Papilio fritillarius major (rectius minor) alis fulvis superne maculis nigris tessellatis.

Habitat in pratis minus frequens.

DESCR. Inter eos, qui argenteis punctis gaudent, hic certe minimus est. Alæ luteæ, subtus nigro-undulatae, supra nigro-reticulatae; Posticæ alæ in margine habent 7 maculas albas subrotundas, æquales; in medio disco subtus macula una argentea, reliquis major, oblonga, utrinque obtusa, collocata in fascia pallidiore; nona demum macula in eodem latere versus basin alæ reperitur argentea.

### §. §. §. §. §. PLEBEJI.

1070. PAPILIO *Betulae* alis subcaudatis fuscis: primoribus macula reniformi fulva; subtus luteis fascia fulva.

Papilio hexapus, alis secundariis angulato-dentatis: subtus flavo alboque flammeis. Fn. 792.

Hoffn. inf. t. 12. f. 1.

Pet. gaz. p. 18. t. 11. f. 10. Papilio minor fuscus, dupli-ci linea inferne prædictus. (Mas.)

f. 11. Papilio minor fuscus: campo aureo, linea gemina subtus ornatus. (Fæmina.)

Raj.

*Raj. inf. p. 120. n. 10.* Papilio minor, alis exterioribus nigricantibus, macula in medio lata arcuata fulva.

Habitat in *Betula*; præsertim in Smolandia obvius.

DESCR. Alæ subtus notatæ fascia postice attenuata linea alba incusa.

1071. PAPILIO *Pruni* alis subcaudatis supra fuscis; subtus fascia marginali fulva utrinque nigro punctata.

Pet. gaz. t. II. f. 10.

*Raj. inf. 130. n. 9?*

Habitat in *Pruno*.

DESCR. Alæ omnes supra fuscæ; Posticæ caudatæ & ante caudam inaculæ 2, f. 3, ferrugineis lunatis. Subtus omnes obscure cinereæ: linea transversa. Secundariae intra marginem posticum fascia fulva, utroque margine nigro punctata.

1072. PAPILIO *Quercus* alis subcaudatis supra cæruleis; subtus cinereis linea alba puncto que ani gemino fulvo.

Pet. gaz. t. II. f. 9.

*Raj. inf. 129. n. 8.*

Habitat in *Quercu Robore*.

DESCR. Alæ omnes supra fuscæ disco cæruleo cente. Subtus omnes canescentes: linea transversa repanda alba; posterius caudatæ & ante caudam ocello gemino fulvo: pupilla nigra.

1073. PAPILIO *Arion* alis ecaudatis: supra fuscis disco cæruleo maculisque atris; subtus canis punctis ocellariibus.

Habitat apud nos rariissime.

DESCR. Facies P. Argi, sed duplo major. Alæ supra fuscæ disco cæruleo. Primores supra in disco punctis nigris, septem, confertis. Subtus omnes cinerascentes, basi virescentes & postice duplice ordine punctorum nigrorum; insuper puncta nigra ocellaria, iride alba, 7 in primoribus, 10 in secundariis, præter lunulam nigram.

1074. PAPILIO *Argus* alis caudatis cæruleis: posticis subtus limbo ferrugineo: ocellis cæruleo-argenteis.

Papilio hexapus: alis rotundatis integerim cæruleis: subtus ocellis numerosis. Fn. 803.

Hoffn. inf. I. t. 4.

Mouff. lat. p. 105. f. ult. duæ & p. 106. f. I. Papilio diurnarum minima quarta.

Zonst. inf. I. 6. f. penult.

Merr. pin. 144. Papilio alis oculatis cyaneum cœlestem spandratis.

Mer. europ. 153.

Rob. ic. t. 17.

Pet. mus. p. 34. n. 318. Papiliunculus cæruleus, ocellis plurimis.

plurimis subtus eleganter adspersus.

*gaz. p. 55. t. 35. f. 1.* Papiliunculus cæruleus  
vulgatissimus.

*Raj. inf. p. 31. n. 11.* Papilio parva, alis superne purpuro-  
cæruleis, subtus cinereis: maculis nigris circulo purpura-  
scente cinctis, punctisque nigris pulchre depictis.

*De Geer. inf. t. 4. f. 14, 15.*

Habitat in *Rhamno*.

*DESCR.* Alæ supra cæruleæ, subtus ocellis numerosis nigris, & in  
alis secundariis subtus maculis marginalibus fulvis confertis in fasciam  
pupillis cæruleo - argentatis.

1075. PAPILIO *Idas* alis ecaudatis cæruleis: posticis fascia ter-  
minali rufa ocellari: subtus pupillis cæruleo - argenteis.

Papilio hexapus, alis rotundatis integerrimis nigro fuscis:  
subtus ocellis numerosis. *Fn. 804, 805.*

*Raj. inf. 131. n. 12.* Papilo parva, alis supinis pullis cum  
linea s. ordine macularum lutearum ad imum margine in.  
Habitat in *Ericetis*.

*DESCR.* Facies, magnitudo & color omnino præcedentis, a quo differt  
alarum lateris superioris colore, qui non, ut in illo, cæruleus, sed omni-  
no nigro-fuscus; Alæ secundarie postice supra fascia obsoleta ex ocellis  
ferrugineis pupilla nigra. Subtus omnes alæ similes præcedenti, sed pal-  
lidiores & fascia albida ante posticam ruffam ex ocellis cæruleo argenteis.  
An solo sexu a priori diversus?

1076. PAPILIO *argiolus* alis ecaudatis supra cæruleis margine  
nigris, subtus cærulecentibus punctis nigris diversis.

Habitat in *Ericetis*.

*DESCR.* Statura duorum præcedentium. Alæ omnes supra cæruleæ lim-  
bo nigro; omnes subtus cano cærulecentes absque ocellis; Primores po-  
stice ordine e punctis 5, oblongiusculis, nigris, minutis; Secundariae pun-  
ctis nigris, parvis, decem, sparsis.

1077. PAPILIO *Rubi* alis dentato - subcaudatis: supra fuscis,  
subtus viridibus.

Papilio hexapus, alis rotundatis integerrimis: subtus viridi-  
bus immaculatis. *Fn. 806.*

*It. æl. 7.* Papilio argo similis, alis immaculatis supra cya-  
neis.

*Pet. gaz. p. 6. t. 2. f. 11.* Papilio minor: superne fuscus,  
inferne viridis.

Habitat in *Rubo aculeato*.

*DESCR.* Corpus cinereum. Antennæ & Pedes nigri annulis numerosis al-  
bis. Alæ supra fusco-nigricantes, subtus virides; in alis secundariis, jux-  
ta marginem superiorem, punctum album. Oculi ante & postice lineola  
alba notati. Magnitudo argi.

1078. PAPILIO *Phleas* alis subangulatis fulvis nigro punctatis, subtus albo marginatis; secundariis canescensibus Papilio hexapus; alis rotundatis fulvis: utrinque punctis nigris. Fn. 807.

*Merian. gall. t. 164.*

*Pet. mus. p. 34. n. 317.* Papilio minor aureus ex nigro permaculatus.

*Raj. inf. 125. u. 20.* Papilio parva, alis exterioribus circa margines nigricantibus, media parte rufis, ferici instar splendidibus, maculis longis nigris pictis.

Habitat in pratis *Westmanniae*.

DESCR. Corpus sequenti minus. Alæ primores supra fulvæ margine nigro, disco punctis nigris passim confluentibus. Subtus disco luteæ, punctis nigris annulo albo cinctis. Secundariae supra fuscæ; postice fascia fulva posterius dentata; Subtus canelentes punctis parvis, fuscis; postice fascia linearis rubra. Ad angulum ani alæ posticæ emarginatae sunt, omnino ut in sequente.

1079. PAPILIO *Virgaureæ* alis subangulatis fulvis margine fuscæ: subtus punctis nigris secundariisque aliquot albis. Papilio hexapus; alis rotundatis fulvis: infra albo punctatis. Fn. 808.

*Pet. gaz. 22. t. 14. f. 3.* Phalæna minor nostras fulva, alis limbo nigro insignitis?

Habitat cum praecedente in pratis *Westmanniae*.

DESCR. Figura Petiveri quadrat, ni antennæ different. Facies & magnitudo omnino praecedentis, sed Alæ supra fulvæ s. ignei coloris, nitidæ, immaculatae, margine tantum nigro. Alæ primores subtus aliquot nigris punctis notatae, quorum duo in medio coalita sunt. Alæ secundariae subtus magis griseæ, punctis nigris & aliquot majoribus albis; ad marginem posteriorem versus anum alæ denticulatae sunt, & maculis semicirculatis fulvis notatae. Mas supra maculis caret nigris. Femina vero copiosissimis adspersa est.

1080. PAPILIO *Comma* alis integerrimis divaricatis fulvis: punctis albis, lineaque nigra. Fn. 793.

*Act. upf. 1736. p. 23. n. 33.* Papilio alis erectis ovatis integerrimis testaceo-griseis, tesserulis albis linea nigra sub superioribus.

Habitat in Pratis.

DESCR. Alæ primores cencolores, flavæ, apice fuscantes maculis pallidis: litura nigra linearis margine nuda subargentea in medio paginae superioris. Secundariae supra flavæ, pallidius maculatae margine fuscantes. Subtus griseæ maculis albidis, quadratis.

1081. PAPILIO *Malvaæ* alis denticulatis divaricatis nigris albo-punctatis. Fn. 794.

*Hoffn. inf. 4. t. 2 f. ult.*

*Pet.*

*Pet. mus. 35. n. 325.* Papiliunculus fuscus punctis plurimis albicantibus.

*gaz. 56. t. 36. f. 6.* Papilio fuscus &c.

*Act. upf. 1736. p. 23. n. 34.* Papilio alis erectis obtusis dentatis nigris: punctis albis tessellatis.

*It. oeland 3.* Papilio hexapus, alis divaricatis denticulatis nigris albo-punctatis.

Habitat primo vere in Pratis.

DESCR. Magnitudo Argi. *Corpus* totum & alae supra nigro fuscæ; Alæ maculis parvis seu punctis quadratis, albis, numerosis adspersæ sunt a parte exteriori, margine quasi dentato, interjacentibus maculis albis. *Corpus* & Alæ subtus griseo-cinereæ; alæ ipsæ subtus maculis albis difformibus inæqualis magnitudinis. *Antennæ* clavatae, supra fuscæ, subtus albidae, annulis minimis albis. Alæ erectæ non sunt, sed divaricatae, fere uti Phalæna quercifoliæ.

1082. PAPILIO *Tages* alis subdenticulatis divaricatis fuscis obsolete albo punctatis.

Habitat in Pratis rarius.

DESCR. Parvus præcedentis magnitudine. *Caput* pilosum. Alæ fuscæ, utrinque adspersæ punctis albidis obsoletis.

## Sphinx.

1083. SPHINX *ocellata* alis angulatis; posticis ocellatis.

*Raj. inf. 148. n. 2.* Phalæna major, corpore crasso, alis ampliis: interioribus macula ophthalmoidæ.

*Raj. inf. 149. n. 3.* Phalæna magna cinereo dilute rubente & nigro coloribus varia, cum maculis oculos referentibus in interioribus alis.

*Uddm dis. 58. f. 11.* Phalæna subulicornis elinguis, alis planiusculis cinereis, maculis fuscis, inferioribus ocello nigro iride cæcia, pupilla nigro-cærulea

Habitat in *Spiraea*, *Salice*.

DESCR. Thorax cinereus dorso macula fusco-ferruginæa. Alæ superiores nebulosæ, margine postico subfuscæ; subtus versus basin rubræ. Inferiores supra rubræ; ocello cæruleo iride nigra versus angulum ani. Antennæ albæ.

1084. SPHINX *Populi* alis dentatis reversis: posticis basi ferrugineis; anticus puncto albo.

Phalæna prismicornis spirilinguis, alis planiusculis erosis griseis; antennis albis. Fn. 810.

*De Geer. inf. 1. t. 8. f. 5.*

Habitat in *Populo*, *Salice* rubra.

DESCR.

*DESCR.* Alæ omnes cinereæ, postice dentatæ. Superiores fasciis obscurioribus & puncto albo in medio. Inferiores supra ad basin ferrugineæ.

1085. SPHINX *Tiliae* alis angulatis virescenti-nebulosis saturati subfasciatis; posticis supra luteo testaceis.

*Frisch.* inf. 7. t. 2.

Habitat in *Tilia*.

*DESCR.* Corpus & Alæ superiores supra virescentes, in medio fascia s. maculis duabus obscurioribus; hæ alæ postice repandæ s. trilobæ. Alæ Posticæ supra luteo-testaceæ angulo ani obscuriore. Margo posticus omnium alarum, tam supra quam subtus, ferrugineus.

1086. SPHINX *Euphorbiæ* alis integris fuscis: vitta superioribus flava, inferioribus rubra.

Phalæna larvæ Sphingis caudæ corniculo scabro. *Fn.* 1356.

*De Geer* inf. 1. t. 8. f. 6-11.

*Uddm.* diss. 57. Phalæna prismaticornis spirilinguis, alis planiusculis fuscis: fascia longitudinali albida.

*Frisch.* inf. 2. t. 11.

Habitat in *Euphorbia, Galio*.

*DESCR.* Alæ superiores subgriseæ, area longitudinali inæquali pallida s. flavescente; margine postico rufescentes. Alæ Posticæ sanguineæ, basi atra & fascia linearí atra ante marginem posticum. Subtus Alæ omnes sanguineæ cum macula nigra in disco primorum, *Antennæ* albæ.

1087. SPHINX *Liguistri* alis posticis incarnatis fasciis nigris, abdomine rubro: cingulis nigris.

Phalæna prismaticornis spirilinguis fusca; alis inferioribus abdomineque fasciis transversis rubris. *Fn.* 809.

*Mouff.* lat. p. 91. f. 2. & p. 182. f. 1. *Eruca glabra viridium nobilissima*.

*Jonst.* inf. t. 19. n. 1. 2. *Eruca viridis Ligustrina*.

*Jacob.* mus. dan. 1. f. 5. n. 24. t. 1. f. 24. *exterior*. *Eruca glabra & cornuta prima*.

*Jung. verm.* 108. *Eruca virgata s. calcarisata*.

*Swam.* bibl. t. 29 f. 1. 2. 3.

*Merian.* europ. 3. p. 54. t. 23. *gallic.* t. 124.

*Alb.* inf. t. VII.

*Gœd. belg.* 1. p. 93. f. 24. (Papilio. non larva)

*Lift. gœd.* p. 71. t. (Papilio. non larva.)

*Reaum. gall.* 2. t. 20. f. 1. 2. 3. 4. *Sphinx*.

*Raj.* inf. 144. n. 1. *Phalæna maxima cauda*, alis angustis longis acutis, abdomine roseo: sex septemve areolis transversis nigris.

p. 362. n. 62. *Eruca glabra maxima*, viridium nobilissima mouffeto.

*De Geer. inf. I. t. f. 6.*

Habitat in *Ligustrum*, *Syringa*, *Fraxino*, *Lonicera*, *Salice*.

Larva XVIpus, glabra, cauda cornuta.

DESCR. Thorax supra niger. Alæ superiores fuliginosæ. Plaga alba a rostro per latera thoracis & marginem exteriorem alarum albida; striæ plures nigrae; apex alæ litura alba; margo posticus albo-undatus. Inferiores subincarnatae fasciis duabus nigris. Latera abdominis rubra fasciis nigris præter lineam dorsalem & tres ventrales nigras. Antennæ albae.

1088. SPHINX *Pinastris* alis integris canis: superioribus lineolis tribus quatuorve nigris sparsis, abdomine canescente cincto.

*De Geer. inf. I. t. 10. f. 1, 2, 3.*

*Gadd. diff. 28.* Phalæna fusco-cinerea subulicornis, thorace hirsuto griseo: lineis duabus nigris longitudinalibus.

Habitat in *Pino*.

DESCR. Corpus canum. Thoracis latera linea nigra. Abdomen canum lateribus cinctum cingulis albis nigrisque alternis. Alæ superiores canæ notatae in medio lineolis tribus nigris confertis; præterea litura nigra ad basin & apicem. Alæ inferiores supra & omnes subtus cinereæ; margo alarum posticus albus, fulco interruptus.

1089. SPHINX *Elpenor* alis integris virescente-purpureoque variis: posticis basi atris.

Phalæna prismicoris spirilinguis, alis viridi fulvo purpureoque variis. Fn. 811.

*De Geer. inf. I. t. 9. f. 8, 9.*

*Frisch. inf. 12. t. 1.*

Habitat in *Epilobio angustifolio*, *Impatiens Nolitangere*.

DESCR. Simillima sequenti, at huic Corpus duplo majus. Lineæ Thoracis 4 longitudinales, rubræ. arcuatae. Abdominis dorsum linea longitudinali rubra. Punctum niveum in medio alæ superioris, cui etiam margo interior albus.

1090. SPHINX *Porcellus* alis integris flavicante purpureoque variis; posticis basi fuscis.

*Roes. inf. I. phal. I. t. 5.*

Habitat in *Epilobio*, *Impatiens* ut prior, sed hujus Larva corniculo caret.

DESCR. Differentia in Præcedenti data est. Huic margo exterior alarum superiorum rubro pictus.

1091. SPHINX *Stellatarum* ab domine barbato: lateribus albo nigroque variis, alis posticis ferrugineis.

*Raj. inf. 133.* Papilio velocissima, alis brevibus, corpore crasso, inter volandum stridorem edens.

*Reaum. inf. I. t. 12. f. 5; 6.*

Habitat in *Galio*; volitando lingua nectar florum haurit cintatissima.

DESCR. Magnitudo Bombyllii. *Corpus* nigrum: *Latera* abdominis barbata: barba atra apice alba. *Anus* barba nigra, fastigiata. *Alæ superiores* fuscocinereæ; *Itriga* una alterave nigra; *Inferiores* ferrugineæ. *Antennæ* albae.

1092. SPHINX *fuciformis* abdomen barbato nigro: fascia flavescente, alis hyalinis margine nigro.

*Reef. ins. 3. t. 38. & 4. t. 34. f. 1-4.*

Habitat in *Lonicera*.

DESCR. Magnitudo Bombyllii. *Corpus* griseum. *Abdomen* cingulo nigro; barba laterali pone cingulum albida. *Anus* barba nigra, *Antennæ* nigrae.

1093. SPHINX *apiformis* abdomen flavo incisararum marginibus atris, thorace nigro maculis duabus flavis.

*Papilio subducornis* elinguis, alis lanceolatis albis: venis nigris. *Fn. 813.*

*Papilio apiformis*, abdomen aureo. *A&N. upf. 1736. p. 26.*  
*v. 84.*

Habitat in *Lucis* passim.

DESCR. Magnitudo & facies Apis s. Vespe. *Alæ* hyalinae venis lutescentibus s. fuscis, margine postico nigrae. *Antennæ* nigrae, tubus albus. *Abdomen* luteum segmentorum, excepto primo & quarto, que tota nigra, marginibus nigris. *Thorax* niger maculis lateralibus flavis. *Pedes* spinosi.

1094. SPHINX *culiciformis* abdomen barbato: cingulo fulvo, alis hyalinis margine fasciisque nigris.

*Phalaena pectinicornis* alis sublinearibus fuscis. *Fn. 817.*  
Habitat apud nos rarius.

DESCR. Facies & magnitudo Apis. *Antennæ* nigrae, breves, pectinatae. *Corpus* fuscum. *Abdominis* segmentum 4 fulvum; 2 lateribus litura fulva. Basis Alarum & Palpi fulvi. *Litura* nivea ante eit post oculos.

1095. SPHINX *vespiformis* abdomen barbato nigro: incisuris tribus posterioribus margine flavis, capite annulo flavo.

Habitat in *Lucis*.

DESCR. Magnitudo sequentis, sed duplo major. *Corpus* totum nigrum, sed abdominis tria segmenta posteriora margine flava. *Alæ* sequentis, sed inacvia flavescente. *Caput* annulo luteo cinctum.

1096. SPHINX *tipuliformis* abdomen barbato nigro: incisuris alternis margine flavis.

Habitat in *Lucis* & *Hortis*.

DESCR. Magnitudo Culicis pipiens. *Thorax* subtus luteus & supra, T ante

ante alas, linea lutea. *Alæ* hyalinæ venis apice & fascia nigris. *Corpus* nigrum; at *Abdominis* segmenta alterna inargine flava: ultimo annulo flavo sæpe duplo.

1097. SPHINX *Filipendulae* alis superioribus cyaneis: punctis sex rubris; inferioribus rubris immaculatis.

*Phalæna subulicornis spirilinguis*; alis superioribus subcæruleis: punctis sex rubris; inferioribus omnino rubris.

*Mouff. angl. p. 966.*

*Lat. p. 97. f. infim. Phalæna pratensis 1.*

*Fonst. inf. t. 7. ord. 3. Phalæna minima pratensis 1.*

*t. 6. Papil. tab. 9. aldr. n. 7.*

*Gœd. belg. 2. p. 126. t. 31. f. 1. 3. 4. Rara.*

*List. goed. p. 100. f. 37.*

*Mer. eur. 2. p. 27. t. 17. gallic. t. 67.*

*Alb. inf. t. 82. f. C. D. Leopardus sylvestris.*

*Reaum gall. 1. t. 12. f. 14. 15. 16. 17.*

*2. t. 2. f. 2.*

*Petiv. mus. p. 36. n. 330. Papilionoides virescens, maculis quaque miniatis ornatus.*

*Raj. inf. 134. n. 2. Papilio pratensis, alis pendulis, minor, corpore crasso nigro, alis externis ex cæruleo nigricantibus cum maculis sanguineis.*

*Merr. pin. 198. Papilio minor cum alis externis nigris quinque maculis, internis rubris.*

*Vulgo Leopardus.*

Habitat in *Filipendula*, volitans de die, licet tarde.

DESCR. *Puppa* intra folliculum membranaceum flavum latitat.

*Sphinx* mas gaudet maculis sex rubris in ala exteriore,

*femina* vero maculis quaque, connatis scilicet duabus basi.

DESCR. *Corpus* & *aëtus* nigra, vestita lana nigra. *Antennæ* antrotsum adscendentibus, versus summitatem sensim latiores (non tamen clavatae), ad apicem attenuatae ac depressæ. *Alæ* superiores ex viridi-cæruleo nitentes: punctorum tribus paribus ovatis coccineis. *Alæ* inferiores coccineæ inargine cæruleo nitido.

1098. SPHINX *Statices* viridi-cærulea, alis inferioribus fuscis.

*Phalæna pectinicornis spirilinguis* viridi-cærulea nitens, alis inferioribus fuscis. *tn. 838. It. W:goth. 27.*

*Raj. inf. 134. n. 3. Papilio parva, alis pendulis.*

Habitat in campis ubi *Statice Armeria* frequens, uti Upfaliae ad Lilieholmen.

DESCR. *Corpus* magnitudine majoris Tabani, viridi-cæruleum, nitens. *Alæ* superiores subtrus & inferiores utrinque fuscæ. *Antennæ* in mare pectinatae.

## PHALÆNA.

1099. PHALÆNA BOMBYX *pavonia* elinguis, alis paten-tibus rotundatis griseo nebulosis: ocello nictitante subfe-nestrato

Phalæna pectinicornis elinguis, alis planiusculis cinereis: sin-gulis ocello fasciaque fusca. Fn. 835.

Zonst. inf. 2. f. 7.

Reaum. gall. 1. t. 49. f. 7.

Mouff. lat. 20. Phalæna tertia.

Raj. inf. 146. Phalæna major pulchra, maculis ophthalmoi-dibus in singulis alis singulis.

147 Eruca viridis rarius pilosa, fulvis s. rubenti-bus in medio annulis, geranicola. Mouffet 180.

Pet. gaz. 53. t. 33. f. 12. Phalæna nigrescens, maculis majoribus, subtus flavescentis.

De Geer inf. 1. t. 19. f. 7. 8.

Habitat in Rosa, Rubo, Malo.

DESCR. Corpus crassiusculum. Antennæ pectinatae lanceolatae, cinereæ, latæ, radiis duplicatis. Alæ omnes luteo ferrugineoque variae: singulæ utrinque in medio ocello magno nigro cum annulo griseo, eique inducta lineola alba. Infra ocellos fascia griseo fusca linearis undulata versus marginem posticum.

1100. PH. BOMBYX *Tau* elinguis, alis patulis testaceis: ocel-lo subviolaceo, pupilla hastata alba.

Uddm. diff. 61. Phalæna alis supra flavis: ocellis cæruleis, pupilla alba angulata.

Act. Stockh. 1749. p. 130 t. 4. f. 8.

Habitat in Betula.

DESCR. Inter nostrates maximas numeranda. Thorax crassus, hirsutus. Antennæ ferrugineæ, breves, parum pectinatae. Alæ griseæ s. testaceæ, inque earum medio ocellus majusculus niger pupilla. Talbum referente; inferiores subtus nebulosæ: Fascia ferruginea & posterius linea transversali curva albida.

1101. PH. BOMBYX *Populi* elinguis fusca, fronte pallida, alis reversis immaculatis fuscofuscentibus: striga sesquialtera albido-repanda.

Roes. inf. 2. phal. 2. t. 60.

Habitat in *Populo*, *Corylo*, Pomiferis.

DESCR. Hæc vix Tabano major, hirsutissima, tota fusca. Thorax an-tice exalbidus, unde quasi fronte exalbida est. Alæ superiores concolores: striga albida, repanda, valde flexuosa versus posteriora, & alia minuta transversa ad ipsam basin alæ. Inferiores concolores, etiam fu-sæ fascia albida; Alarum margo posticus ciliaris in omnibus albo punctatus.

1102. PH. BOMBYX *Neustria* alis reversis lutescentibus: fasciis duabus albidiōribus; subtus unica. *Fn. 825. Syst. nat. 10. p. 500. n. 19.*

*Goed. belg. 1. p. 36. t. 10.*

*List. goed. 204. t. 89. Bibax.*

*Morff. lat. 183. Neustria major.*

*Blank. belg. 48. t. 8. f. J. M.*

*Reaum gall. 2. t. 4. f. I-II.*

$\beta$  Bombyx elinguis alis reversis griseis, strigis duabus pallidis; subtus unica. *Fn. 824. & 831. Syst. nat. 10. p. 500. n. 20.*

*De Geer inf. 1. t. 13. f. 4-6.*

*Frisch. inf. 10. t. 8.*

Habitat in Arboribus & campis polyphaga, vicitans *Salice*, *Pilosella*, *Jacea*, *Alchemilla*, *Euphorbia*, gregaria sub tentorio. Ova ponit confertissime copiosissima circum ramulos arborum instar annuli; nobis vulgatissima *It. oel. 62.*

DESCR. Duplex est varietas, utraque ejusdem speciei, ut ex iis, qui metamorphosin examinarunt, n. De Geereo, Schrebero, Filio. *Prior* est Alis griseis, fasciis duabus obliquis flavis. *Posterior* est Alis flavis: fascia lata subgrisea in medio, & alia angusta ad basin & ante marginem posticum.

1103. PH. BOMBYX *Rubi* elinguis, alis reversis cervinis im- maculatis: strigis duabus albidis; subtus nullis.

Phalæna pēctinicornis elinguis, alis cinereis: exterioribus lineis binis oblique transversis albidis. *Fn. 830.*

*Roef. inf. app. t. 49.*

Habitat in *Rubo*.

DESCR. Majoribus adnumeranda. *Corpus* totum cervini coloris; in aliis magis subgriseus. *Alæ* oblique secant lineæ albidæ due, & postice in aliis superioribus est obsoleta linea obcurior valde repanda & flexuosa.

1104. PH. BOMBYX *Pini* elinguis, alis reversis griseis: stri- gis duabus cinereis puncto que albo triangulo.

*Uddm. diff. 62. Phalæna Pithyocampus pēctinicornis elin- guis ferrugineo-cinerea, alis depressis puncto cordato albo.*

*Frisch. germ. 10. t. 10.*

Habitat in *Pini Sylvestris*. folijs.

DESCR. Hæc e maximis nostratibus hujus phalangis. *Corpus* griseum. *Alæ* superiores fasciis duabus paullo magis cinerascentibus, quarum prior in medio alæ, posterior alam terminat; utræque marginæ obcuriore valde flexuolo distincta. Ante priorem aream in ala superiore punctum nivem, cordatum s. triangulare.

1105. PH. BOMBYX *lanefbris* elinguis. alis reversis ferrugi- neis: striga alba; superioribus puncto basique albis.

*Roef.*

*Roes. inf. 1. phal. 2. t. 62.*

Habitat in *Tilia*, *Pruno spinosa*, *Salice*.

DESCR. *Corpus* griseum s. cervinum. *Alæ primores* striga alba postice subdentata; *Puncto* albo in medio alæ versus marginem inferiorem; *macula* alba ad basin alæ. *Inferiores* alæ striga albida & margine reverso niveo. *Anus* lanatus, albidus. *Sexus* alter macula baseos & fasciis alarum flavis gaudet.

1106. PH. BOMBYX *Quercus* elinguis, alis reversis ferrugineis: striga flava puncto que albo.

*Uddm. diff. 59* *Phalæna pectinicornis* elinguis, alis fulvist fascia flava puncto que albo.

*Goed. belg. 1. t. 7.*

*Raj inf. 142 n. 2.* *Phalæna maxima* fulva, alarum exteriorum superiore medietate intensius colorata.

Habitat in *Quercu*.

DESCR. Magnitudine ad-majores accedit. *Color* aliis pallide ferrugineus, aliis obscure ferrugineus. *Alæ* omnes utrinque fascia arcuata flava; *Punctum* album in medio alæ; litura flava ad basin alarum superiorum. *Corpus* subtus pallide flavum.

1107. PH. BOMBYX *dumi* elinguis, alis reversis fuscescentibus; superioribus puncto fascia margineque postico luteis.

Habitat in *Sylvis ratiis*. Dan. Thæel.

DESCR. Magnitudo præcedentis. *Corpus* luteum. *Alæ* omnes supra fusce: fascia flexuosa lutea, antice repanda. *Superiores* puncto subtrigono luteo ante fasciam. Margo posticus omnibus luteus. Omnes alæ subtus luteæ.

1108. PH. BOMBYX *Catax* elinguis, alis reversis flavis unicoloribus: puncto albo. *Syft. nat. 10. p. 822.*

Habitat in Blekingia.

DESCR. Magnitudo Tabani s. Neustria minor. *Tota* flava, sed alarum margo vix manifeste rufus. *Punctum* album in medio alæ superioris. Margo reversus alæ inferioris albus.

1109. PH. BOMBYX *ilicifolia* elinguis, alis reversis semitectis ferratis griseis: margine postico albo variegato.

*De Geer. inf. 1. t. 14. f. 7-9.*

Habitat in *Salice*.

DESCR. Magnitudo præcedentis, statura sequentis, sed quadruplo minor. *Color* griseo varius. Inter dentes omnium alarum margo albus est.

1110. PH. BOMBYX *quercifolia* elinguis, alis reversis semi-tectis dentatis ferrugineis: margine dentium nigro.

*Reaum. gall. 2. t. 23.*

Frisch germ. 3 t. I. f. 3.

Habitat in *Salice*, *Pruno spinosa*, *Gramine*.

DESCR. Structura præcedentis. Antennæ nigricantes, thorace breviores. Alæ ferrugineaæ strigis 3<sup>o</sup> f. 4, nigris, undulatis. Subtus alæ inferiores obscure ferrugineaæ: striga nigra transversa.

III. PH. BOMBYX *versicolor* elinguis, alis reversis griseis: strigis nigro albis, fronte alba.

Gadd. satag. 82. Phalæna alis lineis albis & nigris undulatis.

Roe. inf. app. 39. f. 3.

Habitat apud nos rarius. D. D. Wahlbom.

DESCR. Ad maiores accedit speciosissima. Corpus griseum, villosum. Antennæ nigrae. Thorax ferrugineus, antice albus, albedine linea nigra terminata. Alæ omnes ferrugineaæ, at supra magis griseæ. Superiores fascia linearis, nigra, antice alba, transversa, versus basin; altera fascia posteriore, flexuosa, alba, antice nigra; maculae tres albae ad angulum posticum, & ad marginem anguli ani. Inferiores alæ subtus luteæ strigis duabus nigris punctoque nigro intermedio; macula alba diaphana ad angulum exteriorem alæ.

III. PH. BOMBYX *Vinula* elinguis albida nigro-punctata, alis supreversis fusco venolis striatisque.

Phalæna pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis diaphanis: vasis obscuris. Fn. 819

Mouff lat. p. 183. f. 10. Vinula.

Aldr. inf. p. 268 f. 1. 3. 6. 7. 8.

Merr. europ. 3. p. 59. t. 39. gallice, t. 140.

Gæd. belg. 3. p. 4. t. C.

1. p. 121. t. 65.

2. p. 158. t. 37.

List. gæd. p. 59. t. 20. n. 6. c.

Alb. inf. t. 11. f. 15.

Frisch germ. 6. p. 18. t. 8. Eruca cauda fureata.

Reaum. gall. 2. t. 21.

Raj. inf. 153. n. 5 Phalæna major pulcherrima, alis ampliis: exterioribus cinereis maculis & lineis nigris eleganter depictis.

n. 3. Eruca bicauda elegantissima, Vinula dicta

Habitat in *Salice*, *Quercu*. *Populo*, præsertim nigra.

Larva e propria vesicula exspuit liquorem laceissima longissime; caput intra thoracem quadrangulum retrahere potest.

DESCR. Thorax albus punctis plurimis nigris. Abdominis dorsum linea e maculis quadratis albis nigro inclusis. Alæ cinereo-exalbidæ venis obscurerioribus & strigis obtuleris undatus; basi vero punctis nigris & flavis adspersæ.

1113. PH. BOMBYX? *Fagi* elinguis, alis reversis rufo-cinereis: fasciis linearibus duabus luteis flexuosis.

*Uddm. diff.* 61.

*Act. holm.* 1749. p. 132. t. 4. f. 10-14.

*Mouff. inf.* 198.

Habitat in *Fago*; rarius in *Suecia australi*.

*Antennæ* visæ sunt Noctuæ in Speciminiibus lectis, forte feminis, tamen ob habitum eam inter Bombyces retuli, donec certiora innotescant de insecto, nisi fugitivis oculis, a me non viuo.

1114. PH. BOMBYX *Cossus* elinguis, alis deflexis nebulosiss, thorace postice fascia atra.

Phalæna subulicornis elinguis; alis depresso-nebulosiss, abdomine annulis albis. *Fn.* 812.

*Plin. hist. l.* 17. c. 24. *Cossus*.

*Mouff. lat. p.* 196. f. 1. *Sphondyla rubra*.

*Mer. eur. 3. p.* 58. t. 36. *gallice t.* 137. ♂ 171.

*Gœd. belg. 2. p.* 112. f. 33.

*Lift. gœd. p.* 105. f. 39.

*Alb. inf. t.* XXXV. f. 56.

*Reaum. gall. VI. t.* 17. f. 1. 3. 4. 5.

*Frisch. germ. 7. p.* 1. t. 1. *Eruca terrestris magna*.

*Raj. inf.* 150. n. 2. Phalæna grandis, alis cinerascentibus: lineolis creberrimis nigricantibus variis, abdomine annulis transversis nigris & albis versicolore.

p. 351. n. 25. *Eruca maxima* subterranea raris pilis obfita supina parte tota, excepto capite, rubra, prona flava.

*Vulgo Cossus*.

Habitat in *Ligno antiquo*.

*Larva XVIpus pilis raris*.

*Puppa* intra folliculum sub terra: incisuris puppæ dentatis.

*DESCR. Corpus magnum. Thorax antice exalbidus, postice lunula atra. Alæ cinereæ nigro tenuissime undulatae utrinque.*

1115. PH. BOMBYX? *bucephala* subelinguis, alis deflexis cinereis apice macula subocellari flava.

*Raj. inf.* 162. n. 14.

*Frisch. inf.* 11. t. 4.

*De Geer. inf. I. t.* 13. f. 14-19.

Habitat in *Alno, Tilia*.

*DESCR. Magnitudo & statura Ph. Cossi. Thorax crassus, luteo-ferrugineus. Alæ superiores cinereæ, antice striga ferruginea, postice nigro ferruginea flexuosa, præter terminalem. Macula magna, flava ad apicem alæ. Subtus alæ flavescentes; superioribus margine interrupta brunneo; inferioribus fascia ferruginea. Antennæ angustæ.*

III6. PH. BOMBYX *Zizzac* elinguis, alis deflexis dorso dentatis apicibusque macula grisea subocellari.

*De Geer.* inf. 2. t. 22. f. 9-16.

*Frisch.* germ. 3. t. 2.

Habitat in Sulice.

**DESCR.** Statura præcedentis. Thorax utrinque postice lobum exserens. Alæ superiores colore fere ustulato nigra transverla brunnea & postice macula magna subviolacea margine brunnea: margo interior ad medium dorsum exserit denticulum erectum.

III7. PH. BOMBYX *cærulocephala* elinguis cristata, alis deflexis griseis: macula albida duplicito-didymia.

Phalæna pectinicornis elinguis, alis deflexis griseis: macula duplice albido-flavescente geminata. Fn. 836.

*Merian.* eur. s. 9.

*Gæd.* belg. 1. p. 116 t. 61. Cæruleo-cephalus.

*List.* gæd. 121 t. 47.

*Frisch* germ. 10. p. 5. t. 3. f. 4. Eruca cæruleo viridis: strigis luteis.

*Reaum.* gall. I. t. 18. f. 7. 8. 9.

*Raj.* inf. 163. n. 17. Phalæna media habitior, alis exterioribus pullis, duabus tribusque maculis albis, e duobus circellis compositis contiguis notatis.

Habitat in Pyro, Gratægo, Cerajo, Hortorum pestis, flores corrumpens.

**DESCR.** Corpus mediæ magnitudinis. Thorax villosissimus, apicem dorsi penicillatus, antice tersus. Antennæ ferrugineaæ. Alæ superiores subgriseæ tæscis duabus fuscis repandis; inter fascias magis nitentes, ad marginem crassiorem duo paria macularum albidarum. Inferiores supra subalbidæ: subtus cinerascentes puncto centrali nigro. Affinis Costa ob antennas, ut etiam Zizzac, quæ omnes gerunt antennas ferratas lamellofas.

III8. PH. BOMBYX *pudibunda* elinguis cristata, alis albo-cinerascentibus: fasciis linearibus tribus fuscis undatis.

Phalæna pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereo undulatis: fasciis transversis obscurioribus, capite inter pedes porrectos. Fn. 828.

*Merian* eur. 47.

*Reaum.* gall. I. t. 33. f. 4. 5. 10. 11. 12.

*Gæd.* belg. 3. p. 33. t. 5.

*List.* gæd. p. 191. f. 81.

*Raj.* inf. 185. n. 7. Phalæna media cinerea, alis oblongis, exterioribus quatuor lineis nigricantibus transversis distinctis.

344. n. 9. Eruca major pulcherrima pilosa e viridi flavi-

flavicans, quatuor in medio dorso scopulis e flavo albicantibus, cum purpureo penicillo longiore supra caudam.

*De Geer. inf. 1. t. 16 f. 11, 12.*

Habitat in *Pruno Armeniaca*, *Malo*, *Castanea*, *Pyro*.

*DESCR.* Larva scopulis 4 in medio dorso flavo-albentibus, & penicillo caeruleo purpureo.

*DESCR.* Corpus albidum. Alæ albidæ: Superiores supra albido-cineraentes: strigis tribus nigricantibus repandis, quarum postica valde undulata.

1119. PH. BOMBYX *fascelina* elinguis cristata cinerea, alis superioribus fasciis duabus angustis fulvo-fuscis, scutello bipunctato fulvo.

Phalæna pectinicornis elinguis villosissima cinerea, alis exterioribus lineolis obsoletis nigris maculaque dupli pallida.

*Fn. 819.*

*Mouff. lat. 189.* Antennulata.

*Merian. eur. t. 18.* Taraxacum.

*List. gæd. 192. t. 80.*

*Gæd. belg. 1. p. 84. t. 36.* Eruca fasciculata.

*Raj. inf. 186. n. 8.* Phalæna obsolete cinerea, alas corpori velut circumvolvens, pedes primores longa & densa lanugine hirsutos antrorsum longissime porrigens.

334. Phalæna e cinereo albicans, corpore habitore, antennis plumosis rubentibus, primores pedes cum sedet protendens & alas corpori velut circumvolvens.

344. Eruca nigra media, longis pilis hirsuta, quinque medio dorso innascentibus pilorum longiorum scopulis nigro albo & ex luteo viridi coloribus variis.

Habitat in *Leontodonte*, *Trifolio*, *Rubo idæo*, *Populo*.

*Larva pilosa*, fasciculis quinque in dorso, ad aures & caudam solitariis.

*DESCR.* Corpus cinereum: Fasiculi dorsales tres: uno ad apicem thoracis nigricante lateribus fulvo; duobus supra basin abdominis nigris. Alæ subdeflexæ, cinereæ lineis duabus transversis (etiam tertia ad basin), undatis, nigricantibus, luteo adspersis; lunula nigricans inter lineas. Pedes, praesertim anteriores villosissimi: Plantæ nigrae, albo undulatae.

1120. BOMBYX *antiqua* elinguis; alis planiusculis: superioribus lunula alba anguli ani; fæmina aptera. *Fn. 827.*

*Gæd. belg. 1. p. 113. t. 59.* Antiik peregrinum.

*List. gæd. p. 191. t. 79.* fæmina.

*Swam. quart. 183. t. 10.* mas & fæmina.

*Aet. ups. 1736. p. 25. n. 74.* Papilio alis depresso-fuscis, antennis pectinatis.

*Mer. eur. 84.*

*Raj. inf. 173. n. 24.* Phalæna cinerea ventricosa, corpore brevi, alarum expers.

344 Eruca sublutea pilosa, quatuor in medio dorso agminulis seu penicillis pilorum longiorum luteorum, & longo pilorum nigrorum penicillo in cauda.

*Reum. gall.* 1. t. 19. f. 12. 13. 17.

*De Geer inf.* 1. t. 17. f. 13-15.

Habitat in *Pruno*, *Tilia*. Mas copula junctus defert feminam apteram ex arbore in arborem.

*DESCR.* Mas alis gaudet amplis, cinereo-nebulosis.

*MAS* antennis fuscis, plumosis. *Alæ superiores* supra flavescentes, fusco-nebulosæ; in singula ala versus angulum ani macula alba lunulata: alæ hæ subtus lutescentes t. ferrugineaæ, uti & alæ inferiores utrinque. *FÆMINA* pectinicornis cinerea, alis vix manifestis, pallidis.

*Læra* pedibus XVI, hirsuta, fasciculis 4 dorsalibus albidis, fastigiatis & scopis ad latera solitariis oppositis, ut & in cauda unica; scopæ loco antennarum, brachiorum & caudæ constant pilis apice penicilliformibus longioribus.

1121. PH. BOMBYX *Tremula* elinguis subcribata, alis superiorebus exustis margine interiore denticulo notatis, antennis ferrugineis.

*Clerck phal.* Phalæna tremula.

Habitat in *Populo*. C. Clerck.

*DESCR.* Magnitudo media. *Antennæ* parum pectinatae, ferrugineaæ, thorace duplo longiores. *Lingua* vix ulla. *Thorax* cinereus, postice subtrilobus, vix manifeste fasciculatus. *Alæ superiores* deflexæ, colore exusto, margine utroque nigricantes; in margine tenuiore, versus thoracem, denticulus subulatus pilis fasciculatis. *Inferiores* alæ albidæ. *Tibiæ* antice valde hirsutaæ.

1122. PH. BOMBYX *furcula* elinguis, thorace variegato, alis griseis basi apiceque albis nigro punctatis.

Habitat heic rarius.

*DESCR.* Magnitudo minor. *Thorax* antice pallidus, cæterum fuscus, luteo punctatus. *Alæ superiores* basi pallide punctis aliquot nigris: dein fascia lata cinerea, quæ postice pallidior fusco undata & versus apicem purpurascens; tum margo posticus alæ late albidus serie marginali punctorum nigrorum. *Inferiores* alæ albidæ, subtus puncto nigricante.

1123. PH. BOMBYX *Coryli* elinguis, alis antice griseo-nebulosis; postice cærulecenti-glaucis, thorace variegato, antennis flavis.

*De Geer inf.* 1. 18. f. 4, 5.

*Roef. inf.* 1. *phal.* 2. t. 58.

Habitat in *Corylo*.

*DESCR.* Magnitudo minor. *Antennæ* testaceaæ. *Corpus* villosum, cinereum. *Alæ superiores* antice cinerea cum puncto ocellari nigricante, in medio albo; postice ala cano cinerea, fusco obsolete undata; margo posticus ciliaris albis punctis.

1124. PH. BOMBYX *curtula* elinguis, alis deflexis glaucis: striga alba apicibusque macula testacea.  
*Frisch.* *inf.* 5. *t.* 6.  
*Habitat in Quercu, Populo.*  
*DESCR.* Simillima PH. anastomosi capite retracto & fronte brunnea. *Magnitudo minor.* Alæ superiores pallide, vix rufescentes s. glaucae; ad spicem alæ macula magna rufa; Strigæ tres alæ, quarum quæ maculam rufam antice tangit nivea. *Thoracis* tergum ferrugineum.
1125. PH. BOMBYX *anastomosis* elinguis, alis griseo-cinerascentibus: strigis tribus pallidis subanastomosantibus.  
*Roeß.* *inf* 1. *phal.* 2. *t.* 26.  
*Habitat in Salice.*  
*DESCR.* Affinis PH. Curtulæ, Thorace antice macula brunnea, omnino ut in illa. Alæ superiores obscure griseæ strigis tribus albis & fascia obscuriore a secundæ basi ad tertiaræ spicem ducta.
1126. PH. BOMBYX *Crataegi* elinguis, alis deflexis cinereis rotundatis: fascia obscuriore obsoletissima, ano barbato.  
*Reum.* *inf.* 1. *t.* 11. *f.* 10.  
*De Geer* *inf.* 1. *t.* 4. *f.* 20, 21.  
*Clerck.* *phal.* *t.* 5. *f.* 1.  
*Habitat in Cratægo.*  
*DESCR.* Statura Ph. Mendicæ, parva, tota cinerea, excepta fascia lata alarum subcinerea saturatiore.
1127. PH. BOMBYX *mendica* elinguis cinerea tota, femoribus luteis.  
*Clerck* *phal.* *t.* 3. *f.* 5. *Phalæna mendica.*  
*Habitat in Sylvis.*  
*DESCR.* *Magnitudo minor.* Antennæ magis fuscae rachi alba.
1128. PH. BOMBYX *chrysorrhœa* elinguis, alis deflexis albidis, ano barbato luteo.  
*Raj.* *inf.* 156. *n.* 1. 15.  
*343. n. 5.*  
*Frisch.* *inf.* 3. *p.* 28. *t.* 8.  
*Habitat in Pomonæ arboribus.*  
*DESCR.* *Magnitudo mediocris.* Tota nivea, excepto Ano valde barbato luteo aut ferrugineo. Antennæ etiam niveæ.
1129. PH. BOMBYX *Salicis* elinguis, alis deflexis albis, pedibus nigris albo annulatis.  
*Phalæna pedestris* elinguis, alis deflexis albis, pedibus antennisque nigris. *Fn.* 822.

300 INSECTA LEPID. PHALÆNA. BOMBYX.

Gœd. belg. I. p. 25. t. 3. Procul spectabilis.

List. gœd. 202. t. 87.

Merian. eur. I. p. II. t. 30. *Salix caprea latifolia*.

Blank. belg. p. 44. t. 8. f. A. B. C. D.

Frisch. germ. I. p. 22. t. 4. f. bona.

Reaum. gall. I. t. 31. f. 4. 5. 6.

Act. upf. 1736. p. 124. n. 58. *Papilio alis depressis niveis*,  
antennis pennatis, pedibus annulis nigris.

De Geer inf. I. t. II. f. 13, 14.

Habitat in *Salice Fragili*, quam quotannis devastat. Item in  
*Populo alba & tremula*. It. scan. 166, 307.

DESCR. Larva XVIpus, nigra, verrucis fulcis, pilosus: maculæ IX du-

plicatae, longitudinales, flavicantes; mutata 1740; VI: 21-VII. 4.

Phalæna est elinguis, nivea, antennis nigris, pedibus nigris: annulis al-

bis. *Maris* antennæ pectinatae utrinque; *Feminae* hinc tantum.

130. PH. BOMBYX *Monacha* elinguis, alis deflexis albis a-  
tro-undatis, abdominis incisuris sanguineis.

Wilk. pap. 19. t. 3. a. 4.

Habitat in Svecia rarius. T. Bergman.

DESCR. Magnitudo media. Antennæ nigrae, Thorax albidus: antice  
lunula nigra, postice macula fusca. Alæ superiores albæ, atro undulatae  
& aliquot punctis nigris. Inferiores utrinque & superiores subitus cine-  
reo-albicantes margine albo punctisque nigris. Caput flavescens. Abdomen  
nigricans segmentis omnibus margine coccineis. Pedes nigri.

131. PH. BOMBYX *Caja* elinguis, alis deflexis fuscis: rivu-  
lis albis; inferioribus purpureis nigro-punctatis.

Phalæna pectinicornis elinguis, alis deflexis: superioribus fu-  
scis: rivulis albis; inferioribus purpureis: punctis sex ni-  
gris. Fn. 820.

Aldr. inf. 245. t. 246. f. II. 12.

Mouff. lat. p. 93. n. 18. f. Suprema.

p. 186. f. 2. Ambulo secundus.

Hoffn. inf. t. 14. f. II. edit. alt. 3. 4. 9.

Gœd. belg. I. p. 74. f. 17.

List. gœd. p. 219. f. 99.

Blank. belg. p. 57. t. 9. f. A. B. C. Eruca ursina.  
germ. p. 44. t. 9. f. C.

Merian. eur. I. p. 2. t. 5. & 160.

Alb. inf. t. 20. f. C. D.

Frisch. germ. 2. p. 38. t. 9. Eruca ursina.

Reaum. gall. I. t. 36. f. 7. 8.

Mus. petrop. I. p. 711. n. 5. Phalæna alis superioribus fu-  
scis: lituris flavis; inferioribus rubris; maculis nigris or-  
nata.

# INSECTA LEPID, PHALÆNA, BOMBYX. 301

*Raj. inf. p. 151 n. 3.* Phalæna major: alis amplis oblongis albicante & fusco coloribus pulchre variegatis, interioribus rutilis cum maculis nigris.

*p. 152. n. 7.* Eruca densius pilosa magna, pilis longis incanis fulvis & nigris varia, cum punctorum albenium lineis annularibus.

*Blank. herb. t. 87 f. 10. & t. 76 f. 3.*

*Vulgo Ursus.*

Habitat in *Lactuca* & ad finibus.

*Larva* XVIpus, hirsutissima, dorso nigro, ab domine lateribusque testaceis: punctorum lateralium longitudinalis ordo seu punctum ad latus singulæ incisuræ album.

*DESCR.* Caput & Thorax fusca, postice sanguinea. Abdomen sanguineum maculis dorsalibus 4, transversis, nigris. Antennæ supra niveas. Alæ superiores concordes, fusce rivulis albis variis; unde puncta 4 distinctæ fusce ad basin, 6 majores areæ fusce in disco. Inferiores alæ concordes sanguineæ maculis fæpiis septem, fuscis, rotundatis.

1132. PH. BOMBYX *Plantaginis* elinguis, alis deflexis atris: rivulis flavis; inferioribus luteis nigro-maculatis.

Phalæna peñinicoris elinguis, alis deflexis atris: superioribus rivulis flavis; inferioribus rubris: maculis nigris. *In. 821. It. gotl. 273.*

*Alb. inf. t. XXI.*

*Reaum. gall. I. t. 31.*

Habitat in *Ulmo*.

*DESCR.* Priori quodammodo similis, sed minor, *Antennæ setaceæ. Alæ atræ: superiores* rivulis flavis, margineque inferiore parum luteo; *Inferiores luteæ maculis nigris. Abdomen a tergo nigrum, lateribus luteis ordine longitudinali punctorum atrorum. Colli cingulum fulvum. Thoracis linea longitudinalis & laterales nigrae.*

1133. PH. BOMBYX *aulica* spirilinguis, alis deflexis: superioribus griseis flavo punctatis; inferioribus fulvis nigro-maculatis.

*Clerck. phal. t. 4. f. 3. Ph. aulica.*

Habitat in *Gramine* Larva hirsuta, similis *Cajæ D D. Hartmann.*

*DESCR.* Parva. *Alæ superiores* griseæ maculis 5 flavis, quarum antica longior e duabus composita, præter minora aliquot puncta ad apicem alæ. *Inferiores* nigrae rivulis fulvis, ut quisnam color prævaleat non facile liquet. *Abdomen dorso fusco & ad latera punctis fuscis.*

1134. PH. BOMBYX *grammica* spirilinguis, alis deflexis luteis: superioribus flavis nigro striatis; inferioribus fascia terminali nigra. *Syst. nat. 10. p. 502. n. 31.*

*Raj. inf. 169. n. 28.*

*280. n. 13.*

*Roef.*

*Roes. inf. 4. t. 21. f. A. D.*

Habitat in *Abrotano*.

DESCR. Statura Ph. jacobææ. Alæ superiores angustæ, luteæ, pallidiores; striis longitudinalibus nigris subramosis; subtus versus apicem fuscescentes. Inferiores saturate luteæ: postice supra fascia latiuscula nigra; subtus punto maiuscule fasciaque nigra. Abdomen luteum, quinquefaria in nigro punctatum. Antennæ nigræ, vix manifeste pinnatae.

1135. PH. BOMBYX *Sannio* spirilinguis, alis deflexis luteis: margine sanguineo lunulaque fusca; inferioribus subtus immaculatis.

Phalæna pectinicornis spirilinguis, alis subdeflexis margine rubro: superioribus fulvis lunula fusca; inferioribus fulcis.

*Fn 837.*

*Rob. ic. t. 30. f. 1.*

*Act. ups. 1736. p. 23. n. 41.* Papilio alis planis fulvis: macula rubente.

*Raj. inf. 228. n. 75.* Phalæna minor, corpore crasso e fusco & rubro diversicolore, alis exterioribus obscure rufis s. pullis: duabus maculis nigris notatis, interioribus e pullo & rubro variis.

Habitat in *Gramine*.

DESCR. Antennæ pectinatae rachi coccinea, radiis fuscis. Corpus pilosum crinibus flavis. Abdomen inter pedes rubrum. Alæ superiores extus flavæ: in medio alæ extus lunula ferruginea seu fulva in macula fusca; subtus fusco-nebulosæ. Inferiores Alæ extus cinereæ, macula in medio fusca, oblonga, & arcu intra marginem fusco; ergo alæ inferiores extus simillimæ alis superioribus a latere interiore. Alæ inferiores subtus pallidæ macula in medio obscura; omnes alas cingit margo e pilis coccineis.

1136. PH. BOMBYX *Cibrum* spirilinguis, alis incumbenti-bus: superioribus albidis transverse nigro-punctatis.

Habitat in *Suecia australi*, tarius.

DESCR. Statura & magnitudo Ph. jacobææ. Alæ superiores supra albidæ, fere transverse pluries nigro punctatae. Superioris subtus, & inferiores utrinque fuscae. Abdomen postice lutescens.

1137. PH. BOMBYX *lota* spirilinguis, alis cinereis: puncto disci atro posticeque striga purpurascente fracta.

*Clerck. phal. t. 8. f. 1.* Ph. lota.

Habitat passim.

DESCR. Magnitudo media. Antennæ vix manifeste pectinatae. Alæ superiores cinereæ atomis aliquot nigris, maculisque duabus obsoletis solo margine conspicuis: anteriore orbiculari, posteriore cordiformi, ut in rusticis; in macula posteriore ad latus interius punctum magnum atrum. Striga fulva s. purpurascens latere posteriore albida; striga hæc versus posteriora semel diffusa est. Subtus alæ pallide cinereæ cum puncto atro & striga fusca, obsoleta, arcuata.

1138. PH. BOMBYX *lubricipeda* spirilinguis, alis deflexis albidis punctis nigris, abdomine quinque fariam nigro-punctato.

Phalæna pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis: punctis nigris, abdomine ordinibus quinque punctorum. Fn. 823.

Gœd belg. I. p. 63. t. 23. Lubricipeda.

List. gœd. 210. t. 93.

Frisch. germ. 3. p. 22. t. 8.

Merian. eur. I. p. 16. t. 46. & 65.

Alt. inf. t. 24. f. 30.

Reaum. gall. 2. t. 1. f. 7-9.

Aet. ups. 1736. p. 124. n. 59. Papilio alis depressis albis: punctis nigris, ventre quinque punctorum.

De Geer inf. I. t. 11. f. 7, 8.

Habitat in arboribus pomiferis, *Urtica*, *Atriplice*, *Quercu*.

DESCR. Remora, præsertim antica, lanugine ferruginea vestita. Corpus album s. albidum. Alæ adspersæ punctis nigris, copiosioribus in superiorum pagina superiore. Abdomen luteum quintuplici macularum nigrarum ordine, quorum unus dorsalis, duo utrinque laterales. Mas alis flavescensibus ordine oblique transverso punctorum nigrorum.

1139. PH. BOMBYX *Oo* spirilinguis cristata, alis depressis cinerascentijs oo notatis.

Roej. inf. I. p. 2. t. 63.

Habitat in *Quercu*, apud nos rarius.

1140. PH. BOMBYX *Graminis* spirilinguis, alis depressis griseis: linea ramosa lunulaque glaucis.

Phalæna pectinicornis elinguis: alis cinereo-fuscis: lineis lunulisque glaucis. Fn. 826. 886.

Aet. stockb. 1742. p. 40. t. 2.

Raj. inf. 228. n. 104.

Habitat in *Gramine* (*Alopecuro intacto*) pessima nostratis, prata certis annis, nec determinatis, devastans, foenum omne consumens, unde Pecora periclitantur, pretium sceni adscendit; prata inde proximis annis florent florētibus plantis, antea solo gramine tectis. Pellitur Cornicibus, Suibus, fossis.

DESCR. Est e Phalænis mediis. Tota satis brevis, hirsuta. Alæ superiores cinereo-fuscae, quas lineæ aliquot longitudinales glaucæ exarant, ubi haæ striæ ramosæ evadunt, observatur lunula grisea cornibus posteriora respiciens; supra hanc lunulam punctum griseum est. Alæ haæ subtus cinereo-tuscae, cum puncto nigro in medio: alæ inferiores pallide griseæ cum fuscedine versus marginem, & puncto subtus nigro.

1141. PH. BOMBYX *celsia* spirilinguis cristatae, alis incumbentibus: supra viridibus; fascia grisea dentata.

Pha-

Phalæna pectinicornis; alis supra viridibus: fascia transversali sinuato-dentata glauca *Fn. 816.*

Habitat Upsaliæ in *Layuletis*, lecta ab O. Celsio. Theol. Professore primario.

*DESCR.* Est e mediocribus. *Caput* viride. *Alæ superiores* virides: fascia in medio alarum linearis, transversali, grisea; in singula ala denticulo unico antrorsum & alio opposito retrosum spectante; præter denticulum alium ad marginem exteriorem alæ antrorsum proeminente punctum lunare griseum, in medio alæ pone denticulum. *Margo* alarum posticus similis glauca linea terminatur, quæ in singula ala duos denticulos antrorsum exelerit; alarum superiorum margo interior & exterior vix conspicue griseus. *I thorax & abdomen* villis glauco ferrugineis teguntur. *Alæ inferiores* fusce; subtus fascia obscurior transversa repanda cum puncto obscuro ante fasciam. *Antennæ* ferrugineaæ.

1142. PH. BOMBYX *belvola* alis rufis: fasciis subfuscescensibus postica lateriore, subtus rufescensibus.

*Clerck. phal. t. 4. f. 8.* Phalæna *belvola*.

Habitat Holmiæ.

1143. PH. BOMBYX *libatrix* spirilingnis cristata, alis incumbentibus dentato-erosis rufo-griseis: punctis duobus albis.

Phalæna pectinicornis elinguis: alis cinereo flavoque rufis: margine laceris *Fn. 833.*

*Gæd. belg. I. p. 155. t. 67.* Libatrix.

*Lift. gæd. 81. t. 30.*

*Að. upf. 1736. p. 25. n. 63.* Papilio alis depressis erosis croceo-rufis.

*Pet. gaz. 29. t. 19. f. 4.* Phalæna fasciata perelegans extremitate spiralis?

*Vulgo* Libatrix.

Habitat in variis, præsertim in *Glechomate*, *Salice*.

*DESCR.* Alæ superiores incumbentes, postice erose, supra griseæ fascia linearis arcuata cinerea: posteriore retrosum ex duplice lineola alba; anteriore fasciola alba versus basin antrorsum arcuata angustiore. Punctum album ad basin antennarum; aliud ad basin alarum; aliud in medio alæ ad aream flavam; aliud in singulo femore. Pedes barbati.

1144. PH. BOMBYX *capucina* spirilinguis cristata, alis deflexis denticulatis ferrugineis: denticulo dorsali reflexo fasciæ cinerea.

Habitat pafl:rn.

*DESCR.* Media. Alæ deflexæ, margine postico dentata, colore rufo-ferruginea fascia obliqua fusca. Subtus omnes rufæ. Cæterum sequenti structura similissima est hæc Phalæna.

1145. PH. BOMBYX *camelina* spirilinguis cristata, alis deflexis erosis brunneis; omnibus denticulo dorsali.

*Roes.* *inf.* 1. *phal.* 2. *t.* 28.

Habitat in *Tilia*. *Malo*, *Betula*. *Also.* T. Bergman.

DESCR. Alæ deflexæ, erosæ, brunneæ lineis tribus fuscis transversis; Superioræ in medio marginis tenuioris dente erecto; inferiores versus finem marginis tenuioris dente instructæ. Inter singulum par dentium alarum fasciculus est.

1146. PH. BOMBYX *palmata* elinguis cristata; alis deflexis erosis albido striatis nigro-venosis, palpis pennatis porrectis.

*De Geer.* *inf.* 1. *t.* 4. *f.* 7.

Habitat in *Salice*.

DESCR. Magnitudo media. Thorax pallens, cristatus. Palpi ensiformes, porrecti, obtusissimi, quasi diffusi. Antennæ angustæ. Alæ superiores albido-flavescentes, striatæ venis nigricantibus, undatæ, in margine tenuiore falcatae lobo ciliari fusco; margo posticus denticularius. Inferiores alæ albidae fascia valde obsoleta. Subitus primores margine exteriore puncto fusco. Inferiores subtus albæ, puncto arcuque fusco.

1147. PH. NOCTUA *Humuli* elinguis fulva, antennis thorace brevioribus; Maris alis niveis.

Phalæna setricornis elinguis, antennis brevissimis rufis, thorace flavo, alis deflexis. Fn. 917.

Aet. upf. 1736. p. 124. n. 57. Papilio alis depresso; supra argenteis, subtus obscuris.

*De Geer* *inf.* 1. *t.* 7. *f.* 5. 6.

*Raj.* *inf.* 157. *n.* 3. Papilio media alis longis, in fæmina flavis cum lineis rubentibus, in mare albis.

Habitat in radicibus *Humuli Lupuli*, quam valde devastat non sine summo possessoris damno, quum Rös melleus radicibus contaminatis totam plantam inungat & eam abortivam reddat. Sub terra, ex ipsa terra, format cylindros perpendiculares spithameos osteocollæ simillimos.

DESCR. Phalæna inter nocturnas nostras maximas locum tenet. Oculi nigricantes. Antennæ setaceæ, thorace longe breviores; hinc brevissimæ. Thorax ipse flavus. Abdomen flavo-rubens. Alæ subtus nigricantes sive fuliginose. Alæ supra colore maxime differentiæ sexti.

MARIS enim alæ supra summe niveæ, ut quid albidius me non vidisse meminerim; Pedes postici lana grisea valde barbati.

FÆMINÆ alæ autem supra flave, nunc immaculatae, nunc dupliciti obliqua linea, nunc simplici linea obliqua fulva notatae, hinc eandem dicerem cum *Gæd.* belg. 1. p. 47. t. 12. & *List.* gæd. 195. t. 82. Nisi antennæ in nostra, tam mare, quam fæmina, omni barba catarent.

1148. PH. NOCTUA *Hecla* elinguis lutea, antennis thorace brevioribus, alis fasciis duabus albido obliquis punctato-interruptis.

*De Geer* inf. 1. t. 7. f. II.Habitat apud nos rarius. *C. Clerck.*

DESCR. Magnitudo Tabani. Corpus flavum. Alæ saturate luteæ fascia brevi versus basin, majore nigra obliqua versus postica ex punctis albido-flavis concatenata. Antennæ brevissimæ, luteæ.

1149. PH. NOCTUA *lupulina* elinguis lutea, antennis thorace brevioribus, alis macula arcuque cinerascente.

Habitat in Suecia rarius.

DESCR. Antenna brevissimæ, luteæ. Corpus luteum, præcedente duplo majus. Alæ superiores areu fusco extus albo; in centro arcus macula oblonga fusca extus alba.

1150. PH. NOCTUA *Pyrina* lævis nivea, antennis thorace brevioribus, alis punctis numerosis cæruleo-nigris; thorace senis.*Reaum.* inf. 2. t. 38. f. 1-4.*Roes.* inf. 3. t. 48. f. 5-6.Habitat in ramis *Pyri*, *Alni*.

DESCR. Magnitudo P. Humulinæ. Thorax tomentoso-lanatus punctis sex nigro-cæruleis. Alæ deflexæ, albæ, punctis numerosis nigro-cærulecentibus: antice &amp; ad marginem exteriorem rotundis, reliquis oblondis. Inferiores alæ breves, obsolete punctatæ, sed margine inferiore 7 s. 8 punctis magis nigricantibus.

1151. PH. NOCTUA *sylvina* subelinguis, antennis brevibus ferratis, alis rufo-lutescentibus: fasciis tribus albidis variis.Habitat Holmiæ. *D. Martewille.*

DESCR. Affinitas &amp; magnitudo PH. Humuli. Antennæ vix thorace longiores, ferratae. Alæ superiores supra rufo-testacea: fasciis luteo-albidis tribus: prima in basi alæ, fracta: exteriorius ad marginem inferiorem fere falcata, ad marginem tenuiorem semiovata. Secunda transversa, ad marginem exteriorem bifida in medio, raimulo antrorum spectante. Tertia fascia obsoleta versus marginem posticum. Alæ omnes subtus &amp; inferiores etiam supra rufo-fuscatoentes.

1152. PH. NOCTUA *lucernea* spirilinguis lævis, alis depressis cinereis immaculatis: strigis tribus repandis albidis, collari bifido.*Clerck.* phal. t. 1. f. 7. Phalæna lucernea.

Habitat frequens apud nos, vesperi candelas ardentes involans.

DESCR. Magnitudo Ph. rusticorum, tota canescens. Collare erectum, rotundatum, bifidum. Alæ superiores cinerea: strigis tribus, albidis, undulatis. Inferioriter subtus exalbidus puncto &amp; fascia arcuata fusca.

1153. PH NOCTUA *complana* spirilinguis lævis, alis depressis; superioribus canescenscentibus exteriori margine albis; inferioribus flavis.

Phalæna feticornis, alis incumbentibus: superioribus exteriori margine; inferioribus totis flavis. *Fn.* 918.

*Aet. upf.* 1736. *p.* 25. *n.* 76.

Habitat in *Quercu*.

DESCR. Est hæc e minoribus, oblonga. *Alæ superiores* dilute cinereæ, sed margine exteriori secundum totam longitudinem flavo. *Alæ inferiores* etiam totæ flavæ.

1154. PH. NOCTUA *rubicollis* spirilinguis lævis nigra, collare purpureo, abdomine flavo.

Phalæna feticornis spirilinguis, alis deflexis nigricantibus, collare abdomineque fulvis. *Fn.* 881.

Clerck. *phal.* t. 2. f. 3. Phalæna rubicollis.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Magnitudo Ph. complanæ, sed tota atra, excepto *collare sanguineo* & *ventre flavo*.

1155. PH. NOCTUA *Jacobææ* spirilinguis lævis, alis depressis fuscis: lineis punctisque duobus; inferioribusque totis rubris.

Phalæna feticornis spirilinguis, alis superioribus fuscis: linea punctisque duobus rubris, inferioribus rubris. *It. æl.* 120, *Fn.* 869.

*Mouff.* lat. *p.* 98. *n.* 3. *t.* 97 *f. inter tres infimas supreme.* & *p.* 183. *flavescens superior.*

*Jonst.* *inf.* t. 7. *ord.* 3. Phalæna minima pratensis 2.

*Chart.* *onom.* *p.* 53. *Eruca Jacobææ.*

*Rob.* *icon.* t. 20.

*Alb.* *inf.* t. *XXXIV.* *f.* *H. G.*

*Mer.* *europ.* 3. *p.* 56. *f.* 28.

*Goed.* *belg.* 1 *p.* 56, *t.* 9.

*Lift.* *goed.* *p.* 134. *f.* 54.

*Blank.* *belg.* 11. *t.* 1. *f.* *G. H. I. K.* *Eruca arenaria.* *germ.* 9. *t.* 1. *f.* *I. K.*

*Reaum.* *gall.* 1. *t.* 17. *f.* 4. 5. 6. 7.

*Pet.* *gaz.* *p.* 52. *t.* 33. *f.* 6. Phalæna umbrica, linea maculisque sanguineis.

*Raj.* *inf.* 168. *n.* 26. Phalæna media, alis exterioribus colore nigro & sanguineo variis, extimo duntaxat margine nigro.

*Derrham.* *physico-theol.* 1. 8. *t.* 6. *n.* 6. Papilio Jacobææ.

Habitat in *Senecione Jacobææ*, minus frequens apud nos, quam in Dunis Belgicis.

# 308 INSECTA LEPID. PHALÆNA. NOCTUA.

DESCR. *Corpus nigrum* *Antennæ setaceæ*. *Alæ nigrae*; *superiores* *margine longitudinali linea rubra*, *macula rubra ad apicem* & *alia macula ad marginem interiorem*; *alæ inferiores rubrae margine nigro*.

1156. PH. NOCTUA *russula* spirilinguis lævis, alis fulvis rubro venosis, maculaque ferruginea, inferioribus nigro variegatis.

Clerck. phal. t. 4. f. 1. Phalæna russula.

Habitat passim frequens.

DESCR. Simillima PH. Sannioni, ac si solo sexu differret, sed metamorphosi non innotuit. *Corpus fulvum*. *Antennæ fulvae*. *Alæ superiores supra fulvae*; *lunula obsoleta rubra in medio*; *subtus flavæ nigro-variaæ*. *Inferiores supra flavæ nigro variaæ*; *subtus flavæ maculis nigris*.

1157. PH. NOCTUA *trapezina* spirilinguis lævis, alis de pressis flavidantibus: fascia latissima saturatiore puncto nigro margineque punctato.

Habitat passim.

DESCR. Media. Tota pallide flavidans. *Alæ plane-incumbentes*: *superiores* *fascia latissima*, *obtusa*, *rhomboidæ*, *saturatiore*, *in cujus medio punctum nigrum*, *minutum*; *margo posticus 7 punctis* *vix conspicuis*, *nigris*; *alæ subtus postice obsolete rufescunt*.

1158. PH. NOCTUA *Batis* spirilinguis lævis, alis de pressis: superioribus fuscis: maculis simul quinque albidis; inferioribus albis.

Roeß. inf. 4. t. 26.

Habitat in *Rubo*.

DESCR. media. *Alæ superiores supra fuscæ* *maculis rotundatis*: *macula baseos* *alæ albida* *in medio fusa*; *macula orbicularis* *ad angulum anni*; *macula dimidia* *ad marginem tenuiorem*; *Maculæ duæ* *versus apicem alæ*. *Inferiores* *alæ utrinque pallidæ*.

1159. PH. NOCTUA *fuliginosa* spirilinguis lævis, alis deflexis rufo-fuliginosis: punctis duobus nigris, abdomine sangvineo.

Uddm. diff. 76.

Raj. inf. 228. n. 13

Roeß. inf. 1. phal. 2. t. 43.

Habitat in *Gramine*, *Rumice*.

DESCR. Magnitudo Tabani. *Alæ superiores rufo-fuscescentes*: *punctis*, *duobus nigris* *in medio* *versus marginem crassiorem*. *Inferiores* *similes* *sed magis fuscescentes* *lunula nigra*, *margineque postico sanguineo*. *Theorax brunneus*. *Abdomen* *sanguineum* *triplici ordiae* *punctorum nigrorum*. *Antennæ supra albae*.

1160. PH. NOCTUA *parthenias* spirilinguis, alis deflexis fuco alboque variis; inferioribus luteis punctis duobus nigris.

*It.* W:goth. 141. n. 1.

Habitat in Quercketis primo vere. T. Bergman.

DESCR. Media. Alæ superiores supra fuscæ, albo nebulosæ. Inferiores luteæ punctis nigris, duobus, magnis, quorum alter in centro cohærens eum nigredine baseos; alter ad angulum ani. Subtas omnes alæ luteæ; fascia in medio nigra.

1161. PH. NOCTUA *glypica* spirilinguis lævis, alis deflexis fuscescentibus; maculis hieroglyphicis nigris, subtus luteæ fusco-fasciatæ.

Phalæna seticornis spirilinguis, alis patentibus supra fuscis pone subtusque flavescentibus. Fn. 847.

*Hoffn. inf. 4. t. 11. f. 3.*

Habitat in paucis Oestunæ Uplandiæ. D. Leche.

DESCR. Corpus nigricans. Alæ superiores fuscæ & tristi colore, postice versus marginem quasi fulco flavescente obsoletæ; macula in medio versus marginem crassiore una alterave magis obscura. Alæ omnes subtus luteæ fasciis concrecentibus & puncto magno lunari atro in alis superioribus, fere in medio. Magnitudo & statura Phalænæ Graminis.

1162. PH. NOCTUA *Mi* spirilinguis lævis, alis deflexis **supra** cinereis: securi pallido-marginata, subtus w nigro.

Habitat passim.

DESCR. Similis Ph. *glypica*. Alæ superiores cinereæ, notatae fasciola fusca punctoque in medio atro; dein macula fusca postice triloba. Subtas alæ pallidæ, postice fuscescente maculatæ, in medio fascia linearis nigra figura W seu M, pone punctum arcuatum nigrum.

1163. PH. NOCTUA *Vitis idææ* subelinguis, alis **cinereis** fascia transversa saturatiore; inferioribus planis.

Habitat in *Vaccinio Vite idææ*.

DESCR. Magnitudo præcedentis. Tota cinerea, inclegans. Alæ **supra** omnes cinereæ: fascia lata, transversa, magis obscure cinerea; Subtas cinereæ, in anteriore parte obscuriores, in posteriore dilutiores. Inferiores figura & fere magnitudine superiorum, planæ & minime plicatae, unde singularis facies. Anus barbatus. Pedes hirsuti. Antennæ corpore triplo breviores. Similius PH. *Cratægi*, ut figura Reaumurii hanc potius delineet, quam alteram.

1164. PH. NOCTUA *meticulosa* spirilinguis eristata, alis ero- sis pallidis: superioribus basi incarnata triangulo fusco.

Phalæna subulicornis spirilinguis, alis deflexis erosis pallidis: triangulo fuscescente incarnatum includente, thorace gibbo.

Fn. 815.

*Merian. eur. t. 34.*

*Gœd. belg. 1. p. 109. t. 56.* Meticulosa

*List. gœd. 118. t. 44.*

*Reaum. gall.* I. t. 8. f. 25. 26. ♂ t. 14. f. 12. 13.

*De Geer. inf.* I. t. 5. f. 14.

Habitat in omnibus oleraceis: *Cheirantho*, *Urtica*, *Mercurialis*; apud nos rario.

1165. PH. NOCTUA *Fraxini* spirilinguis cristata, alis dentatis deflexis cinereo-nebulosis; inferioribus supra nigris fascia cærulecente.

*Røsf. inf.* 4. t. 28. f. 1.

*Hamburg. magaz. tom.* 18. f. 1-4.

Habitat in *Fraxino*, *Populo*.

DESCR. Maxima nostratum Phalænarum. *Corpus* cinereum, subtus album. *Alæ superiores* supra albicantes fusco nebulosæ; striga una alterave alba nigraque & puncto albo majusculo in medio. *Subtus* fasciis tribus, alternis, albis nigrisque. *Inferiores* supra nigrae fascia lata, cærulea, marginaque albo. *Subtus* alba: lunula, fascia arcuata & limbo nigris. Omnes alæ margine postico repandæ sunt.

1166. PH. NOCTUA *pacta* spirilinguis cristata, alis cinerascentibus; inferioribus rubris fasciis duabus nigris, abdomine supra rubro.

Habitat in *Salice caprea*.

DESCR. *Corpus* majusculum, cinereum. *Abdomen* supra rubrum. *Alæ superiores* supra cinereæ; strigis tribus, undatis & ocello lunari nigricante in medio, juxta maculam obliteratam. *Inferiores* sanguineæ: fascia nigra, arcuata, in medio; & alia majore versus marginem posterum album.

1167. PH. NOCTUA *pronuba* spirilinguis cristata, alis incumbentibus griseis; inferioribus luteis fascia atra submarginali. Phalæna seticornis spirilinguis; alis incumbentibus: exterioribus cæsiis nebulosis; inferioribus luteis, fascia atra marginali. *Fn.* 870.

*Höffn. inf.* 15. f. 18.

*Gœd belg.* I. p. 71. f. 14. Noctua.

*List. gœd.* p. 114. f. 41.

*Blank. belg.* 35. t. 6. f. D. E. F.

*germ.* 28. t. 6. f. D. E. F.

*Alb. inf.* 72. f. C. D.

*Merr. pin.* 198. Papilio major, cum exterioribus alis fulvis, internis aureis nigra linea fimbriatis.

*Merr. eur.* t. 49.

*Raj. inf.* 237. n. 18. Papilio major, alis prælongis: exterioribus vel rufis vel ex cinereo nigricantibus; interioribus fulvis cum fascia lata nigra prope imum marginem.

Frisch. germ. 10. p. 17. t. 15. f. 4.

Reaum. gall. 1. t. 14. f. 8. 9.

A&T. upf. 1736. p. 124. n. 60. Papilio alis depressis griseis, obscure maculatis, inferioribus flavis, margine nigro.

Habitat in *Tblaspi Bursa pastoris*; in *Senecione*, *Auricula urfi*, *Primula*, *Cheirantho*, variis.

DESCR. Thorax obsolete cristatus. Alæ superiores glauco-cinerascentes nebulosæ macula reniformi fusca pone rotundam pallidam. Ad angulum extimum alæ, juxta marginem inferiorem, puncta duo nigra. Inferiores alæ utrinque luteæ; fascia submarginali nigra.

1168. PH. NOCTUA *Myrtilli* spirilinguis cristata alis griseis striga alba; inferioribus antice luteis posticeque nigris.

Røs. inf. 4. t. 11. f. A. B. C.

Habitat in *Vaccinio uliginoso*.

DESCR. Parva & inter Noctuas facile minima. Corpus nigricans, incisuris albis. Thorax subgriseus. Anus subbarbatus. Alæ superiores nigricantes, purpurascens-ferrugineo nebulosæ cum striga repanda alba ad basin & alia prope marginem posticum; macula alba triquetra in medio. Subtus superiores e nigro purpurascente & albido maculatæ. Alæ inferiores supra anterius luteæ, posterius atræ margine postico albicante. Subtus itidem antice luteæ cum puncto nigro; postice atræ cum macula ad angulum exteriorem ferruginea obsoletiore.

1169. PH. NOCTUA *chrysitis* spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus orichalceis fascia grisea.

Phalæna leticornis spirilinguis; alis deflexis nebulosis: fascia una alterave aurea. Fn. 875.

Mer. eur. v. 1. p. 14. t. 39.

Raj. inf. 182. Phalæna media, alis exterioribus duplii area transversa viridi-aurata serici instar splendente insignibus.

Habitat in *Mentha*, volitando mel florum haurit.

DESCR. Magnitudo media. Caput, Thoracis antica pars & Antennæ exaldo-flavescens. Alæ superiores nebulosæ, versus marginem posticum cinereo-obsolete; dein fascia pallido-aurata; tum nebulosæ sunt alæ cum tintura aurea, quæ quasi alteram fasciam auream constituit; demum nebuloso cinerascentes ad basin alæ. Alæ superiores subtus fuscæ, ad marginem postice griseæ; Alæ inferiores supra fuscantes & eadem infra subgriseæ cum arcu nigricante reflexo & puncto lunulato

1170. PH. NOCTUA *Festuæ* spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus flavo ferrugineoque variis: maculis tribus argenteis.

A&T. Stockh. 1748. t. 6. f. 3, 4.

Pet. gaz. t. 7. f. 7. Phal. occidentalis anglæ lituris ex aureo & argenteo mixtis.

Habitat in *Festuæ* fluitante, pulcherrima.

312 INSECTA LEPID. PHALÆNA. NOCTUA

DESCR. Media. *Fulva* sunt Caput, Pedes anteriores, Antennæ, Lingua. Thorax magis pallescens fasciculo dorsali fulvo. Abdomen flavum: Alæ superiores flavo ferrugineoque variae. Maculae argenteæ longitudinales in medio utriusque alæ & una linearis versus apicem; basis alæ etiam ex argento nitet. Inferiores alæ plumbeo flavecentes.

1171. PH. NOCTUA *gamma* spirilinguis cristata; alis deflexis: superioribus fuscis gamma græco inscriptis.

Phalæna feticornis spirilinguis; alis deflexis: exterioribus fuscis & græco inscriptis. Fn. 873.

Reaum. gall. 2. t. 26. & t. 27. f. 4. s. & tom. 1. t. 19. f. 2.

Frisch. germ. 1. 5. p. 37. t. 15.

Blank. belg. 54. t. 8. f. N. O. P. Geometra secundus.

Pet. gaz. t. 64. f. 6. Phalæna lambda.

Gœd. belg. 2. p. 82. t. 21. Philopson.

List. gœd. 41. f. 14.

Merian. eur. t. 82.

Raj. inf. 163. n. 17. Phalæna e mediis minuscula, alis exterioribus cinereo & nigro colore varjis, media parte linea alba Y literam aliquatenus referente, notatis.

Act. upf. 1736. p. 25. n. 68. Papilio alis depresso litera Y aurea inscriptis.

Habitat in *Artemisia Abrotano*, *Lactuca*, *Boragine*.

DESCR. Alæ superiores fusco-nebulosæ, pulchre variegatae, litera Y vel A notatæ; Alæ inferiores fuscæ. Linguae longissime sunt.

Variat Littera alarum argenteo & aureo colore, forte inde sexu: Frischii figura differt situ litteræ Y, cuius crura duo respiciunt marginem exteriorem in nostra, contra ac ille pingit.

1172. PH. NOCTUA *interrogationis* spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus cinereis signo? albō inscriptis.

Clerck. phal. t. 6. f. 17. Phalæna Interrogationis.

Habitat apud nos passim.

DESCR. Statura Ph. gammae. Fasciculi magni in dorso. Alæ superiores supra cinereo fuscoque variae signo interrogationis albissimo, in medio, adeoque affabre scripto, ut cuivis primo intuitu innoteat. Alæ inferiores subtus flavescentes.

1173. PH. NOCTUA *Fulvago* spirilinguis cristata, alis pallidis: fasciis ferrugineis, palpis abdomine alisque subtus fulvescentibus.

Clerck. phal. t. 6. f. 15.

Habitat Holmiæ.

DESCR. Similis sequenti. Alæ pallide glaucescentes: fascia una alterave ferruginea; postice fascia obsoleta utrinque punctata. Alæ inferiores pallidæ. Subtus omnes pallide flavæ. Palpi Abdomen & Tibiae fulvæ. Pennis subtus lana alba.

1174. PH. NOCTUA *citrago* spirilinguis cristata, alis deflexis luteis: superioribus fasciis tribus ferrugineis obliquis.

Habi-

Habitat in *Salice*.

DESCR. Media, similis *Geometræ*. *Alæ* plano incumbentes, late luteæ, strigis 3. s. 4. obliquis, purpurascensibus; inter strigas 2 & 3 punctum ferrugineum annulo rufo; inter 3 & 4 macula reniformis rufa in margine. *Inferiores*. alæ supra albidae. Omnes subtus puncto arcuque purpurascente.

1175. PH. NOCTUA *pallens* spirilinguis, alis deflexis pallidis puncto minimo, marginibus posticis subtus punctis nigris.

Clerck. phal. t. 4. f. 1. Phalæna pallens.

Habitat in Uplandia.

DESCR. Media. Tota albido-pallens, *Alæ* colore eodem, striata: superiores in medio puncto nigro minutissimo, ut vix conspicuo. *Alæ* omnes subtus similes atomis nigris; in margine postico punctis nigris minutissimis,

1176. PH. NOCTUA *leporina* spirilinguis lavis, alis deflexis albis: punctis nigris ramosis.

De Geer inf. I. t. 12. f. 10-17.

Habitat in *Alno*, *Salice*.

DESCR. Similis Ph. *Iubricipeda*, sed *Alæ* paucioribus punctis adspersæ, *Cörper* totum album, nec flavum, nec abdome nigro punctato.

1177. PH. NOCTUA *ludifica* spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus virentibus abdomineque flavo nigro-punctatis.

Habitat apud nos rarius.

DESCR. Simillima Ph. *aprilina*. *Caput* supra album, inter antennas nigrum. *Thorax* albus punctis nigris, ante arcu duplice reflexo nigro. *Alæ superiores* albidae, characteribus nigris undique adspersæ, in medio zifra 2 notatae. *Abdomen* dorso cristatum nigris apicibus, flavum, trifariam longitudinaliter nigro maculatum.

1178. PH. NOCTUA *aprilina* spirilinguis cristata, alis deflexis superioribus virentibus fascia maculisque atris: postice punctis trigonis.

De Geer inf. I. t. 5. f. 22. 23.

Habitat in arbustis.

DESCR. Media. *Alæ* ex albido-virescentes, atro maculatae, margine postico duplice ordine punctorum, figura cuspidis sagittæ: *Alæ subtus* cinereæ puncto & arcu fusco; margine postico punctis atris acutis. *Pedes* nigro alboque maculati.

1179. PH. NOCTUA *Aceris* spirilinguis cristata, alis deflexis canescensibus: superioribus lineolis undulatis annuloque ovali nigris.

Frisch. inf. I. t. 5.

Habitat in *Acere*, *Aesculo*.

DESCR. Media. *Alæ* canescens-cinereæ margine postico nigro punctata, ad basin alæ lineola fusca; macula ovalis & reniformis ut in affinis.

1180. PH. NOCTUA *Chi* spirilinguis cristata, alis deflexis canis, superioribus  $\chi$  nigro notatis.

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 13.*

Habitat in *Aquilegia*, *Delphinio*.

DESCR. Media, Alæ canescentes fusco-nebulosæ, in medio  $\chi$  atro notatæ.

1181. PH. NOCTUA *Psi* spirilinguis cristata, alis deflexis canis: superioribus characteribus  $\psi$  nigris.

Phalæna seticornis spirilinguis, alis deflexis canis; maculis  $\psi$ -formibus nigris. *Fn. 879.*

*Friscb. germ. 2. p. 13. t. 2. Eruca dorso saccato.*

*Reaum. gall. 1. t. 42. f. 5. 6.*

*Raj. inf. 350. Eruca rarius pilosa, cornu in medio dorso erecto.*

*Gred. belg. 1. p. 62. t. 22. Admirabilis.*

*List. Goed. 209. f. 92.*

Habitat in *Malo*, *Quercu*, *Alno*, *Corylo*.

DESCR. Magnitudo media. Alæ superiores canæ maculis litteræ  $\psi$  inversi adspersæ. Linea nigra per oculos a rostro utrinque solitaria. Alæ inferiores exalbidæ; subtus puncto nigro. Mas notis  $\psi$  manifestioribus; Fæmina vero omicro nigro supra alas superiores distinguitur.

1182. PH. NOCTUA *Absinthii* spirilinguis cristata, alis cinerascentibus nigricante fasciatis punctatisque; inferioribus albidis.

*Clerck. phal. 2. 8. f. 9.*

*Friscb. inf. 7. p. 19. t. 12.*

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 61.*

Habitat in *Artemisia Absinthio*.

DESCR. Media. Thorax testus valvulis duabus adscendentibus. Abdomen dorso penicillis nigris. Alæ superiores canescentes, striatæ: fasciæ duæ, nigricantes, undatæ, inæquales; inter has puncta 4 minima in tetragonum disposita; margo posticus nigro punctatus. Alæ inferiores albidæ; subtus puncto nigro.

1183. PH. NOCTUA *conspicillaris* spirilinguis cristata, alis incumbenti-planis pallide griseis, oculorum operculis orbiculatis.

Habitat Upsaliæ. T. Bergman.

DESCR. Rustica mediæ magnitudinis. Alæ incumbentes, planæ, griseæ. Antennæ corpore dimidio breviores. Singularis nota est lamina subrotunda, cinerea, pone singulum oculum, quæ anteriusum flexa regit totum oculum, ut tantum subtus conspiciantur, & facile, nisi deduceretur, pro oculo suineretur.

1184. PH. NOCTUA *umbratica* spirilinguis cristata, alis lanceolatis canis striatis, thoracis valvulis lunatis.

*Roeſ. inf. 1. phal. 2. t. 25.*

Habitat in *Soncho oleraceo*.

DESCR. Tora cana, immaculata. Alæ superiores fere lanceolatæ & quasi ex striis compositæ. Thoracis valvulae vel connivent supra thoracem, vel reflexæ supra oculos, tamquam duæ lunulae antrorum hirtæ.

1185. PH. NOCTUA *exsoleta* spirilinguis cristata, alis lanceolatis convolutis exsoletis dorso fuscescentibus, collare compresso.

*Frisch. inf. 5. t. 11. f. 1.*

*Roeſ. inf. 1. phal. 2. t. 24.*

Habitat in *Piso*, *Atriplice*, *Chenopodio*.

DESCR. Corpus cinereum. Alæ oblongæ, deflexæ, pallidae subfuliginoſæ. Thorax antice pallidus, lateribus ad alarum insertionem albus, tubus pallide ferrugineus, ad os nigricans.

1186. PH. NOCTUA *Verbasci* spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus obsoletis: marginibus lateralibus fuscis.

*Raj. inf. 168. n. 25.*

*352. n. 31.*

*Frisch. inf. 6. t. 9.*

Habitat in *Verbasco*, *Scrophularia*.

DESCR. Majuscula & oblonga. Thorax testus dupli crista connivente pallida, post quam a tergo ferrugineus. Alæ superiores oblongæ, lividae margine utroque fuso, quos margines striga albida in medio fecat. Subtus fusca fascia albida obliqua.

1187. PH. NOCTUA *putris* spirilinguis cristata, alis deflexis obsoletis subpunctatis margine exteriore fuso adjecta macula subocellari.

Habitat in hortis.

DESCR. Similis Ph. Verbasci, sed brevior. Scutelli loco puncta duo, linearia, fusca Alæ superiores lividae, vix manifeste lineolis fuscis undatae & punctatae: margo exterior ferrugineus, cui in medio adjacet macula ferruginea cum punto violacco.

1188. PH. NOCTUA *Pinastris* spirilinguis cristata, alis deflexis fuscis characteribus atris margine dorsali posticoque pallido.

Phalæna scabriuscula *Syst. nat. 10. p. 516. n. 108. Clerck.*  
*phal. t. 1. f. 8.*

Habitat in *Pino sylvatica*.

DESCR. Rustica media. Alæ superiores nigrae characteribus atris; ad marginem posticam striæ atræ; margo inferior postice punctis aliquot albis, margo tenuior pallidus linea atra repanda distinctus. Thorax fascicularis pallidus.

1189. PH. NOCTUA *Tragopoginis* spirilinguis subcristata, alis superioribus fuscis: punctis nigris tribus approximatis; inferioribus lividis.

*Frisch. inf. II. p. 33. t. 9.*

Habitat in *Tragopogone pratensi*, *Serratula arvensi*; Larva videt lineis 6 albis, spiraculis nigris.

DESCR. Rustica media, inelegans, fusca. Alæ superiores supra in medio punctis tribus minimis remotis, quorum 1 anterius, 2 posteriora. Inferiores alæ lividae.

1190. PH. NOCTUA *exclamationis* spirilinguis cristata, alis incumbentibus fuscis: lineola atra maculaque cordata; inferioribus albis.

*Clerck. phal. t. I. f. 4. Ph. exclamationis.*

Habitat in pratis.

DESCR. Rustica media. Alæ superiores obscure cinereæ cum aliquot striis pallidioribus, obsoletis, repandis; juxta maculam ordinariam priorem litura linearis atra; macula ordinaria reniformis itidem atra. Alæ inferiores albæ.

1191. PH. NOCTUA *comma* spirilinguis cristata, alis cinereis deflexis lineola nigra adiacente tenuiori aloa.

Habitat in hortis, non infrequens.

DESCR. Rustica media. Alæ superiores cinereæ, substriatae; litura linearis atra, a basi alæ ad ejusdem medium, longitudinalis, cui a latere inferiore adjacet stria alba longior. Subtus cinereæ. Abdomen subferrugineum.

1192. PH. NOCTUA *gothica* spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus fuscouscentibus arcu nigro linea alba marginato.

*Clerck. phal. t. I. f. 1. Phal. gothica.*

Habitat in lucis.

DESCR. Media. Alæ superiores cinereæ absque maculis ordinariis: in medio alæ arcus, extrorsum curvatus, niger, linea alba marginatus; Postice striga repanda pallida. Subtus alæ puncto fusco & arcu obsoleto.

1193. PH. NOCTUA C *nigrum*. spirilinguis cristata, alis depressis cinereis: macula nigra extus obsoleta lineolaque apicis atra.

Phalæna seticornis spirilinguis; alis depressis cinereis macula obsoleta: subtus C. obscuro-, inferioribus albidis. Fn. 874.

*Clerck. phal. t. I. f. 3. Phalæna C nigrum.*

Habitat in Hortis frequens.

DESCR. Media magnitudinis. Alæ superiores supra cinereæ, macula laterali atra, oblonga, arcuata in sinu lutea; macula reniformis flavescens; litura nigra versus marginem posticum. Alæ inferiores supra fere niveæ.

Alæ

Alæ omnes subtus cinerascentes arcu magno obsoleto fusco, literam C inantiente. Thorax antice griseus.

1194. PH. NOCTUA leucomelas spirilinguis cristata, alis nigricante nebulosis: macula alba; inferioribus antice niveis.

Clerck. phal. t. 1. f. 2. Phalæna leucomelas.

Habitat paßim.

DESCR. Media. Alæ superiores nigricante nebulosæ macula magna alba, inferiores iridem nigrae, macula adhuc majore, ovata, alba, ad basin ferre dimidiâ alam occupante, & margo poiticus alæ albus est. Subtus alæ omnes concolores, sed obscurius nigrae & albæ.

1195. PH. NOCTUA typica spirilinguis cristata, alis deflexis fuscentibus: strigis pallidis reticulatis maculaque reniformi.

Rœf. inf. 2. phal. 2. t. 56.

Habitat in Salice.

DESCR. Rustica media. Alæ superiores cinereæ maculis ordinariis margine albo, & strigis tribus albidis, postice in striae excurrentibus, unde ala quasi reticulata.

1196. PH. NOCTUA Atriplicis spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus nebulosis litura exalbida bifida.

Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 31.

Habitat in Atriplice, Rumice.

DESCR. Rustica media. Alæ superiores luteo fuuscoque nebulosæ, postice striga repanda flavescente; juxta maculas ordinarias a latere interiore litura albido flavescens, oblonga, postice bifida, acuta.

1197. PH. NOCTUA oleracea spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus fuscescentibus bimaculatis strigaque terminatis bidentata.

Phalæna seticornis spirilinguis, alis depresso fuscis: superioribus macula dupli palea, thoracis apice basique gibbis.

Fn. 877.

Raj. inf. 160. n. 10.

Habitat in Lactuca, metamorphosin intra terram subiens.

DESCR. Fasciculus duplex thoracis a tergo: altero ad basin thoracis gibbo, altero ad apicem. Phalæna tota fusca est, sed in medio Alæ superioris versus marginem crassiorem duas inaculæ pallidæ: quarum prior rotunda, posterior reniformis. Linea alba intra marginem posticum dupli dente exiens. Alæ inferiores cinereæ. Anus barbatus.

1198. PH. NOCTUA perspicillaris spirilinguis cristata, alis deflexis exusto-striatis postice bis-bidentatis, capite umbraculato.

Clerck.

**Clerck. phal. t. 2. f. 3.** Phalæna polyodon.

Habitat apud nos rarius. Th. Bergman.

**DESCR.** Media s. minor. *Caput* tegitur umbraculis duobus, subrotundis, pallidis, quæ fasciis tribus fusco-picta. *Alæ superiores* quasi ustulatae late palefcente striatae; macula reniformis pallida in medio; postice pallidæ itria desinunt in 2 dentes juxta angulum exteriorem & in 2 in medio. *Alæ inferiores* subtus, rufescentes disco albo puncto que minimo nigro.

**1199. PH. NOCTUA strigilis cristata**, alis deflexis nebulosis: striis abbreviatis nigris intra fasciam terminalem albam.

Habitat in lucis.

**DESCR.** Rustica minor. *Alæ Superiores* glauco-cinerascentes, nebulosæ: fascia albida versus basin; Fascia terminalis lata, exalbida, quam intrant ex anteriore parte striæ plures, breves, nigræ.

**1200. PH. NOCTUA Ruminis spirilinguis cristata**, alis deflexis cinereis bimaculatis: litura marginis tenuioris alba.

**De Geer inf. t. 9. f. 22.**

Habitat in *Rumice*, *Soncho*.

**DESCR.** Rustica media. *Alæ superiores* canæ, nigricante nebulosæ; macula cana ad basin alæ; macula alba in medio marginis tenuioris; macula ordinaria prior orbicularis annulo puncto que nigro.

**1201. PH. NOCTUA lucipara spirilinguis cristata**, alis deflexis purpurascensibus: fascia nigra: postice macula flava.

Habitat in lucis rarius.

**DESCR.** Rustica minor s. media. *Alæ superiores* antice & postice latius rufescentes, nitidæ; in medio vero fusco-nebulosæ; macula ordinaria posterior lutea, nitida. *Caput & Thorax* fusca.

**1202. PH. NOCTUA triplasia spirilinguis cristata**, alis deflexis: strigis duabus contrariis remotis, maculis tribus glaucis intermediis.

**De Geer inf. t. 6. f. 20, 21.**

Habitat in *Soncho*, *Humula*, *Urtica*.

**DESCR.** Rustica media. *Alæ superiores* fusco-nebulosæ, strigis duabus recurvis nigris; ante & post strigas pallidiores; postice ad marginem inferiorem puncta quatuor alba.

**1203. PH. NOCTUA occulta spirilinguis cristata**, alis deflexis fusco-nebulosis: striga inferioribusque brevioribus margine albis.

**Clerck. phal. t. 1. f. 6.** Phal. occulta.

Habitat apud nos minus frequens. D. D. Holm.

**DESCR.** Inter Ph. rusticas nostrates facile maxima est. *Alæ Superiores*zano-fuscoque nebulosæ; macula ovata, albida, ante reniformem cinereum;

ream; Strigæ tres, albæ, repandæ: prima ante maculam ovatam; secunda pone cordiformem; tertia angustissima versus marginem posticum. Alæ inferiores multo breviores, subrus cinereæ puncto arcuque nigricante, margine postico omnino albo.

1204. PH. NOCTUA *flavicornis* spirilinguis cristata, alis superioribus cinereis: strigis tribus atris, antennis luteis.

Clerck. phal. t. 6. f. 9.

Habitat in Populo. T. Bergman.

DESCR. Rustica media. Alæ superiores supra obscure cinereæ strigis duabus, nigris, repandis, versus marginem tenuiorem proprioribus, interjecta macula albida. Thoracis latera gibba, ac si rudimentis alarum elevatis testa. Antennæ flavescentes, quasi gradibus lamellosoæ, basi albæ.

1205. PH. NOCTUA *Brafficæ* spirilinguis cristata, alis deflexis cinereo-nebulosis: macula cordiformi albo maculata.

Roeß. inf. 1. phal. 2. t. 29.

Habitat in *Braffica*, *Nicotiana*, *Menyanthe*; in agris Westrogothiæ frequens.

DESCR. Rustica media difficile dignoscenda. Alæ cinereæ fusoque nebulosæ; macula reniformis ordinaria aliquot punctis albis commaculata. Margo inferior pupillis quatuor albis.

1206. PH. NOCTUA *Pisi* spirilinguis cristata, alis deflexis griseo-nebulosis striga postica alba: angulo ani maculari.

Raj. inf. 160. n. 10.

Roeß. inf. 1. phal. 2. t. 52.

Habitat in *Piso*, *Jacobæa*.

DESCR. Rustica media. Alæ superiores griseo-nebulosæ, postice striga flexuosa alba, quæ ad angulum ani maculam albam majorem constituit.

1207. PH. NOCTUA *Oxyacanthæ* spirilinguis cristata, alis deflexis griseofuscis: macula ovali pallida strigaque ani alba.

Roeß. inf. 1. phal. 2. t. 33.

Habitat in *Oxyacantha*, *Pruno spinosa*.

DESCR. Rustica inauscula. Alæ superiores griseæ macula unica, maiore, ovali, lutescente; postice margo latior cinerascens; ad marginem tenuiorem juxta anum litura linearis alba fere longitudinalis.

1208. PH. NOCTUA *Perficulariæ* spirilinguis cristata, alis fasciis nebulosis: macula reniformi alba pupillæ lunari flavescente.

Roeß. inf. 1. phal. 2. t. 36.

Habitat in *Polygono Perficularia*.

DESCR.

**DESCR.** Alæ superiores fusco nigricantes, venis nebulosæ, margine postice quasi dentatæ atomis albis. Inferiores antice pallidæ, postice fuscescentes margine albido. Subtus omnes glaucescentes; fascia lata, obsoleta & punc̄to nigro. Anus ferrugineus.

1209. PH. NOCTUA *hepatica* spirilinguis cristata, alis glaucescentibus: fascia ferruginea abbreviata terminalique pliata.

Clerck. *phal. t. 8. f. 3. Ph. hepatica.*

Habitat passim.

**DESCR.** Rustica media. Alæ superiores supra hepatici coloris: fascia ferruginea vix ad latus interius extensa; Falcia deinceps terminalis angustior, inæqualis, ferruginea; margo posticus plicato subdentatus. Inferiores alæ subfuscantes margine postico flavo. Subtus alæ cinereo-rufescentes puncto lunari arcuque nigricantibus. Thoracis latera fusco-ferruginea. Dorsum Thoracis & Abdominis plurimis dentibus cristatum.

1210. PH. NOCTUA *plebeja* spirilinguis cristata, alis nigro-nebulosis; inferioribus utrinque luteo ferrugineis nigromaculatis.

Habitat in Uplandia. T. Bergman.

**DESCR.** Magnitudo Ph. *glyphicæ*. Alæ superiores supra nigro cinereo-que nebulosæ maculis duabus ad marginem interiorem albis; ad basin alæ puncta duo alba. Inferiores alæ utrinque, & Superiores subtus luteo-ferruginea maculis duabus nigris transversis & margine postico nigro. Pedes lanati. Tibiae nigrae, annulis albis.

1211. PH. NOCTUA *Tritici* spirilinguis cristata cinerea: maculis duabus pallidioribus unaque nigricante.

Frisch. *inf. 10. t. 19.*

Habitat in Spicis *Tritici*.

**DESCR.** Rustica magnitudine Phalænae Graminis, difficillime distinguenda; Larva nuda flava lineis tribus albis. Corpus totum cinereum macula ovali & reniformi ut in reliquis rusticis; juxta ovalem interius macula nigra ejusdem magnitudinis. Pedes albis-annulisi.

1212. PH. NOCTUA *Vaccinii* spirilinguis, alis ferrugineis obsolete nebulotis puncto strigaque postica septem-punctata fuscis.

Habitat in Vaccinio *Vite idea*.

**DESCR.** Minor. Alæ superiores supra triste ferrugineaæ, obsolete-nebulosæ; in medio puncto majuscule nigro, postice ante marginem striga ex punctis 7, minimis, fuscis. Subtus Corpus & Alæ ferrugineaæ itriga fusca. Alæ superiores subtus & inferiores supra nigricantes.

1213. PH. NOCTUA *litura* spirilinguis cristata, alis canis fascia fusca liturisque quatuor marginalibus nigris.

Habitat Holmiæ, C. Clerck.

**DESCR.**

# INSECTA LEPID. PHALÆNA. NOCTUA. 321

**DESCR.** Starura Ph. gothicæ sed minor. Alæ *Superiores* canæ lituris quatuor, marginalibus, transversis, nigris, æquali spatio remotis; harum 1 ad basin alæ; 2. connexa cum oppositæ alæ lineola undulata nigritante; 3 connexa cum opposita fascia lata, obsoleta, fuscelente, arcuata; 4 ad apicem obliqua lineola, etiam subitus conspicua.

1214. PH. NOCTUA *depuncta* spirilinguis cristata, alis griseofuscis: lituris marginalibus nigricantibus, strigaque postica punctata.

Habitat in Sylvis.

**DESCR.** Media. Alæ *Superiores* cinereæ f. subgriseofuscantes: puncta 2 nigra ad basin; dein puncta 2 f. 3. nigra connata in lituram ad marginem crassiorem; tum macula ovata & reniformis; tandem striga obsoleta obscurior; denum ordo transversus e punctis nigris minutissimis; margo posticus alæ obscurior. Subtus alæ pallidæ puncto & fascia linearis transversa nigricante.

1215. PH. NOCTUA *oculea* spirilinguis cristata, alis ferrugineo-griseis macula reniformi nivea: pupilla lunali lutea.

Habitat in lucis.

**DESCR.** Rustica media f. minor. Alæ *superiores* griseo-nebulosæ cum obsoleta tintura ferruginea: macula prior alæ orbicularis, ferruginea, obsoleta; posterior reniformis in qua lunula lutea margine ferrugineo; in margine crassiore, pone maculas ordinarias, puncta tria minutissima alba. Subtus alæ arcu & punto fusco.

1216. PH. NOCTUA *plecta* spirilinguis subcristata, alis brunneis linea nigra margineque crassiore albido.

Habitat in Sylvis.

**DESCR.** Media f. minor. Alæ *superiores* brunneæ, margo crassior a thorace fere ad apicem albido; linea nigra a thorace per maculas ordinarias ducta distinguit alam brunneam a margine albo; postice margo exterior punctis tribus, albis, minutissimis. Subtus alæ superiores margine postico rufescentes. Alæ *inferiores* albidae, puncto subtus nigro.

1217. PH. NOCTUA *polymita* spirilinguis cristata, alis cinereis: fasciis tribus albo nigroque variegatis.

*Merian. europ. t. 35?*

**DÉSCR.** Rustica media. Alæ *superiores* cinereæ; fasciæ tres, albæ, nigro variegatae, utri etiam maculae duæ ordinariae; margo posticus punctis fagittatis nigris. Thorax tres maculas albas majusculas gerit.

1218. PH. NOCTUA *retusa* spirilinguis subcristata, alis griseis retusis: strigis tribus pallidioribus.

Habitat in Lucis.

**DESCR.** Media. Alæ *superiores* postice retuse; colore cinereo-grisecente, minime nebulosa; strigis tribus pallidioribus: prima ad basin; secunda oblique transversalis, quam macula ovalis & reniformis excipit; ter-

tia transversalis obliqua, quam linea transversalis flexuosa sequitur. *Subtus* alæ cinereæ puncto & arcu fuscis.

1219. PH. NOCTUA *polyodon* spirilinguis cristata cinereo-nebulosa margine postico multidentato.

Habitat in hortis frequens.

DESCR. Rustica majuscula. Alæ superiores cinerascentes, nebylosæ: striga flexuosa ante maculas ordinarias: pone easdem striga una alterave undulata pallidior; margo posticus octo circiter dentibus terminatus. *Subtus* punctum fuscum & arcus obsoletus.

1220. PH. NOCTUA *nigricans* spirilinguis cristata, alis nigricantibus maculis ordinariis pallidioribus.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. Rustica media. Alæ superiores fusco-nigricantes magis quam in alia ulla nostratum, uti etiam totum corpus. Inferiores alæ parum albescentes.

1221. PH. NOCTUA *turca* spirilinguis cristata, alis cinereo-rufis strigis duabus fuscis, lunula alba.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Media. Alæ superiores cinereo-rufæ t. vinacei coloris strigis duabus remotissimis, in medio lunula minuta alba, absque ulla maculis ordinariis. *Subtus* alæ omnes putputalcentes striga fusca.

1222. PH. GEOMETRA *Sambucaria* pectinicornis, alis caudato-angulatis flavescentibus: lineis duabus; posticis apicibus bipunctatis.

Gœd. inf. 2. t. 84.

Rœf. inf. 1. phal. 3. t. 6.

Raj. inf. 177. n. I.

Habitat in *Sambuco* Scaniæ.

DESCR. Magna. Alæ supra albido-flavescentes: antice supra strigis duabus, lutescentibus; postice unica: hujus angulus posticus rufescens, in caudam subulatam exiehs, ad quam utrinque punctum fuscum; exteriore purpurascente. *Subtus* omnes albidae, immaculatae.

1223. PH. GEOMETRA *amataria* pectinicornis, alis angulatis: omnibus pallidis pulverulentis, striga ferruginea transversa, fuscaque curva repanda.

Wilk. pap. 2. I. a 5.

Habitat in *Quercu*.

DESCR. Media. Alæ albidae, pulverulentæ: Striga ferruginea, recta, transversa, ab angulo alæ primoris ad oppositæ angulum ducta; alia ab eodem angulo ad oppositum curva repanda fusca; apices alarum margino rufi.

1224. PH. GEOMETRA *falcatoria* pectinicornis, alis falcatis glaucis: anticis undis fascia que griseis, puncto fusco.

*De Geer. ins. 1. t. 24. f. 7.*

Habitat in *Betula* & *Alno*.

DESCR. Media. Alæ glaucæ, utrinque griseo-undatae: Anterioris falcatae: striga ferruginea ponè punctum majuscum fuscum.

1225. PH. GEOMETRA *putatoria* pectinicornis, alis angulatis: omnibus albidis: strigis duabus candidis repandis.

*Clerck. phal. t. 3. f. 9.* Phalæna putata.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Color albus margaritaceus: suprà Alæ omnes strigis duabus, albis, repandis; absque puncto centrali; Subtus omnes niveæ.

1226. PH. GEOMETRA *lactearia* bipectinicornis, alis angulatis albis immaculatis, antennis apice setaceis.

Phalæna pectinoris spirilinguis tota nivea. Fn. 865.

Habitat passim non infrequens.

DESCR. Magnitudo minor. Alæ omnes niveæ immaculatae: postica angulari recto terminatae. Antennæ inferiore parte valde hispidae; superiore omnino setacea.

1227. PH. GEOMETRA *vernaria* pectinicornis, alis virescentibus: strigis duabus albis repandis, antennis apice setaceis.

Habitat in Dalekarlia. C. Blom.

DESCR. Præcedenti simillima, sed Alæ pallide virescentes strigis duabus, albis, repandis: altera versus postica. Subtus tota pallidior. Accedit ad Ph. viridata.

1228. PH. GEOMETRA *vibicaria* pectinicornis, alis angulatis glaucescentibus puncto fascia strigaque purpureis.

*Clerck. phal. t. 3. f. 2.* Phalæna vibicaria.

Habitat ad Liumkihl. A. Berger.

DESCR. Media. Antennæ pallidæ. Alæ pallidæ s. glaucæ; in strigulis punctum purpureum, transversum; fascia purpurascens antice saturator; striga purpurascens; margo omnis purpurascens. Subtus alæ omnes purpurascentes.

1229. PH. GEOMETRA *lacertinaria* pectinicornis, alis erosis lutescentibus: postice saturationibus strigis duabus ferrugineis punctoque fusco.

*De Geer. ins. 1. t. 7. f. 7. 8.*

Habitat in Quercu.

DESCR. Media. Alæ superiores flavæ, subriebulosæ; postice obscures; margine inæqualiter dentato; strigæ duæ, ferrugineæ obliquæ inter quas punctum fuscum. Inter dentes marginis posticii maculato alba;

feriores supra albantes. *Subtus* omnes flavæ, postice subnebulosæ, puncto fusco in medio.

**1230. PH. GEOMETRA Alniaria pectinicornis**, alis erosis flavis fusco pulveratis: strigis duabus fuscis.

*Phalaena pectinicornis* elinguis; alis angulato-dentatis fulvis: linea dupli fuscis, thorace flavo *Fn. 834.*

*Gæd. belg. 2. p. 161. t. 38.* Terribilis an?

*Raj. inf. 290. n. 21.* Eruca geomettra rubescens teres bacilliformis, cum dupli tuberculo insigni in medio dorso & tribus inferioribus exstantibus annulis e tuberculis compositis.

Habitat in *Alno* cujus foliis pascitur.

*DESCR.* Larvæ facies adeo exæcte refert ramulum Alni, præcedentis f. penultiimi anni, ut vix natura quid magis simile unquam effinxerit crassitie, figura, colore, tuberculis, scabritie, omnibus, est enim longitudo Larvæ 3 ad 4 digitorum transversorum, crassities fere pennæ minoris anserinæ; color cinereo-griseus; pedes 10 quorum 6 antecedentes prope caput, breves; 2 in cauda; 2 paulo ante pedes ani. versus caudam sensim incrassatur animal; versus caput, quod mirum: attenuatur. Lævis est; variis tuberculis vestigia petiolorum referentibus, ut, qui viderit alni ramulum, non opus habeat descriptione.

*Phalaena* ipsa prodiit post mensem. Thorace hirsuto, flavo; Abdomine incarnato; Alis omnibus angulatis sive erosis, fulvis: superioribus lineis duabus obsolete fuscis, remotis; inferioribus supra, etiam subtus fulvis; sed punctis fuscis, obsolete, temere sparsis cum macula lunari fusca in medio, & punctis nigris in margine alarum omnium. Os nullum. Antennæ barbatæ; rachi albida villis incarnatis.

**1231. PH. GEOMETRA pennaria pectinicornis**, alis rufescen-tibus: strigis duabus obscurioribus puncto subterminali nigro centro albo.

Habitat in *W:gothia*. T. Bergman.

*DESCR.* Magnitudo præcedentis, Corpus colore cinnamomeo. Antennæ simillimæ pennæ, longitudine dimidij corporis. Alæ superiores strigis duabus, transversis interjecto puncto, fuscescentibus; Ante angulum alæ punctum nigricans medio album, utrinque conspicuum. Subtus concolores.

**1232. PH. GEOMETRA Pruniaria pectinicornis**, alis sub-dentatis luteis fusco pulveratis: anticis lunula fusca.

*Uddm. diff. 69.* Phalaena alis patentibus pallidis dentatis puncto fusco oblongo.

*Alb. inf. 42. t. 69.*

Habitat in *Præno spinosa*.

*DESCR.* Major, Alæ maris fulvæ, Feminæ flavæ, utrisque conspersæ ac pulveratae fusco colore; in medio utrinque lunula fusca; margo posteriorum quasi dentatus adparet maculis fuscis.

1233. PH. GEOMETRA *Piniaria pectinicornis*, alis omnibus fuscis: disco bimaculato albo; subtus nebuloso - subfasciatæ.

Phalæna pectinicornis spirilinguis, alis planiusculis rotundatis, supra fuscis: antrorsum albis.

Clerck. phal. t. I. f. 10. Phalæna Piniaria.

Udd. diff. 64.

Habitat in *Pino*.

DESCR. Magnitudo media, Antennæ magnæ, nigrae. Alæ omnes supra fuscæ, margine albæ, & versus basin in medio albæ macula alba ex duabus oblongis coalita; subtus omnes cinereo punctatae lincolis undulatis duabus griseis; superiores subtus macula una altercante albicante magna.

1234. PH. GEOMETRA *Tiliaria pectinicornis*, alis lutescentibus: subtus nebuloso - fasciatæ linea alba interrupta.

Phalæna pectinicornis, alis planiusculis rotundatis nebulosis lutescentibus; inferioribus linea longitudinali albida. Fz. 818.

Clerck. phal. t. 4. f. 11. Phalæna Tiliaria.

Habitat in *Tilia*, *Betula*.

DESCR. Antennæ lanceolato-pectinatae, fuscæ. Alæ luteæ, obscurius fasciatæ nebulosæ utrinque maculis obsolete testaceis seu luteis temere adspersæ, & alæ inferiores subtus linea albicante longitudinali bis fere interruptæ notatae.

1235. PH. GEOMETRA *elinguaria pectinicornis*, alis flavis: anticus fascia lutea: medio puncto nigro.

Rœf. inf. 1. phal. 3. t. 9.

Habitat in *Pyro*.

Habitat in Scania.

DESCR. Media. Alæ omnes flavæ: Superiores fascia latissima, saturatio re, lutea, distincta margine ferrugineo, in medio puncto majusculo fu scio. Margo posticus omnium supra punctis minurissimis nigris. Subtus alæ omnes postice pallidiores.

1236. PH. GEOMETRA *birtaria pectinicornis*, alis hirtis canis: strigis tribus nigris; posterioribus approximatis, antennis atris.

Clerck. phal. t. 7. f. 1. Phalæna hirtaria.

Habitat ruri.

DESCR. Media, statura noctuæ, thorace valde hirsuto crasso. Alæ deflexæ, canæ, hirtæ: strigis tribus nigris quarum duæ posteriores propiores; venæ alarum elevatae. Inferiores alæ postico margine albo maculato. Femora valde hirsuta. Antennæ nigrae, apice setacea sunt.

1237. PH. GEOMETRA *Betularia pectinicornis*, alis omnibus albis subfasciatæ atomisque nigris, thorace fascia atra.

*Phalæna seticornis spirilinguis*, alis patentibus niveis; atomis cinerascentibus sparsis. *Fn.* 850.

*Act. Stockb.* 1755. p. 214 t. 6. f. 3.

*De Geer. inf.* 1. t. 17. f. 22.

*Gadd. satag.* 82.

Habitat in *Betula*.

**DESCR.** Media. Tota alba pulvere atomisve nigris undique adspersa. Alæ utrinque obsolete subfasciatæ. *Antennæ* nigrae, apice feracea;

**1238. PH. GEOMETRA defoliaria pectinicornis**, alis subgriseis medio albis puncto lituraque postica nigra; femina aptera.

*Clerck phal.* t. 7. f. 4. *Phalæna defoliaria*.

*Reaum. inf.* 2. t. 30.

*Rœs. supp.* 83. t. 14. femina.

Habitat in *Malo*.

**DESCR.** Media. *Antennæ* flavæ. Alæ superiores flavescentes, atomis fusco-adspersæ; fascia lutea ad basin; Fascia postica lutea fracta, postice lituris fusco-maculata; margo posticus fusco maculatus; Punctum fuscum in medio alæ. Inferiores flavæ atomis fusco-maculatis. Femina aptera facie larvæ. Coccinellæ septem punctatæ.

**1239. PH. GEOMETRA Ribearia pectinicornis**, alis griseis fusco-subfasciatæ; fascia postica moniliiformi.

*Clerck. phal.* t. 6. f. 5. *Phalæna Ribeata*.

Habitat in *Ribe rubro*.

**DESCR.** Magnitudo Ph. Grossulariatae. Alæ superiores griseæ; fasciis marginalibus tribus, nigris, abbreviatis; quarta fascia transversa ex maculis nigris orbiculatis concatenata; margo posticus lineolis nigris. Inferiores alæ minus fasciatæ. Subtus omnes alæ magis luteo-griseæ.

**1240. PH. GEOMETRA melanaria pectinicornis**, alis nigropunctatis maculatisque: anticis albidis; posterioribus luteis.

*Clerck. phal.* t. 4. f. 2. *Phalæna melanaria*.

*Uddm. diff.* 65. *Phalæna* alis inferioribus flavis; maculis plurimis inæqualibus nigris.

Habitat in *Pino sylvestri*.

**DESCR.** Magnitudo & facies Ph. Grossulariatae. Alæ omnes maculis subrotundis numerosis undique adspersæ, colore luteæ, sed superiores supra albidæ. *Abdomen* flavum.

**1241. PH. GEOMETRA papilionaria pectinicornis**, alis omnibus viridibus; strigis duabus albidis undatis; posticis repandis, antennis flavis.

*Phalæna* albo virescens alis, planiusculis. *Fn.* 922.

*Rœs. inf.* 4. t. 18. f. 3.

Habi-

Habitat in *Tilia*.

*DESCR.* Magnitudo Pap. Brassicæ. *Alæ virides*: strigis duabus: posterioribus albidis, obsoletis, undulatis, cum rudimento tertiae versus bæsin; *Inferiores alæ* margine repandæ, similiter pictæ. *Antennæ & pedes* flavescentes.

1242. PH. GEOMETRA *fasciaria* pectinicornis, alis omnibus rufescens: fascia lata ferruginea margine alba.

*Clerck. phal. t. 5. f. 5.* Phalæna fasciaria.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Media. *Alæ rufescenti-cinereæ*: fascia lata, transversa, ferruginea, margine antice & postice alba; *Subtus* alæ glaucæ sunt.

1243. PH. GEOMETRA *pulveraria* pectinicornis, alis omnibus testaceis, fascia lata ferruginea; subtus purpurascens-ferrugineis.

*Clerck. phal. t. 5. f. 6.* Phalæna pulveraria.

Habitat Holmiæ.

*DESCR.* *Alæ* omnes *subtus* saturatissime fulvo-ferruginea; *supra* cinereo pulverariae.

1244. PH. GEOMETRA *pendularia* pectinicornis, alis omnibus cinereis ocello ferrugineo strigaque nigro-punctata.

*Clerck. phal. t. 7. f. 5.* Phalæna pendularia.

Habitat in *Salice* Larva incarnata, pupa pendula.

*DESCR.* Media. *Alæ* omnes cinerascentes; in medio alarum omnium ocellus ferruginens pupilla alba; pone ocellum striga ex punctis nigris & margo poeticus nigro punctatus. *Subtus* concolores, sed absque ocello.

1245. PH. GEOMETRA *atomaria* pectinicornis, alis omnibus lutescentibus: fasciis atomisque fuscis.

Phalæna pectinicornis spirilinguis, alis planiusculis angulatis flavis fusco nebulosis. *Fn. 840.*

*Frisch. inf. 13. t. 5.*

Habitat in *Tilia*.

*DESCR.* Minor. *Alæ* fuscae atomis flavis s. flavescens: fasciis fuscis, obscuriores supra quam subtus; *Subtus* unica fascia obscura.

1246. PH. GEOMETRA *carbonaria* pectinicornis nigra, alis strigis tribus albidis undatis subinterruptis: antica remotiore.

*Clerck. phal. t. 1. f. 11.* Phalæna carbonaria.

Habitat ruri.

*DESCR.* Magnitudo præcedentis. *Alæ* subtus obsoletiores.

1247. PH. GEOMETRA *fuliginaria* pectinicornis, alis nigris albo punctato-undulatis, subtus griseo-fuscentibus.

328 INSECTA LEPID. PHAL. GEOMETRA.

Clerck. phal. t. 8. f. 7.

Habitat ruri

DESCR. Statura Ph. atomariae, sed minor & tota atra. Antennae minores. Alæ fasciis undatis, interruptis, albis. Subtus griseæ, albo punctatae.

1248. PH. GEOMETRA *wauaria* pectinicornis, alis cinereis: anticis fasciis quatuor nigris abbreviatis inæqualibus.

Phalæna pectinicornis spirilinguis, alis patentibus albidis: lineolis quatuor nigris transversis marginalibus. Fn. 845.

Act. upsi. 1736. p. 23. n. 44. Papilio alis planis albidis, fasciis linearibus nigricantibus.

Gæd. belg. I. p. 23. t. 35. Somnolentus.

List. gæd. 38. t. 12.

Pet. mus. 3. n. 4. Phalæna hortensis media cinerea, maculis fuscis notata.

Raj. ins. 179. Phalæna minor, alis amplis e cinereo albicantibus, interdum fusco cinereis, quatuor in exteriorum margine maculis linearibus e rufo nigricantibus.

Frisch. germ. 3. p. 15. t. 3. f. 1. Eruca spithametra viridilutea maculis nigris.

Merian. eur. t. 25.

Vulgæ W. littera.

Habitat in *Ribe rubro* & *Grossularia*.

DESCR. Antennæ albidæ, parum plumosæ. Alæ planæ, supra cinereo albidæ; majores margine exteriore notatæ lineolis quatuor transversis nigris, quarum secunda reliquis longior, quarta vero latior. Alæ subtus subgriseæ sunt. Mas antennis pectinatis. fæmina omnino setaceis, & tantummodo ferratis.

1249. PH. GEOMETRA *margaritaria* subpectinicornis, alis margaritaceis: fascia rivulari lutescente: extremitatibus fuscis.

Habitat Holmiæ. C. Clerck.

DESCR. Magnitudo præcedentis. Alæ fascia linearis, lutescente, a medio anteriorum ad angulum ani; ante hanc fasciam ala albo-cærulescens f. margaritacea; fascia una alterave ad basim; in medio superiorum litera B romana lutescens; extra fasciam communem ala fulva vel fusco-cærulescens; margo extimus ex villis sepe albis.

1250. PH. GEOMETRA *punctaria* pectinicornis, alis angulatis cinereo-grisecentibus: striga ferruginea ordineque transverso punctorum atrorum.

Udd. diff. 67. Phalæna alis pallide griseis linea transversali ferruginea.

Clerck. phal. t. 5. f. 11. Phalæna punctaria.

Habi-

Habitat in Finlandia.

DESCR. Minor. Alæ flavescentes: posteriores angulatae. Striga omnibus ferruginea in medio; ordo punctorum atrorum pone strigam in utraque pagina omnium alarum.

1251. PH. GEOMETRA *pustaria* pectinicornis, alis omnibus niveis: strigis tribus obsoletis.

Clerck. phal. t. 3. f. 6. Phalæna *pustaria*.

Habitat in *Alno*, *Betula*.

DESCR. Parva. Tota alba. Alæ omnes supra niveæ atomis vix conspicuis cinerascentibus adspersæ: Strigæ tres obsolete cinereæ, æquali spatio remotæ. Subtus omnes alæ niveæ; superiores ad costam atomis pulveratæ.

1252. PH. GEOMETRA *prosaparia* pectinicornis, alis lutescentibus: fascia saturatiore utrinque striga glauca distincta.

Uddm. diff. 66. Phalæna alis primariis dilute cinnamomeis: fasciis duabus linearibus subcæruleis.

Clerck. phal. t. 3. f. 1. Phalæna *prosaparia*.

Habitat in Finlandiæ Sylvis Abiegnis.

DESCR. Majuscula, tota cinnamomea, tam supra quam subtus. Alæ superiores fascia saturatiore margine utroque glaucescente. Inferiores striga saturatiore, margine postico glaucescente. Subtus alæ superiores margine tenuiore albidae.

1253. PH. GEOMETRA *quadrifasciaria* pectinicornis, alis griseis: fascia fusca undata puncto atro.

Clerck. phal. t. 6. f. 4. Phalæna quadrifasciata.

Habitat Holmiæ.

DESCR. Minor, facie Ph. Chenopodiæ. Alæ superiores supra griseæ: Fascia in medio nigricans, undulata, postice repanda; utrinque distincta striga alba; in medio fasciæ punctum nigrum. Inferiores alæ cinerascentes, subfasciatæ. Subtus Alæ puncto centrali & arcu gemino: singulo ex arcu duplii fusco constructo.

1254. PH. GEOMETRA *purpuraria* pectinicornis, alis luteis margine anticarumque fasciis duabus purpureis.

Gœd. inf. 2. t. 12.

Habitat in *Pruno spinosa*, *Quercu*.

DESCR. Parva. Alæ superiores supra luteæ: fasciis duabus margineque postico ciliari purpurascentibus. Subtus luteæ: fascia fusca.

1255. PH. GEOMETRA *bidentata* feticornis, alis erosis griseis puncto nigro ocellari: superioribus fasciæ saturatiore.

Clerck. phal. t. 7. f. 2. Geometra bidentata.

De Geer. inf. 1. t. 25. f. 6.

Habitat in *Rosa*, *Alno*.

*DESCR.* Majuscula, grisea. *Alæ* griseæ, omnes in medio utrinque puncto pallido latiusculo margine atro; postice erose. Superiores fascia lata, antice & postice distincta lineola alba interrupta. *Subiis* omnes striga repanda nigricante; area posterior pallidior & margo alarum posteriorum subtus nigro punctatus. Affinitas Ph. Alniaria, sed antennæ, immeis, omnes setaceæ.

1256. PH. GEOMETRA *viridata* seticornis, alis angulatis omnibus viridibus: striga pallida.

Phalæna seticornis spirilinguis, alis patentibus viridibus. Fn. 857.

*Harris. inf. 7. t. 3. f. e-1.*

Habitat in *Oxyacantha*, *Quercu*.

*DESCR.* Parva tenera. *Alæ* omnes virides; supra striga pallida margine que crassiore flavescente.

1257. PH. GEOMETRA *emarginata* seticornis, alis omnibus pallidis emarginato-angulatis: strigis duabus griseis.

*Clerck. phal. t. 4. f. 12.*

## Habitat Holmiæ.

*DESCR.* Parva. *Alæ* flavescenti pallide: strigis duabus, linearibus, griseis, reinotissimis; punctum fuscum in disco; omnes alæ postice obsolete emarginatae sunt. *Subiis* concordes.

1258. PH. GEOMETRA *notata* seticornis, alis angulatis pallidis: fasciis tribus subfuscis; superiorum postica nigricante commaculata.

*Clerck. phal. t. 6. f. 11. Phalæna notata.*

Habitat in *Sylvis*.

*DESCR.* Parva. *Alæ* pallide, atomis fusca adspersæ; fasciæ tres angustæ, fuscae; in tertiaræ fasciæ medio puncta quatuor fusca, in tetragonum æqualiter disposita, stercora muscarum referentia; margo posticus omnium alarum fusca linea; quæ in anteriore lunulam fuscam crassiorem efficit & quasi emarginaturam.

1259. PH. GEOMETRA *dubitata* seticornis; alis anticis griseo-glaucouscentibus: fascia æneo purpurascente; posticis dentatis.

Phalæna seticornis spirilinguis, alis patentibus dentatis: fasciis cupreo cinereis. Fn. 842.

## Phalæna dubitata.

*Clerck. phal. t. 6. f. 2. Phalæna dubitata.*

Habitat in *Sylvis*.

*DESCR.* Major. *Alæ* omnes, imprimis inferiores, postice dentatae. Superioræ supra obscure glaucouscentes; fascia rufescens, ænea, lata repanda nitidula: ante marginem posticum quasi striga e punctis pallidis. Sub-

*tus obscure glaucescentes venis fusco-punctatis & puncto nigro minimo in medio. Difficillime hæc verbis describitur.*

1260. PH. GEOMETRA *repandata* seticornis, alis cinereis; oinnibus fusco-undatis; posticis margine repando atro.  
*Clerck. phal. t. 6. f. 8. Phalæna repandata.*

Habitat in Sylvis.

DESCR Majuscula. Alæ omnes supra canæ fusco undatae & fere nebulosæ; fascia nigra repanda. Margo posticus obtuse dentatus nigra lineola circumscrimitur. Subtus omnes alæ cinerascentes, fusco undatae; inferiores puncto nigricante in medio.

1261. PH. GEOMETRA *Grossulariata* seticornis, alis albidis; maculis rotundatis nigris; anticis strigis luteis.

Phalæna seticornis spirilinguis; alis patentibus albis; maculis inæqualibus nigris plurimis. Fn. 849.

*Mouff. angl. p. 905.*

*lat. p. 96. n. 10.*

*Jonst. inf. p. 89. n. 10. t. 6.*

*Merr. eur. I. p. 11. t. 29. (male antennis clavatis.)*

*Gœd. belg. I. p. 101. t. 31.*

*Lift. gœd. p. 24. f. 9.*

*Blank. belg. p. 41. t. 7. f. E. F. G. H. Geometra.*

*Frisch. germ. 3. p. 14. t. 2. Spirrhometra nigro luteoque maculata*

*Pet. mus. 3. n. 4. Phalæna hortensis alba, maculis plurimis nigris insignita.*

*p. 4. n. 7. Eruca geometrica, pulchre variegata, grossularias depascens.*

*Raj. inf. 178. n. 14. Phalæna media, alis amplis albis, maculis crebris nigris & lineis transversis luteis variis.*

*179. Eruca geometra grossularia majuscula alba rubro & nigro coloribus varia.*

*373. n. 1. Eruca geometra grossulariam depascens.*

Habitat in *Ribes Speciebus*, *Amygdalo*, *Salice*, *Pruno spinosa*.

DESCR Major. *Caput nigrum. Corpus fulvum, nigro-maculatum. Alæ albae: superiores fasciis duabus fulvis maculis rotundis & lituris oblongis atris; margo posticus 7 punctis atris. Postice alæ albæ nigris punctis inditco & margine. Subtus omnes concolores, sed absque fasciis fulvis.*

1262. PH. GEOMTERA *testata* seticornis, alis superioribus fulvescentibus: macula pallida striga alba, lineolaque apicis alba.

Habitat rarius apud nos.

DESCR.

**DESCR.** Majuscula. *Alæ superiores* colore cinnamomeo: in anteriore ala macula curva marginem exteriorem tangens; in posteriore striga albida, exterius recta, interius curva, lineola ut in chenopodiata, ad apice malæ, sed alba, cui postice adjacet macula saturatior. *Subtus* alæ pallidæ puncto centrali nigro & arcu fuscescente, sed ex duabus strigis constante.

- 1263. PH. GEOMETRA *Chenopodiata* seticornis**, alis anticis testaceis: fasciis tribus griseis puncto prominulo apicisque lineola supra fusca.

Phalæna seticornis spirilinguis; alis patentibus: fasciis tribus griseis, punctoque nigricante. *Fn.* 856.

*Att. upf.* 1736. p. 24. n. 47. Papilio alis planis griseis, fascia pallida.

Habitat in *Chenopodio*.

**DESCR.** *Alæ superiores* plano-patentes, flavæ, nitidiusculæ, fasciis tribus griseis: quarum prima ad basin, secunda spatio remota, angusta; tertia magis remota, latior, pone undulata litura linearis ad apicem alæ superioris nigricans. *Alæ inferiores* flavescentes: singulæ alæ subtus in medio puncto nigro notatae: pedum priorum palma albo fuscoque variæ, magnitudo mediocris: in alis superioribus inter fascias duas posteriores punctum nigrum; pars postica alarum superiorum immaculata flavescentes. Maris antennas pectinatas esse retulit T. Bergman.

- 1264. PH. GEOMETRA *comitata* seticornis**, alis anticis flavescentibus: fasciis tribus griseis puncto apicisque lineola utrinque fuscis.

Habitat in Hortis.

**DESCR.** Præcedenti paullo minor. *Alæ superiores* supra flavæ: fasciis tribus, griseentibus: prima ipsius baseos, secunda paullo angustior, cui adjacet punctum nigrum; tertia latior, postice sinuata. Ad apicem alæ litura linearis nigricans.

- 1265. PH. GEOMETRA *Citrata* seticornis**, alis griseis macula subterminali albo-fulva strigaque alba, apicis lineola fusca.

Habitat in Foliis *Citri*, quæ noctu edebat Larva geometra viridi-palescens. *Rölander*.

**DESCR.** Magnitudo Ph. Piniaria. *Alæ superiores* supra griseæ; juxta marginis crassioris postica macula magna albida, postice subferruginea, quam excipit striga alba tenuissima undulata; in apice alæ litura linearis nigra, ut duabus præcedentibus. *Subtus* cinereæ, postice pallidius,

- 1266. PH. GEOMETRA *Populata* seticornis**, alis flavescentibus: anticis subfasciatis, media maculis flavis rotundis: apicis litura fusca.

*Clerck. phal. t. 5. f. 13, 14. Phalæna populata.*

*Clerck. phal. t. 5. f. 15. Phalæna dotata.*

Habi-

Habitat in *Populo*.

*DESCR.* Media. *Aleæ* flavæ; *Superiores fascia baseos subgrisea*; *Fascia subgrisea*, media lata, postice repando-angulata. in medio notata aliquot maculis suborbiculatis flavis; *Fascia terminalis angustior*: *litura linearis fusca* in apice. *Subtus* flavescentes puncto centrali nigricante; primores *subtus* medio *litura fusca* subfasciata & *litura fusca* lata ad marginem posticum.

1267. PH. GEOMETRA *Prunata* seticornis alis griseis: anticus fasciis duabus pallidis repandis: postica semiterminali. Phalæna seticornis spirilinguis alis patentibus: fascia duplici fusca albaque alternis. *Fn. 865.*

*Clerck. phal. t. 7. f. 4. Phalæna Prunata.*

Habitat in *Pruno*.

*DESCR.* major. *Aleæ superiores* fuscecentes: *fascia anteriore* alba undata; *posteriore* terminali latiore maculata & postea hanc macula marginalis etiam in pagina interiori conspicua. *Inferiores* albidæ, subtus puncto in medio & alio ad angulum aleæ.

1268. PH. GEOMETRA *miata* seticornis, alis virescenti-undulatis: fasciis duabus latioribus albis.

Phalæna seticornis spirilinguis; alis patentibus cinereo-maculatis. *Fn. 863.*

*Act. upsi. 1736. p. 23. n. 43. Papilio alis planis virescentibus cinereo-maculatis.*

*Clerck. phal. t. 8. f. 3. Phalæna miata.*

Habitat in *Hortis*.

*DESCR.* Media. *Aleæ superiores* cinereo-virescentes fasciis obscurioribus & pallidioribus fere nebulosæ. In medio fascia pallidior punctis nigris vix manifestis.

1269. PH. GEOMETRA *Juniperata* seticornis, alis cinerascentibus: anterioribus fasciis duabus griseis lineolaque apicis fusca.

*Clerck. phal. t. 2. f. 8. Phalæna juniperata.*

Habitat in *Junipero*. D. C. Solander.

*DESCR.* Parva, statura Ph. *Prunata*. *Aleæ superiores* fascia ipsius baseos cinerascente; *Fascia lata* in medio aleæ, inæqualis, ad marginem interiorem fore interrupta; linea ad aleæ apicem fusca. *Relique oīnnibus paginis cinreas margine postico linearis, fusco.*

1270. PH. GEOMETRA *didymata* seticornis, alis albidis obsolete cinereo-bifasciatis: posteriori macula fusca biloba.

*Clerck. phal. t. 6. f. 10. Phalæna didymata.*

Habitat in *Sylvis*.

*DESCR.* Minor. *Aleæ superiores* supra albidæ fasciis duabus cinereo-nebulosis; altera in medio; altera terminalis in cuius medio macula didyma

dyma fusca; margo posticus nigro-punctatus, apicis litura linearis nigrans. Subtus glaucescentes puncto centrali nigro, arcuque duplo fuscus.

1271. PH. GEOMETRA *plagiata* seticornis, alis anticis canis: fasciis trilineatis nigricantibus repandis.

Clerck. phal. t. 6. f. 1. Phalæna plagiata.

Habitat in Sylvis rarijs.

DESCR. Media. Alæ superiores supra cinerascentes: fasciis quinque: singulis ex tribus lineis fuscis: harum prima baseos macula marginali nigrante; secunda magis obsoleta; tertia litura in medio nigra; quarta ad marginem exteriorem nigrans; quinta magis obsoleta. Inferiores cinereæ litura fusca ad superioris marginem exteriorem; posterius subtus fusca.

1272. PH. GEOMETRA *undulata* seticornis, alis albidis omnibus strigis confertissimis transversis undulatis fuscis: posticis subdentatis.

Uddm. diff. 71. Phalæna alis patentibus dentatis fuscis: lineis plurimis confertis albidis & fuscis acute undulatis.

Clerck. phal. t. 6. f. 3. Phalæna undulata.

Habitat in Salice caprea.

DESCR. Media. Alæ omnes supra cinerascentes: strigis numerosissimis, albidis, undulatis obtectæ. Subtus concolores, sed obsoletæ puncto centrali nigrante.

1273. PH. GEOMETRA *liturata* seticornis, alis subangulatis cinerascentibus: litura postica flava, apice subtus dealbatis.

Clerck. phal. t. 6. f. 6. Phalæna liturata.

Habitat Upsaliæ. Job. Alströmer.

DESCR. Media. Alæ superiores cinerascentes, margine exteriore lituris fuscentibus obsoletis; postice fascia brevis flavescens. Inferiores supra fascia obsoleta flavescente. Omnes subtus margine postico dealbatae. Caput & Collare flava.

1274. PH. GEOMETRA *atra* seticornis atra, alis erectis: anticis apice albis.

Phalæna seticornis spirilinguis tota atra, alis erectis apice albis. Fn. 864.

Aet. upf. 1736. p. 23. n. 35. Papilio alis planis nigris: apicibus albis.

Habitat in Pascuis mense Junio & Julio frequens.

DESCR. Est e minoribus. Tota atra, exceptis summis apicibus alarum exterioreum margine albis; dum feder alas erectas, uti Papiliones, tenet.

1275. PH. GEOMETRA *clathrata* seticornis, alis omnibus flavescenti-albis: lineis nigris decussatis.

Clerck.

*Clerck. phal. t. 2. f. 11.* Phalæna clathrata.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Parva. *Alæ concolores: omnes albæ striis longitudinalibus & strigis transversalibus reticulatae, sed in pagina inferiore reticularis pictura ex testaceo fusca, excepta una anastomosi atra; margo politus albo nigroque quasi dentatus.*

1276. PH. GEOMETRA *hastata* seticornis, alis omnibus nigris albo-maculatis: fasciis duabus albis immaculatis hastato dentatis.

Phalæna seticornis spirilinguis, alis patentibus nigro nebulosis; fasciis duabus albis. Fn. 861.

*Clerck. phal. t. 1. f. 9.* Phalæna hastata.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Media. *Alæ atræ: strigis quatuor, albis, inæqualibus, quorum tertia fascia latior & postice exterit quasi dentem album hastatum versus marginem posticum.*

1277. PH. GEOMETRA *tristata* seticornis, alis omnibus nigris albo-subundulatis: fasciis duabus albis undatis nigropunctatis.

Phalæna seticornis spirilinguis, alis patentibus: fascia dupli-ci alba, duplique nigra alterna. Fn. 862.

*Act. upf. 1736. p. 23. n. 45.* Papilio alis planis albidis, fasciis latis cinereis.

*Clerck. phal. t. 1. f. 13.* Phalæna tristata.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Facies præcedentis, sed minor. *Alæ atræ, albo-nebulosæ: striga alba prope basin; Fascia alba nigro-punctata in medio; striga angustissima postica. Subtus alæ antice albæ nigro-punctata; postice nigricantes striga alba angustissima; Punctum nigrum in medio.*

1278. PH. GEOMETRA *albicillata* seticornis, alis omnibus nigricantibus: fascia unica latissima alba immaculata.

*Clerck. phal. t. 1. f. 12.* Phalæna albicillata.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Media, *Alæ superiores supra albæ, antice & postice nigricantes. Inferiores albæ, postice nigricantes. Subtus omnes albidæ puncto-centrali & arcu fuscis; postice versus apices fuscescentes, imprimis superiores.*

1279.. PH. GEOMETRA *marginata* seticornis, alis omnibus albis: margine exteriore limbo fusco interrupto.

Phalæna seticornis spirilinguis alis patentibus albis: margine undique interrupte fuscis. Fn. 860.

*A&Z. upf. 1736. p. 23. n. 37.* Papilio alis planis albis, maculis fuscis inæqualibus marginalibus.

*Clerck. phal. t. 2. f. 5.* Phalæna marginata.  
Habitat in *Corylo*.

*DESCR.* Media. *Alæ superiores* albæ margine postico fusco lato inæquali; in margine exteriore macula longa versus basi, & brevior in medio; versus apicem occurrit macula marginis postici; in disco etiam macula subrotunda fusca. *Inferiores* albæ: margine postico inæquali, lato, fusco. Quibusdam individuis fascia ex maculis quatuor concatenatis, fuscis. *Subtus* concolores, sed pallido-maculatae absque puncto centrali.

1280. PH. GEOMETRA *ocellata* seticornis, alis albidis: anticis fasciis duabus fuscescentibus maculaque apicis ocellari didyma.

Habitat in *Corylo*.

*DESCR.* Minor. *Alæ superiores* albæ: fascia fusca in ipsa basi; Fascia fusca nigro maculata in medio; in hujus parte ad marginem interiorem omicron ypsilon nigrum observatur; Punctum didymum versus angulum alæ. *Inferiores* alæ albidæ. *Subtus* omnes glauco-nebulosæ cum puncto nigro in medio. *Superiores* ante marginem posticum ordine punctorum ex septem punctis albidis.

1281. PH. GEOMETRA *flavata* seticornis, alis cinerascentibus: anticis fasciis abbreviatis tribus fuscis.

Phalæna subpectinicornis spirilinguis, alis patentibus: fasciis albidis fuscisque variis. *En.* 844.

*Gœd. inf. 3. t. K.*

*Frisch. inf. 7. t. 19.*

Habitat in *Pruno*; in *Sylvis vulgaris*.

*DESCR.* Minor quam Ph. *ocellata*. *Alæ superiores* albidæ-cinerascentes; Fascia fusca in ipsa basi alæ; Fascia media, fusca, tantum ad dimidium alæ sepe extendens; Macula fusca ad marginem crassiorem ante apicem. *Inferiores* supra albidæ, cinereo-undatae. *Subtus* omnes cinereo-nebulosæ puncto nigro in medio.

1282. PH. GEOMETRA *Alchemillata* seticornis, alis canescientibus: anticis undatis fascia nivea cinereo-undata lineolaque intra apicem.

*De Geer. inf. 1. t. 22. f. 16.*

Habitat in *Alchemilla*.

*DESCR.* Minor præcedentibus, sed similis. *Alæ superiores* cinereæ, albidæ-nebulosæ; Fascia transversa, alba, postica, linea fusca undata; striæ ante marginem posticum alba, repanda. *Inferiores* cinereæ, albidæ-undatae. *Subtus* superiorés cinerascentes fascia albida & postice cinereo-fuscescentes; inferiores subtus exalbidæ, postice fuscescentes.

1283. PH. GEOMETRA *Cratægata* seticornis, alis flavissimis:

mis: anterioribus maculis costalibus tribus ferrugineis: media subargentea.

*Phalæna luteolata.* Synt. nat. 10. p. 525. n. 168.

*Uddm. diff. 70.* *Phalæna flava;* alis patentibus macula tricuspidè fusca, pupilla alba.

Habitat in *Cratægo Oxyacantha & Aria.*

DESCR. Parva. Alæ omnes flavissimæ s. sulphureæ, utrū totum corpus. Rubra sunt Antennæ supra, genicula Pedum, Thoracis latera, costæ, alarum basis; in costa alæ superioris tres macula rufæ: prima minima; secunda cum macula ferruginea fenestrata; ultima major trigona. Subtus fere concolores, sed ordo posticus transversus punctorum impressorum obsoletorum. Inferiores puncto fusco in medio.

1284. PH. GEOMETRA *bilineata* seticornis, alis omnibus luteis testaceo-undatis: fascia repanda, margine fusco alboque.

Clerck. phal. t. 6. f. 13. *Phalæna bifasciata.*

Habitat in Hortis.

DESCR. Minor. Alæ omnes utrinque flavæ undique strigis tenuissimis fuscescensibus undulatæ. Superiores supra fascia lata, paullo obscureiore, postice sinuata, utrinque distincta striga repanda albida.

1285. PH. GEOMETRA *lividata* seticornis, alis antice pallidis striga fusca, postice fuscis striga pallida.

Clerck. phal. t. 5. f. 10. *Phalæna lividata.*

Habitat ruri.

DESCR. Facies & statuta omnino sequentis. Alæ omnes puncto atro centrali utrinque; antice pallidæ vel pallide sulphureæ striga curva fusca; postice obsoleto fusca striga pallida & pone strigam fulcùs color minus saturatus. Subtus omnes pallidæ striga fusca pone punctum; fascia dein obsoleta inter punctum & strigam.

1286. PH. GEOMETRA *aversata* seticornis, alis glaucis: striga baseos fasciaque media puncto fuscis.

Clerck. phal. t. 5. f. 7. *Phalæna aversata.*

*Uddm. diff. 72.* *Phalæna* alis patentibus pallidis: fascia transversali dilute fusca.

Habitat in Finlandia.

DESCR. Minor. Alæ omnes glaucæ medio fascia lata, transversa, fusca; antice striga obsoleta fusca; post fasciam striga latior, obsoleta, ut vix manifesta. Subtus fere concolores, sed pallidiiores cum puncto nigro in medio.

1287. PH. GEOMETRA *incanata* seticornis, alis omnibus canis postice striga alba repanda, disco puncto marginato nigro-punctato.

Clerck phal. t. 3. f. 3. *Phalæna incanata.*

Habitat in Sylvis.

# 338 INSECTA LEPID. PHAL. GEOMETRA.

*DESCR.* Minor. *Alæ omnes supra canæ:* Striga undulata, nigricans versus basin; Punctum nigrum in medio; Striga postica nigricans repanda; mox striga alba repanda margine postico nigro punctato. *Subtus omnes albido-cinereæ,* puncto centrali nigro; striga postica fusca repanda margineque nigro punctato. *Alæ posticæ* fere angulatæ.

1288. PH. GEOMETRA *immutata* seticornis: alis albidis concoloribus: strigis posticis obsoletis puncto margineque nigro-punctatis.

*Clerck phal. t. 6. f. 12.* Phalæna immutata.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Minor. *Alæ omnes albae puncto centrali atro;* strigæ albidae, obsoletaæ, ut vix conspicuaæ, præsertim pone punctum, plures; Margo posticus punctis minimis nigris utrinque. *Subtus concolores,* sed magis cinereæ & quasi atomis adspersæ.

1289. PH. GEOMETRA *remutata* seticornis, alis flavescentibus: strigis tribus fuscis, puncto margineque postico nigro-punctato.

*Clerck phal. t. 5. f. 12.* Phalæna remutata.

Habitat passim.

*DESCR.* Parva. *Alæ glaucae:* strigis tribus, fuscis, curvatis, æquali spatio remotis; margo posticus striga fusca cum punctis fuscis. Punctum fuscum inter primam & secundam strigam. *Subtus obsoletiores:* striga prima saepe deficiente.

1290. PH. GEOMETRA *immorata* seticornis, alis omnibus lutescentibus: fasciis obsoletis albidis marginisque striga nigricante.

Habitat ruri.

*DESCR.* Parva. *Alæ omnes cinereo-lutescentes;* atomis fuscis adspersæ fasciis albidis, numerosis, undulatis; margo posticus striga vix conspicua terminatus. *Subtus concolores s. cinereæ fasciis pluribus, undulatis, fuscis, evidentioribus & postice striga minima, nivea.*

1291. PH. GEOMETRA *strigilata* seticornis, alis cinereis: postice striga transversa recta pallida.

*Clerck phal. t. 5. f. 2* Phalæna strigilata.

Habitat rarius apud nos.

*DESCR.* Parva, tota cinerea. *Alæ supra cinereæ, inamoenæ:* strigis duabus, flexuosis, saturatioribus, vix conspicuis; at postice striga transversa, recta, cinerea, postice alba.

1292. PH. GEOMETRA *ferrugata* seticornis, alis purpurascientibus: strigis tribus albidis, postice cinereis macula didyma fusca.

Habitat in Hortis.

*DESCR.*

DESCR. Parva. *Alæ superiores* antice ferrugineo-purpurascentes, posticæ cinereæ: fasciæ duæ, lineares, angustæ, albidae verius basi, fascia tertia distinguit colorem purpurascensem a cinereo. Macula didyma fusca, versus apicem in areæ cinerea. *Inferiores* alæ cinerascentes. *Subtus* omnes cinerascentes.

1293. PH. GEOMETRA *brumata* seticornis, alis griseo-fuscis: striga nigra posticeque pallidioribus; femina aptera. Phalæna seticornis, alis griseo-fuscis: inferioribus albidis; femina aptera. *Fn.* 921.

*De Geer inf. I. t. 24. f. 11-19.*

*Raj. inf. 369. n. 9.* Eruca geometra parva pallide seu ex flavo virens, lineolis albicantibus, tum secundum longitudinem, tum transversis.

Habitat in *Pyro*, *Malo*, *Pruno*, *Carpino*.

DESCR. *Alæ Maris amplæ*, griseo-fuscæ, fascia transversali vix manifesta dilutiore. *Feminae* alæ admodum parvæ, cinereæ, maculis nigris. *Pedes longi*, annulis nigris.

*LARVA* viridis, pedibus 10, linea utrinque laterali, longitudinali, alba, parva; annuo spatio intra puppam latitans antequam excluditur, licet minor inusefa sit.

1294. PH. GEOMETRA *succenturiata* seticornis, alis omnibus cauescenti-exalbidis puncto nigro limboque obscuriore.

*Clerck. phal. t. 8. f. 8. 11.* Phalæna succenturiata.

Habitat in Hortis frequens.

DESCR. Parva. *Thorax & anus* alba. *Abdomen* fulcescens. *Alæ oblongæ*: omnes supra albidæ cinereo fuscoque, præsertim in ambitu variae. *Superiores* puncto centrali nigro; omnes striga postica alba flexuosa.

1295. PH. GEOMETRA *rectangulata* seticornis, alis viridiibus fusco-subfasciatis.

*Clerck. phal. t. 8. f. 6.* Phalæna rectangulata.

Habitat in Hortis frequens.

DESCR. Parva, prioris statura. *Alæ* supra virescentes lituris subfasciatæ, nigris. *Subtus* pallidæ cinerascentes puncto centrali nigro & arcu ex punctis atris concatenatis, strigaque postica alba flexuosa.

1296. PH. GEOMETRA *Absinthiata* seticornis, alis obscure cinereis puncto liturisque tribus nigris marginalibus, punctoque ani albo.

*Clerck. phal. t. 8 f. 9.* Phalæna Absinthiata.

Habitat in *Absinthio*. C. Clerck.

DESCR. Simillima præcedenti, sed colore alarum diversa. *Alæ* lituris fuscois tribus ad marginem crassiorem. Punctum nigrum in medio alæ. Punctum album ad angulum ani

1297. PH. GEOMETRA *Urticata* seticornis, alis albis fusco fasciato maculatis, thorace anoque flavis.

Phalæna hortulata. *Syst. nat.* 10. p. 529. n. 195.

Phalæna seticornis spirilinguis, alis patentibus albo fuscoque nebulosis, ano flavo. *Fn.* 846.

*Gœd. belg.* 2. p. 37. f. 13.

*List. goed.* p. 156. f. 61.

*Alb. inf.* t. XXXVII. f. 60.

*Reaum. gall.* 1. t. 49. f. 18, 17.

*De Geer inf.* 1. t. 28. f. 18, 19.

*Pet. gaz.* 51. t. 32. f. 8. Phalæna minor alba, maculis nigrescentibus ornata.

*Raj. inf.* 222. Phalæna minor; alis oblongis ex albo & cæruleo nigricante variis, ad exortum flavis.

*Harris. inf.* 13. t. 6. f. 1. p.

Habitat in *Urtica*, frequens in Pomonæ hortis; exedebat etiam *Sigesbeckiam* & folia contorquebat.

LARVA fumo ex arbore abigitur, descendit per fila tenuia, mox iterum adscendit per corticem arboris, ni visco sit oblitus, vel a gallinis admissis devoretur. Circa Solsticium æstivum descendit & evanescit, in Puppam transitura?

DESCR. Parva. Corpus luteum. Alæ concolores fuscae disco albo; antice maculae fuscae sparsæ subrotundæ; postice fascia arcuata fusca,

1298. PH. GEOMETRA *Nymphæata* seticornis, alis cinereis: omnibus conformiter albo maculatis reticulatis.

Phalæna seticornis; alis patentibus albis: omnibus nebuloso-reticulatis glabris. *Fn.* 851.

*Act. upf.* 1735. p. 24. n. 52. Papilio alis planis nitidis albis: omnibus reticulatis.

*Raj. inf.* 227. n. 87. Phalæna minor piscinas & stagna frequentans, alis utrisque albo & fusco s. nigricante colore variis?

Habitat in *Lemna*.

DESCR. Alæ omnes reticulatae sunt, reticulo dupli linea nigricante, intra quas color flavescens, sed admodum obsoletus: intra circulos sive campos retis albae omnino sunt alæ. Alæ utroque latere spectatae concolores sunt.

1299. PH. GEOMETRA *Potamogata* seticornis, alis cinereis albo-maculatis: anterioribus obsoletius reticulatis.

Phalæna seticornis; alis patentibus albis; inferioribus nebuloso-reticulatis glabris. *Fn.* 853.

*Lœsel. prussic.* 178. Eruca nymphææ.

*Reaum. gall.* 2. t. 32. f. 11.

*Aet. upf.* 1736. p. 24. n. 51. *Papilio alis planis nitidis albis, inferioribus reticulatis.*

Habitat in *Potamogetone natante.*

DESCR. Est haec praecedenti duplo major, sed simillima, at ala superiores obsoletæ reticulatae.

1300. PH. GEOMETRA *Stratiolata* seticornis; alis pallidis subfasciatis: anterioribus punctis duobus nigris.

*Phalæna seticornis*, alis patentibus cinereis: fasciis linearibus fuscis, punctoque nigro. Fn. 854.

*De Geer inf.* I. t. 37. f. 16-18.

Habitat in Aquosis.

DESCR. Parva. Alæ superiores albidæ: anterius cinerascentes, antice puncto fusco; in medio punctum lunare fuscum disco albo. Posteriores albae, fascia fusca interrupta. Subtus omnes albae immaculatae.

1301. PH. GEOMETRA *Lemnata* seticornis, alis albis: posticis fascia terminali nigra: punctis quatuor albis.

*Phalæna seticornis*, alis patentibus albis, pone fascia marginali; inferioribus nigra: punctis quatuor albis. Fn. 852.

*Reaum. gall.* 2. t. 32. f. 13. t. 16. 17.

Habitat in *Lemna*, ex cuius foliis in cylindrum collectis fit nidus pro pupa supra aquas.

DESCR. Parva. Antennæ corpore breviores, articulis singulis ab altero latere albo triangulo pictis, inde hinc visæ annulis albis cinctæ conspiciuntur.

Alæ superiores albae: fascia ad marginem posticum fusca, in medio glauca; punctum fuscum in medio alæ. Lineola flexuosa glauca ante fasciam; subtus cinereæ sunt haæ alæ puncto in medio fusco.

Alæ inferiores albae: fascia ad marginem posticum nigra, lineola longitudinali superincumbente glauca & punctis quatuor albis, in fascia, secundum ejusdem longitudinem; in medio hujus alæ punctum nigrum & macula nigricans; subtus haæ alæ albidiores sunt.

1302. PH. GEOMETRA *purpurata* seticornis, alis superioribus virescentibus: fasciis duabus purpureis; inferioribus luteis subtus litura purpurascente.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Facies & similitudo summa Ph. purpurariae. Alæ omnes margine ciliari purpureo. Superiores supra virescentes fasciis duabus luteis purpureis; priori brevi, posteriore majore; Subtus flavissimæ litura ante apicem purpurascente. Inferiores utrinque flavissimæ: Subtus litura magna purpurascente.

1303. PH. GEOMETRA *cingulata* seticornis, alis omnibus atris: striga nivea.

*Phalæna seticornis*, spirilinguis nasuta atra: linea alba transversali. Fn. 906.

*Aet. upf. 1736. p. 23. n. 38.* Papilio alis planis nigris : linea transversa alba.

*DESCR.* Tota atra, sed linea alba, minime argentea, angustissima, transversa alas in medio notat. Minima omnium est & pro Tinea agnosceretur, nisi alae inferiores eodem colore cum superioribus gauderent.

1304. PH. TORTRIX *fasciana* alis fusco cinerascentibus : fascia alba.

Habitat in Pomariis.

*DESCR.* Media. Alae superiores obscure cinerascentes margine exteriore albo nigroque maculato ; fascia lata, albida, recurvata. Inferiores alae nigricantes : margine ciliari albido.

1305. PH. TORTRIX *uncana* alis fuscis margine exteriore albido : medio ramum recurvum album introrsum exserente.

*Clerck. phal. t. 3. f. 7.* Phalæna unca.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Magnitudo Tortricum reliquarum, at alæ magis deflexæ, ut in Noctuis, ideoque hæreo utri potius ad socianda ; ob parvitatem huic magis affinis videtur. Corpus cinereum. Alae superiores supra fuscæ, sed margo exterior late albus, a qua albedine quasi ramus obtusus posteriora versus introrsum exit versus alæ discum ; postice quasi fascia albida obsoleta adparet. Inferiores alæ albæ. Subtus omnes cinereæ.

1306. PH. TORTRIX *prasinana* alis superioribus viridibus : strigis duabus obliquis flavis, margine postico antennis pedibusque fulvis.

*Pet. gaz. t. 7. f. 11.* Phalæna virescens lineis obliquis albescientibus.

*De Geer ins. 1. t. 3. f. 1.*

Habitat in Fago, Quercu, Aloë.

*DESCR.* Majuscula. Thorax villosus, albo-virescens. Pedes & Antennæ rufescentes. Alae superiores dilute virescentes strigis duabus, obliquis, albidis ; margo posticus rufus.

1307. PH. TORTRIX *viridana* alis rhombeis : superioribus viridibus immaculatis.

Phalæna seticornis spirilinguis nasuta viridis. Fn. 895. It. W:goth. 65.

*Frisch. germ. 3. p. 18. t. 8.* Papilio viridis erucæ salicinæ. Habitat in Quercu.

*DESCR.*

# INSECTA LEPID. PHALÆNA. TORTRIX 343

DESCR. Latior est aliis; sed ratione latitudinis admodum brevis & postice obtusa. *Alæ superiores* extus dilute virides, nullo autem modo ad cæruleum vergentes, sed albido virides. *Inferiores* (& superiores subtus) albidae ad plumbeum inclinato colore, venter albus. *Pedes* spinosi & tota Phalæna subtus albida. *Caput* album.

1308. PH. TORTRIX *clorana* alis rhombensis: superioribus viridibus margine albido.

Roes. inf. I. pbal. 4. t. 3.

Habitat in *Salice birsuta*.

DESCR. Simillima præcedenti, ut vix distinguitur, nisi margine alarum pallide albicante & quod minor sit.

1309. PH. TORTRIX *hamana* alis superioribus flavis puncto lituraque postica hamata ferrugineis.

Clerck. phal. t. 4. f. 4, 7. Phalæna hamana.

Habitat in Pomiariis.

DESCR. Media. *Alæ superiores* flavæ: Punctum ferrugineum, in medio dorsi; litura fracta ferruginea ad flexuram posticam alæ, cruribus posteriora spectans.

1310. PH. TORTRIX *Amerina* alis superioribus testaceis: litura communi ferruginea.

Reaum. inf. 2. t. 18. f. 6, 7.

Habitat in *Salice*.

DESCR. Simillima Ph. Rosanæ, sed colore alarum testaceo absque pistura ulla; alæ postice retusæ sunt.

1311. PH. TORTRIX *ministrana* alis superioribus testaceis: margine postico rufo, medio litura ferruginea: lineola alba.

Phalæna alis deflexis pallide griseis: fascia saturatiore. Fn. 885.

Clerck. phal. t. 2. f. 12. Phalæna ministrana.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Simillima præcedenti. *Alæ* supra flavescenti-testacea; in medio fascia obsoleta ferruginea; in qua litura linearis albida; posterius alæ rufæ sunt.

1312. PH. TORTRIX *Piceana* alis superioribus griseo fusco-que variis: dorso ferrugineis.

Clerck. pbl. 2. f. 9. Phalæna Piceana.

Habitat in *Pini sylvestris* foliis, quæ connectit.

DESCR. Proxime accedit ad sequentem.

1313. TORTRIX *Xylosteana* alis superioribus testaceis: cruce communi ferruginea.

Clerck. phal. t. 2. f. 6. Phalæna *Xylostana*.

Habitat in *Lonicera Xylosteo*: *Robinia Caragana*.

DESCR Media. Alæ superiores fusco-purpurascentes, at antice luteæ macula oblonga purpurascente ad thoracem; macula lutea ad medium marginis alæ crassioris; & alia posterius; ad angulum ani itidem macula oblonga lutea.

1314. PH. TORTRIX *Rosana* alis superioribus testaceo-reticulatis: fascia grisea obliqua.

Phalæna seticornis spirilingus alis incumbentibus griseis: inferiorum margine crassiore albido. Fn. 896.

Aet. upf. 1736. p. 25. n. 77. Papilio alis depressis brevissimis testaceis.

Habitat in *Rosa. Rubo*.

DESCR. Congeneribus latior est, verum ratione latitudinis admodum brevis & postice obtusa. Alæ omnes griseæ seu dilute testaceæ, tam supra, quam infra, ut & totum animal, sed superiores alæ lineolis transversis, inæqualibus, obscurioribus, vix conspicuis; inferiores Alæ margine crassiore versus basin albido-flavescentes; alæ superiores postice emarginatae margine nigricante.

1315. PH. TORTRIX *oporana* alis superioribus ferrugineis griseo maculatis reticulatisque.

Wilk. pap. 17. t. 2. u. 4.

Habitat in *Malo*.

DESCR. Majuscula. Alæ luteo-testaceæ: superiores supra ferrugineo-reticulatae & varie maculatae; apex alæ parum reflexo-prominens, postice obtusissimus. Subitus omnes alæ luteæ fusco-nebulosæ.

1316. PH. TORTRIX *Avellana* alis superioribus testaceis: fasciis ferrugineis sesquitertiis.

Phalæna seticornis spirilingus; alis incumbentibus flavis: fasciis duabus griseis obliquis, postica interrupta. Fn. 882.

Habitat in *Corylo*.

DESCR. Phalæna magnitudine inusæ carnivora. Alæ deflexo-incumbentes, breves, late: superiores pallide flavescentes: fasciis duabus retrorsum spectantibus, fusco-griseis, quarum postica in medio interrupta. Pylæ spinosi.

1317. PH. TORTRIX *arcuana* alis luteis: fasciis tribus arcuatis, macula nigra tripunctata lineolisque duabus argenteis.

Clerck.

*Clerck. phal. t. 10. f. 8.* Phalæna arcuana.

Habitat in nemoribus.

*DESCR.* Similis Ph. Lecheanæ, sed quadruplo minor. *Alæ superiores luteæ ad basin lineæ argenteæ duæ, quas excipit fascia cæruleo-argentea; tum area latior macula oblonga nigra in qua puncta iria argentea; ultimo fasciæ duæ argenteæ, antrorsum arcuatæ.*

1318. PH. TORTRIX *Lecheana* alis superioribus luteis : charæteribus I L thoraceque argenteis.

*Clerck. phal. t. 10. f. 2.* Phalæna Lecheana.

Habitat in Pado.

*DESCR.* Media. *Alæ superiores luteo-testaceæ, fasciis s. strigis duabus argenteis : priore transversa ; posteriore retrorsum curvata, versus marginem crassiorem bifida ; margo etiam posticus, ante cilia, argentatus. Thorax argentatus.*

1319. PH. TORTRIX *Forskåleana* alis superioribus flavis luteo-reticulatis : medio litura fuscescente.

*Clerck. phal. t. 10. f. 2, 6.* Phalæna Forskåleana.

Habitat in nemoribus.

*DESCR.* Parva ; tota flava. *Alæ flavae : Superiores obtusissimæ, ferruginea tenuissime reticulatae ; fascia in medio recurvata testaceo-fusca, verius interiora latior, sed obsoletior. Inferiores flavae, immaculatae.*

1320. PH. TORTRIX *Bænderiana* alis superioribus testaceo-fuscis immaculatis.

Habitat in nemoribus.

*DESCR.* Majuscula. *Alæ, omnes obscure fuscae immaculatae, uti totum corpus.*

1321. PH. TORTRIX *fusca*, alis superioribus fuscis.

*Clerck. phal. t. 2. f. 1.* Phalæna fusca.

Habitat in nemoribus.

*DESCR.* Majuscula. Tota fusca s. obscure cinerea, absque maculis.

1322. PH. TORTRIX *Hartmanniana* alis cinereis : superioribus linea nigra albæ adnata.

Habitat Loefstadii. *De Geer.*

*DESCR.* Magnitudo media. *Alæ superiores cinereæ linea longitudinali atra, cui adjacet a latere exteriore linea nivea. Inferiores cinereæ.*

1323. PH. TORTRIX *Loeflingiana* alis superioribus flavis luteo-reticulatis : duplixi X X notatis.

*Clerck. phal. t. 10. f. 6.* Phalæna Loeflingiana.

Habitat in Quercus foliis, quæ contorquet.

346 INSECTA LEPID. PHALÆNA. TORTRIX.

**DESCR.** Minor; tota flava. Anus subferrugineus. Alæ superiores pallide flavæ, vix manifeste atomis testaceis reticulatæ s. undatæ; ad marginem crassiorem duæ maculæ testaceæ cruciformes. Subtus alæ fulcescentes.

1324. PH. TORTRIX *Bergmanniana* alis superioribus luteis  
flavo-punctatis: fasciis quatuor argenteis: tertia bifida.

**Clerck. phal. t. 10 f. 5.** Phalæna Bergmanniana.  
Habitat in nemoribus.

**DESCR.** Minutæ flava. Alæ superiores obtusissimæ flavæ fasciis quatuor ferrugineo-argenteis, quarum prima in ipsa basi alæ, ultima in margine postico; omnes hæ fasciæ ad marginem crassiorem connectuntur; insuper alæ superficies atomis ferrugineis hinc inde rarius adpersa. Inferiores alæ & paginæ fulcescentes.

1325. PH. TORTRIX *Holmiana* alis superioribus luteo-ferru-  
gineis: macula marginali trigona argentea.

Phalæna seticornis spirilinguis; alis depresso-fuscis fulvis: macula marginali argentea triangulari. Fn. 883.

Habitat in Pomariis rarius.

**DESCR.** Parva. Alæ superiores supra fulvæ seu rufo-luteæ; macula ad marginem exteriorem, fere in medio, argentea triangulari, basi marginem obregente; superiores alæ subtus fulcæ. Inferiores alæ albide. Antennæ corpore dimidio breviore, simplicissimæ. Lingua spiralis, brevissima. Oculi nigri.

1326. PH. TORTRIX *Rolandriana* alis superioribus pallide  
testaceis: strigis ferrugineis inferne antrorsum versis.

Habitat in nemoribus.

1327. PH. TORTRIX *Solandriana* alis superioribus pallidis:  
macula communi dorsali ferruginea.

**De Geer inf. 1. t. 28. f. 29, 30.**

Habitat in Betula.

**DESCR.** Media. Alæ superiores albido-cineraseentes; in medio dorso, dum alæ complicatae, macula majuscula rhombea ferruginea.

1328. PH. TORTRIX *Hastiana* alis superioribus fuscis: fa-  
scia antrorsum obliqua alba.

**Clerck. phal. t. 2. f. 7.** Phalæna Hastiana.

Habitat in Salice.

**DESCR.** Majuscula. Alæ anterius dilatatae, posterius forficatae magis quam in reliquis, fuscæ; Fascia singulis linearis, obliqua, inferiore basi antrorsum, apice retrosum spectante; hæc non tangit marginem tenuioriem alæ.

1329. PH. TORTRIX *Wablomiana* alis superioribus cinereis:  
fasciis

fasciis duabus fusco-nebulosis: litura postica obsoleta, palpis obtusis.

Phalæna seticornis spirilinguis; alis deflexis albidis: superioribus dupli fascia obsolete cinerea. Fn. 884.

Habitat in Hortis rariis.

DESCR. Magnitudo minoris muscae; alæ patulæ, tamen omnino deflexæ: color totius albus est, sed in superioribus alis, quæ nudæ sunt, fascia duplex cinerea, imo & cinerities versus alarum apices, quasi fascia tertia dimidiata. Thorax tegitur villis longiusculis, qui in gibbum fere elevantur. Antennæ filiformes, cinereæ.

1330. PH. TORTRIX *Ledianæ* alis fuscis: fasciis duabus rubro argenteis: posteriore puncto intruso.

Clerck. phal. t. 10. f. 12. Phalæna *Ledianæ*.

Habitat in *Ledo* palustri. T. Bergman.

DESCR. Alæ superiores fuscæ: fasciæ duæ, argenteæ, rubro colore superinductæ; harum posterior in medio puncto magno intruso, Antennæ nigrae, corpore breviores. Magnitudo Culicis,

1331. PH. TORTRIX *Modeeriana* alis superioribus flavescen-tibus: macula marginali posterius fuscæ.

Habitat Holmiæ.

DESCR. Alæ superiores flavescentes, in medio litura oblitterata obliqua & inacula fusca ad marginem crassiorum, versus posteriora. Inferiores flavescenti-exalbidæ.

1332. PH. TORTRIX *Uddmanniana* alis cinereis: macula ferruginea marginis dorsalis transversa.

Habitat Holniæ.

DESCR. Alæ superiores cinereæ, parum nebulosæ, margine exteriore strigis minimis nigris; in medio marginis dorsalis macula transversa fusco-ferruginea.

1333. PH. TORTRIX *cruciana* alis exalbido-cinereis: postice macula ferruginea arcuata.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Alæ superiores exalbido-cinereæ: antice a tergo macula communis cinerea obsoleta; postice macula ferruginea arcuata cruribus deorsum veatis, anteriore sicilicet medium, posteriore vero apicem attingente; cumque macula utriusque alæ ad annum coenant, crucem quasi postice referunt,

1334. PH. TORTRIX *Heracleana* elinguis recurvicornis, alis griseis puncto obsolete fusco, thorace flavicante.

Phalæna seticornis elinguis; capite bicorni, thorace flavo, alis incumbenti-planis griseo-fuscis. Fn. 919.

De Geer. ins. 1. t. 29. f. 6, 7.

Schæff. ins. 1758. t. 2. f. 3. 4.

Habi-

## 348 INSECTA LEPID. PHALÆNA. TORTRIX.

Habitat in umbellis *Heraclei*, quas quotannis devastat & involvit, sub metamorphosi demum caules penetrat.

DESCR. Phalæna nocturna alis planis incumbentibus: *Thorax* a tergo albicans, pone quasi trilobus; *Caput* albicans, maxillis duabus recurvis cristatis, apice subulatis, nigris, erectis; subitus tota albicanti-fusca est. Hujus plures species apud nos sunt, quæ magnitudine differunt, sed notis specificis non facile distinguntur.

335. PH. TORTRIX *Alströmiana* alis albidis: superioribus macula laterali fusco-ferruginea.

Clerck. phal. t. 10. f. 1. Phalæna Alstromeriana.

Habitat in Pomariis.

DESCR. Statura Ph. Heracleanæ. *Palpi* subulati, adscendentæ. *Alæ* cinereo-exalbidæ: *Superiores* in medio, ad marginem lateralem, macula fusca, interius ferruginea s. sublanguinea; ad marginem posticum exarato-striatae, ipsoque margine nigro-punctatae. *Inferiores* cinereo-albidae. *Subnas* obscure, albicantes.

335. PH. TORTRIX *Logiana* alis superioribus canis: atomis nigris sparsis; inferioribus exalbidis.

Clerck. phal. t. 10. f. 3. Phalæna Logiana.

Habitat in lucis.

DESCR. *Palpi* breves, prominentes, et quasi bicornes. *Alæ* præcedentis obtusiores, cinereo-albicantes, latere exteriore ad marginem macula omnino obsoleta cinerea; postice strigis exaratae, adspersæ punctis nigricantibus vix conspicuis. *Subnas* omnes alæ politæ.

337. PH. TORTRIX *gnomana* alis superioribus flavis: fascia obliqua testacea: maculaque postica marginali ferruginea.

Clerck. phal. t. 4. f. 13. Phalæna gnomana.

Habitat Upsaliæ Job. Alströmer.

DESCR. Parva. *Alæ* flavescentes; e medio margine exteriore fascia acuta, testacea, sursum retrosumque adscendens; margo exterior versus postremo notatur macula ferruginea.

338. PH. TORTRIX *Schreberiana* alis superioribus griseis; macula marginali trigona alba:

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Similis PH. Holmianæ, sed triplo major. *Alæ superiores* supra fulco-griseæ, subfasciatæ; macula magna, nivea, trigona cum puncto (fusco posterius), ad medium marginis exterioris. *Inferiores* fulcæ.

339. PH. TORTRIX *Schalleriana* alis albidis: macula laterali ferruginea apicem alæ attingente.

Habitat in nemoribus.

DESCR.

# INSECTA LEPID. PHALÆNA. TORTRIX. 349

DESCR. Similiis PH. Alströmerianæ, at duplo major & lateribus alatum anteriorius latioribus. Alæ superiores albidae, hinc inde anterius punctis prominentibus elevatis scabre. Macula ferruginea ad marginem crassorem, ante medium incipiens & fere ad apicem alæ juxta marginem excurrentis.

1340. PH. TORTRIX *pupillana* alis albidis: fasciis duabus obliquis fuscescentibus apiceque ocello argenteo-pupillari.  
Habitat Upsaliæ.

DESCR. Alæ superiores supra albæ; ad basin lineola fusca; in medio fascia fuscescens obliqua; ad apicem ocellus fuscus pupilla argentea oblonga. Inferiores & omnes subtus cinerascentes.

1341. PH. TORTRIX *pariana* alis brunneis: fascia glauca strigaque antica posticaque atra.

Clerck. phal. t. 10. f. 9. Phalæna pariana.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Pusilla, brevis, Musca domestica minor. Alæ superiores griseo-brunneæ, antice striga nigra; posterius fascia lata, glauca, in medio divisa. Striga undulata, nigra, angustissima Subtus maculatæ margine albo. Inferiores supra fuscae; subtus glaucescentes fascia fusca.

1342. PH. TORTRIX *Goiiana* alis superioribus supra niveis, subtus fuscis.

Habitat ad sylvarum paludosa.

DESCR. Maxima facile inter nostrates hujus gentis. Corpus nigrum supra testum squamis niveis. Alæ superiores supra niveæ; subtus fuscæ. Inferiores supra albæ; subtus albidae. Femora a latere interiore nigra. Antennæ corpore dimidio breviores, nigrae, characteribus albis.

1343. PH. TORTRIX *mundana* alis nudis albidis: strigis duabus undatis punctoque medio fuscis.

Habitat passim in Pratis.

DESCR. Media. Alæ omnes nudæ, absque squamis, quod inter Phalænas ad modum singulare; alæ postice magis rotundatae & perfecte obovatæ, ut dubium cui Phalænarum phalangi potissimum inferenda. Alæ haec albidae: strigis s. fasciis duabus, fuscis, flexuoso-repandis, alas in tres partes æquales distinguenteribus; punctum in medio fuscum. Antennæ setaceæ, corpore dimidio breviores.

1344. PH. PYRALIS *tentacularis* palpis longitudine antennarum pectinatarum, alis omnibus cinerascentibus: strigis tribus obsoletis.

Phalæna tentacularia. Syst. nat. 10. p. 522. n. 146.

Phalæna pectinicornis spirilinguis, tentaculis setaceis longitudine antennarum, alis planiusculis. Fn. 841.

De Geer. ins. 1. t. 5. f. 1.

Habitat Rusi.

DESCR.

# 350 INSECTA LEPID. PHALÆNA. PYRALIS.

**DESCR.** Media. Alæ omnes utrinque cinereæ: Superiores strigis tribus fuscescentibus, æquali spatio remotis: prima & secunda versus marginem exteriorem recurvata; tertia recta s. transversa. Antennæ pectinatae. Palpi duo, erexitores, antrosum porrecti, longitudine fere antennarum, margine villosi, apice diffraicti patuli.

1345. PH. PYRALIS *barbalis* palpis brevioribus antennis pectinatis, femoribus anticis barba porrecta.

Raj. inf. 227. n. 103. b?

Clerck. phal. t. 5. f. 3. Phalæna barbalis.

Habitat apud nos rarius.

**DESCR.** Simillima præcedenti; an solo sexu distincta? Palpi porrecti in palpis antennis subpectinatis dimidio brevioribus. Femora antica barba porrecta longitudine palporum, quod singulare. Alæ omnino præcedentis, sed inferiores albidiiores.

1346. PH. PYRALIS *proboscidalis* palpis porrectis approximatis thorace longioribus, antennis pectinatis, alis griseo-ferrugineis.

Clerck. phal. t. 5. f. 4. Phalæna proboscidalis.

Habitat in Sylvis.

**DESCR.** Major. Alæ superiores griseæ e pallide cinereo, atomis ferrugineis: Fascia tres, subferrugineaæ, antice oblitteratae; quarum prima exterior recurva; media transversa; postrema transversa aliquot punctis albidis oblitterata punctata. Palpi compressi, porrecti, approximati, antrosum prominent.

1347. PH. PYRALIS *rostralis* palpis porrectis thoraceque longioribus, alis subgriseis: punctis duobus muricatis lineaque apicis nigra.

Raj. inf. 214. n. 9. Phalæna media e rufo cinerascens aut pulla gemina proboscide.

Rœs. inf. 1. phal. 4. t. 6.

Habitat in Urtica, Humulo.

**DESCR.** Media. Alæ superiores obicure griseentes, posterius minus saturate: in area anteriore obscuriore aliquot puncta albida fuscaque prominentia; in posteriore striæ excavatae. Ad apicem alæ lineola nigra, ut in Ph. Chenopodiata. Thoracis dorsum cristis exasperatum. Palpi compressi, adscendentes, margine superiore pubescentes.

1348. PH. PYRALIS *Farinalis* palpis recurvatis, alis politis fuscescentibus: strigis repandis albidis: area interjecta glauca.

Clerck. phal. t. 2. f. 14. Phalæna farinalis.

Habitat in Farina culinari, cibis præparata; frequens in culinis.

**DESCR.** Media. Alæ superiores ferrugineaæ strigis duabus, albidis: priori versus basin recurva; posteriore ante apicem flexuosa. Inferiores supra fusce-

# INSECTA LEPID. PHALÆNA. PYRALIS. 351

fuscescentes striga alba; margine postico nigro. Abdomen semper adscendens & fere erectum; a tergo Thoracis, loco scutelli, duo mucrones. Palpi corniculati, antice hirti. Lingua spiralis.

1349. PH. PYRALIS *glaucinalis* palpis recurvatis, alis glabris glaucis; strigis duabus flavis arcuatis remotis.

Clerck. *phal. t. 5. f. 4.* Phalæna glaucinalis.

Habitat ad pagos.

DESCR. Media. Alæ cinereo-glaucientes, læves: strigis duabus, flavis, æqualibus & spatio fere æquali remotis, transversis, quarum posterior etiam in pagina inferiore conspicua.

1350. PH. PYRALIS *pinguinalis* palpis recurvatis, elinguis, alis cineratis: margine crassiore nigro-subfasciato.

Phalæna seticornis elinguis, capite bicorni, alis albidis: fasciis marginalibus transversis nigris. Fn. 915.

Roland. act. stockh. 1755. p. 51. t. 2.

Habitat in domibus, vicitans *pinguibus*, Butyro; in ventriculo humano Larva pessima expellenda infuso Lichenis cumatilis.

DESCR. Major. Alis patentibus deflexis, exterioribus obsolete cinereis; margine exteriore variis falcii transversis nigris notato. Alæ Inferiores cinereo-albidae. Frons tentaculis duobus reflexis, villosis; apice vix majore conspicuo obtuso erecto (non recurvo & acuto) nudo, lævi, glabro. Antennæ setaceæ.

1351. PH. PYRALIS *Frumentalis* alis cinerascentibus glabris: fasciis obliquis albidis articulatis.

Habitat in agris *Triticō* consitis.

DESCR. Media. Alæ superiores supra cinereo-glaucientes: fasciis duabus tribusque obliquis, albicantibus, concatenatis e maculis ovatis; margo posticus ciliaris lineolis albidis, alternis. Subtus alæ glaucescentes.

1352. PH. PYRALIS *forficalis* alis glabris pallidis: strigis ferrugineis retrorsum obliquatis lituraque anterioris.

Phalæna seticornis spirilinguis triangularis; alis deflexis flavis: lineis duabus ferrugineis obliquis. Fn. 880.

Act. upf. 1736. p. 24. n. 49. Papilio alis planis pallidis nitidis.

Reaum. gall. I. t. 16. f. 12, 13, 14.

Habitat in *Brassica*.

DESCR. Tota flava est & mediæ magnitudinis seu Tabani majoris. Tibiae posticæ spinose. Alæ deflexæ & quasi forcipata cauda avis a se invicem distantes apicibus, ac parum plicatae: lineæ tres obliquæ retrorsum descendunt in ala superiori, quarum prima vix conspicua; secunda ferruginea definens quasi in maculam ferrugineam ante marginem; tertia linea adhuc longior; margo etiam parum fuscescit. Subtus alæ omnes lineola

352 INSECTA LEPID. PHALÆNA PYRALIS.

neola obsoleta obliqua notata, flavescentes. Lineola unica obliqua in superiori latere, alarum inferiorum.

1353. PH. PYRALIS *verticalis* alis glabris pallidis subfasciatis; subtus fusco undulatis.

Phalæna seticornis spirilinguis; alis patentibus albidis obsolete fusco-undulatis nitidis. Fn. 835.

A& npl. 1736. p. 24 n. 50. Papilio alis planis nitidis albidis: fasciis undulatis.

*Reaum. gall. z. t. 19. f. 1-5.*

Habitat in *Urtica*.

DESCR. Media. Alæ superiores supra pallide flavicantes: strigis aliquot obsoletis, undulatis. Inferiores pallidiores: strigis i. fasciis duabus obsolete fuscescentibus. Subtus omnes alæ flavescentes strigis tribus quatuorve magis obscure fasciis.

1354. PH. PYRALIS *sticticalis* alis griseis: striga marginali flava margineqne nigro ciliari.

Habitat Upſaliæ. Job. Alſtrömer.

DESCR. Antennæ feraceæ, corpore dimidio breviores. Alæ superiores griseo-cinerascentes: maculæ s. puncta duo, nigra, ovata, centro punto albo notata; litura flavescentis ante apicem alæ, margo posticus linea flava ciliis nigricantibus. Inferiores multo breviores, flavescentes. Subtus Alæ fasciis duabus fasciis: anteriori constante e linea curva; posteriore e maculis obsoletis.

1355. PH. PYRALIS *reticularis* alis grisecentibus punctis lineola strigaque flavis, margine ciliari variegato.

Habitat paſsim.

DESCR. Parva. Alæ subconcolores. Superiores supra aliquot punctis flavis sparsis: linea flava oblique longitudinalis ad marginem tenuiorem. Striga transversa, ante apicem flava. Margo ciliaris posticus fasciis lineis alternis, albidis. Subtus fere concolores lineis flavis lucidioribus.

1356. PH. PYRALIS *purpuralis* alis fusco-purpurascens omnibus luteo-maculatis.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Parva. Alæ omnes utrinque obscure purpurascens, maculata anterius punctis aliquot flavescentibus; in medio fascia obliqua, interrupta, albo lutea; ultimo ante marginem posticum striga pallida, tenuissima. Subtus omnes alæ obscuriores & distincte magis pictæ.

1357. PH. TINEA *duplaris* alis superioribus cinereis nebulosis, medio punctis duobus atris parallelis.

Habitat in Sylvis, rario.

DESCR. Major Ph. colonella. Alæ superiores cinereo-nebulosæ, in medio transverse albidiōres; Puncta duo atra, exteriore recurvo, parallela, nec uno ante alterum. Alæ inferiores pallidæ subtus punto centrali fusco. Affinis *Noctis*.

1358. PH. TINEA *colonella* alis oblongis cinereis: punctis duobus nigris ante strigam curvam undatam obsoletam.

Phalæna seticornis spirilinguis nasuta cinerea: puncto utrinque nigro. Fn. 912.

Clerck. phal. t. 3. f. 8. Phalæna colonella.

Habitat in Hortis.

DESCR. Hæc inter maiores Tineas numerari debet. Alæ suprà canæ, parum nebulosæ. Punctum parvum nigrum in medio alæ exterioris utrinque. Alæ Inferiores canescentes non nebulosæ. Lingua spiralis brevissima.

1359. PH. TINEA *sociella* alis oblongis cinereis, antice albidis, postice stigia pallidis.

Phalæna seticornis spirilinguis nasutâ cinerea; alis antice albidis, pone fascia linearis albicante. Fn. 905.

Clerck. phal. t. 3. f. 11. Phalæna sociella.

Habitat in pratis.

DESCR. Pupæ pallidæ intra rete album, oblongum, tenacissimum; plures simul.

Phalæna Tineis fere major. Pedes spinosi; Alæ longæ, cinereæ ad viride vergentes, antice versus basin albidæ, quæ albedo pone lineola nigricante terminatur; fascia albida, linearis, transversa, curva versus apicem; intra apicem lineola undulata, nigra. Alæ inferiores pallido-albidæ, margine fusæ, terminatæ villis longiusculis, albidis, parallelis; Oculi nigri.

1360. PH. TINEA *lutarella* alis corporeaque luteis immaculatis.

Clerck. phal. t. 4. f. 9. Phalæna lutarella.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Similis Phryganeæ. Corpus totum, exceptis oculis, antennis & anterioribus pedibus à latere interiori nigris, luteum. Alæ superiores convolutæ, subtus nigrae; Inferiores supra nigrae.

1361. PH. TINEA *irrorella* alis luteis: superioribus punctis nigris trifariis.

Phalæna alis luteis: punctis minutissimis nigris. Fn. 920.

Act. upf. 1736. p. 25. n. 78. Papilio alis depressis luteis; corpore nigro.

Clerck. phal. t. 4. f. 5. Phalæna irrorella.

Habitat paucim.

DESCR. Corpus nigrum. Alæ majuscule, luteæ, punctis nigris, æquilibus, distinctis, sparsis, sed triplici ordine digestis: in primo ordine puncta 3; in secundo 4; in tertio, qui marginis postici, 5 puncta nigra. Præcedente major: Antennæ subpeccinatae, Os fere elingue. Anus luteus.

1362. PH. TINEA *mesomella* alis supra albis, subtus luteis, interne nigris.

Clerck. phal. t. 4. f. 14. Phalæna mesomella.

Habitat in Gramine.

DESCR Magnitudo præcedentis. Corpus luteum. Alæ superiores glaucae s. cinereo exalbidæ margine flavo; in medio ad marginem exteriorem punctum nigricans & ad marginem tenuiorem medium punctum vix conspicuum; alarum paginae occultatae fuscae sunt.

1363. PH. TINEA *Evonymella* alis superioribus albis: punctis quinquaginta nigris; inferioribus fuscis.

Phalæna seticornis spirilinguis nasuta; alis superioribus albis: punctis nigris; inferioribus fuscis. Fn. 891.

Albin. inf. t. 60 f. A. B. C.

Merian. eur. 2. p. 2. t. 2. in medio intra folliculum.

p. 43. t. 44. in lana.

gallice t. 52. ♂ 94.

Reaum. gall. 2. t. 12. f. 1-9.

Raj. inf. 197. Phalæna parva, alis longis lividis s. plumbeis, exterioribus punctis nigris crebris stictois. obs. bis in eadem pagina).

Az. upf. 1736. p. 26. n. 81. Papilio alis depressis argenteis nigro punctatis.

Habitat in *Evonymo*, cuius folia quotannis ita devastat, ut inde Germanis *Spinnelbaum* dicatur arbor ob hujus filia & retia, quæ nent gregariæ larvæ flavescentes punctis utrinque decem.

DESCR. Extus tota nivea. Alæ superiores punctis atris quatuor aut quinque ordinum longitudinaliter digestis. Caput & Thorax etiam punctis nigris adspersa. Alæ superiores subtus, ut & Inferiores utrinque, plumbeæ sive fuscæ. Venter luteus albus, supra niger. Os proboscide spirali. Antennæ setaceæ. Pedes spinosi.

1364. PH. TINEA *Padella* alis superioribus lividis: punctis viginti nigris, inferne fuscis.

Frisch. inf. 5. t. 6.

Roef. inf. 1. phal. 4. t. 7.

Habitat in Pomonæ arboribus: *Pado*, *Sorbo* &c. ubi Larvæ gregariæ conficiunt quasi linea omnium tenuissima, amplissima, sub quibus commode castra ponunt

DESCR. Signillima præcedenti, at Alæ superiores minus albæ & fere plumbeo colore, punctis nigris paucioribus adspersæ.

1365. PH. TINEA *Sequella* alis superioribus albis: linea communis sinuato repanda maculisque lateralibus difformibus nigris.

Clerck phal. t. 10. f. 14. Phalæna sequella.

Habitat in Sylvis.

DESCR.

*DESCR.* Statura duarum præcedentium. Caput, Thorax, Abdomen & Femora alba. Alæ superiores niveæ: vitta dorsalis longitudinalis communis alba, basi bifida, lateribus varie sanguinata; Maculae laterales nigrae, subcruicatae, variaeque figuræ. Tibiae anticae fuscae. Antennæ nigrae, albo annulatae, utræ etiam plantæ.

1366. PH. *Tinea vittella* alis cinereis: linea dorsali communis nigra, margine postico atro-punctato.

*Clerck. phal. t. 15. f. 10. Phalæna Vittella.*

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Magnitudo cedit Ph. Padellæ. Alæ superiores cinereæ, vix nebulosæ: Linea communis nigra, utrinque repanda, longitudinalis; inargo posticus punctis nigris minutis; linea nigricans, excavata, in ipso apice alæ, ut in Ph. Chenopodiata.

1367. PH. *Tinea pascuella* alis superioribus pallidis: linea maculisque duabus oblongis albissimis.

Habitat in Pascuis.

*DESCR.* Media. Alæ superiores flavicantes: Linea albo-argentea, lata, lanceolata, longitudine fere alæ; ad hujus apicem utrinque inacuta ubi longa utrinque acuta; ante apicem lineola duæ, oblique. Inferiores alæ albidae. Subtus omnes fuscae.

1368. PH. *Tinea pinetella* alis superioribus flavis: maculis duabus argenteis: anteriore oblonga, posteriore ovata.

*Clerck. phal. t. 4. f. 15. Phalæna Pinetella.*

Habitat in Pinetis.

*DESCR.* Media, similima præcedenti. Alæ superiores luteæ, inacuta ærgentea, fere longitudinalis, interrupta in duas; quartum prior oblonga, basi angusta, posterior fere thombea marginè saturatius testacea. Inferiores albidae. Subtus omnes fuscescentes.

1369. PH. *Tinea pratella* alis superioribus albidis: linea albissima postice ramosa: apice striis obliquis.

Phalæna seticornis spirilinguis nasuta albida: linea longitudinali argentea postice ramosa. Fn. 908.

*Clerck. phal. t. 3. f. 14. Phalæna pratella.*

Habitat in lætissimis pascuis cum præcedente.

*DESCR.* Si alæ probe inspiciantur, quæ alias pluineo-albæ, in his observatur linea argentea int' medio, longitudinalis, pone emittens ramos simplices striarum instar.

1370. PH. *Tinea culmella* alis superioribus albidis striatis, terminatis punctis nigris septem ciliisque nitentibus.

Phalæna seticornis spirilinguis nasuta albida: striis longitudinalibus albis punctulo nigro terminatis. Fn. 907.

*Raj. inf. 229. n. 106. Phalæna minor pascuorum germina proboscide, alis oblongis, cum sedet circumvolutis, exteriori-*

terioribus ex argenteo lutescentibus vel argenteis vel plumbeis.

*Reaum. inf. 1. t. 17. f. 13, 14.*

*Act. upf. 1736. p. 26. n. 82.* Papilio alis depressis cuneiformibus oblongis striatis.

Habitat copiosissima per totam æstatem in lætissimis *Pratis* roriferisque graminosis, insidens gramine capite semper deorsum spectante; inter omnes in pratis nostris frequen-tissima

*DESCR.* Corpus oblongum, lineare; alis circumvolutis albo-cinereis cum, striis concavis pallidioribus longitudinalibus, terminatis ciliis albis nitidissimis; intra harum striarum fines & marginem punctorum nigricantium, minimoruim ordo transversus, Pedes spinosi.

1371. PH. TINEA *nemorella* alis albidis incurvatis: superiori- bus puncto nigro.

Habitat in *Xylosteo*.

*DESCR.* Similis quatuor præcedentibus: punctum ad marginem alæ ex-terioris interioreum.

1372. PH. TINEA *rhomboidella* alis fuscis macula rhombea nigra.

Phalæna nasuta fusca: macula utrinque nigra, Fn. 910.  
Habitat in Sylvis.

1373. PH. TINEA *trigonella* alis fuscescentibus: macula com- muni dorsali duplice alba trigona.

Phalæna nasuta nebuloso-fusca: macula duplicito-triangu- lari dorsali alba. Fn. 911.

Habitat in Juniperetis Fahlunæ.

*DESCR.* Parva. Alarum superiorum macula communis dorsalis alba, trigona, apice posteriora spœstante, quasi ex duobus triangulis con- structa, anteriore scilicet ad medium posteriori immersa; in sequente vero hæ maculæ distinctæ sunt.

1374. PH. TINEA *capitella* alis nigris: maculis tribus flave- scentibus, capite luteo.

*Uddm. diff. 79.* Phalæna nasuta, alis aureo fuscis: fasciis tribus argenteis: media interrupta.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Similis bracteellæ, sed Caput lana helvola vestitum. Alæ su- periores nigræ: in singulis maculæ tres, albido flavescentes, quarum prima coit cum opposita in fasciam exterius angustiorem; secunda ad marginem exteriorem; tertia ad marginem inferiorem, coadunata cum opposita; margo posticus flavescentis.

# INSECTA LEPID. PHALÆNA. TINEA. 357

1375. PH. TINEA *foenella* alis fuscis : maculis albissimis : anteriore falcata, posteriore reniformi.

*Clerck. phal. t. 2. f. 13.* Phalæna foenella.

Habitat in Pratis.

DESCR. Magnitudo Ph. Cynosbatellæ. Alæ superiores fuscæ : macula anterior major, alba, curva, anteriore apice tangens marginem interiorem, altero medium alæ ; Macula altera alba, ad angulum ani.

1376. PH. TINEA *ramella* alis cinereo-albidis : arcu communis fusco.

Habitat intra *Quercus ramosa*.

DESCR. Statura Ph. unguicellæ ; alarum apices simili modo excurrunt in dentem. Superiores cinereæ macula saturatiore communi versus basin ; postice alæ fuscescentes margine crassiore nigricante, albo striato.

1377. PH. TINEA *nisella* alis superioribus cinereo-nebulofis : macula communi ovata nigra.

*Clerck. phal. t. 12. f. 6.* Phalæna nisella.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Antennæ breviores. Alæ superiores cinereæ, fusco variegatæ macula medii marginis interioris nigra, lanceolata, postice angustiore, quæ cum opposita constituit ovatam ; margo posticus punctis nigris, Inferiores livide cinereæ, diaphanæ, immaculatae.

1378. PH. TINEA *Salicella* alis cærulecenti-cinereis : area dorsali albidis punctis, thorace cristato.

*Roes. inf. 1. phal. 4. t. 9.*

Habitat in *Salice*; Contortrix.

DESCR. Media, magnitudine fere Ph. Evonymellæ. Alæ superiores fusco-nebulosæ, dorso albido ; ad hujus albedinis latera punctum atrum in singula ala ; ad apices maculæ nigricantes. Thorax cristatus est.

1379. PH. TINEA *Cynosbatella* alis griseis apice albidis, thorace cristato.

*De Geer inf. 1. t. 34. f. 4, 5.*

Habitat in *Rosæ* Gemmis.

DESCR. Media. Alæ superiores fusco-cinerascente nebulosæ, postice albidae, sed ipso apice cinerascente ; ad angulum ani punctum nigricans in plerisque.

1380. PH. TINEA *cinctella* alis nigris : superioribus fascia linearis argentea transversa.

Habitat in *Populo*? Joh. Alström.

DESCR. Magnitudo Culicis. Alæ superiores oblongæ, atræ ; in medio fascia nivea. Inferiores setacea, ciliares. Antennæ albo undulatae.

358 INSECTA LEPID. PHALÆNA. TINEA.

1381. PH. TINEA *Petiverella* alis subgriseis: litura dorsali flava apiceque punctis tribus nigris.

*Clerck. phal. t. 12. f. 11.* Phalæna Petiverella.

Habitat in Lucis.

DESCR. Minuta. Alæ superiores fusco-griseentes; in medio dorsi macula albida, transversa, subrhombica (sæpe lineola in medio maculæ, transversa, fusca); ad marginem crassiorem prope apicem lineolæ tres, albidae, transversæ.

1382 PH. TINEA *unguicella* alis cinereis subfasciatis apice incurvato-acuminatis: margine exteriore postice transverse albo-striatis.

Phalæna seticornis spirilinguis; alis superioribus pone unguiculo curvo terminatis. Fn. 890.

*Clerck. phal. t. 12. f. 7.* Phalæna unguicella.

Habitat in Pratis.

DESCR. Magnitudo muscae. Antennæ nigrae, filiformes. Corpus totum fulco-nigricans; alis superioribus punctis lunulato-linearibus, transversis adspersis; hinc ex albo & nigro quasi undulatae sunt alæ, apex alarum superiorum sive margo exterior & crassior definit in unguiculum curvum sive arcuatum sursum; margo alarum exteriorum crassior, magis niger, lineolis curvis albisque pulchre variegatus.

1383. PH. TINEA *Mellomella* alis canis postice purpurascensibus striga alba, scutello nigro apice candido.

*Swamm. bibl. I. t. 26. f. 2.*

*Roes. inf. app. 242. t. 41.*

Habitat in Apum alvearibus, angiportus cylindricos struens, quibus favos penetrat & destruit; accedit Holmiam 1760 apibus e Germania adductis.

1384. PH. TINEA *cucullatella* alis albido-cinereis: antice striæ nigrae recurvatae

*Roes. inf. I. phal. 4. t. II.*

Habitat in Sorbo aucuparia intra folliculum conicum pilosum.

DESCR. Media. Alæ superiores pallide caescentes; antice arcu nigro recurvo notatae; dein duabus tribusque strigis fuscis albidisque undatis. Inferiores albidentes. Subitus obscure cinerascentes puncto centrali in inferioribus.

1385. PH. TINEA *Arbutella* alis sanguineis: fasciis argenteis tenuissimis.

Habitat in Arbuto Uva urfi.

DESCR. Magnitudo culicis; statuta Noctuæ. Alæ superiores fusco reticulatae s. nebulosæ colore rufo s. ferrugineo. Inferiores glaucescentes margine ciliari rufo.

1386. PH. TINEA *Pruniella* alis griseis : margine interiore linea longitudinali nivea medio interrupta.

Habitat in *Prunetis*.

DESCR. Magnitudo feminis secales. *Alæ superiores* griseæ : area a fronte ad apices fere alarum longitudinalis, communis, alba, medio interrupta. Caput & Thoracis tergum nivea. Pedes albi. *Antennæ* corpore breviores, albo fuscoque annulatae.

1387. PH. TINEA *curvella* subnivea, alis arcu medii dorsi cincereo recurvo.

Habitat in *Pomariis*.

DESCR. Magnitudo feminis secalis ; tota nivea, pulvere cinereo rario re temere adspersa : Alarum arcus communis cinereus, lunatus, recurvatus, in medio dorsi, nec margines laterales tangens ; apices alarum compressæ, cinerascentes. *Antennæ* corpore paulo breviores, albo fuscoque annulatae.

1388. PH. TINEA *gemmella* alis nigro albo argenteoque nebuloſis, capite albo.

Clerck. phal. t. 10. f. 10. Phalæna gemmella.

Habitat intra *Quercus* folia, subcutanea.

DESCR. Minuta, albicans, nigricante irrorata. *Alæ superiores* fascia fusca recurvata ; ad angulum ani litura fusca.

1389. PH. TINEA *picarella* alba, alis superioribus linea maculisque nigris, thorace puncto atro pone oculos.

Habitat in lucis.

DESCR. Magnitudo Culicis. Caput, Thorax & *Alæ superiores* niveæ ; ha linea longitudinali nigra oblique inæquali ; puncta duo nigra supra lineam ; macula nigra sub linea. *Subtus* tota fusca. *Antennæ* corpore dimidio breviores. Similis Ph. gemmella.

1390. PH. TINEA *Xylostella* alis cinereis : vitta dorsali communi alba dentata.

Phalæna nasuta cinerea dorso vitra alba. Fn. 909.

Habitat in *Lonicerae Xylostei* foliis.

DESCR. Minuta, oblonga, compressa subcinerea : *Alæ* vitta communi dorsali alba utrinque dentata. *Antennæ*, dum sedet, rectæ antrorsum protendit.

1391. PH. TINEA *Swammerdamella* antennis longissimis, alis flavescensibus pallidis immaculatis.

Clerck. phal. t. 12. f. 1. Phalæna Swammerdamella.

Habitat Holmiæ.

DESCR. Media. *Alæ* omnes livido-flavescentes. *Antennæ* longissimæ, albicantes,

1392. PH. TINEA *Reaumurella* antennis longissimis, alis nigris extrorsum deauratis.  
*Phalæna nasuta nigra*, alis exterioribus deauratis, antennis corpore longioribus. *Fn.* 902.  
*Clerck. phal. t. 12. f. 2.* *Phalæna Reaumurella.*  
*Habitat in Salice.*  
*DESCR.* *Corpus totum nigrum, Frons alba, Antennæ longissimæ.*
1393. PH. TINEA *Degeerella* antennis longissimis, alis atris: fascia flava.  
*Clerck. phal. t. 12. f. 3.* *Phalæna Degeerella.*  
*De Geer inf. t. 32. f. 13.*  
*Uddm. diff. 78.* *Phalæna nasuta aurea, antennis corpore quadruplo longioribus.*  
*Habitat copiose ad acidulas Sætrenses Westmanniæ.*  
*DESCR.* *Media, Alæ superiores nigricantes flavo aurato striatæ: fascia in medio, transversa, utriusque margine nigro argenteo. Antennæ nigricantes, corpore plus quam quadruplo longiores, adeo tenaces ut iis facile apprehendatur.*
1394. PH. TINEA *Robertella* antennis longissimis albis, alis fuscis, angulo ani albo.  
*Habitat Upfaliæ.*  
*DESCR.* *Similis Ph. Swammerdamellæ, sed paulo minor. Alæ fuscae l. nigrae, vix manifeste cinereo-inauratae, macula alba ad angulum ani.*
1395. PH. TINEA *Listerella* antennis mediocribus albo subannulatis, alis fuscis.  
*Habitat in Pomariis.*
1396. PH. TINEA *Frischella* antennis mediocribus concoloribus, alis fusco auratis.  
*Habitat in Pomariis.*
1397. PH. TINEA *Mouffetella* antennis brevioribus albo annulatis, alis lividis: atomis oblongis fuscis.  
*Habitat in Pomariis.*
1398. PH. TINEA *Albinella* alis fuscis: linea aurea retrorsum arcuata.  
*Phalæna nasuta fusca: linea aurea oblique transversali. Fn. 901.*  
*Habitat in Lucis.*  
*DESCR.* *Alæ superiores fuscae; linea unica oblique transversalis cruribus retrorsum spectantibus,*

1399. PH. TINEA *Bonnetella* alis albis: lineis duabus argenteis, posticisque undatis.

Phalæna nasuta alba, alis exterioribus linea dupli fuscocargentea, postice vago undulatis. Fn. 903.

Habitat in sylvis acerosis.

DESCR. Minima, magnitudine culicis, nivea. Alæ exteriore ad basin utrinque lineolis duabus longitudinalibus fuscocargentis; pone characteribus vagis nigro-argentis obsoletis notatae.

1400. PH. TINEA *Leuwenhoekella* nigra, alis superioribus testaceis: fasciis duabus macula lineaque atro-argentis.

Habitat in Nemoribus.

DESCR. Parv. Tota nigra. Alæ superiores obscure testaceæ; Fascia nigra versus basin; fascia nigra in medio; macula transversa nigra ad regionem ani; linea obliqua ante apicem; omnes nigrae in argenteum colorem mutandæ; cæterum alæ maxime ciliatae sunt.

1401. PH. TINEA *Goedartella* alis auratis: fasciis duabus argenteis: priori antrorsum, posteriore retrorsum arcuata.

Clerck. phal. t. 12. f. 14. Phalæna Goedartella.

Habitat in *Alnetis*, pedibus prioribus quatuor insidens, posterioribus duobus protensis.

DESCR. Minuta. Alæ fuscoc-aureæ; basis alæ alba; fascia alba antrorsum recurvata; macula ad marginem crassiorem; fascia retrorsum curvata alba; macula alba ad angulum ani.

1402. PH. TINEA *Merianella* alis nigris: fasciis tribus argenteis transverse divaricatis.

Phalæna nasuta nigra: lineis argenteis transversis tribus. Fn. 900.

Act. upsi. 1736. p. 26. n. 84. Papilio alis depresso oblongis argenteis: lineis tribus transversis aureis: media bifurca.

Habitat in Lucis.

DESCR. Minima, oblonga, nigra, semicylindracea. Alarum margo tenuior villis terminatur, ut in omnibus hujus ordinis. Lineæ tres transversales argenteæ alas diltingunt, ita tamen, ut interjacens nigrum non latius sit lineis argenteis, quarum prima medietas retrorsum, ultima antrorsum flexa; intermedia vero transversalis, utrinque extremitates versus bifida. Si asservatur Phalæna hæc mortua, perit nigredo, & ejus loco deauratus prodit color.

1403. PH. TINEA *Wilkella* alis nigris: fasciis quatuor argenteis arcuatis: secunda recta.

Phalæna nasuta nigra: lineis argenteis transversis quatuor. Fn. 899. It. gotland. 260.

Habitat in *Hoburgo* Gotlandiæ, cōpōsisimē supia terram exsiliens.

*DESCR.* Est inter minimas hujus ordinis, oblonga, nigra, semicylindracea. *Caput & Antennæ* albæ. *Alarum margo* tenuior villis terminatur. *Lineæ* quatuor transversæ argenteæ alas distinguunt, quarum prima medierate retrorsum flexa, secunda recta, tertia & quarta medie-

tate antrorsum flexa.

1404. PH. TINEA *Lyonnetella* alis flavis: fasciis quatuor argenteis: tertia superne bifida.

Phalæna nasuta flava planiuscula: lineis quatuor transversis fusco argenteis. *Fn.* 904.

Habitat in sylvis.

*DESCR.* Magnitudo muscæ; lineæ 4 transversæ fusco-argenteæ, quarum tertia introrsum bifida: ultima in ipso margine postico alarum.

1405 PH. TINEA *Rhediella* alis nigris apice fulvis: strigis in-

terruptis argenteis.

*Clerck. phal. t. 12. f. 12.* Phalæna Rhediella.

Habitat in Lucis.

*DESCR.* Alæ superiores nigræ s. subviolaceæ, postice retusæ, fulvæ, lineis transversis quatuor argenteo-aureis & duabus superioribus. Inferiores nigræ margine albo. *Antennæ* breviores.

1406. PH. TINEA *Roesella* alis nigro-auratis: punctis novem argenteis convexis submarginalibus.

*Clerck. phal. t. 12. f. 13.* Phalæna Roesella.

*De Geer inf. I. t. 30. f. 10-12.*

*Frisch. inf. 3. p. 31. t. 4.*

Habitat in *Mali* foliis, subcutanea.

*DESCR.* Minuta. *Corpus* nigrum. *Alæ superiores* luteæ; macula oblonga nigra ad basin, fascia transversa nigra; margo exterior & interior niger. Omnis niger color in hisce alis disparsens transit in argenteum nitidissimum.

1407. PH. TINEA *Rajella* alis auratis: punctis sex argenteis: secunda tertiaque connatis.

*De Geer inf. I. t. 31. f. 11-12.*

Habitat in *Alni* foliis subcutanea.

*DESCR.* Minuta, Ph. Goedartellæ similis. *Alæ superiores* fuscescentes s. auratae, utroque latere maculatis 3 albis s. argenteis maculis, quarum secunda fere transversa est.

1408. PH. TINEA *Linneella* alis fulvis: punctis tribus argenteis elevatis.

*Clerck. phal. t. 12. f. 8.* Phalæna Linneella.

Habi-

## Habitat in Pomariis.

DESCR. Statura Ph. Rösellæ. Alæ ambitu nigro; disco fulvo, in quo puncta tria, hemisphærica, argentea, valde convexa, & præterea ad marginem inferiorem obsoleta lineola argentea interrupta. Antennæ nigrae, apice albæ.

1409. PH. TINEA Schaefferella alis nigris disco flavis: striga lineisque duabus longitudinalibus punctisque tribus argenteis.

*It. Scan.* 112. Phalæna Fagi.

Habitat in Fagi foliis subcutanea, omnia saepe folia commaculans.

DESCR. in Itinere Scanico 112.

1410. PH. TINEA Jungiella alis fuscis: maculis septem albis duplicatis: tertia fasciali ultimaque simplici.

Phalæna nasuta nigra, alis superioribus lunula alba linea media nigra. *It. W:goth.* 141.

*Clerck. phal. t. 12. f. 9.* Phalæna Jungiella.

Habitat in Nemoribus.

DESCR. Alæ griseo fuscae: Maculæ omnes albæ, excepta ultima e lineolis duabus parallelis; Maculæ due in medio oppositæ; terria a margine exteriore ad angulum alæ adscendens in fasciam obliquam; quarta quinta & sexta ad marginem crassiorem pone fasciam. Lineola s. Puncta simplicia ad marginem posticum; Margo posticum ater; horum punctum primum dorsale connexum suo opposito, lunulam retrorsum archatam refert; hæc lunula vix aurea s. argentea & prioribus paullo longior.

1411. PH. TINEA Clerckella alis argenteis postice fusco-aureatis caudatis; ocello terminali atro.

Habitat Holmiæ. *Car. Clerck.*

DESCR. Minima facile omnium. Alæ superiores argenteæ, ad apicem fusco-auratae, substriatae & caudatae cum ocello rotundo atro. Antennæ mediocres..

1412. PH. TINEA Harrisella alis aureo-argenteis apice obtuse ustulato subocellato.

Habitat in Lucis. *T. Bergman.*

DESCR. Minus elongata & brevior, minuta. Alæ auro & argento variatae, apice obtusa, nec ut præcedentis acuminatae; in ipso apice color ustulatus subfuscus, subocellatus, puncto atro.

1413. PH. TINEA Granella alis albo nigroque maculatis, capite albo.

*De Geer. act. stockb.* 1746. p. 48.

*Reaum. ins.* 3. t. 20, f. 14, 16,

*Roes. ins.* 1. *phal.* 4. t. 12.

Habi-

Habitat in Granorum *Frumenti* acervis, grana consumens.  
 DESCR. Parva. *Alæ superiores* lividæ maculis atris albisque, ita ut albæ maculæ s. lituræ semper nigræ approximatæ. *Inferiores* plumbeæ, margine tenuiore maxime ciliatæ. *Frons* albis villis, *Oculi* nigri; pone oculos lineola s. punctum atrum ad exortum alarum.

1414. PH. TINEA *tapetzella* alis nigris postice albidis, capite niveo.

Phalæna seticornis spirilinguis nasuta nigra, capite niveo, alis pone albidis. Fn. 892.

Raj. inf. p. 204. n. 98. Tinea vestivora major, alis oblongis acutis: exterioribus ad scapulas nigris antibus, inferius albentibus; interioribus fuscis sive cinereis.

Reaum. inf. 3. t. 20. f. 2-4.

Habitat in *vestimentis*, *pellibus*, *tapeziis* & omnibus a lana vel villis animalium confectis; præsertim delectatur *vestimentis Rhangiferinis* Lapporum.

DESCR. Larva facit cuculos cylindraceos e villis, quos rodit: hinc hic cuculli gaudent eodem colore ac vestimenta, quæ consumit, si hæc variegata sunt, fit & cucullus variegatus; incedit cauda elevata, quam tegit cueillus, in quo se recondit terrefacta; cum crescat quotidie crassitie, evadit & quotidie cucullus angustior, hinc a latere diffècatur & lacinia nova ampliatur; hinc si varie coloratas velles illi objicias, variegatus erit cucullus instar histrionis.

Tota oblonga, angusta, versus apicem alæ elevatae. Caput album. *Alæ superiores* nigræ, sed a medio ad apicem albæ, albedine punctis vix conspicuis fuscis parum inquinata. *Alæ inferiores* cinereæ. Corpus & artus nigra. Antennæ tetaceæ.

1415. PH. TINEA *pellionella* alis canis medio puncto nigro, capite subgriseo.

Phalæna nasuta cana puncto nigro in medio alarum, capite subgriseo. Fn. 894.

Reaum. inf. 3. t. 12. f. 12-16.

Habitat in *vestimentis* villosis, quæ corrodit & depilat intra cucullum latitans, uti prior.

1416. PH. TINEA *sarcitella* alis cinereis, thorace utrinque puncto albo.

Phalæna seticornis spirilinguis nasuta cinerea, thoracis puncto utrinque albo. Fn. 893.

Rœf. inf. 1. phal. 4. t. 17.

Reaum. gall. 3. t. 6. f. 9-10.

Habitat in *Vestimentis*, cujus larva cylindros conficit, iisque se vestit & occultat, ut duas præcedentes.

DESCR. Parva est; *Alæ* cinereæ. *Abdomen*, pedes, caput & tota pars inferior albida, ad solem instar metalli nitens. *Antennæ* breviores. *Oculi* nigri.

1417. PH. TINEA *vestianella* alis cinereis costa albis, apicibus adscendentibus plumosis, palpis recurvatis.

Habitat in *Vestimentis*, quæ æstate rodit & destruit more præcedentium.

DESCR. Alæ superiores lanceolatae, margine crassiore niveo, glaucæ atomis nigris, Inferiores subulatae, plumbei coloris, omnes latissime ciliatae. Palpi prominentes, recurvi. Antennæ breviores, albo annulatae.

1418. PH. TINEA *Pomonella* alis nebulosis: postice macula rubra aurea.

Frisch. inf. 7. t. 10.

Rœf. inf. 1. phal. 4. t. 13.

Reaum. inf. 2. t. 40. f. 9. 10.

Habitat intra *Poma* & *Pyra*.

DESCR. Magnitudo Ph. Evonymellæ. Tota cinereo fuscoque nebulosa; dignoscenda macula magna obscura aureo lucente, -ad posteriora alæ versus angulum ani.

1419. PH. TINEA *Strobilella* alis fuscis argenteo-undatis; inferioribus fuscis margine albo.

Phalæna nasuta fusca albido undulata, alis inferioribus fuscis margine albis. Fn. 914.

Clerck. phal. t. 12. f. 10.

Habitat in *Abietis* Strobilis, exiens primo vere, frequens.

DESCR. Minuta. Alæ fuscescente griseoque nebulosæ margine crassiore pluribus albis striis transversis notatae. Inferiores fuscae margine postico & tenuiore albo.

1420. PH. TINEA *Turionella* alis griseo albis nitidulis, thorace luteo.

Habitat intra *Pini sylvestris* Turiones.

DESCR. Magnitudo Ph. Evonymellæ. Alæ ferrugineo alboque nebulosæ: albedine quasi e variis inæqualibus fasciis argenteis connexa.

1421. PH. TINEA *dodecella* alis griseis pallido fasciatis: punctis trium parium fuscis.

De Geer inf. 1. t. 22. f. 22, 23.

Habitat intra *Pini sylvestris*. Turiones, ut præcedens.

1422. PH. TINEA *Cembrella* alis fuscis atomis albidis irroratis.

Habitat in *Pinu sylvestri*; larvæ intra folliculum scabrum, more Ph. Pelliōnellæ.

DESCR. Minor musca domestica. Alæ obtuse, fasciæ punctis albidis cōspersæ, unde cinereæ adparent.

1423. PH. TINEA *Resinella* alis fuscis: fasciis-cinereo argenteis.

De

*De Geer* inf. 1. t. 33. f. 12, 13.

*Frisch.* inf. 10. t. 9.

Habitat intra *Pini* Resinæ glomerem exsudantem e ramis.

DESCR. Simillima Ph. Pomonellæ. Alæ cinereæ, nigro transversim undulatae; albedo argentea adpareret.

1424. PH. TINEA *Tædella* alis fuscis: fasciis tribus maculisque totidem albis bifidis.

*Clerck. phal.* t. 10. f. 13.

Habitat in *Abiete*. Claud. Alströmer.

DESCR. Parva. Alæ breviores, obtusiores: fascia prima in basi, tertia in medio alæ, fracta; posterius maculæ tres albæ, bifidæ, quarum duæ ad marginem inferiorem.

1425. PH. TINEA *Lappella* alis pallidis puncto nigro apice adscendentibus.

*Renstr. Act. Stockh.* 1752. p. 66.

Habitat in *Arctii Lappæ*, capitulis intra semina. Renström.

DESCR. Magnitudo Ph. tapezella. Alæ oblongæ, pallidae testacea s. flavicantes, postice paullo latiores, atomo uno alterove nigro adpersæ. Antennæ breviores. Palpi adscendententes.

1426. PH. TINEA *bracteella* alis nigris: antice maculaque marginali luteo-aureis.

*Clerck. phal.* t. 12. f. 4. Phalæna bracteella.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Magnitudo vix muscae. Alæ nigrae: superiores antice,  $\frac{1}{3}$  totius: aureo flavæ; Macula flava ad marginem exteriorem versus posteriora. Frons flava. Antennæ breves.

1427. PH. TINEA *stipella* alis nigris: maculis tribus sulphureis.

*Clerck phal.* t. 12. f. 5. Phalæna stipella.

Habitat ruri.

DESCR. Magnitudo Culicis. Alæ superiores oblongæ, nigrae: macula flava ad basin interiorem; alia in medio, latior, non attingens marginem exteriorem; alia rotunda ante apicem, non tangens marginem tenuiorem.

1428. PH. TINEA *Corticella* alis griseis margine aureo-punctatis, postice trilunatis.

Habitat intra corticem arborum Pomonæ.

1429. PH. TINEA *tertianella* alis cinereis: fasciis obscurioribus sesquitertiis.

Habitat in Prædiis.

1430. PH. TINEA *tesella* alis nigris: fasciis duabus albis remotissimis tessellatis.

Phalæna feticornis spirilinguis nasuta nigricans: fasciis duabus albis tessellatis. *Fn.* 897.

*DESCR.* E maximis hujus ordinis hæc est, tota nigro-fusca; fascia alba, linearis duplex alas superiores transversim secat, quarum altera juxta basin, altera versus alarum apicem; harum singula alba est, sed maculis parvis nigricantibus quasi tessellata.

1431. PH. TINEA *argentella* tota argentea immaculata.

Habitat in *Abiete*.

*DESCR.* Minuta. Tota cum alis & artubus argentea, nitidissima. Alæ inferiores lanceolatae, utrinque ciliatae. Antennæ corpore breviores; fusco annulatae. Oculi nigri.

1432. PH. TINEA *Calthella* atra, alis superioribus totis aureis, capite ferrugineo.

Habitat in Floribus *Calthæ* frequens.

*DESCR.* Minuta. Antennæ vix corporis longitudine. Alæ superiores certo situ totæ aureæ apparent: alias atræ. Differt a Ph. Frischella Antennis basi minime auritis; Capite ferrugineo; Corpore quadruplo minore.

1433. PH. TINEA *pedella* alis superioribus linearibus luteis: fasciis tribus fuscis, pedibus posticis transverse extensis.

Habitat in *Alni* foliis subcutanea. T. Bergman.

*DESCR.* Minuta. Caput & Thorax lutea. Alæ lineates luteæ: fasciæ tres fuscae, æquali spatio remoræ, quarum prima in ipsa basi. Pedes postici horizontaliter extensi, spinosi. Antennæ mediocres.

1434. PH. TINEA *ustella* alis superioribus nigris: margine inferiore longitudinaliter cinereo.

*Clerck. phal. t. 3. f. 13.* Phalæna *ustella*.

Habitat in *Sylvis* paludosis.

*DESCR.* Antennæ corpore dimidio breviores. Alæ superiores nigrae, margine exteriore lato, longitudinaliter cinereo. Inferiores fusce.

1435. PH. TINEA *parenthesella* alis superioribus testaceis linea longitudinali albida.

Habitat Holmiæ.

*DESCR.* Magnitudo culicis. Alæ circum corpus convolutæ, angustæ, testacea; singulis linea alba longitudinalis a basi ad medium excurrentes, ut insectum linea utrinque alba notatum adpareat. Pedes longitudine corporis.

1436. PH. TINEA *elongella* alis linearibus testaceis, antennis longitudine corporis.

Habitat in Smolandia. *Car. Blom.*

*DESCR.*

*DESCR.* Magnitudo Culicis. *Alæ superiores* luteo-testaceæ, lineares, margine interiore longitudinaliter pilosissimæ. *Inferiores* palbidæ, subulatae; utrinque ciliato-villosæ. *Antennæ* longitudine corporis.

1437. PH. *Tinea punctella* alis superioribus linearibus testaceis: punctis quatuor fuscis.

Habitat in *Pomariis* sedens innititur apici alarum. T. Bergman.

*DESCR.* Simillima præcedenti; sed *Alæ superiores* notatae punctis quatuor, fuscis, æquali spatio remotis,

1438. PH. *Tinea bicostella* alis lanceolatis cinereo-albidis: costa longitudinali fusca margine niveo.

Clerck. *phal.* t. 3. f. 15.

Habitat Upsaliæ. Claud. Alströmer.

*DESCR.* *Palpi* fuscæ, longi. *Antennæ* corpore dimidio breviores. *Alæ* albidæ; linea longitudinalis latiuscula fusca ad marginem exteriorem; margo niveus lineæ parallelus: *Puncta* duo s. tria nigra minima juxta lineam fuscam in disco.

1439. PH. *Tinea fuscella* alis fusco - cinereis: superioribus punctis duobus anoque subtus macula nigra.

Habitat in domibus.

Litura fusca versus apicem alæ superioris.

1440. PH. *Tinea minutella* alis nigricantibus: maculis transversis ferrugineis.

Phalæna seticornis nasuta nigra: maculis quatuor transversis ferrugineis. It. scän. 216.

Habitat in domibus Scaniæ.

*DESCR.* Magnitudo Culicis, nigra. *Alæ superiores* nigrae: maculis duabus ferrugineis: interiore paullo anteriore, unde compositis alis in tergo angulus ferrugineus apparet.

1441. PH. *Tinea mercurella* alis albido cinereis subfasciatis medio puncto albo & cincto.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Culice paulo major. *Alæ* subcinereæ: stigis duabus, repandis, remotis, fuscis. Punctum vix conspicuum nigricans in medio alæ: Ocellus niger pupilla alba s. & signum nigrum, ad marginem exteriorem alæ, versus posteriora.

1442. PH. *Tinea Populella* alis canescensibus fusco nigroque nebulosis, tibiis posticis pilis flavescensibus.

Habitat in *Populo tremula*, Phalæna trunco insidens. Joh. Alströmer.

*DESCR.* Parva, statura præcedentis. *Antennæ* breves. *Alæ* inferiores plumbeæ.

1443. PH. TINEA *porrectella* alis albicantibus, antennis porrectis mediocribus, palpis recurvis.

*De Geer inf. I. t. 26. f. 15, 16.*

Habitat in Plantis *Tetradynamis*.

DESCR. Magnitudo culicis; tota albicans, linearis. Antennæ longitudo corporis, albo annulatis, porrectis & in unam approximatis. Alæ inferiores acuminatae.

1444. PH. TINEA *leucatella* alis nigricantibus: fasciis duabus: posteriore obsoletiore capiteque albis, palpis reflexis.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Media. Alæ superiores nigrae: Fascia anterior alba, semi-orbicularis s. antice transversa, postice rotundata; posterior fascia angusta, alba sed commaculata. Caput totum niveum, ut etiam Palpi corniformes recurvi. Antennæ breviores, nigrae, albo annulatae.

1445. PH. TINEA *cinerella* alis fusco cinereis immaculatis nitidulis, palpis corniformibus.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Corpus totum cinereum una cum aliis. Palpi clavati recurvi, apicibus fetaceis corniculati.

1446. PH. TINEA *scabrella* alis albis striatis dorso nigro-striatis exasperatis, palpis spinosis.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Simillima sequenti. Alæ oblongæ, striatae striis versus marginem dorsalem nigris, ut margo dorsalis fere niger adpareat. at in hac parte eminent striæ squamis erectis, ut sic valde seabra passim evadat; Inferiores fuscescentes. Antennæ albæ, mediocres. Palpi portecti & in horum dorso spinae.

1447. PH. TINEA *asperella* alis albidis: macula communis fusca, apicibus nigro punctatis retusis.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Tota supra alba cum umbra grisecente in medio alatum; in medio tergi alarum macula communis rhombica, nigra, exasperata squamis recurvatis; postice alæ admodum retuse s. emarginatae margine fuscō; inferius acutæ, superne lobo rotundato cum puncto uno altero ante emarginaturam. Antennæ breviores. Palpi portecti.

1448. PH. TINEA *serratella* fusca, tibiis posticis barbatis corpore longioribus.

Habitat in *Pyri* foliis intra cœullum cristatum D. G. Solander.

DESCR. Tota fusco-nigricans, culice minor. Antennæ mediocres, albo annulatae. Alæ abdomine longiores. Pedes postici ipsiis alis longiores. Tibiæ hujus postice pilosa, non vero femorata.

370 INSECTA. LEPID. PHALÆNA. TINEA.

1449. PH. TINEA *Juniperella* alis cinereis: striga alba undulata punctisque quatuor nigris.

Habitat in *Junipero*, conne&etens rāmulos. -C. Clerck.

DESCR. Mediocris. Alæ superiores cinereæ punctis nigris quatuor, absque ordine digestis; postice striga alba undata; margo posticus punctis nigris; inferiores albidae.

1450. PH. TINEA *gelatella* alis cinereis: superioribus linea albida punctisque duobus nigris remotis; femina hemiptera.

Clerck. phal. t. 8. f. 3. Phalæna galatella.

Habitat in *Chærophyllo sylvestri* sub fine mensis defoliatio-nis.

DESCR. Majuscula. Alæ Superiores fusco canescentes linea latiore, al-bida, longitudinali, interrupta duobus punctis nigris, æquali spatio remotis; Inferiores livide cinereæ. Antennæ breviores. FEMINA alis duabus cinereis lanceolatis vix corporis longitudine, villosis, acutis, utroque margine notatis punctis tribus nigris.

1451. PH. TINEA *Lichenella* femina aptera lævi nigra.

Habitat in *Lichene candelario* super muros templi Waxa-lensis; Larva habitat intra folliculum.

DESCR. Femina magnitudine vix Cimicis, nigra, tota glabra. Mas re-pertus non fuit, nec e Larvis, cum feminis, prodiit.

1452. PH. ALUCITA *monodactyla* alis patentibus linearibus indivisis.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Alæ cinereæ: Superiores lineares, indivise, subtus canalicula-tæ, sub quibus inferiores absconduntur; Inferiores fere tripartitæ: rāmo postico usque ad basin diviso.

1453. PH ALUCITA *didactyla* alis patentibus fissis fuscis: strigis albis: anticis bifidis; posticis tripartitis.

Habitat in *Geo rivali*.

DESCR. Alæ superiores fusco-ferrugineæ, semibifidæ, acuminatæ: strigæ s. maculæ aliquot albæ; margo posticus sub apice albus. Inferiores al-bido maculatæ. Pedes albo-annulati.

1454. PH. ALUCITA *tesseradactyla* alis patentibus fissis ci-nereo-nebulosis, posticis fuscis.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Alæ superiores cinereo fuscoque nebulosæ, fissura connivente; Inferiores fuscæ, nec maculatæ, tetrada&ctylæ.

1455. PH. ALUCITA *tetradactyla* alis patentibus fissis palli-dis: lineis albis.

Habi-

Habitat inter frutices.

DESCR. *Alæ superiores* lineares: linea alba, longitudinali, ut foli margines obscuriores, immaeulati. *Pedes* albi.

1456. PH. ALUCITA *ptero-dactyla* alis patentibus fissis testaceis: puncto fusco.

Habitat in nemoribus.

DESCR. *Alæ superiores* ferrugineo-testaceæ, bifidæ, sed fissura, nisi flectantur, non apparente; in medio punctum nigricans.

1457. PH. ALUCITA *penta-dactyla* alis patentibus fissis quinquepartitis niveis: digito quinto distincto.

Habitat in Gotlandiaë Hoburg. *Petr Bergius M. D.*

DESCR. Major reliquis nostratis & tota nivea. *Thorax* fasciculis tribus. *Alæ Superiores* ultra medium bifidæ margine postico ciliatae. *Inferiores* quinquepartitæ: quinto libero; rachidibus omnium imbricatis squamis.

1458. PH. ALUCITA *hexa dactyla* alis patentibus fissis: singulis sexpartitis.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. *Alæ* omnes patentes: radiis numerosis fere, ad basin divisis ciliis quasi coherentibus, colore albo cinereoque undulatis.

## IV. NEUROPTERA.

### Libellula.

1459. LIBELLULA *quadrimaculata* alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante,

Libellula alis macula dupli marginali. *Fn. 764.*

*Raj. inf. 72. n. 3.* Libella maxima, abdomine longo tenui lœvi viridi splendente ad initium & finem intumescente.

Habitat Upsaliæ rario.

DESCR. Nomen *Raji* nil valet, descriptio bona est. *Thorax* crassus maculis duabus flavis, præter anticam, distinctis nigris lineis a tergo hirsutis. *Abdomen* attenuatum ex lato principio. *Alæ* albæ, versus basin luteæ, sed inferiores infra luteum colorem nigræ. *Abdominis latera* & dorsum flavescentia; *canda* duabus appendiculis teretibus utrinque attenuatis. Nota essentialis, qua hæc species ab omnibus distinguitur, consistit in puncto marginali, quod ut in reliquis versus extremitates nigrum est, sed

præter hoc punctum, fusca s. nigra alia macula, ad marginem anteriorem, in medio ale singulæ; adeoque puncta quasi duo marginalia in omni ala.  
Oculi postice subtus linea flava.

1460. *LIBELLULA flaveolata* alis albis basi luteis. *Fn. 765.*  
*Raj. inf. 49. n. 4.* Libella maxima, abdomine breviore latioreque flavo.

Habitat frequens ad Aquas in Uplandia.

DESCR. *Dorsum luteum*; *subtus tota nigra*; *Thorax niger utrinque maculis duabus obliquis flavis*, præter lineas duas flavas, præcedentes. *Pedes nigri*; *Frons virens*. *Oculi grisei*. *Alæ omnes basi lata flava macula*.

1461. *LIBELLULA vulgata* alis albis, corpore fusco, cauda simplici. *Fn. 766.*

*Raj. inf. 49. n. 6.* Libella maxima, abdomine flavo angustiore, nullis ad radicem alarum maculis fuscis.

Habitat ad Aquas.

DESCR. *Alæ albæ*, puncto marginali rufo-fusco. *Corpus nigricans*: *Anus absque appendice*.

1462. *LIBELLULA rubicunda* alis tantum posticis basi nigricantibus.

*Raj. inf. 50. n. 8.* Libella abdomine pulchre rubente versus podicem latiore.

*Ræf. inf. 2. aqu. 2. t. 7. f. 4.*

Habitat ad Aquas.

DESCR. *Facies alba*. *Thorax niger*, pallido lanatus, lineis rubris & dorso inter alas coccineo. *Pedes nigri*. *Alæ hyalinæ*: *macula marginali ferruginea*; *Inferiores basi nigrae*. *Abdomen nigrum maculis dorsalibus magnis rubris*. *Cauda parva*. *Femina lutea*, ubi mas ruber.

1463. *LIBELLULA depressa* alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis; abdomine depresso lanceolato lateribus flavescente.

*Raj. inf. 49. n. 5.* Libella maxima, abdomine breviore latioreque cæruleo.

DESCR. *Facies lutescens*. *Thorax villosus*, pallido virens, antice linea flava. *Alæ macula marginali atra*; & omnes basi nigro-ferrugineaæ: intimo margine albo. *Abdomen lanceolatum*, cinereo-virens, segmentis 3. 4. 5. 6. 7 lateribus luteis; apice obscure ferrugineo; ano setis duabus subulatis brevissimis. *Femora basi livida*, *Pedes nigri*.

1464. *LIBELLULA vulgatissima* thorace strigis octo flavicanis.

*Libellula lateribus flava*, alis albis. *Fn. 767.*

*Raj. inf. 50. n. 7.* Libella major, præcedenti congenier.

*Swam. quare. p. 175. t. 8. f. 6.*

Habi-

Habitat ad Aquas vulgaris.

DESCR. Latera thoracis & abdominis flava; Alæ albæ, nullo modo flavescentes ut in Rajana; a dorso longitudinaliter fusca. Puncta marginalia alarum fuscо-ferruginea.

**1465. LIBELLULA cancellata** alis basi immaculatis, abdomine dorso lateribusque interrupte luteis.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Facies pallida, fronte nigra. Oculi postice linea flava nigro interrupta. Thorax antice testaceus lineis duabus nigris & lateribus maculis duabus flavis. Abdomen dorso flavum utrinque lineis duabus nigris longitudinalibus & segmentorum marginibus nigris.

**1466. LIBELLULA ænea** thorace æneo-viridi.

Libellula thorace viridi nitido: lineis flavis, alis pallidis, abdome nigro. Fn. 768.

Raj. inf. 49. n. 5. Libella maxima, abdomine breviore latioreque cæruleo.

p. 140. Libella maxima, abdomine breviore & crassiore latioreque cæruleo.

DESCR. Caput & thorax viridia, nitida. Oculi subfuscæ; Alæ flavescentes albæ, in quibusdam ad basin flavæ. Punctum marginale fuscum. Abdomen cylindricum nigrum, subtus flavum marginis colore deaurato. Cauda diphyllea, angusta.

β Libellula viridi - inaurata; alis pallidis, pedibus nigris. Fn. 759.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Præcedenti simillima. Mas cauda quadridentata, dentibus superioribus pilosis, inferioribus singulis duplice denticulo. Femina cauda foliolis 2 lanceolatis. Caput, thorax, abdomen cupreo inaurata. Thorax pilosus absque maculis; margo alarum posticarum pone versus abdomen macula membranacea. Oculi prasini. Labium pallidum. Abdomen subtus hinc inde pallide albescens.

**1467. LIBELLULA grandis** alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor flavis.

Libellula grisea, alis flavescentibus, thoracis lateribus lineis flavis, cauda diphylla.

Ream. gall. 6. t. 35. f. 3.

Raj. inf. 49. n. 2. Libella maxima, abdomine longo tenori, alis flavescentibus.

p. 140. n. 2. Libella maxima, abdomine longissimo tenuiori, alis fulvescentibus.

p. 48. n. 1. Libella maxima vulgatissima, alis argenteis.

*Mouff. lit. p. 67.* Libella major. 2. 3.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Duo folia fusca lanceolata, in cauda. *Abdomen longum, angustum, rufo-fuscum. interdum albo maculatum. In Thorace lineolæ utrinque duas, oblique transversales, flavæ; thorax alias abdomini concolor, hirsutus. Alæ flavescentes macula ferruginea. Est inter maximas.*

1468. LIBELLULA *junccea* alarum membrana accessoria nigricante, thorace lineis sex flavis, abdomine ad basin attenuato.

Habitat ad Aquas.

1469. LIBELLULA *forcipata* thorace nigro: characteribus variis flavescentibus.

Libellula thorace luteo-virescente: lineis nigris, abdomine nigricante: characteribus flavis.

*Reaum. gall. 4. t. 10. f. 4.*

6. t. 35. f. 5.

*Merr. pin. 197.* Libella maxima lutea, cum 4 vel 5 spinis in caudæ extremitate.

*Pet. mus. 84 n. 819.* Libella major, corpore compresso flavescente.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Est inter maximas. *Mas cauda forcipata, duobus unguibus majoribus, oppositis, & duobus mucronibus subjectis, parvis. Thorax viridi-flavescentis, anterius ad alarum exortum, versus caput, tribus nigris lineis duplicatis notatus. Abdomen cylindricum, nigrum, octo constans articulis, a tergo linea flava longitudinali inscriptis, quæ 6 priores articulos exarat, non vero 7 & 8. Singulum segmentum ad latera macula flava transversa, & alia minore incurva longitudinali insignitur, quæ maculae evidenteriores in feminina, quam in mare. Feminæ cauda duobus mucronibus armatur. Maris vero quatuor. Maris genitalia sub, vel in primo abdominis segmento, feminæ vero sub vel in ultimo segmento, uti omnibus congeneribus. Alæ hyalinæ, puncto marginali & linea transversa in medio.*

1470. LIBELLULA *virgo* alis erectis coloratis.

α Libellula corpore sericeo nitido: alis luteo fuscis: margine immaculatis. Fn. 756.

*Raj. inf. p. 50. n. 11.* Libella media, corpore e viridi cæruleo cærulescente, alis fulvescentibus absque maculis.

DESCR. *Corpus mediæ magnitudinis, e cæruleo nitens, five atratum. Alæ luteo-fuscæ absque ullo puncto obscuro ad marginem exteriorem alarum.*

β Libellula corpore cæruleo nitido; alis viridi-cæruleo cærulescentibus: apice fuscis: marginé immaculatis. Fn. 757.

*Raj.*

*Raj. inf. p. 50. n. 10.* Libella media, corpore cæruleo, alis fere totis ex cæruleo nigricantibus.

*DESCR.* Alæ, quæ eriam puncto marginali carent, nigro-cærulecentes; apice pallide fulcæ. *Cauda unguiculata.*

2 Libellula corpore viridi-cæruleo; alis subfuscis: puncto marginali albo. *Fn. 758.*

*Raj. inf. 51. n. 12.* Libella media, corpore viridi, alis fulvescentibus maculis parvis albis prope extremum angulum.

*DESCR.* Corpus viridi-sericeum, nitidum, minime cæruleum. Pedes nigri. Alæ subfuscæ puncto marginali albicante oblongo. *Cauda inermis.* Hæc præcedentis fæmina. *De Geer.*

♂ Libellula corpore sericeo nitido; alis inaurato-fuscis: macula nigra. *Fn. 759.*

*Hoffn. inf. t. II. f. ult.*

*Raj. inf. 50. n. 9.* Libella media, corpore partim viridi, partim cæruleo, alis media parte maculis amplissimis e cæruleo nigricantibus.

*p. 140. n. 2.* Libella media, corpore partim viridi, partim cæruleo, alis media parte maculis amplissimis e cæruleo nigricantibus oblitis.

Habitan hæ omnes ad fluvios.

*DESCR.* Corpus cæruleo-nitidum. Pedes nigri. Alæ a medio versus apices cærulecenti nigrae, ipsis apicibus aurato-fuscis: a medio alæ versus ejus basin color inauratus, nullum punctum marginale in hac.

#### 1471. LIBELLULA puella alis erectis hyalinis.

α Libellula corpore sericeo; alis puncto marginali fuscō. *Fn. 760.*

*Raj. inf. 51. n. 15.* Libella minor, alis reticulatis, dorso viridi: incisuris albicantibus.

*Levenb. arcan. 1695. p. 18. t. 19.* Junfferties.

*DESCR.* Hæ e minoribus. Dorsum secundum totam longitudinem æneum. Alæ auratae, nitidae, puncto marginali fuscō, rhomboide, non nigro: Vasa alarum reticulata constant semper duobus nervis longitudinaliter sibi propioribus. Thorax & abdomen subtus & ad latera livida, Pedes extra nigricantes, intus lividi. Oculi cinerei, supra fuscī. Caput a tergo æneum, linea alba transversa, transversim trifida, extremitatibus crassioribus. Thorax a tergo viridi æneus, utrinque linea alba longitudinali notatus. Antennæ nigrae, breves, infimo articulo crasso.

β Libellula corpore incarnato; alis puncto marginali fuscō. *Fn. 761.*

*Raj. inf. p. 51. n. 16.* Libella media, dorso albido, duabus maculis nigris juxta incisuras.

p. 52. n. 17. *Libella minor*, alis reticulatis, dorso rubro maculis ad singulas incisuras nigris.

*DESCR.* *Corpus* incarnatum, juxta incisuras abdominis lineolis sive characteribus nigris. *Punctum* alarum marginale fuscum.

Y *Libellula corpore sericeo; alis puncto marginali nigro.* Fn. 762.

Raj. inf. 140. n. 1. *Libella minor*, corpore livide cæruleo.

*DESCR.* Alæ albæ puncto marginali atro. *Corpus* supra viridi-cæruleum, nitidum, absque ulla alia mixtura; magnitudo præcedentium duarum.

J *Libellula corpore cæruleo cinereoque alterno; alis puncto marginali nigro.* Fn. 763.

Raj. inf. 53. n. 18. *Libella minor*, alis brevioribus, corpore cæruleo maculis transversis nigris.

Gæd. belg. 3. p. 29. f. R.

List. gæd. p. 228. f. 103.

Habitat omnes ad Paludes.

*DESCR.* Alæ albæ, puncto marginali atro. *Abdominis* articuli a tergo visi antice cinerei, postice cærulecenti-nitidi; antepenultimus & ultimus articulus in plerisque cinereus, nullo modo nitidus.

## Ephemera.

1472. EPHEMERA *vulgata* cauda trifeta, alis nebuloso-maculatis. Fn. 750.

Habitat ad Lacus.

*DESCR.* Differt manifeste a reliquis. *Alis* venis reticulatis valde fuscis & maculis alarum nebulosis, fuscis, inæqualibus, *Setæ* etiam caudæ fuscæ.

1473. EPHEMERA *bioculata* cauda bifeta, alis albis reticulatis. Fn. 751.

Aet. upf. 1736. p. 27. n. 2. *Ephemera* alis incarnato-albis. Blank. belg. 1. 12. f. F.

Habitat juxta aquas æstate: Larva vero sub aqua.

*DESCR.* *Caput* minimum. *Tubercula* duo lentiformia, elevata, lutea, oculis multo majora, pellucida, oculis incumbentia; *Thorax* compressus, supra nebulosus. *Abdomen* cylindraceum, albo diaphanum, ultimis articulis subfuscis. *Cauda* duabus fetis rectis, corpore ipso duplo longioribus, albis; intra has duas fetes brevissimæ, incurvæ. *Pedes* nivei, quorum anteriores longiores. *Alæ* erectæ, albæ, opalo-incarnato parum nitentes, reticulatae.

1474 EPHEMERA *fusca* cauda bifeta, corpore fusco alis segmentisque abdominis albis.

Habitat ad Liumkihl Uplaudiæ.

*DESCR.*

DESCR. Caput, Thorax, Abdominis primum & quatuor ultima segmenta fusca. Alæ albae; secundariae minutæ. Spiracula abdominis fusca. Pedes albi; anticis duobus longissimis. Ungues fuscæ. Gibberes oculares magni, flavi. Antennæ breves albae. Caudæ setæ duas, albae, abdomine breviores.

1475. EPHEMERA culiciformis cauda bifeta, alis albis, corpore fusco. Fn. 753.

Habitat ad aquas.

DESCR. Culice paulo major. Thorax nigricans. Abdomen fuscum; setæ caudæ longitudine corporis. Tubercula 2 supra oculos, crassa, magna, livida.

1476. EPHEMERA horaria cauda bifeta, alis albis: margine crassiore nigricantibus. Fn. 754.

A&T. upf. 1736. p. 27. n. 3. Ephemera alis albis minima.

Swam. quart. p. 87. Ephemera minima.

Habitat ad lacus.

DESCR. Alæ albae margine crassiore fusco-nigricante. Cauda duabus setis armata, absque ulla parvis interiectis. Pedes albi, exceptis primis in majoribus magis fuscis, supra oculos. Tubera duo oculis majora, fusco-purpurea. Abdomen cineratcens, segmentorum marginibus albis. Habet quasi sex oculos; tubera scilicet duo majora descripta; oculos duos compositos; ad horum tuberum latera oculos duos alios minimos ante tubera positos.

Circa vesperam evolant ex aquâ, secum ferentes tunicam pupulæ, quam deponunt, ubi priuio quiescant, albam; sic fenestras & navigantium veltes tunicis his adspergunt; vivunt tantum per noctem, moriuntur in sequente hora matutina omnes; magnitudo muscae domesticæ minoris.

1477. EPHEMERA diptera cauda bifeta, alis duabus: costa marginali fusca cinereo-inaculata.

Habitat passim.

DESCR. Media. Alarum costa nigricans velut characteribus albidis inscripta. Inferiores alæ vix existunt.

1478. EPHEMERA nigra cauda bifeta, nigra, alis nigricantibus: inferioribus minioribus.

Habitat ad aquas. D. C. Solander.

DESCR. Magnitudo culicis, tota nigra. Pedes pallidiores, Alæ inferiores adeo parvæ ut vix conipectum subeant. Alarum margo tenuior subciliatus.

1479. EPHEMERA mutica cauda mutica, alis albis striatis. Fn. 752.

Habitat ad aquas.

DESCR. Minor. Alæ hyalinae, sed vasis minime reticulatis. Cauda setis longis caret; capitis tubera oculis minorâ sunt in hac specie. Mas corpore pellucido, thorace nigricante. Fæmina corpore opace subrufesciente. In congressu cohærente perfecte uti. Libellulæ.

1480. EPHEMERA *vespertina* nigra, alis inferioribus albis. *It.*  
*æl. 21.* *Fn.* 755.

Habitat copiose in Smolandia ad fluvium Säthaella.

DESCR. Est inter minores generis sui, toto corpore & alis superioribus nigra; solæ alæ inferiores albæ, quibus ab omnibus generis tui speciebus manifeste differt.

## Phryganea.

1481. PHRYGANEAE *phalænoides* nigra, alis albidis: maculis nigris ipsis.

*Udala. diff. 53. f. 16.* Phryganea nigra, alis albo pallidis: maculis plurimis nigris.

Habitat in Fintlandia: Aboæ & alibi.

DESCR. Speciosior & major omnibus notis Europæis hujus generis. Corpus nigrum. Antennæ corpore dimidio breviores. Alæ albidæ, concolores: superiores maculis adpersæ plurimis, nigris, ad marginem posticum in ordine digestis. Inferiores albæ, margine postico fascia nigra; margine vero laterali inferiori maculis nigris.

1482. PHRYGANEAE *reticulata* nigra, alis subferrugineis atro reticulatis.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Media, statura Phalænæ. Alæ superiores subferrugineæ venis atris transverse reticulatae; ad angulum ani macula nigricans. Inferiores subferrugineæ fascia nigra; margine postico nigricante e maculis confluentibus acutis.

1483. PHRYGANEAE *striata* alis testaceis nervoso-striatis. *Fn.* 738.

*Aet. upf. 1736. p. 27. n. 2.* Hemerobius alis testaceis venoso striatis, antennis longitudine alarum.

*Aldr. inf. p. 763.* Perlarum forte species.

Habitat in viis lutofis.

DESCR. Facies phalænæ majoris. Antennæ antrosum porrectæ, longitudine corporis. Alæ magnæ, latæ, subteitaceaæ sive fulco-testaceaæ, venis aliquantulum raposis striatae, minime autem ullo in puncto reticulatae; Punctum album postice in ala superiore. Corpus fuscum.

1484. PHRYGANEAE *grisea* grisea; alis superioribus nebulosis: macula marginali nigra. *Fn.* 739.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Mediae magnitudinis est. Alæ incumbentes, postice compressæ: superiores (uti totum corpus) griseæ, fusco obsolete nebulosæ; in quam medio juxta marginem inferiorem seu crassiorem nigra macula.

1485. PHRYGANEAE *grandis* alis cinereo-testaceis: lineolis duabus longitudinalibus nigris: puncto albo. Fn. 740.  
Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Magna. Alae testaceo-cinerascentes, lineis in superioribus alis duabus longitudinalibus, eademque serie dispositis, & singulis albo puncto notatis. Antennæ longæ, antrorsum porrectæ.

1486 PHRYGANEAE *rhombica* alis deflexo-compressis flavescentibus: macula rhombea laterali alba. Fn. 741.  
Habitat ad Aquas. Larva in folliculo exramentis grameis transversis.

DESCR. Alæ magnæ, pellucidæ (quas gerit uti Phalænae naturæ) deflexo-compressæ, subluteæ sive griseæ; in medio alæ exterioris macula rhombea albida obliqua & pone hanc alia albida vix notabilis. Corpus testaceum, uti antennæ & pedes, supra & pone inaculam alarem aliud fuscæ. Est hæc inter majusculas sui generis.

1487. PHRYGANEAE *bimaculata* alis fuscis: macula lateralí dupli flava. Fn. 742.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Minor, non autem inter minimas. Alæ fuscæ; in medio alarum macula duplex lunularis flava, altera pone alteram. Animal antice angustatum.

1488. PHRYGANEAE *flavilatera* alis reticulatis, cauda inermi, thoracis lateribus flavis. Fn. 743.

Habitat ad Aquas, ubi sedet tranquilla.

DESCR. Sedet alis deflexis uti Phalæna, vel potius phalæna quercifolia. Alæ subcinereæ, reticulatae: venis fuscis maxime reticulatis, præsertim ad marginem exteriorem, qui admodum dilatatus. Corpus totum nigricans. Antennæ corpore diuidio breviores. Cauda simplex, absque ityliis prominulis. Os duobus denticulis & quatuor a palpis. Collare antice & postice, non ad latera, flavescentia.

1489. PHRYGANEAE *bicaudata* alis albis venoso-reticulatis, cauda biseta. Fn. 744.

*Act. upf.* 1736. p. 27. n. 1. Hæmerobius cauda bipili, alis cinereis venoso-reticulatis.

*Wagn. helv.* p. 227. 228. 229. Musca aquatilis æstiva major.

Habitat ad Aquas, præsertim in Lapponia Umensi.

DESCR. Variat admodum magnitudine. Alæ oblongæ, incumbentes, non deflexæ, antrorsum angustatae, albae, venis fuscis admodum reticulatae. Cauda duabus setis antenniformibus, & antennarum longitudine gaudet.

1490. PHRYGANEAE *nigra* alis cæruleo-atris, antennis corpore duplo longioribus. Fn. 745. Raj.

*Raj. inf. p. 275.* Musca parva quadripennis, antennis omnium, quas unquam vidi, pro corporis magnitudine longissimis.

*A&t. upf. 1736. p. 27.* Hemerobius alis cæruleo-nigris, antennis corpore longioribus.

Habitat ad Aquas inter arundines & scirpos. Vespertino tempore nebularum instar gregaria choreas agens in alto aëre.

DESCR. Alæ nigræ seu atræ cum cærulei vel virescentis mixtura, margine dorsali in medio villoso. Antennæ corpore duplo vel triplo longiores, nigræ. Pedes cinereo-nigri. Magnitudo muscæ domesticæ quoad alas.

1491. PHRYGANEÆ *azurea* alis nigris: postice violaceis.

Habitat ad aquas.

DESCR. Musca minor. Alæ nigræ: singulae V fusco diviso; ita tamen ut divaricatio literæ posteriora respiciat, in qua color azureus locatus.

1492. PHRYGANEÆ *longicornis* alis superioribus nebulosis, antennis corpore triplo longioribus. Fn. 746.

Habitat ad *Degæroeam*, in litoribus Lomarensibus Roslagiæ.

DESCR. Magnitudo majoris culicis. Alæ superiores pallido-griseæ maculis fuscis; Inferiores canæ margine piloso. Antennæ albidae, corpore triplo aut quadruplo longiores.

1493. PHRYGANEÆ *filosa* alis cylindrico-incumbentibus fluorescentibus, antennis corpore triplo longioribus.

Habitat ad aquas.

1494. PHRYGANEÆ *wæneri* cinerea, alis posticis pallidioribus: margine interiore piloso albido. It. W:goth. 44.

Habitat ad ripas Wæneri lacus prope Lidcopiam.

1495. PHRYGANEÆ *albifrons* nigra, alis exterioribus strigis linearibus quatuor albis.

Habitat ad aquas.

DESCR. Tota nigra, magnitudine culicis. Frons alba. Antennæ mediocres, Alæ superiores lineola transversa, alba, marginis tenuioris versus basin; duæ lineoleæ in medio quasi ex una transversa interrupta; una obliqua versus apicem ad marginem crassiorem.

1496. PHRYGANEÆ *bilineata* nigricans, alis superioribus utroque in margine lineolis duabus transversis albidis.

Habitat ad Aquas.

1497. PHRYGANEÆ *ciliaris* nigra, abdomine utrinque alba linea, tibiis posticis pallidioribus, antennis mediocribus.

Habi-

Habitat prope Upsaliam.

DESCR. Thorax pilosus. Abdomen utrinque linea longitudinali pallida; Alæ, imprimis ad marginem, ciliatae.

1498. PHRYGANEAE umbrosa nigra, alis superioribus fuscis lutescetiti-nebulosis.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Magnitudo Culicis. Antennæ longitudine corporis: Corpus nigrum. Alæ superiores fuscæ, irroratae glauco fuscescente colore. Inferiores nigrae.

1499. PHRYGANEAE nebula nigra, alis incumbentibus subcinereo nebulosis, caudæ setis truncatis. Fn. 748.

Habitat ubique frequens primo vere.

DESCR. Insectum oblongum, angustum, subcylindraceum dum alis suis vestitum. Antennæ setaceæ, longitudine corporis, non voto alaruin. Thorax minus latus & marginatus. Cauda terminatur duabus setis truncatis, brevissimis. Corpus totum atrum, exceptis solis alis. Alæ incumbentibus in figuram semicylindricam, subcinereæ, maculis seu fasciis albidis, hinc inde interlucentibus, vix tamen visu manifestis: suprema ala nervis tribus; versus marginem tenuiorem extensis, valde reticulata est; reliqui nervi non ita reticulati sunt. macula nulla in clypeo thoracis, sed duo velut ulcera coalita.

1500. PHRYGANEAE fusca fusca immaculata. Fn. 749.

Habitat Fahlunæ ad Stæmsbogen.

DESCR. Parva, oblonga, cylindrica, tota fusca. Alæ venotæ, minime inaculatae, corpore longiores, nitidiusculæ. Cauda absque feris. Antennæ corpore paulo breviores. Abdomen subtus atrum, supra pallidum, lateribus utrinque maculis septem nigris.

1501. PHRYGANEAE minuta nigra, palpis villosis capite longioribus.

Habitat ad aquas.

DESCR. Antennæ longitudine corporis. Palpi duo superiores capite longiores, nigri, inferiores vero albidi. Antennæ longitudine corporis. Pedes pallidi.

1502. PHRYGANEAE flava alis flavo-reticulatis, antennis longitudine corporis.

Habitat ad paludes.

1503. PHRYGANEAE saltatrix antennis longitudine corporis, macula viridi albaque alarum.

Habitat in Prædio Fulleroen.

DESCR. Minima est & saltatrix. Corpus Culice minus, fuscum. Antennæ corpore longiores, lente inspectæ villosæ apparent. Os ut in reliquis

liquis cum palpis. (ad eoque non Chermes; accedit enim figura ad Chermen alis). Alæ corpore longiores, versus corpus pone compressæ, aquæ, macula subviridi & alba, versus marginem inferiorem venis nigritis, versus superiorem venis albis.

## Hemerobius.

1504. HEMEROBIUS *Perla luteo-viridis*, alis hyalinis: va-  
fis viridibus. Fn. 731.

*Mouff. lat. p. 62. f. ult. Musca Chrysopes.*  
angl. p. 937.

*Grew. mus. p. 156.*

*Gœd. belg. 2. p. 40. t. 14 Audax, intrepidus.*

*List. gœd. p. 229. f. 104. Tolmerus.*

*Merr. europ. 3. p. 49. t. 8. f. in fructu.  
gallice t. 175. 109.*

*Alb. ins. t. 64.*

*Pet. mus. p. 4. n. 6. Perla minima merdam olens.*

*Raj. ins. p. 274. Musca quadripennis, corpore luteo-viri-  
di, alis per amplis e flavo patiter virentibus.*

*Reaum. gall. 3. t. 33. f. omnes. Leo aphidis.*

*Mus. petr. I. p. 717. Musca Chrysopis viridis.*

Habitat in Hortis frequens. Larva viëtat *Aphidibus*.

DESCR. Alæ magnæ, reticulatæ: venis viridibus, pellucidæ, ac si alæ solo reticulo conitarentur, macula marginali oblonga viridi. Oculi globo-  
si, magni, aurei. Antennæ setaceæ, subfuscæ. Corpus etiam viride, ta-  
ctum fœtet stercore humano. Ova petiolo longo insident.

1505. HEMEROBIUS *chrysops* viridi nigroque varius, alis hya-  
linis maculatis reticulatis. Fn. 732.

*Reaum. gall. 3. t. 3. f. 15, 16.*

*Frisch. germ. 4. p. 40. t. 23. Musca fœtida auro oculata.*  
Habitat in arboribus.

DESCR. Major. Alæ striatae & reticulatae: fuscæ venæ plures ad marginem  
inferiorem; duæ vero validiores in margine tenuiore supra dorsum.

1506. HEMEROBIUS *albus* albus, oculis viridi-æneis.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Facies H. Perlae, sed minor. Corpus totum album. Alarum va-  
fa minime obscura sunt.

1507. HEMEROBIUS *hirsus* alis albis fusco reticulatis: fasciis  
duabus fuscescentibus.

Habitat in Lupuletis.

DESCR.

**DESCR.** Magnitudo Muscæ. *Corpus fuscum: Alæ deflexæ: Superiores albidae, fuso conterit nebulosæ & reticulatæ nervis pilosis; fasciæ duæ arcuatae fuscescentes e venis. Inferiores albidiores, minus venosæ: fascia arcuata in medio & alia terminali; utraque fuscescente. Antennæ mediocres. Abdomen terminatur forcipe. Pedes pallidi. Oculi fuisci.*

1508. **HEMEROBIUS phalænoides** alis testaceis basi mucronatis postice excisis.

Habitat Upsaliæ rarius. *P. Loefling.*

**DESCR.** Phalænam metiens. *Alæ latissimæ, breves, rufo-testaceæ, reticulato-venosæ: supra basin superiorum mucro prominens; in medio punctum prominens obscurum; Strigæ duæ, obliquæ, fuscæ e valis; margo posticus excisus apice longiore acutiore.*

1509. **HEMEROBIUS Formicaleo** antennis clavatis, alis hyalinis fuscō reticulatis: costa nigra bilineari.

*Hemerobius Formicaleonis. Fn. 733.*

*Reaum. gall. 4. t. 14. f. 18. 19. Formica-leo,*  
*t. 11. f. 8.*

*6. t. 32. 33. 34. f. 7. Formicaleo.*

*It. ael. 149. 206 Formicaleo.*

*Oelandis Sandpiller.*

Habitat in *Arena sicca*, præsertim in *Oelandia*.

**DESCR.** *Larva magnitudine Araneæ cinereæ. Abdomen magnum, ovatum, papillis hifpidis, & ordinum, longitudinaliter notatum. Thorax angustus. Os forcipe longa ad apicem connivente; singula maxima tribus dentibus, præter apices, armata, utrinque pilosa. Pedes albantes, quibus retrograde incedit instar cancti, & ab domine cavitates et arenam fodit, sub qua latebit.*

*Phryganea ipsa nigra. Alæ oblongæ hyalinæ venis fuscis reticulatæ: costa versus marginem inferiorem constat e duabus nervis elevatis atris parallelis apice coeuntibus spatio ab apice remoto. Thorax villosus.*

1510. **HEMEROBIUS Humuli** alis albis: punctis fuscis sparsis, antennis fuscō alboque annulatis. *Fn. 734.*

Habitat in *Lupuletis* paßim.

**DESCR.** *Corpus albidum, magnitudine formicæ. Alæ magnæ, albæ, venoso-reticulatæ: maculis parvis, obsoletis fere instar punctorum, temere sparsis. Antennæ feraceæ lineolis albis fuscisque monilis instar variegatae, Pedes albidi. Oculi cæruleo-ænei, supra abdomen utrinque ordo macularum fuscum.*

1511. **HEMEROBIUS sexpunctatus** alis albis: maculis fuscis: postice punctis sex distinctis, antennis fuscis. *Fn. 735.*

Habitat paßim.

**DESCR.** *Præcedenti simillimus, sed quadruplo minor. Alæ superiores hyalinæ, reticulatæ & fuscō maculatæ, ut in illo, sed postice in singulis alis observantur puncta sex, scilicet singula inita singulam retis maculam. Inferiores hyalinæ, inmaculatae: omnes determinato ad lucem situ aureæ. Antennæ non albo & nigro variegatae, ut in illo.*

1512. HEMEROBIUS *flavicans* niger, thorace abdomineque flavis. *Fn.* 736.

Habitat Upsaliæ minus frequens.

*DESCR.* Magnitudo pediculi. *Antennæ* nigrae, setaceaæ, longitudine corporis. *Caput* nigruin. *Collum* angustius, flavum. *Thorax* nigricans. *Abdomen* ovatum, teres, oœto incisuri profundi cinctum, flavum. *Pedes* nigricantes. *Alæ* hyalinae venis obscuris ramosis. *Facies* Aphidis.

1513. HEMEROBIUS *latarius* niger, alis albidis striatis albo maculatis.

*Phryganea nigra*, alis albidis striatis albo maculatis. *Fn.* 737.

*Act. upsi.* 1736. p. 27. n. 4. *Hemerobius* alis albis, corpo- re atro, antennis brevissimis.

*Hoffn. inf.* 2. t. 12. juxta phalangia; edit, altera t. 2. f. 113. Habitat præsertim Upsaliæ in plateis lutosis.

*DESCR.* Magnitudo Panorpæ. *Alæ* corpore longiores, lanceolatae, obtusifuscatae, albæ, venis fusca striatae; venis his vix reticulato-connexis, nisi solum in alis exterioribus, duabus aut tribus margini interiori propioribus; duo exteriores nervi seu extimus vix tino in loco connectitur; at alæ omnes quatuor, ad marginem exteriorem, versus apicem, linea fulca inter duo exteriora vasa notantur. *Corpus* & pedes nigra. *Abdomen* subitus atrum; juxta anum duæ appendices brevissimæ. *Antennæ* nigrae, setiformes, longitudine corporis. *Thorax* planiusculus, medio con- vexus.

1514. HEMEROBIUS *bipunctatus* viridi nigroque varius, alis superioribus maculis duabus nigris.

Habitat Upsaliæ. *Fr. Logie.*

*DESCR.* *Corpus* magnitudine Aphidis. *Antennæ* longitudine corporis. *Alæ* hyalinae, venis fusca reticulatae: superioribus maculis duabus nigris, quarum quæ ad marginem crassiorem posterius locata; quæ vero ad marginem tenuiorem anterius.

1515. HEMEROBIUS *pedicularius* virescens, antennis longi- tudine corporis.

Habitat in Domibus, imprimis in fenestris, cursitans.

*DESCR.* *Termeti pullatorio* simillimus, ut demis alis eundem dicerem. *Antennæ* longitudine corporis. *Corpus* fusco-virescens. *Alæ* quatuor, ve- nosæ. *Abdomen* virescens,

### Panorpa.

1516. PANORPA alis æqualibus nigro-maculatis. *Fn.* 729.

*Aldr. inf.* t. 386. f. 8. 9. & 387. f. 5. 6.

*Mauff. lat.* p. 62. f. 3. 4. *Musca scorpiuros* I. & IV.

*Hoffn. inf.* t. 2. f. 14.

*Merr.*

Merr. pin. p. 200. *Musca scorpiura*.

Frisch. germ. 9. p. 29. t. 14. f. 1. *Scorpio musca*.

Reaum. gall. n. 4. t. 8. f. 9.

Habitat in pratis, *Hieracio umbellato* consitis.

DESCR. *Rostrum* in proboscideum duram, corneam, prominens deorsum. *Antennæ* 30 articulis, setaceæ, nigrae: *Corpus* fuscum: latera corporis flavæ. *Cauda* articulata: *Chela* scorpionis instar rufescens, bifida. *Alæ* albae maculis fasciatis, venis reticulatis. *Mas* cum *chela caudæ*. *Femina* absque *chela caudæ* est.

## Raphidia.

1517. RAPHIDIA. Fn. 730.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 1. *Raphidia aculeo recurvo*.

Roes. inf. app. I. t. 21. f. 6, 7.

Habitat in pratis.

DESCR. Magnitudo & facies proxime ad Panorpam accedit. *Caput* nigrum, cornuum, postice angustum, supra depresso, leve. *Thorax* angustus, cylindraceus, niger. *Antennæ* setaceaæ, albidae, innumeris articulis. *Abdomen* oblongum, fuscum, lineis transversis albis. *Alæ* dia-phanae, venis reticulatae, ut in Libellulis, etiam ad marginem exteriorem punctum oblongum fuscum in quibusdam, uti in Libellulis. Ab anno exseritur macro setaceus, niger, arcuatus, longitudine dimidii abdominis, flexilis, iners. Variat aculeo armata & eodem destituta, quod lexus nota. *PUPA* currens. *Alarum* rudimenta ab domine triplo breviora. *Cauda* linearis reflexa retrosum ad tergum abdominis depresso.

## V, HYMENOPTERA.

### Cynips.

1518. CYNIPS *Rosæ nigra*, ab domine ferrugineo postice nigro, pedibus ferruginosis.

Tenthredo antennis duodecim-nodiis nigris, ab domine sub-tus ferrugineo, pedibus flavis, alis immaculatis. Fn. 938.

Reaum. gall. 3. t. 46. f. 5. 6. 7. 8. & t. 47. f. 1. 4.

Act. upf. 1736. p. 29. n. 3. *Ichneumon bedeguaris*.

Blank. belg. 187. t. 16. f. v. x. y. z. *mala*.

Suecic Sömnorn.

Habitat in *Rosacanina* ubi excrescit tuber in modum Lichenis ramosissimi rufi, officinis Bedeguar; in *Cotula fœtida* Gatta gibbosa, extimo pollicis articulo simili, produxit eandem.

B b

DESCR.

**DESCR.** Magnitudo pediculi. *Antennæ* nigrae, rectæ, 12 circiter articulis. *Caput & Thorax* gibbus niger. *Abdomen* subovatum, alis brevius, carinatum, subtus ferrugineum, versus anum nigrum. *Pedes ferruginei*. *Aëla* albæ absque macula marginali.

1519. CYNIPS *Hieracii* Hieracii murorum \*

Tenthredo Hieracii. Fn. 950.

Rupp. gen. 163. Hieracium myophorum.

Chemn. bruns v. 43. t. 7. Pulmonaria gallica murem referens.

Barthol. act. dan. 1671. p. 122. t. 283. Hieracium contortuplicatum & strumosum.

Valent. virid. t. 328. f. 1. Hieracium murorum folio pilosissimo vulgo Pulmonaria gallica.

Heuch. bort. wittenb. 1. t. 1. Hieracium myophorum.

Act. upf. 1723. p. 415. Hieracium Myophorum.

Habitat in *Hieracio murorum* caussans varietatem gallis singularibus, cuius insectum non visum mihi est, sed Galla faciem muris hirsuti gerit. It. scan. 280.

1520. CYNIPS *Glechomæ* Glechomæ hederaceæ \*

Tenthredo gallæ Glechomæ. Fn. 949.

Blank. belg. 186. Hedera terrestris.

Welsch. becast. 1. p. 127. t. 127. f. 1. Strumulæ Chamaecissi.

Reaum. gall. 3. t. 42. f. 1. 2. 3. 4. 5.

Habitat in *Glechoma hederacea* ubi galla dura in ipso folio, subhirsuta; insectum tamen non dum vidi.

1521. CYNIPS *Quercus* folii nigra, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris.

Tenthredo gallæ glabrae foliorum Quercus. Fn. 947.

Frisch. germ. 2. p. 22. t. 3. f. 5. Ichneumon gallarum foliorum Querci.

Rhed ins. p. 115. 157.

Leuwenh. arcan. p. 217.

Blank. belg. 181. t. 16. f. A-H.

Reaum. gall. 3. t. 39. f. 14. 15. 16.

Suecic Gallæple.

Habitat frequens in foliis *Quercus*, præsertim in fruticibus, ubi a pagina inferiore plures sœpe Gallæ globosæ, rubicundæ, glabrae, quæ non indurescunt, in medio larvam continentis; ex hac conficiunt cives atramentum.

**DESCR.** Longitudo cimicis. *Corpus* atrum. *Caput* fuscum. *Antennæ* filiformes, exterrsum crassiores, 12 articulis. *Thorax* fuscus, gibbosus lineis 3 glabris elevatis. *Abdomen* subovatum, atrum, nitidum, gibbum, sessile. *Aëla* eretæ, albæ venis nigris, corpore duplo longiores absque puncto marginali. *Pedes* grisei; *Femora* subtus nigrae.

1522. CYNIPS *Quercus baccarum* nigræ, basi antenhatum pedi<sup>bus</sup> flavescentibus.

*Udām. diff. 81. t. 1. f. 14.*

Habitat in Gallis diaphanis, pisiformibus, paginæ inferioris foliorum *Quercus* Roboris.

1523. CYNIPS *Quercus petioli* nigra, pedibus albidis, femoribus fuscis.

*Röff. inf. app. 2. 35. 36.*

Habitat in Gallæ utrinque convexa, inflata, petioli s. ramuli *Quercus*.

DESCR. Magnitudo Culicis. Corpus nigrum, Abdomen glabrum, Alæ hyaline. Antennæ longitudine fere corporis. Pedes omnes pallidi; Femora crassiuscula, nigricantia.

1524. CYNIPS *Quercus pedunculi* grisea, alis cruce linearis.

*Reaum. inf. 3. t. 40. f. 1-6.*

Habitat in Gallis granulatis, concatenatis, Amenti masculi *Quercus*.

1525. CYNIPS *Quercus gemmæ* gemmæ *Quercus* Roboris.

Tenthredo gallæ imbricatae. Fn. 948.

*Reaum. inf. 3. t. 43. f. omnes.*

Habitat in *Quercu* ubi gemma in Gallam imbricatam inæqualem terminalem transit, quæ insectum fovet.

DESCR. Magnitudo pediculi. Corpus griseum s. testaceum. Oculi fusci, Antennæ subfuscæ, longitudine corporis. Alæ hyaline cruce linearis.

1526. CYNIPS *Quercus corticis* corticis *Quercus* Roboris.

Habitat in Gallæ cyathiformi s. peziziformi disco convexo, cincto punctis ultra viginti concavis, cortici *Quercus* immersa. T. Bergman.

1527. CYNIPS *Quercus ramuli* pallidus, abdomine oculisque nigris.

Habitat in Gallis lanatis albis ramulorum *Quercus* Roboris D. C. Solander.

DESCR. Minima. Antennæ moniliformes, longitudine abdominalis, Corpus totum pallidum exceptis oculis & abdomine nigris.

1528. CYNIPS *Fagi* *Fagi sylvaticæ*.

Tenthredo gallæ foliorum Fagi. Fn. 946.

*Frisch. germ. 2. p. 24. t. 5. Ichneumon foliorum ulmi.*

Habitat in *Fagi sylvaticæ* foliis. Similis etiam in *Ulmi campestris* foliis.

DESCR. Alæ corpore longiores, ut in Phalænis deflexæ, puncto marginali terram spectante.

1529. CYNIPS *Viminalis* flava, thorace nigro.

Rœf. inf. 2. vesp. t. 10. f. 5. 6. 7.

Habitat in *Salice viminali*, intra gallam sub costa folii.

DESCR. Parva. Caput & Abdomen flava. Thorax niger.

1530. CYNIPS *Amerina* nigra, pedibus pallidis.

Habitat in *Salicis pentandrae* ramulis intra Gallam inæqualem terminalem.

1531. CYNIPS *Capreae* viridis nitida, pedibus pallidis. Fn. 940.

Frisch. germ. 4. p. 39. t. 22.

Habitat in *Salicis* Gallis ferrugineis, hordeiformibus, medio folio immersis, nec non in variis excrescentiis ramorum.

1532. CYNIPS *Salicis strobili* atra, thoracis tergo virescente.

Tenthredo atra, thoracis tergo virescente, pedibus saltatoriis. Fn. 941.

Habitat in *Salico myrtilloide*, cuius ramuli terminantur Rosula imbricata, magnitudine & figura coni *Humuli*, intra squamas, dum separantur, in intimo apice unicum sedet insectulum, arcte inclusum coanniventibus numerosis foliolis, quod prodiit alatum Junio 5.

DESCR. Magnitudo pulicis. Corpus totum, pedibus & antennis atrum. Antennæ filiformes, apicem versus minime acutiores sunt, tamen corpore dimidio breviores. Abdomen ovatum, acutum. Pedibus saltat, licet figura pedum crassiore non gaudeat. Caput & Thorax a tergo virescente sunt.

## Tenthredo.

1533. TENTHREDO *femorata* antennis clavatis luteis, corpore atro, femoribus posterioribus maximis.

Habitat in Alnetis.

DESCR. Major. Corpus atrum. Antennarum clavae ferrugineæ. Plantæ pedum testaceæ. Femora quatuor posteriora magna & crassa. Scutelli locus excisus & vacuus.

1534. TENTHREDO *lutea* antennis clavatis luteis, abdominalis segmentis plerisque flavis.

Tenthredo antennis clavatis, atra, segmentis abdominalibus 3. 4. 5. ferrugineis. Fn. 923.

Goed. belg. 1. p. 119. t. 64.

List. goed. 179. f. 77. a.

Frisch. germ. 4. p. 42. t. 25. Eruca salicina viridis, rugis sexaginta duabus.

Habi-

# INSECTA HYMENOPTERA TENTHREDO 389

Habitat in *Salice*, *Alno*, *Betula*. *Larva* glabra, viridis, pedibus 28; sæpe jacet spiralis cochlear depressæ instar, linea dorsali longitudinali nigra, utrinque flava.

DESCR. *Tenthredo* ipse magnitudine *Crabronis niger hirsutus*, articulis 3. 4. 5. abdominalibus ferrugineis, reliquis nigris. *Femora & tibiae nigrae*, palmis flavis. *Antennæ clavatae*, flavae, infimo articulo nigro. *Alæ venis atro-ferrugineis*, margine postico fuscis.

1535. TENTHREDO *Vitellina* antennis clavatis, abdomine rufo, dorso nigro, femoribus posticis dentatis.

Habitat in *Salice* T. Bergman.

DESCR. Statura frequentis, sed labio caret. *Corpus nigrum pubescens*. *Abdominis omnia latera*, utr. subtus, rufa, dorso solo nigro. *Pedes nigri*, *Tibiis plantisque flavis*. *Femora postica prope apicem dentata*. *Antennæ nigrae*. *Alarum margo tenuior nigricans*.

1536. TENTHREDO *Amerina* antennis clavatis, corpore cinereo, ano rufo, labio albo.

Roef. inf. 2. vesp. t. I.

Habitat in *Salice*.

DESCR. Media. *Corpus nigrum pube alba*, unde cinereum appetet. *Plantæ pedum ferrugineaæ*. *Anus rufo-ferrugineus*, ut & *Antennarum clavae*. *Labium oris magnum, orbiculatum, niveum*.

1537. TENTHREDO *lucorum* antennis clavatis nigris, corposo villoso atro.

*Tenthredo* antennis clavatis, atra; abdomine ovato, alis ferrugineis. Fn. 924.

Act. upf. 1736. p. 29. n. 9. *Ichneumon ater*, alis testaceis, antennis clavatis.

Habitat in *Lapponia Ubmensi* & *Pithoz* in *Alno*.

DESCR. Magnitude vulgaris *Bombylii*, obtusissima. *Abdomen subrotundum, depresso, villosum, atrum, holosericeum*. *Thorax & caput nigra*. *Antennæ clavatae, nigrae, articulis sex, obtusissimæ*. *Alæ ferrugineaæ, puncto marginali nigro, oblongo, venis rufis reticulatae; variat antennarum clava nigra & ferruginea*.

1538. TENTHREDO *fasciata* antennis clavatis nigris, abdome glabro atro, alis superioribus fascia fusca.

Habitat in *Sylvis*.

1539. TENTHREDO *nitens* antennis clavatis, abdomine viridi cærulecente nitente.

Habitat in *Sylvis*.

DESCR. Media. *Caput & Thorax villosum nigra*. *Abdomen viridi-cæruleo nitens*. *Alæ ferrugineaæ*. *Tibiae flavae*. *Maris abdomen supra longitudinaliter nigricans antennis ferruginea, nec ut in femina nigris*.

1540. TENTHREDO *Pini* antennis pectinatis lanceolatis,  
thorace subvilloso.

*Uddm. diff. 90. f. 13.*

Habitat in *Pini sylvestris* foliis. Larva cærulea utraque extremitate fulva.

DESCR. Magnitudo Cimicis. Corpus nigricans. Thoracis dorsum surtus variis, Alæ fuscæ venis nigris, macula marginali nigra. Femora nigra. Tibiae pallidae. Antennæ atrae, corpore dimidio breviore, pectinatae, acuminatae, concavæ: radiis circiter 25 subæqualibus: summis apice introrsum antrorsumque flexis. Femina grisea capite nigro, antennis filiformibus simplicissimis.

1541. TENTHREDO *Juniperi* antennis pectinatis obtusis,  
thorace glabro.

*Uddm. diff. 91. f. 12.*

Habitat in *Juniperi communis*. Larva dilute viridis punctis nigris adspersa.

DESCR. Similima præcedenti, sed minor. Corpus nigrum. Thorax glaber. Antennæ pectinatae. Femora & Tibiae fulvae, nec flave, Femina grisea oculis nigris.

1542. TENTHREDO *ustulata* antennis subclavatis continuis,  
thorace cærulecente, alis macula fusca.

Habitat in nemoribus.

1543. TENTHREDO *rustica* antennis subclavatis, abdomine  
nigro; cingulis quatuor flavis.

Habitat in pratis rusticorum.

1544. TENTHREDO *Padi* antennis septem-nodiis, atra, fe-  
moribus tibialisque albis.

Tenthredo atra, tibialis femoribusque albis. *Fp. 944.*

Habitat in foliis *Pruni Padi*, quæ subtus edendo cibri in-  
star perforat.

DESCR. Antennæ, caput, thorax, abdomen atra. Alæ glauce puncto marginali oblongo atro. Femora & tibiae albæ, sed palmæ, præsertim pollicæ, nigrae. Antennæ antrorsum exsertæ, 7 vel 8 articulis acumi-  
natae.

1545. TENTHREDO *Scrophulariae* antennis septemnodiis lu-  
teis, ab domine cingulis quinque flavis: primo remoto re.

Tenthredo antennis septenodiis, nigra; segmentorum abdo-  
minalium marginibus, excepto secundo & tertio, flavis.

*Fp. 935.*

Blackwell, herb. t. 87. f. 10.

Habitat in *Scrophularia* omni, præcipue in *nodosa*, quam omni anno devastat.

**DESCR.** *Caput* nigrum. *Maxilla* nigra, dentata; *Oris labium superius* flavum; sub singulo oculo lineola flava. *Antennæ* ferruginea sive fulvæ, clavatae, septem articulis, excepto infimo. *Thorax* niger a basi ad alas utrinque linea flava. Ad latera baseos punctum utrinque flavum, & sub alæ insertionem macula flava; apex thoracis puncto flavo gemino, altero post alterum; ad basin femoris tertii parvis macula flava. *Abdominis* nigri segmenta 1 4 5 6 7 8 9 lineis flavis terminantur, non vero 2 3, ergo spatium latius inter lineam primam & secundam flavam tergi; subtus omnia segmenta margine flava sunt. *Femora* omnia nigra, sed tibiæ rufæ. *Alæ* hyalinæ, puncto marginali ferrugineo, & margine exteriore alarum majorum ferrugineo. *Facies* & *magnitudo* vespæ. *Mas* femoribus posticis subtus linea flava. *Femina* aculeo brevi.

*PUPPA* pedibus instructa jacet intra terræ glebani (ad radices *Scrophulariæ*) excavatam uti *Scarabæi Pupa*, ubi delitescit a præcedenti anno per hyemem in primum junii.

*LARVA* nivea, longitudine digitu transversi, crassitie pennæ anserinæ; capite nigro: pedibus 6 & 16 seu 22; tota superna superficie punctis nigris notata, quorum intermediâ dorsalia paulo majora.

1546. TENTHREDO *Abietis* antennis septemnodiis, corpore nigro, abdominis segmentis quatuor ferrugineis. *Syst. nat.* 10. p. 556. n. 13 & 27.

Tenthredo antennis septinodiis, abdome flavo: pone nigro. *Fn.* 928.

*Frisch. germ.* 2. p. 12. t. 1. f. 21. 22. 23. 24.

Habitat frequens in *Abietibus Upsaliensibus* mense Majo.

**DESCR.** Alæ incubentes, nigricantes, diaphanæ. *Abdominis* tres vel quatuor anteriores articuli rufescentes. *Corpus* reliquum nigrum. *Pedes* rufi.

1547. TENTHREDO *Cerasi* antennis septemnodiis, corpore nigro, pedibus luteis, scutello flavo.

*Reaum. ins.* 5. t. 12. f. 1-5.

Habitat in *Cerasi* foliis, quæ mutanda involvit.

**DÉSCR.** *Corpus* & omnia nigra, exceptis pedibus omnibus pallidis. *Scutellum* in hac flavescens est, & punctum laepius flavum ante alas.

1548. TENTHREDO *Salicis* antennis septemnodiis, corpore flavo, vertice capitis thoracisque nigro.

Tenthredo antennis septinodiis, flava; capitis vertice thoracisque medio nigris, macula alarum ovata. *Fn.* 927.

Habitat in *Salicibus* variis.

**DESCR.** *Abdomen* absque petiolo thoraci adnatum, totum flavidum. *Thorax* flavidus, sed in medio tergi macula magna nigra, & subtus inter pedes priuarios & secundarios macula magna nigra. *Caput* pone oculos nigrum. *Antennæ* fuscæ, 7 articulis, subulatae. *Alæ* incubentes, membrana-

branaceæ, reticulatæ, cum puncto marginali nigro. Pedes flavi, sed palmæ posteriores nigricantes.

1549. TENTHREDO *mesomela* antennis septemnodiis, abdome subflavo, dorso nigro arcubus flavescentibus.

Tenthredo antennis septinodiis, dorso nigro lineis pallidis transversis arcuatis recurvis. Fn. 936.

Habitat in Ostrogothia. Fr. Hasselquist.

*DESCR.* Alæ membranaceæ: majores margine exteriore nigro punctoque nigro oblongo. Femora & Tibiae pallidæ, postice nigræ. Oculi atri. Abdomen subtus flavum, a tergo nigrum lineis ad latera retrorum flexis pallidis s. singulo segmento macula magna semicirculari testo, margine postico & lateralí pallido. Scutelli apex flavo-albicans, intra quem macula flava & ad ejus latera puncta duo minima pallida. Antennæ nigræ, semper articulis.

1550. TENTHREDO *rufipes* antennis septemnodiis, corpore nigro, abdomine cingulis duobus luteis, pedibus rubris.

Habitat ruri.

*DESCR.* Media. Corpus nigrum. Antennæ filiformes. Ovis labium flavum, acuminatum. Abdomen cingulis duobus: priore fulvo, posteriore flavo. Pedes fulvi plantis nigris; posticæ tibiæ basi nigræ.

1551. TENTHREDO *campestris* antennis septemnodiis, corpore nigro, abdominis cingulo flavo inæquali, antennis tibiisque flavis.

Habitat ruri.

*DESCR.* Media. Corpus nigrum. Antennæ flavae, punctum ferrugineum ante oculos. Scutellum flavum. Abdomen luteum apice & basi atrum. Femora nigra. Tibiae & Plantæ flavae. Alæ macula ferruginea.

1552. TENTHREDO *atra* antennis septemnodiis, corpore atro, pedibus rubris.

Habitat ruri.

*DESCR.* Media. Corpus atrum. Os flavum. Pedes ferrugineo-rufi.

1553. TENTHREDO *ovata* antennis septemnodiis, corpore atro, thorace supra rufo.

Habitat ruri.

*DESCR.* Statura Tenth. Pini, ovata, gibba, capite thoraceque punctis scabria.

1554. TENTHREDO *viridis* antennis septemnodiis, corpore viridi, abdomine supra fusco.

Habitat ruri.

*DESCR.* Media. Corpus flavo-virens. Antennæ nigræ, setaceæ. Oculi nigri.

# INSECTA HYMENOPTERA TENTHREDO 393

nigri. Caput inter oculos nigrum. Thoracis dorsum nigrum. Abdomen dorso nigrum. Femora & Tibiae linea longitudinali exteriore nigra.

1555. TENTHREDO *Rosa* antennis septemnodiis, corpore flavo, costa alarum superiorum longitudinali nigra.

Tenthredo antennis septinodiis, corpore flavo, macula alarum longitudinali sternique nigra. Fn. 929.

Act. upf. 1736. p. 29. n. 14. Ichneumon alis planis luteis: margine exteriore nigris, collari nigro.

Habitat in *Rosa* foliis.

DESCR. Abdomen flavum. Thorax flavus, in medio tergi & medio sterni niger: Oculi & caput nigra. Pedes flavi, sed palmæ omnes articulis nigris. Antennæ nigrae, filiformes 7 articulis; singulare est, quod punctum marginale alaruin, non ovatum sit, sed extensum longitudinaliter cum margine exteriore alæ ad ipsam basin, nigrum.

1556. TENTHREDO *cincta* antennis septemnodiis, corpore atro, abdomine cingulo albo.

Habitat in *Rosa*.

DESCR. Minor. Corpus atrum. Antennæ filiformes. Abdomen cingule albo. Femora nigra basi alba. Tibiae rufæ, basi albæ.

1557. TENTHREDO *livida* antennis septemnodiis, corpore atro, abdomine supra infraque livido.

Ichneumon ater, femoribus testaceis, antennis medio albis. Fn. 955.

Habitat ruri.

DESCR. Caput nigrum. Os album. Antennæ filiformes, nigrae, versus apicem nigrum albæ. Femora rufa, a tergo fusca. Thorax niger. Abdomen livido ferrugineum basi nigrum. Plantæ posticæ nigrae. Alia, forte sexus differentia, abdomine toto atro.

1558. TENTHREDO *septentrionalis* antennis septemnodiis, pedibus posticis compressis dilatatis.

Habitat in pratis rusticorum.

DESCR. Minor. Caput & Thorax nigra. Antennæ nigrae, setacea, longitudine fere corporis. Abdomen ferrugineum, basi nigrum. Pedes ferruginei. Tibiae posticæ basi albide, apice dilatato nigrae, uti etiam tarsus niger dilatatus.

1559. TENTHREDO *duodecim-punctata* antennis septemnodiis, corpore atro: punctis duodecim albis.

Habitat in pratis.

DESCR. Corpus totum nigrum. Macula alba utrinque ante alas in thorace. Scutellum album. Tria segmenta abdominis macula utrinque alba. Ultimum segmentum abdominis apice album. Femora secundi paris magna alba. Tibiae annulo flavo. Labia flava.

1560. TENTHREDO *erythrocephala* antennis setaceis, corpore cæruleo, capite rubro.

*Uddm.* diff. 89.

Habitat in *Pinus sylvestris*.

DESCR. Media. *Corpus Alæ & omnia cæruleascentia. Caput rubrum. Antennæ & oculi nigri. Mas ater, solum Maxillæ & Labium oris flavum. Tibiæ anticæ flavescentes.*

1561. TENTHREDO *sylvatica* antennis setaceis, corpore nigro, pedibus thoracisque characteribus flavis.

Tenthredo nigra, pedibus flavis, thoracis characteribus flavis. *Fn. 931.*

Habitat in sylvis.

DESCR. *Caput nigrum, postice duabus lineolis flavis: maxillæ rufo-bidentatae. Thorax niger, apice flavo, laterisque basi tuberculo flavo. Abdomen nigrum. Pedes flavi, sed femora 1. 2. versus basin nigra. Alæ nigro-nitidæ venis atris: macula marginali ovata, atra. Antennæ setaceæ; articulis plus quam triginta.*

1562. TENTHREDO *nemoralis* antennis setaceis, corpore atra, abdominis segmentis lateralibus albis.

Habitat in nemoribus.

1563. TENTHREDO *Cynobati* antennis setaceis, pedibus ferrugineis: posticis albo nigroque annulatis. *Fn. 937.*

*Reaum. gall. 5. t. 14. f. 1. 2. 3. &c.*

Habitat in *Rosæ* foliis.

DESCR. Inter parvas est; *Facies ichneumonis. Abdomine linearis, totus ater; sed femora & tibiæ & palmæ omnes ferrugineæ, exceptis posticis albo nigroque variis; Antennæ atræ 18 articulis.*

1564. TENTHREDO *reticulata* antennis setaceis, alis pallido fuscoque variis: venis elevatis albis reticulatis.

Habitat in Finlandia.

DESCR. Media. *Caput flavum, nigro variegatum. Antennæ setaceæ, nigrae. Thorax niger, antice lamina transversa flava. Abdomen flavum, ano nigro. Pedes nigri. Alæ fuscæ, albo variegatae, venis etiam elevatis albis reticulatae.*

1565. TENTHREDO *Betulae* antennis setaceis, corpore rubro, thorace ano oculisque nigris, alis postice fuscis.

Habitat in *Betulis*. D. C. Solander.

DESCR. Magnitudo & Statura T. erytrocephalæ. *Antennæ setaceæ, rubrae, apice fuscæ, articulis 24. Caput rubrum lineis 2 longitudinalibus. Oculi nigri; Puncta 3 conglobata verticis. Thorax niger, antice ruber. Abdomen rubrum postico segmento nigro. Pedes rubri. Alæ glaucæ, versus apices fuscæ.*

1566. TENTHREDO *saltuum* antennis setaceis, corpore nigro, abdomine luteo.

Habitat apud nos passim.

1567. TENTHREDO *flava* flava, alarum macula ferruginea.

*Fn. 930.*

*Reaum. inf. 5. t. 10. f. 6, 7.*

Habitat in pratis tempore vernali.

DESCR. Magnitudo Formicæ minoris. *Corpus* ventricosum, totum flavum. *Oculi* nigri. *Alæ* flavo-griseæ: in medio macula ferruginea obsoleta.

1568. TENTHREDO *intercus* nigra, pedibus flavis.

Habitat in *Arctii Lappæ* foliis subcutanea; etiam in *Atropæ* foliis.

DESCR. Magnitudo culicis. *Corpus* nigrum. *Antennæ* corpore longiores, nigrae. *Pedes* longi, flavi. *Alæ* opalinæ puncto marginali flavo; e subcutanea *Atropæ*.

1569. TENTHREDO *Rumicis Rumicis Lapathi*.

*Reaum. inf. 5. t. 10. f. 13, 14.*

Habitat in *Rumicis Lapathi* foliis.

1570. TENTHREDO *Ulmi Ulmi campestris*.

*Reaum. inf. 5. t. 10. f. 16.*

Habitat in *Ulmi campestris* foliis.

1571. TENTHREDO *Alni Betulæ Alni*.

*Reaum. inf. 5. t. 11. f. 1, 2.*

Habitat in *Alni* foliis frequens.

1572. TENTHREDO *Salicis*.

Tenthredo salicina: Larvæ cæruleo-viridis, pectori cauda-que fulva. *Fn. 933.*

*Frisch. germ. 6. p. 9. t. 4.* Ichneumon flavus larvæ viridis nigro punctatæ.

*Goed. belg. 1. p. 65. t. 19.*

*List. goed. 125. t. 49.*

*Reaum. gall. 5. t. 11. f. 3.*

Habitat in *Salice fragili & caprea* frequens.

DESCR. *LARVAM* solam vidi, quæ frequens est. Totum *Corpus* cæruleum sive viridi-cæruleum, 9 ordinibus longitudinalibus macularum nigrarum; sed tria segmenta prima corporis, & tria postrema, fulva sunt, tamen nigro punctata. *Caput* nigrum, glabrum: *Pedum* tria paria in fulva pectoris parte, dein 6 paria in parte corporis cærulea, tum unum par in cauda fulva; summa 20 pedes.

## Sirex.

1573. SIREX *Gigas* abdomine ferrugineo: segmentis 3, 4, 5,  
6. nigris, thorace villoso.

Tenthredo nigra, artibus ferrugineis, ani corniculo cylindrico. Fn. 925.

*Aet.-ups.* 1736. p. 28. n. 1. Ichneumon flavus, abdomine medio nigro, cauda acuta, aculeo umbilicali triplici exerto.

Reaum. gall. 6. t. 31. n. 1. 2.

De Geer inf. 1. t. 36. f. 1, 2.

*Aet. Stockh.* 1739. t. 3. f. 7.

Habitat passim, nec infrequens.

DESCR. Major reliquis: Caput nigrum, pone oculos flavum. Thorax niger totus, hirtus, basi utrinque flavescente puncto prominulus. Alæ ferrugineaæ. Antennæ corpore dimidio breviores, luteæ, 22 articulorum. Abdomen cylindrico-oblongum, incisuris tribus posticis, duabusque primis, luteis; at 3. 4. 5. 6. maxima ex parte nigra; ultimum segmentum obesusum, terminatum corniculo recto, tereti, acuto; abdomen subtus atrium, e cuius medio rima versus posteriora fissa, e qua exit aculeus rectus, niger, corniculo abdominalis longior, rigidus, compositus e tribus setis conjunctis. Femora brevia, nigra; tibiæ & palmæ omnes luteæ.

1574. SIREX *Spectrum* abdomine atro, thorace villoso: litura ante alas lutea.

Tenthredo atra; pedibus ferrugineis: ani apice depresso acuto. Fn. 926.

De Geer inf. 1. t. 36. f. 6.

Habitat in Ligno antiquo.

DESCR. Magnitudine cum precedenti certat. Tota atra. Thorax & Cnæpt. hirsuta: Abdomen glabrum, novem articulis: extimus articulus sive ani terminatur spina crassa, acuta, depressa, non vero, ut in praecedenti, cylindrica. Aculeus triplex incipit sub medio abdominalis & protenditur ultra ani spinam. Alæ subfuscæ. Antennæ nigrae, versus basin fusca, articulis 20. femora, tibiæ, palmæ ferrugineaæ.

1575. SIREX *juvencus* abdomine atro-cærulescente, thorace unicolori villoso.

Ichneumon nigro-cærulescens subhirsutus, abdomine sessili, pedibus flavescentibus. Fn. 954.

De Geer inf. 1. t. 36. f. 7.

Habitat in Roslagia.

DESCR. Media magnitudinis. Alæ longitudine abdominalis, latiores, margine exteriore fuscæ. Corpus atrum, cærulescens. Antennæ corpore dimidio breviores, basi testacea. Pedes testacei.

1576. SIREX *camelus* abdomine atro lateribus albo-maculato, thorace lœvi.

*Uddm. diff.* 82.

Habitat in Ligno antiquo corrupto.

DESCR. Minor. *Corpus* nigrum. *Caput* versus occiput lunulis duabus albis, & punctum album ante oculos. *Antennæ* nigrae, basi ferruginea thorace breviores. *Thorax* lœvi scutulus, litura alba ante alas. *Abdomen* atrum, segmentis singulis utrinque macula acuta alba. *Pedes* ferruginei.

1577. SIREX *marisca* abdomine testaceo: segmentis duobus ultimis nigris, thorace subvilloso.

Habitat Upsaliæ. *P. O'sbeck.*

DESCR. Statura & facies S. gigantis, sed dimidio minor. *Antennæ* flavæ, longitudine dimidii corporis. *Caput* nigrum, ad latera postica luteum. *Thorax* niger, subvillosum. *Pedes* quatuor priores flavi; duo postremi nigri geniculis flavis. *Abdominis* flavi segmentum primum & duo ultima nigra.

## Ichneumon.

1578. ICHNEUMON *sugillatorius* scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine atro segmentis tribus utrinque puncto albo.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. Medius. *Antennæ* nigrae annulo albo, *Caput* nigrum. *Thorax* niger, immaculatus, scutello albo. *Abdomen* nigrum: segmentis tribus priuis margine lateralí puncto albo. *Pedes* nigri. *Tibiae* antice anterius pallidæ.

1579. ICHNEUMON *raptorius* scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque luteis, reliquis apice albis.

Habitat in pratis.

DESCR. Medius. *Caput* & *Thorax* nigra, immaculata. *Scutellum* albidum. *Antennæ* basi undique flavae. *Pedes* lutei, sed femora 4 posteriora nigra. *Abdominis* segmentum 1 nigrum; 2, 3 ferruginea; 4, 5 atra; 6, 7 atra macula sulphurea.

1580. ICHNEUMON *sarcitorius* scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento tertio posterius secundoque ferrugineis, sexto flavo.

Ichneumon niger; abdominis segmentis duobus anticis ferrugineis, apice thoracis flavo. *Fn. 976.*

3 Ichneumon abdomine antice ferrugineo: postice nigro: incisuris flavis, antennis annulo albo. *Fn. 984.*

Habi-

## 398 INSECTA HYMENOPT. ICHNEUMON.

Habitat Upsaliæ. *Orta ex p. 1736. n. 23.*  
DESCR. Antennæ, caput, thorax nigra, sed Scutellum albido flavum & punctum flavum sub basi alæ. Abdominis periolus niger, duo segmenta prima ferruginea, ita tamen, ut basis posterioris ferruginea, segmenti nigrans sit; hinc pars abdominis ferruginea quasi linea transversa notata: quatuor reliqua abdominis segmenta nigra sunt. Pedes ferruginei, sed postice femoribus & tibiis apice nigris. Antennæ luteo annulatae, apice nigrae.

1581. ICHNEUMON *extensorius* scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, ultimis apice albis.

Ichneumon ab domine antice ferrugineo: postice nigro immaculato, antennis annulo albo.

Aet. upf. 1736. p. 50. n. 23. Ichneumon antennis spiralibus, ab domine nigro, articulis duobus superioribus testaceis.

Habitat cum præcedentibus.

DESCR. Antennis nigris; Cingulo albo; capite nigro; thorace nigro apice flavo; pedibus luteis, femoribus nigris; alis glaucis, ab domine nigro segmento secundo & tertio ferrugineo; reliquis immaculatis.

1582. ICHNEUMON *qaesitorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdominis tribus ultimis segmentis dorso macula flava.

Habitat passim.

DESCR. Medius. Corpus totum nigrum, Thorax immaculatus puncto minutissimo albo sub basi alæ. Pedes omnes ferruginei. Antennæ annulo albo. Abdominis tria ultima segmenta supra macula parva sulphurea.

1583. ICHNEUMON *culpatorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, reliquis nigris.

Habitat in pratis.

1584. ICHNEUMON *infractorius* scutello flavo, thorace maculato, abdominis segmentis omnibus margine albidis, pedibus ferrugineis.

Habitat Calmariæ. A. Modeer.

DESCR. Minor. Corpus nigrum. Antennæ annulo albo. Oculi margine flavi. Thorax lineola flava ante alas; puncto flavo supra pedes. Scutellum duplex flavidum. Abdominis segmenta margine flava. Pedum posticorum genua nigra.

1585. ICHNEUMON *constrictorius* scutello flavicante, thorace bidentato submaculato, abdominis segmento secundo ferrugineo.

Habitat passim, non infrequens.

DESCR.

**DESCR.** Medius, niger. *Antennæ* longitudine thoracis, nigrae, albo semi-annulatae. *Thorax* puncto sub basi alarum & scutello flavo s. albido. *Abdominis* segmentum secundum ferrugineum s. rufum.

1586. ICHNEUMON *saturatorius* scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis nigri segmento ultimo albido.

*De Geer. inf. 1. t. 23. f. 16.*

Habitat passim.

**DESCR.** Corpus nigrum, immaculatum: *Antennæ* annulo albo. *Scutellum* album. *Pedes* ferruginei tibiis posticis nigris. *Anus* albus sequitur altero segmento.

1587. ICHNEUMON *molitorius* scutello albo, thorace im-  
maculato abdominis apice tibiarumque basibus albis.

Habitat ad Liumkihl. *P. Forskål.*

**DESCR.** Medius, totus ater. *Antennæ* medio albae. *Abdominis* summus apex puncto albo. *Tibiae* omnes basi albae. *Alae* hyalinæ.

1588. ICHNEUMON *crispatorius* scutello flavicante, thorace submaculato, abdomine toto luteo-ferrugineo: apice sub-  
fuscescente.

Habitat apud nos passim.

**DESCR.** Medius. Corpus nigrum. *Antennæ* versus basin flavo-annulatae. *Thorax* vix maculatus, nisi puncto subferrugineo ad basin alarum. *Scutellum* flavum. *Pedes* flavi: *Femora* nigricantia, apicibus flava. *Abdominis* segmentum, flavum; 2 flavum basi ferruginea; 3 ferrugineum; 4. 5. ferrugineo-fuscescencia.

1589. ICHNEUMON *Pisorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdomine toto luteo.

α Ichneumon niger, abdomine tibiisque ferrugineis, anten-  
narum medio albo. *Fn. 966.*

β Ichneumon niger, abdomine tibiisque ferrugineis, antennis annulo albo. *Fn. 968.*

Habitat in Larvis *Phalænae Pisi*.

**DESCR.** Est hic e majoribus generis. *Caput* nigrum: oculi nigricantes: *Antennæ* nigrae, spiraliter inflexæ, in medio albi instar annuli, licet vix perfecti, qui cingit antennas. *Thorax* niger; a capite versus a-  
las utrinque linea albida; sub alarum insertionibus punctum albicans. *Femora* nigra omnia, sed tibiæ & palme omnes pallide ferrugineæ. *Ab-  
domen* ferrugineum totum, sed petiolus abdominis niger est. *Alae* membranacei coloris, puncto marginali ferrugineo.

1590. ICHNEUMON *luctatorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmento secundo tertioque luteis.

Ichneumon niger, tibiis segmentoque secundo tertioque ab-  
dominis flavis. *Fn. 983.*

Habi-

Habitat *Upsaliæ*. R. Hast.

**DESCR.** Caput, thorax, antennæ nigra, ante oculos utrinque macula flava. apex Thoracis flavus, punctum flavum sub basi alarum. *Abdominis* primum segmentum est petiolus niger: reliqua segmenta depressa, quorum secundum & tertium flavum, reliqua nigra, sed quartum tribus maculis obsoletis ferrugineis. Femora nigra: Pedes flavi, geniculis nigris.

1591. ICHNEUMON *volutatorius* scutello flavicante, thorace variegato, abdominis segmentis omnibus dorso flavis.

## Habitat apud nos frequens.

**DESCR.** Medius. Caput flavidum, nigro varium. Thorax niger, flavo variegatus: maculae 2 supra basin; 2 sub alis: inferiore majore; 3 posticæ: intermedia lunata. *Abdominis* segmenta dorsalia flava, basi nigra. Pedes ferruginei. Antennæ nigrae, subtus longitudinaliter flavae.

1592. ICHNEUMON *vaginatorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdominis segmentis margine flavis: primo quintoque unicolore.

## Habitat apud nos frequens.

**DESCR.** Medius. Corpus nigrum, macula flava ante singulum oculum. Thorax puncto flavo sub basi alarum. *Abdominis* segmenta margine flava. Pedes anteriores lutei; posteriores duo femoribus & tibiis basi ferrugineis. Antennæ nigrae, subtus longitudinaliter pallidae.

1593. ICHNEUMON *persuasorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdome atro: segmentis omnibus utrinque punctis duobus albis.

Ichneumon niger, fronte punctisque abdominis albidis, pedibus rufis. Fn. 964.

*De Geer. inf. I. t. 36. f. 7.*

*Aet. upf. 1736. p. 29. n. 19.* Ichneumon niger, abdome cylindraceo punctato; pedibus rubris, alis albidis.

## Habitat apud nos rarius.

**DESCR.** Antennæ nigrae. Caput nigrum, fronte flavo-albida. Thorax niger, macula linearis albida supra insertionem alarum. Abdomen cylindricum, longum, nigrum, punctis duobus albis ovalibus transversis ad marginem singulare incisuræ abdominis a tergo. Pedes rufi, sed posticii tibiis nigri. Alæ parum glaucae cum punto marginali oblongo atro, Quibusdam *Aculeus* niger, longitudine corporis vel longior.

1594. ICHNEUMON *littorarius* scutello flavicante, thorace maculato, abdome nigro: segmentis quatuor medio flavis, pedibus ferrugineis.

## Habitat ruri. G: Blom.

**DESCR.** Minor. Corpus nigrum. Antennæ subtus pallidiores. Frons verius flava. Thorax scutello minutissimo flavo; lineola lutea inter caput

capit & alas utrinque. Abdomen subfessile: incisuris quatuor margine medio, nec ad latera se extende, lineola lutea. Pedes ferruginei; plantis posticis fuscis.

1595. ICHNEUMON *designatorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdomine atro: segmentis primis quatuor utrinque puncto albo.

Ichneumon ater, tibiis nigris, abdomine maculis utrinque quatuor albis. Fn. 965.

Habitat frequens apud nos.

DESCR. Corpus totum nigrum sive atrum, sed macula utrinque ante oculos alba; duo alba puncta supra os. Thorax ante alarum basin utrinque linea alba a capite ducta cum puncto albo, & subius puncto albo. Apex thoracis albus cum lineola alba transversa. Abdomen longum, segmentis 1. 2. 3. 4. utrinque macula sive puncto albo: horum 1 segmentum petiolus est. Aculens nullus manifestus.

1596. ICHNEUMON *edictorius* scutello flavicante, thorace maculato punctis utrinque duobus, abdomineque toto atro.

Ichneumon ater, tibiis apiceque thoracis albis. Fn. 960.

Habitat in pratis.

DESCR. Medianus est magnitudinis, totus ater; Antennae etiam nigrae; apex thoracis in tergo solus albus. Femora nigra. Tibiae omnes albæ, ut & palmæ in primis pedibus. Abdomen sublunulatum. Punctum marginale alarum pallidum.

1597. ICHNEUMON *deliratorius* scutello flavicante, thorace maculato punctis utrinque tribus, abdomineque toto atro, tibiis albis.

Habitat passim.

DESCR. Medianus. Corpus nigrum. Labium albidum. Thorax niger: puncta tria vix conspicua albida ad basin alter. Scutellum album. Abdomen oblongum nigrum. Pedes nigri: Tibiae & Tharsi basi albidi.

1598. ICHNEUMON *fusorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdomine luteo: petiolo nigro.

Habitat passim.

DESCR. Magnitudo Ich. pisorii. Corpus nigrum. Frons linea lutea ante singulum oculum; puncta duo lutea ad exoptatum alatum. Abdomen luteum, petiolo s. primo segmento nigro. Femora nigra; tibiae luteæ.

1599. ICHNEUMON *fessorius* scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine toto atro, pedibus rufis.

Habitat frequens in campis.

DESCR. Medianus. Antennæ nigrae. Caput nigrum; fronte flavâ duabus maculis. Thorax niger. Scutellum albidum; Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.

1600. ICHNEUMON *comitator* ater totus, antennis fascia alba.

Habitat in sylvis.

DESCR. *Corpus* totum nigrum, immaculatum. *Alæ* etiam obscuriores. *Antennæ* in medio, ab uno latere, albæ.

1601. ICHNEUMON *peregrinator* niger, pedibus subclavatis abdomineque ferrugineis: segmentis duobus ultimis nigris, ano albido.

Habitat in Pratis.

DESCR. Pediculo duplo major.

1602. ICHNEUMON *incubitor* niger, abdomine ferrugineo: apice nigro macula alba, alis hyalinis, antennis subfasciatis.

*Ichneumon niger*, abdomine ferrugineo apice nigro: antennis annulo albo. *Fn. 970.*

*Act. upf. 1736. p. 29. n. 7.* *Ichneumon aculeo triplici, pedibus abdomineque testaceis, apice nigro.*

Habitat inter flores passim, nec non in sylvis.

DESCR. *Caput & Thorax* nigra. *Antennæ* nigrae, annulo albo. *Pedes* omnes rufi. *Abdomen* obverse ovatum, ferrugineum, ultimo articulo nigro: *Aculeo* parvo triplici. *Alæ* membranaceæ.

1603. ICHNEUMON *reluctator* niger, abdomine medio piceo, tibiis anticis clavatis.

Habitat in campis.

DESCR. *Medius*. *Corpus* nigrum. *Antennæ* niveo annulo. *Abdomen* nigrum, in medio relucens obsolete ferrugineo. *Tibiae* piceæ. *Aculeus* abdomine longior.

1604. ICHNEUMON *denigrator* corpore atro, alis nigris lunula hyalina, abdomine testaceo subsessili.

Habitat in pratis.

DESCR. *Medius*. *Corpus* atrum, lave. *Antennæ* vix longitudine corporis. *Abdomen* subsessile, flavum. *Aculeus* niger longitudine corporis, *Alæ* nigrae: superiores in medio lunula albida. *Alium* vidi simillimum absque alarum lunula albida, *Aculeo* corpore dimidio breviore.

1605. ICHNEUMON *desertor* corpore luteo, alis fuscis: fasciis duabus albis.

Habitat in pratis.

DESCR. *Parvus*. *Corpus* totum flavum. *Oculi & Antennæ* corpore breviore, nigrae. *Alæ* fuscescentes: medio litura alba. *Aculeus* corpore brevior.

1606. ICHNEUMON *corruscator* corpore artubusque atris, alis fusco-hyalinis.

Habi-

Habitat in pratis.

1607. ICHNEUMON *rutilator* corpore nigro immaculato, antennis subtus, ab domine pedibusque quatuor anterioribus ferrugineis

Habitat Calmariæ. Modeer.

DESCR. *Medius*. Antennæ subtus longitudinaliter flavescentes. Caput fronte quadrata lutea. Thorax immaculatus. Abdomen excepto periolo nigro ferruginetum. Scutellum immacularum. Pedes quatuor priores subferruginei; postici duo nigri.

1608. ICHNEUMON *manifestator* corpore atro immaculato, ab domine sessili cylindrico, pedibus rufis.

*Ichneumon ater*, pedibus rufis. Fn. 959.

Raj. inf. 256. *Vespa Ichneumon tota nigra*; præter pedes, qui crocei sunt.

ib. *Musca tripilis* corpore tenui admodum & prælongo, setis a cauda, omnium, quas unquam vidi, longissimis, excentibus.

De Geer inf. 1. t. 36. f. 9.

Aet. upf. 1736. p. 29. n. 3. *Ichneumon cauda tripili*, ab domine tereti atro, pedibus filiformibus rubris,

Habitat passim in arenosis.

DESCR. *Corpus* rotundum antennis, capite, thorace, ab domine, aculeo nigrum; *Aculeus* filiformis, niger, constans setis tribus, (intermedio rubro,) corpore longioribus. *Abdomen* cylindricum. *Pedes* longi, toti rufi. *Alæ* macula nigricante marginali.

1609. ICHNEUMON *compunctator* corpore atro immaculato, ab domine subpetiolato oblongo, pedibus rufis: tibiis posticis apice nigris.

*Ichneumon ater*, femoribus pedibusque testaceis, antennis subtus pallidis. Fn. 957. 958.

Habitat apud nos frequens in *Pupis Papilionum*.

DESCR. *Minor*. *Corpus* nigrum. *Antennæ* corpore dimidio breviores, *Palpi* setacei, lutei. *Pedes* omnes ferruginei; postremi plantis fuscis; *Abdomen* nigrum. *Aculeus* brevis. *Antennæ* subtus luteæ.

1610. ICHNEUMON *delusor* corpore nigro, ab domine ferrugineo basi apiceque nigro, femorum posticorum patellis foliis nigris.

Habitat in pratis.

1611. ICHNEUMON *titillator* corpore nigro, ab domine ferrugineo basi apiceque nigro, pedibus posticis nigris: planitis albis.

*Ichneumon niger*, abdomine medio pedibusque anterioribus rufis, palmis posticis albis. *Fn.* 982.

Habitat passim.

DESCR. *Medius*. *Corpus capite, thorace, pedibus antennisque nigris immaculatis* *Abdomen ferrugineum, petiolo & apice nigrum, Pedes anteriores ferruginei; Pedes posteriores nigri plantis albis*.

1612. ICHNEUMON *venator* corpore atro immaculato, abdominis basi subtus incarnata, pedibus rufis, aculeo retractili.

Habitat in Pratis.

1613. ICHNEUMON *extensor* corpore nigro immaculato, abdomine cylindrico, pedibus rufis, palpis setaceis.

*Ichneumon linearis*; *antennis longitudine corporis, tentaculis setaceis, femoribus clavatis*. *Fn.* 986.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. *Est longitudine Culicis, valde tenuis & oblongus, Pedes testacei. Femora clavata. Abdomen clavatum. Antennæ longitudine corporis, in Cauda tres setæ longitudine corporis. Alæ complicatae five incumbentes, macula ferruginea marginali. Duæ setæ five tentaculu ad os longitudine thoracis, albæ, alter sexus caret setis in cauda.*

1614. ICHNEUMON *exarator* corpore piceo immaculato, abdomine femoribusque clavatis, palpis setaceis, alis macula nigra albaque.

Habitat in pratis.

DESCR. *Corpus parvum, angustum. Pedes longiusculi. Aedeus corpore longior.*

1615. ICHNEUMON *Turionellæ niger*, abdomine cylindrico, macula alarum fusca albæ inserta, tibiis ferrugineis albo annulatis.

Habitat in *Phalæna Turionellæ Larvis*.

DESCR. *Minor. Corpus atrum. Tibiae omnes ferrugineæ annulo albo basi propiore. Aedeus abdomine brevior.*

1616. ICHNEUMON *Strobilellæ niger*, aculeo corpore longiore, pedibus lutescentibus, tibiis posticis digitoque nigris albo annulatis.

*Ichneumon niger*, abdomine ferrugineo: apice nigro, antennis nigris. *Fn.* 971.

*Aet. upf. 1736 p. 29. n. 5. Ichneumon niger, cauda exserta triplici, pedibus anterioribus abdominalaque luteis.*

Habitat in *Phalæna Strobilellæ Turionellæque Larva*.

DESCR.

**DESCR.** Antennæ, caput, thorax nigra. Abdomen ovatum, ferrugineum ultimo articulo nigro. Pedes ferruginei, sed femora postica nigra. Aculeus triplex, longitudine fere abdominalis. Alæ glaucæ.

1617. ICHNEUMON *Moderator* niger, abdomine petiolato compresso, ore palpato, pedibus pallidis, aculeo corpore subbreviore.

Habitat in *Ichneumonis Strobilella* Larva, qua consumta crano ejus superstite folliculum inædificat. D. Rolander.

**DESCR.** Parvus. Corpus nigrum. Pedes pallide ferruginei, Antennæ longitudine corporis. Aculeus vix corporis longitudine; Alius vero prodiit aculeo corpore duplo longiore; Pedibus quatuor prioribus ferrugineis.

1618. ICHNEUMON *Refinella* niger, pedibus flavis, abdomine subcylindrico sessili, antennis basi luteis.

Habitat in *Phalæna Refinella* Larva.

**DESCR.** Minutus. Corpus atrum, immaculatum, filiforme. Antennarum basi flava. Pedes toti lutescentes.

- 1619 ICHNEUMON *prærogator* niger, pedibus flavis, abdomine oblongo obtuso.

Habitat in *Phalæna Salicis* Larvis.

1620. ICHNEUMON *mandator* niger, abdominalis segmento secundo tertioque ferrugineis: apice supra albo, antennis unicoloribus.

Habitat in pomariis.

1621. ICHNEUMON *enervator* niger, abdominalis primis tribus segmentis rufis apice supra albo, antennis albo fasciatis.

Ichneumon abdomine antice ferrugineo postice nigro maculis quatuor albis. Fn. 978.

Habitat in hortis.

**DESCR.** Caput nigrum, immaculatum. Thorax immaculatus, niger. Abdominis segmentum primum nigrum; secundum & tertium ferrugineum; reliqua nigra cum macula alba in tergo. Pedes rufi; Femora postica nigra.

1622. ICHNEUMON *gravidator* niger, abdominalis segmento primo ferrugineo abdomen dimidium obtegente.

Habitat in nemoribus.

1623. ICHNEUMON *inculcator* niger, abdomine falcato toto ferrugineo.

Ichneumon niger, abdomine toto ferrugineo. Fn. 972.

*Aet. upf. 1736. p. 29. n. 6.* Ichneumon aculeo triplici ere-  
cto, collari nigro, abdomine pedibusque testaceis. *Fn. 972.*  
*Habitat* passim.

*DESCR.* Caput, antennæ, thorax nigra. *Alæ membranaceæ.* *Abdomen* obverse ovatum, ferrugineum. *Pedes omnes feruginei.*

**1624.** ICHNEUMON *pugillator* niger, abdomine falcato; segmentis secundo tertio quartoque rufis, pedibus tenui-  
bus ferrugineis.

*Ichneumon niger;* abdomine antice luteo, pedibusque luteis.

*Fn. 975.*

*Raj. inf. 255.* Vespa ichneumon major & longior, abdo-  
mine multo tenuiore ligamento pectori adnexo.

*De Geer. inf. I. t. 6. f. 12.*

*Aet. upf. 1736. p. 29. n. 16.* Ichneumon niger, abdomine  
falcato superne luteo, alis erectis.

*Habitat* in *Phalenæ Zizzac* larvis.

*DESCR.* Convenit facie cum proxime præcedentibus, est tamen paulo  
minor. *Abdomine* anterius luteo & posterius duobus tribusque segmentis  
nigro convenit cum prioribus duobus; *thorace* undique nigro & petiolo  
abdominis etiam nigro a prædictis differt. *Pedes* maxima parte nigri sunt,  
Aculeo pungit & dolorem excitat.

**1625.** ICHNEUMON *ruspator* niger, abdomine subcylindrico,  
pedibus ferrugineis, femoribus clavatis: posticis dentatis.  
*Habitat* in pratis & hortis.

*DESCR.* Médius. *Corpus* totum nigrum, immaculatum. *Antennæ* et *Pal-  
pi* nigri. *Pedes* ferruginei. *Femora* brevia, clavata: *Postica* subitus den-  
te armata & basi fusca. *Aculeus* longitudine corporis.

**1626.** ICHNEUMON *jaculator* niger, abdomine falcato; seg-  
mentis secundo tertio quartoque rufis, tibiis posticis cla-  
vatis.

*Ichneumon* tibiis posticis clavatis. *Fn. 985.*

*Mouff. lat. 64. f. 121.* *Musca* tripilis I.

*Réaum. gall. 4. t. 10 f. 14.*

*De Geer. inf. I. t. 36. f. 10.*

*Aet. upf. 1736. p. 29. n. 2.* Ichneumon cauda triplici, ab-  
domine superne flavescente, pedibus clavatis.

*p. 29. n. 17.* Ichneumon cauda inermi, abdomine  
falcato, pedibus clavatis.

*Habitat* in *Apis eruncorum*, *florisomnis*, *Sphegisque* figuli  
Larvis; antennis perquirit ubi larva latet, avolat, reddit &  
imponit ei ovum. T. Bergman.

*DESCR.* Caput, thorax, pedes, antennæ nigra. *Aculeus* in *femina tri-  
plex*

plex, niger (intermedio rubro), piliformis, longitudine corporis vel longior, apice albus. *Abdomen* falcatum, petiolo thoraci adfixum, nigrum, sed versus basim rufum. *Pedes* posteriores constant femoribus parvis, his proximus articulus est tibia nigra, minus crassa, & tertius articulus sive tibia inferior crassissima, nigra, clavata; ultimus articulus tenuis basi albus.

1627. ICHNEUMON *affector* niger, abdomine falcato: segmento secundo tertio quartoque latere rufis, tibiis posticis clavatis.

Habitat in campis.

DESCR. Similis antecedenti, at dimidio minor. *Corpus* totum nigrum. *Abdominis* tria segmenta medio ad latera ferruginea. *Tibiae* ad basim annulo lutescente; posticæ clavatae. *Aculeus* abdomine triplo brevior.

1628. ICHNEUMON *luteus* luteus thorace striato, abdome falcato.

*Ichneumon luteus totus.* Fn. 967.

Gæd. belg. 2. p. 135. f. 37.

List. gæd. 59. f. 20. C.

Raj. inf. 253. n. 6. *Vespa ichneumon major tota fulva, alis amplis: anterioribus nota fulva circa medium marginem anteriorem insignibus.*

Act. aps. 1736. p. 29. n. 15. *Ichneumon flavus, abdome falcato, alis erectis.*

Habitat in *Larvis*. Larva hujus adhæret larvæ *Phalænæ* & consumit.

DESCR. Totum corpus, caput, thorax, abdomen, antennæ, pedes, unius ejusdemque coloris *flavi*, vel dilute lutei. *Alæ membranacei* coloris, puncto marginali luteo. *Abdomen* arcuatum, basi angustiore petiolo adfixum. *Antennæ* longitudine fere corporis infinitis articulis. *Oculi* soli nigricantes.

1629. ICHNEUMON *ramidulus* luteus, abdomine falcato apice nigro.

*Ichneumon totus luteus; abdominis apice nigro.* Fn. 969.

Raj. inf. 253. n. 7. *Vespa ichneumon præcedenti congener, sed minor, tum corpore tum alis, verum imo abdome seu cauda nigra.*

Habitat rarius in nemoribus.

DESCR. *Corpus* totum luteum, duo tantum segmenta extima abdominis nigra. *Alæ membranacei* coloris. *Antennæ* longitudine corporis.

1630. ICHNEUMON *glaucopterus* luteus, pectore nigro, abdome falcato, ano nigro.

*Ichneumon ferrugineus; abdominis apice pectoreque inferiore nigro.* Fn. 973.

Habitat rarius in sepibus.

*DESCR.* Antennæ, capitis latéra, pedes, abdominis antica pars, ferruginea; at Thorax subtus & abdominis tria extima segmenta nigra.

1631. ICHNEUMON *circumflexus* niger, abdomine falcato antice luteo, pedibus posticis nigro-geniculatis, scutello flavo.

Ichneumon niger: abdomine antice luteo; pedum geniculis nigris. *Fn.* 974.

Habitat Upsaliæ. *R. Haft.*

*DESCR.* Caput nigrum: linea circum oculos fulva: macula frontis flavâ, & labium flavum. Antennæ ferrugineaæ. Apex Thoracis macula flavâ. Pedet ferruginei, sed postici basi ovati, nigri. Femora & tibiæ apice nigra. Abdomen flavo-ferrugineum; compressum, falcatum, sed apice nigrum; in dorso abdominis linea longitudinalis nigra.

1632. ICHNEUMON *cinctus* ater, antennis pedibusque ferruginea; alis albis: fasciis duabus nigris.

Ichneumon niger; alis albis: fascia dupli nigra: posteriore majore. *Fn.* 984.

Habitat in pratis.

*DESCR.* Parvus est, magnitudine culicis, angustus, totâs niger, antennis tenuissimis rectis. Totum corpus atrum est, sed femora primora rufescunt; alæ aqueæ cum macula magna nigricante postice; & ante hanc lineola transversa nigra.

1633. ICHNEUMON *Muscarum auratus*, pedibus flavis saltatoriis.

*De Geer. inf. 1. t. 32. f. 19, 20.*

Habitat in *Muscarum apbidivorarum* Larvis.

1634. ICHNEUMON *Bedeguaris auratus*, thorace viridi, abdome aureo.

Tenthredo thorace viridi-æneo; abdomine aureo. *Fn.* 939.

*Blank. belg. 188. n. 12. t. 16. quoad descr.*  
*germ. 142. t. 16. f. 5.*

*Aet. nat. cur. ann. 12. obs. 10.*

Habitat in *Cynipidis Rosæ Bedeguare & C. Quercus Gallis.*

*DESCR.* Omnia hujus generis pulcherrima, magnitudine minimæ ferruginea. Antennæ cylindraceaæ, nigrae, corpore dimidio breviores. Thorax æneo-viridis. Abdomen deauratum, ignei coloris. Pedes incarnati. Aculens triplex tetæ instar, longitudine corporis, niger, intermedio rubro.

1635. ICHNEUMON *Juniperi auratus viridis*, antennis nigris, punctoalarum rubro.

Ichneumon viridi-æneus: antennis nigris spiralibus. *Fn.* 987.

Habitat in *Tipula juniperi* intra suam triglochiden.

*DESCR.*

*DESCR.* *Corpus* totum viridi-æneum, magnitudine pediculi; *Antennæ nigrae*, spirales. *Aleæ aquæ*: puncto marginali rubro. *Larva* rubra. *Pupa* ovata, pellucida, aquei coloris.

1636. ICHNEUMON *Puparum auratus cæruleus*, abdomen viridi nitido, pedibus pallidis.

*De Geer. inf. 1. t. 30. f. 18.*

Habitat in *Papilionum pupis*.

1637. ICHNEUMON *Larvarum auratus viridis*, abdomen nigro: macula dorsali purpurascente, pedibus flavis, antennis septemnodiis.

Habitat in *Phalænarum Larvis*.

1638. ICHNEUMON *Gallarum fusco-æneus*, abdomen nigro, tibijs albidis.

Habitat intra *Cynipedis Quercus ramulii* larvas.

*DESCR.* Cynipedem dixisse, nisi locus & alimentum prohibuisset. Si milis ichn. larvarum, sed totus, excepto capite, fusco æneus, *Abdomine* solo nigro. *Tibiae* omnes albæ. *Antennæ* corpore breviores articulis septem.

1639. ICHNEUMON *Cynipedis auratus viridis*, abdomen fusco basi cingulo pallido, pedibus flavescentibus.

*Tenthredo thorace viridi nitente*, abdomen fusco: basi cingulo pallido, pedibus flavescentibus. *In. 942.*

Habitat in *Salice pentandra* ubi *Galla glabrae*.

irregularis ramos, terminantes, intus lamellosoæ, inter quærum lamellas jacet hoc insectum; prodit fine Aprilis; prodit etiam e Pupis Phalæna, quæ vicitaverat foliis *Quercus*.

*DESCR.* Magnitudo vix pulicis, *Caput & Thorax* nitide viridi-sericea. *Abdomen* ovatum, fuscum, basi pallido cingulo cinctum. *Pedes* pallidi. *Antennæ* minus pallidæ, corpore breviores.

1640. ICHNEUMON *Coccorum nigro-æneus*, abdomen cærulecente, pedibus lividis.

*De Geer inf. 1. t. 35. f. 17.*

Habitat in *Coccis*.

1641. ICHNEUMON *Secalis niger*, capite rufo, oculis viridibus.

Habitat in *Phalænis spicarum Secalis*.

*DESCR.* Magnitudo Pediculi. *Caput* rufum. *Oculi* pulchre virides. *Thorax* totus niger. *Antennæ* nigrae, filiformes, longitudine vix corporis. *Aleæ* puncto marginali subrotundo, atro. *Abdomen* ovatum, nigrum, levæ, petiolo scabro. *Aculeus* longitudine abdominis.

1642. ICHNEUMON *subcutaneus* niger, alis hirsutis: macula lunari nigra, antennis subfiliformibus.

*De Geer. inf. I. t. 30. f. 21.*

Habitat in *Larvis subcutaneis* foliorum.

1643. ICHNEUMON *Aphidum* niger, abdomine basi pedibusque anticis genubusque posticis flavis.

*Ichnéumon Aphidum. It. gotl. 307. Fn. 953.*

*Frisch. inf. II. p. 19.*

Habitat in *Aphidibus Cirsii*. Serratulæ arvensis.

DESCR. Ambulat hic super Aphides, magnitudine pulicis, præcedenti similis, totus nig r; abdomine ad basin, ut & pedibus, flavis; sed pedes postici modo ad genicula flavi. Antennæ atræ; cum ova deponat anum versus thoracem inflebit & incurvat aratri instar, eoque pungit vel anum aphidis vel appendiculi apicem.

1644. ICHNEUMON *ovulorum* niger, pedibus rufis, antennis filiformibus longis.

*De Geer inf. I. t. 35. f. 11-13.*

Habitat in *Lepidopterorum ovis*.

DESCR. Alium non nihil diversum vidi ex ovis phalænarum omni pulice minorem, toto corpore attum.

1645. ICHNEUMON *globatus* niger, pedibus ferrugineis.

*Ichneumon serico conglobato albo. Fn. 951.*

*Journal des scavant. 1713. p. 474. Mouche à cotton.*

*Derrb. physico-theol. I. 8. c. 6. n. 21.*

*Raj. inf. 295. n. 13.*

*Frisch. germ. 6. p. 24. t. 10.*

*Reaum. gall. 2. t. 35. f. 6.*

*Act. upf. 1736. p. 29. n. 10. Ichneumon tophos sericeos exstruens.*

Habitat in *Graminum culmis*; circa autumnum in pratis non infrequens est folliculus sericeus, magnitudine ovi columbini, solitarius, albus e quo prodeunt numerosi ichneumones.

1646. ICHNEUMON *glomeratus* niger, pedibus flavis.

*Ichneumon serico conglomerato-flavo. Fn. 952.*

*Gæd. lat. I. p. 59. n. II.*

*List. gæd. 17. n. 7. Alterum experimentum.*

*Wagn. helvet. 226. Vermiculi ex crambide.*

*Raj. Cantabr. p. 35.*

*inf. 254. n. 12. & p. 260. Musca brassicariæ erucæ.*

*Derrb. physico-theol. I. 8. c. 6. n. 21.*

*Reaum.*

*Reaum. gall. 2. t. 33. f. 2. 7. 8.*

*Mer. europ. t. 45.*

*De Geer. inf. I. t. 16. f. 6.*

*Act. upf. 1736. p. 29. n. 11. Ichneumon parasiticus eruca-rum minimus.*

Habitat in Larvis *Papilionis Brassicæ*; quinque Larva illa ad metamorphosin sese accingat moritur, ex ejus corpore prodeunt plurimæ hujus larvæ, a matre antea intra corpus Larvæ majoris sepultæ; haec tum nent singulæ singulum folliculum sericeum, non album sed flavum, unde plurimi folliculi glomerati.

DESCR. *Corpus* nigrum, magnitudine pulicis. *Antennæ* nigrae, corpore longiores; *Pedes* flavi.

### 1647. ICHNEUMON pedinicornis ater, antennis ramosis.

*De Geer. inf. I. t. 16. f. 6.*

*Act. Stockb. 1740. p. 464. t. 1. f. 4-6.*

Habitat in subcutaneis *Quercus* larvis.

## Sphex.

### 1648. SPHEX sabulosa nigra hirta, abdominis petiolo biarticu-lato: segmento secundo tertioque ferrugineis.

*Frisch. germ. 2. t. I. f. 6, 7.*

Habitat in *Terra sabulosa*, quam fodit, inque ea sepelit araneam.

DESCR. Major. *Corpus* totum nigrum. *Thorax* subpubescens. *Abdomi-nis* primum segmentum s. petiolus filiformis, niger; secundum & tertium segmentum in aliis ferrugineum; in aliis ferrugineum dorso nigro.

### 1649. SPHEX clavipes nigra, abdominis petiolo ferrugineo uniarticulato clavato, pedibus clavatis.

Habitat in campis.

DESCR. Parva. *Corpus* nigrum, glabrum. *Antennarum* insimus articu-lus luteus. *Maxillæ* luteæ. *Tibiæ* quatuor anterioreß flavae. *Tibiæ* posticæ clavatae, basi flavae. *Abdomen* ferrugineum. postice magis fuscescens; petiolus clavatus nigricans.

### 1650. SPHEX figulus atra, ab domine subpetiolato: marginibus seg-mentorum lucidis.

Habitat in Parietum ligneorum foraminibus, quæ claudit deposita Aranea & obturat.

DESCR. Magnitudo vix Culicem superat; oblonga, angusta, tota nigra. Alæ fuscescentes absque puncto marginali.

412 INSECTA HYMENOPTERA. SPHEX.

1651. SPHEX *viatica* nigra pubescens, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo: cingulis nigris.

Ichneumon ater, abdominis sessilis segmentis anticis rufis, alis fuscis. Fn. 977.

Frisch. germ. 2. p. 11. t. 1. f. 13.

Raj. inf. 254. n. 9. Vespa ichneumon major, capite, thorace & pedibus nigris, abdominis anteriore parte rubra, posteriore nigra.

Aet. upf. 1736. p. 50. n. 25. Ichneumon ater, alis nigricantibus, abdomine medio superiore testaceo.

Habitat sat frequens in Uplandia.

DESCR. E maximis est, tota atra, uti antennæ, caput, thorax, pedes & alæ. Abdomen ovatum, vix petiolatum, ferrugineo-rufum sive fusco-rufum, exceptis ultimis tribus segmentis nigris. Antennæ breves, arcuatae, articulis decem.

1652. SPHEX *fusca* atra lævis, abdominis segmentis tribus primis subferrugineis.

Habitat ubique in viis & campis arenosis.

DESCR. Simillima Sph. viatica, sed Thorax lævis. Abdominis segmenta tria prima ferruginea marginibus nigris. Maxillæ minores quam in Sph. viatica.

1653. SPHEX *mystacea* nigra, scutello flavo; abdominis segmentis tribus margine flavis: primo interrupto, tibiis ferrugineis.

Habitat Calmariæ. A. Modeer.

DESCR. Facies Vespæ. Antennæ nigre. Caput nigrum: linea supra os transvera, lutea, interrupta. Thorax margine antico, puncto ante alas, scutello luteus. Abdomen sessile, atrum, acutum: segmento 1 supra inacutis duabus luteis; 2, 3, & fere 4 margine luteis. Femora nigra. Tibiae & planæ ferrugineæ. Alæ planæ, adeoque Vespa esse nequit.

1654. SPHEX *pechinipes* nigra glabra, abdomine anteriore ferrugineo, pedibus primariis ciliatis.

Habitat in collibus arenosis.

DESCR. Minor. Corpus totum nigrum, lave. Pedes antici extrorsum tibiis valde ciliatis. Alæ fuscescentes absque punto marginali. Abdominis tria segmenta priora ferruginea.

1655. SPHEX *variegata* nigra tota, alis albo maculatis.

Tenthredo atra, alis nigro alboque maculatis, antennis undecim-nodiis. Fn. 932.

DESCR. Media vel minor, tota atra. Alæ superiores fascia angusta nigra in medio & alia late nigra posteriorius locata; macula alba rotunda ad apicem. Abdomen postice nonnihil pubescens.

1656. SPHEX *colon* nigra, pedibus antennisque rufis, thorace viridi, alis maculis duabus nigris.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Pediculo paullo major. Caput & Thorax viridi-ænea. Antennæ testaceæ. Pedes testacei. Abdomen subcærulescens. Alæ superiores maculis duabus fuscis rotundis: anteriore minore.

1657. SPHEX *sispes* atra, abdomine petiolato, femoribus posticis clavatis denticulatis rufis.

Habitat in Scania. D. C. Solander.

DESCR. Magnitudo formicæ. Corpus atrum. Tibiae posticæ magnitudine fere abdominalis, ferrugineæ, subtus pluriinis denticulis. Abdomen ovatum, brevissimum: petiolo uniarticulato.

1658. SPHEX *gibba* nigra, abdomine ferrugineo apice fusco, alis primoribus apice nigricantibus.

Habitat paßim.

DESCR. Media. Corpus nigrum, exceptis segmentis duobus ultimis abdominalis nigris. Alarum extremitates fuscescentes.

1659. SPHEX *rufipes* atra, abdominalis segmentis utrinque macula alba, alis apice fuscis, pedibus posticis rubris.

Habitat paßim.

DESCR. Media. Corpus totum atrum, glabrum. Abdominis segmenta 2, 3. utrinque puncto albo; 6 vero 1. ultimum supra unico puncto albo. Pedes 4 posteriores tibiis & dimidiis femoribus sanguineis. Alæ omnes extimo nigricantes.

1660. SPHEX *arenaria* abdominalis fasciis quatuor flavis: primo segmento duobus punctis flavis.

Apis nigra, abdomine fasciis quatuor undique flavis. Fn. 994.

Habitat Fablunæ ad Sacellum capellet, juxta viam publicam, in arena cuniculos formans, & gregaria habitans.

DESCR. Magnitudo fere Apis mellificæ. Corpus nigrum; frons maculis tribus luteis; punctum flavum pone oculos. Thorax punctis duobus remotis in antica parte; duobus ad locum scutelli approximatis & uno utrinque ad apicem thoracis. Abdominis quatuor segmenta cingulo flavo, juxta marginem locato, sed primum segmentum coarctatum utrinque puncto flavo notatum. Tibiae subferrugineæ.

1661. SPHEX *semiaurata* viridis nitida, abdomine ferrugineo apice nigro.

Habitat in Scania. D. C. Solander.

DESCR. Magnitudo formicæ. Antennæ nigrae, Caput, Thorax, Femora viridi ænea. Tibiae ferrugineæ. Abdomen ferrugineum, ovatum, apice 4. segmentis duobus postremis nigrum,

1662. SPHEX *fessoria* thorace immaculato, ore argenteo, abdome maculis utrinque quinque lutescentibus.

Habitat in collibus sabulosis.

DESCR. Major; Corpus nigrum. Os argenteum: maxillis luteis. Antennarum infimus articulus luteus. Thorax subpubescens puncto calloso ferrugineo ante alas. Abdomen ovatum, nigrum, segmentis quinque utrinque inacula laterali ferruginea s. lutescente; in aliis albida. Tibiae imprimis posteriores flavæ. Caput grande est.

1663. SPHEX *leucostoma* atra glabra, labio argenteo, palmis fuscis.

Habitat in arenosis.

DESCR. Minor, facie apis, tota nigra. Femora & Tibiae subclavatae.

1664. SPHEX *vaga* thorace bipunctato, abdominis fasciis tribus flavis: primis interruptis, tibiis flavis.

Habitat paßim.

## Chrysis.

1665. CHRYSIS *ignita* glabra nitens, thorace viridi, abdome aureo: ano quadridentato.

Apis nitida: thorace viridi-ceruleo, abdomine inaurato. Fn. 1004.

*Act. upf.* 1736. p. 28. n. 5. Apis parietina nitida, collari ceruleo, abdome aureo.

*Frisch. germ.* 9. p. 19. t. 10. f. 1. Vespa argillacea variegata s. superbe colorata.

Habitat in parietibus & muris, præsertim argillaceis.

DESCR. Ape domestica minor. Pulcherrima sane in genere suo est; caput & thorax cyanea nitidissima; abdomen ignei coloris nitens auro; pungit & vulnerat uti apis. Alæ fuscæ. Abdominis ultimum segmentum (excepto ani) dentatum est; utri & thorax aliquatenus postice. Antennæ nigrae, articulis 12.

1666. CHRYSIS *aurata* glabra nitens, thorace viridi, abdome aureo: ano bidentato.

Habitat ad parietes.

DESCR. Præcedente quadruplo minor. Antennæ nigrae. Thorax viridi-ceruleus, nitens. Abdomen auratum, fulgidissimum. Alæ fuscescentes.

1667. CHRYSIS *cyanæ* glabra nitens, thorace abdomeque ceruleo: ano tridentato.

Habitat in parietibus ligneis.

DESCR. Simillima Ch. ignita, sed paulo minor, unicolor, tota cerulea nitens.

1668. CHRYSIS *viridula* glabra nitens viridis, thorace abdominisque segmentis duobus primoribus tergo aureis: ano quadridentato.

Habitat in Parietibus. D. C. Solander.

DESCR. Similis Chr. ignitæ, sed tota viridis, præter primum & secundum *Abdominis* segmentum rubro aureum & *thoracis* dorsum aureum.

1669. CHRYSIS *fulgida* glabra nitens, thorace abdominisque primo segmento cœruleis, reliquis aureis: ano quadridentato.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Similis Sph. ignitæ, sed *Abdomine* aureo, exceptis prime & secundo segmento cœruleo; reliquis aureis fulgidissimis.

## Vespa.

1670. VESPA *Crabro* thorace nigro antice rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro dupli contiguo.

*Apis* thorace nigro: antice rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro dupli contiguo. Fn. 988.

Mouff. lat. 50. *Crabro*.

Merr. pin. 196. *Crabro*.

Raj. inf. 250. *Crabro vulgaris*.

Frisch. germ. 9. p. 21. t. 11. f. 1. *Crabro*.

Swamm. bibl. t. 26. f. 9.

Suecic Bolgetting.

Habitat in arboribus, sub arborum radicibus & in domibus vacuis, vietitat raptu aliorum insectorum, etiam apum mellificarum.

DESCR. *Labium* superius luteum: *Caput* rufum. *Thorax* niger, antice rufus. *Pedes* grisei. *Abdominis* incisuræ extrorsum luteæ, introrsum nigrae, punctis duobus in segmento 3 4 5, sed basi connatis cum nigredine interiore incisuratum.

1671. VESPA *vulgaris* thorace utrinque lineola interrupta, scutello quadri maculato-luteo, abdominis incisuris punctis nigris distinctis.

*Apis* thorace lineolis trium parium differentium flavescens, punctis nigris incisurarum liberis. Fn. 989.

Mouff. lat. 52. *Vespa*.

Merr. pin. 196. *Vespa flava major*.

Raj. inf. 250. *Vespa vulgaris*.

Frisch. germ. 9. p. 23. t. 12. f. 2.

Swamm. bibl. t. 26. f. 8.

Suecic *Wespa*, Getting.

Habi-

**Habitat** sub tectis, frequens apud nos, inuscarum prædatrix.  
**DESCR.** *Antennæ nigricantes. Frons luteo-varia. Thorax atet: linea utrinque ante alas, flava interrupta; postice puncta 4 flava transversa: Segmenta Abdominis nigra, omnia margine flava, in singulo duo puncta nigra connexa cum nigredine in prioribus incisuris, in posterioribus vero distincta. Tibiae flavæ.*

**1672. VESPA rufa** thorace lineola utrinque, scutello bimaculato, abdomine flavo antice ferrugineo.

*Apis thorace nigro: lineolis flavis, abdominis segmentis nigris: margine flavis; primo secundoque ferrugineo. Fn. 998.*

**Habitat** rarius in hortis.

**DESCR.** Magnitudo & facies Vespa vulgaris simillima. *Caput nigrum, fronte flava cum macula hastata; maxillæ flavæ. Punctum flavidum inter antennas. Capitis latera flava utrinque lineola. Thorax niger cum lineola ante singulam alam flava; puncta duo transversa flava loco scutelli. Abdominis segmenta nigra, marginibus flavis, sed primum segmentum omnino ferrugineum margine flavo; secundum segmentum basi in medio nigra. Femora maxima ex parte nigra, sed tibiæ ferrugineæ; Antennæ nigrae.*

**1673. VESPA parietum** thorace lineola punctisque duobus, scutello bipunctato, abdomine fasciis quinque flavis: prima remotissima.

*Apis nigra; abdomine fasciis quinque flavis: prima remotissima. Fn. 990.*

*Frisch. germ. 9. p. 12. f. 1.*

**Habitat** passim.

**DESCR.** *Antennæ clavatae, nigrae, infimo articulo subtus flavo; puncta flava ad basin maxillarum a latere, 2 ad apicem labii superioris, 2 in fronte, 1 inter antennas, 2 in medio tergi thoracis, 1 ad singulam alam. Thoracis basis linea flava. Tibiae omnes flavæ. Segmenta Abdominis omnia quinque margine flava, quorum primum remotius, latius, semibifida lineola. Alter minus explicatae.*

**1674. VESPA muraria nigra**, thorace punctis duobus ferrugineis, abdomine fasciis quatuor flavis: prima remotissima.

*Apis nigra; thorace basi flavescente, abdomine fasciis quatuor flavis: prima remotissima. Fn. 991.*

*Frisch. germ. 9. p. 24. t. 12. f. 8. 9.*

**Habitat** ruri.

**DESCR.** Nigra tota est. *Antennæ fere clavatae; a tergo ad basin Thoracis duas macula ferruginea; versus apicem thoracis macula nulla. Abdomen cingitur quatuor flavis fasciis, quartum prima maximæ a reliquis remota est. Tibiae etiam flavæ sunt.*

**1675. VESPA cribaria nigra**, abdomine fasciis sex flavis: inter-

termediis tribus interruptis, tibiis anticis clypeis cribrifor-  
mibus.

**a** *Apis glabra nigra*; tibiis flavis, abdominis fasciis tribus fla-  
vis; primis interruptis. *Fn.* 997.

*Aet. Stockb.* 1751. p. 56. t. 3. f. 1. *Apis nigra*, abdomine fa-  
sciis sex flavis; intermediis interruptis, tibiis anticis lamel-  
lis perforatis.

*Rej. inf.* 255. *Vespa ichneumon* antennis reflexis, pedibus  
anterioribus velut clypeatis.

**DESCR.** Capitum atrum. Antennae atrae, subulatae. Os argenteum. Tho-  
rax niger, pubescens. Abdomen glabrum, atrum: segmentum 1 immacu-  
latum margine flavo; 2 macula utrinque ovata; 3 utrinque macula lu-  
tea; 4 linea flava a tergo interrupta; 5 linea flava contigua: 6 idem.  
Abdomen subitus totum atrum est. Tibiae fulvae. Femora nigra, Tibiae  
anteriores nigrae instruatae lamine cornea convexa, punctis pellucidis  
adspersa.

**B** *Apis nigra*; abdomine fasciis quatuor flavis: tribus primis  
interruptis.

Habitat paßim inter flores, quasi quæ cibraret pollinem,  
sed cibra non sunt perforata, uti videntur.

**DESCR.** Corpus nigrum, ape minus. Tibiae omnes flavae. Thorax im-  
maculatus. Abdomen a latéribus pingitur utrinque tribus lineolis trans-  
versis flavis, & pone has lineola transversali flava. Antennae breves, ni-  
gra, basi flavae.

1676. *VESPA coarctata* abdominis primo articulo infundibuli-  
formi, secundo campanulato maximo bipunctato.

*Apis nigra*, abdominis primo articulo infundibuliformi, se-  
condo campanulato maximo. *Fn.* 1002.

*Frisch.* germ. 9. p. 17. t. 9.

Habitat in Salicetis.

**DESCR.** Media, tota atra. Abdomen glaberrimum; margines segmentorum  
abdominis omnes flavi; articulus primus tenuis, parum ventricosus, secundus maximus, ut omnes reliquos intra se retrotractos occulta-  
re possit; huic articulo utrinque macula flava (apud nos non uti Fri-  
schii) linearis obliqua. Thorax niger; macula flava unica ad basim li-  
nearis, interrupta; ad singulam alam unica; ad apicem unica linearis,  
sed hæc bifida est. Frischit descriptio optima est.

1677. *VESPA campestris* abdominis fasciis quatuor flavis: pri-  
ma interrupta.

Habitat paßim.

**DESCR.** Media, Corpus nigrum. Os supra linea transversa, flava. Tho-  
rax antice linea baseos; flava, transversa. Punctum flavum ante alas;  
Punctum infraservum flavum lbcō testelli. Abdominis primitum segmentum  
maculis duabus transversis; flavis; tria insequentia segmenta mar-  
gine flava. Tibiae ferruginea.

1678. VESPA *arvensis* abdominis fasciis quatuor flavis: tertia interrupta.

$\alpha$  Apis nigra, thorace basi apiceque flavescente, abdomine fasciis quatuor flavis: tertia interrupta. Fn. 992.

$\beta$  Apis glabra nigra, abdomine fasciis tribus flavis: tertia remotissima, primo articulo infundibuliformi. Fn. 996.

Habitat in campis & arvis.

DESCR. Vespa vulgari minor. Antennæ nigrae; Corpus nigrum, ad marginem Thoracis anteriorem lineola flava, & in medio thoracis loco scutelli punctum flavum. Abdomen tribus fasciis transversis flavis a tergo notatur, quarum secunda ac tertia remotissima; his duabus interiacet utroque latere punctum oblongum flavum; primus abdominis articulus angustus & clavatus. Pedes, exceptis femoribus rufis, nigri sunt.

1679. VESPA *parietina* abdominis fasciis quinque flavis: prima remotoire.

Vespa glabra nigra, abdomine fasciis tribus flavis: prima remotissima. Fn. 995.

Habitat in Parietibus.

DESCR. Media. Corpus nigrum. Puncta quatuor flava ad os & unum inter antennas, quæ basi subtus flavæ. Thorax linea flava baseos & pecto luteo supra singulam alam, geminoque loco scutelli. Abdomen fasciis 5 i. 6 flavis, quarum prima remotior.

1680. VESPA *biglumis* thoracis scutello bispinoso, abdominis segmentis margine albis: secundo punctis duobus albis. Syst. nat. 10. n. 8. & 12.

Habitat ad lapidum latera australia, conficiens nidum e fistulis aggregatis. Rolander.

DESCR. Statura Vespe vulgaris. Corpus nigrum. Frons albida. Antennæ subtus flavæ. Punctum flavum pone oculos. Thorax punctis aliquot albis; loco scutelli puncta duo alba; ad apicem utrinque laminula alba reflexa, acuminata. Abdomen segmentis margine albis: secundo punctis duobus albis. Pedes ferruginei.

1681. VESPA *uniglumis* thorace immaculato: scutello mucronato, abdominis segmentis tribus puncto lateralí albo.

Apis nigra, tibiis ferrugineis, abdomine maculis utrinque quatuor flavescensibus. Fn. 1011.

Habitat passim in hortis. Licet minima sit, saepe tamen Muscam domesticam, se triplo vel quadruplo majorem, occidit secum trahit, uti Spheci.

DESCR. Caput & Thorax nigra, immaculata. Abdomen nigrum, cuius incisurae quatuor primariae a tergo notantur pari macularum albissimorum, quarum par thoraci proximum maculam habet utrinque ovaliam, reliqua paria constant maculis linearibus. Femora nigra, sed Tibiae ferruginea. Antennæ non capite longiores, nigrae, deorsum inflexæ & apicibus obsoletæ. Scutellum mucrone prominet acuto.

1682. VESPA *spinipes* labio flavo marginato, abdomine fasciis quinque flavis.

Habitat rarius apud nos

DESCR. Minor. *Corpus* nigrum. *Caput* immaculatum labio flavo bidentato & emarginato. *Punctum* flavum inter antennas antico latere flavas. *Thorax* immaculatus in margine anteriore flavo. *Abdomen* fasciis quinque, flavis: prima remotissima. *Tibiae* flavæ, *Femora* secundi paris dentibus tribus armata.

*SEXUS* alter caret dentibus semorum, puncto que flavo gaudet ante alas & antennis antice tantum basi flavis.

1683. VESPA *bifasciata* thorace immaculato, abdomine fasciis duabus flavis.

Habitat passim.

DESCR. Similis precedenti. *Antennæ clavatae* *Caput* nigrum, immaculatum, ut etiam *Thorax*. *Abdomen* nigrum: segmentis duobus primis in margine flavis: quarum fascia posterior subitus etiam cingit *abdomen*. *Tibiae* basi palecentes.

### Apis.

1684. APIS *longicornis* antennis filiformibus longitudine corporis hirsuti fulvique.

Swamm. bibl. t. 26. f. 6.

Habitat passim, nec infrequens.

DESCR. Facies A. mellificæ. *Corpus* nigrum hirsutie rariore fulvescente, *Abdominis* magis obscura. *Frons* pallida. *Antennæ* atræ, filiformes, longitudine corporis,

1685. APIS *tumulorum* antennis filiformibus longitudine corporis nigri, pedibus maxillisque flavescens.

Apis nigra, pedibus maxillisque flavis. It. gotl. 336. Fn. 1000.

Habitat in *Wifingsö* insula Wetteri, in ipsis antiquissimis tumulis sepulchralibus.

DESCR. Magnitudo dimidiæ muscae domesticæ; *Toto corpore* nigra exceptis *pedibus* & *maxillis* pallide luteis. *Antennæ* filiformes, corporis fere longitudine, subtrus pallidiores.

1686. APIS *clavicornis* antennis clavatis longitudine corporis nigri, abdomine fasciis duabus flavis interruptis.

Habitat Upsaliæ rarius. P. Kalm.

DESCR. Minor. *Antennæ* clavatae, longitudine corporis, nigrae, latere anteriore, excepto spicæ, luteæ. *Corpus* nigrum. *Frons* macula rotunda, alba. *Thorax* immaculatus. *Abdomen* angustatum fasciis duabus, flavis, interruptis.

1687. APIS *centuncularis* nigra, abdomine subtus lana fulva.  
Apis nigra, abdomine supra lineis quatuor albis, subtus lana fulva. Fn. 1010.

Raj. inf. 242. Apis sylvestris corpore longo angusto, parva nigra, dorso lanagine rara fulva obsito, abdomine supino nigro glabro splendente, prono lanagine rufa densa vestito.

DESCR. Ape mellifica minor. Caput nigrum, Frons cinerea. Thorax niger, hirsutie subcinerea. Abdomen ovatum, nigrum, acutum, incisuratum marginibus albis; subtus lana rufa seu ferruginea valde pilosum. Pedes nigri.

1688. APIS *cineraria* nigra, thorace hirsuto albicante: fascia nigra, abdomine cærulecente.

Habitat passim, minus frequens.

DESCR. Media. Corpus nigrum: Thorax hirsutus, albido cinereus: fascia nigra inter alas. Abdomen atrum cærulescens, supra glabrum. Frons pilosa, cinereo-albida.

1689. APIS *retusa* nigra subhirta, abdominalis basi retusa, tibiis posticis extus lanatis.

Habitat passim.

DESCR. Magnitudo A. mellifica. Corpus rotundum nigrum, pubescens. Tibiae posticæ dilatatae, extus vellere brevi denso flavo.

1690. APIS *rufa fusca*, abdomine rufescente, fronte alba.

Apis hirsuta, capite nigro, abdomine rufo, fronte alba.  
Fn. 1009.

Act. upf. 1736. p. 28. n. Apis fusca, fronte alba, collaris testaceo.

Raj. inf. 242. Apis sylvestris parva, abdomine breviore, tota supina parte lanagine rufa vestito, thorace lanagine albicante.

Habitat ubique.

DESCR. Minor. Corpus hirtum, supra helvolum. Caput nigrum, frontis hirsutie albida. Thorax tubus pilis albidis. Abdomen subtus fere rotundum nigrum. Antennæ filiformes, corpore dimidio breviores.

1691. APIS *bicornis* fronte bicorni, capite nigro, abdomine hirsuto.

Apis hirsuta, capite thoraceque nigro, abdomine rufo, fronte bicorni. Fn. 1008.

DESCR. Thorax, caput, oculi, antennæ nigra. Abdomen rufum. Pedes rufescentes, ad minimum posteriores. Frons nigra, minime alba, ad basin maxillarum in fronte duo cornicula incurva, rigida, nec mobilia, prominula, hirsutie vix longiora, nigra, infra apicem, a parte exteriori, denticulo notata; facies & magnitudo apis mellifica.

1692. APIS *truncorum* nigra glabra, fronte albida pubescente, abdomine segmentis margine albidis: subtus flavicante.

Habitat in *Parietibus* ligneis.

DESCR. *Corpus* formica majus, atrum, glabrum. *Frons* barba albida. *Antennæ* filiformes, longitudine thoracis. *Abdominis* segmenta vix margine alba, sed potius verius latera; subtus pubescens flavesque.

1693. APIS *helvola* rufa villosa oblonga: subtus albida.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. *Caput* nigrum. *Thorax* villosus, ferrugineus: *Abdomen* nigricans, minus villosum. *Tibiae* posticæ lana ferruginea.

1694. APIS *succincta* thorace flavescente subvillosa, abdomine nigro cingulis quatuor albis.

*Apis subhirsuta* cinereæ, abdomine nigro: segmentis albidis, fronte flavescente. Fn. 1007

Habitat apud nos rarissime, nec nisi unicam vidi, a P. Kalm.

DESCR. Media. *Corpus* nigrum. *Frons* albicante vellere. *Thorax* villosus albidus. *Abdomen* atrum, nudum, incisurarum marginibus quatuor villoso-niveis. *Pedes* nigri. *Tibiae* extus albido pilosæ.

1695. APIS *aenea* ænea grisecente-pubescentia.

Habitat passim.

DESCR. Media s. A. mellifica dimidio minor. *Corpus* totum viridi neum, at *Thorax* vellere flavescente rectus. *Antennæ* nigrae.

1696. APIS *cærulescens* fusca subvillosa, abdomine cærulescente: incisurarum marginibus albicantibus.

Habitat passim.

DESCR. Minor. *Corpus* totum atrum, cærulescens, immaculatum, villositate, vix observanda, albicante.

1697. APIS *mellifica* pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, pedibus posticis glabris utrinque margine ciliatis.

*Apis gregaria*. Fn. 1003.

*Mouff. lat. 2. Apis.*

*Merr. eur. 2. p. 19. t. 1.*

*Aldr. inf. 20.*

*Jonst. inf. 1. t. 2.*

*Cbarl. exerc. 6.*

*Merr. pia. 106. Apis domestica s. vulgaris alvearium.*

*Raj. inf. 240. Apis.*

*Dal. pharm. 386. n. 15. Apes.*

*2 Mouff. lat. 37. Fucus.*

*Merr. pin. 196. Fucus.*

*Snevis Bi.*

Habitat apud nos in sylvarum cavis arboribus rarius, communiter a rusticis colitur.

Cibus harum est mel e nectariis florum, præsertim autumno e floribus *Ericæ*, sed mel inde rufescit; Provinciæ itaque *Erica* destitutæ, ut Oelandia, in mel album suppeditant, at Cera e Polline antherarum conficitur.

1698. *APIS cunicularia* pubescens, thorace ferrugineo, abdome fusco, pedibus undique villosis.

Habitat in *Terra sabulosa* pluribus foraminibus remotis; ubi plures distincto domicilio nidificant.

DESCR. Simillima *A. mellinæ*.

1699. *APIS variegata* thorace abdomineque albo-variegato, tibiis ferrugineis.

Habitat passim.

DESCR. Minor. Corpus arctum, nigrum, absque ordine albo-variegatum, imprimis ad latera abdominis. Tibiae & Plantæ ferrugineæ.

1700. *APIS rostrata* labio superiore conico infexo, abdominis fasciis glaucis repandis.

*Apis* pedibus maxillisque flavis: apice nigris, incisuris abdominalibus glabris: margine nigris. Fn. 999.

*It. gotl.* 246 Jord-bij.

Habitat in monticulis arenosis *Gotlandiæ*, ubi in singulo nido unicus pullus

DESCR. Oculi, os, pedes flava. Thorax niger. Abdomen nigrum segmento abdominis singulo ante margines flavo; margo enim baseos & extimus niger est; primum segmentum macula utrinque unica notatur. Alæ glaucæ, venosæ. Thorax subhirsutus, macula flava pone singulam alam, linea flava interrupta ad apicem thoracis. Oris labium superius corneum, inflexum, magnum, acuminatum. Dentes utrinque solitarii, flavi, apice nigri. Vespa vulgaris magnitudo.

Difert sexu: Alæ abdomine luteo maculato (ut supra); Antennis supra nigris, subtus flavis; Aculeo corneo brevissimo, rigido; Alæ albo pictæ, ubi prior luteo. Antennæ fere ex toto nigrae. Aculeo pungente, longo, flexuoso, ut in apibus.

1701. *APIS manicata* nigra, pedibus anticis hirsutissimis, abdome maculis lateralibus flavis, ano tridentato.

Habitat passim.

DESCR. Magnitudo *A. mellifica*. Corpus fuscescens. Abdomen utrinque macula flava s. sex partibus. Pedes anteriores valide barbato-ciliati, flavescentes. Anus aculeis tribus, fixis, divaricatis & insuper uno ad latera, magis anteriore.

1702. *APIS lagopoda* griseescens, pedibus anticis dilatato-ciliatis, tibiis pollicis clavatis, ano emarginato.

Habi-

Habitat passim.

DESCR. Magnitudo præcedentis, fusca vellere subgriseo. *Frons* hirsuta. *Labio* obtuso. *Palmae* anticæ hirtutæ, dilatatae, albæ, aculeis extus dilatatis ciliatae. *Tibiae* posticæ incrassatae.

1703. APIS quadridentata fusca, abdomine cingulis quinis albidis, ano quadridentato: intermediis bifidis.

Habitat in pratis floriferis frequens.

DESCR. Similis A. succenturiata, sed triplo minor. *Caput & Thorax* vellere subcineralcentia. *Abdomen* conicum, atrium, marginibus incisuram quinque albis: prima obsoleta, nisi ad latera. *Anus* prominet quatuor dentibus, intermediis longioribus.

1704. APIS florifomnis nigra, abdomine cylindrico incurvo, ano bidentato, tibiis posterioribus apice spinosis.

Habitat ubique floribus inhærens tempore nocturno, nec discedens.

DESCR. Parva, angusta, oblonga, nigra. *Frons* cinereo-pubescentia. *Thorax* pallido-subpubescentia. *Abdomen* semicylindricum, fere glabrum, septem segmentis, incurvatum plerumque. *Ano* bifido, obtuso.

1705. APIS conica fusca, abdomine conico acutissimo: segmentorum marginibus albis.

Apis subhirtula cinerea, abdomine conico, segmentorum marginibus albis. *Fz.* 1006.

Raj. inf. 262. Vespa sylvestris caudata, abdomine nigro: annulis flavis distincto?

Habitat in terra & minis.

DESCR. Ape domestica paulo minor est. *Antennæ* nigrae, subclavatae. *Caput & Thorax* pilis cinereis. *Abdomen* conicum, acutissimum, incisuram marginibus albidis, adeoque 5 a tergo; 4 vel 3 subtus lineolæ albæ. *Frons* nigra.

1706. APIS annulata nigra, fronte annulisque pedum albis.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. Magnitudo Formicæ. Corpus totum atrum. *Frons* alteri sexui lineola ante singulos oculos alba; alteri frons tota alba cum macula alba in basi antennarum. *Thorax* nudus, punto albo convexo ante alas. *Tibiae* quatuor posteriores basi albæ.

1707. APIS ruficornis antennis pedibus punctisque duobus thoracis ferrugineis.

Habitat passim.

DESCR. Media. *Caput* nigrum. *Os* ferrugineum. *Antennæ* ferruginea. *Thorax* niger, aliis lineæ ferrugineaæ quatuor longitudinales; aliis punctum flavum ante alas & duo flava loco scutelli. *Abdomen* ferrugineum, glabrum maculis flavis lateralibus, postice fasciis flavis. *Pedes* ferruginei. *Alæ* apice fuscescentes.

1708. APIS cariosa fusca subvillosa, fronte pedibusque flavis.

Apis nigra, pedibus fronteque flavis. Fn. 1001.

Habitat in antilis & siphonibus cariosis Scaniæ. D. Leche.

DESCR. Magnitudo præcedentis. Tota nigra, sed inter antennas flava: Pedes (exceptis femoribus.) rufo-pallidi, præsertim quatuor posteriores. Antennæ diuidio corpore fere breviores, rectæ.

1709. APIS terrestris hirsuta nigra, thoracis cingulo flavo, ano albo. Fn. 1012.

Jung. verm. 51 Bombylius.

Moüff. lat. 53. f. 2 Bombylius.

Gœd. belg. 2. p. 174. f. 46.

List. gœd. 233 f. 105.

Frisch. germ. 9. p. 24. t. 13. f. 1.

Rai. ins. 247. n. 5. Bombylius.

Aet. upf. 1736. p. 28. n. 12. Apis hirsuta nigra, collari abdominisque cingulo nigro, apice albo.

Reaum. gall. 6. t. 3. f. 1.

Suecis Jord-Humbla. Uplandis Mörnus.

Habitat in ipsa Terra, ubi copiosum mel colligit.

DESCR. Inter Bombylios dictos hæc maxima est. Totum Corpus undique hirsutum & nigrum; Abdomen antice nigrum, dein flavum, medio nigrum, postice album. Thorax antice flavo colore cingitur.

1710. APIS horrorum hirsuta nigra, thorace abdomeque antico flavo, ano albo.

Habitat sub terra.

DESCR. Simillima præcedenti; a qua differt fascia Abdominis flava basin abdominis occupante, nec utrinque nigra fascia distincta.

1711. APIS pratrum hirsuta nigra, thorace antice flavo, ano rubro.

Habitat in Pratis.

DESCR. Minor. Corpus nigricans. Thorax antice sulphureus. Abdomen ano rubro.

1712. APIS lapidaria hirsuta atra: ano fulvo. Fn. 1015.

Reaum. gall. 6. t. 11. f. 1. 2.

Aet. upf. 1736. p. 28. n. 13. Apis hirsuta nigra, abdominis apice rubro.

Frisch germ. 9. p. 25. n. 2. (sed nostra minor.)

Suecis Sten-Humbla.

Habitat in acervis lapidum, copiose mellificans.

DESCR. Tota atra est, excepto apice abdominis tribus incisuris rufo-fulvis.

1713. APIS *sylvarum* hirsuta pallida, thoracis fascia nigra, ano rubro.

Habitat in Sylvis.

DESCR. Similis sequenti, sed vellere pallido. Thorax fascia nigra inter alas. Abdomen pallidum interlucente nigredine corporis tanquam obscuris fasciis. Anus ruber.

1714. APIS *muscorum* hirsuta fulva, abdomine flavo. Fn. 1017.

Frisch. germ. 9. p. 26. n. 8.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 18. Apis hirsuta, collari fulvo, abdomine flavo.

Suecis Moss-Humbla.

Habitat sub *Hypnis* & *Muscis* aliis, in pratis frequens, parum mellificans.

DESCR. Thorax fulvus. Abdomen luteum s. pallidius fulvum, ano concolore.

1715. APIS *hypnorum* hirsuta fulva, abdominis fascia nigra: ano albo.

Apis hirsuta fulva, abdominis medio nigro: ano albo. Fn. 1018.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 17. Apis hirsuta, collari fulvo, abdominis basi fulva: medio nigro, ano albo.

Habitat sub *Muscis*.

DESCR. Thorax fulvus. Abdomen nigrum, basi fulvum, ano albo.

1716. APIS *lucorum* hirsuta flava: ano albido.

Habitat in Lucis.

DESCR. Media. Corpus totam flavescens ano albido; in abdomine translucet nigredo corporis quasi obfoletis fasciis.

1717. APIS *acerorum* hirsuta atra. Fn. 1013.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 15. Apis hirsuta, tota nigra.

Habitat in Terra, minus frequens.

DESCR. Præcedenti similis, sed minor; toto Corpore nigro, immaculato, exceptis setulis quibusdam circa collum sulphureis.

1718. APIS *subterranea* hirsuta atra: ano fusco. Fn. 1014.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 14. Apis hirsuta nigra, abdominis apice fusco.

Habitat in Terra, minus frequens.

DESCR. Præcedenti similis, solo apice Abdominis minus nigro.

1719. APIS *alpina* hirsuta, thorace nigro, abdomine luteo. Fn. 1016.

A&T. upf. 1736. p. 28. n. 12. *Apis hirsuta maxima alpino-*  
*lapponica*, collari nigro, abdomine luteo.

Habitat in *Alpibus Lapponicis*, ubi modo unicam legi.

DESCR. Magnitudine ad *Scarabaeum Cervum* accedit, tota hirsuta &  
 stra, excepto *Abdomine* toto luteo seu ferrugineo, solaque *abdominis* ba-  
 si nigra.

## Formica.

1720. FORMICA herculeana nigra, abdomine ovato, femori-  
 bus ferrugineis.

Formica magna. *It. gotl.* 232. *Fn.* 1019.

Raj. inf. 69. Formica maxima hippomyrmex.

A&T. Stockb. 1741. p. 39. Haest-Myror.

Suecias Håstmyra. *Uplandis Björnmyra*.

Habitat in *Truncis putridis* cavis.

DESCR. *Caput* nigricans, in occipite punctatia. *Thorax* ferrugineus ad  
 tergum nigricans. *Pedes* ferruginei. *Squama intergerina* ovata, integra,  
 acuto-rotundata. *Abdomen* fulcum constans 5 segmentis.

1721. FORMICA rufa thorace compresso toto ferrugineo, ca-  
 pite abdomineque nigris.

Formica rufa. *Fn.* 1020.

Raj. inf. 69. Formica media rubra.

A&T. Stockb. 1741. p. 39. Piss-Myror.

Suecias Stack-Myra. *Uplandis Björn-Myra*.

Habitat ubique in sylvis, acervos e foliolis acerosis exstru-  
 ens.

DESCR. *Corpus* fulcum. *Thorax* ferrugineus, compressus. *Pedes* ferrugi-  
 nei. *Squama intergerina* ferruginea, acuminata.

MAS: *Corpus* nigricans. *Abdomen* segmentis sex. *Pedes* ferruginei.

FÆMINA: *Corpus* nigricans. *Caput* subitus ferrugineum. *Thorax* ferru-  
 gineus dorso fulvo. *Abdomen* segmentis quatuor, primo antice ferrugi-  
 neo.

1722. FORMICA fusca cinereo-fusca, tibiis pallidis.

Formica fusca. *Fn.* 1021.

Raj. inf. 69. Formica media, nigro colore splendens.

A&T. Stockb. 1741. p. 40 Swart-Myror.

Suecias Swart-Myra.

Habitat sub terra glareosa.

DESCR. *Corpus* cinereo fuscum, pilis cinerascentibus minutissimis vesti-  
 tum, unde certo modo ad lucem visum, videtur nigrum, alias cinereum.  
*Caput* fere thorace angustius. *Thorax* teretiusculus. *Squama inter-*  
*gerina* quadrato-emarginata. *Antennæ* infimo articulo longissimo rufo.  
*Femora* fusca. *Tibiae* pallidæ. *P.* Forstbl.

1723. FORMICA nigra tota nigra nitida, tibiis cinerascentibus.

Formica atra. Fn. 1023.

Raj. inf. 69. Formica minor e fusco nigricans.

Aet. Stockh. 1741. p. 41. Smä-Myror.

Habitat in terra.

1724. FORMICA obsoleta supra nigra; subtus testaceo-rufa, abdome subgloboso.

Habitat passim.

DESCR. Caput vix thoracis crassitie. Thorax teretiusculus. Squama intergerina humilis, truncata. Abdomen ovatum, acuminatum, longitudine thoracis, pilis rufescens minimis. Tibiae & Plantae cinerascentes. Corpus ceterum nigro nitidum. Abdomen huic tantum longitudine thoracis, in praecedente vero Abdomen longitudine thoracis eum capite. P. Forskahl.

1725. FORMICA rubra testacea, oculis punctoque sub abdome nigris.

Formica rubra. Fn. 1022.

Raj. inf. 69. Formica minima rubra.

Aet. Stockh. 1741. p. 40. Etter-Myror.

It. gotl. 246. Etter-Myror.

Lewenb. epist. 1687. p. 97. f. 8.

Swam. quart. p. 181. t. 9.

Suecias Ettermyras. Uplandis Rödgiöter.

Habitat in cespitibus graminosis.

DESCR. Caput thorace latius, testaceum. Antennae testacea. Thorax pallidus, parum compressus. Abdomen ovato oblongum pilis albicanibus; punctum nigrum sub abdome.

1726. FORMICA cæspitum petiolo nodis duobus alternis posteriore majore.

Habitat in Tuberibus cæspitosis.

DESCR. Caput thorace latius. Antennarum infimus articulus tertia tantum pars totius est. Thorax teretiusculus. Squamae intergerinæ loco nodi duo globosi: posteriore majore. Abdomen vix longitudine thoracis, ovato-acuminatum, pubescens. Femora & Tibiae satis longæ. Alæ pallide, versus corpus magis fusca. P. Forskahl.

## Mutilla.

1727. MUTILLA europea nigra, abdome fasciis tribus albis interruptis; thorace postice rufo.

Udd. diff. 98. t. 17. Apis aptera.

Habitat in sylvis arenosis rarissima.

DESCR.

**DESCR.** Magnitudo Vespa cibrariae. Caput & Antennæ nigrae, thorace breviore. Thorax rufus, antice niger. Abdomen nigrum, hirtum fasciis tribus albis; quarum duæ posteriores interruptæ. Pedes nigri.

1728. **MUTILLA formicaria** glabra rufa, capite abdomineque pubescente nigris.

Habitat rarissime apud nos.

1729. **MUTILLA Acarorum** glabra rufa, capite abdomineque postico nigris.

Habitat cum *Acaris*, quibus vicitat.

**DESCR.** Parva. Antennæ nigrae, longitudine fere corporis. Caput nigrum. Thorax niger. Abdomen nigrum: segmento primo ferrugineo. Pedes ferruginei: tibiis posticis nigri. Femina simillima aculeo exerto abdomini breviori.

## VI. DIPTERA.

### Oestrus.

1730. **OSTRUS Bovis** alis maculatis, thorace flavo fascia fusca, abdomine flavo apice nigro.

Oestrus thorace flavo: cingulo nigro, alis nigra fascia, pedibus pallidis. Fn. 1024.

Raj. inf. 271. Musca bipennis Oestrum dicta, alis membranaceis punctis crebris nigrioribus velut adspersis.

Derrb. physico-theol. l. 8. c. 6. n. 11. Wormils.

Frisch germ. 5. p. 21. t. 7. Vermis in stercore vaccino.

Reaum. gall. 4. t. 38. 37. 36.

Suecis Styng. Brömskula.

Habitat in dorso *Bovum* per totam hyemem, Julio exiens.

♂ in ventriculo Equorum, ipsis circa solstitium aestivum lethalis.

**DESCR.** Magnitudo musæ majoris. Os nullum: rima absque dentibus & proboscide. Oculi nigri. Antennæ articulo lentiformi cum fera. Thorax flavidus, cingulo nigro inter alas conspicuo. Scutellum nigris pilis, intermediis fulvis reflexis. Abdomen flavum, segmentis margine fusco, ultimo articulo abdominis nigro. Pedes pallidi. Halteres sub alis albi. Cauda exserta inermis, sub abdomine valde inflexa. Alæ albæ, incumbentes, in medio fascia lata transversa fusca; puncto gemino fusco in apice alarum, & tertio puncto inter fasciam & corpus verius marginem tenuorem.

$\beta$  VARIETAS fronte infra oculos eriam hirsuta, Abdomine & Pectore sub-eus nigricantibus abdomine toto flavo, alis uno puncto in apice; habitat intra ventriculos Equi.

1731. OESTRUS Tarandi alis immaculatis, thorace flavo fascia nigra, abdomine fulvo apice flavo.

Oestrus thorace flavo: cingulo nigro, alis immaculatis, pedibus nigris Fn. 1025.

Fl. lapp. 360. n. 517. Oestrum Rhangiferinum Lapponicum, ventre fulvo.

Aet. upf. 1736. p. 31. n. 23. Oestrum idem.

Aet. stockh. 1739. p. 121. t. (ad paginam 84.) 3. f. 5. 6.

Lappis Curbina.

Habitat in dorso Cervorum Tarandorum, praesertim manuorum.

DESCR. Praecedenti duplo major. Alae immaculatae. Abdomen magis hirsutum, ipsa tunica nigra, sed lana fulva, excepta basi abdominalis flavo lana. Thorax flavus fascia arra inter alas. Pedes nigri.

Larva per totam hyeinem latet sub cute Rhenonum in dorso, caustans fontanellas illas, quibus emaciantur Rhangiteri & cicatrices quibus contaminant eorum coria. Dicitur & oestrus & astrum.

1732. OESTRUS nasalis alis immaculatis, thorace ferrugineo, abdomine nigro pilis flavis.

Oestrus niger; thorace flavo. Fn. 1026.

Flor. lapp. 363. p. 517. Oestrum Rhangiferinum Lapponicum, ventre nigro.

Aet. upf. 1736. p. 31. n. 24. Oestrum idem.

Lappis Trompe.

Habitat in Lapponia.

DESCR. Oculi magni, nigri. Frons lutea. Thorax ferrugineus, villosum. Abdomen alis longius, nigrum, veltitum pilis taris, flavis, scriceis. Femora nigra. Tibiae flavae. Antennae clavatae, nigrae, triplici articulo, aristatae.

1733. OESTRUS haemorrhoidalis alis immaculatis, thorace nigro: scutello pallido, abdomine nigro: basi albo apiceque fulvo.

Oestrus ani Equorum. Fn. 1028.

Reaum. gall. 4 t. 35. f. 1-7.

It. gotl. 277. Vermes haemorrhoidum cæcarum facie.

Habitat in recto ani Equorum, instar haemorrhoidum cæcarum hærens.

DESCR. Caput album. Oculi nigri. Thorax niger, scutello pallido. Abdomen cingulo nigro, basi album, apice fulvum. Alae immaculatae, quem puto eundem esse.

1734. OESTRUS *ovis* alis subpunctatis abdomine tomentoso albido nigroque subtebellato.

Oestrus abdomine albo nigroque versicolore. Schreber inf. 15. n. 12.

Oestrus sinus frontis ruminantium. Fn. 1027.

Reaum. gall. 4. t. 35. f. 21. 22. 23. 24.

Suecic Nosmasken.

Habitat in naso sive sinu frontis animalium ruminantium, imprimis *Ovium*. It. Jean. 128.

DESCR. Corpus totum fuscum, albis nigrisque punctis undique irroratum. Bucca alba inflata. Frons cinerea punctis sparsis excavatis.

### Tipula.

1735. TIPULA *peetinicornis* antennis peetinatis, alis macula nigra, thorace flavescente.

Habitat in Graminosis.

DESCR. Major. Antennae nigrae; plumosæ; basi luteæ. Caput nigrum: collaris flavo. Thorax nigricans lateribus flavis. Abdomen flavum; linea dorsali & lateribus nigricantibus. Pedes flavescentes.

1736. TIPULA *quadrimaculata* alis patulis fusco-venosis: margine maculis quatuor fuscis, abdome supra flavo.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. E maximis nostratis. Thorax flavesiensis, nigro-maculatus. Abdomen flavesiensis margine fuscus: Segmentum primum supra macula magna nigra; secundum lineola. Femora pallida apice & annulo ad apicem nigra. Alæ venis fuscis maculisque obsolete fuscis; ad costam maculis duabus fuscis saturioribus.

1737. TIPULA *calmariensis* alis maculis, quatuor marginalibus venisque fuscis: abdome lutescente segmento primo supra nigro.

Habitat Calmariæ.

DESCR. Maximas inter numeranda. Alæ maculis 4 fuscis ad costam crassiores. Thorax flavesiensis maculis fuscis. Abdomen lutescens, versis marginis magis fuscum: primo segmento macula quadrata atra testa.

1738. TIPULA *rivoja* alis hyalinis: rivulis fuscis maculaque nivea.

Tipula alis exalbidis: macula nivea: rivulis fuscis. Fn. 1121. Raj. inf. 72. n. 2. Tipula maxima, alis majoribus ex fusco & albo variegatis.

Act. upf. 1736. p. 50. n. 1. Tipula lapponica cinerea, alis albis: rivulis fuscis.

Act. Stockh. 1739. t. 3. f. 8. ubi hanc delineavi.

Habitat Ubmoe in Westro-Botnia, ubi eam quondam inveni frequentem, rarer Upsaliæ.

DESCR.

**DESCR.** Maxima est. *Corpus & abdomen cinereo-fuscum*: cauda bifida. *Alæ hyalinae seu exalbidæ*; *rivulus fuscus secundum marginem exteriorem longitudinaliter extenditur*, qui *ramum versus marginem interiorem oblique emitit*, et inde oblique *extorrisum*, ubi coadunatur cum eodem, a quo ortus; *macula magna nivea occupat spatium sub ramificatione maculæ fuscæ*. Adeoque inter omnes nostras speciosissima est.

1739. **TIPULA crocata** alis macula fusca, abdomine atro fasciis fulvis.

*Tipula corpore nigro fulvoque variegato.* Fn. 1123.

Raj. inf. 72. n. 4. *Tipula elegans*, dorso & scapulis nigris, ventre croceo, alis macula fusca notatis, lœvis & splendens.

Aet. upf. 1736. p. 30. n. 2. *Tipula abdominalis annulis luteis nigrisque alternantibus.*

Habitat in Roslagia.

**DESCR.** *Corpus atrum & saturatissime nigrum est*: *articuli abdominalis, excepto exteriore margine, crocei seu fulvi*; *variae lituræ fulvae in ipso thorace*. *Alæ subfulvæcentes, venis fuscis, puncto marginali obtuso*. *Femora versus basin lutescentia.*

1740. **TIPULA oleracea** alis hyalinis costa marginali fusca.

Fn. 1124.

Gœd. belg. 2. p. 165. t. 44.

List. gœd. 331. f. 139.

Brädl. natur. p. 25. f. 3.

Frisch. germ. 5. t. 3. f. 1, 2.

Reaum. gall. 4. t. 11. f. 7.

Leuwenh. epist. 1693, dec. 20. f. 4. 5. & 1714. oct. 26. f. 4.

Aet. upf. 1736. p. 31. n. 6. *Tipula cinerea*, alis cinereis margine exteriore fusco.

Habitat in terra, inter radices olerum ipsa Larva.

**DESCR.** *Tota cinerea*. *Alæ membranacei coloris, margine exteriore longitudinaliter (non tamen usque ad summum apicem) linea lata, longa, fusca pictæ, quæ linea quasi ex plicis constat*; *sub hac linea ala albidiior est.*

1741. **TIPULA hortorum** alis hyalinis: maculis albis sparsis obsoletis. Fn. 1125.

Aet. upf. 1736. p. 30. n. 3. *Tipula cinerea*, alis cinereis: vasis fuscis maculisque albis.

Raj. inf. 72. n. 6. *Tipula vulgari similis*, sed multo minor, alis fuscis: maculis albidioribus & nervis magis opacis.

Alb. inf. t. 61. f. F. mas. G. femina.

Suecic Harkrank.

Habitat ubique communis.

**DESCR.** *Tota cinerea*. *Alæ cinerascentes, maculis aliquot albis vix manifestis sparsis; vasa alarum fusca sunt, absque macula aliqua obscura marginali.*

1742. *TIPULA variegata* alis hyalinis macula pallida obsoleta, corpore nigro luteoque variegato. *Fn.* 1131.

*A&L. upf.* 1736. p. 31. n. 8. *Tipula cinerea*, alis cinereis im-maculatis.

Habitat cum reliquis.

*DESCR.* Alæ hyaline, vasis pallidis, puncto marginali obscuriore ma-cula pallida. Corpus viridi nigroque variegatum, præfertim pectus, per-belle pictum. Magnitudo media seu proxime præcedentis. *Maris* cauda obtusa, pene capillaris, longissima. *Feminæ* cauda acuta, ut in reliquis.

1743. *TIPULA contaminata* alis nigro-immaculatis, corpore nigro. *Fn.* 1134.

Habitat in hortis passim.

*DESCR.* Est e mediæ magnitudinis Speciebus. Alæ hyaline nervosæ tri-pli fascia punctorum conglomeratorum nigrorum: singulare fasciam punctum interjacet nigrum juxta marginem majorem alæ. Totum Cor-pus nigrum, etiam oculi. Pedes lividi. Antennæ quindecim articulis.

1744. *TIPULA lunata* alis cinerecentibus lunula marginali alba. *Fn.* 1126.

*A&L. upf.* 1736. p. 30. n. 4. *Tipula cinerea*, alis fuscis, ma-cula lunata alba.

*Raj. inf.* 73. n. 10. *Tipula septimæ similis*, paulo tamen ma-jor, oculis viridifcentibus.

Habitat cum prioribus in cultis.

*DESCR.* Noscitur a reliquis facile *Alarum* colore cinereo una cum ves-nis unicoloribus in loco; ubi punctum marginale solet collocari, huic Lu-nula alba. *Dorsum* abdominis fuscum.

1745. *TIPULA pratensis* alis subcinereis: vasis fuscis puncto-que marginali obscuro, fronte fulva. *Fn.* 1128.

*A&L. upf.* 1736. p. 31. n. 5. *Tipula cinerea*, alis fuscis: va-sis nigra, macula lunata nigra.

*Frisch. germ.* 4. p. 24. t. 12. *Tipula terrestris* major.

Habitat vulgaris per Sueciam.

*DESCR.* Corpus obscurum seu nigrum; latera flava; *Thoracis* lituræ lu-teæ. Alæ subcinereæ, vasis fuscis nigricantibus, macula seu puncto mar-ginali nigricante. *Halteres* pallidi apice albo. *Antennæ* atræ. Pedes ni-gri tenuioribus ferrugineis.

1746. *TIPULA terrestris* alis hyalinis: puncto marginali fusco; dorso abdominis cinereo. *Fn.* 1129.

*A&L. upf.* 1736. p. 31. n. 7. *Tipula incarnata*, alis cinereis puncto nigro.

*Frisch. germ.* 7. p. 30. t. 22. *Tipula terrestris* media.

Habitat cum præcedentibus.

*DESCR.*

*DESCR.* Differt a precedentibus, quod dimidio minor, tam mas quam femina. *Pedum* genicula nigra. *Carpus* subincaraatum. *Alae* hyalinæ venis cinerascentibus; punctum marginale ferrugineum seu fuscum.

1747. *TIPULA cornicina* alis hyalinis: puncto marginali fuscō, abdome flavo: lineis tribus fuscis. *Fn.* 1130.  
Habitat passim inter arbusta.

*DESCR.* Est inter majores, non maximas, numeranda. *Alae* hyalinæ; puncto fuscō. *Abdomen* flavum: lineis tribus longitudinalibus fuscis, quarum una in dorso, una in singulo lateste; apex abdominis fuscus. *Thorax* flavus; a tergo lineis tribus fuscis.

1748. *TIPULA nigra* alis fuscis, corpore atro. *Fn.* 1132.  
*Smolandis* Polsa.

Habitat in Uplandia rarius, *Larvæ* latent in terra pingui humida, radices consutentes.

*DESCR.* Est e mediæ magnitudinis. *Alæ* fuscæ, vasis nigricantibus cum puncto marginali. *Thorax* & *Abdomen* atra. *Pedes* fuscæ. *Feminae* gaudent ano subulato, *Mares* vero obtuso.

1749. *TIPULA atrata* alis glaucis: puncto marginali corpore atro, pedibus rufis. *Fn.* 1127.

Habitat in Larvis *Phalenarum*.

*DESCR.* Est inter maximas sui generis, capite, thorace, abdomine atris, nitidis. *Pedes* ornates ferruginei. *Antennæ* atræ, nodosæ articulis duodecim, longitudine thoracis. *Alæ* glaucæ, præsertim inter punctum marginale & corpus, vasis nigricantibus, puncto marginali majuscule atro. Basis abdominis parum rubra. *Anus* feminae in stylum trivalvem definit.

1750. *TIPULA bimaculata* alis hyalinis: maculis duabus fuscis, abdominis in medio maculato-ferrugineo, antennis plumosis  
Habitat cum precedentibus.

*DESCR.* Media. *Caput*, *Antennæ* & *Thorax* nigra. *Abdomen* nigrum, in medio, tam latefibus quam subtus, ferrugineum s. lividum. *Alæ* in medio macula nigra & apice alatum fuscæ. *Pedes* lividi, flavescentes; articulis apice nigris.

1751. *TIPULA ocellaris* alis albido, maculis ocellaribus nigricantibus plurimis.

*Gadd. satag.* 87. *Tipula* alis albido, punctis 12 nigris ocello fusco cinctis, dorso abdome que cinereo.

Habitat in Europa.

*DESCR.* Media. *Alæ* expansæ, albido duplice serie ocellorum fusciorum, quarum margine exteriori adjacentes obscuriores.

1752. *TIPULA annulata* alis fusco-variegatis, femoribus annulo albo. *Fn.* 1122.

Habitat passim.

DESCR. Mediæ magnitudinis est; Corpus totum cinereo fuscum. Alæ subcinereæ, versus marginem anteriorem fasciis quatuor vel quinque fuscis; versus marginem posteriorem circulis tribus fuscis, cum puncto in medio fusco. Pedes grisei. Femora versus apices annulo nigro cincta. Antennæ 14 articulis, quorum 1 restus, oblongus, niger; 2 globosogibbus; 3-13 subrotundi; 14 acuminatus.

1753. TIPULA *flavescens* alis immaculatis, corpore flavo, dorso fuscō. Fn. 1133.

Habitat passim.

DESCR. Mediæ magnitudinis sive Culice vulgari paulo major. Alæ hyaline, immaculatae. Corpus flavum, sed caput, thorax & abdomen a tergo fuscā. Pedes longi.

1754. TIPULA *regeletionis* alis hyalinis nitentibus, corpore cinereo-fusco.

Habitat, primo vere, in terra prægnante; choreas in Aëre instituit.

DESCR. Magnitudo culicis. Corpus lave, cinereo-fuscum. Antennæ thorace paullo longiores. Alæ hyaline venis fuscis, nitentes e glauco-cinereo, extensæ s. patentes, uno puncto s. anastomosi in medio. Abdomen tenuē.

1755. TIPULA *replicata* alis hyalinis margine tenuiore recurvato, corpore fuscō, antennis simplicibus. De Geer. aët. Upsal.

Habitat Leuffstadii.

DESCR. Dabitur propediem loco citato.

1756. TIPULA *monoptera nigra*, pedibus palpisque pallidis.

Habitat passim.

DESCR. Dimidio minor Culice. Corpus nigricans. Alæ hyaline. Antennæ corpore dimidio breviores. Pedes omnes pallidi s. lividi, ut etiam Palpi. Antennæ corpore breviores. Statura Tipulæ alis patulis, sed aliam alteram alteri incumbentem gerit.

1757. TIPULA *arundineti* albida, antennis villosis, oculis atris.

Habitat in *Arundinetis*, ubi choreas agit.

DESCR. Magnitudo Culicis. Alæ hyaline, incubentes, margine interiore subciliatæ. Antennæ subciliatæ, thorace breviores. Oculi magni, atri. Corpus flavescenti-pallidum. Fæmina anus mucronatus, adscendens, testaceus. Maris furca obtusa

1758. TIPULA *plumosa* thorace virescente, alis hyalinis puncto nigro. Fn. 1135.

It.

*It. oeland.* 40. 41. 86. 160.

*Frisch. inf.* 11. t. 12.

*Reaum. gall.* 5. t. 5. f. omnes.

*Gaed. belg.* 3. p. 35. f. X. quoad figuram.

*List. gæd.* 336. f. 140. quoad iconem.

Habitat hujus *Larva* in mari, latitat sp̄e intra tubulos filiformes molles argillaceo-glareosos, quos construit longissimos. *Tipulam* iptam nullibi frequentiorem vidimus, quam in *Oelandie* lucis; inque *Scania* 223.

DESCR. Hæc Culice pipiente duplo major est. Alæ incubentes, membranaceæ, puncto nigro in medio alæ, ad marginem exteriorem ex anastomosi duorum vasorum orto. Corpus fuscum, sed nuper exclusum omnino vitide, præsertim ad latera thoracis versus abdomen; hirsutes vix ulla in toto corpore; incisurarum margines pallidiores. Gibber seu sacculus sub thorace. Pedes antici felique longiores, non tamen elevati. Os palpis incurvis, non pungens. MAS antennis plumosis ex pilis pallidis undique spectantibus, & ano seu cauda elevata, bifida. FÆMINA antennis modo villosis, cauda non elevata, nec alis longiore. LARVA filiformis, longa, late rubra, mollis, 12 articulis composita, cauda bifida. Pedes duo pone caput & totidem ante caudam, omnes absque unguibus, obrusi, apice pilis ciliati, in penultimo segmento paria duo cirrhorum filiformium pedibus ipsis longiorum.

1759. *TIPULA litoralis virescens*, alis immaculatis, pedibus anticis longissimis.

α *Tipula viridis*, alis albis immaculatis. Fn. 1140.

Habitat copiose in altissimis montibus Norrtellie.

DESCR. Culice vulgari minor. Corpus totum pallide flavum. Pedes longi, virides; antici longissimi. Antennæ brevissimæ; maris pectinatæ. Oculi nigri. Alæ incubentes, striatae.

β *Tipula fusca*; abdomine anteriore viridi. Fn. 1136.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Caput, thorax & tria posteriora segmenta abdominis fusca sive nigricantia. Abdomen tetes, viride, exceptis articulis ultimis. Alæ albæ, immaculatae. Pedes longi, ex parte albi. Antennæ maris plus mosæ, fuscae. Magnitudo Culicis vulgaris. Pedum genicula nigricantia. Pedes antici longissimi.

1760. *TIPULA motitatrix* pedibus anticis maximis motatorius; annulo albo.

*Tipula* pedibus anticis maximis antenniformibus motatricibus; annulo albo. Fn. 1137.

*Frisch. germ.* 11. p. 7. t. 13. *Culex luteo viridis*, pedibus antenniformibus.

Habitat in pratis graminosis & lucis, in gramine juxta terram, Larva autem in aqua.

DESCR. Corpus in aliis dilute viride, in aliis nigro & incarnato variegatum;

tum; a tergo thoracis lineæ tres, quarum intermedia brevior. *Pedes* antici duplo longiores, quos sedens eréctos tener & motitat instar antennarum, quas habet breves, in mare plumosas, non ita in fæmina. Omnes *pedes* annulo nigro cinguntur.

**1761. TIPULA vibratrix** pedibus anticis maximis motatoriis: apice albis.

*It. cel.* 160. nomen idem.

*DESCR.* Hæc antecedenti duplo major. *Abdomen* tenuë, viride. *Thorax* ater. *Pedes* albidi, sed antice versus basin nigri. *Antennæ* fuscæ, in mare plumosæ.

**1762. TIPULA tremula** pedibus anticis longissimis motatoriis nigris: annulis albis.

*Habitat* passim. T. Bergman.

*DESCR.* Oculi nigri. *Antennæ* pilosæ. *Thorax* pallidus maculis tribus longitudinalibus nigris. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ. *Abdomen* flavo-ru-brum.

**1763. TIPULA monilis** pedibus albis: annulis novem nigris, alis albo cinereoque variis.

*Tipula* pedibus albis: annulis novem nigricantibus, alis albo cinereoque maculatis. *Fn.* 1139.

*Habitat* in Scania. D. Leche.

*DESCR.* Magnitudo Culicis vulgaris. *Alæ* albo cinereoque valde maculatæ. *Pedes* longi, nivei, singuli annulis circiter novem fuscis, belle variegati, quibus ab omnibus facile distinguitur.

**1764. TIPULA macrocephala** corpore virescente, oculis thoracisque tergo nigris. *Fn.* 1141.

*Habitat* in Litoribus humidis.

*DESCR.* Vix pediculo major; *Alæ* alæ incumbit, quasi unica esset, nitida. *Corpus* subflavum, a tergo thoracis nigrum. *Oculi* magni, nigri, caput quasi nigrum efficiunt, *Antennæ* nigrae; articulis decem globosis. *Alæ* hyalinæ nervis tribus, quorum marginalis cum apice intermedio junxit; at nervus intimus versus basin marginis bifidus est.

**1765. TIPULA Marci** nigra glabra: alis nigricantibus, femoribus anticis introrsum sulcati. *Fn.* 1143.

*Reaum. gall.* 5. t. 7. f. 17, 18.

*Habitat* frequens in *fimotis* & *vaperariis* hortorum primo vere.

*DESCR.* Longitudo muscae domesticæ, sed multo angustior; totum *Corpus* & artus omnes nigra. *Antennæ* capite fere breviores, incurvatae, boium cornua referentes, nigrae, singulâ septem articulis constat, quasi perfoliatæ essent, hinc brevissimæ; sub ore duo *Palpi* inflexi. *Os proboscis* est, non aculeus. *Abdomen* maris lineare & atrum, fæmina vero subtus flavescens crassum. *Alæ* nigricantes margine exteriore in medio nigrae obscura

scura macula, vel saltem margine ipso magis atro. Thorax glaber est, pone carinatus. Alæ incubentes; Femora antica crassiora, interiore latere fulco longitudinali exarata.

1766. TIPULA brevicornis nigra glabra, alis margine nigricantibus, tibiis anticis spina terminatis.

Habitat in umbrosis, saepe adhaerens reperitur Lychnidi viscaria.

DESCR. Facies T. Marci, at magnitudo Culicis pipientis. Corpus nigrum, glabriuscum. Antennæ brevissimæ, filiformes. Palpi cauda longiores. Abdomen lineare. Alæ incubentes margine exteriorè nigricante e lineis duabus crassioribus, quæ in medio maculam constituent. Pedes potius abdomine paullo longiores. Tibiae anticæ terminatæ spina genina rigida; exteriorè majore.

1767. TIPULA putris fusca, alarum basi cinerea. Fn. 1144.

Frisch. germ. 4. p. 37. t. 22. Musca vermis rerum putridarum.

Habitat in terra, primo vere frequens in vaporariis, sedens in vasis & testis.

DESCR. Magnitudo pediculi; Tota fusca. Abdomen glaucescens. Antennæ filiformes, longæ, 14 articulis constantes. Thorax gibbus. Halteres exalbidi.

1768. TIPULA Febrilis atra oblonga hirta, alis nigricantibus.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 61. Musca oblonga atra hirsuta, alis fuscis incubentibus, pedibus nigris. Fn. 1145.

Pet. gaz. 22. t. 14. f. 4. Musca oblonga nostras nigra.

Gœd. belg. 1. p. 31. t. 6.

List. gœd. 260. t. 108.

Reaum gall. 5. t. 7. f. 7, 12.

Habitat saepius apud agros febre intermittente laborantes.

DESCR. Magnitudo muscae domesticæ, sed magis oblonga, toto corpore & pedibus nigra, pilis hirsuta. Alæ dorso sibi invicem incubunt, ac si unica esset ala; sunt etiam e membranaceo seu aquo colore in nigredinem transeunte; certe margo alarum exterior omnino niger est.

1769. TIPULA Florilega atra holosericea. Fn. 1146.

Habitat in ramis arborum, præsertim in Malis post pluvias; copiosissima in Belgio, rario in Suecia.

DESCR. Parva est musca, aterrima, holosericum superficie referens, mollis: lente inspecta tota pilis tenuissimis densis vestita cernitur.

1770. TIPULA hortulana alis albis: margine exteriorè nigro, thorace abdomineque rubro. Fn. 1147.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 62. Musca corpore rubro, capite pedibusque nigris, alis albidis: margine exteriori nigro cum puncto.

Habitat in *Asparago & floribus arborum*, quas destruit.

*DESCR.* Magnitudo Muscae domesticæ. Caput parvum, nigrum. Thorax & Abdomen rubra, glabriuscula; ubi abdomen jungitur thoraci nigredo a tergo apparet. Alæ albae, sed margo crassior longitudinalis ater est. Pedes nigri. Femora longa. Sexus variat: alter totus ater est, sed femora longa & crassiuscula.

1771. TIPULA *Phalænoides* alis deflexis cinereis ovato-lanceolatis ciliatis. Fn. 1148.

*Aet.* upf. 1736. p. 31. n. 13. Culex alis depressis margine villosis,

*Frisch. germ.* II. p. 6. t. II. Culex parvus cinereus, alis pendulis.

*Leuwenh. epist.* 1692. jun. 24. p. 473. f. 2. 3.

Habitat in parietibus ad sterquilinia, & ubi venti silent.

*DESCR.* Minima est. Alæ ratione magnitudinis maximæ, ad latera deflexæ, ut in Phalænis, lanceolato-ovatae, undique ciliatae, striatae, acutæ. Antennæ filiformes, cinereæ, articulis XI. nigricantibus, globosis construetæ.

1772. TIPULA *hirta hirsuta*, alis deflexis ovatis ciliatis albo nigroque tessulatis.

Habitat in *Arctio Lappa*. C. Alströmer.

*DESCR.* Statura T. Phalenoidis, sed tota hirta, albe nigroque pulcherrime tessulata, Alarum margine omni hirsuto s. ciliato. Antennæ filiformes, longitudine fere corporis, verticillatim villosæ.

1773. TIPULA *notata atra*, alis albis, abdominis latere antico macula alba. Fn. 1149.

Habitat in plantarum folijs.

*DESCR.* Musca domestica minor. Thorax glaber, cum toto corpore, ater; Antennæ XI. articulis, quasi perfoliatæ: primum unum utrinque in singulo latere abdominis juxta pedus album; margo thoracis interdum albus conspicitur, quasi lineola arcuata, reliqua omnino atra.

1774. TIPULA *Juniperina* alis incumbentibus glaucis: margine tenuiore villosis. Fn. 1150.

*Smolandis Kikbär. W:gothis Orkorn. It. W:gotb.* 63.

Habitat in *Juniper*. Ex ovo deposito in apicibus ramorum Juniperi emascitur ibidem æstate quoddam Triglochin (quo Smolandi in Tusci ferina utuntur,) constans foliis triplicibus, conniventibus, ventricosis, ore patulis, intra quæ tria alia foliola, minima, exacte conniventia, ne ærem admittant, incidentia Larvam rubram, quæ Major mense in Pupulam rubram, alis nigris, pedibus albis mutatur, & haec in Tipulam; quæ saepe consumitur ab

*Ichnæus*

*Ichneumone Juniperi*. Gallæ istæ rubræ in foliis & petiolaris *Populæ tremulæ*, magnitudine pisorum, etiam *Muscum*, *Juniperi* & *Salicis* simillimam, & forte eandem, producunt; sed hanc sufficienter non examinavi.

DESCR. Facies Culicis. *Pedes* animalculo longiores. *Antennæ* setaceæ five moniliformes, articulis circiter 14 globofis, remotis, pilis aliquot vagis ornatae. *Caput* minimum. *Oculi* nigri. *Thorax* & *Abdomen* fulvo-rufescens; humeri gibbi. *Alæ* membranaceæ, margine exteriore nigricante, præter nervos in singula binos; at margo alarum exterior villosus est. *Halteres* sub alis, ut in reliquis.

OBS. Frisch. germ. 4. p. 38. t. 21. Musca vermis rubri gemmarum *Salicis* multa communia cum nostra habet, ut dubitemus an specie diversa; cum Larvæ, Pupulæ & Tipulæ ipsius plurima attributa eadem & margo alarum interior hirsutus.

1775. *TIPULA palustris* atra, abdomine rufescente. Fn. 1151.  
Habitat in flore *Iridis* *Pseud Acori* frequens.

DESCR. Hæc omnium minima, vix pulicis magnitudine; grandinis instar copiosa supra aquas, lacus & paludes æstate volitat. *Alæ* huic incumbentes. *Abdomen* ovatum.

1776. *TIPULA longicornis* antennis corpore incarnato longioribus. Fn. 1152.

Habitat inter *Carduum* palustrem media æstate, præsertim ad Oestunaberg.

DESCR. Minima est & pulice fere minor. *Caput* nigrum fronte albida. *Thorax* a tergo fulvis. *Antennæ* & *Pedes* nigri longi; *Alæ* abdomine longiores membranaceæ incumbentes. *Antennæ* corpore & alis fœqui-longiores.

1777. *TIPULA pennicornis* antennis bipectinatis, corpore atro, halteribus albis.

Habitat heic minus frequens.

DESCR. Pulice minor, angusta. *Corpus* aterrimum.

1778. *TIPULA rufipes* atra, pedibus rufis, alis medio nigris basi flavescentibus.

Habitat pañim. Uddman.

DESCR. Magnitudo pulicis. *Corpus* atrum. *Antennæ* pallidæ, villosæ. *Alæ* incumbentes, basi flavescentes, ceterum fulco-hyalinæ, in medio macula l. fascia tota nigra. *Pedes*, exceptis plantis primis, rufæ; anteriores longiores.

## Musca.

1779. *MUSCA plebeja* antennis filatis subulatis, corpore cinereo hirto, abdomine incisuris margine albidis.

Habitat passim, minus frequens.

DESCR. Media. *Corpus nigrum*, hirtum. *Oculi brunnei*. *Alae & Tibiae* subtestaceæ. *Abdomen conicum*, hirtum, segmentorum marginibus pallidis,

1780. MUSCA *chamæleon* antennis filatis clavatis, scutello bidentato luteo, abdomine nigro: fascijs lateralibus luteis. Ocellus aquæ. Fn. 1029.

Musca fusca subhirsuta, abdominis margine acuto lineis utrinque tribus flavis, quarta triangulari. Fn. 1083.

*Hoffn. ins. 3. t. 7.*

*Goed. belg. I. p. 128. t. 70. Chamæleo.*

*List. goed. 355. t. 144.*

*Frisch. germ. 5. p. 28. t. 10. Tabanus aquaticus.*

*Swamm. quart. 138. t. 4. Tabanus.*

Habitat in Paludibus & Piscinis frequens.

DESCR. Musca domestica major. Thorax fusco-cinereus, villosus, apice flavus. Oculi fuscæ, linea transversa obcuriore. Alæ subferrugineaæ. Abdomen ovatum, nigricans, segmento singulo apice utrinque (non in medio) flavo, excepto 4:to quod terminatur triangulo flavo. Halteres albi. Antennæ nigrae clavato-subulatae. Femora nigra, tibiis ultimis flavis.

1781. MUSCA *microleon* antennis filatis clavatis, scutello bidentato nigro, abdomine atro: strigis lateralibus albis.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Similis præcedenti, sed duplo minor. *Corpus nigrum*. *Scutelli dentes ferruginei*. *Abdominis segmenta ad latera linea transversa, flavæ, angusta*.

1782. MUSCA *hydroleon* antennis filatis clavatis, scutello bidentato nigro, abdomine viridi; medio nigro annulato.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. M. *chamæleone minor*. *Caput & Thorax nigra*. *Scutellum bidentatum*, nigrum, dentibus pallidis. *Halteres virides*. *Abdomen undique viride*: dorso maculis tribus (prioribus sensim minoribus) nigris, connatis, antice lateribus angulatis. *Pedes testacei*,

1783. MUSCA *pantheriana* antennis filatis, corpore atro, abdominis dorso maculis tribus, marginibusque totidem connatis albis.

Habitat rarius heic loci.

DESCR. Minor. *Caput nigrum* occipite puncto flave. *Antennæ flavescentes*. *Thorax flavis* lineis tribus latè apice connexis. *Scutellum flavum*. *Halteres flavi*. *Abdomen flavum* segmentis margine nigris; tribus prioribus macula nigra transversa. *Alæ hyalinae*.

1784. MUSCA *moris* antennis filatis subulatis, corpore hirto atro, aliis dimidiato-nigris.

Musca

*Musca atra*, alarum margine tenuiore sinuato-albicante.  
*Fn. 1067.*

*Act. upf. 1736. p. 32. n. 35.* *Musca atra*, alarum margine inferiore albescente lacerato.

*Aldr. inf. 348. t. 2. f. 13.*

*Jonst. inf. t. 8. muscarum aldrovandi t. 2. f. 13.*

Habitat in Hortis passim.

*DESCR.* Totâ atra, cum capite, thorace, abdomine, pedibus, alis; sed margo alarum tenuior albus est, vel potius exalbidus; dum hæc albedo sinus format, alainque quasi obtuse ferratam reddit, & in abdomine a tergo duò vel quatuor puncta nivea ad margines segmentorum.

**1785. MUSCA maura** antennis filatis subulatis, corpore hirto atro albo-fasciato, alis nigro variis.

Habitat in prædiis.

*DESCR.* Caput nigrum. Oculi fusci. Antennæ brevissimæ, cylindricæ, terminatæ seta. Thorax niger, villosus, utroque latere linea longitudinali exalbida. Abdomen ovatum, hirsutum, nigrum, in medio fascia linearis exalbida; ad basin vera & apicem abdominis pili albidi. Halteres albi capitellis niveis. Pedes nigricantes.

**1786. MUSCA tarda** antennis filatis subulatis, corpore lœvi, thorace æneo-nigro, abdomine atro, pedibus subtestaceis.

Habitat rario.

*DESCR.* Musca domestica dimidio minor. Antennæ breviores. Oculi fuisci. Thorax niger, parum cupreo colore lucens, non politus. Halteres albi. Abdomen oblongiusculum, atrum. Femora lurida s. livido-testacea, ut & Tibiæ, sed postice magis nigrae. Alæ incumbentes tegunt Abdomen ac si nullæ essent alæ, singulari modo. Oculi facia fusca.

**1787. MUSCA hottentotta** antennis filatis subulatis, corpore hirto lutescente, alis costa fuscis.

Habitat ad pagos.

*DESCR.* Media. Corpus nigrum, vellere testaceo hirtum. Oculi brunnei, Abdominis segmenta latitudine æquata, ultimo brevissimo, unde postice brufissimum.

**1788. MUSCA scolopacea** antennis filatis apice setigeris, abdome flavescente trifariam nigro-punctato, alis nebulosis. Musca alis membranaceis nigro maculatis, abdomine triplici ordine punctorum nigrorum. *Fn. 1066.*

Habitat in nemoribus.

*DESCR.* Musca domestica longior. Caput & Thorax cinerea; in thorace striæ tres, fusæ. Alæ fuscescentes maculis nigris & albidis. Abdomen flavescentis cum ordine longitudinali macularum nigraturum a tergo, & uniuersaque ordine laterali ad latera; Pedes pallidi. Oculi fusci, Anus nigricans. Facies Afili, sed os musæ.

1789 MUSCA *tringaria* antennis filatis apice setigeris, abdome trifariam nigro punctato, thorace unicolore, alis immaculatis.

Habitat in nemoribus rarius.

DESCR. Similis praecedenti, sed minor. Thorax cinereus. Scutellum flavicans. Abdomen oblongum, flavum, triplici ordine punctorum nigrorum; ultima duo segmenta nigra sunt. Pedes testacei. Alæ pallide, immaculatae.

1790. MUSCA *Conopsoides* antennis clavatis mucronatis basi coadunatis, corpore atro, abdominis cingulis tribus flavis.

Habitat apud nos minus frequens.

DESCR. Caput nigrum. Frons utrinque flava. Occiput margine flavo. Antennæ atræ, clavatae, acutæ, ultra medium versus basin connatae. Thorax ater lineola parva lateraliter ante singulas alas; lineola flava ad scutellum. Alæ margine exteriori fuscæ. Abdomen clavatum segmentis tribus flavis integris & quarto ad basin flavedine interrupta. Halteres albidi.

1791. MUSCA *anilis* antennis filatis hirtis muticis, corpore villoso albo canescente.

Habitat ratus apud nos. J. Alströmer. In Scania D. C. Solander.

DESCR. Musca Magnitudo fere domestica, sed Abdomen oblongum, acuminate, conicum totum albo-canum. Thorax cinereus, villosus & Tibiae pallidæ Halteres albidi. Antennæ filiformes, truncatae, obtusaæ, basi pilis adspersæ, sed absque seta aut arista. Alæ venis fuscis analomofantibus. Oculi brunnei.

1792. MUSCA *bombylans* antennis plumatis, tomentosa nigra, abdome hirsuto postice rufo.

Habitat in Pratis.

DESCR. Facies A. Bombylii. Frons pallida. Oculi nigri. Antennæ pluma nigra. Thorax hirsutus, flavidus. Abdomen basi hirsutum, flavidum, medio nudiusculum atrium, apice hirsutum fulvum; subtus atrium. Alæ exusto colore variegatae. Pedes nigri.

1793. MUSCA *mystacea* antennis plumatis, tomentosa nigra, thorace, abdominis apice, alarumque basi fulvis.

Musca hirsuta, thorace, abdominis apice, alarumque basibus fulvis. Fn. 1069 (mas.)

DESCR. Inter muscas maximas locum tenet. Abdomen ovatum, nigrum, pone pilis fulvis hirsutum; Thorax similiter fulvis pilis vestitus. Caput & Pedes nigri. Alæ hyalinae versus basin, præsertim versus earum marginem exteriorem, macula magna ferruginea notatae.

β Musca pilota, thorace griseo, abdominis apice albo, alis macula ferruginea. Fn. 1071. (femina)

*Aet. upf. 1736. p. 32. n. 32.* **Musca fusca**, abdominalis apice  
villis albo, alis pallidis macula lunata ferruginea.

Habitat in hortis & nemoribus rarioꝝ.

*DESCR.* E maximis muscis haec est. Corpore toto nigro, sed frons pilis  
flavis. Thorax pilis griseo-flavis, at Abdomen versus basin nudum, nigrum,  
versus apicem autem seu posteriora pilis albis vestitum. Tibiae versus  
genicula, quibus femoribus junguntur, exalbidæ. Alæ exalbidæ venis  
fuscis, in medio macula transversali ferruginea notatae.

**1794. MUSCA lappona** antennis plumatis, subtomentosa nigra,  
scutello ferrugineo, abdomine cingulis tribus.

**Musca nigra**, alis ferrugineis, abdomine cingulis tribus al-  
bis a tergo interruptis. *Fn. 1087.*

Habitat in Lapponia, Westrobotnia frequens.

*DESCR.* Media. Frons albida. Antennæ breves. Thorax pubescens,  
fuscus, ante alas flavescens. Scutellum subferrugineum. Abdomen atrum,  
tomentosum fasciis tribus albis interruptis. Pedes ferruginei, plantis api-  
ce nigris. Femora antica nonnihil fusca. Alæ extus subferrugineæ.

**1795. MUSCA pendula** antennis setariis tomentosa, thorace  
lineis quatuor, abdomine fasciis tribus interruptis flavis.

**Musca thorace striis** quatuor flavis, abdominalibus segmen-  
tis tribus interrupto flavis. *Fn. 1081.*

*Reum. gall. 4. t. 31. f. I-II.*

*Frisch. germ. 4. p. 26 t. 13.*

Habitat in aquis stagnantibus, ubi Larva longo filo pendula.

*DESCR.* Oculi fulci. Thorax a tergo 4 striis flavis, & tribus nigris latio-  
ribus alternantibus. Abdominis segmenta fusca, singula fascia flava ma-  
gna interrupta (posterioribus minoribus); subtus est totum primum &  
maximum segmentum maxima ex parte flavum. Femora postica crassa.

**1796. MUSCA florea** antennis setariis tomentosa, thorace fa-  
sciis duabus inæqualibus nigris, abdomine duabus luteis  
ſubabruptis

**Musca thorace flavo**, abdomine fasciis quatuor luteis trans-  
versis: prima majore interrupta. *Fn. 1080.*

*Aet. upf. 1736. p. 32. n. 36.* **Musca subhirsuta**, abdomine  
annulis luteis nigrisque variegato.

*Albin. angl. 17. f. I*

Habitat in horto academico ubique in floribus.

*DESCR.* Facies tere Bombylii. Thorax flavis pilis, vestitus fasciis duabus  
latis nigris: posteriore crassiore. Oculi fulci. Antennæ obovatae. Tibiae  
albae & luteæ. Abdomen ovatum, in segmento uno par macularum ma-  
jorum, quod fere coit a tergo; in segmento 2:do par macularum angui-  
tiorum, quod coit a tergo; margo hujus segmenti in medio flavus. Seg-  
mentum 3:um versus basin transversaliter flavum, ut & margo, hinc ex-  
surgit a tergo abdominalis primo macularum majorum lutearum par, dein  
tres fasciæ transversæ angustiores, omnes pilis luteis composite.

1797. **MUSCA nemorum** antennis setariis tomentosa, abdomini ne segmento luteo cingulisque tribus albis: segmento primo lateribus luteo.

*Musca thorace griseo; abdominis basi fascia lutea interrup ta, marginibus incisurarum exalbidis.* Fn. 1078.

*Act. upsi. 1736. p. 32. n. 37. Musca abdomine fusco, annulis luteis, lateribus flavis.*

*Alb. angl. 13. f. M. L.*

*Reaum. gall. 3. t. 31. f. 8.*

*Merian. eur. t. 2.*

Habitat in horto academico ubique in floribus.

*DESCR.* *Musca domestica major est. Thorax villis luteis adspersus. Ab domen nigrum, utrinque juxta basin seu in primo & secundo segmento luteum, dein tribus lineis transversis angustissimis albicantibus notatum, quæ oriuntur a segmentorum omnium abdominis margine albicante. Frons nigra. Tibiae superius albidæ. Frons pallida. Oculi fuscii, punctum marginale nigrum minimum in medio alæ. Scutellum colore thoracis.*

1798. **MUSCA arbutorum** antennis setariis tomentosa, thorace griseo, abdomine subfusco: segmento primo secundoque latere ferrugineis.

Habitat in pratis floridis cum praecedente.

*DESCR.* Similis *M. nemorum*, at *Thoracis maculae non obsoletæ; in hac duo abdominis segmenta latere flava, in illo unicum; segmentorum margines in hac flavi, in illa albi. Frons, in hac, non supra antennas flava, ut in illa.*

1799. **MUSCA tenax** antennis setariis tomentosa, thorace griseo, abdomine subfusco unicolo, tibiis posticis compresso-gibbis.

*Musca pilosa, thorace griseo, abdomine nigro, aliis macula obsolete ferruginea.* Fn. 1072.

Habitat in aquis flagrantibus, cloacis, Bibliopegorum pappo, vix preli pressione destruenda larva.

*DESCR.* Est e maximis muscis. Nigra est, sed frons & thorax pilis griseis vestiti. *Abdomen nigrum, minus pubescens. Alæ membranaceæ, venarum anastomosi juxta medium marginis anterioris ferruginea. Oculi nigri, linea dupli perpendiculari fulca. Pedum posteriorum pars femore & proximo articulo seu tibia nigruum est, hæc tibia etiam pone gibba observatur. Facies apis domesticæ.*

1800. **MUSCA intricaria** antennis setariis tomentosa lutescens, abdominis apice albido, genubus albis.

Habitat in Pratis.

*DESCR.* *Habitus M. oestracea. Corpus fuscum. Thorax & Scutellum vel lere ferrugineo vestitum. Abdomen villosum, nigrum, postice album. Pedes nigri. Tibiae basi albidæ. Alæ fascia obsoleta ferruginea.*

1801. MUSCA *oestracea* antennis setariis tomentosa nigra, scutello albido, abdominis apice luteofuscante.

Musca pilosa nigricans, abdominis basi alba, apice fulvo; *Fn. 1070.*

Habitat in sylvis.

*DESCR.* Facies Bombylii: magnitudo muscae domesticæ, sed angustior. Caput nigrum. Thorax niger, apice albido; Abdomen in medio nigrum, basi albis pilis, apice vero fulvis vestitum. Pedes nigri. Alæ membranaceæ, venis ferrugineis, tenuissimis, & macula obsolete ferruginea in medio alte, eaque satis magna.

1802. MUSCA *fallax* antennis setariis fusca, fronte flava, ab domine apice tomentoso flavo, squama halterum lactea.

Habitat in nemoribus.

*DESCR.* Antecedenti minor. Corpus fulcum, parum pubescens. Facies flavo-albida. Antennæ ferrugineæ. Scutellum thoraci concolorum. Abdominis ultimum segmentum fulvum. Halteres albi. Femora nigra. Tibiae anteriores flavescentes, posticæ sola basi. Plantæ flavæ apicibus nigris. Alæ vix maculatae.

1803. MUSCA *lucorum* antennis setariis subtomentosa, thora ce subgriseo, ab domine nigro: segmento primo toto flavo

Habitat in Lucis.

*DESCR.* Statura præcedentis. Facies albida. Corpus velle griseo s. subferrugineo vestitum. Abdominis pars diuidia s. postica atria. Pedes nigri. Tibiae anticæ exteriori latere flavæ. Alæ macula fusca transversa lata.

1804. MUSCA *sylvarum* antennis setariis tomentosa nigra, ab dominis ultimo segmento tomentoso flavo.

Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Media, oblonga: Caput nigrum: fronte argentea. Thorax vix manifeste tomentosus, flavescente fulcove renitens pro diverso situ. Scutellum concolorum. Abdomen oblongum, nigrum, segmento 2 lateribus flavo aureo; 3 toto flavissimo & fere aureo; 4 s. anus minimus niger. Femora nigra. Tibiae maximum partem flavæ. Plantæ flavæ apicibus nigris.

1805. MUSCA *bicolora* antennis setariis elongatis nigra, thora ce punctis lateralibus, ab domine que cingulis duobus flavis.

Musca atra, ab domine cingulis duobus a tergo flavis. *Fn. 1086.*

Habitat inter flores.

*DESCR.* Magnitudo muscae domesticæ, vel paullo major. Corpus totum atrum glabrum. Abdomen superne fasciis duabus transversis flavis, remotissimis: prima fere interrupta: subitus vero unica transversa flava, quæ alternat cum dorsalibus. Frons lineis duabus flavis; ad basim thoracis utrinque macula parva lutea. Pedes versus apices flavi. Alæ fusæ, margine crassiore fulcescentes. Halteres flavi.

1806. **MUSCA arcuata** antennis setariis elongatis nigra, thorace lateralibus maculis, abdomine cingulis quatuor arcuatis flavis.

Habitat in pratis floridis.

*DESCR.* Media. Caput fronde lutescente. Antennæ nigrae, longitu line capitis. Thorax pubescens, nigricans, lateribus luteo maculatis. Scutellum luteum, medio nigrum. Abdomen ovatum, nigrum arcubus quatuor luteis medio interruptis, cruribus posteriora spectantibus; Subtus glabrum etiam fasciis quatuor luteo-ferrugineis interruptis. Pedes toti ferruginei.

1807. **MUSCA mutabilis** antennis setariis elongatis tomentosa, abdomine nigro griseoque mutabili, scutello ferrugineo, thorace immaculato.

Habitat in pratis.

*DESCR.* Media, pubescens. Thorax fuscus vellere subtestaceo. Scutellum subferrugineum. Abdomen ovatum, nigricans, vario situ testaceo velle re nitens. Pedes testacei femoribus nigris. Alæ venis ferrugineis reticulatae.

1808. **MUSCA devia** antennis setariis elongatis subtomentosa, thorace cæruleo: abdomine violaceo.

Habitat in pratis rarius.

*DESCR.* Magnitudo Mus. domesticæ. Antennæ nigrae, clavatae acutæ cum seta a latere. Frons cærulea, nitens. Oculi fusi. Thorax cærulescens, nitidus, pilis griseis obrectus. Abdomen atropurpureum, nitens, pilis griseis brevissimis fere rectum. Alæ hyalinæ venis nigris. Tibiae omnes testaceæ.

1809. **MUSCA ichneumonea** antennis setariis elongatis cylindricis, thorace pedibusque longiusculis ferrugineis, abdome cinereo.

Habitat rarius in floribus.

*DESCR.* Figura Ichneumonis, oblonga, angusta. Caput nigrum. Antennæ pallidæ, longitudine capitis. Thorax ferrugineus, antice niger. Scutellum nigrum; sub scutello utrinque mucro pallidus. Pedes testacei. Alæ pallidæ.

1810. **MUSCA diophtalma** antennis setariis nuda, thorace maculis abdomine cingulis sex flavis, femoribus posticis dentatis.

Habitat in floribus.

*DESCR.* Media. Frons flava. Oculi purpurascentes margine & fascia perpendiculari nigra. Thorax niger, cui puncta tria s. quatuor flava. Scutellum nigrum apice ferrugineo. Abdomen nigrum, segmentis sex marginé flavis: penultimo interrupto. Pedes ferruginei; Femora postica subtus dente notata.

1811. **MUSCA vespiformis** antennis setariis nuda, thorace maculis, abdomine cingulis sex flavis, pedibus anticis nigris.

Habi-

## Habitat in Pratis.

*DESCR.* Similis *M. diophtalmæ*. *Antennæ* flavæ. *Thorax* maculis novem albicantibus. *Scutellum* glabrum, atrocaerulecens. *Abdominis* segmenta tria fascia duplice cinguntur, quæ fasciæ in singulo segmento & margine medio uniuertunt & ad latera. *Halteres* albi. *Pedes* ferruginei, sed antice maximam partem nigri. *Frons* flava. *Antennæ* ferrugineæ.

1812. *MUSCA festiva* antennis setariis nuda, thorace lineis lateralibus, abdomine cingulis quatuor flavis interruptis.

## Habitat in Pratis rarius.

*DESCR.* *Corpus* *Musca domestica* majus, atrum. *Frons* lineis duabus perpendicularibus flavis. *Antennæ* nigrae, capite longiores, subclavatae cum arista laterali. *Thoracis* latera linea longitudinali flava, interrupta, cui subjacer macula V flavum referens cum duobus punctis. *Scutellum* delta flavo inscriptum. *Abdomen* arcubus quatuor flavis interruptis, quanto integro terminali. *Subtus* fascia flava & posterius puncta duo flava. *Pedes* ferruginei. *Tibiae* flavae. *Alæ* venis ferrugineis.

1813. *MUSCA glauca* antennis setariis subtomentosa, thorace immaculato, scutello glauco, abdomine cingulis tribus albidis interruptis.

## Habitat in pratis rarius.

*DESCR.* Caput flavum. Oculi purpurascentes. *Antennæ* nigrae. *Thorax* griseo-fuscocens. *Scutellum* flavidum. *Abdomen* nigrum: segmentis tribus basi cinereo glaucis, hinc fasciæ tres glaucae interruptæ. *Pedes* ferruginei. *Femora* nigra, apicibus ferruginea.

1814. *MUSCA noctiluca* antennis setariis subtomentosa atra, abdominis primo segmento maculis duabus pellucidis.

## Habitat in Sylvis.

*DESCR.* Magnitudo media. Caput nigrum, fronte subpilosa. Oculi brunnei. *Antennæ* nigrae. *Thorax* niger, antice inspectus hirsutus, postice glaber adparet. *Abdomen* glabrum: segmento primo maculis duabus, hyalinis, ovatis, diaphanis, apice magis distantibus, supra & subtus pellucentibus.

1815. *MUSCA gibbosa* antennis setariis subtomentosa nigra, abdomine subgloboso cingulis quatuor albis, squamis halterum buccatis.

## Habitat rarius apud nos.

*DESCR.* Minor. Caput nigrum. Oculi purpurascentes. Thorax niger villis canescens. Scutellum concolorum. Squamae Halterum albæ, gibbosæ, magnæ. Abdomen subglobosum, atrum; marginibus segmentorum late niveis. Femora nigra apicibus subferruginea; Tibiae subtestaceæ.

1816. *MUSCA Ribesi* antennis setariis nudiuscula nigra, thorace immaculato, abdomine cingulis quatuor flavis: primo interrupto.

Musca

**Musca** abdomine ovato nigro: lunularum pari, cingulisque tribus flavescens. *Fn.* 1089.

*Act. upf.* 1736. *p.* 32. *n.* 41. **Musca nigra** glabra, abdome cingulis luteis: superioribus dimidiatis cincto.

*Gæd. belg.* 1. *p.* 111. *t.* 41.

*List. gæd.* 315. *f.* 133.

Habitat in hortis, vicitans *Larva* aphidibus, præsertim *Ribis rubri*.

**DESCR.** Hæc sequenti facie, magnitudine; figura simillima: differt solum abdomine a tergo duabus lunulis in primo segmento, & deinceps tribus cingulis transversis flavescens, in medio dorso fere angustioribus. Scutellum etiam flavescens. Os, pedes, abdomen subtus, flavescens; in margine extiore *Ala* linea fusca obsoleta.

**1817. MUSCA Pyraftri** antennis setariis nudiuscula nigra, thorace immaculato, abdomine bis tribus lunulis davis recurvatis.

**Musca** abdomine ovato: tribus paribus lunularum albican-  
tium. *Fn.* 1090.

*Act. upf.* 1736. *p.* 32. *n.* 39. **Musca fusca** glabra, dorso abdominis tribus paribus albarum lunularum notato.

*Gæd. belg.* 1. *p.* 99. *t.* 47. Proboscis elephantis.

*List. gæd.* 319. *f.* 134.

*Alb. apgl.* 66.

*Mer. eur.* *t.* 89.

*Blank. belg.* *t.* 10. *f.* P.

*Reaum. gall.* 3. *t.* 31. *f.* 9.

*Frisch. germ.* 11. *p.* 17. *t.* 22. *f.* t.

Habitat Larva in foliis arborum, præsertim *Pyri*, vicitans aphidibus.

**DESCR.** Frons albido-glaucia. Oculi fusci. Thorax fusco-æneus, latetibus & pectore villoso griseis. Scutellum lividum. Abdomen atrum lunulis trium parium albis recurvatis: poche lunulæ has lineolæ due albæ. Subtus abdomen albicans. Halteres albi. Antennæ nigricantes. Femora nigra. Tibiae flavescentes.

**1818. MUSCA transfuga** antennis setariis nigra, abdome cylindrico tomentoso lunulis bis tribus albidis recurvatis.

**Musca** abdomine subcylindraceo; tergo tribus paribus lunularum albican-  
tium. *Fn.* 1094.

*Act. upf.* 1736. *p.* 31. *n.* 40. **Musca fusca**, abdome oblongo pubescente, dorso tribus paribus albarum lunularum notato.

Habitat inter flores.

**DESCR.** Corpus incanum. Abdomen pubescens, lunulis minoribus sinu thoracem relipientibus: harum lunularum posticum par cohæret cum albedine, qua abdomen subtus tingitur.

1819. MUSCA *Menthastris* antennis setariis nuda nigra, thorace maculato, abdomine cingulis quatuor scutelloque flavis. Musca abdomine arcubus tribus luteis reflexis. Fn. 1097.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 42. Musca fusca, abdomine acuminato: circulis luteis retrorsum flexis cincto.

Habitat in floribus.

DESCR. Parva est, & muſca domes̄tica dimidio minoř, angusta & vespa forma. Pedes flavi. Frons flava. Thorax nigricans, lateribus linea lutea & apice flavus. In Abdominis tetgo tres lineæ flavæ, arcuatæ; arcuum pedibus versus posteriora flexis; primus arcus flavius, in medio interruptus est; secundus vero integer; tertius semi-interruptus; quartus vero interruptus est; quintum segmentum abdominis flavum est, punctis tribus nigris. Abdomen subtus flavum.

1820. MUSCA *scripta* antennis setariis nudiuscula, thorace lineis, scutello abdome neque linearī fasciis flavis.

Musca oblonga; abdome flavo: characteribus nigris transversalibus. Fn. 1091.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 45. Nomen idem.

Habitat in floribus: Larva Aphidibus vicitat.

DESCR. Reliquis longior & angustior est, tota glabra; Pedes flavi. Alæ albae, nitidae. Abdomen tenuie, flavidum, segmentis primis duobus apice & basi fuscis; reliquis versus marginem exteriorem & posteriorem punctis tribus acutis fuscis, velut characteribus notatis. A sequentibus duabus vix nisi abdominis colore differt.

1821. MUSCA *mellina* antennis setariis nuda, thorace subæneo fuscescente iminaculato, abdome maculis octo lutescentibus.

Musca abdome oblongo: paribus tribus tetragonorum lutescentium. Fn. 1092.

DESCR. Sequenti  $\beta$  adeo similis, ut pro eadem habetida. Oculi fusco-ferruginei. Thorax æneo-nigricans, nitidiusculus. Alæ aquæ, nitentes. Apex thoraci non flavidus, sed thoraci concolor. Pedes primores 4 flavi, postici 2 nigri, geniculis luteis. Abdomen oblongum, lineare, nigrum; macularum flavescentium par in primo segmento minus; in secundo segmento par macularum flavescentium majus exakte tetragonarum; in tertio etiam simile, sed minus secundo; in reliquis nulla macula; an sexu solummodo a sequenti diversa? abdome subtus ebrium sive albicans.

$\beta$  Musca abdome oblongo: paribus tribus trigonorum lutescentium. Fn. 1093.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 43. Musca fusca, dorso tribus parious trigonorum luteis notato.

Habitat in plantarum foliis frequens, ubi Larva inter aphides degit. Pupa flava, oblonga, hinc acuminata.

DESCR. Inter minores est & oblonga. Frons flava. Oculi fusco-ferruginei,

ginei. Thorax æneo-nigricans, nitidiusculus, apice flavo. Alæ aquæ. Abdomen nigro-cæruleo-sens, lineare; In primo segmento par punctorum lutescentium; in segmentis 2. 3. 4, singulis scilicet horum, par macula-rum lutescentium, rotundarum, quarum posticum par magis triangula-re, angulo posteriora spicata; ultima duo segmenta flava puncto nigro in medio. Abdomen subtus flavum. Variat in dorso abdominis 4. 3. 1. 2. paribus macularum ferruginearum, variante figura. Thorax a lateribus flava irregulari macula. Pedes flavi.

1822. MUSCA *pipiens* antennis setariis glabra nigra, abdo-mine utrinque albo-maculato, femoribus posticis clavatis dentatis.

Musca oblonga; femoribus posticis majoribus. Fn. 1096.  
A&T. upf. 1736. p. 33. n. 45. Musca oblonga nigra, ab-dominis lateribus inæqualiter albis, pedibus posticis lon-gis.

Habitat in floribus.

DESCR. Corpus totum nigrum, angustum, longum, glabrum Alæ albae, segmenta tria abdominis versus basin utrinque alba sunt. Femora po-stica subtus denticulata. Tibiae postice curvatae annulo pallido. Femora postica saltatoria, reliquis longiora, sed & multo crassiora validioraque, alba utrinque macula, (non tamen semper). Abdominis ultimum seg-mentum subtus nigrum est, reliqua subtus pallida. Frons & Thoracis latera albida.

1823. MUSCA *segnis* antennis setariis glabra, thorace subæ-neo, abdome ferrugineo: apice nigro, femoribus po-sticis clavatis.

Musca oblonga, thorace æneo, abdome anterius flavo, posterius nigro. Fn. 1104.

A&T. upf. 1736. p. 32. n. 33. Musca nigra, abdome an-terius fulvo, alis immaculatis.

Habitat in pratis nemorosis.

DESCR. Magnitudo muscae domesticæ, sed magis oblonga figura. Oculi fusi. Thorax viridi æneus. Abdomen oblongum, in aliis pallido-albe-scens, in aliis ferrugineum, postice autem semper nigrum unico altero segmento, ita tamen ut luteus color majorem locum semper occupet. Femora nigra; tibiæ annulis albis. Alæ aquæ.

1824. MUSCA *femorata* antennis setariis glabra atra oblonga, feinoribus posticis clavatis, pedibusque anticis rubris.

Hab. hat in Pratis, valde segnis.

DESCR. Corpus oblongum, atrum, nudiusculum. Ferruginea sunt anten-narum capitula, pedes quatuor anteriores, femora postica exceptis apici-bus; Halteres. Femora postica magna sunt.

1825. MUSCA *inanis* antennis plumatis, pilosa flavescentia, abdome pellucido cingulisque duobus nigris.

Habi-

Habitat in Lucis.

DESCR. Magna. *Rostrum* utrinque corneum, glabrum. *Thorax* subvillosus, nigricans. *Scutellum* testaceum. *Abdomen* flavum, pellucidum, basi apiceque nigrum; segmenta tria priora margine nigra: primo bifido. *Pedes* fuscescentes, tibiis pallidioribus

1826. MUSCA *pellucens* antennis plumatis, pilosa nigra, ab dominis segmento primo albo pellucido.

Musca abdomine anterius albo, posterius nigro: alis albis: nigra macula. Fn. 1073.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 30. nomen idem.

Habitat rarius in horto academico, & aliis.

DESCR. Certe hæc, si non maxima muscarum nostratum sit, inter maximas tamen omnino est. *Fronte* gaudet alba flava cornea. *Alæ* albæ, præsertim versus basin; in medio alarum inacula magna nigra: intra hanc inaculum & apices alarum venæ fuscæ. *Abdomen* dimidiatum, versus basin supra & subtus album pellucidum, versus apicem nigrum. *Pedes* nigri; minus pilosa est, quam præcedentes. *Oculi* fusi. *Antennæ* flavæ feta nigra pilosa.

1827. MUSCA *meridiana* antennis plumatis, pilosa nigra, fronte aurata, alis basi luteis.

Musca atra; basi alarum ferruginea. Fn. 1077.

Reaum. gall. 4. t. 26. f. 10.

Habitat passim.

DESCR. Est hæc simillima facile maxima in suo genere. Tota nigra: sed ante oculos inacula utrinque deaurata. *Pili* nigri seu potius setæ sparsæ per totum corpus. *Pedes* nigri. *Abdomen* ovatum. *Alæ* hyalinæ, versus basin flavæ sive potius ferragineæ.

1828. MUSCA *cæsar* antennis plumatis, pilosa viridi-nitens, pedibus nigris.

Musca thorace abdomineque viridi-nitente. Fn. 1098.

Act. upf. 1736 p. 33. n. 54. Musca carnivora viridi-aenea, abdomine obtuso.

Mer. eur. t. 49.

Reaum. gall. 4. t. 8. f. 1. & t. 19. f. 8. t. 24. f. 13.-15.

Raj. inf. 272. Musca bipennis, carnariæ vulgaris fere magnitudine, thorace & abdomine supino cœruleo colore pulchro nitente, capite nigro.

Habitat ubique in cadaveribus, carnis & putridis.

DESCR. Musca domestica duplo major. Totum Corpus, thorace & abdome, concolor, scilicet e viridi sericeum sive viridi æneum, valde nitens & politum. *Pedes* atri. *Oculi* rufo-fusi, linea dupli transversum insculpta thoraci. *Abdomen* quatuor articulis, ovatum.

1829. MUSCA *cadaverina* antennis plumatis, pilosa æneo-nitens, thorace cœruleo, abdomine viridi.

*Musca thorace cæruleo nitente, abdomine viridi-nitente.*

*Fn. 1099.*

*Gœd. belg. I. p. 233. f. 54.*

*List. gœd. 305. f. 123.*

*A&T. upf. 1736. p. 33. n. 56. Musca carnivora, pectore cæruleo-æneo, abdomine viridi-æneo.*

*Habitat in cadaveribus.*

*DESCR.* Faccies præcedentis, sed minor, muscæ domesticæ æqualis, differt & colore thoracis cæruleo a præcedenti.

**1830. MUSCA mortuorum** antennis plumatis pilosa, thorace nigro, abdomine viridi. *Fn. 1101.*

*Habitat in cadaveribus & putridis.*

*DESCR.* Facies omnino sequentis, a qua solum differt, quod paulo major sit, quod *Abdomen* e cæruleo-viridi niteat cupri instar, quodque *Frons* inter oculos, una cum antennis & ore, albo aurata sit seu membrana, quod in sequenti non obtinet.

**1831. MUSCA vomitoria** antennis plumatis pilosa, thorace nigro, abdomine cæruleo nitente.

*Musca thorace nigro, abdomine cæruleo. Fn. 1102.*

*Gœd. belg. I. p. 132. t. 53.*

*List. gœd. 304. f. 122.*

*Raj. inf. 271. Musca carnivora, abdomine colore cæruleo nitente.*

*A&T. upf. 1736. p. 33. n. 57. Musca abdomine cæruleo obtuso.*

*Suecis Spy-Fluga.*

*Habitat in cadaveribus & carnibus calori expositis. Ubi cunque carnes recentes in loco calidiori adservantur, semper se fistit, ova deponit, vermiculi sive Larvæ deinceps carnes putridas consumunt.*

*DESCR.* Musca domestica duplo major, *Capite & Thorace nigro*, sole *Abdomine cæruleo nitido.*

**1832. MUSCA carnaria** antennis plumatis, pilosa nigra, thorace lineis pallidioribus, abdomine nitidulo tessellato, major.

*Musca nigra, abdomine nitido tessellato, thorace lineis pallidioribus longitudinalibus, major. Fn. 1105.*

*Aldr. inf. 348. t. 2. f. 16.*

*Jenst. inf. 70. t. 8. t. 2. f. 16. Musca decima sexta.*

*Frisch. germ. 7. p. 21. t. 14.*

*Raj. inf. 270. Musca carnaria vulgaris.*

*Habitat in carnibus recentibus.*

*DESCR.* Eadem cum *M. domestica*, demta magnitudine, qua illa huic cedit; hæc enim duplo major, & alio modo volans.

1833. *Musca domestica* antennis plumatis, pilosa nigra, thorace lineis obsoletis, abdomine nitidulo tessellato: minor.  
*Musca nigra*; abdomine nitido tessellato, thorace lineis pallidioribus longitudinalibus; minor. *Fn.* 1106.  
*Aldr. inf.* 348. *t. 2. f. 23.* *Musca vulgaris domestica.*  
*Fl. lapp.* 359. *n. 517.* *Musca domestica.*  
*Act. upf.* 1736. *p. 33. n. 58.* *Musca domestica.*  
*Raj. inf.* 270. *Musca bipennis major, (minor,) thorace glabro striato, abdomine supino nigro toto: maculis albis punctato.*

*Suecis Fluga. Stugo-Fluga.*

Habitat per totam *Sueciam* vulgatissima in domibus rusticorum, rara avis in *Lapponia*, at in *Finmarchia Norwegiae* integras domos fere replet. Larva nidulatur in fimo Equino. *De Geer.*

DESCR. Nigra est. Oculi rubent, sub his linea alba. *Abdomen* nigro & incano tessellatum. Thorax tribus canis lineis. Differt a praecedente, quod dimidio minor; quod non, uti prior, sub volatu bombos edat; quod non ita putrida querat; quodque aliter generetur. Sola magnitudo in facie externa distinctam reddit, quamvis accuratius intuenti varida signa se sistunt.

1834. *Musca albifrons* antennis plumatis, pilosa nigra, fronte alba. *Fn.* 1107.

*Act. upf.* 1736. *p. 33. n. 60.* *Musca atra obtusa*, fronte alba.

*Reaum. inf. 4. t. 26. f. 5.*

Habitat rarius in pratis.

DESCR. Magnitudo & facies omnino muscae domesticæ, at color magis niger. *Abdominis* latera parum ferruginea. *Frons* alba, pilis quibusdam nigris. Magis etiam glabra est; quamvis *Musca domestica*.

1835. *Musca sepulchralis* antennis plumatis, pilosa nigra, ab domine atro nitidulo supra glaberrimo.

Habitat passim in carnariis & macellis.

DESCR. Magnitudo fere M. domesticæ. *Corpus* nigrum. *Oculi* purpurascentes punctis nigris sparsis. *Antennæ* apice subferruginea. *Abdomen* supra nigredine nitens. *Genua* subferruginea.

1836. *Musca fera* antennis setariis, pilosa nigra, abdominis lateribus testaceis diaphanis.

Habitat passim in Sylvis & pratis.

DESCR. Simillima M. carnariæ, sed latera rufo-testacea diaphana. *Thorax* non lineatus.

1837. MUCA *grossa* antennis setariis, pilosa nigra, alis basi ferrugineis.

Musca nigra: lateribus abdominis testaceis. Fn. 1076.

Reaum. inf. 4. t. 26. f. 10.

Habitat in Fimo Bovino.

DESCR. Corpus maximum omnium Muscarum nostratum, undique hirtum s. pilosum. Caput flaviissimum. Oculi nigri. Antennæ ferrugineæ apicibus nigris. Alæ antice ferrugineæ. Ungulae pedum flavæ.

1838. MUSCA *rotundata* antennis setariis, pilosa, thorace sublineato, abdomine subrotundo flavo: maculis longitudinalibus fuscis confertis.

Habitat passim in angulis sepimentorum.

DESCR. Magnitudo M. domesticæ, Caput ore albo, vertice inter oculos argenteo. Thorax cinereus lineis nigricantibus. Abdomen rotundatum, flavum: punctis dorsalibus quinque rotundatis, longitudinaliter digestis, fuscis, in altero sexu remotis, in altero contiguis. Pedes nigri.

1839. MUSCA *Larvarum* antennis setariis, pilosa nigricans, thorace cinereo, abdomine pallidius tessellato.

De Geer. inf. 1. t. 11. f. 23.

Habitat in Larvis Lepidopterorum.

DESCR. Similis M. domesticæ, sed Thorax vix ac ne vix lineatus,

1840. MUSCA *Radicum* antennis setariis, pilosa, abdomine cinereo: linea dorsali cingulisque quatuor nigris.

Habitat in *Radicibus Raphani*. P. Forskål; Perfecta sequentibus immixta choreas agit; an itaque solo sexu differens?

DESCR. Simillima M. domesticæ, sed quadruplo minor. Abdomen nigrum fasciis quatuor, cinereis, interruptis.

1841. MUSCA *canicularis* antennis setariis, pilosa nigricans, abdominis segmentis flavescētibus: margine nigricante.

Musca lateralis. Syst. nat. 10. p. 597. n. 60. (erronee).

Habitat ubique; mense Caniculari sub arborum coma umbrosa, meridie & vesperi, choreas agit.

1842. MUSCA *cremteriorum* antennis setariis, pilosa nigra, ab domine supra glabro.

Musca nigra, abdomine atro glabro. Fn. 1108.

Habitat cum cadaveribus.

DESCR. Simillima M. rorali, sed tripla major, a qua differt præcipue Tibiis antice subtestaceis & Halteribus albis.

1843. MUSCA *aestivationis* antennis setariis, pilosa nigra, alis punctis albis transversis.

Habi-

## Habitat Upsaliæ.

*DESCR.* Magnitudo pulicis, nigra, at Thorax maculis cinereis & segmenta Abdominis margine canescens. *Alæ* maculis s. potius punctis transversis albis adspersæ.

1844. *MUSCA pluvialis* antennis setariis pilosa cinerea, thorace maculis quinque nigris, abdomine maculis obsoletis tridentatis.

*Musca cinerea*: thorace quinque maculis nigris, abdomine maculis tridentatis. *F. 1112.*

Habitat in viis frequens, & in plantis vulgaris, tædiosissima sub instante pluvia.

*DESCR.* Facies muscae domesticæ omnino, sed dimidio minor. Oculi rufi. Thorax cinereus, maculis duabus parvis ad basin, tribus longioribus majoribus in medio, & supra apicem thoracis macula nigra, bipartita. Abdomen ovatum, canum, 4 segmentis: quorum 1 immaculatum; 2 ad basin fascia retrorsum tridenta; 3 simile secundo; 4 etiam simile secundo ac tertio, sed denticulus maculæ intermedius vix conspicuus.

1845. *MUSCA fenestralis* antennis filatis subulatis glabra atra, abdomine supra rugoso strigis albis, pedibus ferrugineis.

Habitat passim in fenestris.

*DESCR.* Parva atra. Abdomen segmentis dehiscens ostendit strigas niveas, transversas, vix latera attingentes. Pedes testacei. Halteres albi.

1846. *MUSCA roralis* antennis setariis pilosa aterrima.

Habitat inter arbusta.

*DESCR.* Minor. Tota atra, nitida, licet subpilosa. Halteres nigri. Oculi brunnei.

1847. *MUSCA serrata* antennis setariis pilosa fusca, alarum costa pilis brevissimis serrata, abdomine pedibusque ferrugineis.

Habitat frequens Telis Aranearum irretita.

*DESCR.* Minor. Thorax cinereus. Caput, Abdomen & Pedes subtestacea. Alarum margo exterior nigro ciliatus est.

1848. *MUSCA cellaris* antennis setariis, pilosa nigra, alis nervosis, oculis ferrugineis.

*Musca nigra* subpilosa; oculis ferrugineis, alis nervosis.

Habitat in cellulis cerevisia & vino refertis ad potum.

*DESCR.* Musca parva nigra, pilis quibusdam vagis adspersa. Abdominis segmenta sex, nigrante basi, pallidiora. Oculi ferruginei. *Alæ* alba tribus longitudinalibus nervis, margine crassiore solidiore.

1849. *MUSCA meteorica* antennis setariis, pilosa nigra, abdomine subcinereo, alis basi subflavis, oculis brunneis.

*It. W:goth.* 37.

Habitat nebulæ s. examiniis instar obvolitans circum ora E. quorum, ingruente pluvia.

*DESCR.* Magnitudo dupla M. putris. Oculi brunnei. Corpus nigrum. Abdomen subcineratum, Alæ basi subflavæ.

1850. *MUSCA putris* antennis setariis, subpilosa atra, alarum costa nigra, oculis ferrugineis.

α *Musca fimetii* atra glabra, margine alarum crassiore nigro.  
*Fn.* 1110.

Habitat in fimetis copiosissime & instar grandinum.

*DESCR.* Musca parva est magnitudine culicis. Tota glabra nitida. Oculi subferruginei. Alæ albidae margine crassiore nigra linea. Os nigrum. Pedes toti atri. Halteres soli albi.

β *Musca Casei* atra glabra, oculis ferrugineis, femorum basi pallida. *Fn.* 1109.

*Gæd. belg.* I. p. 132. t. 73.

*Lift. goed.* 314. f. 132. *Vermiculus casei*.

*Frisch. germ.* I. p. 30. t. 7. *Vermiculus casei*.

Habitat in Caseo, cujus Larva caseum consumit, eadem omnino cum M. putri fmeti.

*DESCR.* Musca parva est magnitudine culicis. Tota glabra, nitida. Oculi ferruginei; Alæ immaculatae; Os pallidum; Pedes nigri, basi pallidi.

1851. *MUSCA Frit* antennis setariis, pilosa nigra, halteribus plantis posticis abdomineque virescenti-pallidis.

*Act. Stockb.* 1750. p. 128, ubi historiam dedi.

Habitat intra glumas *Hordei*, granum facile decimum quodque destruens, unde Frit s. Graana hordei viliora levioraque prognascuntur, maximo damno agricolarum.

*DESCR.* Magnitudo Pulicis. Corpus figura M. domesticæ, agilissimum, quasi saltatorium, nigrum, Oculi fulvi. Planta postica pallida. Halteres pallidi. Abdomen fuscum, subtus magis pallide virens.

1852. *MUSCA viduata* antennis setariis, glabra nuda æneo-nigra, abdomine æneo; dorso atro squamis halterum ciliatis.

Habitat in umbrosis.

*DESCR.* Magnitudo fere M. domesticæ. Oculi & Antennæ ferrugineæ, Thorax glaber, nigro-æneus. Abdomen glabrum, auratum, supra atrum opacum.

1853. *MUSCA capraria* antennis setariis, glabra ænea, thora-ce viridi, abdomine cupreo oblongo, halteribus nudis.

*Musca oblonga*, capite viridi, thorace aureo, abdomine cupreo, alis macula fusca. *Fn. 1103.*

Habitat in pratis Fahlunæ.

DESCR. *Longitudo muscae domesticæ*, sed angustior. *Corpus totum nitet serici instar glabrum. Caput viridi-nitens. Thorax rubro aureus. Abdomen cupri sive æris colore. Alæ albæ, macula fusca absque ferruginis colore.*

1854. *MUSCA polita* antennis setariis, glabra ænea, capite viridi, thorace abdomineque cœruleis, halteribus nudis.

Habitat passim.

DESCR. *M. Cæsaris* habitu, sed culice non major, tota æneo nitidissima. *Pedum extrema pallida s. albida.*

1855. *MUSCA pubera* antennis setariis, pilosa nigra, abdominis ultimo segmento incurvato: pube utrinque reflexa.

Habitat in umbrosis.

DESCR. *Præcedente minor, angustior, tota atra, nitida; exceptis halteribus eorumque squama. Abdomen fere clavatum; ad Anum utrinque seta subulata reflexa.*

1856. *MUSCA petronella* antennis setariis, pilosa glabra livida, fronte rubra, cauda incurvata, pedibus elongatis testaceis.

*It. W:goth. 55. \**

Habitat passim cursitans supra aquas quietas.

1857. *MUSCA arrogans* antennis setariis nigra, alis fuscis: fasciis tribus albis. *Fn. 1040.*

Habitat passim.

DESCR. *Minuta. Corpus oblongum. Thorax levissimus, globoso-ovatus. Alæ fuscae, fasciæ basi, apiceæ medio albæ. Femora pallida. Pedes albi, Cursitans superba quasi, atrollit caput & fere salit. Or non exæste muscae, sed obtusum, ideoque nec facile Asilus.*

1858. *MUSCA ungulata* antennis setariis, pilosa glabra æneo-viridis, cauda uncinata, pedibus elongatis pallidis.

*Musca alarum punctis duobus nigricantibus. Fn. 1053.*

Habitat Fahlunæ in prædio Sweden, supra aquas fontis cursitans. *J. Moræus.*

DESCR. *Musca domestica paullo minor, magis oblonga, nigricans. Thorax niger, fetis adipersus, latere aureus, basi ad pedes canus. Abdomen oblongum, alis tamen brevius, latere auro nitens. Pedes longi, nigri. Alæ incumbentes, in singulis nervi circiter 4 nigri, & puncta duatra versus marginem tenuiorem, quorum posticum minus est, sed magis atrum; alterum vero cum alterius alæ pari coiens latius. Halteres lividi.*

1859. *MUSCA cibaria* antennis setariis, subpilosa, vertice punctis

*Etis tribus elevatis, abdомine cinereo adunco, pedibus elongatis.*

Habitat in antiquis & relictis cibis.

*DESCR.* Facies omnino M. petronellæ, sed non culice major. *Caput* sincipite flavo, occipite cinereo, vertice purpurascente-fusco, notato punctis tribus elevatis: *Thorax* cinereus, aliquot setis. *Abdomen* supra fuscum: segmento 6 flavescens; 7 f. ultimo longiore adunco cymbiformis; omnia subtus excavata. *Pedes* longi, pallidi. *Halteres* albi. *Alæ* hyalinæ, nervosæ, absque maculis.

1860. *MUSCA scybalaria* antennis setariis pilosa rufo-ferruginea hirta, alis puncto obscuriore.

Habitat in Stercore.

*DESCR.* Simillima M. stercorariae, sed rufo-ferruginea tota. *Oculi* nigri. pili aliquot nigri ad os. *Alæ* pallide ferrugineaæ una anastomosi, corpore longiores.

1861. *MUSCA stercoraria* antennis setariis, pilosa hirta grisea, alis puncto obscuro. *Fn.* 1068.

*Merr.* pin. 200. *Musca stercoraria.*

*Carl.* enom. 42. *Musca merdivora.*

*Reaum.* gall. 4. t. 27. f. 1. 2. 3.

*Act. upf.* 1736. p. 32. n. 28. *Musca stercoraria.*

Habitat ubique in *stercore* humano, equino, bovino.

*DESCR.* Oculi rufi. *Frons* flavescens. *Antennæ* nigrae. *Thorax* cinereus. *Abdomen* hirtum, flavescente-lividum, *Pedes* hirti. *Alæ* basi & margine crassiore flavescentes cum puncto in medio obscuriore. *Mas* magis hirsutus est, magisque luteus. *Fæmina* magis glabra, magisque cinerea.

1862. *MUSCA fimetaria* antennis setariis, pilosa livens glabratæ, alis puncto obscuriore.

Habitat in fimetis.

*DESCR.* Corpus medium, oblongiusculum, ferrugineum, glabritie renitens; pili rariores in Thorace. *Abdomen* vix pubescens adparet. *Oculi* soli fulci. Punctum in ala ex unica anastomosi vix observandum.

1863. *MUSCA parietaria* antennis setariis, alis fuscis albo punctatis maculatisque, fronte testacea.

Habitat ad parietes.

*DESCR.* Statura sequentis. Corpus cinereum. *Frons* testacea. *Alæ* deflexæ more phalænae, fuscæ, punctis numerosis albis confertissime adspersæ. *Pedes* testacei.

1864. *MUSCA umbrarum* antennis setariis, alis fuscis albo maculatis, fronte nivea.

Habitat in umbrosis.

*DESCR.* Parva. Corpus cinereum. *Frons* nivea, *Alæ* fuscæ, punctis numerosissimis, albis confertim adspersæ. *Pedes* cinerei, nigro punctati.

1865. MUSCA *grossificationis* antennis setariis, alis nigris: apice albis. *Fn. 1051.*  
*Act. upf. 1736. p. 33. n. 50.* Musca nigra, alis fuscis: apicibus albis.  
 Habitat in hortis rarioꝝ.  
 DESCR. Rarissima hæc musca parva est, tota nigra, alis nigricantibus summo apice alba macula.
1866. MUSCA *saltuum* antennis setariis, alis albis: costa punctoꝝ terminali fuscis, corpore flavo, occipite nigricante.  
 Habitat in Lucis.  
 DESCR. Parva. *Corpus testaceum totum. Oculi fusi, punctum nigrum in vertice. Alæ hyalinæ, margine crassiore nigro, ad apicem terminato in maculam nigram.*
1867. MUSCA *vibrans* antennis setariis, pilosa, alis hyalinis apice nigro, capite rubro.  
 Musca alis albis: apice nigris. *Fn. 1052.*  
*Act. upf. 1736. p. 33. n. 49.* Musca nigra vibrans, alis albis apicibus nigris.  
 Habitat frequens in arborum plantarumque foliis, inprimis in hortis.  
 DESCR. Tota nigra est, exceptis *Alis* albis, summo apice macula rotunda nigra notatis: *Corpus nigrum est, non admodum longum, sed obtusum. Caput rubrum est. Dum sedet continuo alas elevat, extendit ac vibrat. Magnitudine admodum variat, dantur enim quædam alis triplo aut quadruplo majoribus.*
1868. MUSCA *cynipsea* antennis setariis, alis apice puncto nigro, abdominis primo articulo obovato.  
 Musca alis albis: apice puncto nigro. *Fn. 1754.*  
 Habitat passim.  
 DESCR. Vix pediculi magnitudine. Tota nigra. *Alæ versus apicem ad marginem majorem puncto nigro notatae. Femora antica subtrus denticulata. Abdomen oblongum; articulo primo pyriformi. Pedes longi.*
1869. MUSCA *flava* antennis setariis, flava nuda, oculis viridissimis.  
 Musca flava; oculis nigris. *Fn. 1114.*  
 Habitat in Scania. D. Leche.  
 DESCR. Hæc parva est, magnitudine seminis oryzæ. Tota flava; *Abdomen ovatum. Alæ parum flavescentes. Oculi foli virides.*
1870. MUSCA *aestuans* antennis setariis, alis unguiculatis albis puncto-centrali nigricante. *Fn. 1055.*

Habitat solitaria inter plantas, rarius in horto Academicō.  
 DESCR. Magnitudo fere pulicis. Caput & Thorax cœrulea. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei sive testacei. Alæ albae, puncto obsoleto nigro in singulæ alæ disco, fere in medio, vel paullo proprius ad marginem interiorem; exterior margo denticulo sive ungue instruitur. Halteres albi. Alas non vibrat. Oculi fusco-pallidi. Antennæ testaceaæ, seta nigra.

1871. MUSCA *Serratulae* antennis setariis, alis albis, thorace virescente, abdomine cinereo lineis quatuor punctorum nigrorum.

Habitat in *Cardui* floribus.

DESCR. Culice duplo major. Oculi virides. Thorax viridis, supra colore fusco postice bilobo. Abdomen cinereum lineis quatuor punctorum. Alæ albidae. Fœminæ cauda mucrone conico.

1872. MUSCA *Arnicæ* antennis setariis, alis unguiculatis griseis nigro-maculatis. Fn. 1057.

*Act. upf.* 1736. p. 33. n. 46. Musca alis griseis nigro maculatis. *Aldr. ins.* 346. t. I. f. 5. Musca quinta.

Habitat in floribus *Arnicæ* intra discum, frequens.

DESCR. Musca domestica vulgari minor. Corpus subgriseum s. testaceum. Alæ griseæ, terminatæ macula marginali nigra, & aliquot maculis majoribus nigris sparsis, & plurimis minoribus obsoletis; denticulus in alæ margine crassiore.

1873. MUSCA *Hyoscyami* antennis setariis, cinerea, alis unguiculatis albis fusco-maculatis. Fn. 1058.

*Act. upf.* 1736. p. 33. n. 47. Musca alis albicantibus nigro maculatis.

Habitat in floribus, sœpe *Hyoscyami* & *Cardui crispi*.

DESCR. Alæ albae, non griseæ, tamen inaculis adspersæ nigro-cinereis s. fuscis & quasi erosis majoribus, & aliis minimis vix conspicuis. Thorax & Abdomen cana. Oculi virides. Pedes pallidi. Cauda aculeo rigido, subulato, obtuso, in fœmina. In alarum margine crassiore, inque ejus medio denticulus setæ instar prominens.

1874. MUSCA *germinationis* antennis setariis, alis albis: margine maculisque nigris. Fn. 1059.

*Act. upf.* 1736. p. 33. n. 48. Musca alis albicantibus nigro punctatis.

Habitat in foliis arborum, primo vere.

DESCR. Hæc musca domestica dimidio minor, facie ad M. vibrantem accedit, sed *Alarum* margines extrorsum & apice nigricantes; discus albus, punctis aliquot vagis nigricantibus.

1875. MUSCA *Urticæ* antennis setariis, alis albis: puncto terminali fasciisque tribus fuscis distinctis.

Habi-

Habitat in *Urtica*.

**DESCR.** *Corpus* nigrum, magnitudine vix M. domesticæ. *Caput* ferrugineum. *Alæ* albæ fasciis tribus nigris fere transversis & apicibus fuscis. *Genua* subferruginea.

1876. MUSCA *Cardui* antennis setariis, alis albis: linea geminata fusca S literæ figura, oculis viridibus.

Musca alis albis: linea geminata litera S fusca, oculis viridibus. *Fn.* 1063.

*Blank. belg.* 189. t. 16. f. T.

*Gœd. belg.* I. p. 102. t. 50.

*List. gœd.* 313. p. 102. t. 129.

*Reaum. inf.* 3. t. 45. f. 12., 13., 14.

Habitat in *Cardui Gallis*. Gœdart.

**DESCR.** Magnitudo inuscæ fere domesticæ. Oculi virides. *Corpus* fulvum. *Alæ* linea duplice serpentino-flexuosa, (quarum crassior exterior est,) fusca, in formam litteræ S. ducta, ac si pedes pellucerent. *Tora* subtus obsolete flava; ani apice albo.

1877. MUSCA *Heraclii* antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis repandis, oculis viridibus.

Habitat subcutanea in foliis *Heracli*.

**DESCR.** Affinis præcedenti. *Frons* flava. *Oculi* virides. *Thorax* lividus linea utrinque laterali flava. *Scutellum* flavum. *Abdomen* ovatum, lividum apice fuscum. *Alæ* albæ fasciis duabus fuscis longitudinalibus, flexuoso-repandis. *Pedes* pallidi.

1878. MUSCA *Cerasi* antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis inæqualibus: posticis extus connexis.

Musca alis albis: fasciis quatuor griseis totidemque minoribus obsoletis alternantibus. *Fn.* 1061.

*Rhed.* 1671. p. 262. t. 264.

*Blank. belg.* 185. t. 16. f. L.

*Reaum. gall.* 2. t. 38. f. 22, 23.

Habitat in *nucleis Cerasorum*, præsertim *Bigaraux* dictorum:

**DESCR.** Magnitudo antecedentis. Descriptio Rhedi bona, *Corpus* nigrum. *Alæ* hyalinæ inaculis duabus nigris: anteriore extorsum; inferiore introrsum bifida.

1879. MUSCA *soltitalis* antennis setariis, alis albis unguiculatis: fasciis quatuor fuscis, scutello flavo. *Fn.* 1064.

Habitat in floribus & foliis *Cardui crispi* frequens, rarer in *Cerasi* foliis mense junio.

**DESCR.** Est in uscæ parvis. *Thorax* cinereus, apice a tergo flavus. *Pedes* testacei. *Alæ* albæ, versus basin margine exteriore flavescentes. Alas has transversam pingit fascia quadruplex, quarum prima omnino recta sive transversa, 2. 3. 4. patum atcuata, hatum ultima alas ipsas terminat.

Alas

Alas gerit utri Musca domestica. Oculi virides. Abdomen nigrum, feminæ mucrone subulato, acuto terminatur. Denticulus in margine crassiore alæ.

1880. MUSCA *florescentiae* antennis setariis, alis pallidis: venis nigricantibus; strigis duabus undulatis apice fuscis.

Musca alis pallidis: venis nigricantibus: lineis transversis duabus undatis apiceque fuscis. Fn. 1065.

Act. upf. 1736. p. 34. n. 65. Musca oblonga flavesiens, dorso longitudinaliter punctato, alis nigro-maculatis.

Habitat in Hortis.

DESCR. Musca domestica major est, oblonga, similis rapacibus. Abdomen flavum: ordo duplex punctorum arborum a tergo abdominis: in singulo segmento punctorum atrorium par. Alæ pallidæ, venis nigricantibus, longitudinalibus; apices alarum cinerei; linea duplex, undulato-nigricans in medio alarum, transversa.

1881. MUSCA *frondescientiae* antennis setariis, alis nigris: fasciis duabus punctisque duobus albis, corpore nigro.

Habitat in plantis.

## Tabanus.

1882. TABANUS *Bovinus* oculis virescentibus, abdominis dorso maculis albis trigonis longitudinalibus.

Tabanus griseus; abdominis segmentis singulis triangulo albo. Fn. 1045.

Jonst. inf. t. 8. ord. 2. f. 22-21.

Reaum. gall. 4. t. 17. f. 8.

Fl. lapp. 363. Tabanus vulgaris griseus, incisuris dorsi macula trigona albicante notatis.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 17. Nomen idem.

Suecic Bröms.

Habitat frequens in Suecia australi, Eqñis æstate molestus.

DESCR. In genere suo hic maximus est. Alæ diaphanæ, venis ferrugineis. Corpus griseum. Thorax cinereus. Oculi nigricantes. Dorsum abdominis sub alis magis flavescit, extra eas magis fuscum, In medio dorso, in singulo segmento, macula triangularis albida, acumine thoracem spectante. Femora nigricantia; Tibiae luteæ.

1883. TABANUS *autumnalis* alis hyalinis, abdomine fuscè ordine triplici albido maculosus.

Habitat minus frequens apud nos. De Geer.

DESCR. Paulo minor majore nostrate.

1884. TABANUS *Tarandinus* oculis viridibüs? abdominis segmentis margine luteis, pedibus rufis. Ta-

*Tabanus niger*; abdominis segmentis marginē luteis, pedibus rufis. *Fn.* 1046.

*Fl. lapp.* 363. *Tabanus flavus*,

*Act. upf.* 1736. p. 31. n. 18. *Tabanus flavus*.

Habitat frequens in *Lapponia*, *Norvegiae* contermina, *Tarandis* molestus.

DESCR. Magnitudine ad primum accedit. Oculi, thorax abdomen nigra, sed incitaturum margines pilis seu margine flavo, tam in dorso, quam in ventre, cinguntur. Pedes & Antennæ rufæ sive obscure luteæ sunt. Alæ subgriseæ.

1885. TABANUS *Bromius* oculis fascia purpurascente, corpore cinerascente læviore.

*Tabanus cinereus*; oculis linea transversa. *Fn.* 1048.

Habitat apud nos frequens, equis & bovis molestus.

DESCR. *Alæ albæ*; totum corpus cinereum. *Oculos* linea transversalis, singularis coloris notat, qua manifeste distinguitur a reliquis, & præfertum a pluviali, cui valde affinis. *Tibiae pallidæ*.

1886. TABANUS *tropicus* oculis fasciis ternis fuscis, abdominis lateribus ferrugineis.

*Tabanus fuscus*; lateribus abdominis ferrugineis, oculis lineis tribus fuscis. *Fn.* 1047.

*Act. upf.* 1736. p. 31. n. 19. *Tabanus fuscus*, abdominis lateribus testaceis.

Habitat frequens apud nos æstate, *Equis* molestus, impennis instante pluvia.

DESCR. Magnitudo Bombylii. Totus hic glaber, latera *Abdominis* versus basin ferruginea, margines segmentorum abdominis, præsertim in dorso, albidi. *Femora nigra*. *Tibiae rufæ*. *Alæ albidæ*, incisuræ abdominis tres priores testaceæ, tres posteriores nigricantes. *Oculi* virecentes; lineis tribus transversis fuscis. *Antennæ lunulatae*.

1887. TABANUS *pluvialis* oculis fasciis quaternis undatis, aliis fuscō-punctatis.

*Tabanus fuscus*; aliis cinereis: punctis minutissimis albis, oculis viridibus: lineolis quatuor undulatis fuscis. *Fn.* 1050.

*Act. upf.* 1736. p. 31. n. 20. *Tabanus fuscus*, aliis cinereis punctatis.

Habitat apud nostrates frequens, *Pecoribus* molestus.

DESCR. Magnitudo muscae domesticae; totus cinereo-fuscus: *Alæ* cinereæ, punctis minutissimis albis, cum puncto marginali majori nigricante. *Oculi* virecentes, lineolis transversis undulatis. *Thorax* cinereus, lineis longitudinalibus striatus; duo puncta nigra inter oculos. *Antennæ* nigrae, filiformes. *Tibiae* variegatae,

1888. TABANUS *cætutiens* oculis nigro punctatis, alis maculatis.

Tabanus fuscus; alis maculis fuscis albisque variis, oculis fulvo-viridibus: punctis nigris. Fn. 1049.

*Act. upf.* 1736. p. 31. n. 21. Tabanus fuscus, alis cinereis: maculis albis nigrisque.

n. 22. Tabanus fuscus; alis fuscis: maculis nigris.

*Raj. inf.* p. 272. Musca bipennis pulchra; alis maculis albis amplis pictis.

*Smolandis* Blind-knagg.

Habitat passim, præsertim in *Smolandia*, frequens.

DESCR. Magnitudine vix muscam domesticam superat. *Totus* fuscus, latera abdominis juxta basin sub alis flava. *Alæ* magnis maculis albis & nigricantibus variegatae. *Antennæ* subulatae sive filiformes, versus basin pilosa, nec ullo modo lunulatae. *Oculi* virides fulvescentesque nitidissimi, maculis aliquor distinctis nigris.

1889. TABANUS *lugubris* oculis corporeque nigro, alis fuscis macula alba.

Habitat passim sed infrequens.

DESCR. Similis T. *cætutiensi*, sed paulo minor. *Alæ* fuscæ macula una alterave albida ad marginem tenuiorem, *Abdomen* nigrum, ad latera anteriora, imprimis subtus, luteolum.

## Culex.

1890. CULEX *pipiens* cinereus, ab domine annulis fuscis octo. Fn. 1116.

*Act. upf.* 1736. p. 31. n. 10. Culex vulgaris.

*Flor. lapp.* 363. Culex vulgaris.

*Reaum. gall.* 4. t. 43. f. omnes. & t. 44. f. omnes.

*Swamm. quart.* 95-99. t. 2. 3. Culex.

*Blank. belg.* 171. t. 15. f. A. B. C. D. Culex.

*Flor. Lapp.* 364. Culex alpinus.

*Suecic* Mygg. *Ostrobothniensibus* Kranck.

Habitat Larva in aquis, Culex ipsa in sylvis, præsertim copiosissima Lapponiæ, nec non rarius in alpibus, ubi major est, sed una eademque species. Hominibus & animalibus sono alarum & sanguinis suetu molestissima; præsertim noctu. Dum vulnerat sanguinemque haurit pedes posteriores erigit.

DESCR. Corpus oblongum; cinereum. Abdomen octo zonis fuscis. Rostrum rectum; setaceum. Alæ albicanentes; vasculoſe; ad lumen nitentes. Thorax subtus hirsutus.

MAS Antennis inferno pectinatis. Palpi medio barbati; non pungit aut fugit sanguinem.

1891. CULEX *bifurcatus* fuscus rostro bifurco. Fn. 1115.

Raj. inf. 74. n. 4. *Tipula domesticæ* forte fæmina, prima furcula e fronte.

Reaum. gall. 4. t. 40. f. 1. 2.

Habitat hujus *Larva* in *aqua*; Culex non vulnerat.

DESCR. Culice sequente duplo major; color cinereus. Alæ absque puncto. Antennæ minus plumosæ in mare. Rostrum prominens, ut in re liquis, ubi vagina apice bifurca, dilatata in duo foliola patula, lanceolata, villosa, intermedio rostro setaceo.

1892. CULEX *pulicaris* alis hyalinis: maculis tribus obscuris. Fn. 1117.

Flor. lapp. 365. Culex Lapponicus minimus.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 12. Culex Lapponicus minimus.

Derrham. physico theor. I. 4. c. 11. n. 20 f. 5. 6. 7. Culex minimus nigricans maculatus. an?

Suecis Swidknott.

Habitat in *sylvis*, copiosissime in *Norlandia*, a morsu macula pulicis instar nigricans, diutius hærens, dolens.

DESCR. Corpus magnitudine minoris pulicis, fuscum. Alæ angustæ, albae, incumbentes, margine exteriore tribus punctis obscuris notatae; hinc clausis alis & conniventibus punctis, fasciæ tres transversæ fusæ in alis.

1893. CULEX *reptans* niger, alis hyalinis, pedibus nigris: annulo albo. Fn. 1118.

Lapponibus Mockere.

Suecis Knott.

Habitat in *Laponia*, ante vesperam præsertim copiose infestans; minus in *Suecia* frequens. Legio horum infestat homines occidente sole, tædiosissimo sono, reptatu per cutem, os, oculos, nasum inquirentes; non pelluntur, uti reliqui, oris flatu aut manuum agitationibus.

DESCR. Minimus est, facie inusitatae, magnitudine pulicis, vix lineam longus, satis angustus. Thorax cinereo cærulefcens; Caput nigrum. Antennæ filiformes, pallidæ. Oculi nigri. Abdomen ovattum, fuscum. Halteres albi. Pedes nigri medio geniculo niveo. Pars thoracis postica sape albicans. Alæ hyalinæ, incumbentes, ut unicam modo aliam spectes, sed postice parum dehiscentes.

1894. CULEX *equinus* ater, ab domine fusco, fronte alba. Fn. 1120.

Flor. lapp. 359. Musca minima atra sanguisuga, alis-albis.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 51. nomen idem.

Habitat æstate in *Equis*, præsertim Norlandiæ, currendo inter crines & audacter sanguinem fugendo, mire Equos vexat, non adeo homines; celerrime currit, nil metuens.

**DESCR.** Antennæ filiformes & modus sanguinem hauriendi culicis est, facies licet muscæ. Caput, Pedes, Thorax atra; thoracis latera tamen cinerascent; supra & infra oculos regio alba est. Ovatus & minimus est.

## Empis.

1895. **EMPIS borealis** antennis filatis nigra, alis subrotundis fuscō ferrugineis.

Asilus niger; alis subrotundis ferrugineis. *Fn.* 1038.

*A&t. upf.* 1736. p. 31. n. 15. Culex fuscus; alis subrotundis.

Habitat in *Lapponia Umensi* & *Lulenfi* frequens, ubi circa vesperam choreas in aëre dicit, uti Tipulæ; non vero mordet.

**DESCR.** Ore gaudet culicis longiusculo nigro. Corpus nigrum. Pedes nigri, femoribus ferrugineis. Alæ subrotundæ, fuscæ seu ferrugineæ, valde obtuse. Magnitudine claram muscam domesticam superat, corpus tamen angustius est.

1896. **EMPIS pennipes** antennis filatis nigra, pedibus posticis longis: alteri sexui pinnatis.

Asilus niger glaber, alis cinereis. *Fn.* 1041.

Habitat frequens in floribus Geranii sylvatici & Cardamines pratensis.

**DESCR.** Musca domestica dimidio fere minor; tota atra; *Abdomine* non ovato, sed admodum attenuato; Pedes postici admodum longi respectu animalis. Alæ nec fuscæ, nec cinereæ, sed mediae horum.

β **Tipula atra** thorace gibbo, pedibus posticis magnis. *F.* 1142.

*A&t. upf.* 1736. p. 31. n. 16. Culex niger, pectore gibbo, abdomine cylindraceo, pedibus posticis maximis.

Habitat in sylvis, ubi in aëre gregatim saltat ac volitat.

**DESCR.** Corpus totum nigrum. Thorax valde crassus, gibbus. Abdomen tenui, cylindricum. Alæ albæ, ovatae, Pedes nigri, postici reliquis duplo & crassiores & longiores, tibiis clavatis seu versus inferiora crassioribus.

1897. **EMPIS livida** antennis filatis livida, thorace lineis tribus nigris.

Habitat paup. *D. C. Solander.*

**DESCR.** Corpus musca domestica majus, cinereum. Thorax lineis dorsibus tribus, nigris, parallelis. Abdomen cinereum, angustum. Alæ fuscescentes, basi subtektaceæ. Pedes lutescentes.

1898. **EMPIS forcipata** antennis filatis cinerea, alis oblongis, cauda appendiculata.

Habitat paup. *D. C. Solander.*

**DESCR.**

DESCR. *Corpus Culice paulo majus. Thorax cinereus s. plumbeus pilis sparsis. Abdomen oblongum, magis cinereum; in cauda hæret forceps duplex cartilagineas, quarum prior s. exterior bivalvis apice bidentata, inferiore dente producetior; intra priorem forceps interior triplo longior, lanceolata, gibba, bivalvis. Femora pilosa, tibiæque longiusculæ cinnerea. Antennæ subulatæ. Alæ hyalinæ, longiusculæ.*

1899. *EMPISTERCOREA* antennis filatis testacea, alis reticulatis, linea dorsali abdominalisque nigra.

Habitat paucum.

DESCR. *Color Muscæ stercorariae lividus. Antennæ nigrae, Linea longitudinalis nigra per Thoracem & Abdomen excurrens. Planta fusca. Alæ lividae venis reticulatis obscurioribus.*

## Conops.

1900. *CONOPS CALCITRANS* antennis subplumatis cinerea glabra ovata.

*Asilus cinereus glaber ovatus. Fn. 1042.*

*Suecis Sting Fluga.*

Habitat ubique. Hæc tibias nostras ingruente præsertim pluvia pungit; hæc, ut continuo calcitrent boves, nec pedibus quiescant, facit; ubi pungit, macula sæpe rubra in medio coccinea, diu durans.

DESCR. *Facies magnitudo & Color Muscæ domesticæ vulgarissime adeo similes, ut quis eandem absolute diceret, ni rostrum subulatum, atrum, & cornuum distingueret.*

1901. *CONOPS IRRITANS* antennis setariis cinerea subpilosa ovata.

Habitat cum *Bobus* quorum dorso frequentissime & copiose infidet.

DESCR. Simillima præcedenti, sed triplo minor.

1902. *CONOPS MACROCEPHALA* antennis clavatis mucronatis luteis, abdome subcylindrico glabro: segmentis quatuor margine flavescientibus.

*Asilus antennis capite longioribus clavatis acuminatis, segmentis abdominalibus glabris: margine flavis, fronte glabra. Fn. 1030.*

*Reaum. gall. 4. t. 33. f. 12. 13.*

Habitat in pascuis.

DESCR. *Facies inflata, flava. Antennæ lanceolatae, ferruginea. Alæ fusca, quasi ustulatae. Thorax rufus, dorso medio nigro. Abdomen cylindricum, incurvum, fuscum, segmentis margine flavis, imprimis primoribus. Halteres albidi, Varietas Thorace toto nigro, Antennisque nigris.*

1903. CONOPS *vesicularis* antennis clavatis mucronatis subferrugineis subconnexis, occipite vesiculari, abdomine glauco-flavescente.

Habitat minus frequens apud nos.

DESCR. Similis C. macrocephala. Facies flava; occiput vesica pellucida. Thorax niger, antice verrucis & lateribus ferrugineus. Scutellum ferrugineum. Alæ fusca, dimidiato-albæ. Halteres flavi. Abdominis segmenta flava, sed prima basi fusca. Pedes ferruginoi. Abdomen subcylindricum, obtusum, basi incurvum.

1904. CONOPS *flavipes* antennis clavatis mucronatis nigris, abdomine subcylindrico glabro; segmentis tribus marginé flavis.

Habitat passim.

DESCR. Capit & Antennæ nigra. Thorax ater puncto flavo utrinque ante & pone alas. Scutellum puncto flavo. Halteres ferruginei. Abdomen clavatum, nigrum, postice canelcens: segmento 1 puncto utrinque flavo, 2, 3, 4. marginibus flavis. Pedes lutei. Femora versus apicem nigra.

1905. CONOPS *buccata* antennis setariis, abdomine hamoso griseo, facie vesiculari alba, alis nebulosis.

Habitat passim.

DESCR. Media. Caput pallidum, subtus album, inflatum, pellucidum. Oculi nigri. Antennæ approximatae, flavæ, extimo articulo glabro obtuso cum arista. Alæ pallide fasciis obsoletis fuscis. Abdomen oblongum, cylindricum, lividum, apice admodum incurvatum. Halteres flavi. Pedes lividi.

1906. CONOPS *aculeata* antennis setariis nigricans, abdominis segmentis margine, scutello, thoracisque punctis duobus anticis flavis.

Habitat minus apud nos frequens.

DESCR. Magnitudo Muscae domesticæ. Antennæ clavatae, setariae, nigrae. Facies inflata, flava. Thorax niger, antice utrinque puncto prominulo flavo; Lineola flava transversa ante Alas. Scutellum flavum. Abdomen ovatum, nigrum margine luteo inaequali sinuato colore, subtus flavum linea fusca. Pedes lutei: plantis nigris. Aculeus in foemina niger, incurvus, inflexus.

1907. CONOPS *ferruginea* antennis setariis, corpore ferrugineo, abdomine cylindrico, fronte lutescente.

Habitat rarissime apud nos.

DESCR. Statura C. flavipedis. Corpus totum ferrugineum. Thorax dorso fuscus. Abdomen cylindricum. Frons flava.

## Asilus.

1908. ASILUS *crabroniformis* abdomine tomentoso antice nigro, postice flavo inflexo.

Asilus ferrugineus; abdominalis articulis tribus prioribus atris, posterioribus quatuor flavis. Fn. 1031.

Mouff. lat. p. 46. Vespæ species, figura exterior.

Jenst. ins. t. 10. f. 2. Musca boaria aid. tab. I.

Hoffn. ins. t. 16. f. 10.

Raj. ins. 267. Musca maxima crabroniformis.

Frisch. germ. 3. p. 38. t. 8. Musca rapax magna, abdominali ne luteo maculato.

Ream. gall. 4. t. 8. f. 3.

A&t. upf. 1736. p. 29. n. 8. Ichneumon collari gibbo, abdome ovato acuto.

Habitat in pascuis, volitat *juxta terram*.

DESCR. Facies crabronis: Thorax magnus, gibbus: Rostrum nigrum, subulatum. Alæ, pedes, venter subtus ferruginea: Abdominis tres articuli primores nigri: proxime insequentes flavi; anus seu cauda ipsa rufa. Alæ ad marginem tenuiorem nigro maculatae.

1909. ASILUS *gibbosus hirsutus* niger, abdomine postice albo.

Asilus niger hirsutus, abdominalis articulis tribus postremis albis. Fn. 1034. It. Scan. 414.

Flor. lapp. 360. Oestrum bovinum: cauda alba.

A&t. upf. 1736. p. 31. n. 25. Oestrum bovinum, cauda alba.

Habitat in *Nericia*, & alibi.

DESCR Magnitudo præcedentis: Crabronem ipsum superat. Totus oblongus, niger & hirsutus est. Frons pallescit. Alæ griseæ; segmenta abdominalis tria ultima alba. Anus ipse corneus, niger, unguæ caprinæ instar latus; cauda simplex & abdomen dilutius flavum alteri sexui.

1910. ASILUS *ater hirsutus totus niger*, barba albida.

Habitat rarissime apud nos.

DESCR. Magnitudo fere præcedentium; totus ater, excepta barba alba sub capite.

1911. ASILUS *flavus niger hirsutus*, thorace postice flavo, abdomine supra fulvo, plantis ferrugineis.

Asilus flavus hirsutus, pedibus nigris, alis glaucis. It. gotl. 327. Fn. 1032.

Habitat in *Smolandia*.

DESCR. Magnus est; in cauda quasi unguia caprina, intra quam varii aulei innocui.

1912. *ASILUS gilvus* abdomine pubescente nigro: supra rufo.  
*Asilus niger*; abdominis segmentis tribus a tergo rufis. *Fn.*  
 1035.  
*Habitat cum præcedentibus.*  
*DESCR.* Totus ater, parum hirsutus; area magna a tergo abdominis ru-  
 fa. *Alæ fuscæ.*
1913. *ASILUS marginatus* halteribus abdominalisque incisuris  
 flavis, femoribus nigris.  
*Habitat rarius in hac patria.*
1914. *ASILUS forcipatus* hirsutus subcinereus, halteribus fla-  
 vis.  
*Frisch. inf. 3. t. 7.*  
*Habitat in Terra.*  
*DESCR.* Magnitudo Muscæ domesticæ. *Corpus cinereum, subpilosum.*  
*Abdomen cylindricum. Alæ hyalinæ. Halteres flavi. Pedes nigri. Mas-*  
*ani for ipe quadridentata: dentibus duobus superioribus majoribus. Fe-*  
*mina Ani stylo acuto.*
1915. *ASILUS tipuloides* cinereus nudus, thoracis lineis dor-  
 salibus tribus nigris.  
*Asilus lividus, thoracis lineis dorsalibus tribus nigris. Fn.*  
 1033.  
*Habitat in floribus.*  
*DESCR.* Magnitudo muscæ. *Abdomen & Femora longa, pallida s. livida.*  
*Thorax lividus, a tergo lineis tribus longitudinalibus nigris. Oculi gri-*  
*sei. Rostrum nigrum, sub pectore inflexum, longitudine thoracis. Alæ*  
*hyalinæ. Antennæ nigrae. Pedes flavescentes.*
1916. *ASILUS oelandicus* ater nudus, alis nigris, femoribus  
 halteribusque ferrugineis.  
*Asilus corpore atro glabro; alis nigris, femoribus halteri-*  
*busque ferrugineis. It. ael. 155. Fn. 1037.*  
*Habitat in Oelandia.*  
*DESCR.* Totus glaber. *Abdomen clavatum, atrum, nitidum. Caput &*  
*Thorax atra. Pedes ferruginei, plantis nigris. Halteres ferruginei. Alæ*  
*angustæ, nigrae.*
1917. *ASILUS morio* hirsutus niger, alis albo nigroque variis.  
*Habitat Aboæ.*  
*DESCR.* Thorax niger, lateribus pilis lutescentibus vestitus. *Alæ corpô-*  
*re longiores, atro alboque variegatae, præsertim versus marginem tenacio-*  
*rem. Abdomen ovatum, nigrum, medio fascia fere alba. Pedes nigro-*  
*ferruginei. Antennæ articulis tribus; extimo subulato. Rostrum apice*  
*lanceolatum.*

## Bombylius.

1918. BOMBYLIUS *major* alis dimidiato - nigris.

Culex lanigerus, alis semifuscis. Fn. 1119.

Aldr. inf. p. 350. f. 10. Musca X.

Mouff. lat. 64. f. 5. a sinistris.

Hoffn. inf. t. 8. f. 5.

Pet. gaz. 56. t. 36. n. 5. Musca apiformis, proboscide porrecta, alis maculatis.

Raj. inf. 273. Musca bombyliformis dense pilosa nigra, ab domine obtuso, ad latera rufo.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 14. nomen Petiveri.

Habitat floribus inhians, quorum mel haurit volitando, nec sedendo, animal non mordens.

DESCR. Rostrum longum, semper exsertum. Alae dimidium longitudinaliter fuscum, quod scilicet margini crassiori adjacer; album, quod teneriori proximum. Totum corpus nigrum, sed hirsutie &amp; lana albida undique vestitum Apis Bombylii instar, unde facies exsurgit singularis.

1919. BOMBYLIUS *medius* alis fusco punctatis.

Habitat cum praecedente.

DESCR. Corpus vix praecedente minus, differt vero alis antice f. ad marginem crassiorem fulcis, sed tota pagina adspersis punctis fuscis,

1920. BOMBYLIUS *minor* alis immaculatis. It. Scan. 164.

Reaum. inf. 4. t. 8. f. 11. 13.

Habitat uti praecedentes.

DESCR. Praecedentibus triplo minor. Alae hyalinæ, antice versus basin obsolete fuscocentes.

## Hippobosca.

1921. HIPPOBOSCA *equina* alis obtusis, thorace albo - variegato.

Hippobosca pedibus tetradactylis. Fn. 1043.

Mouff. lat. 59. Hippobosca.

Frisch. germ. 5. p. 43. t. 20. Ricinus volans.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 27. Musca equina tenax.

Reaum. gall. 6. t. 48.

Suctis Haest-Fluga.

Habitat in Equis, Bobus, praesertim ad inguina &amp; perinæum; vulgus itinera instituens maxime metuit, ne aures intret.

*DESCR.* Notissima ubique est, tota glabra, grisea, tenacissima; capite privata vivit adhuc diu; pedes posteriores longiores sunt.

1922. HIPPOBOSCA *avicularia* alis obtusis, thorace unicolor.

Habitat in *Pafferibus*. D. C. Solander.

*DESCR.* Præcedente dimidio minor. Alæ corpore sesquilongiores; vasis lateralibus atris.

1923. HIPPOBOSCA *Hirundinis* alis subulatis.

Hippobosca pedibus hexadactylis. Fn. 1044.

Ream. gall. 4. t. 11. f. 1. 2. 3. 4. 5.

Habitat in pullis Hirundinum.

*DESCR.* Præcedenti minor. Abdomen postice emarginatum; Alæ angustæ, in tergo abdominis spatio remotæ. Pedes singuli test ungibus.

1924. HIPPOBOSCA *Ovina* alis nullis. It. W:gotb. 59.

Frisch. ins. 5. t. 18.

Habitat inter *Ovium* lanam.

*DESCR.* data in It. W:gotb. 59.

## VII. APTERA.

### Lepisma.

1925. LEPISMA *saccharina* squamosa, cauda tripili.

Adam. micogr. t. 28. f. 147.

Habitat inter *Saccharata*, recentiori ævo advena.

*DESCR.* Corpus oblongum, lævigatorissimum, subargenteum, sensim posterius attenuatum, constans decem segmentis, præter caput & caudam. Antennæ longitudine corporis. Cauda fetis tribus, patulis, subitus pilosis, præter aliquot setas sub cauda.

1926. LEPISMA *terrestris* nuda, cauda triplici.

Habitat supra terram, rarissima.

*DESCR.* Corpus cylindricum, album, facie Podura. Antennæ corporis dimidii longitudine, obtusæ. Setæ caudæ tres exsertæ.

### Podura.

1927. PODURA *viridis* viridis subglobosa. Fn. 1172.

Act. upsi. 1736. p. 37. n. 2. Pulex viridis plantarum.

Habi-

Habitat in plantis, rarius Upsaliæ, præsertim in foliis primordialibus *Polygoni Fagopyri*, minus tamen in tatarico.

DESCR. Magnitudo majoris pediculi capitis. *Abdomen* dilutius viride, globosum, parum in ovalem figuram terminatum, versus anum admodum convexum, viride cum cinerascentis mixtura. *Thorax* tenuissimus, vix conspicuus. *Caput* viride, obtusum, Cicadis non adeo dissimile. *Oculi* supra caput nigri, cum linea utrinque nigricante. *Pedes* albo-virides, æquales. *Antennæ* recurvæ.

1928. PODURA atra subgloboſo atra, antennis longitudine corporis: apice albis. Fn. 1173.

Habitat in *Fungis sylvaticis*.

DESCR. Inter majores hujus generis est. *Abdomen* globosum, sed anus quasi capitulo eminet. *Antennæ* nigrae, corporis longitudine, quas di-varicatas antrorsum protendit, apice albæ.

1929. PODURA fusca globosa fusca nitida, antennis longis: articulis plurimis. Fn 1174.

*Act. stockb.* 1743. p. 296. t. 7.

Habitat super lignis putridis.

1930. PODURA plumbea teres fusco-cærulea nitida.

Podura teres plumbea. Fn. 1175.

Habitat in arboribus vel pratis, semper solitaria; & in *Fungis* frequens.

DESCR. Reliquis major & pediculi vulgaris magnitudinem attingens, omnino teres, fusco-cærulea, polita, pilis rarissimis adpersa: *Pedes* albidi: curvata & interdum salit. *Pedes* ani etiam albi.

1931. PODURA nivalis oblonga cinerea signaturis nigris. Fn. 1176.

*De Geer. Act. upf.* 1740. p. 54. t. 2. Podura campestris ci- nerea, signaturis nigris, antennis longis.

*Suecic Snöloppa.*

Habitat hyeme gregatim in ipsa nive, curvantans agilissime, ni liquecat nix, qua perit: æstate frequens in *Ribis baccis ru- bris*, tum solitaria.

DESCR. Corpus oblongum, cinereum, characteribus nigris notatum.

1932. PODURA arborea nigra, pedibus furcaque albis. Fn. 1177.

*De Geer. act. stockb.* 1740. p. 272. t. 4.

*Act. upf.* 1740. p. 49. t. 1. Podura campestris ni- gra splendens, pedibus cœdaque albis.

Habitat in Oelandiæ Aceritus inter ligna putrida, & alibi.

DESCR. Tota parva, nigra: Cauda furca cum pedibus & antennis vera fus basi albæ.

1933. PODURA *cincta cylindrica grisea*; abdominis cingulo a-  
stro: antice albo.

Habitat in Sylvis.

1934. PODURA *aquatica aquatica nigra*. *It. goth.* 181. *Fn.*  
1178.

*De Geer act. holm* 1740. p. 279. t. 3. 4.

*Act. upf.* 1740. p. 57. t. 3. Podura aquatica tota  
nigra.

Habitat in *Aquis quietis & pacatis*. Phalanges juxta littora  
piscinarum format, horis præsertim matutinis, ac si lit-  
tora gelu coivissent, cum intra phalanges quietior aqua sit.

DESCR. Præter duos sexus a D. *De Geer* egregie descriptos, etiam ter-  
tiū, ni fallor, sexum observo, seu animalcula longe adhuc minora,  
rubra, rotundiora seu magis gibba, reliquis mixta.

1935. PODURA *fimetaria terrestris alba*. *Fn.* 1180.

Habitat in terra prægnante, præsertim in hortis, ubi Melo-  
nes & plantæ seruntur in ventre equino, tempore verno;  
hic infinita copia occurrit, & atomorum volitantium in-  
star saltat, præsertim postquam humus humectata fuit.

DESCR. Hæc omnium minima est, totaque alba.

1936. PODURA *ambulans alba, furca extensa*.

Pediculus terrestris niveus. *Fn.* 1170.

Habitat in terra subhumente calida, proin frequens in *terra*  
*prægnante* & ollis in hypocastro per totam hyemem, ad-  
scendens quoties aqua irrigatur, descendens cum terra  
sicca evadit.

DESCR. Facies omnino Poduræ, teres, oblonga, alba, mollis, sed furca  
carens, præter quod cauda sit bifida; non salit.

## Termes.

1937. TERMES *pulsatorium* abdomine oblongo, ore rubro,  
oculis luteis.

Pediculus ligni antiqui. *Fn.* 1168.

*Act. Stockholm.* 1754. p. 152.

*Blanck. belg.* 169. t. 14. f. F. Pediculus ligni.

*Raj. inf.* 8. Pediculo cognatus & similis.

*Bradl. nat.* t. 27. f. 3.

*Derrham. act. angl.* n. 271. p. 231.

291. p. 1586.

*physico-theol.* p. 119. Pediculus pulsatorius,  
fatidicus, mortisaga. *Allin.*

*Allen. act. angl. n. 245 p. 376.*

Habitat in antiquis lignis, Libris diu relictis, muris; currit solitarius, pulsat instar horologii super squamam ligni ari- di ipso abdome. *Roland. act. Holm. I. c.*

*DESCR.* Corpus oblongum, pallidum. Oculi flavi. Antennæ setaceæ, longitudine (in plerisque) ipsius corporis; macula fusca annularis intra abdomen & pone hanc versus anum punctum fuscum: segmenta abdominis ad latera punctis rufis singula notata sunt. Os rufum.

1938. TERMES *faticidum* abdome ovato, ore pallido, oculis fuscis.

*Frisch. germ. II. p. 2. t. 10.*

Habitat in Herbario meo.

*DESCR.* Præcedenti simile, sed duple majus. Oculi fuisci. Os pallidum.

### Pediculus.

1939. PEDICULUS *Humanus humanus*. Fn. 1153.

*Rhed. exper. t. 18.* Pediculus ordinarius.

*Mouff. lat. 259.* Pediculus.

*Swamm. quart. 169. t. 7.* Pediculus.

*Bonan. micogr. f. 55.*

*Anon. angl. p. 203. f. 11.*

*Merr. pin. 202.* Pediculus in capite simpliciter.

*ib.* Pediculus corporeus maculatus.

*Suecis Luus.*

Habitat in homine, præsertim in capite Puerorum, & vestimentis Nautarum, Militum &c. Maximos in Fodinæ Fahlunensis cryptis calidioribus reperi. Qui in vestimentis viicitat ab eo, qui in capite vivit, non differt ut species, sed tantum varietas.

1940. PEDICULUS *Pubis pubis*. Fn. 1154.

*Rhed. exp. t. 19. f. 1.* Pediculus inguinalis.

*Pet. gaz. t. 67. f. 9.* Pediculus inguinalis.

*Mouff. lat. p. 200.* Pediculus ferus.

*Raj. inf. 8.* Pediculus ferus.

*Merr. pin. p. 202.* Pediculus Morpio.

*Suecis Flat-luus.*

Habitat in hominum immundorum pube & ciliis,

1941. PEDICULUS *Vespertilionis thorace angulato-cruciato*, pedibus unguatis corpore longioribus.

*Frisch. germ. 7. t. 7.*

Habitat in Vespertilione murino: in plano incedere nescius.

1942. PEDICULUS *Suis Suis Scrofae*.  
Habitat in *Suibus domesticis*.

1943. PEDICULUS *Porcelli Muris Porcelli*.  
Habitat in *Mure Porcello*.

1944. PEDICULUS *Cervi Cervi*.  
*Frisch. germ. 12. t. 5.*  
Habitat in *Cervis*.

1945. PEDICULUS *Ovis Ovis Arietis*.  
Habitat in *Ovibus*.

1946. PEDICULUS *Tauri Bovis*: abdomine lineis transversis  
octo ferrugineis. Fn. 1155.

*Suecis Roe-luus.*

Habitat in *Vaccis*; haec minor est species, datur & altera  
qua major & insequens.

DESCR. *Totus albus, minimus. Caput testaceum. Pedes testacei, apice  
albidiores. Abdomen album, lineis octo testaceis transversis in dorso;  
quinque fasciis transversis in ventre; qua omnes linea non tangunt  
marginem seu latera; latera ramen obscuriora reliquo corpore sive pun-  
ctis octo ferrugineis notata.*

1947. PEDICULUS *Vituli Bovis*: abdomine plumbeo. Fn. 1156.  
*Suecis Blåluus.*

Habitat in *Bobus*.

DESCR. *Præcedenti major: Abdomine ventricoso, acuminato, cæruleo-  
fusco; Pedibus brevibus, crassis, griseis, ut & capite & thorace griseis.*

1948. PEDICULUS *Equi Equi Caballi*.  
Habitat in *Equis*.

1949. PEDICULUS *Tinnunculi Falconis Tinnunculi*. Fn.  
1157.

*Rhed. inf. t. 13. Pediculus Tinnunculi.*  
Habitat in *Falcone Tinnunculo*.

DESCR. *Inter omnium maximos pediculos, quos unquam vidi, hic erat:  
Corpus depresso, ovali-oblongum. Caput antice obtusum, versus aurium  
regionem utrinque retrorūm obtuse sagittatum. Thorax marginatus fere,  
et in Carabo seu Cantharide. Abdomen in 9 sive 10 segmenta divisum,  
margine omnino intègро, linea notato. Palatum prominet. Ungues soli-  
tarii, in vola manus spongiosum quid; Femora versus apice in introrsum  
qua si inutilata.*

1950. PEDICULUS *Corvi Corvi Coracis*. Fn. 1158.  
*Rhed. exper. t. 16. Pulex Corvi.*

Habi-

Habitat in *Corvo Corace.*

DESCR. *Abdomen* ovali-oblongum, utrinque contractum, depresso, planum, cinereum, lineis ad incisuras duodecim vel decem nigris. *Collum* brevissimum. *Caput* minimum, nigrum. *Pedes* brevissimi. *Antennæ* brevissimæ, retrorsum flexæ. Substantia animalculi tenacissima, licet digitis validissime pressum tamen vivacissimum & curvans.

1951. PEDICULUS *Infausti* Corvi infausti.

*Pediculus Picæ Lapponicæ.* Fn. 1159.

Aet. upf. 1736. p. 37. n. 3. *Pediculus Turdi Merulæ mon-*  
*tanæ diæti.*

Habitat in *Corvo infausto.*

DESCR. *Abdomen* ovatum, gibbum, diaphanum, pallidum, utrinque ad basin squamula veluti ala spuria notatum. *Thorax* angustissimus, brevis. *Caput* minimum, subrotundum, obtusum. *Oculi* nigri. *Antennæ* longitudine corporis, tenuissimæ, albæ. *Pedes* tenuissimi, satis longi; Magnitudo minimi pediculi capitis, valde tener, facile solo tactu conquassandus.

1952. PEDICULUS *Anseris Anatis Anseris.*

Habitat in *Anseribus.*

1953. PEDICULUS *Sternæ Sternæ Hirundinis.* Fn. 1161.

Habitat in *Sterna nigra.*

DESCR. *Caput* trigonum, latum, obtusum, pallidum. *Thorax* brevissimus, angustissimus. *Abdomen* ovatum, longitudine anterioris corporis, in medio longitudinaliter nigricans. *Antennæ* brevissimæ, capillares. *Pedes* brevissimi, crassi: quorum antici brevissimi sub capite. *Abdomen* subtrus concavum.

1954. PEDICULUS *Gruis Ardeæ Gruis.* Fn. 1162.

Rhed. inf. t. 3. *Pulex Gruis.*

Frisch. germ. 5. p. 15. t. 4. *Pediculus Gruis.*

Habitat in *Ardea Grue.*

1955. PEDICULUS *Ciconiæ Ardeæ Ciconiæ.*

Habitat in *Ciconiis.*

1956. PEDICULUS *Recurvirostræ Recurvirostræ Avosettæ.*  
It. xl. 90. Fn. 1163.

Habitat in *Recurvirostra Avosetta.*

DESCR. *Corpus* fuscum, oblongum. *Caput* obsolete triangulum, acuminate, linea transversali excavata in medio. *Abdomen* oblongum, recte lineare, in medio paulo latus, incisuris octo. *Pedes* breves, curvi, *Antennæ* breves, parvæ, capitatae.

1957. PEDICULUS *Hæmatopi Hæmatopi Ostralegi.* It. xl.  
90. Fn. 1164.

Habi-

Habitat in *Hæmatopo Ostralego*.

*DESCR.* Magnitudo pulicis, totus glaucus. Caput subrotundum, glaberrimum, convexo-planum. Abdomen obverse ovatum incisuris deinceps, transversis, pallidis. Pedes breves. Antennæ brevissimæ. Thorax angustissimus; pili ad latera posterioris abdominis.

**1958. PEDICULUS Meleagridis Meleagridis Gallopavonis.**  
*Fn. 1160.*

*Red. expor. t. 1. f. 2.* Pediculus Accipitris.

Habitat in *Meleagridis* s. *Gallo pavone* 164.

*DESCR.* Caput planum, antice rotundatum, postice dentato angulatum in margine retrorsum subulatum. Thorax medio cordatus, utrinque angulatus. Abdomen griseum 8 vel 10 incisuris longitudinaliter in medio album. Antennæ breves: affinis Pediculi caponis.

**1959. PEDICULUS Gallinæ Phasiani: thorace capiteque utrinque mucronato.** *Fn. 1166.*

Habitat in *Gallinæ*. Rustici nostri pediculis laborantes gallinas curant pulvere *Piperis butyro mixto & subacto*, quod gallinis devorandum præbent, experimento raro fallente.

*DESCR.* Pediculo vulgari minor: Corpus pilis griseis adspersum. Abdomen oblongum, ovatum, 8 vel 9 incisuris. Caput lunatum: cruribus posteriora spectantibus. Antennæ brevissimæ. Thorax utrinque angulo acute recto mucronatus.

**1960. PEDICULUS Caponis Gallinæ: abdominis margine nigro.** *Fn. 1165.*

*Rhed. inf. t. 16.* Pulex capi.

*Frisch. germ. II. p. 24. t. 24.* Pediculus galli.

Habitat in *Gallina domestica*.

*DESCR.* Magnitudo ovi pediculi humani (seu Lendis.) Corpus depresso, caudam versus obtusum: Abdominis latera nigra, dorso albo dia-phano; macula nigra versus caput, quæ cor transparens: Caput album: Antennæ motitæ.

**1961. PEDICULUS Tetraonis Tetraonis Tetricis.**

Habitat in *Tetraonibus*.

*DESCR.* Caput semi ovatum, postice truncato-emarginatum, angulis posticis emarginato-truncatis, antice rotundatum, supra planum. Collare lunatum. Abdomen ovatum, obtusum margine ferrato incisuris novem ferrugineis. Antennæ brevissimæ, obtuseæ.

**1962. PEDICULUS Lagopi Tetraonis Lagopi.** *Fn. 1167.*

*Ast. upf. 1736. p. 37 n. 2.* Pediculus Tetraonis Lagopi dicti.

Habitat in *Tetraone Lagopo*.

*DESCR.*

**DESCR.** *Corpus depresso, utrinque obtusum. Abdomen antice angustum, postice dilatum, figura fructus Bursae pastoris aut Veronicae capsulae, cinctum margine nigro intorsum ferrato. Caput absque thorace notabili adfixum, utrinque obtusum, lateribus emarginatum.*

1963. **PEDICULUS Hirundinis** pallescens, abdomine obovato albo nigro contaminato lateribus setoso: setis posticis majoribus.

Habitat in *Hirundine apode*.

1964. **PEDICULUS Farionis.**

Habitat in *Salmone Farione Maris Norvegic.* A. Martin.

**DESCR.** *Corpus album. Caput brevius, latius. Collare brevissimum. Thorax subquadratus. Abdomen ovatum, depresso. Pedes sex, brevissimi. Supra Caudam cylindri duo, corpore longiores, tuberculis obrecti.*

## Pulex.

1965. **PULEX irritans** proboscide corpore breviore.

*Pulex ater.* Fn. 1171.

*Leuwenh. epist. I. p. 357. f. 7.*

*Hook. microgr. f. egregia.*

*Bonan microgr. f. 56.*

*Anon. angl. p. 204. f. 12.*

*Merr. pin 202.*

*Raj. inf. 7. Pulex vulgaris.*

*Frisch. germ. II. p. 8. Pulex.*

*Suecis Loppa.*

Habitat in hominibus, praesertim feminis, autumno vulgaris; in nidis hirundinum ripariarum copiosissima. In Lapponia non vidi.

## Acarus.

1966. **ACARUS Reduvius** obovatus planus: abdominis macula baseos obovata.

*Acarus ovinus.* Fn. 1192.

*Charlet. onom. 49. Reduvius.*

*Raj. inf. 9. Pediculus ovinus, quem Mouffetus Reduvium vocat.*

*It. ael. 62. 126. Festing.*

*Oelandis Festing.*

Habitat in *Ovibus*, quarum lanas vitiat.

**DESCR.** *Corpus depresso, magnitudine cimicis lectularii. Abdomen in dorso*

dorso anterius macula ovata, in medio pallida, cincta fuscedine strias retrosum emitrente..

OBS. Variat colore: semper depresso & planus margine laterali prominente.

1967. ACARUS *Ricinus* globoſo-ovatus, abdominis macula baseos rotunda, antennis clavatis.

Acarus abdomine livido, antice ovato-fusco, antennis clavatis. Fn. 1193.

Raj. inf. 10. *Ricinus caninus*.

Frisch. germ. 5. p. 41. t. 19. *Pediculus caninus*.

Suecis Flott.

Habitat in *Bobus* frequens, ut & *Canibus*.

DESCR. Corpus ovato-globosum, luteo albidum, macula nigra rotunda ad basin abdominis in tergo; Anus infra abdomen. Thorax vix conspicuus. Caput inminimum. Os bifidum. Caput & Pedes nigri. Antennæ clavatae, longitudine rostri.

1968. ACARUS *cancroides* antennis cheliformibus, abdomine ovato depresso.

Acarus pedibus primi paris cheliformibus. Fn. 1187.

Clerck. aran. t. 6. f. 10. 1, 2.

Frisch. germ. 8. p. 2. t. 1. *Scorpio-araneus*.

It. vel. 84. Acarus *Scorpio - araneus* dictus.

Habitat in *domibus* diu clausis, nec aëri expositis, ut & in cistis & cellulis. Capite penetrabat femur rustici tempore nocturno, inde Papula magnitudine nucis *Coryli*, cum dolore horrendo totius feñoris. D. D. Bergius.

DESCR. Chelis cancrinis priorum pedum & ingressu retrogrado facile dignoscitur a reliquis. Vicitat Termite pulsatorio.

1969. ACARUS *crassipes* pedibus secundi paris crassissimis. Fn. 1189.

Habitat in terra, ubique discurrens, sœpe gregarius, ut plures in eodem loco reperias; in hortis frequens.

DESCR. Magnitudo minoris pulicis: Color totius corporis castaneus: Femora secundi paris monstrose crassa cheliformia, desinente tamen chela in tenuem pedem reliquis similem; hinc pes secundi paris juxta basin & femur valde crassus, quatuor denticulis five ramis aut spinis armatus; apex chelæ flexilis est, ut eo melius apprehendat; hoc pede tamen non incedit.

OBS. Huic ad annum adhaerentem reperi alium ACARUM, castanei coloris, minimum, testudinarium sive depresso, margine undique acuto, pedibus brevissimis, æqualibus, adeoque forte diversæ speciei, ni singularem aliquam metamorphosin subeat.

1970. ACARUS *Pafferinus* femoribus tertiiis crassissimis.

Acarus pedibus tertii parisi maximis. Fn. 1190.

*D. Geer. act. holm. 1740. p. 351. t. 1. f. 2.* *Acarus avium*,  
pedibus tertii paris mole monstrosis.

*Rhed. inf. t. 2. f. 4.* *Pulex Sturni.*

Habitat in *Passere Fringilla cælibe*, nobis adhuc dum non  
visus.

DESCR. Est minimus, punctum nigrum in dorso; Pedes tertii paris mag-  
nici; Femora enim hujus ambo simul mole ipsum corpus ferunt adæquant,  
reliquis minimis; his monstrosis pedibus non incedit, sed modo seie ad-  
figit pennis vivacissimæ & agilissimæ avis, ne excutatur, vide plura in  
actis Itzckh. I. c. Hunc male delineavit Rhede, egregie vero. D. De Geer.

1971. ACARUS motatoriis pedibus primis longissimis motatoriis  
*Fn. 1188.*

Habitat in *Fungis*; celestiter currit.

DESCR. Magnitudo tendit: *Color cereus*, exalbidus vel subflavus; *Pedes*  
anteriores longissimi, hos etigit saepe iacet cursitando, & motitatem instar  
antennarum; sumque hi corpore longiores & reliquis pedibus pallidiores.

1972. ACARUS Aphidioïdes ruber; pedibus primoribus longiori-  
bus cursoriis abdomine postice bicorni. *Fn. 1191.*

Habitat in *Pini* truncis.

DESCR. Parvus ruber; *Pedes* primi pati reliquie longiores, quos non  
erigit, sed iis utri reliquie currit. *Abdomen* postice duobus corniculis in-  
structum uti aphidum.

1973. ACARUS coleoptratus ater; lateribus nigro coleoptris.  
*Fn. 1211.*

Habitat sub *lapidibus*. P. Kalm.

DESCR. Minimus est; magnitudine vix seminis Papaveris; octo pedi-  
bus; dorso glabro, nitido, latera versus caput acuta quasi coleoptra bre-  
vi nigra, hinc abdomen caput respiciens, quasi antrosum biforme & ad  
latera auctum membranula nigra, non tamen mobili, ut in *Coleoptratis*.

1974. ACARUS telarius hyalino-fulvus.

*Acarus viridi-albicans foliorum Tiliæ.* *Fn. 1212.*

*Acarus Alceæ.* *Fn. 1196.*

Habitat in Foliis *Tiliæ*, *Alceæ*, aliarumque, at fréquens  
in *Caldariis*, ubi plantis summa calamitas, quas facit pal-  
lescere & ductis filis vix conspicuis suffocat.

DESCR. Nudis oculis vix conspicuus; totus hyalini coloris utroque la-  
tere ferruginea.

1975. ACARUS Siro latetibus sublobatis, pedibus quatuor po-  
sticis longissimis, femoribus capiteque ferrugineis, abdo-  
mine fetoso.

*Acarus farinæ.* *Fn. 1195.*

*Leuw. arcan. t.*

*Blank. belg. p. 158. t. 14. f. A. B.*

*Bonan. N. C. dec. 2. anno 10. app. 34. Acarus ex arido caseo.*

*Riv. prurit. 18. fig. D. E. F. G. I. K. L. N.*

*Suecias Mahl.*

*Habitat in Farina antiqua, antiquoque Caseo.*

$\beta$  *Acarus humanus subcutaneus. Fn. 1194.*

*Ettmüll. act. lips. 1682. p. 319.*

*Rivin. diff. exanth. p. 18. f. A. B.*

*Act. upf. 1736. p. 37. n. 5. Acarus scabiei.*

*Suecias Klämask.*

*Habitat sub cute hominis scabiem caussans, ubi vesiculam excitat, parum recedit, corporis rugas secutus, quiescit interum & titillationem excitat; nudis oculis sub cuticula delitescens observatur ab adsueto, acu facile eximitur, unguis impositus vix moveatur, si vero oris calido balitu afflatur, agilis in ungue cursitat;*

*DESCR. Minimus magnitudine vix lendis, subrotundus, capite vix conspicuo, ore, ut & pedibus ruffis sive testaceis. Abdomen ovatum, hyalinum, in dorso duplice linea lunari seu pari linearum fuscarum recurvarum notatum, & quasi lobo utrinque.*

1976. *ACARUS exulcerans* pedibus longissimis setaceis: anticis duobus brevibus.

*Habitat in Scabie ferina, cuius caussa est.*

1977. *ACARUS geniculatus* niger; femorum geniculis globosis. *Fn. 1210.*

*Habitat in ramis emortuis.*

1978. *ACARUS aquaticus* abdomine depresso tomentoso postice obtuso, aquaticus.

*Acarus aquaticus ruber, abdomine depresso. Fn. 1199.*

*Charlet. onom. 47. Buprestis araneolæ.*

*Frisch. germ. 8. p. 5. t. 3. Araneus aquaticus ruber parvus. Smolandis Qualster.*

*Habitat in Lacubus sub aqua, ubi cito currit, globum saepe trahens post se, velociter natans, ova rubra in Nepis ponens.*

*DESCR. Corpus ovatum, parum in dorso depresso, coccineum.*

1979. *ACARUS holosericeus* abdomine depresso tomentoso postice retuso, terrestris.

*Acarus terrestris ruber; abdomine depresso. Fn. 1200.*

*Blank.*

*Blank. belg. 170. t. 14. f. I.* Araneus terrestris scharlatinus.  
*List. aran. 100. f. 38.* Araneus exiguum coccineus vulgo  
 anglice a Tant dictus.

*Raj. inf. 41. n. 38.* Nomen Listeri.

*Pet. mus. 65. n. 701.* Araneus anglicus coccineus minimus.  
*It. œl. 84.* Acarus coccineus terrestris.

*Ostrogothis Bråfrö.*

Habitat in terra; in aqua non movetur, sed perit.

DESCR. Præcedenti quam ovum ovo similius. *Totus ruber, holosericet & coccineus.* Caput minimum: Oculi duo. Pedes utrinque quatuor multis articulis. Abdomen magnum, depresso, pone & lateribus gibbum, postice sulcatum. Magnitudo antecedentis. Palpi duo apice desinentes in unguem & articulum ovatum.

1980. ACARUS *Baccarum* ab domine distento rubro: lateribus obscurioribus. Fn. 1201.

Habitat ubique in arboribus, præsertim in *Ribe rubro* ejusque baccis, celestime cursitans, vulgarissimus.

DESCR. Præcedentibus multoties minor: minime dorso depresso, nec rugosus, nec sericeus seu villosus, sed glaber & undique tumidus: punctum obscurum utrinque ad thoracem. Pili hinc inde enati.

1981. ACARUS *Muscarum* ab domine rufo, pedibus posticis longissimis filiformibus. Fn. 1209.

Habitat in *Muscis*, omnium minimus.

1982. ACARUS *gymnopterorum* ab domine rubro: lateribus punctis binis coccineis.

Acarus *gymnopterorum* ruber, punctorum coccineorum utrinque pari. Fn. 1208.

Habitat in *Culicibus Apibus* aliisque, uti sequens acarus in Coleoptratis.

DESCR. Ruber, minimus, ut oculi & pedes nudo vculo distinguantur: Abdomen globosum, late rubrum, pilis quibusdam hispidum; in anteriore abdominis parte, ad latera, utrinque par punctorum obscurius rubrorum, quorum punctum alterum anterius, alterum posterius.

1983. ACARUS *Coleoptratorum* rufus: ano albicante. Fn. 1198.

*List. logu. 381.* Pediculus subflavus scarabæis infestus.

*Blank. belg. 168. t. 14. f. H.* Pediculus insectorum volatilium.

*Frisch. germ. 4. p. 17. t. 10.* Pediculus scarabæi currens.

*Act. upf. 1736. p. 37. n. 2.* Acarus insectorum coleoptratorum.

*Reaum. gall. 6. t. 4. f. 14. 13.*

Habitat in *Scarabaeis* Apibus hirsutis similibusque, sub pectore vel intra femora.

DESCR. Corpus subrotundum, rufum, convexum, durum; Capit & collum vix manifeste; versus anum albicans. Pedes veloci, anteriore longiore. Sutura transversalis distinguit corpus supra.

1984. ACARUS *rupestris* fuscus: linea dorsali bicolori. Fn. 1202.

Habitat in lapidibus & campis.

DESCR. Magnitudo & figura Aquatici, sed Cursus obscurum; Abdominis linea dorsal longitudinalis utrinque dilatata, anterior in aliis alba, in aliis rubra; communiter anterior albida, posterior rubra; ceterum abdomen nebuloso-nigrum est, pedes rubri.

1985. ACARUS *rupestris* ruber, antennis rostro longioribus. Fn. 1205.

Habitat in petris; raro in capite humano ubi multum irritat.

DESCR. Facile hic ab omnibus aliis dignoscitur. Antennis rostro longioribus; antennæ enim in reliquis vix manifestæ sunt; has antennæ numero præter ostio ordinarios pedes, adeoque non pedes primores pro antennis habeo. Rostrum, antennæ, pedes, corpore pallidiora sunt.

1986. ACARUS *litoralis* fusco-rufus, pedibus sanguineis.

Fn. 1206.

*It. oel.* 96. Acarus.

Habitat ad littora maris Oelandici in petris.

1987. ACARUS *Fungorum* fusco-rufescens abdomine subgloboso glabro. Fn. 1207.

Habitat ad radices *Fungorum* gregatim, tarde incedens.

DESCR. Magnitudo lendis. Tonus ferrugineus seu triste rufescens, unicolor valde glaber, absque lateralibus maculis.

1988. ACARUS *scaber*, cinereus depresso; lateribus scabris.

Fn. 1197.

Habitat in terra primo vere frequens.

DESCR. Est minimum animalculum; Corpus depresso, obscure cinereum; Abdominis latera a tergo punctis elevatis scabra; anus depresso, bidentatus; tergo impositus pedes undique protendit.

1989. ACARUS *Salicinus* ruber: dorsali linea dupli fusca ante bifurca.

Acarus *salicinus* ruber, dorso fusco. Fn. 1203.

Habitat in *Salice*, ubi currit velocissime.

DESCR. Aquatico simillimus magnitudine. Linea dorsalis duplex parallela longitudinalis fusca, versus thoracem bifurca.

1990. ACARUS *croceus* fulvus, thoracis lateribus puncto rufo.  
*Acarus Salicinæ rosæ.* Fn. 1204.  
*Habitat in Salice minima;* monstrosa in rosæ formam, cum  
 Tenthredine frequens.  
*DESCR.* Corpus vix conspicuum nudis oculis, croceum sive dilute ful-  
 vum; Thorace utrinque puncto rufo saturato.
1991. ACARUS *Tremellæ* subglobosus atro-cærulescens ni-  
 tidus.  
*Habitat in Tremella juniperina.*

### Phalangium.

1992. PHALANGIUM *Opilio* abdomine ovato subtus albo.  
*Acarus pedibus omnibus longissimis.* Fn. 1186.  
*Clerck. aran.* t. 6. f. 10. 3.  
*Aldr. inf.* 607. t. 608. f. 4. Araneus XIV.  
*Mouff. lat.* 234. f. 4. Araneus longipes.  
*Hoffn. inf.* 2. t. 9.  
*Goed. Belg.* 2. p. 197. f. 49.  
*List. goed.* 348. f. 143.  
 angl. 95. t. 1. f. 35. Araneus cinereus cristatus,  
*Raj. inf.* 39. n. 35. Nomen Listeri.  
*Bradl. natur.* t. 24. f. 2.  
*Suecic* Läcke.  
*Habitat in plantis & aliis corporibus non infrequens.*

### Aranea.

1993. ARANEA *diadema* abdomine subgloboso rubro-fusco:  
 cruce albo-punctata. Fn. 1214.  
*Clerck. aran.* t. 1. f. 4. 3.  
*Aldr. inf.* 607. t. 608. f. 9. Araneus IX.  
*Fonst. inf.* t. 18. f. 17. 19. 20.  
*Hoffn. inf.* t. 4. f. 16. & t. 8. f. 16. 17. & edit. alt. 4. t. 3.  
 f. penult.  
*Mouff. lat.* 233. f. 1. Araneus velarius maximus.  
*List. aran.* 28. f. 2. Araneus rufus sive avellaneus cruciger,  
 cui utrinque ad superiorem alvi partem, quasi singula tu-  
 bercula prominent.  
*Raj. inf.* 18. n. 2. Nomen Listeri.  
*Frisch. germ.* 7. p. 7. t. 4. Araneus magnus rubroluteus.  
*Habitat in arboribus, præfertim Betula.*

*DESCR.* Colore rufo & magnitudine & ovato abdome ab omnibus differt, in dorso abdominis crux alba ex articulis tanquam diadema.

1994. ARANEA *reticulata* ex albiā, abdome globoſo reticulato ſupra purpurafcente fuſco nebulofo. *Fn. 1221.*

Habitat in Horus. *O. Celsius. S. S. Th. Doct.*

*DESCR.* Co-pus albicans. Thorax hyalini coloris a tergo macula oblonga nigricans, lateribus puncta nigra. Abdomen tenuiſſime reticulatum album, vasis nigricantibus, in dorſo nebulofum e fuſco & versuſ latera obſcure purpurafcente. Pedes nigris maculis.

1995. ARANEA *cucurbitina* abdome ſubgloboſo flavo: pun-  
etis quibusdam nigris. *Fn. 1224.*

*Clerck. aran. t. 2. f. 4.*

*List. aran. 34. f. 5.* Araneus viridis, cauda nigris punctis utrinque ad marginem ſuperne notata, ipſo anno erocoeo.

*Raj. inf. 20. n. 8.* Listeri nomen.

Habitat in Betulis, Malis, Pyrisque, vesperi frequens. Ma-  
ter adſidet reti laxo ova involventi, nec facile abigitur.

*DESCR.* Thorax & pedes pallidi; linea nigra ad thoracis latera utrinque. Pedum articuli spinosi, ad apices omnes nigricantes. Abdomen o-  
vatum, viride, utrinque versuſ anum punctis quatuor nigris & in disco  
abdominis, versuſ ejus basin, punctorum 3 paria nigricantia excavata.  
*Anus* ſaepè fulvus.

1996. ARANEA *Calycina* abdome globoſo pallido flavescente. *Fn. 1228.*

*Aet. upf. 1736. p. 38. n. 6.* Aranea globosa pallida flores  
inhabitans.

Habitat in Horto Upſaliensi rarius, ubi ſe recondit intra ca-  
lyces plantarum, asperifoliarum præfertim, postquam co-  
rolla decidit; hic ſe occultat, inuicias quærentes cibum  
capit absque rete, dum immittunt proboscidem vel pedem  
ejus calyci.

*DESCR.* Media. Abdomen albidum vix manifeſte flavescentis;  
ſupra punctis excavatis: 1 ad basin; deinceps 2 parva; tum 2 media. Thorax lateri-  
bus linea virescente. Pedes longi, ad latera protensi.

1997. ARANEA *bipunctata* abdome globoſo atro: punctis  
duobus excavatis. *Fn. 1232.*

*Aet. upf. 1736. p. 38.* Aranea atra, abdome ſuperne duo-  
bus punctis excavato.

Habitat interdum in fenestris; tela non geometrica, ſed va-  
riis filiis ſparsis conſtantia.

*DESCR.* Tota atra. Pedes testacei; Abdomen globosum, glabrum, nitidum, punctis duobus non coloratis a tergo in medio impressis notatum  
& ſi probe attendas, aliis adhuc duobus, paulo anterioribus, ſed mino-  
ribus. A capite per thoracem & abdomen dicitur linea inter pupillorum  
et anum usque toride testacea.

1998. ARANEA *arundinacea* abdomine subgloboſo albo: maculis dilute fuscis. Fn. 1243.

Habitat intra paniculam *Arundinum*

DESCR. Est inter minores generis sui. Abdomen albidum maculis fere ut domesticæ, sed dilutioribus & magis distinctis. Thorax lividus sive griseus. Caput supra canuin.

1999. ARANEA *angulata* abdomine ovato antice lateribus angulato-acuto.

Aranea abdomine antice lateribus acuminato. It. gotl. 216.  
Fn. 1213. Clerck. aran. t. 1. f.

Habitat in arboribus, præsertim Gotlandiæ.

DESCR. Maxima, urytote ultimum articulum pollicis sèpe æquans. Differt ab omnibus figura abdominis, quæ antice quasi bicornis, prominentiis valde distantibus, differt etiam colore abdominis maculato ex albo, luteo & atro. Pedes albo & nigro variegati: rubedo in toto corpore nulla.

2000. ARANEA *domestica* abdomine ovato fusco: maculis nigris quinque subcontiguis, anterioribus majoribus.

Aranea fusca; dorso maculis quinque longitudinalibus subcontiguis nigris: anterioribus longioribus. Fn. 1215. Clerck. aran. t. 2. f. 9.

Lift. aran. 59. n. 17. Araneus subflavus hirsutus, prælongis pedibus domesticus.

Raj. inf. 27. n. 17. Listeri nomen.

Act. upf. 1736. p. 38. n. 7. Araæa fusca: maculis quinque nigris dorsalibus longitudinalibus contiguis.

Suecic Foenster-Spindel. Dwaerg. Smolandis Lâche.

Habitat in fenestræ nostris vulgatissima.

DESCR. Caput & Thorax pellucida. Abdomen pallidum maculis oblongis, transversalibus, longitudinaliter digestis, nigris, quinis, fere contiguis, anticis latioribus, versus posteriora sensim angustioribus factis.

2001. ARANEA *lineata* abdomine ovato albido: lineis tribus longitudinalibus punctorum nigricantium. Fn. 1020.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Pedes lividi annulis nigris. Thorax lividus linea longitudinali & lateralibus nigra. Abdominis tres lineaæ longitudinales ex punctis nigricantibus concatenatae.

2002. ARANEA *riparia* abdomine ovato nigro-æneo: ano subluteo bicorni. It. atl. 125 \* Fn. 1222.

Habitat in fabulo riparum & littorum, telas horizontaliter extendens.

2003. ARANEA *labyrinthica* abdomine fusco ovato: linea exalbida pinnata, cauda bifurca. It. gotl. 251. \* Fn. 1223.

Clerck. aran. t. 2. f. 8.

*List. aran. 60. n. 18.* Araneus cinereus maximus, ani appendicibus insigniter prominentibus.

*Raj. inf. 27. n. 18.* Listeri nomen.

Habitat in pratis graminosis Oelandiae & Gotlandiae, ubi rete extendit super grama horizontale, album, latum, margine puto cylindraceo ex crassiore reti contexto, in cuius fundo occultatur aranea ab avibus secura, radiisque solis minus exposita; quam primum quis tangit rete, mox e spelunca exit in spem praedæ.

*DESCR.* Thorax griseus lineis tribus pallidis longitudinalibus. Abdomen fuscum, nitidum, linea dorsali exalbida, longitudinali, minima, striae albas oppositas pinnatum utrinque exserens. Anus sive cauda duplice furca seu inuncronibus, superioribus inferioribus brevioribus; sub abdomine fasciis tribus longitudinalibus, pallidis.

2004. ARANEA redimita ab domine oblongo-ovato flavo: annulo ovali dorsali rubro. *Fn. 1227.*

*Clerck. aran. t. 3. f. 9.*

*List. aran. 51. f. 12.* Araneus albicans, corona coccinea in alvo ovali.

*Raj. inf. 24. n. 12.* Listeri nomen.

*Frisch. germ. 10. p. 6. t. 4.* Araneus hortensis albus serto dorsali ciunabarino rubro.

Habitat in Hortis, telas ducit more domesticæ.

*DESCR.* Magnitudo musæ. Pedes satis longi, albi, diaphani; anterius geniculis nigris instructis. Thorax aqueus. Abdomen sulphureum, a tergo macula annulari ovata sanguinea, intra quam linea oblonga fusca longitudinalis.

2005. ARANEA cerallata ab domine ovato nigro: annulo dorsali ovali albo. *It. oel. 126. Fn. 1229.*

Habitat in Oelandia.

*DESCR.* Tota nigra: Abdomen ovatum, linea alba bifurca includens spatium ovale a tergo abdominalis, margine interiore varijs denticellis pecto.

2006. ARANEA fumigata ab domine ovato fusco: basi punctis duabus albis. *Fn. 1231.*

*Clerk. aran. t. 5. f. 6.*

Habitat

*DESCR.* Aranea media magnitudinis. Pedes longi. Abdomen oblongum, in dorso versus basin abdominalis puncta duo alba ovata apicibus longius a se invicem dehiscentia.

2007. ARANEA montana ab domine ovato albo maculis cinereis.

Aranea ab domine albo-cinereoque variegata. *Fn. 1242.*

Habi-

Habitat in arboribus.

*DESCR.* Abdomen ovatum, lateribus niveis in dorso e cinereo & albo nebuloso; subtus abdomen cinereum est totum. Thorax & pedes pallidi. Pedes anteriores longi, quos, dum tranquille sedet, recta protendit.

2008. ARANEA *notata* abdomine ovato fusco; lineis albis transversis arcuatiss.

Habitat in Plantis.

*DESCR.* Abdomen subglobosum, magnitudine feminis Cracæ; supra fuscum; macula ad basim alba subrotunda; dein ovali; tum linearis; demum linearis; utrinque lineæ quatuor albæ, recurvæ. Corpus & Pedes pallidi.

2009. ARANEA *rufipes* thorace nigro, abdomine fusco, pedibus rufis. Fn. 1230.

Habitat in Urtica.

*DESCR.* Magnitudo media; an major factus colores mutet, me fugit.

2010. ARANEA *nocturna* abdomine nigro punctis duobus albis: basi lunula alba. Fn. 1235.

*Act. upsi.* 1736. p. 38. n. II. Aranea capite nigro, abdomen albo inaculato, cauda prominula nigricante.

Habitat in lucis, noctu agilis, die quieta.

*DESCR.* Magnitudo mediocris. Tota corpore & pedibus nigra; in medio dorso. Abdominis puncta duo alba minima vix conspicua, in singulo latere singula, gibbum anteriorem abdominis lineola alba anterius cingit in modum lunulae. Anus prominens, compressus.

2011. ARANEA *extensa* abdomine longo argenteo virescente, pedibus longitudinaliter extensis. Fn. 1216.

*List. aran.* 30. f. 3. Araneus ex viridi inauratus, alvo longitudinali prætenui.

*Raj. inf.* 19. n. 2. Nomen Listeri.

Habitat in uliginosis lucis; adsidet ramis arcte & longitudinaliter, pedibus quaternis recta protensis, totideinque retrorsum extensis.

*DESCR.* Pedes lividi. Abdomen subtus linea longitudinali atqa, utrinque flava, extus grisea; a tergo vero venis nigris.

2012. ARANEA *fimbriata* abdomine oblongo nigro; linea utrinque laterali longitudinali alba, pedibus fuscis, Fn. 1226.

*Clerck. aran.* t. 5. f. 9.

Habitat in Aquis, currit supra aquam.

*DESCR.* Satis magna est; Pedes subgrisei sive ex pallido fusi. Thorax & Abdomen nigra, utrinque linea lata alba, qua coit ad caudam. Anus bifurcus. Palpi apice globosi & valde magni, hinc Mac procul dubio.

In Abdomine supra lineam lateralem albam utrinque ordo longitudinalis punctorum minutissimorum alborum.

2013. ARANEA *sexpunctata* abdome oblongo; punctorum excavatorum tribus paribus. Fn. 1233.

Habitat in sylvis inter cortices Pinii.

DESCR. Inter majusculas numeranda est. Thorax cinereus. Abdomen ovato oblongum tereri sculum pilis glaucis, aliis rarioribus nigris; in tergo abdominis tria paria punctorum excavatorum conspicuntur.

2014. ARANEA *quadripunctata* abdome oblongo nigro: punctis quatuor excavatis.

Aranea oblonga fusca, abdome nigro apice spinoso, tergo punctis quatuor excavato. Fn. 1234.

It. et. 34. Araneus oblongus fuscus, abdome nigro apice spinoso: tergo punctis quatuor depresso notato.

Habitat in fenestris.

DESCR. Thorax fuscus. Abdomen nigrum pilis cinereis. Pedes ferrugineo-fusci. Anus appendiculis 5 vel 6 subulatis truncatis.

2015. ARANEA *holosericea* abdome ovato oblongo holosericeo: basi subtus punctis duobus flavis.

Aranea livida: abdome atro holosericeo: basi subtus punctis duobus flavis. Fn. 1241.

Lift. aran. 71. t. 23. Araneus plerumque lividus, non raro tamen subflavus sine ulla pictura.

Habitat in ruderibus & plantis ac arboribus ubi folia convolvit, & se occultat & ova ponit.

DESCR. Corpus totum, caput, pedes, thorax fusco-livida, hirsuta; pedes insuper pilis adspersi; forceps oris robusta. Abdomen ovato-oblongum, atrum, holosericeum seu impalpabili hirsutie testum, apice duabus appendiculis truncatis, sub abdome juxta basin duo tubercula flavae. Adeoque A. aquaticæ simillima, sed dimidio minor & terrestris, longeque minori forficula oris.

2016. ARANEA *senoculata* oculis tantum senis.

Lift. aran. 74. f. 24.

Habitat paucim. rarius.

2017. ARANEA *scenica* saliens nigra: lineis albis transversis semicircularibus. Fn. 1237.

Clerck. aran. t. 5. f. 13.

Lift. aran. 87. f. 31. Araneus cinereus, alvo circiter senis fasciis transversis in angulos acutos, in medio erectis argenteis & nigris alternatim dispositis insignibus.

Raj. inf. 37. n. 31. Listeri nomen.

Bradl.

*Bratl. natur. t. 24. f. 5.*

Habitat in parietibus & fenestris, extra domum vulgatissima.

2018. ARANEA *truncorum* saliens nigra: dorso punctis albis.  
*Fn. 1236.*

*Act. upsi. 1736. p. 38. n. 13.* Araneus saliens niger punctis albis notatus.

Habitat in parietibus arborumque truncis, filum post se ubique trahens.

2019. ARANEA *rupestris* saliens: abdominis macula nigra margine rubra: medio alba. *Fn. 1238.*

Habitat in parietibus & lignis.

DESCR. Macula dorsalis ovalis nigra margine rubra, & in centro sive medio alba.

2020. ARANEA *aquatica* livida; abdomine ovato: linea transversa punctisque excavatis duobus. *Fn. 1240.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 8.*

Habitat in Aqua, & quidem non supra aquam, sed in & sub aqua.

DESCR. Est inter maximas generis sui, tota livida sive fusco-pallida. Abdomen ovato-oblongum, cinereum, ano obtuso seu truncato, duobus appendiculis; abdomen a tergo gibbum, versus basin linea excavata transversa notatum, & sub hac duobus punctis excavatum. Pedes longi, tibiae versus basin velut geniculatae. Oris torceps omnium aranearium nostrarum maxima, nigra, dura, hians, sive mordens, at arripiens obiecta, verbo: oris forcipe omnino Tarantulam referens. Hinc si quae alia, haec certe venenata, ex colore, structura, figura oris &c.

2021. ARANEA *saccata* abdomine ovato ferrugineo-fusco.

*List. aran. 82. f. 28.*

*Frisch. ins. 8. t. 2.*

Habitat passim super terram saccum ovorum circumferens.

2022. ARANEA *virescens* abdomine oblongo flavo-viridi: lineis lateralibus albis.

Aranea flavescente - viridis: linea utrinque alba. *Fn. 1225.*

*Zonst. ins. t. 18. f. 42.* Araneus mouff. ultimus.

*Frisch. germ. 12. t. 3. f. 13.*

*Act. upsi. 1736. p. 38. n. 8.* Aranea flavo-viridis, lateribus linea alba cinctis.

Habitat in Hortis.

2023. ARANEA *palustris* abdomine oblongo nebuloso: lineis lateralibus albis.

Aranea

*Aranea nigra*; thorace triplici linea longitudinali alba, abdome nebuloso. *Fn. 1219.*

*Frisch. germ.* 8. p. 3. t. 2. *Araneus terrestris* sacco ovifero.  
*Ast. upf.* 1736. p. 38. n. 9. *Aranea nigra*, pectore abdomine neque linea alba cinctis.

Habitat in *paludibus exsiccatis* frequens apud nos.

OBS. Neque *Frischius* loco citato, neque *Listernus* de araneis Lupis globiferis p. 77. n. 25. 26. 27. 28. in ulla specie meminit thoracem utrinque linea alba longitudinali notari, nec tertiam albam lineam longitudinalem thoracis a medio dorso. Hinc de Synonymis hæreo. *Thorax* aliis niger. *Abdomen* nigrum maculis nigerrimis quasi nebulosum.

2024. ARANEA *viatica* abdomen subrotundo piano obtuso, pedibus quatuor posticis brevissimis. *Fn. 1218.*

*Clerck. aran.* t. 6. f. 5.

*Frisch. germ.* 7. p. 10. t. 5. *Araneus hortensis*, pedibus quatuor longis anticis, abdome piano.

*List. aran.* 83. f. 29. *Araneus subfuscus*, minutissimis oculis e viola purpurascensibus tardipes & gressu & figura cancro marino non adeo dissimilis.

*Raj. ins.* p. 35. n. 29. Nomen Listeri.

Habitat in *arboribus* & *lignis*, ubi propriis ovis incubat.

2025. ARANEA *levipes* abdome rhombeo depresso, pedibus transversaliter extensis variegatis. *Fn. 1217.*

*List. aran.* 85. t. 30. *Araneus parvus subrufus inauratus*, ipsa alvi apice infuscata, levipes.

*Frisch. germ.* 10. p. 16. t. 14. *Araneus truncorum* albo nigroque varius.

Habitat in *parietibus*, *truncis*, *sepibus*.

DESCR. Cinerea, mediæ magnitudinis; *Abdomen* rhomboides seu depresso, pone rotundatum, ano acutiuscula. *Pedes* transversim expanduntur, remotiusculi, fusci annulis albis. *Filum* saepe post se trahit. *Pedes* 2. 1, 3. 4. longitudine se excipiunt.

## Cancer.

2026. CANCER *Mænas* brachiurus, thorace lœvi utrinque quinquedentato, manibus ovatis, carpis dentatis, pedibus posticis subulatis.

*Cancer brachiurus* manibus ventricosis lœvibus unicoloribus. *It. W:goth.* 173.

*Rumpl. mus.* t. 6. f. 0.

*Sneecis Krabba.*

Habitat in *Mari Atlantico*.

2027. CANCER *restratus* brachiurus, thorace spinis duabus erectis, manibus oblongis compressis.

Habitat in Oceano

DESCR. Parvus, sordidus. Thorax obcordatus supra inæqualis, in medio armatus spinis duabus, erectis, validis: quarum altera anterior, altera posterior; antice protensus est thorax in rostrum. Antennæ setis armatae. Manus oblongæ, læves, digitis linearibus, canaliculatis, compressis; basis chelæ quasi spinis duabus obsoletis & obtusis instruēta.

2028. CANCER *Pagurus* brachiurus, thorace utrinquè obtuso novem-plicato, manibus apice atris.

Cancer brachyurus; manuum digitis atris. Fn. 1244. It. W:goth. 173. \*

Bellon. aquat. 368. Pagurus.

Aldrov. exsang. 186. Pagurus.

Zonst. exsang. t. 5. f. 2 Cancer marinus.

Gesn. aquat. 155. Cancer marinus.

Merr. pin. 192. Cancer marinus.

Charl. exerc. 57. Cancer marinus.

Schonef. ichth. 30. Cancer officinarum.

Rond. pise. 560. Cancer Mæas.

Dal. pharm. 400. n. 24. Cancer officinarum

A&T. N. C. 1. p. 315. t. 10. f. 1. Cancer marinus.

Habitat in mari Atlantico circa Gothoburgum.

2029. CANCER *hirtellus* brachiurus, thorace hirto utrinque quinque-dentato, manibus extus muricatis.

Habitat in Oceano septentrionali. A. Martin.

DESCR. Minutus. Thorax rotundatus, lævis, sed utrinque margine spinis quinque-dentatus; antice integer, tenuissime denticulatus. Manus læves, sed extus muricatae & pilosæ. Pedes posteriores acuti & villosi.

2030. CANCER *Araneus* brachiurus, thorace ovato tuberculato hirsuto, rostro bifido, manibus ovatis.

Cancer brachyurus, thorace aculeato, manibus linearibus glabris, rostro bicorni. Fn. 1246. It. Scan. 312.

Zonst. exsang. t. 5. f. 13 Pagurus fæmina.

Habitat in mari Atlantico.

OBS. Manus sive Chelæ antice lineares, minime ventricosæ, digitis æqualis longitudinis; reliqui pedes monodactyli.

2031. CANCER *Maja* brachiurus, thorace aculeato, manibus ventricosis spinosis: digitis pennicillato-hirsutis.

Cancer brachyurus; thorace aculeato, manibus ventricosis lævibus. Fn. 1245. It. Scan. 327.

*Matth. diosc. p. 229.* Maja.

*Fonst. exsang. t. 5. f. 5.* Cancer Maja.

Habitat in mari Atlantico.

DESCR. Thorax cordatus, undique spinis muricatus, margine vero majoribus. Rostrum subulatum, apice bidentatum, dentibus horizontalibus aequalibus. Chela spinis muricatae, sed ipsi digiti laeves praeterquam margine, adspersae fasciculis pilotum.

2032. CANCER *Bernhardus macrourus parasiticus*, chælis cordatis laevibus: sinistra majore.

Cancer macrourus, cauda molli testa cochlear inclusa; chela dextra majore. Fn. 1250.

*Matth. diosc. 230.* Cancellus.

*Rond. pisc. I. p. 553.* Cancellus.

*Bellon. aquat. 361.* Cancellus.

*Gesn. aquat. 161.* Cancellus.

*Aldr. exsang. 218.* Cancellus.

*Fonst. exsang. t. 7. f. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.* Cancellus.

*Charl. exerc. 58.* Cancellus quibusdam Bernhardus Eremita diætus.

*Merr. pin. 192.* Cancer in testis degens.

*Worm. mus. 250.* Cancellus quibusdam Bernhardus Eremita.

*Dal. pharm. 399. n. 22.* Cancellus.

*Swamm. bibl. t. II. f. 1. 2.* Cancellus.

*Suecis Kryp-Kong.*

Habitat in mari Atlantico.

OBS. Varias & diversas desertas Cochlear testas adsumit, scabra crusta obducit, intra has se includit, caudam præcipue ut tegat; licet & totum corpus intra testam retrahat, hinc semper eam secum dicit ut *Diogenes suum Dolium*.

2033. CANCER *Gammarus macrourus thorace laevi, rostro lateribus dentato: basi supra dente duplo.* Fn. 1248. It.

*W:goth. 174.* \*

*Matth. diosc. 227.* Astacus.

*Gesn. aquat. 91.* Astacus.

*Rond. pisc. 538.* Astacus.

*Aldr. exsang. 112.* Astacus verus.

*Fonst. exsang. t. 71.* Astacus marinus communis.

*Merr. pin. 191.* Astacus marinus.

*Schonef. ichth. 23.* Astacus marinus.

*Charl. exerc. 55.* Astacus marinus.

*Worm. mus. 247.* Astacus marinus.

*Dal. pharm. 399. n. 20.* Astacus marinus.

*Suecis Hummer.*

Habi-

Habitat in mari circa *Gothoburgum & Bahusiam*, mutans locum secundum anni tempus.

2034. CANCER *Astacus macrourus*, thorace lævi, rostro lateribus dentato: basi utrinque dente unico.

Cancer *macrourus*, rostro supra ferrato, basi utrinque dente simplici. Fn. 1249.

Rond. pisc. 22. p. 210. *Astacus fluviatilis*.

Gesn. aquat. 104. *Astacus fluviatilis*.

Alar. exsang. 129. *Astacus fluviatilis*.

Zonst. exsang. t. 4. f. 1. *Astacus fluviatilis*.

Matth. diosc. 228. *Gammarus*.

Bellon. pisc. 355. *Gaminarus*.

Worm. mus. 248. *Gammarus s. Astacus fluviatilis*.

Schonef. ichth. 24. *Astacus fluviatilis*.

Charl. exers. 56. *Astacus fluviatilis*.

Merr. pin 192. *Astacus fluviatilis*.

Dal. pharm. 399. n. 21. *Astacus fluviatilis*.

Suecic. Kråfweta.

Habitat in lacubus & flaviis Sueciæ, hodie sat frequens, ante tempora Regis *Johannis III.* vix in Suecia vîsus.

2035. CANCER *Mantis macrourus articularis*, manibus adæctylis compressis falcatis ferrato-dentatis. Mus. Ad. Fr. I. p. 86.

Rumph. mus. t. 3. f. 1.

Habitat in *Oceano Norvegico*. A. Martin.

2036. CANCER *strigosus macrourus*, thorace antrorsum rágoso spinis ciliato, rostro acuto septem dentato.

Habitat in *Mari Norvegico*. A. Martin.

DESCR. *Corpus* longitudine digitii. *Thorax* obovatus, margine utrinque spinis octo acuminatis antrorsum porrectis ciliatus, dorso rugis numerosis antrorsum imbricatis. *Rostrum* porrectum, acutum, spinis utrinque tribus acutis. *Chelæ* oblongæ, depressæ, margine aculeatæ, supra scabré, subtus quasi squamosæ; *Digitæ* introrsum hirsuti, apice rubri. *Præterea*, *Pedes* utrinque tres, unguiculati, hispidi, apice rubri; quatuor par filiforme, apice villosum tinerine. *Cauda* segmentis quinque, apice pentaphylla: foliolo intermedio emarginato.

2037. CANCER *Squilla macrourus* thorace lævi, rostro supra ferrato; subtus tridentato, manuum digitis æqualibus. Fn. 1252.

Matth. diosc. p. 229. *Squilla*.

Worm. mus. p. 248. *Squilla*.

Klein. dub. 35. f. æ. *Squilla fusca*.

*Act. upf. 1736. p. 39. n. 5.* Cancer cauda exserta, rostro superne ferrato.

*Suecic* Råka.

Habitat in mari *Baltico*, inter *Equisetum lacustre*.

*DESCR.* *Rostrum* lanceolatum, perpendicularē, acutum, supra očō crenis, infra tribus ferratum; *Manus*, quæ tertio pedum pari insident, digitis sunt æqualibus.

2038. CANCER *Crangon macrourus*, thorace lœvi, rostro integrissimo, manuum pollice longiore.

*Act. upf. 1736. p. 39. n. 6.* Cancer cauda exserta, rostro integrissimo.

Habitat in mari, capitur sæpius cum sequenti.

*DESCR.* *Rostrum* integrissimum, absque crenis aut spinis, brevissimum. *Pollex* in manibus, qui mobilis, chela longior, & ejus apici quasi infixus, tamen chela terminatur mucrone opposito breviori. Hisce chelis & rostro integrissimo facile distinguitur a sequenti, cum quo mixtus venum exponitur & editur pro una eademque specie, magnitudo dein hujus sequentem parum superat. Olim etiam in Belgio sequenti mixtum sæpe vidi.

2039. CANCER *norvegicus macrourus*, thorace antrosum a-culeato, manibus prismaticis: angulis spinosis. *Fn. 1247.*

*It. scan. 307.*

*Ater. exsang. 113.* *Astacus mediæ magnitudinis prior.*

*Act. upf. 1736. p. 39. n. 9.* Cancer cauda exserta, chelis angulatis.

Habitat in mari *Laponiæ* adjacentibus copiose.

2040. CANCER *Arctus macrourus*, thorace subaculeato hirto, manibus adactylis.

*Rumph. mus. t. 2. f. C. D.*

Habitat in *Oceano septentrionali*.

2041. CANCER *Pulex macrourus articularis*, rostro acuto manibus adactylis, cauda attenuata spinis bifidis.

Cancer macrourus rufescens, thorace articulato. *Fn. 1253.*

*It. oel. 42. 96. It. scan. 125.*

*Raj. inf. 44.* *Pulex fluviatilis.*

*Frisch. germ. 7. p. 26. t. 18.* *Vertnis aquaticus cancri-formis.*

*It. oel. 42. 96.* *Cancer Pulex fluviatilis dictus.*

*Suecic* Mårtä. *Scānis Sandhare.*

Habitat ad littora maris vulgatissimus, frequens, rodens rea-tia, conficiens sceleta pisium; natat in dorso.

*DESCR.* Pedes 7 parium, quorum 4 paria anterius versum; horum paria antica chelifera digito mobili absque pollice. Pedum 3 paria postrema retrorsum versata.

2042. CANCER *Locusta* macrourus articularis, rostro obtuso, manibus adactylis, cauda attenuata spinis bifidis.

Cancer macrourus cæruleus, thorace articulato. *It. gotl.* 260. *Fn.* 1254.

Habitantem vidi ad montem *Thorsberg* in mari juxta Gotlandiam.

*OBS.* Præcedenti major: totus cæruleus. *Rostrum* nullum proeminens, *Corpus* 14 articulatus. *Cauda* trifolia: intermedio subulata.

2043. CANCER *stagnalis* macrourus articularis, manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda cylindrica bifida.

Larva aquatica, globulo coccineo nitente umbilicali, cauda bifida. *Fn.* 1357. t. I.

Habitat in cavitatibus & rimis petrarum & montium; ubi aquæ stagnant, natans resupinatus.

*DESCR.* Facies pisces minimi, longitudine pollicis transversi. Caput depresso. Oculi parvi, fuscii, laterales, distantes. Antennæ capillates. Frons obtusa. Rostrum obtusum, inflexum ut in cicada, angustum, obtusiusculum. Dorsum convexum, subincarinatum. Cauda teretiuscula, articulata, longitudine fere corporis: pinna horizontali bifida acuta. Globulus magnitudine feminis sinapis ad regionem ani, coceineus, auro nitens, splendens ad latera flavus. Pedes multi (12 circiter) ad latera corporis, ab utroque latere imbricatim dispositi. Natat in dorso uti Notonectæ. Fæmitia solo globulo instruitur, quod forte ovarium, ut praæcta metamorphosi præsto sint ova.

## Monoculus.

2044. MONOCULUS *foliaceus* testa foliacea plana.

*Loefl. act. upf.* 1750. p. 42.

*Frisch. germ.* 6. t. 12.

Habitat in Lacubus maritimis, pisces necans.

2045. MONOCULUS *piscinus* planiusculus, clypeo subrotundo, corpore obcordato.

Habitat in Gadis & Salmonibus Farionibus matis Norvegici.

*A. R. Martin.*

*DESCR.* Affinis Monoculo foliaceo: *Clypeus* patens, subrotundus, convexus, subitus concavus. *Corpus* posticum obcordatum, gibbum. *Cauda* cylindrico-subulata, longitudine corporis pollici; apice bifida. *Cylindri* duo ad caudam, subarticulati, obtusi, in quibusdam corpore longiores. *Pedes* sub clypeo sex, at inter clypeum & corpus duo longiores.

2046. MONOCULUS *Apus* testa subcompressa antice retusa postice truncata, cauda bifeta.

Monoculus cauda bifeta. Fn. 1181.

Frisch. germ. 10. p. 1. t. 1. Apus.

Act. angl. 40. p. 150. t. 1. f. 2. Scolopendra aquatica scutata.

Habitat in *Piscinis*, fossis, primo vere, passim.

DESCR. *Corpus* subvirescens, magnitudine glandis. *Oculi* bini, approximati in vertice. *Pedes* multi, ramosi. *Cauda* setis duabus, validis, interjecta Lamella.

2047. MONOCULUS *Pulex* antennis dichotomis, cauda inflexa. Fn. 1182.

Swamm. quart. p. 66. t. 1. *Pulex aquaticus* arborescens.

Merr. pin. 207. Vermes minimi rubri aquam stagnalem colore sanguineo inficientes, unde vulgus dira proteudit.

Hierne Flock. 1. p. 32. 35. Abyssus Satanæ.

Habitat in omnibus aquis stagnantibus.

OBS. Ex hujus gregibus in aqua fiunt quasi sanguinis grumi, unde vulgus credit aquam in sanguinem versari.

2048. MONOCULUS *pediculus* antennis dichotomis, cauda reflexa. Fn. 1183.

Habitat in aquis.

2049. MONOCULUS *quadricornis* antennis quaternis, cauda recta bifida. Fn. 1184.

Blank. belg. p. 149. t. 13. f. B.

Habitat in aquis cum prioribus.

DESCR. *Antennarum* duo paria. *Cauda* tenuis, longiuscula, duplex, setis instructa versus apicem: sub cauda utrinque racemos ovorum; hinc *Cancris* valde adfinis; *Corpus* fuscum est, at ovaria, quæ juxta caudam utrinque extenduntur ovata, sunt lutea, & simul sumta magnitudine ferre totum corpus æquant.

2050. MONOCULUS *conchaceus* antennis capillaceis multiplicibus, testa bivalvi. Fn. 1185.

Habitat in *piscinis* & *paludibus*.

DESCR. *Testa* semine *Brassicae* major, ovata, oblongiuscula, utrinque æqualis, antice gibba & parum retusa, adeoque omnino *Conchæ*; sed in conchis apertura est a latere tenuiore & cardo ubi gibba magis est; contra vero in hac; hæc extracta ex aquis tota clauditur, ut crederes semen cuiusdam plantæ; in aquis dum hiat, jurares concham esse. Celeriter fertur per aquas, ut reliqui monoculi; testa cinerea, impura est. Dum aperit testam, exserit multos capillos æquales, albidos, in altera extremitate aperturæ; hos capillos motitando fertur agilis per aquas, neo quiescit antequam vel cochleam vel aliquod terrestre reperit, hic confedit eum sociis lubenter, & pedibus supra hoc corpus incedit & affigitur. totum corpus intra testam latet, dum quiescit.

2051. MONOCULUS *lenticularis* testa compressa lentiformi.

Habitat in *Finlandia*.

DESCR. *Testa* valde compressa margine acuto; pellucida, magnitudine Fabæ.

### Oniscus.

2052. ONISCUS *Afilus* abdomine foliis duobus obtecto, cauda semiovali. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 88.

*Bellon. aquat.* 443. *Afilus* s. *Oestrum*.

Habitat in *Oceano*.

2053. ONISCUS *Oestrum* abdomine foliis sex obtecto, cauda retusa. *Mus. Ad. Fr.* 89.

Habitat in *Oceano*.

2054. ONISCUS *Pseora* abdomine subtus nudo, cauda semi-ovali acuta.

Habitat in *Oceano norvegico*. D. C. Solander.

DESCR. Magnitudo præcedentium. *Thorax* segmentis 7 æqualibus. *Cauda* segmentis quinque angustioribus, præter ultimum quod semiovale, sed acutum. *Antennæ*  $\frac{1}{4}$  totius longitudinis. *Pedes* XIV, quorum 6 primi antiorum versi digito incurvo & affixi corpori articulo arcuato. *Abdomen* nudum. *Cauda* obtecta foliolis angustis non excentibus. *Ovarium* externe contra scabieum specificum Norvegis. Solander.

2055. ONISCUS *Entomon* abdomine subtus nudo, cauda sus-  
bulata.

Oniscus cauda subulata utrinque appendiculata. *Fn.* 1255.  
*Raj. ins.* 43. *Asellus marinus cornubiensis* alius.

*Act. upf.* 1736. p. 39. n. 1. *Oniscus marinus maximus*.

*Klein. dub.* 38. f. 1. 2. *Entomon pyramidale*.

*Suecic* Syrinx. *Ostrobothniensibus* Grundskorfwa.

Habitat in mari *Baltico* cum *Harengis* fréquens.

DESCR. Magnitudo extimi articuli pollicis, supra convexus; infra planus; marginé undique acuto. *Capitis clypeus* undique incisus est. *Pedes* anteriores utrinque tres, minores, glabri; posteriores utrinque quatuor, majores, ciliati. *Antennarum* in fronte bina patia. *Corpus* septem incisutis, præter caput & caudam. *Cauda* duas tertias partes corporis longitudine æquat, indivisa, teteti-triangularis; subtus veltira radiis duabus convexis, parallelis. Totum animal, exceptis oculis, album.

2056. ONISCUS *Ceti* ovalis segmentis distinctis, pedibus tertii quartique paris linearibus muticis.

*Martens. spitzb.* t. Q. f. D. *Pediculus Ceti*.

Habitat in *Cetis Oceani*.

**DESCR.** *Corpus ovale*, 7 articulis distinctis. *Caput*, quod primus articulus, minimum. *Pedes* 1, 2, 5, 6, 7, *chelis* crassis ungue mobili acent terminati. *Pedes* vero 3, 4 paris filiformes mutici; primum par sub corpore situm est. *Corporis* articuli magis remoti & distincti, quam in reliquis speciebus.

2057. *ONISCUS marinus* semicylindricus, cauda ovato-oblonga integra. *It. W:goth.* 190. \*  
Habitat in Oceano.

2058. *ONISCUS Asellus ovalis*, cauda obtusa bifida.

*Oniscus cauda obtusa bifurca.* *Fn.* 1257.

*Matth. diosc.* 257. *Millepeda.*

*Charl. exerc.* 54. *Millepes.*

*Raj. inf.* 41. n. 1. *Asellus asininus* sive *vulgaris*.

*Suecic* Gräsguggor.

Habitat in domibus, muris antiquis humentibus, & præfer-  
tim in Caldariis hortorum.

2059. *ONISCUS Armadillo ovatus*, cauda obtusa integra.

*Oniscus cauda obtusa integerrima.* *It. gotl.* 298. *Fn.* 1256.

*Raj. inf.* 42. *Asellus lividus major.*

Habitat in pratis Gotlandiæ.

**DESCR.** *Totus niger*, marginibus segmentorum albis; macula alba sub femoribus posterioribus in singula incisura. *Cauda obtusa*, *integra*, nec bifurca. *Tactus* se contrahit uti *Armadillo*, qui erit diu jacet, ut igno-  
to pro pilula vel pupa ichneumonis omnino haberetur.

2060. *ONISCUS scopulorum luteus*: strigis fuscis. *It. W:guth.* 190.\*  
Habitat in Oceano.

2061. *ONISCUS aquaticus* cauda rotundata: stylis bifurcis.

*Oniscus cauda bifida*, stylis bifurcis. *Fn.* 1258.

*Raj. inf.* 43. *Asellus aquaticus gesneri.*

*Frisch. germ.* 10. p. 7. f. 5. *Asellus aquaticus.*

Habitat in fossis & aquis putealibus.

**DESCR.** Constat articulis septem, præter caudam & caput. *Caudæ* ar-  
ticulus reliquis, ut & ipso capite major, planus, subrotundus, e quo pro-  
deunt duo ityli, singuli bifidi. *Pedes* utrinque septem, quorum po-  
tiores semper longiores antecedentibus. *Antennæ* setaceæ articulis tribus.

2062. *ONISCUS bicaudatus* semicylindricus, caudis duabus  
longitudine corporis.

Habitat ad littora maris Norvegici, Martin.

**DESCR.** *Corpus* semicylindricum, fuscum, 12 articulis. *Pedes* utrinque  
7, albi, quorum solitarii postici reflexi. *Caudæ* 2, protenæ, longitu-  
dine corporis, 5 articulis: quorum tertius major, longior & crassior;  
primus

primus & secundus brevis; quartus & quintus angustiores. Inter has caudas, caudæ & aliæ, breves, fubulatæ.

## Scolopendra.

2063. SCOLOPENDRA *lagura* pedibus utrinque duodecim, corpore ovali, cauda penicillo albo. *Fn.* 1264.

*Aet. upf.* 1736. p. 39. n. 3. *Oniscus minimus*, cauda alba. *Habitat Upsaliae* ad radices arborum inter muscos frequens primo vere, præsertim juxta Hortum arcis.

*DESCR.* Magnitudo pediculi; utrinque pedes 12, a tergo penicillus expansus supra singulos pedes, dein in medio dorso transversalis fasciculus. Cauda constat penicillo majori pilorum conniventium majorum.

2064. SCOLOPENDRA *forficata* pedibus utrinque quindecim. *Fn.* 1263.

*Raj. inf.* 45. Ad scolopendram accedens triginta pedibus instructa.

*Suecis Twästiert.*

*Habitat in terra.*

*DESCR.* Rubra est, vix digitum transversum longa. Pedes antici crassi & validi; ultimi longissimi; hinc cauda quasi bifurca. Corporis articuli alterni reliquis dimidio breviores.

2065. SCOLOPENDRA *electrica* pedibus utrinque septuaginta. *Fn.* 1261.

*Aldr. inf.* 637. t. 636. f. 8. *Scolopendra vulgaris ac vera.*

*Raj. inf.* 45. *Scolopendræ valde exiles longæ.*

*Frisch. germ.* II. p. 22. t. 8. f. 1. *Scolopendra plana longa.*

*Habitat in ipsa terra.*

*DESCR.* Rubra est, plana, filiformis, serpentis instar flexuosa. Pedes 54 a singulo latere Frischius numerat, nostra 70 vel 68 obtinet,

## Julus.

2066. JULUS *terrestris* pedibus utrinque centum. *Fn.* 1260.

*Alar. inf.* 637. t. 636. f. 4. *Scolopendra terrestris minor.*

*Mouff. lat.* 30. *Julus quartus glaber.*

*Jonst. inf.* t. 23. *Julus glaber mouff.* I.

*Raj. inf.* 46. *Julus quartus glaber.*

*Habitat in terra.*

*DESCR.* Corpus subcylindricum, fuscum; dorsum linea longitudinali duplice ferruginea notatum. Antennæ 5 articulis, quorum ultimus subglobulus. Datur & niger totus, & minor simul.

2067. JULUS sabulosus pedibus utrinque centum & viginti. *It.*  
*gotl.* 180. *Fn.* 1262.

*Raj. inf.* 47. Julo glabro adfinis, lividis albisque circulis.  
*Habitat* sub *lapidibus* in *insula Carlsoea* majore.

*DESCR.* Longitudo pollicis transversi; crassitie 8 pennæ columbinæ, glaber, cinereus, lineis duabus longitudinalibus dorsalibus, ferrugineis, pallidis; singulo articulo corporis juxta latus longitudinaliter striato, pallidore; corpus circiter ( numero rotundo ) 60 incisuris. *Antennæ* 5 articulis. *Pedes* exalbidi. Tactus in spiram planam, pedibus tamen terram respicientibus, contrahitur.

2068. JULUS complanatus pedibus utrinque XXX, corpore planiusculo, antennis clavatis. *D. C. Solander.*

*Habitat* in *Scania*

*DESCR.* *Corpus* longitudine unguis, planiusculum, lineare, lateribus angulatum, supra pallidum, subtus albescens, segmentis 20; rectum *Clypeolis* supra planiusculis, tuberculatis, marginatis, subquadratis, ad latera serrulatis, angulatis, posticis acutis, extra corporis segmenta parum extantibus. *Primum segmentum* est Caput ovatum depresso; *secundum S.* Collum rectum *Clypeo* antice rotundato, postice truncato s. lunato; *tertium & quartum segmentum* reliquis breviora & fere linearia. *Segmentum 20* s. Cauda triangulare s. acuminatum leve. *Pedes* utrinque 30; scilicet sub singulo segmento duo paria, at sub segmento 3, 4. 18, 19 unicunq; tantum par pedum. *Antennæ* capite triplo longiores, hexarticulatae; 5 articulus subglobosus, obliquior; 6:us minimus est.

## Classis. VI.

## VERMES

## I. INTESTINA.

## Gordius.

2068. GORDIUS *aquaticus* pallidus : extremitatibus nigris.  
Fn. 265.

*It. gotl.* 282. Gordius.

*Gesn. aquat.* 463. Vitulus *aquaticus*.

*Aldr. inspect.* 720. t. 765. Seta f. *Vitulus aquaticus*.

*Fonst. ins. t.* 25. Meerwurm.

*Merr. pin.* 207. Seta *aquatica*.

*Smolandis* Onda-Betet.

Habitat in *Argilla & Aquis*.

DESCR. Figura & magnitudo setæ equinæ, colore pallido, capite & cauda nigris. Credunt rustici Smolandiaæ horum morsus Paronychias caufari, vocant etiam Paronychiaæ morbum Onda beter, uti etiam ipsum verem eodem nomine; quod vero intret corpus, rusticis nostris plane ignotum. Curant Paronychias rusticæ Smoldandi incisione facta culculo, cum quo Gordius prius in minuta segmenta fuerit divisus; dicunt etiam omnia frusta vermis aquis immissa, recrescere in perfectum corpus.

2069. GORDIUS *argillaceus* flavescentes : extremitatibus concoloribus.

Habitat in *Argilla*, quam penetrat uti Piscis aquam; prodit itaque ubique fossæ in terra argillosa excavantur, fontium primarius authorcum priore.

DESCR. Simillimus præcedenti, sed major, neos ita distinctum & cauda acutior.

## Furia.

2070. FURIA *infernalis*. D. S. Solander act. upf. Amoen. acad. 3. p. 322.

Habitat in *W:bottnia & O:bottnia*, imprimis supra Kemi in vastis paludibus cæspitosis, unde nescio quæ ratione ætheria petat & in corpora Animalium, ipsiusque hominis decidat, momento citius atrocissimo dolore jugulans.

## 304 VÈRMES. INTESTINA. ASCARIS. LUMB.

**DESCR.** Vivam non vidi; exsiccatam, instar fibrillæ minutæ, misit olim Ervast, *Præpos. Kemens.*

### Ascaris.

#### 2071. ASCARIS vermicularis pollicaris. *Fn. 1269.*

Habitat in *paludibus*, in *intestino recto* puerorum, sæpe etiam in ipsa vulva chloriticarum; in intestinis *Equorum* vulgarissima; in *radicibus* plantarum corruptis primo vere copiosa; inde pereunt sæpius plantæ in sequente estate.

#### 2072. ASCARIS lumbricoides spithamea.

Habitat in *Intestinis Hominis*, imprimis puerorum frequens; nec extra observavi.

**DESCR.** Simillima magnitudine Lumbrico terrestri, sed absque annulo & utraque extremitate subulata, adeoque figura antecedentis, sed ingens.

### Lumbricus.

#### 2073. LUMBRICUS terrestris trifarium retrorsum aculeatus.

Lumbricus lœvis. *Fn. 1271.*

*Rhed. quart. t. 15. f. 1.*

*Raj. inf. 2. Lumbricus terrestris minor.*

*Suecic Metmatisk.*

*or Raj. inf. 1. Lumbricus major.*

*Suecic Daggmatisk.*

*Q Raj. inf. 2. Lumbricus intestinalis teres.*

*Merr. pin. 206. Vermes in homine s. Lumbricus.*

Habitat in *Humo*. Coëunt hi vermes supra terram nocturnis horis, approximatis collaribus, hinc exeundo e terra ad copulam tumulos effodiunt, hortis & ambulacris molesti. His visitant Talpæ, hinc si quis supra terram leviter subsiliat, sæpe exeant e terra præ metu Talpæ.

#### 2074. LUMBRICUS marinus papillis dorsalibus geminatis setigeris. *It. W:Gotb. 189. t. 3. f. 6. It. Scan. 315.*

Lumbricus punctis prominulis. *Fn. 1270.*

Habitat frequens in *mari Septentrionali*; ubique proditur cuniculus, sub æstu maris conspicuis.

**DESCR.** Corpus spithameum, crassitie pennæ cygneæ, a medio anterius consistat 14 vel 15 segmentis: singulo ex quinque minoribus segmentis, quoquin extiniuntur elati. Singulum ex hisce 14 vel 15 segmentis a tergo pari tuberculorum instruitur & e singulo tuberculo sera erecta; sed quatuor segmenta postica constant: quatuor tantum minoribus segmentis,

mentis, similiter pari setarum instructa. A medio retrorsum corpus leve et cinereum annulis s. rugis inaequalibus, punctis minutissimis adspersis. Subrus e medio corporis viscus propendens rufescens, granulis flavis repletum, hinc forte ovarium.

### Fasciola.

2075. FASCIOLA hepatica ovata. *Amoen. acad. 4. p. 185, 186.*  
Hirudo depressa alba, lateribus acutis. *It. gotl. 182. 250.*

*Fn. 1274.*

Limax ovatus lividus, margine acuto. *Amoen. acad. 2. p. 86.*

*Reaum. act. - - Hirudo-Limax.*

Habitat sub aquis, supra lapides, in rivulis frequens, saepe etiam in piscibus, praesertim Gasterostii, copiosa, nec infrequens in Ovium hepate. *It. gotl. 182.*

DESCR. in *Amoen. acad. 2. p. 86.* videnda.

2076. FASCIOLA intestinalis linearis longa. *Amoen. acad. 2. p. 71.*

Tænia continuata plana sulcis longitudinalibus, longa. *Fn. 1268.*

Habitat in Piscium intestinis.

DESCR. in *Amoen. acad. 1. c.* data est.

2077. FASCIOLA barbata ore papillis fasciculato.

Habitat in intestinis loliginis. Martin.

DESCR. Corpus album, oblongum, magnitudine seminis Cucumeris, depresso, constans saepe 2 partibus: quarum anterior linearis ore papillis copiosis fasciculato; posterior ovalis.

### Hirudo.

2078. HIRUDO sanguisuga depressa fusca: margine lateralí flavo. *Fn. 1272.*

*Bergm. act. Stockb. 1757. n. 4. f. 3, 4.*

*Raj. inf. 3. Hirudo maxime in anglia vulgaris.*

*Suec. Snigel.*

Habitat in aquis paludosis & fossis.

DESCR. Vivipara est, unico gaudet embryone, cui funiculus cauda in fertus est.

2079. HIRUDO medicinalis depressa fusca: lineis flavis dorsaliibus sex: intermediis immaculatis, subtus cinerea nigromaculata.

*Bergm. act. stock. 1757. n. 4. f. 1, 2.*

Habitat in *Aquis dulcibus*.

2080. HIRUDO *oculata* depressa fusca: punctis octo nigris supra os Bergm. Act. Stockb. 1757 n. 4. f. 5-8.

Hirudo depressa nigra, ab domine subcinereo.

Coccus aquaticus. Fn. 725. ovum.

*Sæcis* Blod igel

Habitat in *Aquis* passim.

DESCR. Nigra est supra, sed punctis pallidis, in singulo segmento, in transversam lineam digestis notata.

2081. HIRUDO *f stagnalis* depressa nigra, ab domine subcinereo.

Bergm. Act. Stockb. 1757. n. 4. f. 9-11.

Habitat in *Aquis dulcibus*.

2082. HIRUDO *complanata* depressa ovato-oblonga: interaneis fuscis pinnatim perlucentibus.

Bergm. act. Stockb. 1757. n. 4. f. 12 14. Hirudo sexoculata.

Habitat in *Aquis dulcibus*.

DESCR. Magnitudo pollicaris, ovata, pallida, anterius acuminata striis duabus longitudinalibus, fuscis, approximatis, parallelis, e quibus striae sex utrinque, transverso reflexæ, fusæ, obtusa, latiores. Caput punctis 3 parium.

2083. HIRUDO *geometra* teres: extremitatibus dilatatis. Fn. 1275.

Frisch. germ. 5. p. 25. t. 11. Hirudo ore caudaque ampla.

Habitat in *aquis*; reperitur etiam facile supra *pisces*; ore & cauda æque apprehendit.

DESCR. Filiformis extremitatibus orbiculatis dilatatis.

2084. HIRUDO *muricata* teres, corpore verrucoso.

Hirudo muricata Mus. Ad. Fr. 1. p. 93. t. 8. f. 3.

Rond. aquat. 2. p. 111. Hirudo marina.

Habitat in Oceano septentrionali.

2085. HIRUDO *heteroclitia* hyalina, postice lutea.

Habitat in Lacu Leufstadiensi.

DESCR. Minor, hyalina, posteriore parte dimidia virore pellucente. Caput punctis sex nigris, quorum postica remotiora.

## Myxine.

2086. MYXINÉ *glutinosa*. Mus. Ad. Fr. 1. p. 91. t. 8. f. 4.

*Sæcis* Putähli.

Habi-

Habitat in *Oceano* septentrionali; reperitur saepe in piscibus  
rebus adhærentibus, quos intus consumit.

### Teredo.

2087. TEREDO *navalis* intra lignum testa flexuosa.

Dentalium testa membranacea cylindracea ligno inserta.

*Fn.* 1329.

*Sellii* Teredo *navalis*.

Habitat in *navibus palisque* marinis, ligna destruens, ab ex-  
teris oris advecta, ante aliquot annos apud nos copiose  
observata.

## II. MOLLUSA.

### Limax.

2088. LIMAX *ater* *ater*. *Fn.* 1276.

*Aldr.* *inf.* Limax tertia tota nigra.

*Jonst.* *inf.* 138. Limax.

*Merr.* *pin.* 207. Limax.

*List.* *angl.* 131. Limax *ater*.

*bist.* 1. *p.* 102. Limax *ater*.

*Dal.* *pharm.* 383. Limax *ater*,

*Smolandis* Skog-snigel.

Habitat in *lucis* & nemoribus umbrosis frequens post pluvias  
& in rore frequens; Androgynus est uti congeneres, agit  
enim & patitur.

2089 LIMAX *rufus* *subrufus*. *Fn.* 1277.

*Aldr.* *inf.* 702. Limax magna colore rufo.

*List.* *bist.* 1. *n.* 103. Limax *subrufus*.

*angl.* *app.* 6. *t.* 2. *f.* 1. Limax quartus *subrufus montanus*.

*Dal.* *pharm.* 383. Limax ruber.

Habitat in *umbrosis* & ubi ros non facile exsiccatur, minus  
tamen frequens.

2090. LIMAX *maximus* *cinereus* *maculatus*. *It.* *act.* 61, *Fn.*  
1278.

*List.*

*Lift. angl. 130. app. t. 2. f. 2.* *Limax cinereus maximus striatus & maculatus.*

*Anom. hist. nat. 386. t. 32. f. 26.*

*Habitat in sylvis densissimis Oelandiæ locis subhumidis.*

*DESCR.* Maximus est inter congeneres, profunde striatus & rugosus, maculis obscurioribus.

2091. LIMAX agrestis cinereus immaculatus. *Fn. 1279.*

*Lift. angl. 130. Limax cinereus parvus immaculatus praetensis.*

*Blank belg. 151. t. 13. f. X.*

*Suecis Mask på Såden.*

*Habitat in hortis, saepe inter olera, saepeque inter folia Brassicæ obvius. Frequens vitium in Agris Secalinis, noctu consumens tenella folia, dum secale adhuc in herba est.*

*DESCR.* Magnitudo feminis Phaseoli. Corpus rugosum, cinereum, vix maculatum.

2092. LIMAX flavus flavus maculatus. *Fn. 1280.*

*Lift. exercit. anat. p. I. t. I. Limax succini colore, albidis maculis insignitus.*

*Habitat in umbrofis inter plantas.*

2093. LIMAX papillosus ovatus tectus tuberculis.

*Habitat in Mari Norvegico. Martin.*

*DESCR.* Corpus album, magnitudine feminis oryzae, totum supra tectum papillis acuminatis mollibus; Subtus planum. Antice Tentacula quatuor majora.

2094. LIMAX bilamellatus ovatus tectus lamella parallela.

*Habitat in Hepate Pleuronectes Maris Norvegici. Martin.*

*DESCR.* Corpus album, magnitudine Seminis Oryzae, ovale, constans Lamellis, duabus, horizontalibus, sibi incumbentibus, aequalibus, ovalibus, mollibus, albis, quarum inferior Pes, superior dorsum sit, quas Corpus occultatum inter eas connectit, exferens Tentacula quatuor ante, ut in Limacibus,

## Nereis.

2095. NEREIS cærulea glabra cærulescens. *Amoen. acad. 4. p. 254. n. 38.*

*Nereis tentaculorum 184. paribus. Mus. Ad. Fr. I. p. 93.*  
*Habitat in Oceano.*

2096. NEREIS pelagica segmentis annularibus XL, subtus fulcata. *Habi-*

Habitat in Mari Hallandiam alluente.

*DESCR.* *Corpus* filiforme, sulco longitudinali, constans segmentis circiter 44 cum totidem paribus pediformibus e tentaculis & seris factis. *Os* ad apicem duabus maxillis unguiformibus. *Supra* caput *Tubercula* duo prominula; inter hæc tubercula *Cirri* duo & ab utroque latere *cirri* quatuor.

2097. NEREIS *mollis* papillis articulorum corporis solitariis supra tentacula pediformia.

Habitat in Mari Norvegico. Martin.

*DESCR.* Facies Scolopendræ, mollis, pollicars, depressa, articulata. Tentacula lateralia uti pedes in Scolopendra. Papilla obtusa perforata, in singulo segmento corporis, ad latera, supra tentacula. *Os* inerme, cum Tentaculis aliquot antenniformibus supra proboscideum.

2098. NEREIS *Noctiluca* segmentis XXIII annularibus.

*Noctiluca marina* *Amoen.* *acad.* 3. *p.* 203. *t.* 3.

*Grisi monogr.* *b.* *Scolopendra marina lucens.*

*Vianelli monogr.* *Lucioletta aquæ marinæ*

Habitat in Oceano ubique, cum aqua etiam heic quasi ignita, sæpissime noctu ad naves luceat, ex observatis italorum.

## Aphrodita.

2099. APHRODITA *aculeata* ovalis hirsuta aculeata.

*Aphrodita nitens.* *Fn.* 1284. *Mus. Ad. Fr.* 1. *p.* 93. *Amoen.* *acad.* 1. *p.* 326.

*Barth.* *act.* 3. *p.* 88. *t.* 88. *Vermis aureus.*

*Barr. rar.* 131. *t.* 1284. *Eruca marina griseo fusca.*

*Dal. barv.* 394. *Mus marinus.*

*Ruyssch.* *ovat.* 1. *p.* 23. *n.* 49. *Eruca marina, pilis lateralibus aureis cæruleis viridibus, iridis instar fulgentibus prædictis,* *Hystrix marina dicta.*

Habitat in Mari occidentali rarius.

## Lernæa.

2100. LERNÆA *Cyprinacea* corpore obclavato, thorace eylindrico bifurco: brachiis apice lunatis.

*Lerneæa tentaculis quatuor: duobus apice lunulatis.* *Fn.* 1282.

Habitat supra Cyprinum Carassium, cuius sanguinem haurit.

*DESCR.* Longitudo transversi digiti; *Corpus* teres, subpellucidum, versus basin egressum e tunica alba tanquam e praeputto; est hoc corpus *abdomen*, quod versus apicem tribus obtusis gaudet tuberculis, quoutum

utrumq.

510 VERMES MOLLUSCA. LERNÆA.

unum május est; antice est apertura oris, juxta hanc duo processus molles; & juxta hos utrinque anus; processus mollis apice extrorsum lunatus: hæc antica pars tegitur tunica alba.

2101. LERNÆA *Astellina* corpore lunato, thorace cordato.

Lerneæ cauda dupli tereti. *It. W:goth.* 171. t. 3. f. 4.

Habitat in Oceano, in Branchiis *Gadi*.

2102. LERNÆA *Salmonea* corpore obovato, thorace obcordato, brachiis duobus linearibus confertis.

*A&E. Holmens.* 1751. p. 181. t. 6. f. 1-5. Pediculus Salmonis.

Habitat in branchiis *Salmonum*.

DESCR. Thorax obcordatus, apice definens in os bilabiatum acutiusculum: Labio superiore emarginato, inferiore bifido. Brachia ad basin thoracis, duo, filiformia, longitudine corporis, apice coœuntia & affixa prædæ. Ovaria duo, apici abdominis adhærentia, cylindrica, granulata, longitudine totius animalis.

## Priapus.

2103. PRIAPUS *senilis* subcylindricus rugosus.

Habitat in *Ostreis* Oceani.

DESCR. Corpus magnitudine extimi articuli digiti; sordidum; extremitate fuscum, rugosum, apice perforatum, constans tunica subcoriacea, intra quam tunica tenera, mollis, sanguinea, intus refæcta feminibus flagris spatis.

2104. PRIAPUS *judaicus* cylindricus lævis truncatus, præputio interiore undulato lævi.

*Planc. couch.* 43. t. 6. Culum marinum.

Habitat in Oceano. D.D. Bierchén, Martin.

2105. PRIAPUS *felinus* cylindricus lævis glande muricata.

Habitat cum præcedenti.

DESCR. Simillimus priori, sed glande muricata.

## Sepia.

2106. SEPIA *officinalis* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 93.

Sepia. *Fn.* 1281. *Antoen. Acad.* I. p. 325.

*Matth. aiosc.* 244. Sepia.

*Salv. aquat.* 165. Sepia.

*Ald. exsang.* 44. Sepia.

*Jonst. exsang.* 7. Sepia.

*Bellon.* aquat. 336. - *Sepia.*

*Rond.* aquat. 1. p. 498. *Sepia.*

*Gesn.* aquat. 850. *Sepia.*

*Charl.* exerc. 51. . *Sepia.*

*Merr.* pin. 191. *Loligo - Sepia.*

*Dal.* pharm. 392. *Sepia.*

Habitat in mari Scaniam alluente, ad cujus littora cum fulbo maris ossa sepiæ quotannis ejiciuntur.

DESCR. In Amoen, acad. 1. c.

2107. SEPIA *Loligo* corpore subcylindrico-subulato, cauda angcipiti rhombea.

*Bellon.* aquat. 339. *Loligo.*

*Rond.* pise. 506 *Loligo.*

*Suecic* Bläckfisk.

Habitat in Oceano.

## Medusa.

2108. MEDUSA *capillata* orbiculi margine sedecies emarginato. Fn. 1286. it. West:goth. 172. t. 3. f. 3.

*Gesn.* aquat. 760. *Pulmo marinus?*

*Aldr.* exsang. 577. *Pulmo marinus?*

*Jonst.* exsang. 56. *Pulmo marinus?*

*Bell.* aquat. 438. *Pulmo marinus?*

*Rond.* aquat. 2 p. 121. *Pulmo marinus?*

*Baub.* pin. 369 *Pulmo marinus?*

*Charl.* exerc. 68 *Pulmo marinus?*

*Dal.* pharm. 393. *Pulmo marinus?*

*Tabern.* hist. 1524. f. 1. *Pulmo marinus?*

Habitat in mari atlantico, copiose ad littora *Lapponia* & *Finmarkiae*, Esca Balænæ Mysticeti.

DESCR. Figuræ omnes malæ sunt, hinc dubia synonyma moneo. *Corpus* orbiculatum, supra convexum, totum gelatinæ instar friabile & pellucidum; a parte inferiore s. plana circulus depingitur scaber s. echinatus squamosusve, intra quem *Radiorum* octo paria a centro versus peripheriam extensa adnata. *Stamina* s. Branchie niveæ, in aliis incarnatae, semper crispæ. *Pistilla* s. Filamentorum congeries multipl. x, longissima; omnia hæc e centro lateris inferioris enata. *Margo corporis* octifidus, obtusus, singulis lobis emarginatis, hinc 16 sinubus. *Pistilla* in aliis copiosa & longissima, in aliis omnino nulla.

2109. MEDUSA *aurita* orbiculo subtus quatuor cavitatibus notata. Fn. 1287. It. West:goth. 172. t. 3. f. 1.

It. ocl. 160. Medusa.

ouig

*Vulgo Urtica marina.*

*Suecis Manet. Scanis Brennwabel.*

Habitat ubique in mari: ad Solem lucentes tanquam Stellæ in mari; tætu urentes.

DESCR. *Corpus pellucidum gelatinæ instar; extus convexum, subtus concavum, margine subciliato; subtus in centro quadruplex cavitas, singula arcuata & cincta opaca linea, constante punctis plus quam viginti parallelis; e centro orbiculi quatuor prodeunt falces, margine exteriore ciliatae. In tergo corporis e centro plurimæ venæ pallidæ.*

### 2110. MEDUSA cruciata orbiculata cruce alba piæta.

Habitat in mari atlantico.

DESCR. Hæc omnium minima est, tota gelatinosa, vitrei coloris; discum pingit crux magna alba, ad margines usque extensa; margo integer est: caret appendiculis omnibus, sc. cavitatibus, pistillis, staminibus, branchiis.

## Asterias.

### 2111. ASTERIAS rubens stellata radiis lanceolatis gibbis undique aculeata.

Asterias radiis quinis latiusculis asperis. Fn. 1285. It. Wigoth. 172.

Plot. ox. 85. n. 16. t. 2. f. 2. 3. Asteria.

Pet. mus. 6. n. 10. Asteria Slagburiensis.

Merr. pin. 191. Stella marina minor.

Olear. mus. 55. t. 28. f. 4. Stella marina.

Schönef. ichth. 75. Stella marina plinio.

Suecis Sjöftierna.

Hallandis Korsfisk, Marstrand. Korstroll.

Habitat in mari Scaniæ & Norwegiæ alluente, ubi sæpe consumit pisces in hamo.

DESCR. Stella pentadactyla violacea, rubens s. alba, testa undique aculeis mollibus minutis; subtus papillæ quadruplici ordine digestæ. Os subtus in centro.

### 2112. ASTERIAS minuta stellata obtusa ciliata.

Habitat in Mari Norvegico. Martin.

DESCR. Similis quodammodo Asterie rubenti, sed magnitudine sensim minus. Pastinacæ & lobis ovatis, obtusis, ciliatis 6 s. 7 mucronibus pellucidis. An Pullus præcedentis vel distincta species vix dixerim, quia indiu præcedentis pullos non viderim.

### 2113. ASTERIAS glacialis stellata radiis heptagonis: angulis aculeatis.

Link. Stell. t. 7. f. 9. & t. 32. f. 52. Stella marina.

Habitat in Oceano Norvegico.

2114. ASTERIAS *ophiura* radiata: radiis quinque, stella orbicularis squamosa.

*Martens spitzb. t. P. f. D.*

*Planck. conch. 38. t. 4. f. 4.*

Habitat in *Oceano Norvegico.*

2115. ASTERIAS *caput medusæ* radiata: radiis dichotomis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 95. Asterias caput medusæ.*

*Martens spitzb. t. P. f. E.*

*Seb. mus. 3. t. 9. f. 1, 2.*

Habitat in profundo *Oceani Norvegici*, frequens.

### Echinus.

2116. ECHINUS *esculentus* hemisphærico-globosus: ambulacris denis, areis obsolete verrucosis.

*Echinus subglobosus, vertice plano. Fn. 1289.*

*List. angl. 169. t. 3. f. 18. Echinus marinus, aculeorum vestigiis parum aut nihil eminentibus.*

*Suecic Borre.*

Habitat in *mari Norvegico.*

2117. ECHINUS *spatagus* ovatus gibbus: ambulacris quaternis depressis.

*Echinus subcompressus, vertice prominulo. Fn. 1290.*

*List. app. 28. Echinus minor angulosus, ex utraque parte compressus.*

Habitat in *mari Septentrionali.*

2118. ECHINUS *Cidaris* hemisphærico depressus: ambulacris quinis repandis linearibus; areis alternis bifariis.

*Gualt. test. t. 108. f. D. E.*

Habitat in *Oceano Norvegico.* A. R. Martin.

### III. TESTACEA.

#### Chiton.

2119. CHITON *punctatus* testa octovalvi levata, corpore punctis excavatis.

Habitat in *Oceano Norvegico.* A. R. Martin.

K k

DESCR.

*DESCR.* Quem e mari norvegico attulit D. Martin erat parvus, magnitudine Lentis: *Testa* oſſovalvi, incarnata, lævi: valvulis aliquot ſtriis transverſis arcuatiiſ.

2120. *LEPAS anatifera testa compressa quinquevalvi lævi intestino glabro insidente.*

*Lepas testa compressa, basi membrana cylindracea.* Fn. 1350.

*Argenv. nat.* 364. t. 30. f. F. *Concha anatifera adhærens.*

*Pet. mus.* 82. n. 862. *Balanus anatifera.*

*Bart. cent.* 6. p. 271. *Concha anatifera major.*

*Worm. mus.* 256. *Concha anatifera.*

*List. hist.* 23. t. 440. f. 283. *Concha anatifera margine lævi exerc.* t. 7. f. 4. 5.

*Stalpart. obs.* 2. p. 458. t. 15. *Conchæ falsis gravidæ anseribus.*

*Bonan. recr.* 95. f. 2.

*Sennert. hypomn.* 2. c. 8. *Concha anatifera.*

*Sibb. mus.* 170. n. 2. *Concha quinquevalvis compressa, tubulo quodam lignis aut algæ marinæ adhærens; animal sui generis multis cirrhis instruētum continens, falso dicta anatifera.*

*scot.* 2. l. 3. c. 12. t. 18. f. 1. *Concha anatifera.*

*Aldr. ex Sang.* 543. *Conchæ anatiferæ ex arbore dependentes.*

*Grew mus.* 148. *Balanus compressa.*

*Lob. ic.* 2. p. 250. *Conchæ anatiferæ britannicæ.*

*Bauh. pin.* 513. n. 1. 2. 3. *Arbores anatiferæ.*

*Bauh. hist.* 3. p. 803. *Anates Conchiferæ vel Anatiferæ falso dictæ aut Tellinæ & Balani.*

*Hoffn. inf.* 3. t. 6. *Concha anatifera vulgo Branta & Bernicla.*

*Chabr. sciagr.* 580. f. 3. 4. *Arbores conchiferæ & anatiferæ dictæ.*

Habitat in *Oceano* super ligna frequens.

2121. *LEPAS Scalpellum testa compressa tredecimvalvi læviuſcula, intestino squamoso insidente.*

*Ellis. Aet. angl.* 1758. vol. 2. t. 34. f 4.

Habitat in *Oceano Norvegico*, unde eam attulit A. R. Martin. Med. cand.

OBS. Testa non ſemper ſeſſiliſ, ſed ſæpe iñteſtino tenui ſquamoſo iñſidens, cæterum ſimiſiſ Lep. anatiferæ, at valvulae huic plures.

2122. *LEPAS Balanus testa conica fulcata: operculis acuminatis.* Fn. 1349. it. W:goth. 170.

*Argenv. nat.* 364. t. 30. f. A.

Habi-

Habitat in *Ostreis* & *lapidibus*, frequens in *mari Atlantico*.  
 DESCRI. Differt a sequenti quod 1. major sit, 2. quod *testa* ad latera sulcatis variis inæqualibus exsculpta, 3. quod *operculum*, quatuor valvulis compositum, acumine longo claudatur oblique inuicronato.

2123. LEPAS *Balanoides* testa conica truncata lævi: operculis obtusis. Fn. 1248.

*Pet. mus.* 82. n. 802. *Balanus noster parvus vulgaris*.

*Argenv. nat.* 364 t. 30. f. D.

*List. angl.* 196. t. 2. f. 41. *Balanus cinereus velut e senis laminibus striatis compositus*, ipso vertice altera testa bifida rhomboide occluso.

*hijst.* 3. t. 444. f. 287. *Balanus parvus striatus*.

*Leuwenh. arcan. epist.* 82 p. 472. t. 465. f. 1. E. & f. 7.

Habitat in *lapidibus*, *vulgatissima in mari Atlantico*.

DESCR. ANIMAL habet 1. *Rostrum* molle, intortum. 2. *Pedes* utrinque quatuor, longos, articulatos, pilosos. 3. *Pedes* utrinque tres, ventricosos, uti chelæ breves, singulos instructos fetis brevibus binis articulatis; 4. *Os inferne* dentibus utrinque duobus labello superimposito. Figuram Leuwenhœkii videoas satis bonam.

## Pholas.

2124. PHOLAS *Dactylus* oblonga hinc reticulato-striata.

*List. angl. app.* 44. t. 2. f. 3. *Pholas rostratus major* dicens penis.

*Seb. mus.* 3. t. 16. f. 6.

Habitat in *Scopolis Norvegici maris*. A. R. Martin.

2125. PHOLAS *crispata* testa ovali hinc obtusiore crispato-striata; cardinis dente curvo.

*List. angl.* t. 5. f. 36. concha altera parte dimidia striis crissatis.

Habitat in *Oceano*.

DESCR. *Testa* utraque extremitate maxime hiâns; Sulcus transversus in duas patres valvulas dividens; parte altera valde rugosa & crista, in qua ad cardinem matto reflexus,

## Mya.

2126. MYA *truncata* testa ovata postice truncata; cardinis dente antrosum porrecto obtusissimo.

*It. W:gotb.* 199. n. 2. t. 5. f. 3. nomine Listeri.

*List. angl.* 191. t. 5. f. 36. Concha lævis; altera tantum parte clausilis.

Habitat in *Oceano*, saepe etiam fossilis occurrit.

2127. *MYA arenaria* testa ovata postice rotundata, cardinis dente antrorsum porrecto rotundato denticuloque lateralí.

*It. W:goth.* 187. Concha subarenaceo-marina.

Habitat in *Oceano* Bahusiam alluente, sub arena, aqua tecta, ex duobus foraminibus in fundo obviis investiganda.

DESCR. *Testa* magnitudine Ovi anseris, lèvis, valvulae alterius cardo constat lobo rotundato cum denticulo lateralí; alterius ex cavitate subitus elevata; cætera vide *It. W:goth.*

2128. *MYA lutraria* testa oblongo-ovata, cardinis dente depresso parallelo rotundato denticuloque erecto emarginato.

*List. angl.* 170. t. 4. f. 19. Concha longa lataque in mediis cardinibus cavitate pyriformi.

Habitat ad ostia *fluviorum* mare intrantia.

2129. *MYA pictorum* testa ovata, cardinis dente primario crenulato; laterali longitudinali; alterius duplicato.

*List. ang. app.* 20. t. 1. f. 4. *Musculus* ex viridi pallidus omnium angustissimus.

Habitat in *fluviis*.

2130. *MYA margaritifera* testa ovata antice coarctata, cardinis dente primario conico, natibus decorticatis.

Concha testa oblonga, medio antice contracta. *Fn.* 1331.

*List. app.* 15. t. 1. f. 1. *Musculus niger* omnium crassissima & ponderosissima testa.

*Gesn. aqu.* Conchæ longæ species.

*List. app.* 15. f. 1. *Musculus niger* omnium crassissima & ponderosissima testa, conchæ longæ species.

*Suecic* Pärlemusla.

Habitat in fluviis maximis, præsertim *Lapponiæ*, ubi in verringibus communiter reperitur.

DESCR. *Testa* ovali-oblonga, ponderosa, antice retuso-compressa, extus rufus nigricans, latere angustiore s. superiore subvillosa, Natibus valde excorticatis; per siccitatem fragilis eriam per se. *Intus* Testa albida cicatricibus duabus pro inserzione muscularum. *Cardinis Dens* conicus, obtusus, porrectus; lateralis nullus; sed in minoribus longitudinalis crenulatus; an vero minor species diversa?

## Solen.

2131. *SOLEN Siliqua* testa linearis recta, cardine altero bidentato.

*List. angl.* 192. t. 5. f. 37. Concha fusca longissima angustissimaque.

Habij-

Habitat in *Oceano Norvegico.*

### Tellina.

2132. TELLINA *radiata* testa oblonga longitudinaliter subtilliſſime ſubſtriata nitida, futura ani canaliculata.

Habitat in *Oceano Norvegico.*

2133. TELLINA *trifasciata* testa ovata læviuſcula fanguineo-triradiata, pube rugosa.

Habitat in *Oceano Norvegico.*

2134. TELLINA *incarnata* testa ovata compresso-planiuſcula, natibus ſubmucronatis.

Concha testa ovata: altero latere angulo piano a cardine ad ambitum. Fn. 1337.

Lift. app. 32. f. 8. Concha rugosa tellinæformis, lineola quadam paululum eminente ab ipſo cardine ad imum ambitum donata.

Habitat in mari.

DESCR. Testa parva, magnitudine Fabæ, lævis, rugis minimis transversis; ubi valvæ coēunt, ab altero latere cardinis, testa plana est versus riectum.

2135. TELLINA *bimaculata* testa triangulo-subrotunda latoire lævi albida: intus maculis duabus fanguineis oblongis.

Habitat in *Oceano.*

2136. TELLINA *baltica* testa subrotunda lævi extus incarnata.

Concha testa subrotunda glabra incarnata. Fn. 1335.

It. æl. 43. Concha subrotunda glabra incarnata.

Habitat in mari *Baltico.*

DESCR. Testa tenera, magnitudine ſeminis Phafeoli, valde fragilis, vix taetum ferens, extus incarnata, ad cardines angulata, parum convexa absque ullis striis.

2137. TELLINA *pififormis* testa subglobosa lævi intus incarnata oblique ſubſtriata: ſtris antice angulo acuto reflexis.

Gualt. test. t. 7. f. D.

Habitat in *Oceano.*

2138. TELLINA *cornea* testa globosa glabra cornei coloris fulco transversali.

Concha testa subglobosa glabra cornei coloris: fulco transversali. Fn. 1336.

*Lift. angl. app. 22. f. 5.* Musculus exiguis pisi magnitudine subrotundus.

Habitat in paludibus; in *Hottonia*.

DESCR. Magnitudo seminis Pisi majoris, subglobosa. Testa latior transversim, quam a cardinibus antrosum; valde gibba, laevis est, uno sulco striave transversali, subpellucida, minime alba, sed coloris omnino cornu bovini ad pectines elaborati subdiaphani.

## Cardium.

2139. CARDIUM *echinatum* testa subcordata: sulcis exaratis linea ciliata: aculeis inflexis plurimis.

Concha testa subrotunda; sulcis XX longitudinalibus: dorso antice aculeatis. Fn. 1339.

Rond. aqu. 22. Concha echinata.

Gesn. aqu. 131. 132.

Bonan. test. clas 2. n. 90. p. 446. Concha striata echinata.

*Lift. angl. 188. t. 5. f. 33.* Pectunculus echinatus.

*Lang. test. 60.* Concha cordiformis æquilatera umbone cardinum unito, striata papillosa verrucosa aculeata vel imbricata

Habitat in Oceano Atlantico frequens.

DESCR. Testa est subrotunda valvis hinc depresso, illinc vero magis rotundatis, valde gibba, sulcis XX exarata, striis interjacentibus elevatis, longitudinaliter reflexo-echinatis, praesertim versus marginem.

2140. CARDIUM *solidum* testa triangulari rotundata opaca laeviuscula, cardinibus foveola pyriformi.

*Lift. angl. 174. t. 4. f. 24.*

Habitat in Oceano Norvegico.

2141. CARDIUM *edule* testa antiquata: sulcis XXVI obsolete recurvato-imbricatis.

Concha testa subrotunda, sulcis viginti sex longitudinalibus, tribus transversalibus. Fn. 1340.

*Aldr. ex sang. 449.* Concha striata altera Rondeletii.

*Pet. mus. 86. n. 835.* Pectunculus maritimus nostras edulis vulgarissimus.

*Lift. angl. 189. t. 5. f. 34.* Pectunculus vulgaris rotundus circiter XXVI. striis majusculis at planioribus notatus.

*bif. 3. n. 171.* Pectunculus capite minore rotundiore & magis æquali margine.

*Schonef. ichth. 55.* Pectunculus.

*Dal. pharm. 398.* Pectunculus.

*It. atl. 42.* Concha testa subrotunda, sulcis 26 longitudinalibus, tribus transversalibus.

Habi-

Habitat in mari; copiose ad littora rejicitur.

DESCR. *Testa* subrotunda, rugis. s. fulcis transversis duobus tribusve profundis velut austra est; sulci longitudinales 26 circiter, distincti, remoti, interjecto spatio rugolo; hi sulci subtus similiter versus marginem profunde insculpti numerantur. *Craffa* admodum testa est.

## Donax.

2142. DONAX *trunculus* testa antice lævi, intus violacea, marginibus crenatis.

*List angl.* 190. t. 5. f. 35. *Tellina* intus ex violaceo purpurascens, in ambitu ferrata.

Habitat in *Oceano Norvegico*.

## Venus.

2143. VENUS *Gallina* testa subcordata radiata: striis transversis obtusis, cardinis dente postico minimo, margine crenulato.

Habitat in *Oceano Norvegico*.

2144. VENUS *mercenaria* testa cordata solida transverse substriata lævi, margine crenulato, intus violacea, ano ovato.

*Kalm. canad.* 2. p. 355. Clam.

*List angl.* 229. t. 8. f. 33.

Habitat in *Oceano Norvegico* copiose.

2145. VENUS *exoleta* testa lentiformi transversim striata pallida obsoleta radiata, ano cordato.

*Gualt. test.* t. 75. f. F. G.

Habitat in *Oceano Norvegico*.

2146. VENUS *literata* testa ovata antice angulata: striis transversis subundulatis.

*Gualt. test.* t. 86. f. E. F.

Habitat in *Oceano Norvegico*.

## Arca.

2147. ARCA *barbata* testa oblonga striis barbata, natibus incurvis approximatis, margine integro clauso.

*Gualt. test.* t. 91. f. F.

Habitat in *Oceano Norvegico*.

## Ostrea.

2148. OSTREA *maxima* testa radiis rotundatis longitudinaliter striatis.

Concha testa aurita: striis quatuordecim. Fn. 1343.

Pet. mus. 86. n. 829. Pecten major nostras vulgaris.

List. angl. 184. t. 5. f. 29. Pe~~cten~~ maximus circiter striis 14 admodum crassis & eminentibus & iisdem ipsis striis insignitus.

hist. 3. t. 163. f. 1. Pe~~cten~~ magnus albidus circiter 12 striis multis minutisque incisuris exasperatis donatus.

Habitat in mari Atlantico.

2149. OSTREA *edulis* testa semiorbiculata membranis imbricatis undulatis: valvula altera plana integerrima.

Concha testa subrotunda rugosa substriata: valvis inaequalibus, cardine oblitterato. Fn. 1338.

Rond. aquat. 2. p. 37. Ostrea.

Gesn. aqu. 645. Ostrea.

Aldr. exsang. 482. Ostrea Rondeletii marina.

Fonst. exsang. 44. Ostrea.

Schonef. icht. 54. Ostrea.

Charl. exerc. 66. Ostrea.

Merr. pin. 193. Ostrea.

List. ang. 176. t. 4. f. 26. Ostreum vulgare maximum intus argenteo quodam splendore albescens.

hist. 3. p. 20. Ostrea major sulcata inaequaliter utrinque ad cardinem denticulata.

Bonan. recr. 108. t. 70. Concha satis nota in coenis, Ostrea latinis dicta, non Ostreum.

Lang. test. 81. Ostreum vulgare striatum.

Dal. pharm. 397. Ostrea.

Pet. mus. 85. n. 822. Ostrea vulgaris esculenta.

Suecic Ostra.

Habitat in mari Occidentali.

## Anomia.

2150. ANOMIA *craniolaris* testa orbiculata: valvula gibbosior conico-convexa, planiore basi foraminibus tribus.

Concha testa planiore orbicularata cranium humanum referente. Fn. 1347. t. 2. f. 1347.

Stobæi Diff. epist. 1732. 4:to Lundim. f. 1. 2 Nummulus Brattensburgensis.

*A&Z. upf. vol. 2. p. 560. t. 152. f. 4.* Nummus brattenburgensis territorii willans, insulæ Ivæ lacu, ubi ad littra sæpe rejicitur pagi Biskops-gården.

Habitat in *Scania*, ad Ifvö & Balsberg, sed fossilis, nec viva reperta.

OBS. D. D. Leche reperit duas testas coherentes, altera est Nummus Brattenburgensis Strobæi; altera est magis interne concava, extus turbinata convexa; adeoque de genere nullum dubium amplius supereft in Tab. II. æ conchæ testam superiorem antea notam in naturali magnitudine exhibet a tergo visam; *G* eandem auctam a latere interiore; *V*ero a latere exteriore. *J* Testam inferiorem antea ignotam a latere interiore, & vero eandem a latere exteriore delineat.

2151. ANOMIA *squamula* testa orbiculata integerima plana: margine altero gibbo lævi.

*It. W:gotb.* 171. Patella.

Habitat in *Oceani* Fucis, Cancris.

2152. ANOMIA *patelliformis* testa obovata convexa subdiphana striata, vertice postico recurvo lævi.

Habitat in *M. Norvegico*. A. R. Martin.

DESCR. Testa simillima Patellæ luteæ, ut si altera testa asservetur, nequeat non pro Patella dignosci.

Testa magnitudine extimi articuli digiti, albida, ovalis & fere orbiculata, læviter convexa, striata striis longitudinalibus convexis, numerosis, minutissimis, transversis, vix nudis oculis conspicuis; tenera fragilis & fere diaphana. Mucro ad nates versus cardinem obsoletior, lævis, recurvatus. *Valvula inferior* plana, lævis, tenuissima, cum majusculo obovato foramine versus cardinem.

2153. ANOMIA *retusa* testa obovata striata retusa convalle longitudinali, nate perforata.

Habitat in *Oceani Norvegici* Alcyoniis.

2154. ANOMIA *caput serpentis* testa obovata striata tomentosa: valvula altera nate longiore perforata:

Habitat in *Norvegiae Oceano*.

2155. ANOMIA *Terebratula* testa obovata lævi convexa: valvula altera triplicata; altera biplicata.

*Lift. angl.* 240. t. 8. f. 46.

Habitat in *Oceano Norvegico*.

### Mytilus.

2156. MYTILUS *edulis* testa læviuscula violacea, valvulis obliquis postice acuminatis.

*Concha testa oblonga lævi subviolacea. Fn. 1333. It.  
li goth. 170.*

*Lang. test. 24. Concha soleniformis lævis.*

*Gesn. aqu. 277. Mytulus.*

*Rond. aqu. 2. p. 48. Mytulus.*

*Aldr. exsang. 512. Mytulus Rondeletii.*

*Bell. aqu. 397. Mytulus.*

*Schonef. ict. 54. Mytulus.*

*Merr. pin. 193. Mytuli.*

*List. hist. 3. t. 362. f. 200. Musculus subcæruleus fere  
virgatus.*

*angl. 182. f. 28. Musculus ex cæruleo niger.*

*Pet. mus. 84. n. 820. Musculus maritimus vulgatissimus  
edulis.*

*It. øel. 43. Concha Mytulus dicta.*

*Habitat in mari copiosissime, ad littora rejicitur, a Belgis  
editur, non vero a nostris.*

2157. *MYTILUS barbatus* testa læviuscula ferruginea apice  
barbata.

*Gualt. test. t. 91. f. H.*

*Habitat in Oceano Norvegico.*

*DESCR.* Simillima præcedenti, sed rufescens & apice barbata.

2158. *MYTILUS anatinus* testa ovali compressiuscula fragilis-  
sima margine membranaceo, natibus decorticatis.

*Concha testa oblonga ovata longitudinaliter subrugosa, po-  
stice compresso prominula. Fn. 1332.*

*List. app. 9. f. 2. Musculus latus maximus, testa admodum  
tenui ex fusco viridescens, palustris.*

*Suecic Sjö-Musla. Musla.*

*Habitat in lacubus frequens.*

*OBS.* Figura Listeri paulo latior videtur, quam nostra.

## Bulla.

2159. *BULLA Hypnororum* testa ovata pellucida sinistrorsa, spi-  
ra prominente, apertura ovato-lanceolata.

*Cochlea testa pellucida flava ovata sinistrorsa, apertura ova-  
to-lanceolata, spira producta. Fn. 1303.*

*Habitat in Muscis humentibus.*

*DESCR.* Longitudo feminis Avenæ, sed crassior est. *Testa* pellucida,  
subflava, tenerrima, proninens, oblonga, minus acuta, spiris s. anfra-  
ctibus quatuor sinistrorum flexis: apertura oblonga est, cum spiræ in-  
fimæ latitudo superat totum corpus testæ superioris.

2160.

2160. **BULLA fontinalis** testa ovata pellucida sinistrorsa; spira obsoleta, apertura ovato-oblonga.

Cochlea testa pellucida flava ovata ventricosa sinistrorsa: apertura ovato-oblonga longitudinali: spira introducta.

*Fn. 1302. It. W:goth. 49.*

*A&t. upf. 1736. p. 41. n. 23.* Cochlea testa flava pellucida acuminata: rectu obliquo.

Habitat in plantis aquaticis.

DESCR. Magnitudo infra Hordei granum subsistit: Testa ovata, pellucida, flava, fragilissima, ut vix tactum ferat; apertura ovato-oblonga, fere longitudinalis, ventricosa & extima fere sola conspicua, reliquæ vix prominent; mucro obtusissimus est; spiræ sinistrorum incedunt.

## Buccinum.

2161. **BUCCINUM Lapillus** testa ovata acuta striata lœvi, columella planiuscula.

Cochlea testa crassa ovata utrinque producta; spiris quinque spiraliter sulcatis; aperturæ labro undulato. *Fn. 1321. It. W:goth. 170.*

*List. angl. 158. t. 3. f. 5. 6.* Buccinum minus albidum a-sperum intra quinas spiras finitum.

*exerc. 2. p. 85* idem.

Habitat in mari occidentali frequentissima, exedens mortuos pisces in sagenis.

DESCR. Sæpe argilla adeo obducta, ut difficile videantur spiræ. variat Testa subrotundata majore *List. f. 5*, quæ etiam frequens. *It. W:goth. 169.*

2162. **BUCCINUM glaciale** testa lœvi substriata ovato-oblonga, anfractu infimo subcarinato.

Habitat in *Oceano Norvegico*, usque in Spitsbergam. *Martin.*

DESCR. Testa crassa, magnitudine extimi articuli pollicis, pallida, secundum anfractus obsoleta striata, acuminata, superne conica. Anfractus infimus s. maximus subcarinatus est, sed hæc carina in reliquis superioribus anfractibus evanescit, cuæ futura anfractuum evadat, quæ attenuata. Basis gibba, emarginata. Apertura ovata. Labium exterius crassum, patulum, striis incumbentibus.

2163. **BUCCINUM undatum** testa oblonga rudi transverse striata: anfractibus curvato-multangulis.

*List. angl. 156. t. 3. f. 2. 3.* Buccinum crassum rufescens striatum, & undatum.

Habitat in *Oceano Norvegico*.

DESCR. Statura Muricis despecti, sed canalis brevissimus & vix prominent. Variat Testa rotundata & torplofa.

## Strombus.

2164. **STROMBUS** *Pes pelecani* testa labro tetradactylo palmato digitis angulato, fauce lævi.  
*Cochlea* testa longa acuminata, aperturæ labro dilatato: dupli stræa antice sinuato. *Fn.* 1323.  
*Bonan. recr.* 3. n. 85. 87.  
*Habitat in mari atlantico.*  
*DESCR.* Testa crassa, longa, terebriformis, incarnata, basi parum rostrata, 8 spirarum anfractibus, verrucis compressis unica serie digestis. Apertura testæ producitur labro latissimo duabus elevatis striis angulato; Labrum hoc antice (apicem versus) prominet in angulum acutiusculum, intra quem angulum & testam sinus semilunaris est.

## Murex.

2165. **MUREX antiquus** testa patulo-caudata oblonga, anfractibus octo teretibus.  
*Gualt. test. t. 46. f. E.*  
*Habitat in Oceano.*
2166. **MUREX despectus** testa patulo-subcaudata oblonga, anfractibus octo: lineis duabus elevatis.  
*It. Wgoth. 200. t. 5. 8.* *Cochlea*, spiris octo, oblonga utrinque producta, lineis duabus elevatis.  
*Lift. angl. 155. t. 3. f. I.* *Buccinum album* læve maximum septem spirarum.  
*Habitat cum præcedenti.*

## Trochus.

2167. **TROCHUS cinereus** testa oblique umbilicata ovata, anfractibus rotundatis.  
*Habitat ad Oceani litora.*
2168. **TROCHUS zizyphinus** testa imperforata conica lævi, anfractibus subcarinatis.  
*Lift. angl. 166. t. 3. f. 14.* *Trochus albidus* maculis rubentibus sex spirarum.  
*Habitat ad littora Oceani, Norvegiae proximi.*

## Turbo.

2169. **TURBO littoreus** testa subovata acuta striata, margine columinari plano. *It.*

*It.* *W:goth.* 169, 199. *t.* 5. *f.* 4. *Cochlea testa ovata, spiris quinque striatis fasciatis, aperturæ margine postico dilatato rotundato.*

*List. angl.* 162. *t.* 3. *f.* 9. *Cochlea fusca fasciis crebris angustisque prædita.*

*Suecic* Kupunge.

*Habitat* ubique ad littora *Oceani*, ut ea fere tegat, & quando altius rupibus adhæret, tempestates australes indicare credunt rustici.

2170. TURBO *Clathrus* testa cancellata turrita, anfractibus contiguis lævibus.

*Cochlea oblonga: striis longitudinalibus marginatis.* *Fn.* 1325.

*Pet. mus.* 66. *n.* 705. *Buccinum album minus, costis eleganter elatis.*

*Habitat* in *mari occidentali*, unde nobis missa?

*DESCR.* Facillime distinguitur ab omnibus aliis hæc cancellata Cochlea, cuius striae longitudinales octo vel novem elatae quasi membranaceæ.

2171. TURBO *Terebra* testa turrita: anfractibus carinis sex acutis.

*Cochlea testa longa subulata, spiris duodecim striatis.* *Fn.* 1322.

*List. angl.* 161. *t.* 3. *f.* 8. *Buccinum tenue dense striatum, 12 minimum spiris donatum.*

*Habitat* in *mari occidentali*.

*DESCR.* Color corneus, *testa* terebriformi, singula spira quinque fulcis spiraliter exarata; *apertura* orbiculari.

2172. TURBO *perversus* testa turrita pellucida: anfractibus contrariis, apertura edentula.

*Cochlea testa pellucida oblonga, spiris decem sinistrorsis, apertura subrotunda.* *Fn.* 1300.

*Aet. upf.* 1736. *p.* 41. *n.* 20. *Cochlea testa oblonga obtusa, rectu rotundo, spiris octo, decem, duodecim.*

*List. angl.* 124. *t.* 2. *f.* 11. *Buccinum alterum pellucidum subflavum, intra senas spiras mucronatum.*

*Habitat* in *Muscis* ad radices arborum, & in tectis antiquis rusticorum circa Upsiloniam.

*DESCR.* *Testa* pellucida, subflava, spiris 8. 10. 12. sensim minoribus, in longum producta, apice obtusiuscula, sensim attenuata, spiris sinistrorum cunctibus.

2173. TURBO *Muscorum* testa turrita obtusa pellucida, anfractibus secundis, apertura edentula.

*Coch-*

Cochlea testa subpellucida, spiris sex dextrorsis, subcylindrica obtusa. Fn. 1301.

*List. angl.* 121. 2. 2. f. 6. Buccinum exiguum flavum, mucrone obtuso s. cylindraceum.

*It. øland.* 99. Cochlea parva spiris septem.

Habitat Upsaliæ inter *Hypna* & *Brya* ad radices arborum, & in tectis rusticorum antiquis.

*DESCR.* Magnitudo seminis secalis. Testa brunnea, dum adhuc animalculo foeta est, alias cornea, pellucida, spiris 4, 5, vel 6; apertura ovato-acuminata, mucrone obtuso. Spiræ more communi dextrorsum (aperturæ imposita) procedunt.

## Helix.

2174. HELIX *Lapicida* testa carinata umbilicata utrinque convexa, apertura marginata transversali ovata.

Cochlea testa utrinque convexa, subtus perforata, spira acuta, apertura ovata transversali. *It. øl.* 8. *Wigoth.* 27. \* Fn. 1298.

*Aet. upf.* 1736. p. 40. n. 9. Cochlea testa convessa subtus perforata, spira acuta.

*Pet. mus.* 69. n. 734. Planorbis terestris anglicus, umbili-  
co minore, margine acuto.

*List. angl.* 126. 2. 2. f. 14. Cochlea pulla sylvatica, spiris in aciem depresso.

*bist.* 1. p. 29. f. 62. Cochlea nostra umbilicata pulla.

Habitat in montibus præruptis Dannemoræ, Elfskarlebyæ, Oelandiæ. &c. Rodit Lapidem calcareum, uti Teredo ligna.

*DESCR.* Testa subpellucida, supra parum convexa, subtus magis convexa, constat spiris quinque: color pallidus s. corneus cum lituris spirarum transversis ferrugineis. Apex testæ minime prominet; subtus vero umbilicus foramine tereti majuscule apertus; margo spiraruim undique acutissimus. Apertura subovata, transversa, levissime dilatata.

2175. HELIX *albella* testa carinata umbilicata planiuscula subtus gibba, apertura semicordata

Cochlea testa supra convexo-plana, subtus convexa perforata, anfractu acuto, apertura semicordata. *It. øl.* 65. Fn. 1299.

*Aet. upf.* 1736. p. 40. n. 6. Cochlea testa depresso, supra planiuscula marginata, subtus convexa perforata.

Habitat in montium præruptis, rarissimum animal.

*DESCR.* Præcedenti multoties minor. Testa supra plana fere est, subtus valde gibba & perforata umbilico; acies lateralis in hac versus latus planum, contraria ac in præcedenti modo, ubi margo in medio anfractus

Etus; hinc dum *apertura* præcedentis ovata est, huic erit dimidiato cor-  
data s. cordis longitudinaliter disiecti dimidium referens, nullo modo  
margine dilatata; hæc constat anfractibus tribus vel quatuor, præcedens  
vero anfractibus quinque.

2176. *HELIX planorbis* testa subcarinata umbilicata plana, supra  
concava: apertura oblique ovata utrinque acuta  
Cochlea testa plana fusca, supra concava, anfractibus qua-  
tuor, margine prominulo. *Fn.* 1306.

*Lift. angl.* 145. t. 2. f. 27. Cochlea fusca, altera parte pla-  
nior & limbo insignita quatuor spirarum.

*hist.* 2. t. 138. f. 42. Cochlea fusca, limbo circum-  
scripta.

*Pet. gaz.* 16. t. 10. f. 11. *Planorbis minor* fluviatilis, acie  
acuta.

Habitat in aquis stagnantibus, *fossis*, *piscinis*, *paludibus* &  
*fluviosis*

DESCR. *Testa* constat 4 anfractibus nigricantibus, dum animal intra ean-  
dem latet opaca, alias pellucida cornei coloris s. membranacei: striæ  
minimæ obliquæ testam striatam reddunt; *apertura* ovato-obliqua, utrin-  
que parum acuta; margo anfractuum prominet.

2177. *HELIX complanata* testa deorsum carinata umbilicata  
convexa, subtus plana, apertura semicordata.

Cochlea testa plana, supra convexa, subtus concava; an-  
fractibus quatuor deorsum marginatis. *Fn.* 1308.

Habitat in *flaviis* & *paludibus*, frequens in *Hottonia*.

DESCR. Parva adinodum: *Testa* subcinerea, subdiaphana, tenuis, plana,  
supra convexa, parum umbilicata; subtus plana omnino, sed parum ca-  
va versus centrum; margo, qui anfractus cingit, respicit latus planius  
s. inferius, *apertura* ovato-acuminata est.

2178. *HELIX vortex* testa carinata plana: supra concava, aper-  
tura ovali.

Cochlea testa plana fusca: supra concava, anfractibus quin-  
que: margine acuto. *Fn.* 1307.

*Lift. angl.* 145. t. 2. f. 28. Cochlea exigua subfuscata, altera  
parte planior sine limbo, quinque spirarum.

Habitat in *fossis*, *paludibus*, *piscinis*.

DESCR. Hæc *Hel.* planorbis minor, at anfractibus pluribus: margo te-  
stæ in illa extra testam exseritur, at in hac ipse testæ angulus est acutus,

2179. *HELIX cornea* testa supra umbilicata plana nigricans,  
anfractibus quatuor teretibus.

Cochlea testa plana pulla: supra umbilicata, anfractibus qua-  
tuor teretibus. *Fn.* 1304.

*Lift. angl. 143. t. 2. f. 26.* *Cochlea pulla*, ex utraque parte circa umbilicum cava.

*exerc. 2. p. 59.* *Purpura f. Cochlea fluvialis compressa major.*

Habitat in *fluviis*, *paludibus* majoribus, *fossisque* frequens admodum.

*DESCR.* *Testa* spira f. anfractus teres est, striis longitudinalibus & transversalibus minutissimis elevatis: tota ferruginea f. pulla, subpellucida, plana utrinque est, nec spira prominens, at latere superiore concavo umbilicata, vix autem in inferiore latere.

2180. *HELIX spirorbis* testa utrinque concava plana albida, anfractibus quinque teretibus.

*Cochlea* testa plana alba utrinque concava, anfractibus quinque teretibus. *Fn. 1305.*

*Act. upf. 1736. p. 40. n. 2.* *Cochlea* testa depressa utrinque subæquali: spira tereti.

Habitat in *Lacubus*.

*DESCR.* Magnitudo feminis Aneti. *Testa* alba, pellucida: anfractibus quinque, plana, parum utrinque concava, vix tamen umbilicata; minime marginata uti sequentes.

2181. *HELIX contorta* testa subumbilicata plana utrinque æquali, apertura linearis arcuata.

*Cochlea* testa plana: utrinque æquali umbilicata: apertura semilunari. *Fn. 1309.*

*Act. upf. 1736. p. 40. n. 5.* *Cochlea* testa depressa: spira arctissima, vix perforata.

Habitat in *fossis* ad radices *Hottoniae*, sæpe in prato regio Upfaliensi.

*DESCR.* Magnitudo feminis Brassicæ, raro major: *Testa* constat anfractibus quatuor arctissime sibi invicem obvolutis: utrinque fere æqualis est testa, & utrinque concava: apertura litteram C refert, seu Lunam in primo quadrante. *Corpus* nigrum, corniculis subulatis, longis; cum in aquis versatur & ex testa proreperit animalculum vivum, videtur testa, eminus inspecta, quasi deaurata.

2182. *HELIX hispida* testa umbilicata convexa hispida diaphana, anfractibus quinis, apertura subrotundo-lunata.

*Cochlea* testa utrinque convexa hispida, spiris quinque rotundatis, subtus perforata. *Fn. 1296.*

Habitat in *arboribus* & *plantis*.

*DESCR.* Parva, cornei coloris, convexa, rotundata, subtus perforata, pilis raris brevissimis hispida, apertura lunari-subrotunda.

2183. *HELIX Pomatia* testa umbilicata subovata obtusa decolor, apertura subrotundo-lunata.

Coch-

Cochlea testa ovata quinque spirarum, pomatia dicta. *Fn.*  
1293.

*Gesn. aquat.* 255. Pomatia.

*Aldr. exsang.* 389. Cochlea terrestris gypso obserata.

*List. ang.* 111. t. 2. f. 1. Cochlea cinerea edulis, cuius apertura operculo crasso velut gypso per hyemem clauditur.  
*exercit. anat.* 1. p. 162, t. 1. Cochlea pomatia edulis gesneri.

*bist.* 1. n. 46 Cochlea cinereo rufescens fasciata leviter umbilicata.

*Dal. pharm.* 394. Cochlea terrestris, Limax terrestris.

*Merr. pin.* 207. Cochlea alba major, cum suo operculo.

*Pet. mus.* 4. n. 12. Cochlea alba major.

*Suecic* Trägårds-Snäcka.

Habitat in hortis; allata e Germania, sponte vix occurrit;  
a quibusdam editur.

2184. *HELIX arbustorum* testa umbilicata convexa acuminata,  
apertura suborbiculari bimarginata: antice elongata.

Cochlea testa utrinque convexa subcinerea: fascia solitaria grisea, labro reflexo. *Fn.* 1295.

*List. angl.* 119. t. 2. f. 4. Cochlea maculata, unica fascia pulla angustiore que per medium anfractus insignita.

*bist.* 1. n. 53. Cochlea maculata, unica fascia fusca per medium orbem insignita.

*Pet. mus.* 5. n. 15. idem.

Habitat in *Nemoribus*, pratis umbrosis, lucis.

*DESCR.* Variat admodum colore. *Testa* apertura lunulata est, constans spiris quinque, convexiuscula, fascia grisea per medium spirarum; cæterum undique subgrisea punctis oblongis transversis albis.

2185. *HELIX vivipara* testa imperforata subovata obtusa corna cingulis fuscatis, apertura suborbiculari.

Cochlea testa oblongiuscula obtusa, anfractibus teretibus: lineis tribus lividis. *Fn.* 1312.

*List. angl.* 133. t. 2. f. 17. Cochlea maxima fusca s. nigricans fasciata.

*bist.* 2. t. 126. f. 26. Cochlea vivipara fasciata.

*exerc.* 2. p. 17. t. 2. Cochlea maxima viridescens fasciata vivipara.

*Swam. bibl.* t. 9. f. 3. Cochlea vivipara.

*Pet. mus.* 84. n. 814. Cochlea fluviatilis vivipara londinen sis.

*Att. upf.* 1736. p. 40. n. 14. Cochlea testa producto-convexa fluviatilis.

*Vulgo Caput bovis.*

Habitat in *paludibus*, *lacubus* & *fluviiis*, in primis in flu-  
vio Sahla frequentissima, præsertim locis argillosois.

DESCR. *Testa pallida* & *obtusa*, anfractus linea triplici livida obsoleta  
longitudinaliter picta: *apertura ovata*, *operculo membranaceo testa*.

2186. *HELIX nemoralis* testa imperforata subrotunda lævi dia-  
phana fasciata, apertura subrotundo-lunata

Cochlea testa utrinque convexa flava: fascia subsolitaria fu-  
sca, labro reflexo. *Fn.* 1294

*Lift. angl.* 116. *t.* 2. *f.* 3. Cochlea citrina aut leucophæa,  
non raro unicolor, interdum tamen unica, interdum e-  
tiam duabus, aut tribus, aut quatuor, plerumque vero  
quinque fasciis pullis distincta.

*hist.* *t.* 1. *n.* 54. Cochlea interdum unicolor, interdum  
variegata, item variis fasciis depicta.

*Merr. pin.* 207. Cochlea vulgaris, testa variegata.

*Pet. mus.* 5. *n.* 14. Cochlea vulgaris, testa variegata.

Habitat in *Nemoribus*. *It. cel.* 127.

OBS. Ab hac specie vix differt *Cochlea testa pellucida*. *It. cel.* 155.

2187. *HELIX fragilis* testa imperforata ovato - subulata tereti  
pellucida, apertura ovato-oblonga.

Cochlea testa producta acuminata pellucida, anfractibus  
senis, apertura ovato-oblonga. *Fn.* 1311.

*A&t. upf.* 1736. *p.* 41. *n.* 24. Cochlea testa alba pellucida  
acuminata, rigata obliquo.

Habitat in *paludibus*.

DESCR. *Testa pellucida*, longa, sed tam tenera, ut vix tactum ferat,  
ubi præcedens solida & dura vix digitis comminuenda: facie ad præce-  
dentem proprius accedit, sed triplo minor.

2188. *HELIX stagnalis* testa imperforata ovato-subulata suban-  
gulata, apertura ovata.

Cochlea testa producta acuminata opaca, anfractibus senis  
subangulatis, apertura ovata. *Fn.* 1310.

*Pet. mus.* 82. *n.* 805. Buccinum fluviatile nostras oblongum  
majus.

*Lift. angl.* 137. *t.* 2. *f.* 21. Buccinum longum, sex spira-  
rum, omnium & maximum & productius subflavum pel-  
lucidum in tenui acumen ex amplissima basi mucronatum.

*hist.* 2. *t.* 123. *f.* 21. Buccinum subflavum pellucidum  
sex orbium, clavicula admodum tenui productiore.

*Aldr. test.* 3. *p.* 359. *n.* 3. Turbo lævis in stagnis degens.

*a A&t. upf.* 1736. *p.* 41. *n.* 21. Cochlea testa producta acu-  
minata striata cinereo-alba. *Lift.*

*Lift. angl. 139. t. 2. f. 22.* Buccinum minus fuscum sex spirarum, ore angustiore. fig. mal.

*Pet. mus. 82. n. 306.* Buccinum fluviatile nostras oblongum minus.

*Act. upf. 1736. p. 41. n. 22.* Cochlea testa producta acuminata atra.

Habitat in fossis, paludibus, flaviis & stagnis passim.

DESCR. Inter maximas nostras aquaticas numerari potest; caret omnī pictura, sed colore valde variat; Aliis testa omnino atra; aliis cinerea; aliis albida; aliis subgrisea; in omnibus striæ minutissimæ anfractuum transversæ s. testæ longitudinales, vix oculis nudis conspicuæ; hinc inde macula transversalis anfractus s. longitudinalis alterius spiræ, quæ albida est, ac si ea nota omni anno distingueretur.

2189. *HELIX putris* testa imperforata ovata obtusa flava, apertura ovata.

Cochlea testa membranacea subflava oblonga, mucrone obtuso, anfractibus tribus. *Fn. 1317.*

*Lift. angl. 140.* Buccinum subflavum pellucidum, trium spirarum, (Figura non quadrat, an hæc?)

*hist. 3. t. 123. f. 23.* Buccinum subflavum pellucidum trium orbium?

*Bonan. recr. 119. f. 54. n. 1.* (an?)

*Pet. mus. 83. n. 808.* Buccinum fluviatile nostras, testa pretenui fragili (an?)

Habitat in flaviis & lacubus.

DESCR. Testa cerei coloris, pellucida & fere membranacea, strigis minutissimis parallelis obliquis, constans tribus anfractibus, mucrone obtusiusculo: apertura ovata margine recto, nec dilatato; testa magis flava est, quam in ulla alia alia nostrate.

2190. *HELIX limosa* testa imperforata oblongiuscula pellucida apertura ovata.

Cochlea testa oblongiuscula; anfractibus quinque, pellucida: ore ovato. *Fn. 1314.*

Habitat in flaviis.

DESCR. Testa pellucida & valde tenera ac acuta.

2191. *HELIX tentaculata* testa imperforata ovata obtusa impura, apertura subovata.

Cochlea testa oblonga obtusa: anfractibus quatuor laxis cinnereis opacis; apertura subovata. *Fn. 1313.*

*Act. upf. 1736. p. 41. n. 16.* Cochlea palustris, testæ hiato rotundo contracto; spiris laxis.

*Lift. angl. 135. t. 2. f. 19.* Cochlea parva subflava, intra quinque spiras finita.

Habitat cum præcedente.

*DESCR.* Hæc quadruplo minor est & spira laxiore magisque elongata, nec adeo ventricosa, tota quasi argilla obducta, a qua depurari nequit, operculo etiam clauditur.

2192. *HELIX auricularia* testa imperforata ovata obtusa, spira acuta brevissima, apertura ampliata.

Cochlea testa diaphana, anfractibus quatuor, mucrone acuto brevissimo, apertura acutissima. *Fn.* 1315.

*List. angl.* 139. t. 2. f. 23. Buccinum pellucidum flavum, quatuor spirarum, mucrone amplissimo, testæ apertura omnium maxima.

*bifl. 2. t. 123. f. 32.* Buccinum subflavum pellucidum, quatuor orbium, ore amplissimo: mucrone acuto.

*exerc. 2. p. 54.* Buccinum fluviatile pellucidum subflavum, quatuor spirarum, mucrone acuto, testæ apertura patentissima.

*Pet. mus.* 83. n. 807. Buccinum fluviatile nostras breve, ore patulo.

Habitat in flaviis & stagnantibus aquis.

*DESCR.* Est inter lacustres & fluviatiles nostrates maxima. Spira infinita maxima ventricosa, minutissime secundum anfractus transversim striata. Duplex nobis est, altera magis, altera minus retusa a parte mucronem spectante; testa interne nivea omnino est. Apertura margo reflexus.

2193. *HELIX balihica* testa imperforata ovata acuminata, rugis elevatis, apertura ovata ampliata.

Cochlea testa pellucida, anfractibus quatuor, apertura ovata ampla, superficie rugis elevatis. *Fn.* 1316. *Is. gosl.* 261.

Habitat ad littora Gotlandiæ.

*DESCR.* Parva est, Testa ventricosa, spiris tribus, quarta vero in apice vix conspicua: aperturæ margo dilatatus; superficies testæ striis elevatis remotis versus aperturæ marginem oblique descendentibus. Singulare in hac est, quod testa in medio gibba aucta est sutura quadam; *Animalculum* nigrum erat.

## Nerita.

2194. *NERITA fluviatilis* testa rugosa, labiis edentulis.

Cochlea Nerita fluviatilis dicta. *Fn.* 1318.

*List. angl.* 136. t. 2. f. 20. Nerita fluviatilis e cœruleo virescens maculatus, operculo subrufo lunato & aculeato donatus.

*bifl. 2. p. 1. f. 38.* Nerita fluviatilis e cœruleo virescens maculatus, operculo subcroceo aculeatoque donatus.

*Pet.*

*Pet. mus.* 67. n. 718. *Nerita thamesis exiguus reticulata variegatus.*

Habitat in *flaviis*, Upsaliæ ad molendinam *Ulvam* & alibi.

DESCR. Testa subovata cornæ coloris, subcærulescens, superficie cavitibus inæquali, argilla deturpata, Apertura magnitudine fere testæ: labro interiore plano, operculo semi-ovato.

2195. *NERITA littoralis* testa lævi, vertice cavernoso, labiis edentulis.

Cochlea *Nerita marina* dicta. *Fn.* 1320.

*Lift. angl.* 164. t. 2. f. 3. *Nerita reticulatus.*

*bif. I.* 4. f. 8. f. 39. *Nerita coloris castanei.*

*Pet. mus.* 67. n. 717. *Nerita anglicus maritimus fuscus vulgaris.*

*It. goth.* 261. *Nerita.*

Habitat in *Mari frequens.*

DESCR. Testa minor, lævis & operculata. Animal utrinque setas duas instar pedum totidem exterens.

3 *Cochlea Nerita lacustris* dicta. *Fn.* 1319.

Habitat in *Lacu* ad pagum Tible Uplandiæ frequens.

DESCR. Præcedenti & sequenti similis; Testa minor antecedente, major insequente, glabra, varie colorata.

2196. *NERITA lacustris* testa læviuscula cornea, apice exquisito, labiis edentulis.

Habitat in *Lacubus.*

2197. *NERITA glauca* testa umbilicata lævi, spira obtusiuscula, umbilico semiclauso: lobo gibbo dicolore.

*Cochlea subrotunda obtusa umbilicata:* fasciis quinque maculis ferrugineis sagittatis, secunda lineis undulatis. *Fn.* 1324.

*Lift. angl.* 163. t. 3. f. 10. *Cochlea rufescens*, fasciis maculatis, maxima ad imos orbes distincta.

Habitat in *Oceano*, olim ad me delata.

DESCR. Magnitudo nucis Coryli; Testa subrotunda, obrufa, quatuor anfractum, albida, basi perforata seu umbilicata, anfractus (præsertim intimus) fasciis quinque pinguntur, quarum prima seu superior maculis ferrugineis sagittatis constat, secunda maculis ferrugineis oblongis undulatis, tertia, quarta & quinta maculis ut in prima.

## Haliotis.

2198. *HALIOTIS tuberculata* testa subovata, rugis transversis tuberculatis.

*Haliotis striata rugosa.* *Fn.* 1326.

*Rond. aqu. 5.* *Auris marina.*

*Bellon. aqu. 395.* *Patella altera major.*

*Gesn. epit. 224. f. 1. 2.* *Auris marina.*

*Aldr. exsang. 551. f. 1. 2.* *Patellæ feræ s. Aures marinæ.*

*Fonst. aqu. 1. 17. f. 4. 5.*

*Bonan. recr. 91 f. 1. 2.* *Auris marina.*

*List. angl. 167. t. 3. f. 16.* *Auris marina quibusdam.*

*bif. 4. f. 7. t. 611. f. 2.* *Auris marina major, latior, plurimis foraminibus eorumque vestigiis ad 40 circiter conspicua, clavicula elata.*

*Pet. mus. 81. n. 801.* *Auris marina anglica.*

*Sibb. mus. 130. n. 2.* *Auris marina nostras.*

*Grew. mus. 139.* *Auris marina.*

Habitat in mari Occidentali, cum testis ad littora repertis, habuimus.

### Patella.

2199. PATELLA *vulgata* testa subangulata angulis quatuordecim exsoleatis, margine dilatato acuto.

Patella testa ovata quatuordecim angulis exarata. *Fn. 1291.*

*List. angl. 195. t. 5. f. 40.* Patella ex livido cinerea striata.

*Sibb. mus. 125. n. 1.* Patella vulgaris ex livido cinerea.

*Pet. mus. 85. n. 827.* Patella vulgaris anglica,

Habitat in mari Occidentali ubique in lapidibus.

DESCR. Testa conica, 14 angulis elevatis tuberculatisque exarata, quibus interjacente anguli totidem minores. Apex obtusiusculus est & margini angustiori propior, nec in centro. Margo subtus nigricans dentulis albis.

2200. PATELLA *lacustris* testa integerrima ovali membranacea, vertice mucronato reflexo.

Patella testa membranacea ovali; mucrone reflexo. *Fn. 1292.*

*List. angl. 151. t. 2. f. 32.* Patella fluviatilis fusca, vertice mucronato inflexo.

Habitat sat frequens in lacubus nostris, plantarum foliis insidens sub aquis, praesertim Stratiotis foliis delectatur.

### Dentalium.

2201. DENTALIUM *Entalis* testa tereti subarcuata continua.

Dentalium testa subcylindracea lævi obliqua, hinc angustiore. *Fn. 1327.*

*Rond. pisc. 2. p. 110.* Tubulus dentatus lævis.

*Gesn. aqu. 348.* Dentales.

*Charl. exerc. 63.* Dentalium.

*Dal. pharm. 393.* Dentalium.

*Lang.*

*Lang. test. 5.* *Tubulus dentalis* lævis.

*Lift. hist. 4. f. 2. n. 2.* *Dentale* læve album, altera extremitate rufescens.

*Bonan. recr. 91.* *Dentales* alii ejusdem formæ minores.  
Habitat in mari Occidentali frequens.

### Serpula.

2202. SERPULA planorbis testa regulari orbiculata plana æquali.  
Habitat in Oceani conchis.
2203. SERPULA spirillum testa regulari spirali orbiculata pellucida, anfractibus teretibus sensim minoribus.  
*Planck. conch. t. I. f. 8.*  
*Ginnan. mar. 2. t. I. f. 7.*  
Habitat in Oceani Zoophytis.
2204. SERPULA spirorbis testa regulari spirali orbiculata, anfractibus supra introrsum subcaniculatis, sensimque minoribus.  
*It. W:goth. 170.* *Dentalium* testa spirali plana adhærente.  
*Ginnan. mar. 2. t. I. f. 8.*  
Habitat in Oceani Fucis frequentissima.
2205. SERPULA contortuplicata testa semitereti rugosa glomerata.  
Habitat in Oceano.
2206. SERPULA triquetra testa repente flexuosa triquetra.  
*Dentalium* testa adhærente flexuosa triquetra. *It. W:goth. 7.*  
Habitat in Oceani *Cancris*, *Ostreichis* &c.  
*OBS.* *Testæ* apertura, in perfectis, apice tridentata: dente uno superiore recto & duobus inferioribus propioribus nutantibus.
2207. SERPULA glomerata testa tereti decussato - rugosa glomerata.  
*Dentalium* testa cylindracea inæquali flexuosa contorta. *Fn. 1328.*  
*Argent. nat. 352. t. 29. f. 8.*  
Habitat ubique ad littora Oceani, sæpe in Ostreichis.
2208. SERPULA ringens testa tereti recta punctato - arenacea.  
Habitat in Lacubus frequens.  
*OBS.* *Utrum* hæc proprie *hujus generis* sit, etiamnum dubium est.

## IV. LITHOPHYTA.

## Madrepore.

2209. MADREPORA *turbanata simplicissima* *turbanata lavis*, *stella concava*. *Amoen. acad.* I. p. 87. t. 81. f. 1, 2, 3, 4, 7.  
Habitat in Mari Balthico, copiosissime reiecta ad littora Gotlandiae.
2210. MADREPORA *truncata composita*, corporibus proliferis disci pluribus margine coadunatis, stellis truncatis centro cylindrico cavo. *Amoen. acad.* I. p. 93. t. 4. f. 10.  
Habitat cum praecedente, parcius.
2211. MADREPORA *stellaris composita*, corporibus proliferis centralibus solitariis, stellis margine dilatato-coadunatis. *Amoen. acad.* I. p. 94. t. 4. f. 11.  
Habitat cum praecedentibus.
2212. MADREPORA *favosa composita*, stellis angulosis concavis coadunatis. *Amoen. acad.* I. p. 96. t. 4. f. 16.  
Habitat cum praecedentibus.
2213. MADREPORA *organum composita*, cylindris striatis membrana deflexa striata combinatis. *Amoen. acad.* I. p. 96. t. 4. f. 6.  
Habitat cum praecedentibus, minus frequens.
2214. MADREPORA *flexuosa composita*, stellis cylindricis flexuosis scabris: superne distinctis fastigiatis. *Amoen. acad.* I. p. 96. t. 4. f. 13.  
Habitat cum prioribus.
2215. MADREPORA *Ananas composita*, corporibus proliferis e centro pluribus undique coadunatis, stellis convexis striatis centro concavis. *Amoen. acad.* I. p. 22. t. 4. f. 9.  
Habitat cum praecedentibus.  
*DESCR.* Praecedentes omnes, passim ad littora Gothlandiae & Oelandiae reiectas, antiquae Sueciae & Maris Balthici incolas fuisse dubium esse nequit, num vere otiamnum, in alto hujus maris, heic vivant & procreentur, me fugit.
2216. MADREPORA *ramea ramosa pinuata undulata striata*, *stellis terminalibus*. *Coral-*

*Corallium album pumilum nostras.* *Raj. angl.* 3. p. 32.  
*Habitat in Oceano Norvegico.* A. R. Martin.

*DESCR.* Simillima est nostra reliquis hujus speciebus, sed magnitudine  
*Corallio albo officinarum non major;* rami deinde a stella ad itellam ma-  
 gis flexuosi.

### Millepora.

2217. **MILLEPORA Eschara** membranacea undique adnata  
 punctis quincuncialibus. *Amoen. acad.* 1. p. 105. t. 4. f.  
 19. *Loefl. act. stockb.* 1752. p. III. f. 1-4.

*Habitat ubique in Mari supra fucos, corallia, testacea, to-*  
*phos, quos crustae instar abducit.*

*DESCR.* Membrana pertusa punctis contiguis ovalibus, que puncta in  
 ambitu gerunt 8 f. 10 dentes setaceo-subulatos.

### Tubipora.

2218. **TUBIPORA Urceus** corallio urceolato subsimplici: ore  
 sexdentato. *Schäff. monogr.* 1755. t. 2. f. 7-9.  
*Habitat in Lacubus.*

2219. **TUBIPORA repens** corallio repente filiformi dichotomo,  
 tubis flexilibus cylindricis erectis distantibus.  
*Polypus stellis cordato-campanulatis radiatis.* *Amoen. acad.*  
 2. p. 63.

*Beck. act. stockb.* 1746. t. 6. f. 4?

*Habitat in Nymphææ foliis, pagina aversa, frequens in La-*  
*cubus.*

## V, ZOOPHYTA.

### Isis.

2220. **ISIS Hippuris** stirpe corallino, articulis striatis, geniculis  
 attenuatis.

*Sertularia ramosissima, articulis sulcatis.* *Hort. cliff.* 430.  
*Mus. Tess.* 118.

*Habitat in M. Norvegico, unde eam attulit A. R. Martin.*

2221. **ISIS Anastatica** stirpe capillari paniculato minutissimo.

L 15

Poly-

*Polypus anastaticam* referens. *Amoen. acad. 2. p. 64.*  
*De Geer act. stockb. 1747. t. 6. f. 4. 5.*  
*Habitat in Lacum conchyliis frequens.*

### Gorgonia.

2222. **GORGONIA** *Flabellum reticulata*, ramulis interne compressis.  
*Lithoxylon retiforme*, ramis parallele compressis: primordiis  
 aliis crassioribus. *Hort. cliff. 480*  
*Habitat in Oceano Norvegico.* A. R. Martin.
2223. **GORGONIA** *Placomus paniculata*, ramis vagis tomentosis,  
 calycibus octodentatis.  
*Habitat in Oceano*, Balusiam alluente.
2224. **GORGONIA** *pinnata compressiuscula*, ramis distichis  
 compressis.  
*Lithoxylon pinnato-ramosum erectum compressum flexile*,  
 ramulis setaceis. *Hort. cliff. 480.*  
*Habitat in Oceano Norvegico.* A. R. Martin.  
*DESCR.* Cortex luteus quasi crusta ochracea constructus.

### Alcyonium.

2225. **ALCYONIUM** *arboreum*, stirpe arborecente, ramis obtusis.  
*Lithoxylon norvegicum.* *Mus. Tessin. 120. t. 10.*  
*Habitat in alto Oceani Norvegici.*  
*DESCR.* Stirps suberosa, altitudine s̄epe humana, ramis ultimis s̄epe  
 digitis crassitię, Abietem defoliatam referens.
2226. **ALCYONIUM** *digitatum acaule coriaceum oblongum rugosum.*  
*Ellis corallin. 82. t 32. f. A. a.* Alcyonium ramoso digitatum  
 molle, asteriscis undique ornatum.  
*Habitat in Oceano Norvegiam alluente.*
2227. **ALCYONIUM** *rubrum* informe rubrum.  
*Habitat in Oceano Norvegico.* A. R. Martin.
2228. **ALCYONIUM** *gelatinosum* informe gelatinosum.  
*Habitat in Oceano*, supra Fucos, frequens.  
*DESCR.* Corpora amorpha quasi e gelatina constantia, diaphana; intra  
 hęc animalia, quę prodeunt itella simili Madreporae. An hujus generis  
 vera species, asseverare non audeo.

Tubu-

## Tubularia.

2229. TUBULARIA *ramosa* cylindris ramosis, geniculis contractis.

*Ellis corall.* 31. t. 16. f. A. a. t. 17. f. A.  
Habitat in Oceano.

2230. TUBULARIA *muscoides* cylindris subdichotomis totis annulato-rugosis.

Habitat in Oceano Bahusiam alluente.

DESCR. Stirpes filiformes, brevissimæ, ramosissimæ, fere dichotomæ, corni coloris, tubulosæ, undique rugis annularibus testæ.

## Flustra.

2231. FLUSTRA *foliacea* foliacea ramosa; laciniis cuneiformibus rotundatis.

Millepora membranacea flexilis ramosissima, ramis distinctis planis obtusis superne dilatatis. *Hort. cliff.* 480.

*Ellis corall.* 70. t. 79. f. A.  
Habitat in Oceano.

OBS. Nomen *Escharæ* in *Flustram* transmutavi, cum prius Morbi homonymon.

2232. FLUSTRA *fistulosa* ramea dichotoma fistulosa articulata teres.

*Ellis corall.* 46. t. 23. f. A.  
Habitat in Oceano.

2233. FLUSTRA *pilosa* bipinnata pilosa.

*Ellis corall.* 73. t. 31.

Habitat in Oceano Norvegico, non infrequens.

DESCR. Facies Hypni ramis bipinnatis vel supra decompositis: ramulis clavatis, compressis, undique poris pertusa, inollis. Seta mollis sub singulo poro.

## Corallina.

2234. CORALLINA *officinalis* trichotoma, articulis cylindricis: terminali ovato.

*Ellis corall.* 48. n. 2. t. 24. f. A.  
Habitat in Oceano frequentissima.

2235. CORALLINA *squamata* bipinnata, articulis obovatis compressis.

*Ellis corall.* 49. n. 4. t. 24. f. C.

Habitat cum præcedente, non infrequens.

2236. CORALLINA *corniculata* dichotoma, articulis bicornibus: corniculis articulatis.

*Ellis. corall.* 50. n. 6. t. 24. f. D.

Habitat in Oceano paßim.

2237. CORALLINA *rubens* dichotoma capillaris, articulis cylindricis brevissimis: dichotomiæ subclavatis.

*Ellis corall.* 59. n. 5. t. 24. f. E.

Habitat in Oceano.

2238. CORALLINA *cristata* dichotoma capillaris: articulis omnibus clavatis.

*Ellis. corall.* 51. n. 7. t. 24. f. F.

Habitat in Oceano.

### Sertularia.

2239 SERTULARIA *pumila* denticulis oppositis mucronatis recurvatis, calycibus obovatis, ramis vagis.

*Ellis corall.* 9. n. 8. t. 5. f. A.

Habitat in Oceani testaceis & Fucis.

2240. SERTULARIA *tamariscæ* denticulis suboppositis truncato-subdenticulatis, calycibus obovatis bidentatis, ramis alternis.

*Ellis corall.* 4. n. 1. t. 1. f. A.

Habitat cum præcedente.

2241. SERTULARIA *abietina* denticulis suboppositis tubulosis, calycibus ovalibus, ramis alternis.

*Ellis corall.* 4. n. 2. t. 1. f. B.

Habitat cum præcedentibus rarius.

2242. SERTULARIA *balecina* denticulis alternis obsoletis, calycibus ovalibus ore obliquo, caulinis coadunatis.

*Ellis corall.* 17. n. 15. t. 10.

Habitat cum præcedentibus, rarior.

2243. SERTULARIA *myriophylla* denticulis secundis acutis, calycibus cylindricis sessilibus, ramis pinnatis incurvatis.

*Ellis.*

*Ellis corall.* 14. n. 13. t. 8. f. A.  
Habitat in Oceano alto.

2244. SERTULARIA *falcata* denticulis secundis tubulosis,  
calycibus ovatis, ramis pinnatis alternis.

*Ellis corall.* 12. n. 11. t. 7. f. A.  
Habitat cum præcedente.

2245. SERTULARIA *pluma* denticulis secundis campanula-  
tis, calycibus gibbis cristatis, surculis pinnatis alternis lan-  
ceolatis.

*Ellis corall.* 13. n. 12. t. 7. f. B.  
Habitat cum præcedentibus.

2246. SERTULARIA *echinata* denticulis oppositis obtusiuscu-  
lis, calycibus obovatis compressis reticulatis muricatis;  
surculis pinnatis bifidis.

Habitat in Oceano Sueciam alluente.

DESCR.. Stirps pinnata, lanceolata; pinnis remotis, bifidis, fere imbricatis, dentibus oppositis, præcedenti structura similibus. Calyces pluri-  
mi, ovales s. obovati, compressi, venis elevatis reticulati & undique mu-  
ricati.

2247. SERTULARIA *antennina* denticulis verticillatis setaceis,  
calycibus subsessilibus verticillatis, stirpibus simplicibus.

*Ellis corall.* 13. n. 12. t. 7. f. B.  
Habitat in Oceano nostro rarius.

2248. SERTULARIA *lendigera* denticulis obsoletis, calycibus  
secundis cylindricis parallelis paucim congestis, stirpibus  
filiformibus.

*Ellis. corall.* 27. n. 24. t. 15. f. B.  
Habitat in Oceano frequens.

2249. SERTULARIA *geniculata* denticulis alternis contortis,  
calycibus ovatis subrostratis, stirpe geniculata flexuosa  
simplici.

*Ellis corall.* 22. n. 19. t. 12. f. B.  
Habitat in Oceano ad Bahusæ littora frequens.

2250. SERTULARIA *polyzonias* denticulis alternis subdenti-  
culatis, calycibus obovatis polyzoniis, stirpe subramosa.

*Ellis corall.* 5. n. 3. t. 2. f. A.B.  
Habitat in Oceano.

2251. SERTULARIA *flexuosa* denticulis obsoletis, calycibus alternis ovatis sessilibus, stirpe simplici flexuosa.  
*Loefl. act. Stockb. 1752. p. 114. t. 3. f. 5-10.*  
*Ellis. corall. t. 38. f. 1. A*  
 Habitat in *Oceano & Baltico* mare.
2252. SERTULARIA *bursaria* denticulis oppositis compressis fastigiatis, ramis dichotomis.  
*Ellis. corall. 41. n. 8. t. 22. f. A.*  
 Habitat in *Oceani Fucis.*
2253. SERTULARIA *loricata* denticulis oppositis truncatis obsoletis.  
*Ellis. corall. 40. n. 7. t. 21. f. B.*  
 Habitat in *Oceano.*
2254. SERTULARIA *fastigiata* denticulis alternis acutis, ramis dichotomis fastigiatis.  
*Ellis. corall. 31. n. 1. t. 18. f. A.*  
 Habitat in *Oceano* frequens.
2255. SERTULARIA *scruposa* denticulis alternis angulatis spinosis, ramis dichotomis.  
*Ellis. corall. 38. n. 4. t. 20. f. C.*  
 Habitat in *Oceano*, cum plurimis aliis, quas mihi remote a mari habitanti investigare non licuit.

### Hydra.

2256. HYDRA *Polypus* nuda, tentaculis septenis capillaribus.  
*Hydra viridis* corpore æquali, tentaculis corpore brevioribus.  
*Fn. 1283.*  
*Bæk. act. Stockb. 1746. t. 6. f. 1. 2.*  
*Ellis. corall. t. 26. f. C.*  
 Habitat in *Aquis dulcibus stagnis & piscinis* frequens.
2257. HYDRA *socialis* nuda mutica torosa rugosa.  
*Rœf. inf. 3. t. 95, 96, 94. f. 4.*  
 Habitat cum præcedenti, non infrequens.

2258. HYDRA *umbellaria* capsula ciliata globosa, corpusculo mutico.  
*Rœf. inf. 3. t. 100.*  
 Habitat in *Aquis dulcibus.*

2259. HYDRA *triticea* capsula ovali truncata magnitudine seminis tritici.

Habitat in *Oceano* supra testas ostrearum, non infrequens.  
A. R. Martin.

DESCR. *Capsulae* subpedicellatae, plures, membranaceae, magnitudine & figura puparum Formicæ rufæ, apice truncatae. *Florem* non vidi.

### Pennatula.

2260. PENNATULA *phosphorea* stirpe rachi utrinque pennata.

Pennatula *phosphorea* rachi summitate undique pinnata.

*Amoen. acad.* 4. p. 256.

Penna marina. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 69. *seb. mus.* 3. t. 16. f. 8.  
Habitat in *Oceano* norvegico parcus.

2261. PENNATULA *mirabilis* stirpe filiformi, pinnis lunatis peccinatis remotis distiche alternis.

Polypus mirabilis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 96. t. 19. f. 4. *Amoen. acad.* 4. p. 257.

Habitat in *Oceano* Norvegico.

### Tænia.

2262. TÆNIA *vulgaris* osculis lateralibus geminis. *Amoen. acad.* 2. p. 7. t. 1. f. 2.

Tænia articulata plana. *Fn.* 1266.

*Gadd. satag.* 88.

Habitat ad fontes rarius & parva, in *Canibus* frequentissima, in *Homine* sæpe.

2263. TÆNIA *lata* osculis lateralibus solitariis. *Amoen. acad.* 2. p. 80. t. 1. f. 3.

Habitat in *Canibus* non infrequens; in *Homine* raro.

2264. TÆNIA *Solium* osculis marginalibus solitariis. *Amoen. acad.* 2. p. 74. t. 1. f. 1.

Tænia articulata teres. *Fn.* 1267.

Habitat in *Canibus*, *Hominibus*, *Piscibus*.

2265. TÆNIA *canina* osculis marginalibus oppositis. *Amoen. acad.* 2. p. 81. t. 1. f. 4.

Habitat cum præcedentibus.

Volvox.

2266. VOLVOX *globator globosus*.  
*Roel. inf. 3. f. 1-3.* Globo-animal.  
Habitat in *Lacubus frequens*.

---

*Turpe est in Patria vivere & Patriam ignorare.*  
Lancius.

---

SEPO-

# SEPOSITA

*Animalia olim lecta, nec dein a nobis, pro ulteriori examine, reperta.*

## INSECTA.

2267. SCARABÆUS nigro-cærulescens. Fn. 359.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudine pulicem vix adtingit; *supra* totus nigro-cærulescens; *subtus* totus ater.

2268. DERMESTES ater, pectore elytrisque subnigris; pedibus rubris. Fn. 371.

Habitat in *Brassica subputrida*, per hyemem in cellulis servata.

DESCR. Corpus ovatum, pediculo duplo majus, agile. Caput atrum. Pedes & Elytra e rubicundo nigra; elytra secundum marginem dorsalem parum prominent, ubi conjunguntur; femora & pedes nigro-rubri, Pedes non teres: sed fere marginatum Cassidæ; cum Chrysomelis in multis convenit.

2269. DERMESTES ater, pedibus rufis. Fn. 372.

Habitat in aquis inter Lemnas.

DESCR. Magnitudo dupla pediculi. Caput, Thorax, Elytra attra. Elytra singula 9 striis, punctata, in margine laterali prominulo. Pedes & antennarum basis rufo-ferruginea. Thorax convexus, non vero teres. (Forte *Silpha aquatica* 461.)

2270. DERMESTES nigro-fuscus; elytris punctatis nitidis.

De Geer. Fn. 374.

Habitat in lignis.

DESCR. Magnitudo pediculi majoris, cylindricus, fere glaber. Elytra non truncata variant fusco & nigro colore.

2271. COCCINELLA coleoptris flavis: maculis quatuor rotundis, tribus oblongis. De Geer. Fn. 393.

Habitat in sylvis.

DESCR. Oblonga: macula intermedia prima communis utrisque elytris; duas aliae transversæ longiusculæ.

2272. CHRYSOMELA oblonga fusca, elytris littera S albo.

Fn. 433.

M m

Habi-

Habitat in *Scania*. D. Leche.

*DESCR.* *Thorax* griseus albidis pilis. *Elytra* griseo-fusca cum macula alba, utrinque acuta, rhombæa, in medio futuræ; mox macula trigona, apice posteriora spectante; tum fascia transversa, & ultimo macula in medio futuræ, omnes hæ maculæ albæ. Magnitudo totius est seminis Carvi.

2273. **CHRYSOMELA testacea oblonga; elytris acuminatis.**

*Fn. 442.*

Habitat in *arboribus*.

*DESCR.* Est inter omnia Coleoptera minima, utpote quæ pediculo quadruplo minor. *Tota testacea. Antennæ* filiformes, minus capitatae quam in 434. *Elytra* dein non obtusa, sed acuminata caudam tegunt. *Thorax* marginatus fere, ut in *Carabis*.

2274. **CURCULIO cinereus, fasciis longitudinalibus dilutioribus.** *Fn. 472.*

Habitat inter glateam.

*DESCR.* Magnitudine pediculum superat: *totus omnibus partibus obscure cinereus: linea longitudinalis dilute cinerea a rostro ad elytra ducitur in medio dorso, elytra tamen non tangit. Linea alia cinereo-exalbida ab oculo per latus thoracis & elytrorum recta ad anum utrinque tendit; subtus totum animal dilutius cinereum est. Oculi nigri. Antennæ cinereæ, capitatae, infimo articulo longo; ad basin antennarum in capite lineola atra: Rostrum breve, non multum productum. (videtur *Curculio lineatus*.)*

2275. **LEPTURA nigra; elytris testaceis: punctis duobus, cruce, fasciisque nigris.** *Fn. 508.*

Habitat in *Scania*. D. Leche.

*DESCR.* *Corpus* nigrum. *Elytra* pallide testacea cum puncto in singulo elytro nigro; dein lunula recurva in ipsa futura elytrorum longitudinali; demum macula in singuli elytri margine exteriore, quæ ambæ conjuguntur lineâ transversâ; tandem fascia lata nigra & apice fascia nigra & lunula nigra ad apicem; per futuram longitudinali ducitur nigra linea: *Femora* & *Tibiae* supra flava, infra nigra.

2276. **CARABUS ater, pedibus rufis.** *Fn. 521.*

*Aet. upf. 1736. p. 21. n. 9. Buprestis corpore nigro, pedibus rufis.*

Habitat etiam apud nos vulgaris.

*DESCR.* Magnitudine fere & figura 800 simillimus, sed totus ater. *Thorax* latitudine coleopterorum: *Elytra* striata; *tibiae* & *antennæ* versus basin rufescentes; *striæ* in singulo elytro octo, quarum secunda (a futura) parva obliqua interrupta.

2277. **CARABUS griseus; capite, abdomine, elytrorum basi nigricantibus.** *Fn. 533.*

Habitat - - - - -

*DESCR.*

*DESCR.* Vix pediculo major. *Thorax, Elytra, Antennæ, Pedes* subgrisea: *Abdomen & Caput nigrum: basis elytrorum nigricans versus scutellum.*

2278. CHRYSOMELA saltatrix subrotunda atra opaca. *Fn. 537. (sub Mordella)*

*Act. upj. 1736. p. 18. n. 4. Gyrinus nigricans minor.*  
*Habitat inter olera.*

*DESCR.* Similis 426 sed dimidio minor, tota atra, nec thorace nitido. Saltat uti reliquæ. *Elytra* abdome paulo breviora, obtusa.

2279. CHRYSOMELA subrotunda atra nitida, tibiis antennisque flavis. *Fn. 538. (sub Mordella)*

*Habitat inter plantas sylvaticas.*

*DESCR.* Magnitudo majoris pulicis. *Tota atra, nitida. Elytra striata, Antennæ filiformes, pallide flavæ, apicibus nigricantibus, Femora nigra, tibiis flavis.* (an varieetas Chrysomelæ Helxines?)

2280. MORDELLA oblonga nigra, macula ferruginea in medio coleopterorum, lateribus basi ferrugineis. *Fn. 541.*

*Habitat in terra.*

*DESCR.* *Corpus* totum fuscum, magnitudine pediculi. *Caput* obtusum inflexum. *Thorax* ovatus, teretusculus, versus abdomen angustior. *Elytra* ovata, convexa: in medio coleopterorum macula rufa s. ferruginea, lunari, sinu anum respiciente, incumbente utroque elytro simul: ad basin singulorum elytrorum a latere utrinque rufescens; subtus tota nigra cum pedibus & antennis, quæ filiformes, articulatae, thorace paulo longiores.

2281. CICINDELA thorace viridi, elytris ferrugineis postice nigro-ceruleis. *Fn. 553.*

*Habitat in Scania.* D. Leche.

*DESCR.* Facies Carabi, sed thorax non marginatus. *Antennæ* nigrae. *Caput & thorax* cœrulea, nitida. *Thorax* subglobosus. *Elytra* ferruginea, postice in medio magna macula nigra, cœruleo splendente, quæ dimidiam partem elytrorum occupat, margine tamen exteriore ubique ferrugineo. *Pedes* flavi. *Corpus* subitus obscuro-ferrugineum. (an *Carabus vaporiariorum* 796?)

2282. DYTISCUS ovatus fuscus: capite thoraceque rubris *Fn. 571.*

*Act. upj. 1736. p. 15. n. 5. Dytiscus ovatus, collati ventreque rubro, alis fuscis*

*Habitat in fontibus cum Monoculo frequens.*

*DESCR.* Magnitudo feminis oryzæ, vel pulice paulo major. *Elytra* fusca. *Abdomen rubrum. Thorax & Caput rufescens. Oculi nigri.* (affinis *Dytisco erythrocephalo* 774)

2283. *GRYLLUS cauda ensifera recurvata*. *Fn. 622.*

*Gœd. belg. 2. p. 165. t. 40.* Sprinckhanen.

*List. gœd. p. 301. t. 121.* Acrigoneus.

*Friscb. germ. 2. t. 2. f. 4. an?*

Habitat in Tiliis, ubi cantillat mense Augusto, præsertim copiose in prædio Fullerón Comitis Jac. Cronstedt Regni Senatoris. (Audivi, sed non vidi hoc insectum in patria)

2284. *COCCUS Insectorum Coleoptratorum*. *Fn. 724.*

*Friscb. germ. 4. p. 19. t. 9.* Pediculus Scarabæorum canali adfixus.

Habitat in insectis variis Coleoptratis, præsertim in Scarabæis frequentissimus.

*DESCR.* Corpus ovale, margine acuto, parum convexum, rufescens. Cum partes accurate discernere non licuerit, ex facie huc retuli; inquirant vero alii accuratius in genus, an hujus? an Acari? an Pediculi species? seta quasi semper adfixum est hoc insectum corpori majoris infecti, sæpe in copia; an ovum? (*Non dum sciebam quid sit*)

2285. *PHALÆNA pectinicornis spirilinguis*, alis patentibus cinereis: fasciis duabus fuscis. *Fn. 843.*

Habitat in Umbrosis.

*DESCR.* Alæ superiores cinereæ, fascia ad basin fusca, parva, & alia in medio magna, undulata; tota superficies, si lente inspiciatur, punctis albis adsperrgitur; rachis antennarum alba est: inferiores alæ fascia unica pallida in medio obsoleta; subtus hæc alæ puncto nigro obsoleto gaudet in medio. *Abdomen* cineracens.

2286. *PHALÆNA seticornis spirilinguis*, alis patentibus canis: fasciis cinereis duabus tribusve puncto nigro. *Fn. 848.*

*Roes. phal. 3. p. 31. t. 8.*

Habitat in Pratis arboribus constitis.

*DESCR.* Magnitudo tabani. Alæ superiores canæ fasciis duabus vel tribus latis æqualibus transversis subcinereis. Alæ Inferiores canæ versus posticum marginem magis cinereæ. Alæ omnes subtus coloris accipitrii s. cincerei: cum tintura rufescens coloris vix manifesti; punctum nigricans in alis exterioribus utrinque conspicuum. Maris antennæ pennatae sunt; Fæminæ vero setaceæ.

2287. *PHALÆNA seticornis spirilinguis*; alis patentibus flavescente-niveis fasciisque linearibus nigris. *Fn. 858.*

Habitat in pratis & Gramine.

*DESCR.* Alæ omnes concolores, tam supra quam infra niveæ cum tintura flavescenti; nervi nigri ramosi; in superioribus linea transversa nigra, dein similis precedentium cum hamo; tum parum arcuata, deum ex duplice arcu. Inferiores lineola transversa, deum parum arcuata, tum ex duplice arcu; margines omnes postici albi dentibus nigris.

2288. PHALÆNA seticornis spirilinguis, alis patentibus, erucæ viridis bacilliformis. Fn. 867.  
*Frisch. germ. 7. p. 27. t. 19. Papilio erucæ spithame træ luteo-viridis erectæ stantis.*  
*Habitat in Pruno (an Phalæna, 1277. triflata.)*
2289. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis incumbentibus griseis, albo fulvoque reticulato-maculatis. Fn. 871.  
*Goed. belg. 1. p. 126. f. 68.*  
*List. goed. p. 136. f. 55.*  
*Habitat in Sambuco; volitantes copiose Upsaliæ ad Sandwicks Kiällan juxta viam vidi 1742. Junio XI.*  
*DESCR. Magnitudo majoris muscæ. Alæ plano-deflexæ, fuscæ, variis rotundis & ferrugineo-fulvis maculis undique adspersæ.*
2290. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis ferrugineo-cinereis: maculis alba flavaque, ano barbato ferrugineo. Fn. 872.  
*Raj. inf. 165. n. 20. Phalæna media, corpore brevi crasto, alis exterioribus e pulvereo rubentibus, maculis nigris variis?*  
*Frisch. germ. 7. p. 29. t. 21. Papilio erucæ atriplicinæ nigrae linea laterali lutea?*  
*Smolandis Askepiesk.*  
*Habitat in Urtica, Spinacia, Atriplice, frequens æstate in domibus, lucentibus candelis se ipsam cremans.*  
*DESCR. Alæ posticæ lineola alba: maculae duas obtoletæ: anterior alba, posterior flava. Anus amplissimus, 3 valvis, monstruosissimus, barba ruffa testus. Alæ superiores ferrugineo-nigrae, maculis & lineolis obsoletis albidis. Alæ subtus pallidæ puncto nigricante in medio.*
2291. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis depressis fuscis: linea utrinque ferruginea, humeris gibbis, fasciculoque medii dorsi. Fn. 876.  
*Habitat in Humulo.*  
*DESCR. Phalæna e majusculis f. Gamma par. Alæ supra fusco-nebulosæ: superiores ad basin lineola curva subferruginea (ante hanc pallidior alia) transversa, & alia ferruginæa transversa versus apicem. Alæ subtus pallidæ puncto nigro in medio. Pedes anteriores longiores barbati. Collare a tergo thoracis prominens & fasciculus pilorum a tergo thoracis cinereus. fasciculus minimus pilorum nigricantium in medio dorsi. Larva glabra, curva, postice oblique truncata, viridis, humeris triangulo flavo notatis.*
2292. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis pallide griseis: fascia saturatiore. Fn. 885.

## Habitat in Hortis.

*DESCR.* Magnitudo muscae carnivore. *Lingua* brevissima, *Alæ superiores* griseæ s. flavescentes, fascia in medio, versus marginem interiorem spectans, saturate grisea; similis macula ad basin alarum & parva macula ad marginem exteriorem, versus apicem etiam saturate grisea; *Alæ subtus* in medio fulceæ. *Alæ inferiores* crassiori margine albescentes. *Alæ superiores* postice repuse.

2293. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis supra fuscis margine albam lineolam emittebantibus. *Fn.* 886.

## Habitat Stockholmiae inter arbusta.

*DESCR.* Magnitudo Tabani. *Alæ superiores* supra fusce margine crassiore albae, in medio linea seu ramulo posteriora respiciente albo, & fascia transversa exalbida versus marginem posteriorem; *alæ inferiores* cinereæ; omnes subtus glaucæ.

2294. PHALÆNA seticornis spirilinguis; corniculis duobus recurvis basi cristatis, alis plano incumbentibus. *Fn.* 887.

*Reaum.* gall. I. & 18. f. II. 12. 13. 14. 15.

## Habitat in Domibus, frequens vere.

*DESCR.* Figura oblonga, planiuscula: magnitudo muscae carnariae. *Rostrum* spirale. *Alæ superiores* nitidæ, cavitatibus longitudinalibus striatae, griseæ, punctis obsoletis minimis sparsis; *Alæ inferiores* albæ, nitidæ: omnes postice ad marginem villosæ. *Fedes* spinosi. *Antennæ* setiformes, in fronte loco maxillarum prominularum Cornicula duo subulata, parva, acuta, recurva versus antennas, basi verrucosa sive cristata. *Abdomen* subtus utrinque punctis & nigris, versus latera sitis, longitudinalibus. *Corpus* alias totum alis superioribus concolor. *Color* alarum parum variat; hinc aliis griseus, aliis glaucus: singulis exterioribus & puncta alba cum antecedente nigro.

2295. PHALÆNA seticornis spirilinguis, corniculis duobus subulatis recurvis, alis nigricantibus supra albo maculatis. *Fn.* 888.

## Habitat in Nemoribus.

*DESCR.* Minima est, oblonga, nigricans. *Alæ superiores* in dorso albidis maculis tribus longitudinalibus nigricantibus, *Alæ* postice barbatæ nigrae, ad latera fusce; Maculae s. fasciae tres in medio dorsi longitudinaliter dispositæ nigricantes. *Cornicula* recurva subulata non cristata.

2296. PHALÆNA seticornis spirilinguis; corniculis duobus subulatis recurvis, alis incumbentibus nigro cinereoque nebulosis. *Fn.* 889.

## Habitat in truncis populitremule, cuius foliis larva vicitat, ea que convolvit.

*DESCR.* Magnitudo muscae carnariae, antice acuminata, corpore depresso. *Alæ superiores* incumbentibus, fusco canoque nebulosæ, postice punctorum ordine nigro. *Cornicula* simplicia recurva; *Antennæ* sere corporis longitudine.

2297. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta grisea nigro-nebulosa. *Fn.* 898.

Habitat in Domibus rarius.

*DESCR.* Parva, semi cylindracea, alis margine superiore villosis. *Alæ supra* griseæ sunt, sed nebulosæ colore fusco-nigricante. *Pedes* grisei. *Oculi* nigri, *Antennæ* alis breviores, setaceæ, nigrae.

2298. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta nigricans : lineolis luteis margine albis undulatis. *Fn.* 913.

Habitat in *Pado*.

*DESCR.* Magnitudo muscae domesticæ. *Antennæ* nigrae, corpore dimidio breviores. *Alæ superiores* supra nigricantes lineolis undulatis luteis/tam copiose pictis, ut quisnam color prævaleat, difficile determinatur; margo alarum crassior postice 5 vel 6 lineolis parvis albis vel argenteis undulatus. *Alæ inferiores* nigricantes margine crassiore, latere albo.

2299. PHALÆNA seticornis; alis incumbentibus linearibus pilosis. *Fn.* 919.

? *Reaum. inf.* I. t. 12. 13.

Habitat ad paludes, uti Stockholmiae ad *Brahelund* & *Friedrichshof*, ubi culicum instar volitat supra aquas circa vesperam.

*DESCR.* *Antennæ* setaceæ, longæ. Magnitudo & facies culicis vulgarissimæ pungentis. *Alæ superiores* lineares; *inferiores* subulatae, omnes pilis longis hirsutæ: dum alæ clauduntur observatur utriusque ad latera macula alba. *Pedes* pilosi. an *Phryganea*?

2300. TENTHREDO populnea. *Fn.* 934.

Habitat in *Populo tremula*. J. Moræus.

*DESCR.* Tenthredinem non vidi, sed Larvam Fahlunæ: *LARVA* virens. Capite atro, Collo ante pedes & cauda flavescente. Macularum longitudinalium nigrarum 4 ordines e maculis s. punctis XI in singulo latere cum impari terminali. ♂ minores duplicatae supra singulos pedes. Pedum secundariorum, præter caudæ obliquæ, sex paria.

2301. TENTHREDO gallæ foliorum Salicis. *Fn.* 945.

*Welsch. hectast.* I. p. 128. t. 128. *Verrucæ foliorum Salicis* *Frisch. germ.* 4. p. 22. t. 4. *Ichneumon foliorum Salicis*.

*Reaum. gal.* 3. t. 37. f. 1-5.

Habitat in *Salicibus* variis, in quarum foliis nodi seu gallæ nodosæ, intra quas habitat.

2302. ICHNEUMON niger; pedibus ferrugineis: palmis anticis nigris, antennis unicoloribus. *Fn.* 956.

Habitat in pascuis.

*DESCR.* Hic inter non maximos habendus est. *Antennæ*, caput, thorax abdomen atra. *Antennæ* longitudine fere abdominis, omnino nigrae. *A-*  
*culeus*

*culeus* longitudine abdominis, *setaceus*, niger. *Pedes ferruginei* cum femoribus, tibiis, palmis, exceptis pedum anteriorum tibiis, apice nigris.

2303. ICHNEUMON niger; fronte pallida, pedibus rufis. Fn. 961.

*Aet. upf. 1736. p. 50. n. 20.* Ichneumon cauda inermi, ab domine tereti atro, pedibus filiformibus rubris.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. Minor. *Antennæ* nigræ. *Frons* pallida. *Puncta* nullæ ante alas, nec ulla in incisuris abdominis. *Alæ* rufæ; *Pedes* postici tibiis apice nigrescentibus: *Alæ* membranaceæ cum puncto marginali, minime glaucae, hyalini coloris. *Abdomen cylindricum* est.

2304. ICHNEUMON ater; pedibus rufis, tibiis posticis apice nigris, antennis medio albis. Fn. 962.

*Aet. upf. 1736. p. 50. n. 21.* Ichneumon antennis spirali bus, corpore atro, ventre subfalcato, pedibus luteis.

Habitat passim ruri.

DESCR. *Abdomen atrum*, minime cylindricum, sed lanceolato-depres sum. *Caput & Thorax* nigra. *Alæ* subglaucae, puncto marginali pallido. *Antennæ* spirales, longitudine fere corporis, nigræ, annulo in medio albo. *Femora*, *tibiæ* & *palmæ* omnes ferrugineaæ, sed *tibiæ* posticæ verius apices præsertim & harum palmæ nigræ sunt; *Femora* autem, quæ longiuticula, ferruginea sunt in pedibus posticis, ut in reliquis.

2305. ICHNEUMON niger, pedibus ferrugineis, tibiis posticis albo nigroque variegatis. Fn. 963.

Habitat in *Seania*. D. Leche.

DESCR. Culice paulo major. *Antennæ* pallidæ. *Frons* flava. *Caput*, thorax, abdomen immaculate nigra. *Abdomen cylindricum*. *Pedum* duo paria priora ferruginea; par tertium femoribus obscure ferrugineis: *Tibiae* duobus annulis albis totidemque nigris alternis notantur.

2306. ICHNEUMON ab domine antice ferrugineo: postice nigro: maculis flavis quinque, antennis hinc albis. Fn. 979.

Habitat cum præcedente.

DESCR. *Antennæ* nigræ, altero latere toto albæ. *Pedes rufi*. *Caput* nigrum, fronte flava. *Thorax* niger apice & ad insertionem alarum luteus: *Abdominis* segmenta nigra; dorso macula flava notata, sed secundum & tertium ferrugineum. *Alæ* glaucae.

2307. ICHNEUMON niger; ab domine medio pedibusque anterioribus rufis, palmis posticis albis. Fn. 982.

Habitat in nemeribus.

DESCR. Mediæ magnitudinis est. *Caput & Antennæ* totæ nigræ. *Abdomen* rufum, basi & apice nigris. *Pedes* 4 anteriores rufi; pedes postici duo longiores, nigræ, solis pedum plantis albis. *Alæ* membranaceæ puncto marginali nigricante.

2308. APIS glabra nigro-aenea immaculata; pedibus ferrugineis. Fn. 1005.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Lechei hæc est. Vespa parva, prannia: Antennæ latis, capitatis, æqualibus, uno angulo deorsum pendentibus. Caput thorace latius. Thorax longior, medio crassior. Abdomen latum, depresso-rotundum, cum umbone in medio inferius. Alæ abdomine longiores, sine colore, cum unico rivulo marginali nigro, non exente. Pedes fusco-fulvi, parvi, Magnitudo pediculi; Antennæ vespæ; nulli circuli colorati abdominis.

2309. ASILUS ater hirtus, alis albis, femoribus ferrugineis. Fn. 1035.

*Fl. lapp. 359. n. 517.* Musca atra villosa oblonga, pedibus longis, femoribus rubris.

*Act. upf. 1736 p. 34. n. 64.* idem.

Habitat in nemoribus Lapponiae Lulensis.

DESCR. Magnitudo muscae domesticæ, sed angustior. Totus ater, pilis hispidus, nec nitidus. Femora ferruginea. Alæ albæ venis nigris.

2310. MUSCA nigricans; alis antice albo nigroque variis. Fn. 1056.

DESCR. Facies Tipulæ. Corpus nigricans. Abdomen tenue; Pedes longi. Antennæ subulatae. Alæ membranacei coloris, nervis 7 vel 8, nigricantibus; maculae juxta marginem anteriorem, præsertim in medio, albo nigroque variegatae. Oculi nigri. Nullus denticulus in margine alæ.

2311. MUSCA alis albis: fasciis quatuor fuscis, dorso abdominis punctis quinque parium. Fn. 1062.

*It. oel. 118.* Musca pallida, oculis viridibus.

Habitat in Oelandia.

DESCR. Musca domestica longe minor. Oculi virides. Abdomen a tergo ordinibus punctorum attrorum quatuor; in singulo ordine punctis quinque. Alæ albae, fasciis quatuor fuscis, versus marginem inferiorem angustioribus. Cauda acuminata.

2312. MUSCA hirsuta, thorace fulvo, alis macula fusca. Fn. 1074.

Habitat in floribus Scaniae. D. Leche.

DESCR. Est inter magnas. Oculi fusi. Frons flava. Antennæ fulvae. Thorax valde pilosus, fulvus. Abdomen nigrum, pilis flavis vestitum. Pedes nigri. Abdomen subtus nigrum, marginibus incisurarum albidis: latera abdominis margine luteo prominent, extra inferioris superficie latitudinem.

2313. MUSCA pilosa cinerea; alis ferrugineis macula fusca. Fn. 1075.

*Act. upf. 1736. p. 32. n. 34.* Musca fusca; alis testaceis, macula ferruginea. M m 5 Habi-

## Habitat in nemoribus.

*DESCR.* E maximis generis sui, facie quodammodo Tabani. Alæ pallido-ferrugineaæ cum macula in medio, præsertim versus marginem exteriorem, saturatus ferrugineaæ seu fusco-ferrugineaæ. Corpus villis cinereis, & parum magis in abdome griseis testum. Tibiae superne albidæ, interne nigrae.

2314. MUSCA nigra; segmentis abdominalibus, excepto primo, flavis medio nigris. *De Geer.* Fn. 1079.

## Habitat in Ostro-Gothia.

*DESCR.* Magnitudo muscaæ domesticae; segmenta abdominis numero 6, flava, linea transversa nigra, at primum totum nigrum. In thorace untrinque duæ maculæ flave.

2315. MUSCA nigra, abdome niveo, fasciis duabus nigris. Fn. 1082.

Habitat in *Potentilla* floribus aliisque rarius.

*DESCR.* Musca domestica dimidio minor. Oculi fuscæ. Thorax ater nitidus. Abdomen ovatum, niveum, segmento primo in medio versus basin nigro; secundo toto albo tertio & quarto margine postico nigris, ani albo apice nigro. Tota subtus atra; sed tibiæ pallidæ, & segmentum primum abdominis subtus album.

2316. MUSCA fusca; marginibus incisarum abdominis cinereis, alis ferrugineaë. Fn. 1088

*Aet. upf. 1736. p. 32. n. 38.* Musca glabra, abdome annulis fuscis pallidisque cincto.

## Habitat in floribus, præsertim in hortis obvia.

*DESCR.* Musca domestica longe major, fusco-cinerea, at segmenta Abdominis incana, hinc annuli tres abdominis quasi incani; tibiæ versus apices nigrae, alias albæ. Alæ ferrugineaæ, apicibus hyalinis. Vix hirsuta est.

2317. MUSCA grisea; abdominis tergo punctis quatuor nigris. Fn. 1095.

## Habitat in Scania. D. Leche.

*DESCR.* Magnitudo muscaæ domesticae, facies Afili vel Muscaæ stercorariae. Caput nigricans. Alæ membranaceaæ, margine anteriore pallidioræ. Thorax canus. Abdomen tenue, lividum, versus anum fuscum, puncta quatuor longitudinaliter disposita a tergo abdominis, nigra, in singulo segmento singula. Femora livida, tibiis pedibusque fuscis.

2318. MUSCA thorace viridi-nitente, abdome cæruleo-nitente. Fn. 1100.

*Aet. upf. 1736. p. 33. n. 55.* Musca carnivora viridi ænea, abdome acuminato.

## Habitat in cadaveribus.

*DESCR.* 1858. minor. *Pedes longiores. Alae magis obscuræ. Caput & Thorax viridi-anæa. Abdomen cœruleum, nitidum, angustius.*

2319. **MUSCA saltatrix** antennis setariis nuda, abdomine supra fusco, thorace tribus striis nigris. *Fn. 1113.*

Habitat in campis inter gramina, saliens more **Cicadæ.**  
*F. Logie.*

*DESCR.* Magnitudo pediculi. *Caput flavum. Oculi nigri. Vertex macula triangulari nigra tectus. Thorax a tergo lineis tribus longitudinalibus nigris, quarum intermedia cum capite cohæret, laterales vero a capite distinctæ; Scutellum flavum. Abdomen supra fuscum lineis duabus flavicantibus. Femora postica crassa.*

2320. **PODURA viatica.** *Fn. 1179.*

*Suecæ Jordkrut.*

Habitat in *Smolandia* in ipsis viis communiter, pulveris pyrii instar per terram sparsa; gregaria enim maxime est; an aquatica?

2321. **ARANEA flava;** abdominis apice macula cordata atra.  
*Fn. 1239.*

Habitat in *uliginosis*, sæpe etiam in floribus.

*DESCR.* Vidi pullos modo numerosissimos gregatim telæ insidentes, sed mutant dein colorem. *Abdomen subrotundum totum sulphureum; supra unum macula pulchra exæste cordata. Os his forcipatum; Thorax a quei coloris; cum procedit filum post se trahit.*

## VERMES.

2322. **NAUTILUS orthocera** testa recta, anfractibus carinato-striatis.

Nautilus testa recta subcylindracea apicem versus angustiore.  
*Fn. 1330. It. æl. 140.*

Habitat forte in mari *Baltico.*

*DFSCR.* Testam ipsam aut animal vidimus, at petreficatum ubique vulgare, non modo per *Oelandiam*; sed & in omnibus nostris Provinciis.

2323. **CONCHA** testa oblonga transversim vixque longitudinaliter striata. *Fn. 1334.*

Habitat in mari.

2324. **CONCHA** testa subrotunda: sulcis profundis viginti, margine crenato. *Fn. 1341.*

Habitat in mari.

*DESCR.* Testa subrotunda, crassa, sulcis profundis viginti pluribusve transversis exarata; his sulcis interjacet margo reflexus; at margo testæ introrsum crenatus s. denticulatus est, qua nota a sequenti maxime differt.

2325. CONCHA testa subrotunda: striis transversis innumeris, margine laevi. *Fn. 1342.*

Habitat in mari.

*DESCR.* Testa subrotunda, crassa, pellucida, basi acutiuscula, striis transversis, innumeris, 20 pluribus, tenuissimis, vix distinguendis visu, acutis & reflexis; intra testam, in ejus fundo, sulcus saepius oblongus; margo minime denticulatus est.

2326. CONCHA testa aurita rufescente: striis viginti. *Fn. 1344.*

*Lijt. angl. 185.. t. 5. f. 30.* Peeten tenuis rubrufus maculosus, circiter 20 striis majoribus at laevibus donatus.

Habitat in mari Occidentali frequens.

2327. CONCHA testa aurita: striis circiter quadraginta. *Fn.*

<sup>1345.</sup>

*Lijt. angl. 186. t. 5. f. 31.* Peeten minimus angustior inaequalis fere & asper, sinu ad cardinem cylindraceo, crenatissimus minutissimisque striis donatus.

Habitat frequens in mari Occidentali.

*DESCR.* Striae in hac specie exarant testam sulcis 30 ad 40, minutissimis, quibus facile a reliquis differt; alba dein etiam est.

2328. COCHLEA testa utrinque convexa, spiris quatuor corni coloris, fascia subferruginea. *Fn. 1297.*

Habitat in insula Liljeholmen Upsaliæ.

*DESCR.* Minor. Corpus animalis angustissimum, totum atrum,

# FLORÆ SVECICÆ NÓVITIÆ.

1. PANICUM sanguinale. Osbeck P. Hallandia, Hasslif.
2. POA bulbosa. Törnroes. I. Sudermannia, Nykopiae.
3. STIPA pennata. Falk J. P. W:gothia, Åsaka. Wartofta frequens.
4. PULMONARIA maritima. Martin A. R. Norvegia, Herlö. in littore maris arenoso.
5. PRIMULA veris acaulis. Martin. Norvegia, Bergen, frequens.
6. CAMPANULA rapunculoides. Osbeck. Hallandia, rarius. Nericia, unico in loco.
7. GENTIANA aurea. Solander D. C. Lapponiae alpes.
8. SCANDIX odorata. Martin. Norvegia, Bergen, locis arenosis.
9. SCANDIX Pedem. ♀ Falk J. P. Gotlandia, Klinte.
10. BUNIUM Bulbosanthum. Martin. Norvegia, Bergen montibus arenosis.
11. TAMARIX Germanica. Martin Norvegia, Siördals Elf.
12. LILIMUM bulbiferum, ipse. Sudermannia, Aspœn, in colle f. Querceto copiosissime.
13. JUNCUS stygius. ipse. Suecia paludes cæspitosæ, passim.
14. RUMEX obtusifolius. Ipse. Sudermannia, Åkerö, ad prædiuum Illustr. Tessin.
15. OENOTHERA biennis. Tidström. Westrogothia. Kinnekullæ
16. DIANTHUS prolifer. Falk, J. P. Gotlandia, Carlssöa minor
17. CRATÆGUS hybridus.  
Falk. J. P. Gotlandia; Ekstad, Östergarn, Färö, Carlssöa. Kalm. P. Finlandia. Aboæ. major.  
*Species hybrida e Sorbo 435 & Cratago 433, ut vix dicere rem cuinam proprius accedit.*
18. DIGITALIS rubra. Martin. A. R. Norvegia, Bergen, passim.
19. DRABA hirta. Solander. D. C. Lapponia, Alpes.
20. CARDAMINE parviflora. Törnroes I. Sudermannia Nykopiae, Djurgården.
21. SISYMBRIUM supinum. Falk J. P. Gotlandia, Aars tråsk. ad molendinatum.

22. LAVATERA *turingiaca*. ipse. *Uplandia, Upsaliæ, agris*  
*Wällfætrae.*
23. ASTRAGALUS *pilosus*. Falk. *Gotlandia, Westergarn*  
*Skansholmen*
24. TRIFOLIUM *medium*. Schreber. *Uplandia, Upsaliæ,*  
*Liumxihl.*
25. HIERACIUM *Leontodontis*. Solander. *Lapponiæ Alpes.*
26. ORCHIS *odoratissima*. Solander. *W: bothnia* *passim*  
 Falk. *Gotlandia, Sundre.*
27. ARISTOLOCHIA *clematitis*. Forskål P. *Scania, Hel-*  
*singburg ad valles.*
28. HOLCUS *mollis*. Ofbeck. *Hallandia.*
29. FONTINALIS *minor*. Gothen. *Uplandia, Upsaliæ.*
30. LYCOPERDON *Carpobolus* Forskål. *Smolandia, Gren-*  
*næ, in sylva ad viam.*
31. LYCOPERDON *radiatum*. Filius. *Uplandia, Upsa-*  
*liæ, Säfja Kongspark.*

## ADDENDA.

§.	17.	Fn.	9.	§.	1011.	Fn.	700.
	92.	Fn.	76.		1027.	Fn.	726.
	176.	Fn.	148.		1029.	Fn.	728.
	204.	Fn.	170.		1467.	Fn.	770.
	238.	Fn.	201.		1503.	Fn.	747.
	239.	Fn.	204.		1581.	Fn.	980.
	234.	Fn.	197.		1675. β	Fn.	993.
	325.	Fn.	298.		1768.	Fn.	1145.
	419.	Fn.	367.		1857.	Fn.	1040.
	477.	Fn.	391.	151.	<i>Colymbus cristatus.</i>		
	677. β.	Fn.	510.	152.	<i>Colymbus auritus.</i>		
	813.	Fn.	532.	1516.	<i>Panorpa communis.</i>		
	950.	Fn.	667.	1517.	<i>Raphidia Ophiopsis.</i>		

# ERRATA.

§.	11.	Fn.	54.	lege	5.	†
	22.	-	37.	-	16.	
	68.	-	63.	-	68.	
	224.	-	176.	-	177.	
	299.	-	91.	-	271.	
	380.	-	213.	-	324.	
	404.	-	356.	-	357.	
	434.	-	411.	-	441.	
	444.	-	349.	-	347.	
	468.	-	377.	-	387.	
	569.	-	448.	-	438.	
	588.	-	175.	-	475.	
	612.	-	428.	-	458.	
	874.	-	616.	-	626.	
	914.	-	656.	-	659.	
	1001.	-	673.	-	693.	
	1032.	-	302.	-	802.	
	1119.	-	733.	-	783.	
	1154.	-	919.	-	916.	
	1580.	-	984.	-	981.	
	1868	-	1754.	-	1054.	
	1912.	-	1035.	-	1036.	
	1958.	-	164.	-	198.	
	2001.	-	1020.	-	1220.	

§.	96.	sextu	lege	sexu.
	117.	molifissimæ	-	mollifissimæ.
	167.	Tetanus	-	Totanus.
	207.	cauda	-	caudæ.
	214.	Cinctus	-	Cinclus.
	234.	nigris	-	alis nigris
	263.	a rubra	-	rubra
	291.	brachias	-	branchias.
	492.	14 punctata	-	14 guttata.
	587.	Avernæ	-	Avenæ.
	1023.	zythoptæ	-	Autoptæ
	1300.	Stratiolata	-	Stratiotata
	1857.	fasciæ basi apiceæ	-	fascia basi apiceque.
	1985.	rupestris	-	longirostris
	2039.	adjacentibus	-	adjacente.
	2120.	(adde ante §)	-	LEPAS

IN-

# INDEX NOMINUM LATINORUM.

- A*bramus 360.  
*A*bysse *Satanæ* 2047.  
*Acarus* 1966-1991.  
*Acarus* 1966-1968, 1970, 1974,  
1975, 1978, 1979, 1982, 1983,  
1986, 1989, 1990, 1992.  
*Accipiter* 65, 68.  
*Achantis avicula* 237.  
*Acipenser* 299, 300.  
*Acipenser* 299, 300.  
*Aculeatus* 338.  
*Acus* 356, 375-377.  
*Admirabilis* 1181.  
*Alauda* 209-212.  
*Alauda* 209-212, 227.  
*Alaudæ congregæ* 228.  
*Albellus* 137.  
*Albula* 352, 353, 373.  
*Alburnus* 373.  
*Alca* 139, 142.  
*Alca* 139.  
*Alce* 39.  
*Alcyonium* 2225-2228.  
*Alcyonium* 2226.  
*Aluco* 72.  
*Ambulo*. 1131.  
*Ammodytes* 302.  
*Ammodytes* 302.  
*Ampelis* 80, 81, 82, 95.  
*Anas* 107-134.  
*Anas* 109, 110, 112, 113, 117,  
122, 124-127, 130 134, 136,  
141, 160, 196.  
*Anates*. 2120.  
*Anguilla* 301, 302.  
*Anguis* 289.  
*Anguis* 285, 286, 288.  
*Anomia* 2150-2155.  
*Anser* 108, 114-116, 140, 147.  
*Antennaria* 1119.  
*Antijk* 1120.
- Aper* 21.  
*Aphis* 975-1000.  
*Apbis* 980, 987.  
*Aphrodita* 2099.  
*Aphrodita* 2099.  
*Aphya* 374.  
*Apis* 1684-1719.  
*Apis* 1660, 1665, 1670-1676,  
1678, 1681, 1685, 1687, 1690,  
1691, 1694, 1697, 1700, 1705,  
1708, 1709, 1712, 1714, 1715,  
1717-1719, 1727.  
*Apus* 272, 2046.  
*Aranea* 1993-2025.  
*Aranea* 1996, 1997, 1999, 2000,  
2007, 2010, 2014, 2015, 2022,  
2023.  
*Araneus* 305, 906, 1978, 1979,  
1992, 1993, 1995, 2000, 2003,  
2004, 2011, 2014, 2015, 2017,  
2018, 2022-2025.  
*Arbores anatif. & conch.* 2120.  
*Arca* 2147.  
*Ardea* 161-166.  
*Ardea* 161, 163-166.  
*Argnata* 168, 169.  
*Ascaris* 2071, 2072.  
*Asellus* 306-310, 2055, 2058,  
2059, 2061.  
*Afilus* 1908-1917.  
*Afilus* 1895, 1896, 1900, 1902,  
1908, 1909, 1911, 1912, 1915,  
1916, 2052.  
*Afio* 71.  
*Afacus* 2033, 2034, 2039.  
*Asteria* 2111.  
*Asterias* 2111-2115.  
*Asterias* 2111, 2115.  
*Atricapilla* 256.  
*Attelabus* 638-644.
- N n Attela

- Attelabus* 514. 520. 566. 644.  
724. 815.  
*Audax* 1504.  
*Avis* 140. 141. 150. 156. 175.  
227. 259.  
*Avosetta* 191.  
*Auris marina* 2198.
- B**  
*Balaena* 49. 50.  
*Balaena* 48. 49.  
*Balanus* 2120. 2123.  
*Balbusardus* 63.  
*Ballerus* 365.  
*Basse la Reine* 1031.  
*Bernicla* 115.  
*Bibax* 1102.  
*Biber* 27.  
*Blatta* 862. 863.  
*Blatta* 822. 862.  
*Blennius* 316. 318.  
*Blennius* 317. 318.  
*Bombylius* 1918-1920.  
*Bombylius* 1709.  
*Bomyx* 1102.  
*Bos* 46.  
*Bos* 46.  
*Boschas* 131.  
*Branta* 115.  
*Brenta* 115.  
*Bubo* 69. 70.  
*Buccinum* 2161-2163.  
*Buccinum* 2161. 2163. 2166.  
2170-2173. 2188. 2189. 2192.  
*Bufo* 275.  
*Buglossa* & *Buglossus* 326.  
*Bulla* 2159. 2160.  
*Buprestis* 753-763.  
*Buprestis* 400. 644. 670. 672.  
754-756. 759. 800. 807. 1978.  
*Buteo* 60. 65.
- C**  
*Cæcilia* 289.  
*Caruleo-cephalus* 1117.
- Callaris* 306.  
*Callionymus* 304.  
*Cancellus* 2032.  
*Cancer* 2026-2043.  
*Cancer* 2026. 2028. 2030-2032  
2034. 2037-2039. 2041. 2042.  
*Canis* 5-8.  
*Canis* 5-7. 295.  
*Cantharis* 699-720.  
*Cantharis* 444. 641. 677. 699-  
701. 704. 709. 713. 714. 718.  
746. 748. 794. 807. 827.  
*Cantharus* 444. 700. 701. 826.  
*Capella* 176.  
*Caper* 44.  
*Capra* 44.  
*Capra* 43. 44. 176.  
*Caprea* Plin. 43.  
*Capreolus* 43.  
*Capricornus* 653. 660. 678.  
*Caprimulgus* 274.  
*Caprimulgus* 274.  
*Capriolus* 43.  
*Capus* 199.  
*Caput bovis* 2185.  
*Carabus* 780. 814.  
*Carabus* 781. 783-785. 787. 794-  
796. 799. 800. 807. 810. 820.  
*Carassius* 364.  
*Carbo* 145.  
*Cardium* 2139-2141.  
*Carduelis* 233-236.  
*Garycatactes* 91.  
*Carpio* 359.  
*Cassida* 467-469.  
*Cassida* 450-452. 454. 456. 458.  
460. 467. 468.  
*Castor* 27. 28.  
*Castor* 27. 32.  
*Catus* 9.  
*Catodon* 53.  
*Catodon* 53.  
*Cerambyx* 645-676.  
*Cerambyx* 647. 650-655. 657-  
660.

660. 666. 667. 670. 672. 675.  
 678. 697. 783. 785. 828.  
**Cernua** 335.  
**Certhia** 106.  
**Certhia** 106.  
**Certhias & Certhius** 106.  
**Cervus** 39-43  
**Cervus** 40-42. 405.  
**Cete** 53.  
**Chamaleo** 1780.  
**Charadrius** 187.  
**Charadrius** 187-190.  
**Charadrius** 187-190.  
**Charax** 364.  
**Chermes** 1001-1014.  
**Chimera** 294.  
**Chimera** 294.  
**Chiton** 2119.  
**Chloris** 226. 230.  
**Chrysætos** 54.  
**Chrysifis** 1665-1669.  
**Chrysometa** 56-578.  
**Chrysomela** 423. 434. 507-511.  
 513. 514. 519-526. 528. 531.  
 547. 554. 565-567. 569. 570.  
 808.  
**Cicada** 879-902.  
**Cicada** 881. 898.  
**Cicindela** 746-752.  
**Cicindela** 690. 691. 699. 746.  
 748. 749. 752. 756.  
**Ciconia** 162. 163.  
**Cimex** 909-974.  
**Cimex** 837. 903. 907. 909. 911.  
 917. 923. 927. 928. 934. 936.  
 942. 945. 946. 951. 954. 956.  
 958. 959. 969. 970-973. 978.  
 1008.  
**Cimices** 909.  
**Cinclus** 180.  
**Citrinella** 230.  
**Clam.** 2144.  
**Clangula** 122.  
**Clupea** 357. 358.
- Clupea* 358.  
*Cobitis* 341-343.  
*Cobitis* 341-343. 374.  
*Coccinella* 470-502.  
*Coccinella* 429. 430. 440. 471.  
 430. 481. 89. 490. 498.  
*Coccinellæ* 467. 471. 477. 492.  
 496.  
*Coecutiæraustes* 222.  
*Coccus* 1015-1026.  
*Coccus* 1023. 2080.  
*Cochinella* 477. 1023.  
*Cochlea* 2159-2161. 2163. 2166.  
 2167-2195. 2197.  
*Coluber* 285-288.  
*Coluber* 288.  
*Columba* 207. 208.  
*Columba* 142. 148. 207. 208.  
*Colymbus* 148-152.  
*Colymbus* 150-152.  
*Concha* 2120. 2125-2128. 2130.  
 2131. 2134. 2136. 2138. 2139.  
 2141. 2148-2150. 2156. 2158.  
*Conchæ* 2120. 2130.  
*Conirofor* 224.  
*Conops* 1900-1907.  
*Coracias* 94. 95.  
*Corallinia* 2234-2238.  
*Coregonus* 352-354.  
*Cornix* 86-88. 94.  
*Corvus* 85. 93.  
*Corvus* 85. 91. 94. 145. 146. 340.  
*Coffus* 1114.  
*Cottus* 321-324.  
*Cottus* 304. 321. 322. 324.  
*Coturnix* 206.  
*Crabro* 1670.  
*Crex* 194.  
*Cuculus* 96.  
*Cuculus* 96. 97.  
*Culex* 1890-1894.  
*Culex* 1760. 1771. 1890. 1892.  
 1895. 1896. 1918.  
*Culicæ in Populo nigra* 998.

- Culum marinum* 2104.  
*Cuniculus* 26.  
*Curculio* 579-637.  
*Curculio* 581-583. 585. 587-  
  589. 602-605. 608. 609. 612.  
  615. 623. 624. 629. 635. 638.  
  641.  
*Curruca* 145. 247.  
*Cyclopterus* 320.  
*Cyclopterus* 320.  
*Cyclus* 107.  
*Cygnus* 107.  
*Cynips* 1518-1532.  
*Cyprinus* 359-374.  
*Cyprinus* 359-369. 371-374.
- Dama* 42.  
*Delphinus* 51. 52.  
*Dendrofalco* 59.  
*Dentale* 2201.  
*Dentales* 2201.  
*Dentalium* 2201.  
*Dentalium* 2201. 2204. 2206.  
  2207.  
*Dermestes* 408-439.  
*Dermestes* 408. 411. 414. 418.  
  424. 426. 440. 445. 446. 455.  
*Donax* 2142.  
*Dorcas* 43.  
*Draco* 305.  
*Dreparus* 273.  
*Dytiscus* 764-779.  
*Dytiscus* 764. 766. 768. 772.
- Echinus* 2116-2118.  
*Echinus* 22. 2116. 2117.  
*Eglefinus* 306.  
*Elater* 723. 745.  
*Elater* 723. 724. 727. 731-734.  
  740. 741. 743.  
*Emberiza* 227-231.  
*Emberiza* 228. 230.  
*Empis* 1895-1899.  
*Entomon pyramidale* 2055.
- Eperlanus* 350.  
*Ephemera* 1472-1480.  
*Ephemera* 1473. 1476.  
*Epos* 105.  
*Equus* 47.  
*Eritaceus* 22.  
*Eruca* 1031. 1034-1036. 1057-  
  1059. 1087. 1099. 1112. 1114.  
  1117-1120. 1131. 1155. 1181.  
  1230. 1248. 1261. 1293. 1534-  
  2099.  
*Esox* 355. 356.  
*Esox* 355. 356.
- Falco* 54-68.  
*Falco* 53. 63. 64. 68.  
*Fasciola* 2075-2077.  
*Felis* 9-11.  
*Felis* 9-10.  
*Fiber* 27.  
*Ficedula* 248. 251.  
*Flustra* 2231-2233.  
*Folliculi Populi* n. 998.  
*Forficula* 860. 861.  
*Forficula* 839. 841-844. 853.  
  858. 860. 861.  
*Formica* 1720-1726.  
*Formica* 1720-1723. 1725.  
*Formica-leo* 1509.  
*Fratercula* 141.  
*Fringilla* 232-243.  
*Fringilla* 227. 231-233.  
*Fringillago* 265.  
*Fringillarius* 68.  
*Fucus* 1697.  
*Fulica* 193.  
*Fulica* 193.  
*Fuligula* 111.  
*Fullo* 394.  
*Furia* 2070.
- Gadus* 306-315.  
*Gadus* 306. 311.  
*Galens* 295. 296.

*Gallina*

- Gallina* 198. 199. 204.  
*Gallinæ* 180.  
*Gallinago* 173.  
*Gallinula* 180. 182. 184. 185.  
*Gallopavo* 198.  
*Gallus* 199.  
*Gambetta* 177.  
*Gammarus* 2034.  
*Garrulus* 82. 94.  
*Gasterosteus* 336. 338.  
*Genus Galei* 294.  
*Geometra* 1171. 1261.  
*Gladius* 303.  
*Glaniis* 344.  
*Glancion* 123.  
*Glancium* 123.  
*Glires* 33.  
*Globor-animal* 2266.  
*Glottis* 171.  
*Gobio* 322.  
*Gobius* 322.  
*Gordius* 2068. 2069.  
*Gordius* 2068.  
*Gorgonia* 2222-2224.  
*Graculus* 146.  
*Granum Zschinbitz* 1023.  
*Griflagine* 367.  
*Grus* 161.  
*Grygallus* 200. 202.  
*Grylli* 862.  
*Gryllo-talpa* 866.  
*Gryllus* 864-878.  
*Gryllus* 862. 864-867. 870. 872.  
   876. 886. 896. 898.  
*Gulo* 14.  
*Gyrfalco* 64.  
*Gyrinus* 429. 536. 543. 544.  
  
**H***æmatopus* 192.  
   *Hæmatopus* 192.  
*Haliotus* 63.  
*Haliotis* 2198.  
*Haliotis* 2198.  
*Harengus* 357.  
  
*Hedera* 1520.  
*Helix* 2174-2193.  
*Hemerobius* 1504-1515.  
*Hemerobius* 1483. 1489. 1509.  
   1513.  
*Hermellanus* 17.  
*Hieracium* 1519.  
*Hinnulus* 40.  
*Hippelaphus* 41.  
*Hippobosca* 1921-1924.  
*Hippobosca* 1921. 1923.  
*Hippoglossus* 329.  
*Hippolais* 247.  
*Hircus* 44.  
*Hirudo* 2078-2085.  
*Hirudo* 2075. 2078. 2080. 2082-  
   2084.  
*Hirudo-limax* 2075.  
*Hirundinis &c.* 150.  
*Hirundo* 270-273.  
*Hirundo* 158. 159. 270-273.  
   340.  
*Hister* 440-443.  
*Homo* 1.  
*Hoopoe* 193.  
*Hortulanus* 229. 230.  
*Hortulana* 229.  
*Hydra* 2256-2259.  
*Hydrocantharus* 769. 771-773.  
  
**I***Chneumon* 1578-1647.  
   *Ichneumon* 1518. 1521. 1528.  
   1537. 1555. 1557. 1572. 1573.  
   1575. 1580. 1581. 1589. 1590.  
   1593. 1595. 1596. 1602. 1608.  
   1609. 1611. 1613. 1616. 1621.  
   1623. 1624. 1626. 1628-1632.  
   1635. 1643. 1645. 1646. 1651.  
   1908.  
*Insectum* 970. 1011.  
*Isatis* 8.  
*Isis* 2220. 2221.  
*Julus* 2066-2068.  
*Julo adfinis* 2067.

- Fulus* 2066.  
*Fauferties* 1471.  
*Jynx* 97.  
*Jynx* 97.
- K* *Aktor* 27.  
*Kernell* 128.  
*Knavel* 1023.
- L** *Abrus* 330. 331.  
*Lacerta* 281-284.  
*Lacerta* 281-284.  
*Lacertus* 282-284.  
*Lugopus* 203.  
*Lampetra* 290. 292.  
*Eunpyris* 863.  
*Linarius* 61. 80. 81.  
*Lanius* 80-84.  
*Lanius* 80. 81. 84.  
*Lipouing* 176.  
*Larus* 153-157.  
*Larus* 144. 153. 155. 157. 158.  
*Larva* 2043.  
*Lavarens* 352.  
*Lemming* 29.  
*Lemmus* 29.  
*Leopardus* 1097.  
*Lepas* 2120-2123.  
*Lepas* 2120.  
*Lepisma* 1925. 1926.  
*Leptura* 677-698.  
*Leptura* 648. 649. 677. 678.  
 682. 635. 637. 689. 695. 698.  
*Lepus* 25. 26.  
*Lepus* 25. 320.  
*Lernæa* 2100-2103.  
*Lernæa* 2100. 2101.  
*Leucoradiis* 160.  
*Libairix* 1143.  
*Libella* 1459-1464. 1466. 1467.  
 1469. 1471.  
*Liberula* 1459-1471.  
*Libellula* 1459. 1464. 1466.  
 1467. 1469. 1471.
- Ligurinus* 237.  
*Limax* 2088. 2094.  
*Limax* 2975. 2088-2092.  
*Limosa* 171.  
*Linaria* 240. 241.  
*Lithoxylon* 2222. 2224. 2225.  
*Locusta* 864. 869. 870. 872. 874.  
*Locusta-pulex* 881. 886. 887.  
*Loligo* 2107.  
*Loligo-sepia* 2106.  
*Lophius* 298.  
*Lophius* 298.  
*Lota* 315.  
*Loxia* 222-226.  
*Loxia* 224.  
*Lubricipeda* 1138.  
*Lucioletta* 2098.  
*Lucio-perca* 334.  
*Lucius* 355.  
*Lumbe* 149.  
*Lumbricus* 2073-2074.  
*Lumbricus* 2073. 2074.  
*Lumpus* 320.  
*Lunda* 141.  
*Lupus* 6.  
*Luscinia* 244.  
*Luteæ alterum genus* 230.  
*Lutra* 12.  
*Lynx* 10. 11.  
*Lyra* 304.
- M** *Madreporea* 2209-2216.  
*Maja* 1231.  
*Mallemucke* 144.  
*Martes* 15.  
*Medusa* 2108-2110.  
*Medusa* 2109.  
*Meervyrm* 2068.  
*Meleagris* 198.  
*Meleagris* 198.  
*Meles* 20.  
*Meloe* 826-830.  
*Blembreas* 357.  
*Merganser* 135.

Mer-

- Mergus* 135-138.  
*Mergus* 135-138. 150.  
*Merula* 93. 214. 219-221.  
*Meticulosa* 1164.  
*Millepeda* 2058.  
*Millepes* 2058.  
*Millepora* 2217.  
*Millepora* 2232.  
*Milvus* 57. 66.  
*Molva* 308.  
*Monedula* 89.  
*Monoceros* 48. 378.  
*Monoculus* 2044-2051.  
*Monoculus* 2046.  
*Monodon* 48.  
*Montifringilla* 227. 233.  
*Mordella* 831-836.  
*Mordella* 427. 536. 540. 541.  
 543. 544. 815-817. 832. 911.  
*Morinellus* 178. 188.  
*Morphnos* 63.  
*Morrhua* 308.  
*Moschetus* 68.  
*Moscovian* 200.  
*Motacilla* 244-264.  
*Motacilla* 182. 214. 252. 253.  
 259.  
*Mouche a Coffon* 1645.  
*Muræna* 301.  
*Mures* 34.  
*Murex* 2165. 2166.  
*Mus* 29-36.  
*Mus* 24. 28. 29. 31-36. 2099.  
*Musca* 1779-1881.  
*Musca* 939. 942. 1489. 1490.  
 1504. 1505. 1516. 1608. 1626.  
 1646. 1730. 1767. 1768. 1770.  
 1780. 1784. 1788. 1793. 1797.  
 1799. 1805. 1816-1823. 1826-  
 1829. 1831-1834. 1837. 1841.  
 1842. 1844. 1848. 1850. 1853.  
 1858. 1861. 1863-1867. 1869.  
 1872. 1874. 1876. 1878. 1880.  
 1888. 1894. 1908. 1918. 1921.
- Muscicapa* 255.  
*Musculus* 2129. 2130. 2138.  
 2156. 2158.  
*Mustela* 14-18.  
*Mustela* 15-17. 315.  
*Mustelus* 295.  
*Mutilla* 1727-1729.  
*Mutuiti* 187.  
*Mya* 2126-2130.  
*Mytilus* 2156-2158.  
*Mytili* 2156.  
*Mytilus* 2156.  
*Myxine* 2086.
- N**  
*Atrix* 288.  
*Necydalis* 337. 838.  
*Necydalis* 638. 659. 713. 837.  
*Nepa* 906-908.  
*Nepa* 906.  
*Nereis* 2095-2098.  
*Nereis* 2095.  
*Nerita* 2194-2197.  
*Nerita* 2194. 2195.  
*Neustria* 1102.  
*Noctiluca* 699. 2098.  
*Noctua* 74. 76. 79. 1167.  
*Notonecta* 903. 905.  
*Notonecta* 904. 905.  
*Notopeda* 741. 743.  
*Numenius* 168. 170-173.  
*Nummulus brattensb.* 2150.  
*Nummus* 2150.
- O**  
*Ocrophus* 180.  
*Oculus pavonis* 1048.  
*Oenanthe* 254. 255.  
*Oenas* 207. 208.  
*Oestrum* 1731. 1732. 1909.  
*Oestrus* 1730-1734.  
*Oestrus* 1730-1734. 1780.  
*Oniscus* 2052-2062.  
*Oniscus* 2055. 2058. 2059. 2061.  
 2063.  
*Onos* 306.

- Ophidion* 319.  
*Ophidion* 319.  
*Orca* 5.  
*Orygometra* 194.  
*Osmerus* 350.  
*Ostrea* 2148. 2149.  
*Ostrea* 2149.  
*Ostreum* 2149.  
*Otis* 196.  
*Otus* 71.  
*Ova infecti incogniti* 1023. 1024.  
*Ovis* 45.  
*Ovis* 45.  
  
*P**Agarus* 2028. 2030.  
*Palumbus* 208.  
*Panorpa* 1516.  
*Papilionoides* 1097.  
*Papilio* 1031-1082.  
*Papilio* 1031-1039. 1041-1044.  
 1047 1052. 1054-1060. 1063-  
 1065. 1068-1070. 1074. 1075.  
 1077 1081. 1091. 1093. 1097.  
 1098. 1120. 1129. 1135. 1138.  
 1143. 1147. 1155. 1167. 1171.  
 1248. 1263. 1268. 1274. 1277.  
 1299. 1303. 1307. 1314. 1352.  
 1353. 1361. 1363. 1370. 1402.  
*Papiliunculus* 1044. 1074. 1081.  
*Parus* 265 269.  
*Parus* 83. 84. 262. 265-269.  
*Passer* 227. 231. 242. 243. 261.  
 327-329.  
*Passerculus* 262.  
*Patella* 2199. 2200.  
*Patella* 2151. 2198-2200.  
*Pavo* 197.  
*Pavo* 197.  
*Pecken* 2148.  
*Pedunculus* 2139. 2141.  
*Pedicudo cognatus* 1937.  
*Pediculus* 1939-1964.  
*Pediculus* 975. 984. 1015. 1936.  
 1937. 1939. 1940. 1949. 1951.  
 1954. 1958. 1960. 1962. 1966.  
 1967. 1983. 2056. 2102.  
*Pelecanus* 145-147.  
*Pelecanus* 145. 160.  
*Penelope* 124.  
*Penguin* 140.  
*Pennatula* 2260. 2261.  
*Pennatula* 2260.  
*Penna marina* 2260.  
*Pérca* 332-335.  
*Perca* 332-335.  
*Perdix* 203. 205.  
*Perla* 1504.  
*Petrel* 143.  
*Petromyzon* 290-292.  
*Phalangium* 1992.  
*Phalæna* 1032. 1060. 1079. 1083.  
 1084. 1086-1089. 1094. 1097-  
 1100. 1103. 1104. 1106. 1111.  
 1112. 1114. 1117-1121. 1127.  
 1129. 1131-1133. 1135. 1137.  
 1138. 1140-1143. 1147. 1152-  
 1156. 1161. 1164. 1167. 1169-  
 1172. 1175. 1181. 1188. 1190.  
 1192-1194. 1197. 1198. 1203.  
 1209. 1225. 1226. 1228. 1230.  
 1232-1234. 1236-1246. 1248.  
 1250. 1253. 1255. 1256. 1258-  
 1261. 1263. 1266-1279. 1281.  
 1283-1289. 1291. 1293-1301.  
 1303. 1305-1307. 1309. 1311-  
 1314. 1316-1319. 1321. 1323-  
 1325. 1328-1330. 1334-1337.  
 1341. 1344-1350. 1352. 1353.  
 1358-1363. 1365. 1366. 1368.  
 1369. 1370. 1372-1375. 1377.  
 1381. 1382. 1388. 1390-1393.  
 1399. 1401-1406. 1408-1410.  
 1414-1416. 1419. 1426. 1427.  
 1430. 1434. 1440. 1450.  
*Phæopus* 169.  
*Phasca* 129.  
*Phasianus* 199.  
*Philopson* 1171.  
*Phoca* 4.  
  
*Phoca*

*Phoca* 4.  
*Phocæna* 51.  
*Pholas* 2124. 2125.  
*Pholas* 2124.  
*Phryganea* 1481-1503  
*Phryganea* 1481. 1513.  
*Phyjis* 363.  
*Phygalis* 50.  
*Physapus* 1027. 1029.  
*Physeter* 50.  
*Pica* 82. 90. 92. 141. 192.  
*Picea* 1011.  
*Picus* 98-103.  
*Picus* 98-104.  
*Pied Chaffinch* 227.  
*Pilularius* 388.  
*Pisciculus* 336. 337.  
*Piscis* 302. 305. 337. 365. 377.  
*Planorbis* 2174. 2176.  
*Platalea* 160.  
*Platea* 160.  
*Platea* 328.  
*Platina* 160.  
*Pleuronechtes* 325-329.  
*Pleuronectes* 326-328.  
*Pluvialis* 171. 186. 189. 190.  
*Podura* 1927-1936.  
*Podura* 1930-1932. 1934.  
*Polygonum coccif.* 1023.  
*Polypus* 2219. 2221. 2262.  
*Pomaria* 2183.  
*Populi n. vermes* 998.  
*Priapus* 2103-2105.  
*Pristis* 297.  
*Proboscis elephantis* 1817.  
*Procellaria* 143. 144.  
*Procul spectabilis* 1129.  
*Proscarabaeus* 826.  
*Pulex* 1965.  
*Pulex* 779. 902. 1927. 1950.  
 1954. 1960. 1965. 1970. 2041.  
 2046.  
*Pulmo marinus* 2108.  
*Pulmonaria* 1519.

*Pungitius* 336.  
*Pungitii alt. genus* 337.  
*Puphinus* 141.  
*Purpura* 2179.  
*Putorius* 16.  
*Pygargus* 55.  
*Pyrrhula* 225.

**Q**uerquedula 128. 129. 132.  
**Q**uadrupes volat. *Russie*  
 38.

**R**aja 293.  
*Raja* 293.  
*Rallus* 194. 195.  
*Rallus* 195.  
*Raua* 275-280.  
*Rana* 275. 277-280. 298.  
*Ranatra* 879. 881. 889.  
*Ranunculus* 280.  
*Rangifer* 41.  
*Raphidia* 1517.  
*Raphidia* 1517.  
*Razorbill* 150.  
*Recurvirostra* 191.  
*Recurvirostra* 174. 191.  
*Reduvius* 1966.  
*Regina omnium* 1048.  
*Regulus* 262. 264.  
*Reptatrix* 106.  
*Rhodopus* 180.  
*Rhombus* 325.  
*Ricinus* 1921. 1967.  
*Rootang* 366.  
*Rubecula* 260.  
*Rubeculus* 260.  
*Rubetra* 255.  
*Rubicella* 223.  
*Rubicilla* 225.  
*Rusticola* 170.  
*Ruticilla* 257. 259.  
*Rutilus* 372.

- Salamandra* 281.  
*Salar* 348.  
*Salicaria* 249.  
*Salix capr. latif.* 1129.  
*Salmo* 345-354.  
*Salmo* 345-347.  
*Sandilz* 302.  
*Scarabælaphus* 405.  
*Scarabæus* 378-407.  
*Scarabæus* 368. 379. 381. 384-  
  386. 388. 389. 391-394. 400.  
  405. 406. 408. 418. 426. 429.  
  435. 444. 446. 450. 452. 455.  
  467. 468. 471. 475. 477. 490.  
  492. 500. 511. 531. 536. 567.  
  585. 587. 589. 603. 605. 623.  
  631. 641. 644. 652. 653. 672.  
  677. 681. 695. 697. 699. 700.  
  704. 708. 727. 741. 743. 746.  
  749. 768. 779. 784. 785. 787.  
  822. 826. 841. 843. 860. 862. 945.  
*Scilus* 334.  
*Schoenobænus* 246.  
*Sciurus* 37. 38.  
*Sciurus* 37. 38.  
*Scolopax* 167-174  
*Scolopax* 170. 173. 174.  
*Scolopendra* 2063-2065.  
*Scolopendra* 2046. 2064-2066.  
  1098.  
*Scolopendræ* 2065.  
*Scomber* 339.  
*Scombea* 339.  
*Scombrus* 339.  
*Scorpænæ* 323.  
*Scorpio* 323. 906.  
*Scorpiones* 906.  
*Scorpio-araneus* 1968.  
*Scorpio-musca* 1516.  
*Scorpius* 223.  
*Scrofa* 21.  
*Sepa* 2106-2107.  
*Sepia* 2106.  
*Serpens* 288.  
*Serpula* 2202-2208.  
*Serra marina* 297.  
*Sertularia* 2239-2255.  
*Sertularia* 2220.  
*Seta* 2068.  
*Silurus* 344.  
*Silurus* 315. 344.  
*Silpha* 444-466.  
*Silpha* 453.  
*Sirex* 1573-1577.  
*Sitta* 104.  
*Sitta* 104.  
*Smaragdulus* 400.  
*Solea* 326.  
*Solen* 2131.  
*Somnolentus* 1248.  
*Sorex* 24.  
*Sphex* 1648-1664.  
*Sphinx* 1083-1098.  
*Sphinx* 1087.  
*Sphondyla* 1114.  
*Spinus* 237.  
*Spirinchus* 350.  
*Spithometra* 1261.  
*Spoonbill* 160.  
*Spratti* 358.  
*Squalus* 295-297.  
*Squilla* 2037.  
*Staphylinus* 839-859.  
*Staphylinus* 841. 843. 854.  
*Stella* 2111. 2113.  
*Sterna* 153. 159.  
*Sterna* 156. 158. 159.  
*Strix* 69-79.  
*Strix* 73. 77. 247.  
*Strombus* 2164.  
*Strumula Cham.* 1520.  
*Struntjager* 156.  
*Sturio* 299. 300.  
*Sturnus* 213. 214.  
*Sturnus* 213.  
*Subbuteo* 59.  
*Sus* 21.  
*Syngnathus* 375-377.

*Syn-*

- Syngnathus* 375-377.  
**T**abanus 1882-1889.  
*Tabanus* 1780. 1882. 1884<sup>a</sup>.  
 1888.  
*Tadorna* 113.  
*Tænia* 2262-2265.  
*Tænia* 342. 2076. 2262. 2264.  
*Talpa* 23.  
*Talpa* 866.  
*Tarandus* 41.  
*Taraxacum* 1119.  
*Taurus volans* 405.  
*Taxus* 20.  
*Tellina* 2132-2138.  
*Tellina* 2142.  
*Tenebrio* 815-825.  
*Tenebrio* 822. 825. 829.  
*Tenthredo* 1533-1572.  
*Tenthredo* 1518-1521. 1525.  
 1528. 1532. 1534. 1537. 1544.  
 1546. 1548. 1549. 1555. 1561.  
 1572-1574. 1634. 1639. 1655.  
*Teredo* 2087.  
*Teredo navalis* 2087.  
*Termes* 1937. 1938.  
*Terribilis* 1230.  
*Testudo viridis* 467.  
*Tetrao* 200-206.  
*Tetrao* 200. 202.  
*The godwall or gray* 121.  
*The grev* 346.  
*Thrips* 1027-1030.  
*Thymallus* 354.  
*Thymus* 354.  
*Tinca* 363.  
*Tinea* 1414.  
*Tinnunculus* 61.  
*Tipula* 1735-1778.  
*Tipula* 971. 1738-1742. 1744.  
 1746. 1751. 1759. 1760. 1763.  
 1891. 1896.  
*Tobianus* 302.  
*Tollmerus* 1504.  
*Torquilla* 97.
- Totanus* 167.  
*Trachinus* 305.  
*Trachinus* 304. 305.  
*Tragelaphus* 41.  
*Trapazorola* 152.  
*Trichas* 215.  
*Trigla* 340.  
*Trigla* 340.  
*Tringa* 175-186.  
*Tringa* 167. 179. 180. 182-184.  
 186.  
*Triscus* 315.  
*Trochus* 2167. 2168.  
*Trochus* 2168.  
*Trutta* 347. 348.  
*Tubipora* 2218. 2219.  
*Tubularia* 2229-2230.  
*Tubulus* 2201.  
*Turbitæ* 207.  
*Turbo* 2169-2173.  
*Turbo* 2188.  
*Turdus* 215-221.  
*Turdus* 93. 214-218. 221.  
*Tursio* 51.  
*Typhle* 376.  
*Typhlos* 239..
- V**anellus 176.  
*Veau marin* 4.  
*Ventriones* 975.  
*Venus* 2143-2146.  
*Vermes* 1733. 2046.  
*Vermiculi* 1646.  
*Vermiculus casei* 1850.  
*Vermis* 881. 1008. 1730. 2041.  
 2099.  
*Vespa* 1670-1683.  
*Vespa* 1608. 1624. 1628. 1629.  
 1651. 1665. 1671. 1679. 1705.  
 1908.  
*Vespertilio* 2. 3.  
*Vespertilio* 2.  
*Vinula* 1112.  
*Vipera* 286. 287.

*Vitulus* 4. 2068.  
*Viverra* 12. 13.  
*Volvox* 2266.  
*Ulula* 75. 78.  
*Umbra* 349.  
*Unicornu* 48.  
*Upupa* 105.  
*Upupa* 105.  
*Urogallus* 200. 202.  
*Ursus* 19. 20.  
*Ursus* 19. 1131.  
*Urtica marina* 2109.

*Vulpanser* 113.  
*Vulpes* 7. 8.  
**W** *littera* 1248.  
*Wormils* 1730.  
*Water wagtail* 252.  
*Wegflecklin* 259.  
*Wydengyckerlin* 259.

**X** *Iphias* 303.  
*Xiphias* 303.



# INDEX

## NOMINUM SVECORUM

A bborre 332.  
Ahlfogel 126.  
Ahltita 83.  
Alaipg 227.  
Aler 126.  
Alfit 191.  
Alkufva 374.  
Alkuta 374.  
Alvargrim 189.  
Anka 131.  
Ard 135.  
Asp 361.

B ack-svala 273.  
Beccalin 182.  
Benunge 337.  
Bergsnyltra 330.  
Bi 1697.  
Binnikemasken 2263.  
Ejur 27.  
Björka 371.  
Blörktraßt 216.  
Björn 19.  
Björn-Myra 1720. 1721.  
Blicka 365.  
Blickta 353.  
Blindknagg 1888.  
Blodhund 5.  
Blodigel 2080.  
Bläfot 63.  
Bläkråka 94.  
Blälus 1947.  
Blåmees 267.  
Blänacke 131.  
Blåsklacka 193.  
Blästål 331.  
Bläcka 176.  
Bläckfisk 2107.  
Bofinck 232.  
Bolgeting 1670.

Bolk 311.  
Borre 2116.  
Bose 287.  
Botnmus 324.  
Brandgås 113.  
Brandråf 7.  
Braxen 390.  
Braxenflicka 365.  
Braxeninygg 970.  
Braxenpanka 365.  
Brennvabel 2109.  
Brunnacke 123.  
Brushane 175.  
Bråfrö 1979.  
Bröms 1882.  
Brömskula 1730.  
Budd 374.  
Butta 325.  
Båfver 27.  
Bårfis 928.  
Börting 347.

C Abbliau 308.  
Carusfa 364.  
Cheruna 203.  
Curbma 1731.

D Aggmask 2073.  
Dof 42.  
Dofhort 42.  
Domherre 225.  
Dopping 122.  
Dracan 862.  
Dufva 207.  
Dvärg 2000.  
Dåfman.

E Ider 117.  
Ekoxe 405.  
Elof 156.

En-

Engelsk Dogg 5.  
 Entita 269.  
 Ettermyra 1725.  
  
**F** Alk 58.  
 Faren 369.  
 Festing 1966.  
 Filfræs 14.  
 Finke 232.  
 Finnfisk 50.  
 Fjörna 152.  
 Fiskórn 63.  
 Fjällgås 116.  
 Fjällimus 29.  
 Fjällracka 8.  
 Fjássing 305.  
 Flatlus. 1940.  
 Flott 1967.  
 Fluga 1833.  
 Flundra 327.  
 Flädermus 2.  
 Fogelhund 5.  
 Forell 348.  
 Fró 278.  
 Fyrfot 284.  
 Får 45.  
 Fårsing 305.  
 Fönster-spindel 2000.  
  
**G** Addsur 337.  
**G** Gallápgle 1521.  
 Geecka 96.  
 Get 44.  
 Geting 1671.  
 Gjers 335.  
 Gjædda 355.  
 Gjök 96.  
 Gjóktyta 97.  
 Gjós 334.  
 Glada 57.  
 Gli 374.  
 Glirr 374.  
 Glirren 374.  
 Glatt 171.  
 Golspink 239.

Gorquadd 337.  
 Groda 278.  
 Grufgrabbe 281.  
 Grundel 341.  
 Grundskorffva 2055.  
 Grylle 187.  
 Grälax 346.  
 Grälik 309.  
 Gråliska 241.  
 Gråskinn 37.  
 Gräsparf 242.  
 Gräsuggor 2058.  
 Grässvin 20.  
 Gråsand 131.  
 Gröngjöling 99.  
 Gröning 230.  
 Grönlands Hvalfisk 49.  
 Gröning 341.  
 Gröniska 237.  
 Grönspik 99.  
 Gudunge 117.  
 Guldsmed 400.  
 Gumphöns 199.  
 Gyllenrenna 100.  
 Gás 114.

**H** Afsnål 375.  
**H** Haffsjáder 145.  
 Haf-s-Órn 55.  
 Haj 295.  
 Hampspíkk 242.  
 Hare 25.  
 Harfäng 76.  
 Harkrank 1741.  
 Harr 354.  
 Helsingegås 116.  
 Hemdufva 207.  
 Hermein 17.  
 Hjort. 40.  
 Hjátpe 204.  
 Homáka 153.  
 Horntisk 336.  
 Horngjáll 356.  
 Hornoxe 405.  
 Hornsimpa 321.

Horn-

- Horntroll 405.  
 Hornuggla 71.  
 Horsgjök 173.  
 Huggorm 286.  
 Hummer 2033.  
 Hund 5.  
 Hutt 190.  
 Huttich 189.  
 Husvala 271.  
 Hvassbuk 358.  
 Hvitling 310.  
 Hyss 306.  
 Hårdvårsfogel 227.  
 Håger 165.  
 Hålgflundra 329.  
 Hämpling 240.  
 Härfogel 105.  
 Håst 47.  
 Håstfluga 1921.  
 Håstmyra 1720.  
 Höna 199.  
 Höns 199.  
 Hönstjuf 66.  
  
**I** Agthund 5.  
 Ickorn 37.  
 Id 361.  
 Igelkott 22.  
 Iggling 374.  
 Iller 16.  
 Illvårsfogel 227.  
 Jordbi 1700.  
 Jordhumbla 1709.  
 Isarf 366.  
 Ispjärna 252.  
 Jugás 113.  
 Jungfru Mar. Höna 477,  
 Järf 14.  
 Järnsparf 245.  
  
**K** Aja 89.  
 Kalkon 198.  
 Kanin 26.  
 Kantnål 376.  
 Karp 359.
- Katta 9.  
 Kattlo 11.  
 Kikbår 1774.  
 Kjågelrifvare 224.  
 Kjörfogel 135.  
 Klera 218.  
 Kläckgroda 277.  
 Klåmask 1975.  
 Kläffa 278.  
 Klådra 218.  
 Knipa 122. 135.  
 Knoding 340.  
 Knorrhane 340.  
 Knot 340.  
 Knott 1893.  
 Knåhund 5.  
 Ko 46.  
 Kolja 306.  
 Koltrålt 220.  
 Kongsfogel 262.  
 Kopparorm 289.  
 Kornknattr 194.  
 Kornlárka 228.  
 Kornskrika 90.  
 Korp 85.  
 Korsfisk 2111.  
 Korsnáf 224.  
 Korsráf 7.  
 Korsstroll 2111.  
 Kovipa 176.  
 Krabba 2026.  
 Kramsfogel 215.  
 Kranck 1890.  
 Krollhöna 199.  
 Kronhjort 40.  
 Kropfdufva 207.  
 Kruka 247.  
 Krypare 106.  
 Krypkung 2032.  
 Kråka 88.  
 Kräcka 129.  
 Kráfveta 2034.  
 Kupunge 2169.  
 Kyrkofalk 61.

**L** Abben 156.  
**L** Ladusvala 270.  
**Lahul** 188.  
**Lake** 315.  
**Lappskata** 93.  
**Lax** 345.  
**Laxóring** 348.  
**Lekatt** 17.  
**Linnare** 363.  
**Linál** 291.  
**Lomm** 150.  
**Loppa** 1965.  
**Lummick** 29.  
**Lunda** 141.  
**Lus** 1939.  
**Lyrblek** 312.  
**Lysmask** 699.  
**Läcke** 1992. 2000.  
**Långa** 313.  
**Läderlapp** 2.  
**Lárka** 209.  
**Lója** 373.  
**Lópare** 52.

**M** Al 344. 411. 275.  
**Makrill** 339.  
**Manet** 2109.  
**Marspit** 192.  
**Marsvin** 51.  
**Mask på Sáden** 2091.  
**Mave** 153.  
**Mesar** 250.  
**Meshatt** 266.  
**Metmask** 2073.  
**Mockere** 1893.  
**Moiku** 353.  
**Molle** 31.  
**Mops** 5.  
**Morkulla** 170.  
**Mosshumbla** 114.  
**Mudd** 374.  
**Mullvad** 23.  
**Musla** 2158.  
**Mus** 34.

Mygg 1890.  
**Myror** 1720 - 1726.  
**Myrpytta** 189.  
**Márd** 15.  
**Mánk** 13.  
**Márta** 2041.  
**Mómus** 1709.  
**Mórt** 372.

**N** Akenhund 5.  
**Nattblacka** 2.  
**Nattskjärta** 274.  
**Nattskräfva** 274.  
**Nattvaka** 223.  
**Nejnóga** 290.  
**Nosinasken** 1734.  
**Norrquint** 233.  
**Nors** 350.  
**Nyckelpiga** 477.  
**Nábbgjädda** 356.  
**Nábbmus** 24.  
**Náktergal** 244.  
**Nátting** 290.  
**Nót.** 46.  
**Nótkraka** 91.  
**Nótpacka** 104.  
**Nótväcka** 91. 104.

**O** Densvala 163.

Olycksfogel 93.  
**Onda Betet** 2068.  
**Orkom** 1774.  
**Ormslä** 289.  
**Orre** 202.  
**Ostra** 2149.

**P** Adda 275.

Pago 187.  
**Pelekan** 160.  
**Pingborre** 393.  
**Pinulka** 323.  
**Pissmyror** 1721.  
**Polsa** 1748.  
**Popp** 105.

Pracka 136.  
Prutgås 115.  
Putål 2086.  
Påfogel 197.  
Pårlemusla 2130.

**Q** Vabbsu 320.  
Qvalster 1978.  
Qvidd 374.  
Qvidfogel 60.  
Qvällknarren 274.

**R** Acklehan 201.  
Rapphóna 205.  
Raud 349.  
Rhen 41.  
Ringdufva 208.  
Ringorm 288.  
Ringsvala 272.  
Riska 239.  
Roka 87.  
Roslare 201.  
Rotgans 115.  
Rotgel 269.  
Rotta 33.  
Ruda 364.  
Råcka 293.  
Rådjur 43.  
Råf 7.  
Råka 2037.  
Rödgjöter 1725.  
Röding 349.  
Rödlus 1946.  
Rödstjert 257.  
Rödtjuxa 93.  
Rördrum 164.  
Rötimp 323.

**S** Abelmus 29.  
Sandhare 2041.  
Sandpiller 1509.  
Sarf 366.  
Segdreitver 194.  
Seij 309.

Siberisk gås 108.  
Sidensvants 82.  
Sik 352.  
Siklöja 353.  
Sill 357.  
Siska 237.  
Sjuryggfisk 320.  
Sjutut 208.  
Sjál 4.  
Sjöfärka 227.  
Sjömusla 2158.  
Sjöstjerna 2111.  
Skata 92.  
Skjura 92.  
Skjálryta 323.  
Skjárfäck 191.  
Skjärknif 370.  
Skogsdufva 207.  
Skogsknetter 250.  
Skogsnigel 2088.  
Skomakare 363.  
Skrabba 323.  
Skraka 135.  
Skräftabborre 281.  
Skrikuggla 77.  
Skrobb 822.  
Skrotabborre 281.  
Skränlom 152.  
Skälla 328.  
Skára 92.  
Slaggimp 322.  
Slaghök 65.  
Slom 350.  
Slättskädd 327.  
Smed 340.  
Småmyror 1723.  
Sma Sik 353.  
Sma Totsk 311.  
Snigel 2078.  
Snok 188.  
Snorgjers 335.  
Snåppa 182.  
Snöloppa 1931.  
Snömus 18.

- Snöripa 203.  
 Snöskata 215.  
 Snösparf 227.  
 Snötuppa 82.  
 Sola 326.  
 Solsenfödg 374.  
 Spank Kråka 94.  
 Sparfhök 68.  
 Spigg 336.  
 Spillkråka 98.  
 Spof 169.  
 Spyfluga 1831.  
 Stäckmyra 1721.  
 Stare 213.  
 Stenbit 320 348.  
 Stenhumla 1712.  
 Stenkäck 222.  
 Stensimpa 322.  
 Stensqvätta 254.  
 Sterlett 300.  
 Stiglitsa 236.  
 Stringfluga 1900.  
 Stint 353.  
 Stork 162.  
 Stormvåders-fogel 143.  
 Stor-Sik 352.  
 Strandpipare 187.  
 Strandskjara 192.  
 Strand-svala 273.  
 Straule 153.  
 Ströming 357.  
 Stugo-fluga 1833.  
 Styng 1730.  
 Stäm 367.  
 Stör 299.  
 Surk 23.  
 Sutare 363.  
 Svan 107.  
 Svarilasse 156.  
 Svartmyra 1722.  
 Svenska 226  
 Svensk Papgoja. 223.  
 Sverdfisk 303.  
 Svidknott 1892.
- Svin 21.  
 Svärta 109.  
 Syrmask 2055.  
 Syrsa 867.  
 Sågfisk 297.  
 Sådes - Pompa 277.  
 Sådesärla 252. 253.  
 Sädgjök 97.  
 Säffsparf 231.  
 Sömntorn 1518.
- T** Algoxe 265.  
 Tallbit 223.  
 Tall - Trast 218.  
 Tangsnipa 375.  
 Tichuri 13.  
 Tillkråka 98.  
 Timmerman 653.  
 Tjockfjälling 362.  
 Tjáder 200.  
 Tobis 302.  
 Tofshöns 199.  
 Tofsmyssa 266.  
 Tofstita 266.  
 Toile 98.  
 Tolk 178.  
 Tomlinge 269.  
 Tomtorm 288.  
 Torbagge 388.  
 Tord 139.  
 Torndyfvel 388.  
 Torraka 862.  
 Torsk 307.  
 Trana 161.  
 Trast 220.  
 Trompe 1732.  
 Trulls 187.  
 Trágårds - snåcka 2183.  
 Tumlare 51.  
 Tunga 326.  
 Tupp 199.  
 Turkisk Gås 108.  
 Tveitjert 860. 2064.  
 Tånglacke 317. 342.

Tåffa

Täffa 275.  
Tårna 158.  
Tätting 242.  
Uer 333.  
Ul 69.  
Uff 6.  
Ulka 323.  
Utter 12.

**W**Aktel 206.  
Warfogel 80.  
Warg 6.  
Warglo 10.  
Wattenbagge 779.  
Wattenstare 214.  
Wedknarr 99.  
Wesla 17.  
Wespa 1671.  
Widding 310.  
Wigge 132.  
Willivin 21.  
Wimba 368.  
Wimma 351.  
Windspole 169.  
Winterrand 125.  
Winthund 5.  
Wipa 176.

Woodcock 170.  
Wrakfogel 135.  
Wriand 124.  
Wårtbit 870.  
Wågglus 909.  
Wålfräckja 252.

**Å**da 117.  
Ål 301.  
Ålkussa 316.  
Åkerhöna 190.  
Åkerhöns 189. 477.  
Allekråka 94.  
Allenborre 393.  
Allonskrika 90.

**Ä**lg 39.  
Änger 408.  
Ängsnärpa 194.  
Äera 117.  
Ärla 252.  
Ärta 129.

**O**dla 284.  
Örlax 347.  
Örnmask 860.  
Öru 54.





