



#### FORMULA

Atropina sulfato..... 1.00 g  
Cloruro de benzalconio..... 0.01 g  
Vehículo c.s.p. .... 100 ml

#### DESCRIPCION

La ATROPINA colirio es una agente anticolinérgico con acción ciclopléjica y midriática. Su efecto midriático permite dilatar la pupila para la evaluación, diagnóstico y alivio del dolor de diferentes alteraciones oculares. Su acción ciclopléjica permite la parálisis de músculos ciliares del ojo para realizar cirugías o exploraciones oftalmológicas.

#### INDICACIONES

Colirio para uveítis. Úlcera de córnea. Observación de fondo de ojo.

#### ESPECIES

Caninos y Felinos.

#### DOSIFICACION

En midriasis: colocar 2 gotas con intervalo de 1 hora entre cada una. Controlar una hora después. En uveítis o úlcera de córnea: colocar 1 gota cada 8/12 horas.

#### CONTRAINDICACIONES y LIMITACIONES DE USO

- En algunos pacientes la acción puede persistir de 1 a 5 días. Puede dificultar momentáneamente enfoque y respuestas fotomotoras
- No aplicar en queratoconjuntivitis seca, ya que disminuye la producción lagrimal.
- El sabor amargo puede producir efecto sialogogo. No emplear ante glaucoma excepto secundario a uveítis.
- Hipersensibilidad al medicamento.

#### PRESENTACION

Frasco gotero de 5ml.