

## Atropina Midriático

### Atropina 1%



#### FÓRMULA

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Atropina sulfato.....       | 1.00 g |
| Cloruro de benzalconio..... | 0.01 g |
| Vehículo c.s.p. ....        | 100 ml |

#### DESCRIPCIÓN

La ATROPINA colirio es una agente anticolinérgico con acción ciclopléjica y midriática. Su efecto midriático permite dilatar la pupila para la evaluación, diagnóstico y alivio del dolor de diferentes alteraciones oculares. Su acción ciclopléjica permite la parálisis de músculos ciliares del ojo para realizar cirugías o exploraciones oftalmológicas.

#### INDICACIONES

Colirio para uveítis. Ulcera de córnea. Observación de fondo de ojo.

#### ESPECIES

Caninos y Felinos.

#### DOSIFICACIÓN

En midriasis: colocar 2 gotas con intervalo de 1 hora entre cada una. Controlar una hora después. En uveítis o úlcera de córnea: colocar 1 gota cada 8/12 horas.

#### CONTRAINDICACIONES y LIMITACIONES DE USO

- En algunos pacientes la acción puede persistir de 1 a 5 días. Puede dificultar momentáneamente enfoque y respuestas fotomotoras.
- No aplicar en queratoconjuntivitis seca, ya que disminuye la producción lagrimal.
- El sabor amargo puede producir efecto sialogogo. No emplear ante glaucoma excepto secundario a uveítis.
- Hipersensibilidad al medicamento.

## PRESENTACIÓN

Frasco gotero de 5ml.