

Zorrilo de espalda blanca norteño / Hog-nosed skunk (Conepatus leuconotus)

Familia/family: Mephitidae

Tamaño/size: Pequeño/small



El zorrilo de espalda blanca norteño es una especie de zorrilo de America central y del norte, siendo una de los zorrillos mas grandes del mundo, llegando a medir hasta 82 cm. y pudiendo pesar hasta 3 kg.

Es una especie principalmente nocturna y solitaria, la cual se alimenta principalmente de insectos y larvas las cual saca de la tierra excavando. Este zorrilo se ha encontrado en una amplia variedad de habitats, incluyendo bosques, pastizales, laderas de montañas, llanuras costeras, areas de matorrales espinosos y muchos mas. Se le encuentra en una altitud hasta de 4100 m.



The hog-nosed skunk is a species of skunk from central and north America, and is one of the largest skunks in the world, reaching up to 82 cm., and can weigh up to 3 kg.

It is mainly nocturnal and solitary, and feeds mainly on insects and larvae which it digs out of the ground. This skunk has been found in a wide variety of habitats, including forests, grasslands, mountain slopes, coastal plains, thorn scrub areas, and many more. It is found at an altitude of up to 4,100m.

Mofeta encapuchada / Hooded skunk (*Mephitis macroura*)



Familia/family: Mephitidae

Esta especie es distinta de las demás por su cola larga y pelaje esponjoso, en la parte superior su pelaje es de color blanco y en el inferior es negro, su cabeza es pequeña, ojos pequeños y oscuros, y sus extremidades son cortas. La longitud de su cuerpo varía de 558 a 790 mm, su cabeza de 195 a 295 mm, del retropié de 60 a 68 mm. Es un animal omnívoro, se alimenta de plantas, especialmente de chumberas, insectos y pequeños roedores; habita en bosques, matorrales, pastizales, zonas rocosas y desierto artificial/terrestre; se encuentra a una elevación de 2,440 m.



This species is different from the others due to its long tail and fluffy fur, on the upper part its fur is white and on the lower part it is black, its head is small, its eyes are small and dark, and its limbs are short. The length of its body varies from 558 to 790 mm, its head varies from 195 to 295 mm. It is an omnivorous animal, it feeds on plants, especially prickly pears, insects and small rodents; inhabits forests, shrubs, grasslands, rocky areas and artificial / terrestrial desert; it is located at an elevation of 2,440 m.

Pecarí de collar/ Collared peccary or javelina (*Pecari tajacu*)

Familia/Family: Tayassuidae

Tamaño/Size: Mediano-grande/medium-large



Mide .5 metros a la cruz, de largo puede medir entre .8 y 1.0 metros, puede pesar alrededor de 15-25 kg. La coloración de su pelaje es negro grisáceo y un collar blanquecino que extiende la melena sobre los hombros y la garganta. Tienen colmillos cortos y rectos. Tienen mala vista pero excelente olfato y buen oído.

Es un animal omnívoro, alimentándose principalmente de raíces, bulbos, hongos, frijoles, bayas, hierba, cactus y nueces, además de frutas y huevos ocasionales, carroña, serpientes, peces y ranas.



It measures up to .5 m. It can measure .8 to 1 meter long and it weighs around 15-25 kg. Its coat is grayish black and has a whitish collar that extends its mane over its shoulders and throat. They have short, straight fangs. They have poor eyesight but excellent smell and good hearing.

It is an omnivorous animal, feeding primarily on roots, bulbs, mushrooms, beans, berries, grass, cacti and nuts, as well as fruits and eggs, carrion, snakes, fish and frogs.

Zarigüeya de Virginia del Norte de México/Virginia oposum

(*Didelphis virginiana* ssp. *californica*)

Familia/family: Didelphidae



Es conocido porque su pelaje es duro y áspero, el pelo que los protege suele ser color negro. Otra de sus características distintivas es su cola con ausencia de pelo, tiene la cabeza puntiaguda, con orejas pequeñas y oscuras, nariz rosada y ojos negros, el pelaje de su cabeza suele ser de tonos claros; sus patas son cortas con pequeñas garras, los machos llegan a medir de 45 a 50 cm sin contar la cola, las hembras son más pequeñas, y pueden llegar a pesar desde 1.5 kg hasta 3.5 kg. *Didelphis virginiana* es un mamífero omnívoro pueden comer un gran número de alimentos, ya que es poco selectivo con la comida, hierbas, frutos, granos, también puede consumir desechos y carroña. Habita en bosque, matorral, artificial / terrestre, se encuentra a 3000 m.



It is known because its fur is hard and rough, the hair that protects them is usually black. Another of its distinctive characteristics is its tail with no hair, it has a pointed head, with small and dark ears, pink nose and black eyes. The fur on its head is usually light tones; their legs are short with small claws, males can measure from 45 to 50 cm without counting the tail, females are smaller, and can weigh from 1.5 kg to 3.5 kg. *Didelphis virginiana* is an omnivorous mammal that can eat a large number of foods, since it is not very selective with food, herbs, fruits, grains, it can also consume waste and carrion. It lives in forest, scrub, artificial / terrestrial, it is located at 3000 m.

LC

Coatí/White-nosed coatí (*Nasua narica*)



Familia/family: Procyonidae

Es de tamaño mediano, cabeza alargada, hocico alargado y móvil, nariz con líneas de pelo blanco, orejas cortas redondas y cubiertas de pelo, pelaje de color marrón, cola larga y anillada, patas marrón oscuro con garras largas y rígidas, entre la cabeza y el cuerpo tiene una longitud de 41 a 67 cm, su cola está entre los 32 y los 67 cm, puede llegar a pesar desde 3 a los 6 kg; es un animal omnívoro, por lo cual se alimenta de lombrices, lagartos pequeños, arañas, ratones, frutos e incluso huevos de pájaro; habita en bosques y pastizales, se encuentra en un rango de elevación de 3,500 m.



It is of medium size, elongated head, elongated and mobile snout, nose with lines of white hair, short round ears covered with hair, brown fur, long and ringed tail, dark brown legs with long and rigid claws, between the head and the body. It has a length of 41 to 67 cm, its tail is between 32 and 67 cm, it can weigh from 3 to 6 kg. It is an omnivorous animal, which is why it feeds on worms, small lizards, spiders, mice, fruits and even bird eggs; it inhabits forests and grasslands, it is found in an elevation range of 3,500 m.

Liebre antilope/Antelope jackrabbit (*Lepus alleni*)

Familia/family: Leporidae

Tamaño/size: Grande/large



Es la especie mas grande del genero Lepus. Esta especie tiene el cráneo, orejas y nariz especialmente grandes y en su mayoría carecen de pelo, excepto por unas pequeñas franjas blancas a lo largo de bordes y puntas. Los lados del cuerpo, cola y la superficie ventral tienen un color blanco. La parte superior es de color marrón y un poco de negro. Llega a medir entre 52 a 58 cm. de largo, sus patas traseras miden entre 20 y 30 cm. de largo.

Es un animal herbívoro, folívoro y granívoro, lo que significa que se alimenta fundamentalmente de hojas, y granívoro por alimentarse de granos y comedor de plantas suculentas, en especial las diferentes especies de cactus.



Largest species of the Lepus genus. This species has especially large skull, ears and for the most part they lack hair, except for a few small stripes along the edges and tips. The sides of the body, tail and ventral surface have a White color. The top of the body is brown with black. It can measure between 52 to 58 cm. long, its hind legs are between 20 and 30 cm. long.

It is a herbivorous, folivorous and granivorous animal, which means that it feed mainly on leaves, grains and plants.

Liebre de cola negra/Black-tailed jackrabbit (*Lepus californicus*)



Familia/family: Leporidae

Es una liebre grande a comparación de las demás especies con una longitud promedio de 54.7 cm y un peso de 2.3 kg, el pelaje de su espalda es café claro con manchas tenues blanquecinas y en la parte ventral es de color blanco, en la punta de sus orejas, cuello y cola tiene manchas negras, su cabeza es pequeña, ojos oscuros y nariz marrón, es un animal herbívoro, se alimenta de hierbas pastos y cortezas de árboles y arbustos. Se encuentra en bosques, sabanas, arbustos, pastizales, desiertos artificial/terrestre a un rango de elevación de 3,700m.



It is a large hare compared to the other species with an average length of 54.7 cm and a weight of 2.3 kg, the fur on its back is light brown with faint whitish spots and on the ventral part it is white, at the tip of its ears, neck and tail have black spots, its head is small, dark eyes and brown nose, it is a herbivorous animal, it feeds on grasses and bark of trees and shrubs. Found in forests, savannas, shrubs, grasslands, artificial / terrestrial deserts at an elevation range of 3,700m.

Monstruo de Gila/Gila monster (*Heloderma suspectum*)

Familia/family: Helodermatidae

Tamaño/size: Mediano/medium



Es un lagarto venenoso de movimiento lento, puede medir hasta 60 cm. Tiene patas pequeñas con garras fuertes, y una cola corta y gruesa en la cual almacena grasa que utiliza como energía para sobrevivir en tiempos de hibernación o en escasez de comida. Tiene una piel rugosa, con marcas brillantes de colores rosa, amarillo o blanco sobre escamas de color negro.

Habita en zonas aridas como los desiertos de america del norte y bosques tropicales secos. Vive en madrigueras que el excava, es mas activo durante la mañana y los atarcederes, evitando los calores extremos del medio dia.

El monstruo de gila es carnívoro, su dieta se basa principalmente en mamíferos pequeños como los conejos, ratones, y ardillas, además de otros reptiles como las lagartijas, anfibios como las ranas, insectos y aves, además de huevos de aves, tortugas y serpientes.



It is a poisonous lizard, it can measure up to 60 cm. It has small legs with strong claws, and a short, thick tail in which is stores fat that is uses for energy to survive in times of hibernation or in shortage of food. It has a rough skin, with bright pink, yellow or white markings on black scales.

It lives in arid areas such as deserts of North America and dry tropical forests. It lives un burrows that it digs, it is more active during the morning and at dusk, avoiding the extreme heat of midday.

The gila monster is carnivorous, its diet is based mainly on small mammals such as rabbits, mice, and squirrels, as well as other reptiles such as lizards, amphibians such as frogs, insects and birds, in addition to the eggs of birds, turtles and snakes.

Pavo salvaje/Gould's Turkey (*Meleagris gallopavo*)

Familia/family: Phasianidae



Una característica que lo hace diferente es su cola en forma de abanico, los machos son de mayor tamaño, su plumaje es color negro con coloraciones blancas al final. Se reconoce por su rebaba rojiza, y los espolones en las patas, la piel de su cabeza suele cambiar de tono, pudiendo ser rojiza, azul o marrón. En la adultez pesan entre 6,8 y 11 kilogramos. En el caso de las hembras los tonos pueden ser mas opacos, tanto de color blanco o grisáceo, la carúncula está ausente. En la madurez alcanza los 3,6 a 5,4 kilogramos. Son animales omnívoros, esto es que se alimentan de pequeños insectos, semillas y plantas. Habita en bosque, sabana, matorral, pradera, artificial / terrestre. Con un rango de elevación de 2500 m.



A characteristic that makes it different is its fan-shaped tail, males are larger than females, its plumage is black with white colorations at the end. It is recognized by its reddish burr, and the spurs on its legs, the skin on its head usually changes color, and can be reddish, blue or brown. As adults they weigh between 6.8 and 11 kilograms. In the case of females, the tones may be more opaque, both white or gray, the caruncle is absent.

At maturity it reaches 3.6 to 5.4 kilograms. They are omnivorous animals, that is, they feed on small insects, seeds and plants. It inhabits forest, savanna, scrub, meadow, artificial / terrestrial. With an elevation range of 2500 m.



Oso negro/Black bear (*Ursus americanus*)

Familia/family: Ursidae

Tamaño/size: Grande/large

Es una especie de talla grande y tiene cuerpo robusto llegando a medir hasta 2 m; pesan entre 90 y 216 kg. El macho es más grande que la hembra por un 20% aproximado. Es de color negro o café oscuro. Tiene ojos pequeños: las orejas también son pequeñas, redondeadas y firmes. La cola también es muy pequeña. Tiene 5 dedos en cada pie y manos con uñas muy fuertes, cortas, negras, ganchudas y no retractiles, mismas que usan para desgarrar, excavar y trepar. Son excelentes trepadores de arboles.

Es una especie omnívora, por lo tanto su dieta incluye plantas, frutos como nueces y bayas, también comen insectos y huevos de aves. Ocasionalmente caza mamíferos jóvenes, peces, y también son animales carroñeros.

El oso americano habita zonas con climas templados y semifríos, con altitudes entre 650 hasta 3000 msnm. Se le encuentra principalmente en todo tipo de bosque de pino, aunque también se le puede encontrar en pastizales, regiones semiáridas, zonas agrícolas y ganaderas.

It is a species of large size and has a robust body, measuring up to 2 m; they weigh between 90 and 216 kg. The male is larger than the female by about 20%. It is black or dark brown in color. It has small eyes: the ears are also small, rounded and firm. The tail is also very small. It has 5 toes on each foot and hands with very strong, short, black, hooked and non-retractable nails, which they use to tear, dig and climb. They are excellent tree climbers. It is an omnivorous species, therefore its diet includes plants, fruits such as nuts and berries, they also eat insects and bird eggs. Occasionally hunts young mammals, fish, and they are also scavengers. The American bear inhabits areas with temperate and semi-cold climates, with altitudes between 650 to 3000 meters above sea level. It is found mainly in all types of pine forest, although it can also be found in grasslands, semi-arid regions, agricultural and livestock areas.



**SKY
ISLAND
ALLIANCE**

Puma o león de montaña/Mountain lion or cougar (*Puma concolor*)

Familia/family: Felidae

Tamaño/size: Grande/large

Es una especie nativa del continente americano. Es el segundo felino más grande del continente, después del jaguar. Tiene un cuerpo delgado, musculoso, compacto y mucha agilidad. Su larga cola es una de las características más distintivas del puma. La coloración más común en el puma es rojizo o gris rojizo a marrón oscuro. El peso promedio en los machos es de 53 a 72 kg. Mientras el de las hembras es alrededor de 34 a 48 kg. El puma no puede rugir, ya que carece de la laringe especializada y el hueso hioides.



Se trata de una especie estrictamente carnívora, sus presas más importantes son distintas especies de ungulados como los ciervos, particularmente en América del Norte; se alimenta de ciervos mula, ciervos de cola blanca, e incluso alces, berrendo y borrego cimarrón.



Native species of the american continent. It is the second largest feline in the continent, after the jaguar. It has a Slim, muscular compact body with great agility. Its long tail is one of the most distinctive characteristics of the cougar. The most common coloration in the cougar is reddish or reddish grey to dark brown. The average weight in males is 53 to 72 kg. While that of females is around 34 to 48 kg. It cannot roar, as it lacks the specialized larynx and hyoid bone.

It is a strictly carnivorous species, its most important prey are different species of ungulates such as deer, particularly in North America; It feed on mule deer, white-tailed deer, and even elk, pronghorn and bighorn sheep.



Venado bura/Mule deer
(Odocoileus hemionus)



Familia/family: Cérvidos

Se le considera una de las especies mas grande de venados siendo desde 0,85 a 2,1 m, cuenta con orejas grandes en comparación a su tamaño corporal. El color de su pelaje suele cambiar conforme pasa el año. En verano presentan un pelaje de color marrón o rojizo. Mientras que en invierno suelen ser de color blanco con tonalidades negras. Esto hace que sean confundidos con otras especies de ciervos. Un venado bura adulto llega a pesar hasta 400 libras y las hembras pesan aproximadamente la mitad de eso. Sus hábitos alimenticios cambian de verano a invierno, es herbívoro, se alimenta de artemisia, enebro y cepillo amargo. Habita en bosque, sabana, matorral, pradera, humedales (interior), desierto, intermareal marino, artificial / terrestre, artificial / acuático y marino, vegetación introducida, se encuentra a un rango de 3,000 m. Es un animal migrante.



It is considered one of the largest species of deer, being from 0.85 to 2.1 m, it has large ears compared to its body size. Their coat color tends to change as the year goes by. In summer they have a brown or reddish coat. While in winter they are usually white with black tones. This causes them to be confused with other species of deer. An adult mule deer can weigh up to 400 pounds, and females weigh about half that. Its eating habits change from summer to winter, it is herbivorous, it feeds on mugwort, juniper and bitter brush. It inhabits forest, savanna, scrub, prairie, wetlands (interior), desert, intertidal marine, artificial / terrestrial, artificial / aquatic and marine, introduced vegetation, it is found at a range of 3,000 m. It is a migrant animal.

Berrendo/Pronghorn
(*Antilocapra americana*)



Familia: Antilocapridae

Su longitud corporal es de 1.30 a 1.50 m, un largo de cola de 10 cm, sus orejas tienen una longitud de 15 cm y un peso de hasta 70 kg en los machos y 55 kg en las hembras. Sus cuernos son negros, planos y con la punta hacia adentro. Presentan pelo en la base de los cuernos y sus patas son largas y delgadas. El cuerpo y cuello cuentan con un pelaje color café claro. En la parte ventral del cuello presenta dos bandas blancas, una a la altura de la garganta y, otra, debajo de ella. Se alimenta principalmente de plantas, es herbívoro y rumiante, tragan el alimento entero y después lo devuelven de su estómago a su boca para masticarlo poco a poco. Habita en matorrales, pastizales y desierto, a un rango de elevación de 3,500 m. Es un animal que migra.



Its body length is 1.30 to 1.50 m, a tail length of 10 cm, its ears are 15 cm long and it weighs up to 70 kg in males and 55 kg in females. Their horns are black, flat and pointed inward. They have hair at the base of the horns and their legs are long and thin. The body and neck have light brown fur. On the ventral part of the neck there are two white bands, one at the level of the throat and the other below it. It feeds mainly on plants, it is herbivorous and ruminant, they swallow food whole and then return it from their stomach to their mouth to chew it little by little. It inhabits scrublands, grasslands and desert, at an elevation range of 3,500 m. It is an animal that migrates.

Venado cola blanca/White-tailed deer (*Odocoileus virginianus*)

Familia/family: Cervidae

Tamaño/size: Grande/large



Son grandes, de color café en distintas tonalidades, dependiendo la época del año y localidad. Sus orejas son de tamaño mediano. Su vientre es de color blanco y poseen una cola relativamente larga de color café, su parte inferior es de color blanco. Los machos se distinguen de las hembras por poseer astas ramificadas, aunque también pueden presentarse sin ramificaciones siendo astas sencillas. Las crías tienen una coloración café rojizo con manchas blancas. Los venados adultos pesan de 40 a 160 kg.

Es una especie herbívora, ramoneador que se alimenta de los brotes de arbustos, hojas, flores, semillas, corteza y hasta raíces.



They are large, brown in different shades, depending on the time of year and location. Its ears are medium in size. Their belly is white and they have a relatively long brown tail, their underside is brown. Males are distinguished from females by having branched antlers, although they can also appear without ramifications, being simple antlers. Their babies are reddish brown with white spots. Adult deer weigh 40 to 160 kg.

It is a herbivore species, that feed on shrubs, leaves, flowers, seeds, bark and even roots.



Búho Elfo/Elf owl (*Micrathene whitneyi*)



Familia/family: Strigidae

Su cuerpo es de denso plumaje con patas largas. Tiene una longitud de 12.5 a 14.5 cm, con una envergadura de hasta 27 cm, tiene un peso de entre 35 y 55 g. El pico tiene tonalidades amarillentas y en ocasiones naranjas. Su plumaje es café oscuro con cintas mas oscuras en el vientre. Sus ojos son amarillos y justo arriba de sus ojos tiene plumas blancas que contornean su rostro dándole aspecto de cejas. El búho enano es carnívoro. Su dieta se basa en arácnidos e insectos pequeños, como grillos, polillas, escarabajos, ciempiés y escorpiones. Habita en bosque, sabana, matorral, humedales (interior), se encuentra en un rango superior de hasta 2,100 m. Migra al norte de la frontera con México, llega al comienzo de la primavera y parte al comenzar el otoño.



Its body is dense plumage with long legs. It has a length of 12.5 to 14.5 cm, with a wingspan of up to 27 cm, it has a weight of between 35 and 55 g. The beak has yellowish and sometimes orange tones. Its plumage is dark brown with darker ribbons on the belly. It's eyes are yellow and just above his eyes he has white feathers that outline his face giving him the appearance of eyebrows. The pygmy owl is a carnivore. Their diet is based on arachnids and small insects, such as crickets, moths, beetles, centipedes, and scorpions. It inhabits forest, savanna, scrub, wetlands (interior), it is found in a higher range of up to 2,100 m. Migrates north of the Mexican border, arriving in early spring and departing in early fall.

Agullilla gris/Gray hawk (*Buteo plagiatus*)

Familia/family: Accipitridae

Tamaño/size: pequeño/small

Es un ave rapaz de tamaño pequeño, de un color gris pálido y con finas barras blancas en las partes inferiores, presenta barras blancas y negras en su cola. Los juveniles son de color marrón y rayados. Mide entre 40 y 45 cm. Es un cazador ágil con mucha rapidez. Su alimentación principal es pequeños roedores y lagartijas, en el estado de Arizona, se alimenta mucho de la lagartija Espinosa, (genero *sceloporus*). Se alimenta también de distintas especies de aves pequeñas y medianas, serpientes, ratones, pequeños Conejos, ardillas e insectos.



Habita principalmente bosques con árboles dispersos, y bosques ribereños, regiones semiaridas.



It is a small bird of prey, pale gray in color and with fine white bars on the lower parts, it has black and white bars on its tail. Juveniles are brown and striped. It measures between 40 and 45 cm. It is a very quick and agile hunter. Its main food is small rodents and lizards, in the state of Arizona it feeds a lot on the spiny lizard. It also feeds on different species of small and medium-sized birds, snakes, mice, small rabbits, squirrels and insects.

It inhabits mainly forests with scattered trees, and riparian forests and semi-arid regions.



Murciélago magueyero menor/ Lesser long-nosed bat (*Leptonycteris yerbabuenae*)

Familia/family: Phyllostomidae

Tamaño/size: Pequeño/small



Murciélago de tamaño pequeño, su cuerpo no excede los 9 cm. De longitud. Es un importante polinizador, y este ha adaptado su rostro largo y estrecho para poder facilitar el acceso a los nectarios de las flores. Tiene un peso promedio de 15 a 25 gramos. Son excelentes voladores a larga distancia, pudiendo volar hasta 30 kilómetros por noche desde su refugio a la ubicación de su alimento. Tiene una envergadura de unos 14 cm. Y su lengua mide aproximadamente lo mismo que su cuerpo.

Su rango altitudinal varía entre zonas bajas alcanzando los 2,600 msnm. Las poblaciones que se encuentran en Estados Unidos migran hacia el norte y centro de México, siguiendo la época de floración de distintas especies de agave, que son su principal alimento. Esta especie de murciélago se alimenta principalmente del néctar y polen de distintas especies de cactáceas, agaváceas, fabáceas y bombacáceas, árboles de seda, cactus saguaro, cactus columnares entre otros.



Small sized bat, its body does not exceed 9 cm. of length. It is an important pollinator and it has adapted its long and narrow face to facilitate access to flower nectaries. It has an average weight of 15-25 grams. They are excellent long-distance fliers, being able to fly up to 30 kilometers per night from their shelter to the location of their food. It has a wingspan of about 14 cm. And its tongue is about the same size as their body.


Its altitudinal range varies between low areas reaching 2,600 meters above sea level. The populations found in the United States migrate to the north and center of Mexico, following the flowering season of different species of agave, which are their main food. This species of bat feeds mainly on the néctar and pollen of different species of cacti, agavaceae, fabaceae and bombacaceae, silk trees, saguaro cacti, columnar cacti among others.



Zopilote aura/Turkey vulture (*Cathartes aura*)

Familia/family: Cathartidae

Tamaño/size: Grande/large



Se trata de una ave grande, con una envergadura de 170 a 183 cm, una longitud de 64-81 cm y un peso que puede variar entre 0,85 y 2,26 kg. La hembra es ligeramente más grande que el macho. Su plumaje es de una coloración marrón oscuro hasta negro; Carece de plumas en su cabeza y el cuello y son de color rojizas. Tiene un pico es fuerte y corto, ganchudo, de color marfil. Se considera como especie en preocupación menor por la IUCN.

Es una especie carnívora, se alimenta principalmente de una gran variedad de carroña, desde pequeños mamíferos a los herbívoros grandes, prefiriendo los recién muertos, y evitando los cadáveres que han llegado al punto de putrefacción. Raramente se alimenta de materia vegetal, como vegetación riberana, calabazas u otros cultivos, y de insectos vivos y otros invertebrados. Tiene una visión y sentido del olfato excelentes. Su rango altitudinal llega por lo general hasta los 2500 msnm, pero se le ha observado a los 4300 msnm.



It is a large bird, with a wingspan of 170 to 183 cm., a length of 64-81 cm. And a weight that can vary between .85 and 2.26 kg. The female is slightly larger than the male. Its plumage is dark brown to black; it lacks feathers on its head and neck and they are reddish in color. It has a short and strong beak, hooked, ivory in color. It is considered a species of least concern by the IUCN.

It is a carnivorous species, it feeds mainly on a wide variety of carrion, from small mammals to large herbivores, preferring the freshly dead, and avoiding corpses that have reached the point of putrefaction. It rarely feeds on plants, such as riparian vegetation, pumpkins, or other crops. It has an excellent vision and sense of smell. Its altitude range generally reaches 2,500 meters above sea level, but it has been observed at 4,300 meters above sea level.

Tejón/American Badger (*Taxidea taxus*)

Familia/family: Mustelidae



This Photo by Unknown author is licensed under [CCBY-SA](#)

El tejón es de gran tamaño. Con una longitud de 65 a 100 cm y un peso de 10 a 16 kg. Su cabeza es de forma triangular con un cuello y cola cortos. Utiliza el hocico para escarbar. Posee ojos pequeños al igual que las orejas. Éstas están orientadas hacia los lados y hacia atrás. Las patas robustas con gran fuerza, tienen 5 dedos y en la parte de abajo presentan almohadillas. Sus uñas largas y fuertes. La piel es muy gruesa y resistente, cubierta de un denso pelaje grisáceo. En la cabeza tienen dos listas oscuras. Tanto las partes inferiores como las patas son negras. El tejón es omnívoro y come prácticamente de todo, desde animales a vegetales: mamíferos pequeños, insectos, lombrices, raíces, frutos, cereales, plantas verdes, etc. Habitan en bosque, matorral, pradera, desierto, artificial / terrestre; a un rango de elevación de hasta 3,300 m.



The badger is large. With a length of 65 to 100 cm and a weight of 10 to 16 kg. Its head is triangular in shape with a short neck and tail. It uses his snout to scratch. It has small eyes as well as its ears. These are oriented to the sides and to the rear. The sturdy legs with great strength, have 5 fingers and have pads on the bottom. It has long and strong nails. The skin is very thick and resistant, covered with a dense grayish fur. On the head they have two dark stripes. Both the lower parts and the legs are black. The badger is omnivorous and eats practically everything, from animals to vegetables: small mammals, insects, worms, roots, fruits, cereals, green plants, etc. They inhabit forest, scrub, meadow, desert, artificial / terrestrial; at an elevation range of up to 3,300 m.

LC

Cola anillada/Ringtail (*Bassariscus astutus*)



Familia/family: Procyonidae

Esta especie de un tamaño promedio, su cabeza es pequeña, orejas cortas, ojos grandes, patas cortas, su cola es larga con anillos negros, el pelaje de la parte superior de la espalda hasta su cabeza es de color café claro y en la parte ventral es blanca, así como la demás parte de su cola. En su etapa adulta llegan a pesar entre 700 gramos y 1.5 kilos. Es omnívoro e incluye frutos, invertebrados y pequeños vertebrados. Habita en bosques, matorrales, pastizales, áreas rocosas (p. Ej. Acantilados interiores, picos de montañas, desiertos, artificiales / terrestres. Se encuentran a un rango de elevación superior de hasta 2,900 m.



This species is of an average size, its head is small, short ears, large eyes, short legs, its tail is long with black rings, the fur from the upper part of the back to its head is light brown and in the part ventral is white, as well as the other part of its tail. In their adult stage they weigh between 700 grams and 1.5 kilos. It is omnivorous and includes fruits, invertebrates, and small vertebrates to its diet. It inhabits forests, scrublands, grasslands, rocky areas (eg, inland cliffs, mountain peaks, deserts, man-made / terrestrial). They are found at a higher elevation range of up to 2,900 m.



SKY
ISLAND
ALLIANCE



Zorrillo manchado occidental/Western spotted skunk (*Spilogale gracilis*)

Familia/family: Mephitidae

Tamaño/size: Pequeño/small



Son animales pequeño, llegando a medir de 20 a 29 cm de la cabeza a la cola, son de color negro con una serie de bandas y manchas blancas en todo el cuerpo, su cola es mayormente blanca, midiendo de 11 a 16cm. Su peso es de 200 a 900 g. Cuando se siente amenazado produce una secreción fétida con sus glándulas anales.

Es una especie omnívora, su alimentación consiste en animales invertebrados como gusanos, lombrices e insectos. También comen vertebrados como ratones, lagartijas, culebras y aves. De igual modo se alimentan de huevos, diversos frutos, semillas y miel.



They are small animals, measuring 20 to 29 cm from head to tail, they are black with a series of bands and white spots all over the body, their tail is mostly white, measuring 11-16 cm. Their weight is 200 to 900 g. When threatened, it produces a foul discharge from its anal glands.

It is an omnivorous species, its diet consists of invertebrate animals such as worms, earthworms and insects. They also eat vertebrates such as mice, lizards, snakes and small birds. They will also feed on eggs, various fruits, seeds and honey.



**SKY
ISLAND
ALLIANCE**



Gato montés/Bobcat (*Lynx rufus*)



Familia/family: Felidae

Puede ser confundido con un gato doméstico, pero es mucho más alto, con colas cortas y orejas altas con mechones. Su pelaje es de color marrón grisáceo, el pelaje ventral suele ser más claro. Mide 90 cm de largo y pesa aproximadamente 6,8 kg. Es un animal carnívoro, se alimenta (en especial de aves), anfibios, reptiles e incluso insectos también constituyen un porcentaje importante de su dieta. Viven en bosque, sabana, matorral, pradera, y desierto. Se encuentran en un rango de elevación de 2.250 m.

[This Photo](#) by Unknown author is licensed under [CCBY-SA-NC](#)



It can be confused with a domestic cat, but are much taller, with short bobbed tails and tall tufted ears. Its fur is greyish brown in color, the ventral fur is usually lighter. It is 90 cm long, and weighs approximately 6.8 kg. It is a carnivorous animal, it feeds (particularly birds), amphibians, reptiles and even insects also make up a significant percentage of its diet. They live in forest, savanna, scrub, prairie, and desert. They are in an elevation range of 2,250 m.

[This Photo](#) by Unknown author is licensed under [CCBY-SA](#)



Halcón de Cooper/Cooper's hawk (*Accipiter cooperii*)

Familia/family: Accipitridae



Su tamaño es mediano con alas y cola redondeadas. Tiene una longitud de 39 cm con una envergadura de 0.7 a 0.9 m, con un peso en las hembras de hasta 421 g y los machos de hasta 722 g. En la parte inferior o ventral tiene tonalidades blancas con manchas marrones. Se alimenta de aves como petirrojos, charas azules o pájaros carpinteros, y también de aves más grandes y más pequeñas. También se alimenta de mamíferos pequeños, como tamiás, ardillas de árbol, ardillas de tierra, ratones y murciélagos. A veces se alimenta de reptiles e insectos. Habitan en bosque, matorral, artificial / terrestre; se encuentran a un rango de elevación de hasta 3,000 m. Casi todo el año suelen estar en un solo lugar, pero cuando están en la etapa de reproducción suele ir al sur. Migra durante el día. Especialmente en otoño, los ejemplares que migran a menudo se concentran a lo largo de crestas y costas en determinadas condiciones meteorológicas.



Its size is medium with rounded wings and tail. It has a length of 39 cm with a wingspan of 0.7 to 0.9 m, with a weight of up to 421 g in females and up to 722 g in males. In the lower or ventral part it has white tones with brown spots. It feeds on birds such as robins, blue jays, or woodpeckers, as well as larger and smaller birds. It also feeds on small mammals, such as chipmunks, tree squirrels, ground squirrels, mice, and bats. Sometimes it feeds on reptiles and insects. They inhabit forest, scrub, artificial / terrestrial; they are found at an elevation range of up to 3,000 m. Most of the year they are usually in one place, but when they are in the breeding stage they usually go south. It migrates during the day. Especially in autumn, the migrating specimens often concentrate along ridges and coasts in certain weather conditions.

Coyote (*Canis latrans*)

Familia/family: Canidae

Tamaño/size: Mediano/Medium



Mide menos de 60 cm de altura, y su color va desde el gris hasta el canela, a veces con un tinte rojizo. Las orejas y el hocico del coyote son largos en relación al tamaño de su cabeza. Puede llegar a medir hasta 94 cm. y pesa de 10 a 25 kg. Posee una cola espesa y ancha. Por su aspecto esbelto se puede distinguir de su pariente mayor, el lobo gris.

Es una especie generalmente solitaria, aunque se la ha observado en manadas. Se le encuentra en una gran diversidad de ecosistemas: tropicales, templados y áridos.

Se trata de una especie omnívora, aunque se alimenta principalmente de una gran variedad de presas, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, este adapta su dieta a las fuentes disponibles, incluyendo frutas, hierbas y otros vegetales.



It is less than 60 cm tall, and its color ranges from gray to tan, sometimes with a reddish tinge. The coyote's ears and snout are long in relation to the size of its head. It can measure up to 94 cm. and weighs from 10 to 25 kg. It has a thick and wide tail. By its slender appearance it can be distinguished from the grey wolf. It is a solitary species, although it has been observed in herds. It is found in a great diversity of ecosystems: tropical, temperate and arid.

It is an omnivorous species, although it mainly feeds on a wide variety of prey, including mammals, birds, reptiles, fish; it also adapts its diet to available sources, including fruits, herbs and other plants.

Conejo del desierto/Desert cottontail
(Sylvilagus audubonii)



Familia/family: Leporidae

Esta especie es conocida por poseer una cinta de color gris que va desde el dorso hasta la cola, la zona ventral es de color claro. Tiene orejas largas. Su longitud en promedio es de 385 mm y un peso que va desde 755 a 1,250 g. Son herbívoros y se alimentan de pastos, arbustos y maleza. También comen bellotas. Habitan en bosque, matorral, pradera, desierto a un rango de elevación de 1,829 m.



This species is known to have a gray ribbon that goes from the back to the tail, the ventral area is light in color. It has long ears. Its average length is 385 mm and a weight that ranges from 755 to 1,250 g. They are herbivores and feed on grasses, shrubs, and weeds. They also eat acorns. They inhabit forest, scrub, prairie, desert at an elevation range of 1,829 m.

Codorniz de Gambel/Gambel's quail (*Callipepla gambelii*)

Familia/family: Odontophoridae

Tamaño/size: Mediano/medium

Tiene una coloracion mayormente grisacea con una parte beige en la parte superior del vientre y un parche negro en la parte inferior. Los machos se distinguen de las hembras por poseer una cara negra y plumas curvadas en la parte superior de la cabeza. Es propia de los desiertos del oeste de Estados Unidos y noroeste de Mexico. Es un ave estrictamente de regiones deserticas y aridas. Se le puede encontrar en desiertos con vegetacion arbustiva, generalmente cerca de cuerpos de agua, con territorio abierto y mucha variedad de arbustos, arboles de bajo tamaño y cactus.



It has a mostly grayish coloration with a beige part on the upper part of the belly and a black patch on the lower part. Males are distinguished from females by having a black face and curved feathers on the top of the head. It is typical of the deserts of the western United States and northwestern Mexico. It is a bird strictly from desert and arid regions. It can be found in deserts with bushy vegetation, generally near bodies of water, with open territory and a wide variety of shrubs, small trees and cacti.



SKY
ISLAND
ALLIANCE

Correcaminos norteño/ Greater roadrunner (*Geococcyx californianus*)

Familia/family: Cuculidae

Tamaño/size: Pequeño/small



Tiene una longitud de 52–62 cm., y pesa 221–538 g. Mide alrededor de 25–30 cm. de altura. Los dedos de los pies son de color marrón con manchas doradas. La parte superior de sus cuerpos es por lo general de color marrón con rayas negras. El cuello y pecho son de color blanco con rayas marrones oscuras, y el vientre blanco. Una cresta de plumas marrones sobresale de la cabeza, y un parche de piel naranja y azul se encuentra detrás de cada ojo.

Es una especie insectívora, se alimenta principalmente de animales de pequeño tamaño, incluyendo algunos insectos, arañas, tarántulas, escorpiones, ratones, pájaros pequeños y especialmente lagartijas y serpientes pequeñas. Come también algunas frutas y semillas.



It is 52-62 cm. long and weighs 221-538 g. It measures about 25-30 cm. tall. It has brown toes with golden spots. The upper part of their bodies is usually brown with black stripes. The neck and chest are white with dark brown stripes, and the belly is white. A crest of brown feathers protrudes from the head, and a patch of orange and blue fur is located behind each eye.

It is an insectivorous species, it feed mainly on small animals, including some insects, mice, small birds, lizards and snakes. They will occasionaly eat some fruit and seeds too.

Zorro gris/Gray fox
(*Urocyon cinereoargenteus*)

Familia/family: Canidae



Es de tamaño mediano, puede alcanzar 1,15 m de largo y pesar un máximo de 9 kg, es de color grisáceo en la parte superior y en la parte ventral es color rojizo; alternando bandas de color blanco y negro en las partes altas; las áreas de color blanco se presentan en la garganta, nuca y a lo largo del medio del abdomen, las patas, la parte trasera de las orejas y los lados del cuello son amarillentos o naranjas; tiene la cola larga poblada con una franja y la punta de color negra. Es carnívoro, su dieta se compone de mamíferos pequeños como conejos, ardillas y ratas, además de aves e insectos. Habita en bosques, arbustos artificial/terrestre, se encuentra en un rango de elevación de 283 a 462 m.



It is medium in size, it can reach 1.15 m in length and weigh a maximum of 9 kg. It is greyish on the upper part and reddish on the ventral part; alternating black and white bands in the upper parts; areas of white color appear on the throat, nape and along the middle of the abdomen, the legs, the back of the ears and the sides of the neck are yellowish or orange; it has a long tail covered with a black fringe and tip. It is a carnivore, its diet consists of small mammals such as rabbits, squirrels and rats, as well as birds and insects. It lives in forests, artificial / terrestrial shrubs, it is found in an elevation range of 283 to 462 m.

Zorrilo listado norteño/Striped skunk (*Mephitis mephitis*)

Familia/family: Mephitidae

Tamaño/size: Pequeño/small

Su nombre común viene de las dos rayas blancas que se extienden a través del dorso. Es un animal robusto, de cortas extremidades, de cabeza pequeña y una cola larga y peluda. Los machos adultos son 10% más grandes que las hembras, midiendo hasta 77 cm. de longitud y generalmente pesando 1.8–4.5 kg. Los patrones de coloración del pelaje consisten en una base negra con una franja blanca que se extiende desde la cabeza a la cola.


Es una especie omnívora, consumen principalmente insectos como los saltamontes, escarabajos, grillos y orugas. En los meses de invierno y primavera, agrega a su dieta vertebrados como ratones, topillos, huevos y polluelos de aves que anidan en el suelo. También se alimenta de vegetales, como manzanas, arándanos, cerezas negras, cerezas molidas, maíz y solanáceas.

Its common name comes from the two white stripes that run across the back. It is a robust animal, with short limbs, a small head and a long, hairy tail. Adult males are 10% larger than females, measuring up to 77 cm. in length and generally weighing 1.8-4.5 kg. The coat coloring patterns consist of a black base with a white stripe running from head to tail.

It is an omnivorous species, they mainly consume insects such as grasshoppers, beetles, crickets and caterpillars. In the Winter and spring months, it adds vertebrates such as mice, moles, eggs, and ground-nesting chicks to its diet. It also eats vegetables such as apples, blueberries, black cherries, ground cherries, corn and many more.



Categorías de la Lista Roja de la UICN para las especies/ IUCN Red List Categories for Species



Referencias Bibliográficas

- Equipo Editorial Aves. (2020, 12 septiembre). Pavo salvaje (guajolote gallipavo), Meleagris gallopavo. Recuperado de <https://aves.paradis-sphynx.com/galliformes/pavo-salvaje-meleagris-gallopavo.htm>
- Información Sobre el Pavo Salvaje. (s. f.). Recuperado de <https://www.infoanimales.com/informacion-sobre-el-pavo-salvaje>
- Equipo Editorial Mamíferos. (2018, 14 diciembre). Zarigüeya norteamericana, Didelphis virginiana. Recuperado de <https://mamiferos.paradis-sphynx.com/marsupiales/didelphimorphia/zarigüeya-norteamericana-didelphis-virginiana.htm>
- M, C. F. (s. f.). El Berrendo. Recuperado de <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=berrendo&pag=3>
- PROCER | Berrendo - Antilocapra americana. (s. f.). Recuperado de <http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/especies/WEB/berrendo.php>
- Ciervo mulo o venado bura (Odocoileus hemionus) » VENADOPIEDIA. (s. f.). Recuperado de <http://www.venadopedia.com/ciervo-mulo-o-venado-bura-odocoileus-hemionus/>
- Gato Montés. (s. f.). Recuperado de http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_09_gatomontes/gatomontes.htm
- Gato montés (Felis silvestris). (s. f.). Recuperado de <https://www.faunaiberica.org/gato-montes>
- EcuRed. (s. f.). Conejo del desierto - EcuRed. Recuperado de https://www.ecured.cu/Conejo_del_desierto
- Sylvilagus audubonii. (s. f.). Recuperado de <http://www.ibiologia.unam.mx/amcela/auduboni.html>
- Gavilán de Cooper. (2020, 3 junio). Recuperado de <https://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/gavilan-de-cooper>
- EcuRed. (s. f.). Gavilán Cooper - EcuRed. Recuperado de https://www.ecured.cu/Gavil%C3%A1n_Cooper
- Musave. (s. f.). Gavilán De Cooper - Accipiter Cooperii. Recuperado de <https://musave.org/guia-de-aves/detalle.php?ID=25>
- Jimenez, M. (2004, 1 marzo). Azor de Cooper. Recuperado de <http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/accipitridae/accipitrinae/accipiter/cooperii/index.htm>
- Tejón (Meles meles). (s. f.). Recuperado de <https://faunaiberica.org/tejon>
- Maldonado, R. O. (2012). Bassariscus astutus. Recuperado de http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/iztapopo/documentos/fichas_de_especies/Bassariscus_astutus.pdf
- Ticolote Enano. (2020, 3 junio). Recuperado de <https://www.audubon.org/es/guia-de-aves/ave/tecolote-enano>
- Mochuelo de los Saguars - Búhos, Lechuzas, Información y Características. (s. f.). Recuperado de <https://www.owlworlds.com/es/mochuelo-de-los-saguars/>
- Vallejo, A. F 2019. Nasua narica En: Brito, J., Camacho, M. A., Romero, V. Vallejo, A. F. (eds). Mamíferos del Ecuador. Version 2018.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Nasua%20narica>, acceso Miércoles, 17 de Junio de 2020.
- Jimenez, M. (2009, 1 enero). El coatí marrón, Nasua narica. Recuperado 16 de junio de 2020, de <http://www.damisela.com/zoo/mam/carnivora/procyonidae/narica/index.htm#:~:text=La%20alimentaci%C3%B3n%20de%20Nasua%20narica,frutas%20invertebrados%20peque%C3%B1os%20mam%C3%ADferos.&text=El%20Coat%C3%AD%20Marr%C3%B3n%20mide%20en,de%2032%20a%2069%20cm>.
- Espinoza-garcía, Claudia & Martínez Calderas, Jesus Manuel & Palacio-Núñez, Jorge & Hernández, Anuar D.. (2014). Distribución potencial del coati (Nasua narica) en el noreste de México: implicaciones para su conservación. Therya. Vol.5. 331-345. 10.12933/therya-14-195.
- (extincion)
- Ramirez Silva, J. P. (2003, febrero). Liebre de cola negra, Lepus californicus. Recuperado 16 de junio de 2020, de <http://www.ibiologia.unam.mx/amcela/californicus.html>
- EcuRed. (s. f.). Liebre de cola negra - EcuRed. Recuperado de https://www.ecured.cu/Liebre_de_cola_negra
- <https://www.iucnredlist.org>
- Bairos-Novak, K. 2014. "Mephitis macroura" (en línea), Animal Diversity Web. Consultado el 17 de junio de 2020 en https://animaldiversity.org/accounts/Mephitis_macroura/
- Natural, E. H. (s.f.). Mefitidos. Recuperado el 16 de 06 de 2020, de <http://www.elhogarnatural.com/otros%20animales/Mefitidos.htm>
- García, M. (s.f.). Guía de mamíferos y reptiles terrestres. Recuperado el 16 de 06 de 2020, de <http://www.essa.com.mx/archivos%20essa/transparencia/mni/transparenciaFocalizada/medioAmbiente/guiamrtesa.pdf>
- Rodríguez, J. G. (2016). Arrollamientos de zorros (*Cerdocyon thous* y *Urocyon cinereoargenteus*) en la autopista barquisimeto acarigua, región centro-occidental de Venezuela. Venezuela: ECOTRÓPICOS 29. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/43489/Articulo4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gómez, C. F. (2020, 15 enero). Urocyon cinereoargenteus: características, hábitat, comportamiento. Recuperado de <https://www.lifeder.com/urocyon-cinereoargenteus/>



Referencias de Imágenes

Pavo salvaje (*Meleagris gallopavo*)

© Kenneth Bader

<https://www.inaturalist.org/observations/46269569>

© CK Kelly

<https://www.inaturalist.org/observations/9020244>

Zarigüeya de Virginia del Norte de México (*Didelphis virginiana* ssp. *californica*)

(c) Elvis Herrera Rodríguez

<https://www.inaturalist.org/photos/573192>

© Juan Cruzado Cortés

<https://www.inaturalist.org/observations/309849>

Berrendo (*Antilocapra americana*)

(c) Steven Mlodinow

<https://www.inaturalist.org/photos/3087222>

© Rob Klotz

<https://www.inaturalist.org/observations/19657604>

Venado bura (*Odocoileus hemionus*)

(c) Sjensen

<https://www.inaturalist.org/photos/60478258>

© Matt K

<https://www.inaturalist.org/observations/19518883>

Gato montés (*Felis silvestris*)

(c) Javisahun

<https://www.inaturalist.org/photos/40278868>

(c) Fikret

<https://www.inaturalist.org/observations/56405700>

Conejo del desierto (*Sylvilagus audubonii*)

© Susan Hopkins

<https://www.inaturalist.org/observations/38760379>

© Steven Kurniawidjaja

<https://www.inaturalist.org/observations/6167273>

Halcón de Cooper (*Accipiter cooperii*)

© andrewwilds

<https://www.inaturalist.org/observations/58988288>

© chrihag

<https://www.inaturalist.org/observations/59000752>

Tejón (*Meles meles*)

© Cgrounds

<https://www.inaturalist.org/observations/44242850>

© Manuel Ruedi

<https://www.inaturalist.org/observations/48248242>

Cola anillada (*Bassariscus astutus*)

© i_rose32

<https://www.inaturalist.org/observations/9852267>

© Lee Hoy

<https://www.inaturalist.org/observations/27809983>

Búho elfo (*Micrathene whitneyi*)

© osiel

<https://www.inaturalist.org/observations/15954575>

© Javier Cruz Nieto

<https://www.inaturalist.org/observations/39122103>

Coatí (*Nasua narica*)

© rdesch

<https://www.inaturalist.org/observations/60282870>

© gillbsydney

<https://www.inaturalist.org/observations/60035698>

Liebre de cola negra (*Lepus californicus*)

© Carlos Luna

<https://www.inaturalist.org/observations/10028445>

© Lauren Glevanik

<https://www.inaturalist.org/observations/35157330>

Mofeta encapuchada (*Mephitis macroura*)

(c) RODOLFO PINEDA PÉREZ

<https://www.inaturalist.org/observations/21022306>

© sarionions

<https://www.inaturalist.org/observations/47468109>

Zorro gris (*Urocyon cinereoargenteus*)

© jennsoos

<https://www.inaturalist.org/observations/49887640>

© curtmccamy

<https://www.inaturalist.org/observations/60382122>

