

*Quassia glabra* (Engl.) Noot. = **Simaba glabra** Engl.

Referencias: Pirani, J. R., 1987.

*Quassia praecox* (Hassl.) Noot. = **Simaba praecox** Hassl.

Referencias: Pirani, J. R., 1987.

*Quassia trichilioides* (A. St.-Hil.) D. Dietr. = **Simaba trichilioides** A. St.-Hil.

Referencias: Pirani, J. R., 1987.

### **Simaba Aubl.**

Número de especies: 3, 1 endémica

#### **Simaba glabra** Engl.

Sin.: *Quassia glabra* (Engl.) Noot., *Simaba glabra* Engl. subsp. *trijuga* Hassl., *Simaba glabra* Engl. var. *emarginata* Hassl., *Simaba glabra* Engl. var. *inaequilatera* Hassl.

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Fernández Casas, F. J., 1988; Pirani, J. R., 1987, 2002c; Sleumer, H. O., 1953b.

Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAA, CON).

Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BA)]; PRY[*Hassler, E. 10569* (G, LIL, P)].

*Simaba glabra* Engl. var. *emarginata* Hassl. = **Simaba glabra** Engl.

Referencias: Pirani, J. R., 1987.

*Simaba glabra* Engl. var. *inaequilatera* Hassl. = **Simaba glabra** Engl.

Referencias: Pirani, J. R., 1987.

*Simaba glabra* Engl. subsp. *trijuga* Hassl. = **Simaba glabra** Engl.

Referencias: Pirani, J. R., 1987.

#### **Simaba praecox** Hassl.

Sin.: *Quassia praecox* (Hassl.) Noot.

Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Pirani, J. R., 1987. Subarbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: PRY(APA, CAU, CAN).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9497* (G, LIL, P)].

#### **Simaba trichilioides** A. St.-Hil.

Sin.: *Quassia trichilioides* (A. St.-Hil.) D. Dietr., *Zwingera trichilioides* (A. St.-Hil.) Spreng.

Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Pirani, J. R., 1987. Arbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11436* (G, P)].

Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Pirani, 1987).

*Toxicodendrum altissimum* Mill. = **Ailanthus altissima** (Mill.) Swingle

*Zwingera trichilioides* (A. St.-Hil.) Spreng. = **Simaba trichilioides** A. St.-Hil.

Referencias: Pirani, J. R., 1987.

## **SIPARUNACEAE**

Autores: Hausner, G. & Renner, S. S.

1 género, 1 especie.

### **Siparuna Aubl.**

Número de especies: 1

#### **Siparuna guianensis** Aubl.

Referencias: Renner, S. S. & Hausner, G., 2005.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–600 m.

Países: PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11960* (F, G, GH, K, NY)].

## **SOLANACEAE**

Coordinador: Barboza, G. E.

Autores: Stehmann, J. R. & Semir, J. (*Calibrachoa y Petunia*), Matesevach, M., Barboza, G. E., Spooner, D. M., Clausen, A. M. & Peralta, I. E. (*Solanum* sect. *Petota*), Barboza, G. E., Matesevach, M. & Mentz, L. A.

41 géneros, 500 especies, 250 especies endémicas, 7 especies introducidas.

### **Acnistus Schott**

Número de especies: 1

*Acnistus achalensis* Hieron. ex Seckt, nom. nud.  
= **Dunalia brachyacantha** Miers

#### **Acnistus arborescens** (L.) Schldt.

Sin.: *Atropa arborescens* L., *Dunalia arborescens* (L.) Sleumer

Referencias: Hunziker, A. T., 1982b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Nativa. 0–600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8817* (F, GH, NY)].

*Acnistus australis* (Griseb.) Griseb. = **Ioichroma australe** Griseb.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hunziker, A. T., 1982b.

*Acnistus australis* (Griseb.) Griseb. var. *grandiflorus* Griseb. = **Ioichroma australe** Griseb.

*Acnistus bornmulleri* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus breviflorus* Sendtn. = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *glabratus* Hassl.  
= **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *indutus* Hassl. = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus breviflorus* Sendtn. var. *glabratus* Sendtn.  
= **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

*Acnistus cestroides* (Schltdl.) Miers = **Lycium cestroides** Schltdl.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986; Cabrera, A. L., 1983d.

*Acnistus galanderi* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus glabratus* (Sendtn.) Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus hauthalii* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus lorentzii* Dammer = **Eriolarynx lorentzii** (Dammer) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 2001.

*Acnistus lycioides* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus mollis* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus parviflorus* Griseb. = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus parviflorus* Griseb. var. *arboreus* (Griseb.) Griseb. = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus schunckii* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1982b.

*Acnistus sellowii* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus spinescens* (Sendtn.) Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus spinosus* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Acnistus ulei* Dammer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1982b.

*Acnistus virgatus* Griseb. = **Nicotiana glauca** Graham  
Referencias: Hunziker, A. T., 1982b.

*Alona microphylla* Miers = **Phrodus microphyllus** (Miers) Miers  
Referencias: Hunziker, A. T., 2001.

### **Athenaea Sendtn., nom. cons.**

Número de especies: 1

**Athenaea picta** (Mart.) Sendtn.  
Sin.: *Witheringia picta* Mart.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1989; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto. Nativa. 300–400 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6444* (CORD, MBM)].

*Atropa arborescens* L. = **Acnistus arborescens** (L.) Schltdl.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1982b.

*Atropa hirtella* Spreng. = **Solanum hirtellum** (Spreng.) Hassl.  
Referencias: Nee, M., 1999.

*Atropa organifolia* (Lam.) Desf. = **Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Atropa physalodes* L. = **Nicandra physalodes** (L.) Gaertn.

*Atropa rhomboidea* Hook. = **Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Atropa spinosa* Meyen = **Dunalia spinosa** (Meyen) Dammer  
Referencias: Hunziker, A. T., 1960.

### **Aureliana Sendtn.**

Número de especies: 3

**Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. **fasciculata**  
Sin.: *Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn., *Capsicum fasciculatum* (Vell.) Kuntze, *Capsicum lucidum* (Moric.) Kuntze, *Solanum fasciculatum* Vell., *Solanum lucidum* Moric.  
Referencias: Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1991[1990].  
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1300 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, SPE).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1897* (CORD, HBR)]; PRY[*Ortiz, M. 1257* (FCQ)].

**Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. **longifolia**

(Sendtn.) Hunz. &amp; Barboza

Sin.: *Aureliana glomuliflora* Sendtn. var. *longifolium* Sendtn.

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

Arbusto. Nativa. 300–1100 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 31760* (CORD, MBM)].**Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. **tomentella**

(Sendtn.) Barboza &amp; Hunz.

Sin.: *Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn. var. *tomentellum*Sendtn., *Bassovia crassiflora* Dunal, *Bassovia lucida*(Moric.) Sendtn. var. *pilosulum* Dunal, *Capsicum**crassiflorum* (Dunal) Kuntze

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, GUA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6462* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11693* (CORD)]; PRY[*Rojas, T. 7910* (AS, CORD)].*Aureliana glomuliflora* Sendtn. var. *longifolium* Sendtn.= **Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var.**longifolia** (Sendtn.) Hunz. & Barboza

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

*Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn. = **Aureliana****fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. **fasciculata**

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

*Aureliana lucida* (Moric.) Sendtn. var. *tomentellum*Sendtn. = **Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var.**tomentella** (Sendtn.) Barboza & Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

**Aureliana tomentosa** Sendtn.Sin.: *Bassovia tomentosa* (Sendtn.) Dunal, *Capsicum**tomentosum* (Sendtn.) Kuntze

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

Arbusto. Nativa. 0–700 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25665* (CORD, MBM, SP)].**Aureliana wettsteiniana** (Witasek) Hunz. & BarbozaSin.: *Bassovia wettsteiniana* Witasek

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 39322* (CORD, MBM)].*Bassovia crassiflora* Dunal = **Aureliana fasciculata**(Vell.) Sendtn. var. **tomentella** (Sendtn.) Barboza &

Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

*Bassovia lucida* (Moric.) Sendtn. var. *pilosulum* Dunal= **Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var.**tomentella** (Sendtn.) Barboza & Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

*Bassovia pyraster* Dunal = **Vassobia breviflora** (Sendtn.)

Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Bassovia pyraster* Dunal var. *glabriusculum* Dunal= **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Bassovia spina-alba* (Dunal) Griseb. = **Vassobia****breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Bassovia tomentosa* (Sendtn.) Dunal = **Aureliana****tomentosa** Sendtn.

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

*Bassovia wettsteiniana* Witasek = **Aureliana****wettsteiniana** (Witasek) Hunz. & Barboza

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Barboza, G. E., 1991[1990].

**Benthamiella Speg.**

Número de especies: 12 endémicas

*Benthamiella abietina* Skotts. = **Benthamiella****patagonica** Speg.

Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.

*Benthamiella acutifolia* Speg. = **Benthamiella longifolia**

Speg.

Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.

*Benthamiella aurea* Skotts. = **Benthamiella patagonica**

Speg.

Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.

**Benthamiella azurella** (Skotts.) A. SorianoSin.: *Saccardophyton azurella* Skotts.

Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;

Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000; Cosa de Gastiazoro,

M., 1991; Soriano, A., 1948.

Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.

Países: ARG(NEU, SCR); CHL(XII).

Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 2265* (BAB)]; CHL[*Boelcke, O. 11549* (BAB)].**Benthamiella azurelloides** Speg.

Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;

Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.

Subarbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(CHU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 5836* (BAB)].**Benthamiella chubutensis** A. Soriano

Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;

Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000; Soriano, A., 1948.

Subarbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(CHU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. 29* (SI)].

**Benthamiella graminifolia** Skottsbo.

Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;  
Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000; Chiapella, J. &  
Ezcurra, C., 1999.  
Subarbusto. Endémica. 0–3100 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2294* (BAB)].

**Benthamiella intermedia** Skottsbo. = **Benthamiella patagonica** Speg.

Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.

**Benthamiella lanata** A. Soriano

Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;  
Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000; Rossow, R. A.,  
1999f; Soriano, A., 1948.  
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CHU); CHL(XII).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2066* (BAB, SI)];  
CHL[*Arroyo, M. T. K. 850101* (CONC)].

**Benthamiella longifolia** Speg.

Sin.: *Benthamiella acutifolia* Speg.  
Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;  
Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.  
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 288* (K, MO, S)].

**Benthamiella montana** Dusén = **Benthamiella patagonica** Speg.

Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.

**Benthamiella nordenskjoeldii** Dusén ex N.E. Br.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. &  
Marticorena, C., 1992; Arroyo, S. C., 1980;  
Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000; Cosa de Gastiazoro,  
M., 1991.  
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15092* (BAB)];  
CHL[*Arroyo, M. T. K. 92193* (CONC, SGO)].

**Benthamiella patagonica** Speg.

Sin.: *Benthamiella abietina* Skottsbo., *Benthamiella aurea*  
Skottsbo., *Benthamiella intermedia* Skottsbo.,  
*Benthamiella montana* Dusén  
Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;  
Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000; Cosa de Gastiazoro,  
M., 1991.  
Subarbusto. Endémica. 500–1500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Arroyo, S. C. 209* (BAB)];  
CHL[*Boelcke, O. 774* (BAB)].

**Benthamiella pycnophylloides** Speg.

Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;  
Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.  
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Crespo, S. 1684* (BAB)].

**Benthamiella skottsbergii** A. Soriano

Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;  
Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000; Soriano, A., 1948.  
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 3711* (B,  
BAB, CORD)].

**Benthamiella sorianoi** Arroyo

Referencias: Arroyo, S. C., 1980, 1999a;  
Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.  
Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.  
Países: ARG(SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 2711* (BAB)].

**Benthamiella spagazziniana** A. Soriano

Sin.: *Saccardophyton pycnophylloides* Speg.  
Referencias: Arroyo, S. C., 1980; Arroyo-Leuenberger, S. C.,  
2000; Soriano, A., 1948.  
Subarbusto. Endémica. 1000–1500 m.  
Países: ARG(SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Ambrosetti, J. A. 3780*  
(BAB)].

**Bouchetia** DC.

Número de especies: 1 endémica

*Bouchetia anomala* (Miers) Loes., nom. illeg.  
= **Bouchetia anomala** (Miers) Britton & Rusby  
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1983.

**Bouchetia anomala** (Miers) Britton & Rusby

Sin.: *Bouchetia anomala* (Miers) Britton & Rusby subsp.  
*staticifolia* (Sendtn.) Loes., *Bouchetia anomala* (Miers)  
Loes., nom. illeg., *Bouchetia erecta* auct. non Dunal,  
*Nicotiana staticifolia* (Sendtn.) Kuntze, *Nierembergia*  
*anomala* Miers, *Nierembergia staticifolia* Sendtn.,  
*Salpiglossis anomala* (Miers) D'Arcy  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Cosa de Gastiazoro, M.,  
1991; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1983, 1995a;  
Vignoli-Silva, M. & Mentz, L. A., 2005a.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ,  
MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA);  
PRY(ÑEE); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SAO,  
TAC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 25049*  
(CORD)]; BRA[*Krapovickas, A. 22781* (CTES)]; PRY  
[*Rojas, T. 12639* (LIL)]; URY[*Hicken, C. M. 79* (SI)].

*Bouchetia anomala* (Miers) Britton & Rusby subsp.  
*staticifolia* (Sendtn.) Loes. = **Bouchetia anomala**  
(Miers) Britton & Rusby  
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995a.

*Bouchetia erecta* auct. non Dunal = **Bouchetia anomala**  
(Miers) Britton & Rusby  
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995a.

[*Bouchetia erecta* Dunal]

Sin.: *Nierembergia miersiana* Sendtn.  
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995b.  
Notas: Especie excluida del área de proyecto.

**Brugmansia Pers.**

Número de especies: 1 introducida

[*Brugmansia arborea* (L.) Lagerh.]

Sin.: *Datura arborea* L.

Referencias: Preissel, U., 1997.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

**Brugmansia suaveolens** (Humb. & Bonpl. ex Willd.)

Bercht. & J. Presl

Sin.: *Datura suaveolens* Humb. & Bonpl. ex Willd.

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto o arbolito. Introducida. 100–500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(CAA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 878* (SI)];  
BRA[*Reitz, P. R. 4716* (HBR, US)]; PRY[*Schinini, A. 27771* (CTES)].

**Brunfelsia L.**

Número de especies: 6

*Brunfelsia acuminata* (Pohl) Benth. = **Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **brasiliensis**

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

**Brunfelsia australis** Benth.

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *australis* (Benth.) J.A. Schmidt, *Brunfelsia hopeana* auct. non (Hook.) Benth., *Brunfelsia paraguayensis* Chodat, *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don f. *intermedia* Hassl., *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don f. *obovatifolia* Hassl., *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don f. *typica* Hassl., nom. inval., *Franciscea australis* (Benth.) Miers, *Franciscea hopeana* Hook.

Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Hunt, D. R., 1978; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Plowman, T. C., 1979, 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–700 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(sin localidad).

Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 166* (SI)];  
BRA[*Rambo, B. 37819* (A, C, W)]; PRY[*Basualdo, I. 815* (FCQ, MO)]; URY[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 2197* (P)].

*Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.) L.B. Sm. & Downs var. *acuminata* (Pohl) L.B. Sm. & Downs = **Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **brasiliensis**

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

**Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **brasiliensis**

Sin.: *Brunfelsia acuminata* (Pohl) Benth., *Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.) L.B. Sm. & Downs var. *acuminata* (Pohl) L.B. Sm. & Downs, *Franciscea acuminata* Pohl, *Gerardia brasiliensis* Spreng.

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

Arbusto. Nativa. 300–700 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43398* (F)].

**Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **macrocalyx** (Dusén) Plowman

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *macrocalyx* Dusén

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

Arbusto. Nativa. 500–1100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13562* (GH, NY, S)].

*Brunfelsia calycina* Benth. = **Brunfelsia pauciflora** (Cham. & Schltdl.) Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

**Brunfelsia cuneifolia** J.A. Schmidt

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13044* (GH, MO, P, R, UC, US)].

*Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. = **Brunfelsia uniflora** (Pohl) D. Don

Referencias: Plowman, T. C., 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Brunfelsia hopeana* auct. non (Hook.) Benth. = **Brunfelsia australis** Benth.*Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *australis* (Benth.) J.A. Schmidt = **Brunfelsia australis** Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *macrocalyx* Dusén = **Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **macrocalyx** (Dusén) Plowman

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

*Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *pubescens* Benth. = **Brunfelsia uniflora** (Pohl) D. Don

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Brunfelsia mutabilis* (H.Jacq.) Vilm. = **Brunfelsia uniflora** (Pohl) D. Don

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Brunfelsia paraguayensis* Chodat = **Brunfelsia australis** Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

**Brunfelsia pauciflora** (Cham. & Schltdl.) Benth.

Sin.: *Brunfelsia calycina* Benth., *Brunfelsia pauciflora* (Cham. & Schltdl.) Benth. var. *calycina* J.A. Schmidt, *Franciscea calycina* (Benth.) Miers, *Franciscea pauciflora* Cham. & Schltdl.

Referencias: Plowman, T. C., 1998; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Nativa. 0–1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 13327 (F, GH, NY, S)].

*Brunfelsia pauciflora* (Cham. & Schltdl.) Benth. var. *calycina* J.A. Schmidt = **Brunfelsia pauciflora** (Cham. & Schltdl.) Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

**Brunfelsia pilosa** Plowman

Referencias: Plowman, T. C., 1979, 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

Arbusto. Nativa. 0–1100 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).

Ejemplares de referencia: ARG[Gamerro, J. C. 135 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 45415 (SI)]; PRY[Fiebrig, K. A. G. 5460 (G, GH, US)].

**Brunfelsia uniflora** (Pohl) D. Don

Sin.: *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth., *Brunfelsia hopeana* (Hook.) Benth. var. *pubescens* Benth., *Brunfelsia mutabilis* (H.Jacq.) Vilm., *Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don var. *pubescens* (Benth.) R.E.D.Baker & N.W.Simmonds, *Franciscea mutabilis* H.Jacq., *Franciscea uniflora* Pohl

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Plowman, T. C., 1979, 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

Arbusto. Nativa. 1500–2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 23935 (SI)].

*Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don f. *intermedia* Hassl. = **Brunfelsia australis** Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don f. *obovatifolia* Hassl. = **Brunfelsia australis** Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don f. *typica* Hassl., nom. inval. = **Brunfelsia australis** Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don var. *pubescens* (Benth.) R.E.D.Baker & N.W.Simmonds = **Brunfelsia uniflora** (Pohl) D. Don

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Cacabus flavus* I.M. Johnst. = **Exodeconus flavus** (I.M. Johnst.) Axelius & D'Arcy

Referencias: Axelius, B., 1994.

*Cacabus integrifolius* Phil. = **Exodeconus integrifolius** (Phil.) Axelius

Referencias: Axelius, B., 1994; Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1998.

*Cacabus pusillus* Bitter = **Exodeconus pusillus** (Bitter) Axelius

Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2003; Axelius, B., 1994.

**Calibrachoa Cerv. ex La Llave & Lex.**

Número de especies: 24, 19 endémicas

**Calibrachoa caesia** (Sendtn.) Wijsman

Sin.: *Calibrachoa elegans* auct. non (Miers) Stehmann & Semir, *Petunia caesia* Sendtn., *Petunia kleinii* L.B. Sm. & Downs

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Subarbusto. Endémica. 500–1500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[Parodi, L. R. 5571 (BAA)]; BRA[Reitz, P. R. 8142 (HBR, US)].

*Calibrachoa calycina* (Sendtn.) Wijsman = **Calibrachoa ovalifolia** (Miers) Stehmann & Semir

**Calibrachoa cordifolia** Stehmann & Aguilar

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 2005.

Subarbusto. Endémica. 0–600 m.

Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[Silveira, N. J. E. 5962 (HAS, UEC)].

**Calibrachoa dusenii** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia dusenii* R.E. Fr.

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 2005.

Subarbusto. Endémica. 900 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 6791 (MBM)].

**Calibrachoa eglandulata** Stehmann & Semir

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997, 2005.

Arbusto. Endémica. 1200 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Stehmann, J. R. 1764 (UEC)].

*Calibrachoa elegans* auct. non (Miers) Stehmann & Semir = **Calibrachoa caesia** (Sendtn.) Wijsman

**Calibrachoa ericifolia** (R.E. Fr.) Wijsman

Sin.: *Petunia ericifolia* R.E. Fr.

Subarbusto. Endémica. 0–200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 12820 (K, MBM, UPCB, US)].

**Calibrachoa excellens** (R.E. Fr.) Wijsman

Sin.: *Calibrachoa hassleriana* (R.E. Fr.) Wijsman, *Petunia excellens* R.E. Fr., *Petunia hassleriana* R.E. Fr., *Petunia variabilis* R.E. Fr.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1300 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(CAA, GUA); URY(TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[Krapovickas, A. 16848 (CTES)]; BRA[Stehmann, J. R. 1667 (BHCB)]; PRY[Hassler, E. 8735 (BM, G, K, NY, W)]; URY[Arechavaleta, J. 848-4817 (SI)].

**Calibrachoa felipponei** (Sandwith) Stehmann

Sin.: *Petunia felipponei* Sandwith  
 Referencias: Sandwith, N. Y., 1926.  
 Subarbusto. Endémica. 0–200 m.  
 Países: URY(MON).  
 Ejemplares de referencia: URY[*Felippone, F. 5085* (K)].

*Calibrachoa hassleriana* (R.E. Fr.) Wijsman  
 = **Calibrachoa excellens** (R.E. Fr.) Wijsman

**Calibrachoa heterophylla** (Sendtn.) Wijsman

Sin.: *Fabiana heterophylla* (Sendtn.) Dunal, *Petunia heterophylla* Sendtn.  
 Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966; Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1977.  
 Subarbusto. Endémica. 0–200 m.  
 Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS, SCA).  
 Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19356* (LP)]; BRA[*Stehmann, J. R. 1311* (UEC)].

**Calibrachoa humilis** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia humilis* R.E. Fr.  
 Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 2005.  
 Subarbusto. Endémica. 0–200 m.  
 Países: BRA(RGS); URY(SAO).  
 Ejemplares de referencia: BRA[*Stehmann, J. R. 284* (ICN)]; URY[*Osten, C. 3105* (US)].

**Calibrachoa linearis** (Hook.) Wijsman

Sin.: *Nierembergia intermedia* Graham, *Petunia intermedia* (Graham) G. Don, *Petunia linearis* (Hook.) Paxton, *Salpiglossis linearis* Hook.  
 Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Fries, R. E., 1911; Wijnands, D. O. & Westphal-Stevens, J. M. C., 1985; Wijsman, H. J. W., 1990.  
 Subarbusto. Endémica. 0–500 m.  
 Países: ARG(COS, ERI); URY(COL, RNO, PAY, SAO).  
 Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6361* (CTES, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 5404* (MVFA, UEC)].

**Calibrachoa linoides** (Sendtn.) Wijsman

Sin.: *Calibrachoa macrodactylon* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman, *Petunia linoides* Sendtn., *Petunia macrodactylon* L.B. Sm. & Downs  
 Referencias: Cosa de Gastiazoro, M., 1991; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
 Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.  
 Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(PAI).  
 Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8033* (BAB, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 13616* (HBR, US)]; PRY[*Hunziker, A. T. 20250* (CORD)].

*Calibrachoa macrodactylon* (L.B. Sm. & Downs)  
 Wijsman = **Calibrachoa linoides** (Sendtn.) Wijsman

**Calibrachoa micrantha** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia micrantha* R.E. Fr.  
 Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997, 2005.  
 Subarbusto. Nativa. 800–1000 m.  
 Países: BRA(PAR, SCA).  
 Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 51929* (MBM)].

**Calibrachoa missionica** Stehmann & Semir

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 2005.  
 Arbusto. Endémica. 0–500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(ITA).  
 Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 2126* (CTES, K)]; BRA[*Hagelund, K. 10424* (ICN)]; PRY[*Bertoni 4493* (W)].

**Calibrachoa ovalifolia** (Miers) Stehmann & Semir

Sin.: *Calibrachoa calycina* (Sendtn.) Wijsman, *Petunia calycina* Sendtn., *Petunia helianthemoides* Sendtn., *Petunia ovalifolia* Miers  
 Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.  
 Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); URY(ART, CLA, RIV, TYT).  
 Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 2880* (BR, US)]; BRA[*Stehmann, J. R. 1583* (BHCB, UEC)]; URY[*Berro, M. B. 1998* (G)].

**Calibrachoa paranensis** (Dusén) Wijsman

Sin.: *Calibrachoa rupestris* (Dusén) Wijsman, *Petunia paranensis* Dusén, *Petunia rupestris* Dusén  
 Subarbusto. Endémica. 800–1000 m.  
 Países: BRA(PAR).  
 Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23409* (MBM)].

*Calibrachoa parviflora* (Juss.) Wijsman, comb. superfl.  
 = **Calibrachoa parviflora** (Juss.) D'Arcy

**Calibrachoa parviflora** (Juss.) D'Arcy

Sin.: *Calibrachoa parviflora* (Juss.) Wijsman, comb. superfl., *Leptophragma montevidensis* (Spreng.) Dunal, *Leptophragma prostrata* (Hook. & Arn.) Benth., *Lindernia montevidensis* Spreng., *Nicotiana parviflora* (Juss.) Lehm., *Nierembergia viscidula* Kunth, *Petunia parviflora* Juss., *Petunia parviflora* Juss. var. *glabriuscula* Dunal, *Petunia parviflora* Juss. var. *villosa* Dunal, *Petunia viscidula* (Kunth) Miers, *Salpiglossis prostrata* Hook. & Arn.  
 Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Fries, R. E., 1911; Rossow, R. A., 1999f.  
 Hierba. Anual. Nativa. 0–300 m.  
 Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(V); PRY(COA); URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, SAO, SOR, TAC, TYT).  
 Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 117* (CORD)]; BRA[*Stehmann, J. R. 995* (ICN)]; CHL[*Miers, J. 1017* (BM)]; PRY[*Hassler, E. 12405* (BM, E, G)]; URY[*Osten, C. 5266* (US)].

**Calibrachoa pubescens** (Spreng.) Stehmann

Sin.: *Nierembergia graveolens* Dunal, hom. illeg., *Nierembergia pubescens* Spreng., *Petunia pubescens* (Spreng.) R.E. Fr.  
 Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.  
 Países: ARG(COS); URY(MON).  
 Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5215* (BAA, BAB, SI)]; URY[*Felippone, F. 5095* (K)].

**Calibrachoa pygmaea** (R.E. Fr.) Wijsman

Sin.: *Petunia pygmaea* R.E. Fr.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Cosa de Gastiazoro, M., 1991

Hierba. Anual. Endémica. 0–300 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, CAS, DUR, FLO, FLA, MON, PAY, SAO, SOR, TAC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 28557 (SI)]; BRA[Stehmann, J. R. 2048 (UEC)]; URY[Herter, G. 1144 (G, M, NY, US)].

*Calibrachoa rupestris* (Dusén) Wijsman = **Calibrachoa paranensis** (Dusén) Wijsman

**Calibrachoa scabridula** (C.V. Morton) Stehmann

Sin.: *Petunia scabridula* C.V. Morton

Referencias: Morton, C. V., 1944.

Subarbusto. Endémica. 0–300 m.

Países: URY(CAS).

Ejemplares de referencia: URY[Osten, C. 20060 (US)].

**Calibrachoa sellowiana** (Sendtn.) Wijsman

Sin.: *Fabiana sellowiana* (Sendtn.) Dunal, *Petunia alpicola* L.B. Sm. & Downs, *Petunia sellowiana* Sendtn.

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966; Wijsman, H. J. W., 1990.

Subarbusto. Endémica. 500–1900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 2627 (HBR, US)].

**Calibrachoa sendtneriana** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia sendtneriana* R.E. Fr.

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

Subarbusto. Endémica. 1400–1900 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 7761 (FLOR, G, HBR, K, L, US)].

**Calibrachoa serrulata** (L.B. Sm. & Downs) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia serrulata* L.B. Sm. & Downs

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966; Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

Subarbusto. Endémica. 1400–1500 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 7446 (FLOR, HBR, L, MBM, NY, US)].

**Calibrachoa spatulata** (L.B. Sm. & Downs) Stehmann & Semir

Sin.: *Petunia spatulata* L.B. Sm. & Downs

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966; Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

Subarbusto. Endémica. 1000–1300 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Smith, L. B. 8907 (HBR, R, US)].

**Calibrachoa thymifolia** (A. St.-Hil.) Stehmann & Semir

Sin.: *Fabiana thymifolia* A. St.-Hil., *Petunia thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

Subarbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(ART, COL, MON, RNO).

Ejemplares de referencia: ARG[Burkart, A. 25280 (SI)]; BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 2606* (P)]; URY[*Del Puerto, O. 14731* (MVFA)].

**Capsicum L.**

Número de especies: 5

**Capsicum baccatum L. var. baccatum**

Sin.: *Capsicum microcarpum* Cav., *Capsicum microcarpum* Cav. var. *tomentosum* Chodat & Hassl.

Referencias: Barboza, G. E. & Bianchetti, L. B., 2005; Cabrera, A. L., 1983d; Eshbaugh, H. W., 1970; Hunziker, A. T., 1998a; Mereles, F., 2001.

Arbusto. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, PAI, SPE); URY(RIV).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 458 (CORD)]; BRA[Mentz, L. A. 263 (CORD, ICN)]; PRY[Schinini, A. 27787 (CTES)]; URY[Bayce, D. 17365 (MVFA)].

**Capsicum baccatum L. var. praetermissum** (Heiser & P.G. Sm.) Hunz.

Sin.: *Capsicum praetermissum* Heiser & P.G. Sm., *Capsicum villosum* auct. non Sendtn.

Referencias: Barboza, G. E. & Bianchetti, L. B., 2005.

Arbusto. Nativa. 0–1500 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Klein, R. M. 2774 (US)].

*Capsicum breviflorum* (Sendtn.) Hunz. = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

**Capsicum chacoense** Hunz.

Sin.: *Capsicum chacoense* Hunz. var. *tomentosum* Hunz.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hunziker, A. T., 1950a, 1998a.

Arbusto. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 24963 (CORD)]; PRY[Mereles, F. 5536 (FCQ)].

*Capsicum chacoense* Hunz. var. *tomentosum* Hunz. = **Capsicum chacoense** Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1998a.

*Capsicum crassiflorum* (Dunal) Kuntze = **Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. **tomentella** (Sendtn.) Barboza & Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1991[1990].

**Capsicum eximium** Hunz.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Eshbaugh, H. W., 1982; Hunziker, A. T., 1950a, 1998a.

Arbusto. Nativa. 1000–3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

- Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 47426* (CTES)].
- Capsicum fasciculatum* (Vell.) Kuntze = **Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. **fasciculata**  
Referencias: Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1991[1990].
- Capsicum flexuosum** Sendtn.  
Sin.: *Capsicum schottianum* auct. non Sendtn.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1950a, 1998a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Moscone, E. A., 1992.  
Arbusto. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI, SPE).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 3391* (CORD, SI)]; BRA[*Hunziker, A. T. 2492* (CORD)]; PRY[*Jiménez, B. 1651* (BM, CTES, MO, PY)].
- Capsicum glandulosum* Dunal = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.
- Capsicum lucidum* (Moric.) Kuntze = **Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. **fasciculata**  
Referencias: Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1991[1990].
- Capsicum microcarpum* Cav. = **Capsicum baccatum** L. var. **baccatum**  
Referencias: Hunziker, A. T., 1998a.
- Capsicum microcarpum* Cav. var. *tomentosum* Chodat & Hassl. = **Capsicum baccatum** L. var. **baccatum**  
Referencias: Hunziker, A. T., 1998a.
- Capsicum mirabile* auct. non Mart. ex Sendtn. = **Capsicum recurvatum** Witasek
- Capsicum praetermissum* Heiser & P.G. Sm. = **Capsicum baccatum** L. var. **praetermissum** (Heiser & P.G. Sm.) Hunz.
- Capsicum pyraster* (Dunal) Kuntze = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.
- Capsicum recurvatum** Witasek  
Sin.: *Capsicum mirabile* auct. non Mart. ex Sendtn.  
Referencias: Barboza, G. E. & Bianchetti, L. B., 2005.  
Arbusto. Nativa. 100–900 m.  
Países: BRA(PAR).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Mentz, L. A. 289* (CORD, ICN)].
- Capsicum schottianum* auct. non Sendtn. = **Capsicum flexuosum** Sendtn.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1998a.
- Capsicum tomentosum* (Sendtn.) Kuntze = **Aureliana tomentosa** Sendtn.  
Referencias: Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1991[1990].

*Capsicum villosum* auct. non Sendtn. = **Capsicum baccatum** L. var. **praetermissum** (Heiser & P.G. Sm.) Hunz.

## Cestrum L.

Número de especies: 18, 3 endémicas

*Cestrum albotomentosum* Dammer ex Francey = **Cestrum velutinum** Hiern  
Referencias: Nee, M., 2001.

*Cestrum amictum* Schltld. = **Cestrum bracteatum** Link & Otto  
Referencias: Nee, M., 2001.

[*Cestrum amictum* Schltld. f. *elongatum* Francey]  
Referencias: Nee, M., com. pers.  
Notas: Nombre dudoso.

[*Cestrum amictum* Schltld. f. *paranense* Witasek]  
Referencias: Nee, M., com. pers.  
Notas: Nombre dudoso.

*Cestrum amictum* Schltld. var. *longiflorum* (Sendtn.) Dunal = **Cestrum bracteatum** Link & Otto var. **longiflorum** Sendtn.  
Referencias: Nee, M., com. pers.

*Cestrum amictum* Schltld. var. *parviflorum* (Sendtn.) Dunal = **Cestrum bracteatum** Link & Otto  
Referencias: Nee, M., com. pers.

**Cestrum auriculatum** L'Hér.  
Referencias: Nee, M., 2001.  
Arbusto. Nativa. 1800 m.  
Países: CHL(I).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Shepard, K. S. 324* (NY)].

[*Cestrum bonariense* Dunal]  
Notas: Nombre dudoso.

## Cestrum bracteatum Link & Otto

Sin.: *Cestrum amictum* Schltld., *Cestrum amictum* Schltld. var. *parviflorum* (Sendtn.) Dunal, *Cestrum bracteatum* Link & Otto var. *amictum* (Schltld.) Sendtn., *Cestrum bracteatum* Link & Otto var. *parviflorum* Sendtn.  
Referencias: Eskuche, U. G., 1989; Nee, M., com. pers.; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto. Nativa. 0–900 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 489* (CORD)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11477* (S)].

*Cestrum bracteatum* Link & Otto var. *amictum* (Schltld.) Sendtn. = **Cestrum bracteatum** Link & Otto  
Referencias: Nee, M., com. pers.

[*Cestrum bracteatum* Link & Otto var. *longiflorum* Sendtn.]  
Sin.: *Cestrum amictum* Schltld. var. *longiflorum* (Sendtn.) Dunal

- Referencias: Nee, M., com. pers.  
Notas: Nombre dudoso.
- Cestrum bracteatum* Link & Otto var. *parviflorum* Sendtn. = **Cestrum bracteatum** Link & Otto  
Referencias: Nee, M., com. pers.
- Cestrum calycinum* Kunth = **Cestrum strigilatum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954b.
- Cestrum calycinum* Willd. ex Roem. & Schult., hom. illeg. = **Cestrum strigilatum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954b.
- Cestrum calycinum* Willd. ex Roem. & Schult. var. *tenuiflorum* Francey = **Cestrum strigilatum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954b.
- Cestrum campestre* Griseb. = **Cestrum parqui** L'Hér.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954b.
- Cestrum conglomeratum* auct. non Ruiz & Pav. = **Cestrum parqui** L'Hér.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.
- Cestrum cordatum** Schott ex Sendtn.  
Referencias: Francey, P., 1935.  
Arbusto. Nativa.  
Países: PRY(COA).  
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7073* (G)].
- Cestrum coriaceum** Miers  
Referencias: Francey, P., 1935.  
Arbustiforme. Perenne. Nativa. 0–800 m.  
Países: BRA(PAR).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11767* (S)].
- Cestrum corymbosum* auct. non Schldtl. = **Cestrum euanthes** Schldtl.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.
- Cestrum corymbosum** Schldtl. var. **corymbosum**  
Referencias: Francey, P., 1936; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, COA, PAI, SPE); URY(ART, CLA, PAY, RNO, SJO, TAC, TYT).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2221* (S)]; PRY[*Jiménez, B. 1474* (BM, CTES, G, MO, PY)]; URY[*Del Puerto, O. 9425* (MVFA)].
- Cestrum corymbosum** Schldtl. var. **hirsutum** Francey  
Referencias: Francey, P., 1936; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto. Endémica. 800 m.
- Países: BRA(SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Mueller s.n.* (B)].
- Cestrum euanthes** Schldtl.  
Sin.: *Cestrum corymbosum* auct. non Schldtl., *Cestrum pseudoquina* auct. non Mart., *Cestrum sellowianum* Sendtn.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954a, b.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR); PRY(PHA); URY(CAS, SJO).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5262* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 6827* (S)]; PRY[*Degen, R. 3137* (FCQ)]; URY[*Cabezas de Aragunde, J. 18* (MVFQ), *Herter, G. 5447* (M)].
- Cestrum floribundum* Britton = **Cestrum reflexum** Sendtn.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.
- Cestrum guaraniticum** Chodat & Hassl.  
Referencias: Francey, P., 1935; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954a, b.  
Arbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); PRY(CON, PAI, PHA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1634* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 4660* (FCQ, MO)].
- [*Cestrum guaraniticum* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Hassl.]  
Referencias: Francey, P., 1936.  
Notas: Nombre dudoso.
- Cestrum hassleri** Francey  
Referencias: Francey, P., 1935.  
Arbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: PRY(AMA).  
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 10310* (B)].
- Cestrum intermedium** Sendtn.  
Referencias: Francey, P., 1936; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966; Stutz, L. C., 1983.  
Arbusto. Nativa. 0–700 m.  
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17671* (S)]; PRY[*Stutz, L. C. 1120* (G)].
- Cestrum kunthii** Francey  
Referencias: Francey, P., 1936; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954a, b.  
Arbusto. Endémica. 900–2000 m.  
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 776* (CORD)].
- Cestrum laevigatum** Schldtl.  
Sin.: *Cestrum laevigatum* Schldtl. var. *evolutum* Schldtl., *Cestrum laevigatum* Schldtl. var. *paraguayense* Francey, *Cestrum laevigatum* Schldtl. var. *pauperculum* Francey  
Referencias: Francey, P., 1935; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954a, b.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAA, GUA).

- Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, *F. O. 6708* (SI)]; PRY[Schinini, *A. 27752* (CTES)].
- Cestrum laevigatum* Schltld. f. *flaviflora* Chodat & Hassl.  
= **Cestrum mariquitense** Kunth
- Cestrum laevigatum* Schltld. var. *evolutum* Schltld.  
= **Cestrum laevigatum** Schltld.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.
- Cestrum laevigatum* Schltld. var. *paraguayense* Francey  
= **Cestrum laevigatum** Schltld.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.
- Cestrum laevigatum* Schltld. var. *pauperculum* Francey  
= **Cestrum laevigatum** Schltld.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.
- Cestrum lorentzianum** Griseb.  
Sin.: *Cestrum pubens* Griseb.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Francey, P., 1936; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954a, b.  
Arbusto o árbol. Nativa. 500–2000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Lorentz, *P. G. 293* (CORD, GOET)].
- Cestrum mariquitense** Kunth  
Sin.: *Cestrum laevigatum* Schltld. f. *flaviflora* Chodat & Hassl., *Cestrum mariquitense* Kunth var. *latifolium* Standl. & C.V. Morton, *Cestrum paraguayense* Hassl. ex Francey, nom. nud., *Cestrum sendtnerianum* Mart.  
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Knapp, S., Stafford, M., Sousa-Peña, M. & Martínez, M., 2005; Nee, M., 2001; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.  
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, SPE).  
Ejemplares de referencia: ARG[Múlgura de Romero, *M. E. 1634* (SI)]; PRY[Hassler, *E. 5042* (BM), Zardini, *E. M. 4021* (FCQ)].
- Cestrum mariquitense* Kunth var. *latifolium* Standl. & C.V. Morton = **Cestrum mariquitense** Kunth  
Referencias: Knapp, S., Stafford, M., Sousa-Peña, M. & Martínez, M., 2005.
- [*Cestrum morretense* Toledo]  
Referencias: Nee, M., 2001.  
Notas: Nombre dudoso.
- [*Cestrum nocturnum* L.]  
Referencias: Nee, M., 2001; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.
- Cestrum paraguayense* Hassl. ex Francey, nom. nud.  
= **Cestrum mariquitense** Kunth  
Referencias: Nee, M., 2001.
- Cestrum parqui** L'Hér.  
Sin.: *Cestrum campestre* Griseb., *Cestrum conglomeratum* auct. non Ruiz & Pav., *Cestrum parqui* L'Hér. f. *heterophyllum* Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *glabriusculum* Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *longiflorum* Francey, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *oranense* Scolnik, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *poepigii* Dunal, *Cestrum virgatum* Ruiz & Pav.  
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Plissock, P., 2002; Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Scolnik, R., 1954a, b.  
Arbusto. Nativa. 0–2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(COA, PHA); URY(ROC, TAC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, *G. E. 378* (CORD)]; BRA[Sobral, *M. 3279* (ICN)]; CHL[Gunckel, *L. H. 37353* (CONC)]; PRY[Degen, *R. 3448* (CTES, FCQ, MO)]; URY[Alonso Paz, *E. 3657* (MVFQ)].
- Cestrum parqui* L'Hér. f. *heterophyllum* Kuntze  
= **Cestrum parqui** L'Hér.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954b.
- Cestrum parqui* L'Hér. var. *glabriusculum* Kuntze  
= **Cestrum parqui** L'Hér.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954b.
- Cestrum parqui* L'Hér. var. *longiflorum* Francey  
= **Cestrum parqui** L'Hér.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954b.
- Cestrum parqui* L'Hér. var. *oranense* Scolnik = **Cestrum parqui** L'Hér.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.
- Cestrum parqui* L'Hér. var. *poepigii* Dunal = **Cestrum parqui** L'Hér.
- [*Cestrum pseudoquina* Mart.]  
Notas: Nombre dudoso.
- Cestrum pseudoquina* auct. non Mart. = **Cestrum euanthes** Schltld.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.
- Cestrum pubens* Griseb. = **Cestrum lorentzianum** Griseb.  
Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik, R., 1954b.
- Cestrum reflexum** Sendtn.  
Sin.: *Cestrum floribundum* Britton, *Cestrum reflexum* Sendtn. var. *densiflorum* Francey  
Referencias: Legname, P. R., 1973a; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.  
Arbusto. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[Ule, *E. H. G. 5491* (CORD)].

*Cestrum reflexum* Sendtn. var. *densiflorum* Francey  
= **Cestrum reflexum** Sendtn.

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.

*Cestrum rojasianum* Hassl. = **Cestrum tubulosum**  
Sendtn.

Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1998;  
Francey, P., 1935.

*Cestrum sellowianum* Sendtn. = **Cestrum euanthes**  
Schltdl.

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998; Scolnik,  
R., 1954b.

*Cestrum sendtnerianum* Mart. = **Cestrum mariquitense**  
Kunth

Referencias: Nee, M., 2001.

**Cestrum strigilatum** Ruiz & Pav.

Sin.: *Cestrum calycinum* Kunth, *Cestrum calycinum* Willd. ex  
Roem. & Schult. var. *tenuiflorum* Francey, *Cestrum*  
*calycinum* Willd. ex Roem. & Schult., hom. illeg.,  
*Cestrum strigilatum* Ruiz & Pav. var. *calycinum*  
Kuntze, *Cestrum strigilatum* Ruiz & Pav. var.  
*laxiflorum* Kuntze, *Cestrum viridiflorum* Hook.

Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997;  
Cabrera, A. L., 1983d; Jiménez, B., Knapp, S., Marín,  
G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Romanutti, A. &  
Hunziker, A. T., 1998; Sayagués, L., Graf, E. &  
Delfino, L., 2000; Scolnik, R., 1954a, b; Smith, L. B. &  
Downs, R. J., 1966; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. &  
Zardini, E. M., 1994; Stutz, L. C., 1983.

Arbusto. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE,  
TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA,  
CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(RIV, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6696* (SI)];  
BRA[*Dusén, P. K. H. 16561* (S)]; PRY[*Zardini, E. M.*  
*4495* (FCQ, MO)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (CORD)].

*Cestrum strigilatum* Ruiz & Pav. var. *calycinum* Kuntze  
= **Cestrum strigilatum** Ruiz & Pav.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Cestrum strigilatum* Ruiz & Pav. var. *laxiflorum* Kuntze  
= **Cestrum strigilatum** Ruiz & Pav.

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.

**Cestrum tubulosum** Sendtn.

Sin.: *Cestrum rojasianum* Hassl.

Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1998;  
Francey, P., 1935.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 10033* (G)].

**Cestrum velutinum** Hiern

Sin.: *Cestrum albotomentosum* Dammer ex Francey

Referencias: Francey, P., 1935; Romanutti, A. & Hunziker,  
A. T., 1998.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3132* (SI)];  
PRY[*Rojas, T. 9947* (G)].

*Cestrum vestioides* Schltdl. = **Sessea vestioides** (Schltdl.)  
Hunz.

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.

*Cestrum virgatum* Ruiz & Pav. = **Cestrum parqui** L'Hér.  
Referencias: Nee, M., com. pers.

*Cestrum viridiflorum* Hook. = **Cestrum strigilatum** Ruiz  
& Pav.

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.

*Chamaesaracha boliviensis* Dammer = **Solanum**  
**chamaesarachidium** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Nee, M., 1999.

*Citharexylum mendocinum* Phil. = **Grabowskia obtusa**  
Arn.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

*Collomia patagonica* Speg. = **Nicotiana linearis** Phil.

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.

## Combera Sandwith

Número de especies: 2 endémicas

**Combera minima** (Phil.) Sandwith

Sin.: *Nicotiana minima* Phil., *Petunia minima* (Phil.) Reiche  
Referencias: Hunziker, A. T., 1979b, 2000a; Ricardi, M.,  
1962.

Hierba. Perenne. Endémica. 1800 m.

Países: CHL(X).

Ejemplares de referencia: CHL[*Pearce, R. s.n.* (SGO)].

**Combera paradoxa** Sandwith

Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Hunziker,  
A. T., 1979b, 2000a; Ricardi, M., 1962; Rossow, R. A.,  
1999f.

Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3200 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, XI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Bernardello, G. 658*  
(CORD)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

*Cyclostigma tenue* Phil. = **Leptoglossis linifolia** (Miers)  
Griseb.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Cyphomandra abutiloides* Griseb. = **Solanum**  
**abutiloides** (Griseb.) Bitter & Lillo

Referencias: Bohs, L., 1994a; Cabrera, A. L., 1983d.

*Cyphomandra adelpha* (C.V. Morton) A. Child ex Bohs  
= **Solanum confusum** C.V. Morton

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Cyphomandra angustifolia* L.B. Sm. & Downs

= **Solanum pinetorum** (L.B. Sm. & Downs) Bohs

Referencias: Bohs, L., 1994a.

*Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn. = **Solanum**  
**betaceum** Cav.

Referencias: Bohs, L., 1995.

*Cyphomandra cornigera* Dunal = **Solanum pelagicum** Bohs  
Referencias: Bohs, L., 2001.

*Cyphomandra corymbiflora* Sendtn. = **Solanum corymbiflorum** (Sendtn.) Bohs subsp. **corymbiflorum**  
Referencias: Bohs, L., 1995; Nee, M., 1999.

*Cyphomandra corymbiflora* Sendtn. subsp. *mortoniana* (L.B. Sm. & Downs) Bohs = **Solanum corymbiflorum** (Sendtn.) Bohs subsp. **mortoniana** (L.B. Sm. & Downs) Bohs

*Cyphomandra crassifolia* (Ortega) Kuntze = **Solanum betaceum** Cav.

*Cyphomandra diploconos* (Mart.) Sendtn. = **Solanum diploconos** (Mart.) Bohs  
Referencias: Bohs, L., 1995; Nee, M., 1999.

*Cyphomandra divaricata* (Mart.) Sendtn. = **Solanum melissarum** Bohs  
Referencias: Bohs, L., 1995; Nee, M., 1999.

*Cyphomandra divaricata* (Mart.) Sendtn. var. *herbacea* Sendtn. = **Solanum melissarum** Bohs  
Referencias: Bohs, L., 1994a.

*Cyphomandra flagrans* (Ten.) Walp. = **Solanum pseudoquina** A. St.-Hil.  
Referencias: Bohs, L., 1994a.

*Cyphomandra fragans* (Hook.) Sendtn. = **Solanum diploconos** (Mart.) Bohs

*Cyphomandra fusiformis* (L.B. Sm. & Downs) A. Child ex Bohs = **Solanum fusiforme** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Bohs, L., 2001.

*Cyphomandra hispida* L.B. Sm. & Downs = **Solanum pinetorum** (L.B. Sm. & Downs) Bohs  
Referencias: Bohs, L., 1994a.

*Cyphomandra kleinii* L.B. Sm. & Downs = **Solanum corymbiflorum** (Sendtn.) Bohs subsp. **corymbiflorum**  
Referencias: Bohs, L., 1994a.

*Cyphomandra macrophylla* L.B. Sm. & Downs = **Solanum corymbiflorum** (Sendtn.) Bohs subsp. **corymbiflorum**  
Referencias: Bohs, L., 1994a.

*Cyphomandra maritima* L.B. Sm. & Downs = **Solanum pelagicum** Bohs  
Referencias: Bohs, L., 2001.

*Cyphomandra mortoniana* L.B. Sm. & Downs = **Solanum corymbiflorum** (Sendtn.) Bohs subsp. **mortoniana** (L.B. Sm. & Downs) Bohs

*Cyphomandra patrum* L.B. Sm. & Downs = **Solanum corymbiflorum** (Sendtn.) Bohs subsp. **mortoniana** (L.B. Sm. & Downs) Bohs

*Cyphomandra pinetorum* L.B. Sm. & Downs = **Solanum pinetorum** (L.B. Sm. & Downs) Bohs  
Referencias: Bohs, L., 1995; Nee, M., 1999.

*Cyphomandra premnifolia* (Miers) Dunal = **Solanum premnifolium** (Miers) Bohs  
Referencias: Bohs, L., 1995; Nee, M., 1999.

*Cyphomandra reitzii* L.B. Sm. & Downs = **Solanum sciadostylis** (Sendtn.) Bohs

*Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. = **Solanum sciadostylis** (Sendtn.) Bohs  
Referencias: Bohs, L., 1995; Nee, M., 1999.

*Cyphomandra sciadostylis* Sendtn. var. *trichocarpa* Hassl. = **Solanum sciadostylis** (Sendtn.) Bohs  
Referencias: Bohs, L., 1994a.

*Cyphomandra stuckertii* (Bitter) D'Arcy = **Solanum stuckertii** Bitter  
Referencias: Bohs, L., 2001; Nee, M., 1999.

*Cyphomandra subhastata* (L.B. Sm. & Downs) A. Child ex Bohs = **Solanum subhastatum** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Cyphomandra verruculosa* Hassl. = **Solanum corumbense** S. Moore  
Referencias: Bohs, L., 1994a; Knapp, S., 2002.

## **Datura L.**

Número de especies: 3, 2 introducidas

[*Datura albiflora* Rojas Acosta]  
Notas: Nombre dudoso.

*Datura arborea* L. = **Brugmansia arborea** (L.) Lagerh.  
Referencias: Preissel, U., 1997.

*Datura bertolonii* auct. non Parl. = **Datura stramonium** L.

## **Datura ferox L.**

Referencias: Cabrera, A. L., 1965b, 1979, 1983d; Rossow, R. A., 1999f; Satina, S. & Avery, A. G., 1959.

Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, NEU, SAL); CHL(III, IV, VI, VII, VIII, X, RME); URY(CAS, COL, FLA, MON, SJO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar*, L. 255 (CORD)]; CHL[*Matthei*, O. R. 453 (CONC)]; URY[*Del Puerto*, O. 9030 (MVFA), *Herter*, G. 78037 (M)].

*Datura guayaquilensis* Kunth = **Datura innoxia** Mill.  
Referencias: Satina, S. & Avery, A. G., 1959.

*Datura inermis* Juss. = **Datura stramonium** L.

Referencias: Satina, S. & Avery, A. G., 1959.

**Datura inoxia** Mill.

Sin.: *Datura guayaquilensis* Kunth

Referencias: Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Satina, S. & Avery, A. G., 1959.

Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC); CHL(II); PRY(APY, CON, PAI); URY(ART).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 588* (CORD)]; CHL[*Marticorena, C. 9922* (CONC)]; PRY[*Kiesling, R. 9718* (G, PY, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 6003* (MVFA)].

**Datura stramonium** L.

Sin.: *Datura bertolonii* auct. non Parl., *Datura inermis* Juss., *Datura tatula* L.

Referencias: Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Parodi, L. R., 1943a; Rossow, R. A., 1999f; Satina, S. & Avery, A. G., 1959; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.

Países: ARG(COR, COS, ERI, NEU, RNE, SDE, SFE); BRA(SCA); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, IJF, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 1090* (BAB)]; BRA[*Reitz, P. R. 6623* (HBR, US)]; CHL[*Matthei, O. R. 416* (CONC)].

*Datura suaveolens* Humb. & Bonpl. ex Willd.

= **Brugmansia suaveolens** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl

*Datura tatula* L. = **Datura stramonium** L.

Referencias: Satina, S. & Avery, A. G., 1959.

*Dierbachia australis* (Griseb.) Kuntze = **Ioichroma australe** Griseb.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Dierbachia brachyacantha* (Miers) Kuntze = **Dunalia brachyacantha** Miers

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Dierbachia breviflora* (Sendtn.) Kuntze = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Dierbachia lyciodes* (Miers) Kuntze = **Dunalia spinosa** (Meyen) Dammer

Referencias: Hunziker, A. T., 1960.

*Dierbachia lyciodes* (Miers) Kuntze f. *achalensis* Kuntze, hom. illeg. = **Dunalia brachyacantha** Miers

Referencias: Hunziker, A. T., 1960.

*Dierbachia parviflora* (Sendtn.) Kuntze = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

*Dierbachia senticosa* (Miers) Kuntze = **Dunalia brachyacantha** Miers

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Dittostigma mendocinum* Phil. = **Nicotiana noctiflora** Hook.

*Dolichosiphon volkmanni* Phil. = **Jaborosa volkmannii** (Phil.) Reiche

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987; Rossow, R. A., 1999g.

*Dorystigma caulescens* (Gillies & Hook.) Miers = **Jaborosa caulescens** Gillies & Hook. var. **caulescens**

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Dorystigma squarrosus* Miers = **Jaborosa squarrosa** (Miers) Hunz. & Barboza

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

**Dunalia** Kunth

Número de especies: 2

*Dunalia achalensis* Dammer = **Dunalia brachyacantha** Miers

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Dunalia arborescens* (L.) Sleumer = **Acnistus arborescens** (L.) Schltld.

Referencias: Hunziker, A. T., 1982b.

*Dunalia australis* (Griseb.) Sleumer = **Ioichroma australe** Griseb.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

**Dunalia brachyacantha** Miers

Sin.: *Acnistus achalensis* Hieron. ex Seckt, nom. nud., *Dierbachia brachyacantha* (Miers) Kuntze, *Dierbachia lyciodes* (Miers) Kuntze f. *achalensis* Kuntze, hom. illeg., *Dierbachia senticosa* (Miers) Kuntze, *Dunalia achalensis* Dammer, *Dunalia hauthalii* Dammer, *Dunalia herzogii* Dammer, *Dunalia pflanzii* Dammer, *Dunalia senticosa* Miers

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hunziker, A. T., 1960, 1979b; Moscone, E. A., 1992.

Arbusto o árbol. Nativa. 1500–3000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Negrutto, M. A. 457* (CORD, CTES, SI)].

*Dunalia breviflora* (Sendtn.) Sleumer = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hunziker, A. T., 1982b.

*Dunalia hauthalii* Dammer = **Dunalia brachyacantha** Miers

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Dunalia herzogii* Dammer = **Dunalia brachyacantha** Miers

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Dunalia lorentzii* (Dammer) Sleumer = **Eriolarynx lorentzii** (Dammer) Hunz.

*Dunalia lycioides* Miers = **Dunalia spinosa** (Meyen) Dammer  
Referencias: Hunziker, A. T., 1960.

*Dunalia pflanzii* Dammer = **Dunalia brachyacantha** Miers  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Dunalia senticosa* Miers = **Dunalia brachyacantha** Miers  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

**Dunalia spinosa** (Meyen) Dammer  
Sin.: *Atropa spinosa* Meyen, *Dierbachia lycioides* (Miers) Kuntze, *Dunalia lycioides* Miers, *Grabowskia meyeniana* (Nees) Walp.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1960.  
Arbusto. Nativa. 3500 m.  
Países: CHL(I).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1064* (GH, K, LIL, NY, UC)].

## Dyssochroma Miers

Número de especies: 2

**Dyssochroma longipes** (Sendtn.) Miers  
Sin.: *Markea longipes* (Sendtn.) Cuatrec., *Solandra longipes* Sendtn.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1977a, 1979b; Persson, V., Knapp, S. & Blackmore, S., 1994.  
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40196* (CORD, MBM)].

**Dyssochroma viridiflorum** (Sims) Miers  
Sin.: *Solandra viridiflora* Sims  
Referencias: Hunziker, A. T., 1979b, 2001; Persson, V., Knapp, S. & Blackmore, S., 1994.  
Arbusto. Nativa.  
Países: BRA(SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Schwacke, C. A. W. 13212* (P)].

## Eriolarynx (Hunz.) Hunz.

Número de especies: 2 endémicas

**Eriolarynx iochromoides** (Hunz.) Hunz.  
Sin.: *Vassobia iochromoides* Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1986, 2000b.  
Arbusto o árbol. Endémica. 1000–2000 m.  
Países: ARG(CAT).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 854* (CORD)].

**Eriolarynx lorentzii** (Dammer) Hunz.  
Sin.: *Acnistus lorentzii* Dammer, *Dunalia lorentzii* (Dammer) Sleumer, *Vassobia lorentzii* (Dammer) Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 2000b; Moscone, E. A., 1992.  
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.

Países: ARG(CAT, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3651* (GH, LIL, LP)].

## Exodeconus Raf.

Número de especies: 3, 1 endémica

**Exodeconus flavus** (I.M. Johnst.) Axelius & D'Arcy  
Sin.: *Cacabus flavus* I.M. Johnst.  
Referencias: Arroyo-Leuenerger, S. C., 2003; Axelius, B., 1994; Barboza, G. E., Carrizo García, C. & Hunziker, A. T., 1997.  
Hierba. Anual. Nativa. 2000–2500 m.  
Países: CHL(I).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2782* (B, CONC, SGO)].

**Exodeconus integrifolius** (Phil.) Axelius  
Sin.: *Cacabus integrifolius* Phil.  
Referencias: Arroyo-Leuenerger, S. C., 2003; Axelius, B., 1994; Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1998.  
Hierba. Anual. Endémica. 2300–4000 m.  
Países: ARG(CAT); CHL(I, II, III).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 9929* (CORD, SI)]; CHL[*Eggli, U. 2781* (B, CONC, SGO)].

## Exodeconus pusillus (Bitter) Axelius

Sin.: *Cacabus pusillus* Bitter  
Referencias: Arroyo-Leuenerger, S. C., 2003; Axelius, B., 1994.  
Hierba. Anual. Nativa. 2500–3000 m.  
Países: CHL(I).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2800* (B, CONC, SGO)].

## Fabiana Ruiz & Pav.

Número de especies: 14, 8 endémicas

*Fabiana araucana* Phil. = **Fabiana imbricata** Ruiz & Pav.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

*Fabiana barrosi* Phil. = **Fabiana viscosa** Hook. & Arn.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

*Fabiana biflora* J. Remy = **Fabiana imbricata** Ruiz & Pav.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

## Fabiana bryoides Phil.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b; Cabrera, A. L., 1983d; Navarro, G., 1993; Zöllner, O., 1987.  
Arbusto. Nativa. 3100–4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(II, III, IV).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 3216* (LIL, SI)]; CHL[*Arancio, G. 10496* (ULS)].

*Fabiana clarenii* Dammer = **Fabiana densa** J. Remy

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

*Fabiana coridifolia* Dunal = **Fabiana viscosa** Hook. & Arn.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

**Fabiana densa** J. Remy

Sin.: *Fabiana clarenii* Dammer

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b; Cabrera, A. L., 1983d.

Arbusto. Nativa. 2500–4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(III).

Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 641* (LP, SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (CORD)].

*Fabiana densa* J. Remy var. *ramulosa* Wedd. = **Fabiana ramulosa** (Wedd.) Hunz. & Barboza

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

**Fabiana denudata** Miers

Sin.: *Fabiana hieronymi* Niederl.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b; Zöllner, O., 1987.

Arbusto. Endémica. 300–4500 m.

Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU); CHL(I, II).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 995* (CORD)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94077* (CONC)].

*Fabiana deserticola* Reiche = **Fabiana ramulosa** (Wedd.) Hunz. & Barboza

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

*Fabiana ericoides* Dunal = **Fabiana viscosa** Hook. & Arn.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

**Fabiana foliosa** (Speg.) S.C. Arroyo

Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var. *foliosa* Speg.

Referencias: Arroyo, S. C., 1976, 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a; Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999.

Subarbusto. Endémica. 0–2100 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2274* (CORD)].

**Fabiana friesii** Dammer

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b; Cabrera, A. L., 1983d.

Arbusto. Endémica. 1000–4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27267* (SI)].

*Fabiana glandulosa* Dusén = **Fabiana patagonica** Speg.

Referencias: Arroyo, S. C., 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

*Fabiana heterophylla* (Sendtn.) Dunal = **Calibrachoa heterophylla** (Sendtn.) Wijsman

*Fabiana hieronymi* Niederl. = **Fabiana denudata** Miers

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

**Fabiana imbricata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Fabiana araucana* Phil., *Fabiana biflora* J. Remy, *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. var. *biflora* (J. Remy) Reiche, *Fabiana lutescens* Phil.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Arroyo, S. C., 1976, 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b; Cosa de Gastiazoro, M., 1991; Zöllner, O., 1987.

Arbusto. Endémica. 0–3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Forcone, A. 442* (CORD)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996021* (CONC)].

*Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. var. *biflora* (J. Remy) Reiche = **Fabiana imbricata** Ruiz & Pav.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

*Fabiana kurtziana* Dammer = **Fabiana patagonica** Speg.

Referencias: Arroyo, S. C., 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

*Fabiana lutescens* Phil. = **Fabiana imbricata** Ruiz & Pav.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

**Fabiana nana** (Speg.) S.C. Arroyo

Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var. *nana* Speg.

Referencias: Arroyo, S. C., 1976, 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

Subarbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(CHU, SCR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Bonifacino, M. 725* (SI)].

**Fabiana patagonica** Speg.

Sin.: *Fabiana glandulosa* Dusén, *Fabiana kurtziana* Dammer, *Fabiana patagonica* Speg. var. *typica* Speg., nom. inval., *Fabiana peckii* Niederl. var. *patagonica* (Speg.) Hauman

Referencias: Arroyo, S. C., 1976, 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

Arbusto. Nativa. 1000–4000 m.

Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 450* (SI)].

*Fabiana patagonica* Speg. var. *brachyloba* Speg. = **Fabiana peckii** Niederl.

Referencias: Arroyo, S. C., 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

*Fabiana patagonica* Speg. var. *foliosa* Speg. = **Fabiana foliosa** (Speg.) S.C. Arroyo

Referencias: Arroyo, S. C., 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

*Fabiana patagonica* Speg. var. *gracilis* Speg. = **Fabiana peckii** Niederl.

Referencias: Arroyo, S. C., 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

*Fabiana patagonica* Speg. var. *nana* Speg. = **Fabiana nana** (Speg.) S.C. Arroyo

Referencias: Arroyo, S. C., 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

*Fabiana patagonica* Speg. var. *typica* Speg., nom. inval. = **Fabiana patagonica** Speg.

Referencias: Arroyo, S. C., 1999b.

**Fabiana peckii** Niederl.

Sin.: *Fabiana patagonica* Speg. var. *brachyloba* Speg., *Fabiana patagonica* Speg. var. *gracilis* Speg.

Referencias: Arroyo, S. C., 1976, 1999b; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

Arbusto. Endémica. 0–3000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[Bonifacino, M. 740 (SI)].

*Fabiana peckii* Niederl. var. *patagonica* (Speg.) Hauman = **Fabiana patagonica** Speg.

*Fabiana petunioides* Griseb. = **Nicotiana petunioides** (Griseb.) Millán

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a; Rossow, R. A., 1999f.

**Fabiana punensis** S.C. Arroyo

Referencias: Arroyo, S. C., 1976; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a, 1998b.

Arbusto. Endémica. 2000–4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 679 (CORD)].

**Fabiana ramulosa** (Wedd.) Hunz. & Barboza

Sin.: *Fabiana densa* J. Remy var. *ramulosa* Wedd., *Fabiana deserticola* Reiche

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.

Arbusto. Nativa. 3200–4000 m.

Países: CHL(I, II).

Ejemplares de referencia: CHL[Werdermann, E. 1116 (A, G, LIL, M, MO, S, SI, US)].

*Fabiana sellowiana* (Sendtn.) Dunal = **Calibrachoa sellowiana** (Sendtn.) Wijsman

Referencias: Wijsman, H. J. W., 1990.

**Fabiana squamata** Phil.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Zöllner, O., 1987.

Arbusto. Nativa. 3000–4400 m.

Países: CHL(I, II).

Ejemplares de referencia: CHL[Ricardi, M. 384 (CONC, LP)].

**Fabiana stephanii** Hunz. & Barboza

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a.

Arbusto. Nativa. 3000–3900 m.

Países: CHL(I).

Ejemplares de referencia: CHL[Ricardi, M. 114 (LP)].

*Fabiana thymifolia* A. St.-Hil. = **Calibrachoa thymifolia** (A. St.-Hil.) Stehmann & Semir

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

**Fabiana viscosa** Hook. & Arn.

Sin.: *Fabiana barrosi* Phil., *Fabiana coridifolia* Dunal, *Fabiana ericoides* Dunal

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1993a; Zöllner, O., 1987.

Arbusto. Endémica. 100–2200 m.

Países: CHL(III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[Eggli, U. 2677 (CORD), Johnston, I. M. 4894 (GH, S, US)].

*Franciscea acuminata* Pohl = **Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **brasiliensis**

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

*Franciscea australis* (Benth.) Miers = **Brunfelsia australis** Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Franciscea calycina* (Benth.) Miers = **Brunfelsia pauciflora** (Cham. & Schltdl.) Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

*Franciscea mutabilis* H.Jacq. = **Brunfelsia uniflora** (Pohl) D. Don

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Franciscea pauciflora* Cham. & Schltdl. = **Brunfelsia pauciflora** (Cham. & Schltdl.) Benth.

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

*Franciscea uniflora* Pohl = **Brunfelsia uniflora** (Pohl) D. Don

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 2001.

*Fregirardia spina-alba* Dunal = **Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1982b.

*Gerardia brasiliensis* Spreng. = **Brunfelsia brasiliensis** (Spreng.) L.B. Sm. & Downs subsp. **brasiliensis**

Referencias: Plowman, T. C., 1998.

**Grabowskia Schltdl.**

Número de especies: 4, 3 endémicas

*Grabowskia ameghinoi* (Speg.) Speg. = **Lycium ameghinoi** Speg.

Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

**Grabowskia boerhaviifolia** (L. f.) Schltldl.

Sin.: *Grabowskia glauca* (Phil.) I.M. Johnst., *Grabowskia lindleyii* Miers, *Grabowskia schizocalyx* Dammer, *Lycium boerhaviifolia* L. f., *Lycium glaucum* Phil.

Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002; Cabrera, A. L., 1983d; Hunziker, A. T., 1997a; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.

Arbusto. Nativa. 0–2500 m.

Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC); CHL(II).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 647 (CORD)]; CHL[Ricardi, M. 2686 (CONC)].

*Grabowskia cuneifolia* Dunal = **Grabowskia duplicata** Arn.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

*Grabowskia disticha* (Meyen) Nees ex Dunal = **Lycium distichum** Meyen

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Grabowskia duplicata** Arn.

Sin.: *Grabowskia cuneifolia* Dunal, *Grabowskia duplicata* Arn. var. *balansae* Chodat, *Grabowskia schlechtendalii* Sendtn.

Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002; Cabrera, A. L., 1979; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hunziker, A. T., 1979b, 1997a.

Arbusto. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(CEN, CON, PHA); URY(PAY, RNO).

Ejemplares de referencia: ARG[Hurrell, J. A. 5087 (SI)]; BRA[Gaudichaud-Beaupré, C. 1750 (P)]; PRY[Degen, R. 3452 (CTES, FCQ)]; URY[Schroeder, J. s.n. (BAF)].

*Grabowskia duplicata* Arn. var. *balansae* Chodat = **Grabowskia duplicata** Arn.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

*Grabowskia duplicata* Arn. var. *grandiflora* Dammer = **Grabowskia obtusa** Arn.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

*Grabowskia glauca* (Phil.) I.M. Johnst. = **Grabowskia boerhaviifolia** (L. f.) Schltldl.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

*Grabowskia lindleyii* Miers = **Grabowskia boerhaviifolia** (L. f.) Schltldl.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

**Grabowskia megalosperma** Speg.

Referencias: Hunziker, A. T., 1979b, 1997a.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(SCR).

Ejemplares de referencia: ARG[Ameghino, C. 36 (BA)].

*Grabowskia meyeniana* (Nees) Walp. = **Dunalia spinosa** (Meyen) Dammer

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

*Grabowskia obscura* Dunal = **Grabowskia obtusa** Arn.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

**Grabowskia obtusa** Arn.

Sin.: *Citharexylum mendocinum* Phil., *Grabowskia duplicata* Arn. var. *grandiflora* Dammer, *Grabowskia obscura* Dunal

Referencias: Hunziker, A. T., 1979b, 1997a.

Arbusto. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, NEU, SDE, SJU, SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 543 (CORD)].

*Grabowskia schizocalyx* Dammer = **Grabowskia boerhaviifolia** (L. f.) Schltldl.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

*Grabowskia schlechtendalii* Sendtn. = **Grabowskia duplicata** Arn.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

[*Grabowskia sodiroi* Bitter]

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Grabowskia spegazzinii* Dusén = **Lycium ameghinoi** Speg.

Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

*Himeranthus ameghinoi* Speg. = **Jaborosa ameghinoi** (Speg.) Macloskie & Dusén

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987; Rossow, R. A., 1999g.

*Himeranthus erosus* Miers = **Jaborosa runcinata** Lam.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Himeranthus magellanicus* Griseb. = **Jaborosa magellanica** (Griseb.) Dusén

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987; Rossow, R. A., 1999g.

[*Himeranthus patagonicus* Speg.]

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987.  
Notas: Nombre dudoso.

*Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl. = **Jaborosa runcinata** Lam.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl. var. *brevipes* Dunal = **Jaborosa runcinata** Lam.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998a.

*Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl. var. *longipes* Dunal = **Jaborosa runcinata** Lam.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998a.

*Himeranthus tridentatus* Miers = **Jaborosa runcinata**

Lam.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

**Iochroma Benth.**

Número de especies: 1

*Iochroma arboreum* Griseb. = **Vassobia breviflora**

(Sendtn.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1984d.

**Iochroma australe** Griseb.Sin.: *Acnistus australis* (Griseb.) Griseb., *Acnistus australis* (Griseb.) Griseb. var. *grandiflorus* Griseb., *Dierbachia australis* (Griseb.) Kuntze, *Dunalia australis* (Griseb.) Sleumer

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hunziker, A. T., 1979b, 1982b; Moscone, E. A., 1992.

Arbusto. Nativa. 1000–3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Rotman, A. D. 770 (SI)].

**Jaborosa Juss.**

Número de especies: 23, 19 endémicas

**Jaborosa ameghinoi** (Speg.) Macloskie & DusénSin.: *Himeranthus ameghinoi* Speg.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a; Rossow, R. A., 1999g.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(CHU).

Ejemplares de referencia: ARG[Ameghino, C. s.n. (LPS)].

*Jaborosa andina* Kurtz, nom. nud. = **Jaborosa kurtzii**

Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987; Rossow, R. A., 1999g.

**Jaborosa araucana** Phil.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a. Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU); CHL(VII).

Ejemplares de referencia: ARG[Oberti, J. C. s.n. (CORD)]; CHL[Zöllner, O. 5893 (L)].

**Jaborosa bergii** Hieron.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a; Rossow, R. A., 1999g.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, RNE, SJU, SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[Anderson, D. L. 1296 (CORD)].

*Jaborosa bipinnatifida* (Dunal) Meigen = **Jaborosa caulescens** Gillies & Hook. var. **bipinnatifida**

(Dunal) Reiche

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Jaborosa bonariensis* J.F. Gmel. = **Jaborosa integrifolia**

Lam.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

**Jaborosa cabrerai** Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a; Barboza, G. E., 1986b.

Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.

Países: ARG(CAT).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 24680 (LP)].

**Jaborosa caulescens** Gillies & Hook. var. **bipinnatifida** (Dunal) ReicheSin.: *Jaborosa bipinnatifida* (Dunal) Meigen, *Lonchostigma bipinnatifidum* (Dunal) Phil., *Lonchostigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal var. *bipinnatifidum* Dunal, *Trechonaetes bipinnatifida* Phil.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a. Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(II, III, IV, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 8810 (LP)]; CHL[Johnston, I. M. 4923 (BA)].

**Jaborosa caulescens** Gillies & Hook. var. **caulescens**Sin.: *Dorystigma caulescens* (Gillies & Hook.) Miers, *Lonchostigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a. Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4000 m.

Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU); CHL(I, III, IV, V, VII, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[Cocucci, A. A. 2250 (CORD, CTES, SI)]; CHL[Ricardi, M. 2881 (CONC, CORD)].

**Jaborosa chubutensis** Barboza & Hunz.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a; Rossow, R. A., 1999g.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(CHU).

Ejemplares de referencia: ARG[Ferruglio, E. s.n. (BA)].

*Jaborosa crispa* auct. non Benth. & Hook. = **Jaborosa parviflora** (Phil.) Hunz. & Barboza*Jaborosa desiderata* Speg. = **Jaborosa reflexa** Phil.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987; Rossow, R. A., 1999g.

**Jaborosa integrifolia** Lam.Sin.: *Jaborosa bonariensis* J.F. Gmel., *Jaborosa integrifolia* Lam. var. *brasiliensis* Dunal

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a; Cabrera, A. L., 1983d; Degen, R. &amp; Mereles, F., 1996.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE); PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA); URY(RNO).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 359 (CORD)]; BRA[Sellow, F. s.n. (P)]; PRY[Degen, R. 3335 (FCQ)]; URY[Arechavaleta, J. s.n. (CORD)].

Notas: Citada para el sur de Brasil sin indicar localidad.

*Jaborosa integrifolia* Lam. var. *brasiliensis* Dunal = **Jaborosa integrifolia** Lam.

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

**Jaborosa kurtzii** Hunz. & Barboza

Sin.: *Jaborosa andina* Kurtz, nom. nud.  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a;  
 Rossow, R. A., 1999g.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.  
 Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 24811  
 (CORD)].

**Jaborosa laciniata** (Miers) Hunz. & Barboza

Sin.: *Trechonaetes bridgesii* Dunal, *Trechonaetes laciniata*  
 Miers  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a;  
 Rossow, R. A., 1999g.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.  
 Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU); CHL(III, IV, V, VII,  
 RME).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 2135  
 (CORD)]; CHL[Martcorena, C. 563 (CONC)].

**Jaborosa lanigera** (Phil.) Hunz. & Barboza

Sin.: *Lonchostigma lanigerum* (Phil.) Cabrera, *Trechonaetes  
 lanigera* Phil.  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 3000–5000 m.  
 Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 682  
 (CORD)].

*Jaborosa leptophylla* Speg. = **Jaborosa leucotricha**  
 (Speg.) Hunz.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987;  
 Rossow, R. A., 1999g.

**Jaborosa leucotricha** (Speg.) Hunz.

Sin.: *Jaborosa leptophylla* Speg., *Trechonaetes leucotricha*  
 Speg.  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a;  
 Hunziker, A. T., 1977a.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 500–2600 m.  
 Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU,  
 TUC).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Ruiz Leal, R. A. 37840  
 (CORD, MERL)].

**Jaborosa magellanica** (Griseb.) Dusén

Sin.: *Himeranthus magellanicus* Griseb.  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a;  
 Rossow, R. A., 1999g.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.  
 Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Donat, A. 487 (LIL)];  
 CHL[Pisano, E. 2880 (MO)].

*Jaborosa montevidensis* Casar. = **Salpichroa origanifolia**  
 (Lam.) Baill.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

**Jaborosa odonelliana** Hunz.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.  
 Países: ARG(SAL, SDE, TUC).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 652 (CORD)].

**Jaborosa oxipetala** Speg.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.  
 Países: ARG(CAT, SAL, TUC).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 773  
 (CORD)].

**Jaborosa parviflora** (Phil.) Hunz. & Barboza

Sin.: *Jaborosa crispa* auct. non Benth. & Hook.,  
*Lonchostigma parviflorum* (Phil.) Cabrera,  
*Trechonaetes machucana* Phil., *Trechonaetes parviflora*  
 Phil.  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.  
 Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4500 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II, III).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Sleumer, H. O. 3251 (LIL,  
 SI)]; CHL[Martcorena, C. 370 (CONC)].

**Jaborosa pinnata** Phil.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987;  
 Barboza, G. E., 1986a.  
 Hierba. Perenne. Endémica.  
 Países: CHL(VI, VII, RME).  
 Ejemplares de referencia: CHL[Philippi, R. A. s.n. (SGO)].

**Jaborosa reflexa** Phil.

Sin.: *Jaborosa desiderata* Speg.  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a;  
 Rossow, R. A., 1999g.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 200–1000 m.  
 Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VI, VII,  
 VIII, IX, RME).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Balzaretti, V. s.n. (CORD)];  
 CHL[Sparre, B. B. 10876 (CONC)].

**Jaborosa riojana** Hunz. & Barboza

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a;  
 Martcorena, C., Matthei, O. R., Arroyo, M. T. K.,  
 Muñoz-Schick, M., Rodríguez Ríos, R., Squeo, F. A. &  
 Arancio, G., 1998.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4300 m.  
 Países: ARG(CAT, LRI); CHL(II).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, J. H. 4143  
 (CORD)]; CHL[Arroyo, M. T. K. 97227 (CONC)].

**Jaborosa rotacea** (Lillo) Hunz. & Barboza

Sin.: *Trechonaetes rotacea* Lillo  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.  
 Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4000 m.  
 Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 730  
 (CORD)].

**Jaborosa runcinata** Lam.

Sin.: *Himeranthus erosus* Miers, *Himeranthus runcinatus*  
 (Lam.) Endl., *Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl. var.  
*brevipes* Dunal, *Himeranthus runcinatus* (Lam.) Endl.  
 var. *longipes* Dunal, *Himeranthus tridentatus* Miers,  
*Jaborosa sinuata* Larrañaga, *Jaborosa tridentata*  
 (Miers) Hicken  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a;  
 Cabrera, A. L., 1979.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, SFE); URY(FLA, MAL, MON, SJO).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 342 (CORD, CTES, SI)]; URY[Castellanos, A. 17009 (CORD)].

**Jaborosa sativa** (Miers) Hunz. & Barboza

Sin.: *Trechonaetes floribunda* Phil., *Trechonaetes sativa* Miers

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

Hierba. Perenne. Endémica. 300–4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 779b (CORD)].

*Jaborosa sinuata* Larrañaga = **Jaborosa runcinata** Lam.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

**Jaborosa squarrosa** (Miers) Hunz. & Barboza

Sin.: *Dorystigma squarrosus* Miers, *Lonchestigma squarrosus* (Miers) Dunal

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.

Países: ARG(JUJ, LRI); CHL(I, III).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus*, G. H. E. W. 222 (CORD)]; CHL[*Marticoarena*, C. 211 (CONC)].

*Jaborosa tridentata* (Miers) Hicken = **Jaborosa runcinata** Lam.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

**Jaborosa volkmannii** (Phil.) Reiche

Sin.: *Dolichosiphon volkmani* Phil.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1991a, 1998a; Hunziker, A. T., 1979b; Rossow, R. A., 1999g.

Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.

Países: ARG(NEU); CHL(VIII, IX).

Ejemplares de referencia: ARG[*Carrique*, M. C. 1005 (CORD)]; CHL[*Ricardi*, M. 2358 (CONC)].

**Latua** Phil.

Número de especies: 1 endémica

**Latua pubiflora** (Griseb.) Baill.

Sin.: *Lycioplesium pubiflorum* Griseb.

Referencias: Cosa de Gastiazoro, M., 1991; Hunziker, A. T., 1979b, 2001.

Arbusto o arbolito. Endémica. 300–900 m.

Países: CHL(VIII, IX, X).

Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi*, M. 5243 (CONC)].

*Lehmannia otophora* (Griseb.) Comes = **Nicotiana otophora** Griseb.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

**Leptoglossis** Benth.

Número de especies: 1 endémica

**Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Sin.: *Cyclostigma tenue* Phil., *Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *linifolia* (Miers) Monach., *Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *tenuis* (Phil.) Monach., *Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *xerophytica*

Monach., *Leptoglossis tenuis* (Phil.) B.D. Jacks., *Nierembergia linifolia* Miers, *Nierembergia linifolia* Miers var. *macrophylla* Dunal, *Nierembergia linifolia* Miers var. *parviflora* Dunal, *Salpiglossis linifolia* (Miers) Wettst., *Salpiglossis tenuis* (Phil.) Wettst., *Schwenckia tenuis* (Phil.) Griseb.

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979a, b, 1995b; Rossow, R. A., 1999f.

Hierba. Perenne. Endémica. 300–1200 m.

Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar*, L. 2800 (CORD)].

[*Leptoglossis schwenckioides* Benth.]

Referencias: Hunziker, A. T., 2001.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *linifolia* (Miers)

Monach. = **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995b.

*Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *tenuis* (Phil.)

Monach. = **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

*Leptoglossis schwenckioides* Benth. var. *xerophytica*

Monach. = **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995b.

*Leptoglossis tenuis* (Phil.) B.D. Jacks. = **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Leptophragma montevidensis* (Spreng.) Dunal

= **Calibrachoa parviflora** (Juss.) D'Arcy

*Leptophragma prostrata* (Hook. & Arn.) Benth.

= **Calibrachoa parviflora** (Juss.) D'Arcy

*Lindernia montevidensis* Spreng. = **Calibrachoa**

**parviflora** (Juss.) D'Arcy

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Lonchestigma bipinnatifidum* (Dunal) Phil. = **Jaborosa**

**caulescens** Gillies & Hook. var. **bipinnatifida**

(Dunal) Reiche

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Lonchestigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal

= **Jaborosa caulescens** Gillies & Hook. var.

**caulescens**

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Lonchestigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal var.

*bipinnatifidum* Dunal = **Jaborosa caulescens** Gillies

& Hook. var. **bipinnatifida** (Dunal) Reiche

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Lonchestigma lanigerum* (Phil.) Cabrera = **Jaborosa**

**lanigera** (Phil.) Hunz. & Barboza

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Lonchostigma parviflorum* (Phil.) Cabrera = **Jaborosa parviflora** (Phil.) Hunz. & Barboza  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Lonchostigma squarrosus* (Miers) Dunal = **Jaborosa squarrosa** (Miers) Hunz. & Barboza  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

## **Lycianthes (Dunal) Hassl.**

Número de especies: 5

### **Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter

Sin.: *Solanum asarifolium* Kunth & Bouché, *Solanum chodatianum* Huber, *Solanum violifolium* Schott f. *chacoense* Hassl., *Solanum violifolium* Schott f. *decadontum* Hassl., *Solanum violifolium* Schott f. *lilaciniflora* Hassl., *Solanum violifolium* Schott var. *asarifolium* (Kunth & Bouché) Hassl., *Solanum violifolium* Schott var. *majus* Dunal

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992; Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997; Cabrera, A. L., 1983d.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR); PRY(CEN, GUA).

Ejemplares de referencia: ARG[Burkart, A. 14971 (LIL)]; BRA[Hatschbach, G. 61463 (M)]; PRY[Schinini, A. 26848 (CTES)].

*Lycianthes australe* (C.V. Morton) Hunz. & Barboza, nom. illeg. = **Lycianthes pauciflora** (Vahl) Bitter  
Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997.

### **Lycianthes lycioides** (L.) Hassl.

Sin.: *Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. subsp. *parvifolia* (Wedd.) Bitter, *Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. var. *brachyphylla* Bitter, *Solanum lyciiforme* Dammer, *Solanum lycioides* L., *Solanum lycioides* L. var. *parvifolium* Wedd., *Solanum pseudolycioides* Rusby

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992; Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997; Stutz, L. C., 1983.

Arbusto. Nativa. 1000–4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(APA).

Ejemplares de referencia: ARG[Tolaba, J. A. 3597 (SI)]; PRY[Stutz, L. C. 1756 (G)].

*Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. var. *brachyphylla* Bitter = **Lycianthes lycioides** (L.) Hassl.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Lycianthes lycioides* (L.) Hassl. subsp. *parvifolia* (Wedd.) Bitter = **Lycianthes lycioides** (L.) Hassl.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

### **Lycianthes pauciflora** (Vahl) Bitter

Sin.: *Lycianthes australe* (C.V. Morton) Hunz. & Barboza, nom. illeg., *Lycianthes pseudolycioides* (Chodat & Hassl.) Bitter, *Solanum australe* C.V. Morton, *Solanum pauciflorum* Vahl, *Solanum pseudolycioides* Chodat & Hassl., hom. illeg., *Solanum urbanum* Morong var. *ovatifolium* Chodat

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992; Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Arbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[Schwarz, G. J. 7017 (CORD)]; BRA[Schwarz, G. 7504 (LIL)]; PRY[Renvoize, S. A. 3219 (SI)].

*Lycianthes pseudolycioides* (Chodat & Hassl.) Bitter = **Lycianthes pauciflora** (Vahl) Bitter

Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997.

### **Lycianthes rantonnei** (Carrière) Bitter

Sin.: *Solanum corniculatum* Hieron., *Solanum muticum* N.E. Br., *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanum urbanum* Morong, *Solanum urbanum* Morong var. *foliosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *nervosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *subtomentosum* Chodat, *Solanum urbanum* Morong var. *typicum* Chodat, nom. inval.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992; Stutz, L. C., 1983.

Arbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[Schinini, A. 27592 (SI)]; BRA[Schwarz, G. 7232 (LIL)]; PRY[Stutz, L. C. 1407 (G)].

### **Lycianthes saltensis** Bitter

Sin.: *Solanum fundatum* C.V. Morton, *Solanum saltense* (Bitter) C.V. Morton, hom. illeg.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992; Cabrera, A. L., 1983d.

Arbusto. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Ahumada, O. 9091 (CTES, SI)].

*Lycioplesium pubiflorum* Griseb. = **Latua pubiflora** (Griseb.) Baill.

## **Lycium L.**

Número de especies: 29, 16 endémicas, 1 introducida

*Lycium acanthocladium* Speg. = **Lycium gilliesianum** Miers

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

### **Lycium ameghinoi** Speg.

Sin.: *Grabowskia ameghinoi* (Speg.) Speg., *Grabowskia spgazzinii* Dusén, *Lycium durispina* Dusén

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.

Arbusto. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).

Ejemplares de referencia: ARG[Correa, M. N. 10286 (BAB, CORD)].

**Lycium americanum** Jacq.

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *paraguariense* Hassl., *Lycium confusum* Dammer ex R.E. Fr., *Lycium floribundum* Dunal var. *pruinatum* (Griseb.) A. Terracc., *Lycium nodosum* auct. non Miers, *Lycium pruinatum* Griseb., *Lycium subtridentatum* Dammer, *Lycium tweedianum* auct. non Griseb., *Lycium tweedianum* Griseb. var. *pruinatum* (Griseb.) Hassl.

Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002; Bernardello, L. M. & Luján, M. C., 1997; Bernardello, L. M., 1984, 1986, 1995; Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 525 (CORD)]; PRY[Degen, R. 3212 (CTES, FCQ)].

**Lycium argentinum** Hieron. = **Lycium ciliatum** Schldtl.

Referencias: Bernardello, L. M., 1995.

**Lycium athium** Bernardello

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(FOR).

Ejemplares de referencia: ARG[Bernardello, G. 488 (CORD)].

**Lycium barbarum** L.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.

Arbusto. Introducida. 0–500 m.

Países: ARG(SCR).

Ejemplares de referencia: ARG[Correa, M. N. 2038 (BAB)].

**Lycium biesei** F.A. Barkley = **Lycium leiostemum** Wedd.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium boerhaviifolia** L. f. = **Grabowskia boerhaviifolia** (L. f.) Schldtl.

Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.

**Lycium breanum** Phil. = **Lycium deserti** Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium cestroides** Schldtl.

Sin.: *Acnistus cestroides* (Schldtl.) Miers, *Lycium cestroides* Schldtl. var. *normale* A. Terracc.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995; Cabrera, A. L., 1983d.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(MON, SJO).

Ejemplares de referencia: ARG[Rotman, A. D. 973 (SI)]; URY[Herter, W. G. F. 279 (LIL, SI)].

**Lycium cestroides** Schldtl. var. *normale* A. Terracc.

= **Lycium cestroides** Schldtl.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium chanar** Phil.

Sin.: *Lycium crassipina* Phil., *Lycium decipiens* Dammer

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.

Arbusto. Nativa. 2000–4500 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[Anton, A. M. 274 (CORD)];

**Lycium chilense** Miers ex Bertero f. *glaberrimum* (Phil.)

A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **glaberrimum** Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium chilense** Miers ex Bertero f. *minutifolium* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **minutifolium** (Miers) F.A. Barkley

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. *capillare* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **filifolium** (Miers) Bernardello

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *normale* Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gelidum* (Wedd.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *o'donelli* F.A. Barkley, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *ovatum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *petiolatum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *tomentosulum* Phil., *Lycium fimbriatum* C.L. Hitchc., *Lycium gelidum* Wedd., *Lycium grevilleanum* Miers, *Lycium hunzikeri* F.A. Barkley, *Lycium lasiopetalum* Speg., *Lycium pulverulentum* Skotts., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *chilense* (Bertero) Kuntze, *Lycium scoparium* Miers, *Lycium scoparium* Miers subsp. *normale* A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *affine* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *divaricatum* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *grevilleanum* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *lineare* (Miers) A. Terracc.

Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Plissock, P., 2002; Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.

Arbusto. Endémica. 0–4500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC); CHL(IV, V, VI, VII, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 673 (CORD)]; CHL[Bernardello, G. 845 (CORD)].

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **comberi**

(C.L. Hitchc.) Bernardello

Sin.: *Lycium comberi* C.L. Hitchc.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE).

Ejemplares de referencia: ARG[Soriano, A. 2112 (BAB, CORD, SI)].

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **confertifolium**

(Miers) F.A. Barkley

Sin.: *Lycium melanopotamicum* Niederl., *Lycium patagonicum* Miers var. *melanopotamicum* (Niederl.) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* (Miers) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* Miers

Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002; Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.

Arbusto. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU); CHL(IV, V, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[Bernardello, G. 139 (CORD)]; CHL[Bernardello, G. 860 (CORD)].

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **descolei**

F.A. Barkley

Sin.: *Lycium comberi* C.L. Hitchc. var. *donatii* F.A. Barkley, *Lycium patagonicum* Miers, *Lycium patagonicum* Miers var. *normale* A. Terracc., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *patagonicum* (Miers) Kuntze

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR); PRY(PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[Bernardello, G. 231 (CORD)]; PRY[Mereles, F. 4510 (FCQ)].

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum*

A. Terracc., p.p. = **Lycium deserti** Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum*

A. Terracc., p.p. = **Lycium humile** Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum*

A. Terracc., p.p. = **Lycium minutifolium** J. Remy

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **filifolium** (Miers)

Bernardello

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *capillare* (Miers)

A. Terracc., *Lycium filifolium* Miers

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.

Arbusto. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SDE, SJU, SLU); CHL(III, IV).

Ejemplares de referencia: ARG[Bernardello, G. 111 (CORD)]; CHL[Zöllner, O. 7044 (CTES)].

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gelidum* (Wedd.)

A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **glaberrimum**

Phil.

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero f. *glaberrimum* (Phil.)

A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp.

*gracile* (Meyen) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex

Bertero var. *glabriusculum* Phil., *Lycium chilense* Miers

ex Bertero var. *gracile* (Meyen) A. Terracc., *Lycium*

*chilense* Miers ex Bertero var. *peruvienne* F.A. Barkley,

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rhadinum* (Phil.)

Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *venosum*

(Phil.) Reiche, *Lycium gracile* Meyen, *Lycium*

*rhadinum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *gracile*

(Meyen) Kuntze, *Lycium sessiliflorum* Phil., *Lycium*

*sparrei* F.A. Barkley, *Lycium venosum* Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.

Arbusto. Endémica. 500–2000 m.

Países: ARG(MEN); CHL(III, IV, V).

Ejemplares de referencia: ARG[Schulz, A. G. 6231 (CTES)]; CHL[Biese, W. 2206 (LIL)].

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glabriusculum*

Phil. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var.

**glaberrimum** Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gracile* (Meyen)

A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var.

**glaberrimum** Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *heterophyllum*

(Hassl.) Hassl. = **Lycium nodosum** Miers

Referencias: Bernardello, L. M., 1984, 1986.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *implexum* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium minutifolium** J. Remy

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *meyeri*

F.A. Barkley = **Lycium ciliatum** Schldt.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **minutifolium**

(Miers) F.A. Barkley

Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero f. *minutifolium*

(Miers) A. Terracc., *Lycium filifolium* Miers var.

*minutifolium* Miers, *Lycium microphyllum* Phil., hom.

illeg., *Lycium minutifolium* Phil., *Lycium philippianum*

Speg.

Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002; Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.

Arbusto. Endémica. 0–2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE); CHL(III, IV).

Ejemplares de referencia: ARG[Bernardello, G. 781 (CORD)]; CHL[Bernardello, G. 862 (CORD)].

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *nodosum* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium nodosum** Miers

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

[*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *normale* Hassl.]

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

Notas: Nombre dudoso.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *o'donelli*

F.A. Barkley = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**

Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *ovatum* Phil.

= **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *peruvienne*

F.A. Barkley = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **glaberrimum** Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

- Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *petiolatum* Phil.  
= **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rachidocladum*  
(Dunal) A. Terracc. = **Lycium rachidocladum** Dunal  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rhadinum* (Phil.)  
Reiche = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var.  
**glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *tomentosulum* Phil.  
= **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *venosum* (Phil.)  
Reiche = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var.  
**glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chilense** Miers ex Bertero var. *vergarae* (Phil.)  
Bernardello  
Sin.: *Lycium vergarae* Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.  
Arbusto. Endémica. 2000–4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU); CHL(I, III, IV).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5437* (BAB, CORD)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (CORD)].
- Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *vimineum* (Miers)  
A. Terracc. = **Lycium vimineum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *gracile* (Meyen)  
Reiche = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var.  
**glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *normale* Reiche  
= **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *paraguariense*  
Hassl. = **Lycium americanum** Jacq.
- Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *rachidocladum*  
(Dunal) Reiche = **Lycium rachidocladum** Dunal  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium chubutense* Dusén = **Lycium tenuispinosum**  
Miers var. **tenuispinosum**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium ciliatum** Schltld.  
Sin.: *Lycium argentinum* Hieron., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *meyeri* F.A. Barkley, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *cordobense* Kuntze, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *heteromorphum* Kuntze, *Lycium ciliatum* Schltld. var. *saltense* Kuntze, *Lycium erosum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal var. *ciliatum* (Schltld.) A. Terracc., *Lycium floribundum* Dunal var. *grisebachii* A. Terracc., *Lycium ignarum* Miers, *Lycium schickendantzii* F.A. Barkley, *Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) A. Terracc., *Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) Griseb., *Salpichroa ciliata* (Schltld.) Miers, *Withania pulvinata* Dunal  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995; Cabrera, A. L., 1979, 1983d.  
Arbusto. Nativa. 0–3500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 611* (CORD)]; BRA[*Sellow, F. s.n.* (K, W)]; URY[*Tweedie, J. s.n.* (K)].  
Notas: Citada para Brasil y Uruguay sin indicar localidad.
- Lycium ciliatum* Schltld. var. *cordobense* Kuntze  
= **Lycium ciliatum** Schltld.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium ciliatum* Schltld. var. *heteromorphum* Kuntze  
= **Lycium ciliatum** Schltld.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium ciliatum* Schltld. var. *saltense* Kuntze = **Lycium ciliatum** Schltld.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium comberi* C.L. Hitchc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **comberi** (C.L. Hitchc.) Bernardello  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium comberi* C.L. Hitchc. var. *donatii* F.A. Barkley  
= **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **descolei** F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium confertum* Miers = **Lycium elongatum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium confusum* Dammer ex R.E. Fr. = **Lycium americanum** Jacq.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1984.
- Lycium crassipina* Phil. = **Lycium chanar** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium cuneatum** Dammer  
Sin.: *Lycium cuneatum* Dammer var. *rojasii* F.A. Barkley, *Lycium pruinosum* Griseb. var. *puberulum* Griseb.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995; Degen, R. & Mereles, F., 1996.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE); PRY(APY, AMA, PHA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Scarpa, G. F. 518* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5969* (CTES, FCQ, MO)].
- Lycium cuneatum* Dammer var. *rojasii* F.A. Barkley  
= **Lycium cuneatum** Dammer  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium cyathiforme** C.L. Hitchc.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.  
 Arbusto. Nativa. 0–1200 m.  
 Países: ARG(JUJ, SAL).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Krapovickas, A. 17500  
 (CTES, LP)].

**Lycium decipiens** Dammer = **Lycium chanar** Phil.

Referencias: Bernardello, L. M., 1995.

**Lycium deserti** Phil.

Sin.: *Lycium breanum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex  
 Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p., *Lycium  
 pachyclados* Phil.  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986; Dillon, M. O., 2005;  
 Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R.,  
 Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. &  
 Arancio, G., 1998.  
 Arbusto. Nativa. 500–3200 m.  
 Países: CHL(II, III).  
 Ejemplares de referencia: CHL[Werdermann, E. 980  
 (CORD)].

**Lycium distichum** Meyen

Sin.: *Grabowskia disticha* (Meyen) Nees ex Dunal  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.  
 Arbusto. Nativa. 2000 m.  
 Países: CHL(I).  
 Ejemplares de referencia: CHL[Troll, C. 3321a (M)].

**Lycium durispina** Dusén = **Lycium ameghinoi** Speg.

Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

**Lycium elongatum** Miers

Sin.: *Lycium confertum* Miers, *Lycium floribundum* Dunal  
 var. *confertum* (Miers) A. Terracc., *Lycium floribundum*  
 Dunal var. *elongatum* (Miers) A. Terracc.  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.  
 Arbusto. Endémica. 0–1000 m.  
 Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU,  
 TUC).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 23588  
 (CORD)].

**Lycium elongatum** Miers var. *longiflorum* (Phil.) Hauman

= **Lycium gilliesianum** Miers  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium elongatum** Miers var. *riojana* Hieron. ex Hauman,

nom. nud. = **Lycium fuscum** Miers  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium erosum** Miers = **Lycium ciliatum** Schltld.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986; Cabrera, A. L., 1979.

**Lycium filifolium** Miers = **Lycium chilense** Miers ex

Bertero var. **filifolium** (Miers) Bernardello  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

**Lycium filifolium** Miers var. *minutifolium* Miers

= **Lycium chilense** Miers ex Bertero var.  
**minutifolium** (Miers) F.A. Barkley  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

**Lycium fimbriatum** C.L. Hitchc. = **Lycium chilense** Miers

ex Bertero var. **chilense**  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

**Lycium floribundum** Dunal = **Lycium tenuispinosum**

Miers var. **tenuispinosum**  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

**Lycium floribundum** Dunal var. *ciliatum* (Schltld.)

A. Terracc. = **Lycium ciliatum** Schltld.  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium floribundum** Dunal var. *confertum* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium elongatum** Miers  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium floribundum** Dunal var. *elongatum* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium elongatum** Miers  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium floribundum** Dunal var. *gilliesianum* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium gilliesianum** Miers  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium floribundum** Dunal var. *grisebachii* A. Terracc.

= **Lycium ciliatum** Schltld.  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium floribundum** Dunal var. *infaustum* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium infaustum** Miers  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium floribundum** Dunal var. *normale* A. Terracc.

= **Lycium tenuispinosum** Miers var. **tenuispinosum**  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium floribundum** Dunal var. *pruinatum* (Griseb.)

A. Terracc. = **Lycium americanum** Jacq.

**Lycium floribundum** Dunal var. *tenuispinosum* (Miers)

A. Terracc. = **Lycium tenuispinosum** Miers var.  
**tenuispinosum**  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium fragosum** Miers = **Lycium stenophyllum**

J. Remy  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

**Lycium friesii** Dammer = **Lycium tenuispinosum** Miers

var. **friesii** (Dammer) C.L. Hitchc.  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1995.

**Lycium fuscum** Miers

Sin.: *Lycium elongatum* Miers var. *riojana* Hieron. ex  
 Hauman, nom. nud., *Lycium gilliesianum* Miers var.  
*fuscum* (Miers) F.A. Barkley, *Lycium longiflorum* Phil.  
 var. *riojana* Hieron. ex Hauman, nom. nud., *Lycium  
 miersii* F.A. Barkley, *Lycium penduliflorum*  
 I.M. Johnst., *Lycium scoparium* Miers var. *fuscum*  
 (Miers) A. Terracc.  
 Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.

- Arbusto. Endémica. 2000–3500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 4568* (CORD, IZAC)].
- Lycium gelidum* Wedd. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium gilliesianum** Miers  
Sin.: *Lycium acanthocladium* Speg., *Lycium elongatum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) Hauman, *Lycium floribundum* Dunal var. *gilliesianum* (Miers) A. Terracc., *Lycium gilliesianum* Miers var. *longitubum* (Dammer) C.L. Hitchc., *Lycium gilliesianum* Miers var. *ruiz-lealii* F.A. Barkley, *Lycium longiflorum* Phil., *Lycium longitubum* Dammer, *Lycium patagonicum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium rigidum* Gillies ex Miers, *Lycium wilkesii* Ball  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.  
Arbusto. Endémica. 0–2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SLU).  
Ejemplares de referencia: ARG[*López, H. A. 115* (CORD)].
- Lycium gilliesianum* Miers var. *fusum* (Miers) F.A. Barkley = **Lycium fuscum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium gilliesianum* Miers var. *longitubum* (Dammer) C.L. Hitchc. = **Lycium gilliesianum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium gilliesianum* Miers var. *ruiz-lealii* F.A. Barkley = **Lycium gilliesianum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium glaucum* Phil. = **Grabowskia boerhaviifolia** (L. f.) Schltld.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1997a.
- Lycium glomeratum** Sendtn.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APY, APA, CEN, PHA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 762* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 39852* (CORD)]; PRY[*Rojas, T. 8176* (CORD)].
- Lycium gracile* Meyen = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium grevilleanum* Miers = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium halophilum* Speg. = **Lycium infaustum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium horridum* Phil. = **Lycium minutifolium** J. Remy  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

- Lycium humile** Phil.  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p.  
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Bernardello, L. M., 1986, 1995; Cabrera, A. L., 1983d.  
Arbusto. Endémica. 2000–4000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II, III).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Ancibor, E. 65* (BAA)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94040* (CONC)].
- Lycium hunzikeri* F.A. Barkley = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium ignarum* Miers = **Lycium ciliatum** Schltld.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium implexum* Miers = **Lycium minutifolium** J. Remy  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium infaustum** Miers  
Sin.: *Lycium floribundum* Dunal var. *infaustum* (Miers) A. Terracc., *Lycium halophilum* Speg., *Lycium tweedianum* Griseb.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995; Cabrera, A. L., 1979.  
Arbusto. Endémica. 0–2500 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 544* (CORD)].
- Lycium lasiopetalum* Speg. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium leiostemum** Wedd.  
Sin.: *Lycium bieseii* F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1984, 1986; Dillon, M. O., 2005; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.  
Arbusto. Nativa. 1000 m.  
Países: CHL(I, II).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Biese, W. 559* (LIL)].
- Lycium longiflorum* Phil. = **Lycium gilliesianum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium longiflorum* Phil. var. *riojana* Hieron. ex Hauman, nom. nud. = **Lycium fuscum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium longitubum* Dammer = **Lycium gilliesianum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium melanopotamicum* Niederl. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **confertifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.

- Lycium microphyllum* Phil., hom. illeg. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **minutifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium miersii* F.A. Barkley = **Lycium fuscum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium minutifolium* Phil. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **minutifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium minutifolium** J. Remy  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., p.p., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *implexum* (Miers) A. Terracc., *Lycium horridum* Phil., *Lycium implexum* Miers, *Lycium rhudolphi* Speg.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Rios, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.  
Arbusto. Endémica. 1000–3200 m.  
Países: CHL(II, III, IV).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Pfister, A. 8378* (CONC, CORD)].
- Lycium minutifolium* J. Remy var. *major* Kuntze = **Lycium pubitubum** C.L. Hitchc.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium morongii** Britton  
Sin.: *Lycium morongii* Britton f. *parvifolium* C.L. Hitchc., *Lycium morongii* Britton var. *indutum* Hassl., p.p., *Lycium morongii* Britton var. *parvifolium* (C.L. Hitchc.) F.A. Barkley, *Lycium morongii* Britton var. *typicum* Hassl., nom. inval.  
Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002; Bernardello, L. M., 1986, 1995; Cabrera, A. L., 1979.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Bernardello, G. 486* (CORD)]; PRY[*Arenas, P. 1732* (BACP)].
- Lycium morongii* Britton f. *parvifolium* C.L. Hitchc. = **Lycium morongii** Britton  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium morongii* Britton var. *indutum* Hassl., p.p. = **Lycium morongii** Britton  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium morongii* Britton var. *parvifolium* (C.L. Hitchc.) F.A. Barkley = **Lycium morongii** Britton  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium morongii* Britton var. *typicum* Hassl., nom. inval. = **Lycium morongii** Britton  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium nanum* Phil. = **Junellia uniflora** (Phil.) Moldenke  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium nodosum* auct. non Miers = **Lycium americanum** Jacq.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1995.
- Lycium nodosum** Miers  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *heterophyllum* (Hassl.) Hassl., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *nodosum* (Miers) A. Terracc., *Lycium tweedianum* Griseb. var. *heterophyllum* Hassl.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1984, 1986, 1995; Degen, R. & Mereles, F., 1996.  
Arbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, TUC); PRY(APY, PHA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 515* (CORD)]; PRY[*Mereles, F. 5945* (CTES, FCQ, MO)].
- Lycium o'donellii* F.A. Barkley = **Lycium repens** Speg.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc. = **Lycium tenuispinosum** Miers var. **calycinum** (Griseb.) Bernardello  
Referencias: Bernardello, L. M., 1995.
- Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc. var. *sleumeri* F.A. Barkley = **Lycium tenuispinosum** Miers var. **friesii** (Dammer) C.L. Hitchc.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium pachyclados* Phil. = **Lycium deserti** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium patagonicum* Miers = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **descolei** F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium patagonicum* Miers var. *longiflorum* (Phil.) A. Terracc. = **Lycium gilliesianum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium patagonicum* Miers var. *melanopotamicum* (Niederl.) A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **confertifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium patagonicum* Miers var. *normale* A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **descolei** F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium patagonicum* Miers var. *pubescens* (Miers) A. Terracc. = **Lycium tenuispinosum** Miers var. **tenuispinosum**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium penduliflorum* I.M. Johnst. = **Lycium fuscum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

- Lycium philippianum* Speg. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **minutifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium pruinosum* Griseb. = **Lycium americanum** Jacq.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1984.
- Lycium pruinosum* Griseb. var. *puberulum* Griseb.  
= **Lycium cuneatum** Dammer  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium pubescens* Miers = **Lycium tenuispinosum** Miers var. **tenuispinosum**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium pubitubum** C.L. Hitchc.  
Sin.: *Lycium minutifolium* J. Remy var. *major* Kuntze  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.  
Arbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[Moreno, F. s.n. (NY)].
- Lycium pulverulentum* Skottsbo. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium rachidocladum** Dunal  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *rachidocladum* (Dunal) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rachidocladum* (Dunal) A. Terracc.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1994.  
Arbusto. Endémica. 0–3500 m.  
Países: CHL(III, IV).  
Ejemplares de referencia: CHL[Kausel, E. M. L. 4995 (LIL)].
- Lycium repens** Speg.  
Sin.: *Lycium o'donellii* F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999.  
Arbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[Correa, M. N. 4147 (BAA, BAB)].
- Lycium rhadinum* Phil. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium rhodolphi* Speg. = **Lycium minutifolium** J. Remy  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium rigidum* Gillies ex Miers = **Lycium gilliesianum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *chilense* (Bertero) Kuntze = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *floribundum* (Dunal) Kuntze = **Lycium tenuispinosum** Miers var. **tenuispinosum**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *gracile* (Meyen) Kuntze = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *patagonicum* (Miers) Kuntze = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **descolei** F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *pubescens* (Miers) Kuntze = **Lycium tenuispinosum** Miers var. **tenuispinosum**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium schickendantzii* F.A. Barkley = **Lycium ciliatum** Schltld.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium schreiteri** F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M. & Luján, M. C., 1997; Bernardello, L. M., 1986, 1995.  
Arbusto. Endémica. 1500–3000 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Palacios 1670 (CORD)].
- Lycium scoparium* Miers = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium scoparium* Miers var. *affine* (Miers) A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) A. Terracc. = **Lycium ciliatum** Schltld.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium scoparium* Miers var. *argentinum* (Hieron.) Griseb. = **Lycium ciliatum** Schltld.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium scoparium* Miers var. *calycinum* Griseb. = **Lycium tenuispinosum** Miers var. **calycinum** (Griseb.) Bernardello  
Referencias: Bernardello, L. M., 1995.
- Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* (Miers) A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **confertifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* Miers = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **confertifolium** (Miers) F.A. Barkley  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium scoparium* Miers var. *divaricatum* (Miers) A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

- Lycium scoparium* Miers var. *fuscum* (Miers) A. Terracc.  
= **Lycium fuscum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium scoparium* Miers var. *grevilleanum* (Miers)  
A. Terracc. = **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium scoparium* Miers var. *lineare* (Miers) A. Terracc.  
= **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium scoparium* Miers subsp. *normale* A. Terracc.  
= **Lycium chilense** Miers ex Bertero var. **chilense**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium sessiliflorum* Phil. = **Lycium chilense** Miers ex  
Bertero var. **glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium sparrei* F.A. Barkley = **Lycium chilense** Miers ex  
Bertero var. **glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium spinulosum* Miers = **Lycium tenuispinosum**  
Miers var. **tenuispinosum**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1999.
- Lycium spinulosum* Miers var. *parvifolium* Gillies ex  
Miers = **Lycium tenuispinosum** Miers var.  
**tenuispinosum**  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium stenophyllum** J. Remy  
Sin.: *Lycium fragosum* Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986; Dillon, M. O., 2005;  
Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R.,  
Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. &  
Arancio, G., 1998.  
Arbusto. Nativa. 0–2500 m.  
Países: CHL(I, II, III, IV).  
Ejemplares de referencia: CHL[Zöllner, O. 6178 (CTES, L)].
- Lycium subtridentatum* Dammer = **Lycium americanum**  
Jacq.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1984.
- Lycium tenuispinosum** Miers var. **calycinum** (Griseb.)  
Bernardello  
Sin.: *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc., *Lycium scoparium*  
Miers var. *calycinum* Griseb.  
Referencias: Bernardello, L. M. & Luján, M. C., 1997;  
Bernardello, L. M., 1986, 1995.  
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(VIII).  
Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 612  
(CORD)]; CHL[Pérez Moreau s.n. (BA)].
- Lycium tenuispinosum** Miers var. **friesii** (Dammer)  
C.L. Hitchc.  
Sin.: *Lycium friesii* Dammer, *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc.  
var. *sleumeri* F.A. Barkley, *Lycium venturii*  
C.L. Hitchc.  
Referencias: Bernardello, L. M. & Luján, M. C., 1997;  
Bernardello, L. M., 1986, 1995.  
Arbusto. Endémica. 300–3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU,  
TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 591  
(CORD)].
- Lycium tenuispinosum** Miers var. **tenuispinosum**  
Sin.: *Lycium chubutense* Dusén, *Lycium floribundum* Dunal,  
*Lycium floribundum* Dunal var. *normale* A. Terracc.,  
*Lycium floribundum* Dunal var. *tenuispinosum* (Miers)  
A. Terracc., *Lycium patagonicum* Miers var. *pubescens*  
(Miers) A. Terracc., *Lycium pubescens* Miers, *Lycium*  
*salsum* Ruiz & Pav. var. *floribundum* (Dunal) Kuntze,  
*Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *pubescens* (Miers)  
Kuntze, *Lycium spinulosum* Miers, *Lycium spinulosum*  
Miers var. *parvifolium* Gillies ex Miers  
Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002;  
Bernardello, L. M., 1986, 1995, 1999; Degen, R. &  
Mereles, F., 1996.  
Arbusto. Endémica. 0–2600 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU,  
RNE, SDE, SFE, SJU, SLU); PRY(APY).  
Ejemplares de referencia: ARG[Negritto, M. A. 311 (CORD,  
SI)]; PRY[Mereles, F. 4543 (FCQ)].
- Lycium tweedianum* auct. non Griseb. = **Lycium**  
**americanum** Jacq.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1995.
- Lycium tweedianum* Griseb. = **Lycium infaustum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium tweedianum* Griseb. var. *heterophyllum* Hassl.  
= **Lycium nodosum** Miers
- Lycium tweedianum* Griseb. var. *pruinatum* (Griseb.)  
Hassl. = **Lycium americanum** Jacq.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1984.
- Lycium venosum* Phil. = **Lycium chilense** Miers ex  
Bertero var. **glaberrimum** Phil.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.
- Lycium venturii* C.L. Hitchc. = **Lycium tenuispinosum**  
Miers var. **friesii** (Dammer) C.L. Hitchc.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1995.
- Lycium vergarae* Phil. = **Lycium chilense** Miers ex  
Bertero var. **vergarae** (Phil.) Bernardello  
Referencias: Bernardello, L. M., 1995.
- Lycium vimineum** Miers  
Sin.: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *vimineum* (Miers)  
A. Terracc.  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986, 1995.  
Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SFE); URY(DUR).  
Ejemplares de referencia: ARG[Bernardello, G. 896  
(CORD)]; URY[Schroeder, J. s.n. (BAB, CORD)].

*Lycium wilkesii* Ball = **Lycium gilliesianum** Miers  
Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Lycopersicon chilense* Dunal = **Solanum chilense**  
(Dunal) Reiche  
Referencias: Peralta, I. E. & Spooner, D. M., 2005.

[*Lycopersicon fastigiatum* R. Br.]  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Lycopersicon peruvianum* (L.) Mill. = **Solanum peruvianum** L.  
Referencias: Peralta, I. E. & Spooner, D. M., 2005.

*Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill. = **Solanum pimpinellifolium** L.  
Referencias: Peralta, I. E. & Spooner, D. M., 2005.

*Lycopersicon pissisi* Phil. = **Solanum pimpinellifolium** L.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Markea longipes* (Sendtn.) Cuatrec. = **Dysochroma longipes** (Sendtn.) Miers  
Referencias: Hunziker, A. T., 1997c.

**Melananthus Walp.**  
Número de especies: 1 endémica

*Melananthus fasciculatus* auct. non (Benth.) Soler.  
= **Melananthus multiflorus** Carvalho  
Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2005.

**Melananthus multiflorus** Carvalho  
Sin.: *Melananthus fasciculatus* auct. non (Benth.) Soler.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2005; Hunziker, A. T., 1977a, 1979b.  
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(COS); BRA(RGS).  
Ejemplares de referencia: ARG[Schinini, A. 12333 (SI)].

**Nicandra Adans.**  
Número de especies: 1

**Nicandra physalodes** (L.) Gaertn.  
Sin.: *Atropa physalodes* L.  
Referencias: Barboza, G. E., Carrizo García, C. & Hunziker, A. T., 1997; Cabrera, A. L., 1983d; Carrizo García, C., 2005; Hunziker, A. T., 1979b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, IV, V, RME).  
Ejemplares de referencia: ARG[Negritto, M. A. 459 (CORD)]; BRA[Reitz, P. R. 2713 (HBR, US)]; CHL[Matthei, O. R. 390 (CONC)].

**Nicotiana L.**  
Número de especies: 27, 16 endémicas, 1 introducida

**Nicotiana acaulis** Speg.  
Sin.: *Petunia humifusa* Speg., hom. illeg.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Rossow, R. A., 1999f.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[Rossow, R. A. 4465 (BAB, BAF)].

**Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **acuminata**  
Sin.: *Nicotiana copiapina* Phil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *oligantha* (Phil.) Millán, *Nicotiana oligantha* Phil., *Nicotiana uspallatensis* Phil., *Petunia acuminata* Graham  
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Rossow, R. A., 1999f.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3400 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, RME).  
Ejemplares de referencia: ARG[Grondona, E. M. 3285 (BAB, CTES, K)]; CHL[Muñoz-Schick, M. 3895 (SGO)].

**Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **compacta** Goodsp.  
Referencias: Goodspeed, T. H., 1954; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Rossow, R. A., 1999f.  
Hierba. Anual. Endémica. 2700–3500 m.  
Países: CHL(IV).  
Ejemplares de referencia: CHL[Morrison s.n. (UC)].

**Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **multiflora** (Phil.) Reiche  
Sin.: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav., *Nicotiana heterophylla* Phil., *Nicotiana multiflora* Phil.  
Referencias: Goodspeed, T. H., 1954; Rossow, R. A., 1999f.  
Hierba. Anual. Endémica. 100–3100 m.  
Países: CHL(II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, RME).  
Ejemplares de referencia: CHL[Rodríguez Ríos, R. 3725 (CONC)].

*Nicotiana acuta* Griseb. = **Nicotiana longiflora** Cav.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Nicotiana acutiflora* A. St.-Hil. = **Nicotiana longiflora** Cav.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Nicotiana affinis* Hort ex Moore = **Nicotiana alata** Link & Otto  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979.

**Nicotiana alata** Link & Otto  
Sin.: *Nicotiana affinis* Hort ex Moore, *Nicotiana alata* Link & Otto var. *grandiflora* Comes, *Nicotiana persica* Lindl.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

- Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA);  
PRY(ITA); URY(FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO,  
RIV, SAO, SJO, TYT).  
Ejemplares de referencia: ARG[Scarpa, G. F. 507 (SI)];  
BRA[Reitz, P. R. 5530 (HBR, US)]; PRY[Bertoni 4460  
(CORD, LIL)]; URY[Rosengurt, B. 584 (LP)].
- Nicotiana alata* Link & Otto var. *grandiflora* Comes  
= **Nicotiana alata** Link & Otto  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
Goodspeed, T. H., 1954.
- Nicotiana alpina* Poepp. var. *deserticola* Speg.  
= **Nicotiana linearis** Phil.  
Referencias: Rossow, R. A., 1999f.
- Nicotiana alpina* Poepp. var. *patagonica* Speg.  
= **Nicotiana linearis** Phil.  
Referencias: Rossow, R. A., 1999f.
- Nicotiana ameghinoi** Speg.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
Goodspeed, T. H., 1954; Rossow, R. A., 1999f.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CHU, SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[Boelcke, O. 15402 (BAB)].
- Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav. = **Nicotiana  
acuminata** (Graham) Hook. var. **multiflora** (Phil.)  
Reiche  
Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.
- Nicotiana axillaris* Lam. = **Petunia axillaris** (Lam.)  
Britton, Stern & Poggenb. subsp. **axillaris**  
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.
- Nicotiana axillaris* Lam. var. *nyctaginiflora* (Juss.)  
Kuntze = **Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern &  
Poggenb. subsp. **axillaris**  
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.
- Nicotiana axillaris* Lam. var. *propinqua* (Miers) Kuntze  
= **Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.  
subsp. **axillaris**
- Nicotiana azambujae** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.  
Países: BRA(SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 2245 (HBR,  
US)].
- Nicotiana bonariensis** Lehm.  
Sin.: *Nicotiana bonariensis* Lehm. var. *spathulata* Sendtn.,  
*Nicotiana flexuosa* C. Jeffrey, *Nicotiana tristis* Sm.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Cocucci, A. A. &  
Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Smith,  
L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.  
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA);  
URY(ART, CAS, CLA, MAL, RIV, ROC, SJO, SOR).  
Ejemplares de referencia: ARG[Burkart, A. 26053 (SI)];  
BRA[Reitz, P. R. 11371 (HBR, US)]; URY[Burkart, A.  
18171 (CORD, SI)].
- Nicotiana bonariensis* Lehm. var. *spathulata* Sendtn.  
= **Nicotiana bonariensis** Lehm.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.
- Nicotiana brachysolen* Phil. = **Nicotiana undulata** Ruiz  
& Pav.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.
- Nicotiana breviloba* Phil. = **Nicotiana solanifolia** Walp.  
Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.
- Nicotiana cardiophylla* Phil. = **Nicotiana solanifolia**  
Walp.  
Referencias: Dillon, M. O., 2005; Goodspeed, T. H., 1954.
- Nicotiana caudigera* Phil. = **Nicotiana pauciflora** J. Remy  
Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.
- Nicotiana cavanillesi* auct. non Dunal = **Nicotiana  
noctiflora** Hook.  
Referencias: Steibel, P. & Cunquero, H., 1991.
- Nicotiana cavanillesi* Dunal = **Nicotiana  
plumbaginifolia** Viv.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.
- Nicotiana cavanillesi* Dunal var. *noctiflora* (Hook.)  
Millán = **Nicotiana noctiflora** Hook.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
Rossow, R. A., 1999f.
- Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *albiflora* (Comes)  
Millán = **Nicotiana paa** Mart. Crov.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.
- Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *typica* Millán, nom.  
inval. = **Nicotiana noctiflora** Hook.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
Rossow, R. A., 1999f.
- Nicotiana cerinthoides* Hornem. = **Nicotiana  
paniculata** L.  
Referencias: Vignoli-Silva, M. & Mentz, L. A., 2005b.
- Nicotiana chilensis* Millán = **Nicotiana undulata** Ruiz &  
Pav.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.
- Nicotiana collae* Phil. = **Nicotiana miersii** J. Remy var.  
**miersii**  
Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.
- Nicotiana copiapina* Phil. = **Nicotiana acuminata**  
(Graham) Hook. var. **acuminata**  
Referencias: Rossow, R. A., 1999f.
- Nicotiana coquimbana* Phil. = **Nicotiana miersii**  
J. Remy var. **miersii**  
Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

**Nicotiana cordifolia** Phil.

Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.  
 Arbusto. Endémica. 0–200 m.  
 Países: CHL(IJF).  
 Ejemplares de referencia: CHL[Muñoz 7124 (CONC)].

**Nicotiana corymbosa** J. Remy var. **australis** Goodsp.

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
 Goodspeed, T. H., 1954.  
 Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.  
 Países: ARG(CHU, RNE, SCR).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Scolnik, R. 492 (CORD)].

**Nicotiana corymbosa** J. Remy var. **corymbosa**

Sin.: *Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotiana monticola* Dunal, *Nicotiana oulophylla* Dunal, *Nicotiana scapigera* Phil.  
 Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Plissock, P., 2002; Cabrera, A. L., 1957b; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Rossow, R. A., 1999f.  
 Hierba. Anual. Endémica. 1500–3500 m.  
 Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU); CHL(II, III, IV, V, VII, RME).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Rossow, R. A. 4479 (BAB, BAF)]; CHL[Zoellner, O. 9773 (CONC)].

*Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *deserticola* (Speg.) Millán = **Nicotiana linearis** Phil.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *typica* Millán, nom. inval. = **Nicotiana corymbosa** J. Remy var. **corymbosa**

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.

*Nicotiana crispa* Phil., hom. illeg. = **Nicotiana petunioides** (Griseb.) Millán

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Nicotiana deserticola* Speg. = **Nicotiana petunioides** (Griseb.) Millán

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Nicotiana flexuosa* C. Jeffrey = **Nicotiana bonariensis** Lehm.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979.

*Nicotiana floribunda* (Phil.) Reiche = **Nicotiana miersii** J. Remy var. **lychnoides** (J. Remy) Goodsp.

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

**Nicotiana forgetiana** Hemsl.

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966;  
 Vignoli-Silva, M. & Mentz, L. A., 2005b.  
 Hierba. Anual o perenne. Endémica. 700–1300 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).  
 Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 16457 (HBR, US)].

*Nicotiana friesii* Dammer ex R.E. Fr. = **Nicotiana otophora** Griseb.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

**Nicotiana glauca** Graham

Sin.: *Acnistus virgatus* Griseb., *Nicotiana glauca* Graham f. *lateritia* Lillo, *Nicotiana glauca* Graham var. *decurrens* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *grandiflora* Comes, *Nicotiana glauca* Graham var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotidendron glauca* (Graham) Griseb.

Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Browicz, K., 1993; Cabrera, A. L., 1983d; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Goodspeed, T. H., 1954; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, RME); PRY(APY, COA, PAI); URY(MON, SAO, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[Scarpa, G. F. 505 (SI)]; BRA[Wasum, R. 6600 (NY)]; CHL[Zoellner, O. 9608 (CONC)]; PRY[Basualdo, I. 732 (FCQ, MO)]; URY[Berro, M. B. 5781 (MVFA)].

*Nicotiana glauca* Graham f. *lateritia* Lillo = **Nicotiana glauca** Graham

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.

*Nicotiana glauca* Graham var. *decurrens* Comes = **Nicotiana glauca** Graham

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.

*Nicotiana glauca* Graham var. *grandiflora* Comes = **Nicotiana glauca** Graham

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.

*Nicotiana glauca* Graham var. *typica* Millán, nom. inval. = **Nicotiana glauca** Graham

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.

*Nicotiana heterophylla* Phil. = **Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **multiflora** (Phil.) Reiche

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

*Nicotiana integrifolia* (Hook.) Kuntze = **Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia****Nicotiana langsdorfii** Weinm.

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
 Goodspeed, T. H., 1954; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966; Vignoli-Silva, M. & Mentz, L. A., 2005b.

Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 482 (CORD, CTES, SI)]; BRA[Smith, L. B. 10290 (HBR, R, US)]; PRY[Fiebrig, K. A. G. 5399 (GH, K, US)].

**Nicotiana linearis** Phil.

Sin.: *Collomia patagonica* Speg., *Nicotiana alpina* Poepp. var. *deserticola* Speg., *Nicotiana alpina* Poepp. var. *patagonica* Speg., *Nicotiana corymbosa* J. Remy var. *deserticola* (Speg.) Millán

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
Goodspeed, T. H., 1954; Rossow, R. A., 1999f.

Hierba. Anual. Endémica. 0–3500 m.

Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(IV, VII).

Ejemplares de referencia: ARG[Correa, M. N. 3068 (BAA, BAB)]; CHL[Jiles, C. 2044 (CONC)].

### **Nicotiana longibracteata** Phil.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L., 1957b, 1983d; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954.

Hierba. Anual. Endémica. 3400–4000 m.

Países: ARG(CAT, SAL); CHL(II).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 8786 (LP)]; CHL[Arroyo, M. T. K. 94037 (CONC)].

### **Nicotiana longiflora** Cav.

Sin.: *Nicotiana acuta* Griseb., *Nicotiana acutiflora* A. St.-Hil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *acutiflora* (A. St.-Hil.) Comes, *Nicotiana longiflora* Cav. var. *breviflora* Comes, *Nicotiana longiflora* Cav. var. *grandifolia* Morong

Referencias: Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, CON, COA, PAI, PHA); URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[Múlgura de Romero, M. E. 2827 (SI)]; BRA[Klein, R. M. 4569 (HBR, US)]; PRY[Zardini, E. M. 29382 (AS, MO)]; URY[Del Puerto, O. 5733 (MVFA), Herter, G. 756 (M)].

### *Nicotiana longiflora* Cav. var. *acutiflora* (A. St.-Hil.)

Comes = **Nicotiana longiflora** Cav.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

### *Nicotiana longiflora* Cav. var. *breviflora* Comes

= **Nicotiana longiflora** Cav.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

### *Nicotiana longiflora* Cav. var. *grandifolia* Morong

= **Nicotiana longiflora** Cav.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

### *Nicotiana longiflora* Cav. var. *oligantha* (Phil.) Millán

= **Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **acuminata**

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

### *Nicotiana longiflora* Cav. var. *pauciflora* (J. Remy)

Comes = **Nicotiana pauciflora** J. Remy

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

### *Nicotiana lychnoides* J. Remy = **Nicotiana miersii**

J. Remy var. **lychnoides** (J. Remy) Goodsp.

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

### *Nicotiana mendocina* Phil. = **Nicotiana noctiflora** Hook.

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
Rossow, R. A., 1999f.

### **Nicotiana miersii** J. Remy var. **lychnoides** (J. Remy)

Goodsp.

Sin.: *Nicotiana floribunda* (Phil.) Reiche, *Nicotiana lychnoides* J. Remy, *Waddingtonia floribunda* Phil.

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

Hierba. Anual. Endémica. 0–1400 m.

Países: CHL(III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[Ricardi, M. 4467 (CONC)].

### **Nicotiana miersii** J. Remy var. **miersii**

Sin.: *Nicotiana collae* Phil., *Nicotiana coquimbana* Phil., *Nicotiana parviflora* Phil., hom. illeg., *Petunia viscosa* Colla, hom. illeg.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002;  
Goodspeed, T. H., 1954.

Hierba. Anual. Endémica. 0–1400 m.

Países: CHL(III, IV, V, RME).

Ejemplares de referencia: CHL[Marticorena, C. 538 (CONC)].

### *Nicotiana minima* Phil. = **Combera minima** (Phil.)

Sandwith

Referencias: Ricardi, M., 1962.

### *Nicotiana monticola* Dunal = **Nicotiana corymbosa**

J. Remy var. **corymbosa**

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

### *Nicotiana multiflora* Phil. = **Nicotiana acuminata**

(Graham) Hook. var. **multiflora** (Phil.) Reiche

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

### **Nicotiana mutabilis** Stehmann & Semir

Referencias: Vignoli-Silva, M. & Mentz, L. A., 2005b.

Hierba. Anual o bianual. Endémica.

Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[Stehmann, J. R. 1842 (UEC)].

### **Nicotiana noctiflora** Hook.

Sin.: *Dittostigma mendocinum* Phil., *Nicotiana cavanillesi* auct. non Dunal, *Nicotiana cavanillesi* Dunal var. *noctiflora* (Hook.) Millán, *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *typica* Millán, nom. inval., *Nicotiana mendocina* Phil.

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005;  
Goodspeed, T. H., 1954; Moscone, E. A., 1992;  
Rossow, R. A., 1999f.

Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–2400 m.

Países: ARG(BAI, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Cocucci, A. A. 1015 (CORD)].

### *Nicotiana noctiflora* Hook. var. *albiflora* Comes

= **Nicotiana paa** Mart. Crov.

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005.

### *Nicotiana nyctaginiflora* (Juss.) Lehm. = **Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **axillaris**

*Nicotiana oligantha* Phil. = **Nicotiana acuminata**(Graham) Hook. var. **acuminata**

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

**Nicotiana otophora** Griseb.Sin.: *Lehmannia otophora* (Griseb.) Comes, *Nicotiana friesii* Dammer ex R.E. Fr.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 500–2500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11341* (CORD, MCNS)].*Nicotiana oulophylla* Dunal = **Nicotiana corymbosa**J. Remy var. **corymbosa**

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

**Nicotiana paa** Mart. Crov.Sin.: *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *albiflora* (Comes) Millán, *Nicotiana noctiflora* Hook. var. *albiflora* Comes

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 2005; Martínez Crovetto, R., 1978.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(III).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1576* (SI)]; CHL[*Morrison 17102* (UC)].*Nicotiana pampasana* Kuntze = **Nicotiana petunioides**

(Griseb.) Millán

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

[*Nicotiana paniculata* L.]Sin.: *Nicotiana cerinthoides* Hornem.

Referencias: Vignoli-Silva, M. &amp; Mentz, L. A., 2005b.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Nicotiana parviflora* (Juss.) Lehm. = **Calibrachoa****parviflora** (Juss.) D'Arcy*Nicotiana parviflora* Phil., hom. illeg. = **Nicotiana****miersii** J. Remy var. **miersii**

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

**Nicotiana pauciflora** J. RemySin.: *Nicotiana caudigera* Phil., *Nicotiana longiflora* Cav. var. *pauciflora* (J. Remy) Comes

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

Hierba. Anual. Endémica. 500–2500 m.

Países: CHL(III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 970* (GH, K, NY, UC)].*Nicotiana persica* Lindl. = **Nicotiana alata** Link & Otto

Referencias: Cabrera, A. L., 1979.

**Nicotiana petunioides** (Griseb.) MillánSin.: *Fabiana petunioides* Griseb., *Nicotiana crispa* Phil., hom. illeg., *Nicotiana deserticola* Speg., *Nicotiana pampasana* Kuntze, *Nicotiana philippi* Millán

Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. &amp; Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L., 1983d; Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Rossow, R. A., 1999f.

Hierba. Anual. Endémica. 3700–4300 m.

Países: ARG(CAT, CHA, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU); CHL(II, III).

Ejemplares de referencia: ARG[*Schickendantz, F. 304* (CORD, GOET)]; CHL[*Arancio, G. 10500* (ULS)].*Nicotiana philippi* Millán = **Nicotiana petunioides**

(Griseb.) Millán

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

**Nicotiana plumbaginifolia** Viv.Sin.: *Nicotiana cavanillesii* Dunal

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954.

Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 1092* (CORD)]; PRY[*Vanni, R. O. 1860* (CTES)].*Nicotiana scapigera* Phil. = **Nicotiana corymbosa**J. Remy var. **corymbosa**

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

**Nicotiana solanifolia** Walp.Sin.: *Nicotiana breviloba* Phil., *Nicotiana cardiophylla* Phil.

Referencias: Dillon, M. O., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. &amp; Arancio, G., 1998; Teillier A., S., Zepeda F., H. &amp; García V., P., 1998.

Arbustiforme. Perenne. Endémica. 0–1000 m.

Países: CHL(I, II, III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[*Rodríguez Ríos, R. 3131* (CONC)].**Nicotiana spegazzini** Millán

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Rossow, R. A., 1999f; Steibel, P. &amp; Cunquero, H., 1991.

Hierba. Anual. Endémica. 0–3500 m.

Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10670* (BAA, BAB, SI)].*Nicotiana staticifolia* (Sendtn.) Kuntze = **Bouchetia****anomala** (Miers) Britton & Rusby

Referencias: Hunziker, A. T. &amp; Subils, R., 1995a.

**Nicotiana sylvestris** Speg. & Comes

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Moscone, E. A., 1992.

Hierba. Perenne. Nativa. 500–2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1738* (CORD)].

**Nicotiana tabacum** L.

Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba. Anual o perenne. Introducida. 0–500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IJF); PRY(PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[Cocucci, A. A. 1412 (CORD)]; BRA[Reitz, P. R. 3639 (HBR)]; CHL[López 48 (CONC)]; PRY[Soria, N. 2226 (FCQ, MO)].

**Nicotiana tristis** Sm. = **Nicotiana bonariensis** Lehm.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979.

**Nicotiana undulata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Nicotiana brachysolen* Phil., *Nicotiana chilensis* Millán

Referencias: Cabrera, A. L., 1957b, 1983d; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 2005; Goodspeed, T. H., 1954; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.

Hierba. Anual. Nativa. 2500–4500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(II).

Ejemplares de referencia: ARG[Negritto, M. A. 369 (CORD)]; CHL[Marticorena, C. 364 (CONC)].

**Nicotiana usspallatensis** Phil. = **Nicotiana acuminata** (Graham) Hook. var. **acuminata**

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

**Nicotidendron glauca** (Graham) Griseb. = **Nicotiana glauca** Graham

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

**Nierembergia Ruiz & Pav.**

Número de especies: 18, 11 endémicas

**Nierembergia andina** Millán = **Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **pulchella**

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

**Nierembergia angustifolia** Kunth f. **frutescens** (Durieu) Kuntze = **Nierembergia scoparia** Sendtn.**Nierembergia angustifolia** Kunth var. **filicaulis** (Lindl.) Hassl. = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia****Nierembergia angustifolia** Kunth var. **intermedia** Hassl. = **Nierembergia aristata** D. Don

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1993.

**Nierembergia anomala** Miers = **Bouchetia anomala** (Miers) Britton & Rusby

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b.

**Nierembergia aristata** auct. non D. Don = **Nierembergia rigida** Miers

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1993.

**Nierembergia aristata** D. Don

Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth var. *intermedia* Hassl., *Nierembergia aristata* D. Don var. *stricta* (Miers) Griseb., *Nierembergia prostrata* Millán, *Nierembergia stricta* Miers

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1993, 1995b; Rossow, R. A., 1999f.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE); BRA(SCA); PRY(PHA); URY(CAS, FLA, PAY, RNO, SAO).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 524 (CORD)]; BRA[Smith, L. B. 11189 (HBR, R, US)]; PRY[Schinini, A. 25892 (CTES)]; URY[Rosengurt, B. 5789 (LIL)].

**Nierembergia aristata** D. Don var. **montana** Griseb. = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

**Nierembergia aristata** D. Don var. **stricta** (Miers) Griseb. = **Nierembergia aristata** D. Don

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1993.

**Nierembergia boliviana** Millán = **Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **pulchella**

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

**Nierembergia browallioides** Griseb.

Sin.: *Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *grandiflora* Kuntze, *Nierembergia parodii* Millán

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b; Millán, R., 1941.

Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Lorentz, P. G. 407 (CORD, GOET)].

**Nierembergia caerulea** Miers = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

**Nierembergia calycina** Hook.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b; Millán, R., 1941.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(ERI); URY(CAS, COL, DUR, FLA, FLO, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SOR, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 346 (CORD, CTES, SI)]; URY[Gallinal, J. P. 2177 (SI)].

**Nierembergia canescens** Millán = **Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **pulchella**

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

**Nierembergia catamarcensis** Millán = **Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **pulchella**

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

**Nierembergia ericoides** Miers

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b;  
Cosa de Gastiazoro, M., 1991; Millán, R., 1941.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.  
Países: ARG(BAI).  
Ejemplares de referencia: ARG[Cocucci, A. A. 818 (CORD),  
Spegazzini, R. A. s.n. (BAB, CTES)].  
Notas: La presencia de esta especie en Uruguay es dudosa.

*Nierembergia ericoides* Miers var. *tandilensis* (Kuntze)  
Millán = **Nierembergia tandilensis** (Kuntze) Cabrera  
Referencias: Cabrera, A. L., 1965b.

*Nierembergia famatinensis* Millán = **Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **macrocalyx** (Millán) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia filicaulis* Lindl. = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia frutescens* Durieu = **Nierembergia scoparia** Sendtn.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b.

*Nierembergia gracilis* Hook. = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia gracilis* Hook. var. *guaranitica* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia grandiflora* Millán = **Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **macrocalyx** (Millán) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

**Nierembergia graveolens** A. St.-Hil.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b; Millán, R., 1941.  
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(COS, ERI); URY(CLA, COL, PAY, RNO, SOR).  
Ejemplares de referencia: ARG[Pedersen, T. M. 7343 (CORD)]; URY[Rosengurt, B. 1576b (SI)].

*Nierembergia graveolens* Dunal, hom. illeg.  
= **Calibrachoa pubescens** (Spreng.) Stehmann

*Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *grandiflora*  
Kuntze = **Nierembergia browallioides** Griseb.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b.

*Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var. *tandilensis*  
Kuntze = **Nierembergia tandilensis** (Kuntze) Cabrera  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b.

**Nierembergia hatschbachii** A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1993.  
Hierba. Perenne. Endémica. 200–800 m.  
Países: BRA(PAR).  
Ejemplares de referencia: BRA[Lindeman, J. C. 2785 (CORD)].

*Nierembergia hippomanica* Miers = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *caerulea* (Miers)  
Millán = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *crispa* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var. **pinifolioides** (Millán) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *densa* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *dubia* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *elata* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *glabriuscula* Dunal = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *mesopotamica*  
Millán = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *montana* (Griseb.)  
Millán = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *pampeana* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var. **pampeana** (Millán) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b.

*Nierembergia hippomanica* Miers var. *pinifolioides*  
Millán = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **pinifolioides** (Millán) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

- Nierembergia hippomanica* Miers var. *rubricaulis* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var.  
**pinifolioides** (Millán) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.
- Nierembergia hippomanica* Miers var. *scabridopilosa*  
Dunal = **Nierembergia linariifolia** Graham var.  
**linariifolia**  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.
- Nierembergia hippomanica* Miers var. *typica* Millán,  
nom. inval. = **Nierembergia linariifolia** Graham var.  
**linariifolia**
- Nierembergia hippomanica* Miers var. *violacea* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var.  
**glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.
- Nierembergia intermedia* Graham = **Calibrachoa linearis**  
(Hook.) Wijsman  
Referencias: Wijsman, H. J. W., 1990.
- Nierembergia linariifolia** Graham var. **glabriuscula**  
(Dunal) A. Cocucci & Hunz.  
Sin.: *Nierembergia aristata* D. Don var. *montana* Griseb.,  
*Nierembergia hippomanica* Miers var. *densa* Millán,  
*Nierembergia hippomanica* Miers var. *dubia* Millán,  
*Nierembergia hippomanica* Miers var. *elata* Millán,  
*Nierembergia hippomanica* Miers var. *glabriuscula*  
Dunal, *Nierembergia hippomanica* Miers var. *montana*  
(Griseb.) Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var.  
*violacea* Millán, *Nierembergia montana* (Griseb.)  
Hieron.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a, b.  
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SLU).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9568*  
(CORD)].
- Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**  
Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth var. *filicaulis* (Lindl.)  
Hasl., *Nierembergia caerulea* Miers, *Nierembergia*  
*filicaulis* Lindl., *Nierembergia gracilis* Hook.,  
*Nierembergia gracilis* Hook. var. *guaranitica* Millán,  
*Nierembergia hippomanica* Miers, *Nierembergia*  
*hippomanica* Miers var. *caerulea* (Miers) Millán,  
*Nierembergia hippomanica* Miers var. *mesopotamica*  
Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var.  
*scabridopilosa* Dunal, *Nierembergia hippomanica*  
Miers var. *typica* Millán, nom. inval., *Nierembergia*  
*scoparia* Sendtn. var. *glaberrima* Millán, *Siphonema*  
*filicaulis* Raf.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a, b.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS,  
SAL, SDE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(ITA, PHA);  
URY(MON).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1736* (SI)];  
BRA[*Hunziker, A. T. 23502* (CORD)]; PRY[*Hassler, E.*  
*1398* (G, LIL, SI)]; URY[*Felippone, F. 3264* (LIL, SI)].
- Nierembergia linariifolia** Graham var. **pampeana**  
(Millán) A. Cocucci & Hunz.  
Sin.: *Nierembergia hippomanica* Miers var. *pampeana* Millán  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a, b;  
Rossow, R. A., 1999f.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, RNE).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9739* (BAB,  
CTES)].
- Nierembergia linariifolia** Graham var. **pinifolioides**  
(Millán) A. Cocucci & Hunz.  
Sin.: *Nierembergia hippomanica* Miers var. *crispa* Millán,  
*Nierembergia hippomanica* Miers var. *pinifolioides*  
Millán, *Nierembergia hippomanica* Miers var.  
*rubricaulis* Millán  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a, b.  
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, SDE, SLU).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 7438*  
(CORD)].
- Nierembergia linifolia* Miers = **Leptoglossis linifolia**  
(Miers) Griseb.  
Referencias: Rossow, R. A., 1999f.
- Nierembergia linifolia* Miers var. *macrophylla* Dunal  
= **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.  
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.
- Nierembergia linifolia* Miers var. *parviflora* Dunal  
= **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.  
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.
- Nierembergia longistyla* Millán = **Nierembergia**  
**pulchella** Gillies ex Miers var. **longistyla** (Millán)  
A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.
- Nierembergia macrocalyx* Millán = **Nierembergia**  
**pulchella** Gillies ex Miers var. **macrocalyx** (Millán)  
A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.
- Nierembergia micrantha** Cabrera  
Referencias: Cabrera, A. L., 1977, 1979; Cocucci, A. A. &  
Hunziker, A. T., 1995b.  
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(ERI); BRA(PAR, RGS); URY(ART, RIV,  
TYT).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1261* (SI)];  
BRA[*Hatschbach, G. 30759* (CORD, MBM)];  
URY[*Berro, M. B. 3077* (MVFA)].
- Nierembergia miersiana* Sendtn. = **Bouchetia erecta**  
Dunal  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b.
- Nierembergia montana* (Griseb.) Hieron.  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var.  
**glabriuscula** (Dunal) A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia parodii* Millán = **Nierembergia****browallioides** Griseb.

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995b.

*Nierembergia patagonica* Speg. = **Petunia patagonica**  
(Speg.) Millán

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Nierembergia pilosa* Millán = **Nierembergia pulchella**Gillies ex Miers var. **macrocalyx** (Millán)

A. Cocucci &amp; Hunz.

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995a.

**Nierembergia pinifolia** Miers

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995b.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(RGS); URY(ART, CLA, LAV, MAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Schwarz, G. J. 1329 (LIL)]; BRA[Isabelle, A. s.n. (P)]; URY[Marchesi, E. 1434 (MVFA)].

*Nierembergia prostrata* Millán = **Nierembergia aristata**  
D. Don

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1993, 1995b.

*Nierembergia prunellifolia* Dunal = **Stenandrium dulce**  
(Cav.) Nees

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995b.

*Nierembergia pubescens* Spreng. = **Calibrachoa****pubescens** (Spreng.) Stehmann

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995b.

**Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **longistyla**  
(Millán) A. Cocucci & Hunz.Sin.: *Nierembergia longistyla* Millán

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995a, b.

Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Rodríguez, F. M. 1289 (SI)].

**Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var.**macrocalyx** (Millán) A. Cocucci & Hunz.Sin.: *Nierembergia famatinensis* Millán, *Nierembergia grandiflora* Millán, *Nierembergia macrocalyx* Millán, *Nierembergia pilosa* Millán, *Nierembergia vivacissima* Millán

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995a, b.

Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 18915 (SI)].

**Nierembergia pulchella** Gillies ex Miers var. **pulchella**Sin.: *Nierembergia andina* Millán, *Nierembergia boliviana* Millán, *Nierembergia canescens* Millán, *Nierembergia catamarcensis* Millán

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995a, b;

Millán, R., 1941.

Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 17032 (SI)].

*Nierembergia punicea* Sendtn. = **Petunia integrifolia**(Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia**

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995b.

**Nierembergia repens** Ruiz & Pav.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. &amp; Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. &amp; Rodríguez Ríos, R., 1999.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: CHL(VII, VIII, IX).

Ejemplares de referencia: CHL[Arroyo, M. T. K. 996099a (CONC)].

*Nierembergia repens* auct. non Ruiz & Pav.= **Nierembergia rivularis** Miers

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995b.

**Nierembergia rigida** MiersSin.: *Nierembergia aristata* auct. non D. Don

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1993, 1995b.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, LRI, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Pozner, R. 215 (CTES, SI)].

**Nierembergia riograndensis** Hunz. & Cocucci

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1993.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[Krapovickas, A. 34191 (CTES)].

**Nierembergia rivularis** MiersSin.: *Nierembergia repens* auct. non Ruiz & Pav.

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995b.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COS, SAL); URY(COL, RNO, SOR, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[Arbo, M. M. 6673 (CTES)]; URY[Castellanos 17090 (CORD)].

**Nierembergia scoparia** Sendtn.Sin.: *Nierembergia angustifolia* Kunth f. *frutescens* (Durieu) Kuntze, *Nierembergia frutescens* Durieu, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *breviflora* Millán, *Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *longipedicelata* Millán

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995b; Cosa de Gastiazoro, M., 1991; Millán, R., 1941.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[Pedersen, T. M. 5372 (K)]; BRA[Lindeman, J. C. 8373 (CORD, CTES)]; URY[Rosengurt, B. 414 (CORD, SI)].

*Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *breviflora* Millán  
= **Nierembergia scoparia** Sendtn.*Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *glaberrima* Millán  
= **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**

Referencias: Cocucci, A. A. &amp; Hunziker, A. T., 1995a.

*Nierembergia scoparia* Sendtn. var. *longipedicelata*  
Millán = **Nierembergia scoparia** Sendtn.

*Nierembergia staticifolia* Sendtn. = **Bouchetia anomala**  
(Miers) Britton & Rusby  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b.

*Nierembergia stricta* Miers = **Nierembergia aristata**  
D. Don  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b.

**Nierembergia tandilensis** (Kuntze) Cabrera  
Sin.: *Nierembergia ericoides* Miers var. *tandilensis* (Kuntze)  
Millán, *Nierembergia graveolens* A. St.-Hil. var.  
*tandilensis* Kuntze  
Referencias: Cabrera, A. L., 1965b; Cocucci, A. A. &  
Hunziker, A. T., 1995b.  
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.  
Países: ARG(BAI).  
Ejemplares de referencia: ARG[Gómez, R. s.n. (BA, CTES,  
LIL)].

**Nierembergia tucumanensis** Millán  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995b;  
Millán, R., 1941.  
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.  
Países: ARG(CAT, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 759  
(CORD)].

**Nierembergia veitchii** Hook.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Cocucci, A. A. &  
Hunziker, A. T., 1995b; Millán, R., 1941.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 3812 (SI)].

*Nierembergia viscidula* Kunth = **Calibrachoa parviflora**  
(Juss.) D'Arcy

*Nierembergia vivacissima* Millán = **Nierembergia**  
**pulchella** Gillies ex Miers var. **macrocalyx** (Millán)  
A. Cocucci & Hunz.  
Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

## **Pantacantha** Speg.

Número de especies: 1 endémica

### **Pantacantha ameghinoi** Speg.

Referencias: Cosa de Gastiazoro, M., 1991; Hunziker, A. T.,  
1979b, 2000a; Rossow, R. A., 1999f.  
Arbusto. Endémica. 1700–2500 m.  
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).  
Ejemplares de referencia: ARG[Ambrosetti, A. 1419  
(CORD)].

## **Petunia** Juss.

Número de especies: 17, 15 endémicas

*Petunia acuminata* Graham = **Nicotiana acuminata**  
(Graham) Hook. var. **acuminata**  
Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

*Petunia alpicola* L.B. Sm. & Downs = **Calibrachoa**  
**sellowiana** (Sendtn.) Wijsman

**Petunia alti plana** Ando & Hashim.  
Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1993, 1998.  
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1400 m.  
Países: BRA(RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[Ando, T. 319b (S, US)].

**Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.  
subsp. **axillaris**  
Sin.: *Nicotiana axillaris* Lam., *Nicotiana axillaris* Lam. var.  
*nyctaginiflora* (Juss.) Kuntze, *Nicotiana axillaris* Lam.  
var. *propinqua* (Miers) Kuntze, *Nicotiana nyctaginiflora*  
(Juss.) Lehm., *Petunia nyctaginiflora* Juss., *Petunia*  
*propinqua* Miers, *Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman  
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Ando,  
T. & Hashimoto, G., 1993; Ando, T., 1996; Ando, T.,  
Iida, S., Kokubun, H., Ueda, Y. & Marchesi, E., 1994;  
Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Hunziker, A. T., 1979b;  
Kokubun, H., Ando, T., Kohyama, S., Watanabe, H.,  
Tsukamoto, T. & Marchesi, E., 1997; Smith, L. B. &  
Downs, R. J., 1966.  
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.  
Países: ARG(BAI, LPA, RNE); BRA(RGS); URY(CAS,  
CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON,  
PAY, ROC, SJO, SOR, TYT).  
Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 2396 (LP)];  
BRA[Reineck, E. M. 137 (G)]; URY[Berro, M. B. 7200  
(MVFA)].

**Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.  
subsp. **parodii** (Steere) Cabrera  
Sin.: *Petunia parodii* Steere, *Stimoryne axillaris* (Lam.)  
Wijsman subsp. *parodii* (Steere) Wijsman  
Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1994; Ando, T.,  
1996; Steere, W. C., 1931; Wijsman, H. J. W., 1982.  
Hierba. Anual. Nativa. 0–600 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR); BRA(RGS);  
PRY(APY); URY(ART, COL, DUR, FLO, PAY, RNO,  
SAO, SOR, TAC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 7201 (LP)];  
BRA[Stehmann, J. R. 277 (ICN)]; PRY[Lurres 5204  
(BA)]; URY[Berro, M. B. 2951 (MVFA)].

**Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.  
subsp. **subandina** Ando  
Referencias: Ando, T., 1996.  
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE,  
SJU, SLU, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 9813 (K)].

**Petunia bajeensis** Ando & Hashim.  
Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1998.  
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.  
Países: BRA(RGS).  
Ejemplares de referencia: BRA[Hashimoto, G. 796b (MBM,  
R, SI, SP, US)].

**Petunia bonjardinensis** Ando & Hashim.

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1993, 1998.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 900–1400 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA).  
 Ejemplares de referencia: BRA[Ando, T. 170b (BM, R, S, US)].

**Petunia caesia** Sendtn. = **Calibrachoa caesia** (Sendtn.) Wijsman

Referencias: Wisjman, H. J. W., 1990.

**Petunia calycina** Sendtn. = **Calibrachoa ovalifolia** (Miers) Stehmann & Semir

[**Petunia calycina** Sendtn. var. *flaccida* R.E. Fr.]  
 Notas: Nombre dudoso.

[**Petunia calycina** Sendtn. var. *rigida* R.E. Fr.]  
 Notas: Nombre dudoso.

[**Petunia cumingiana** J. Remy]  
 Notas: Nombre dudoso.

**Petunia dichotoma** Sendtn. = **Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **depauperata** (R.E. Fr.) Stehmann**Petunia dusenii** R.E. Fr. = **Calibrachoa dusenii** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir

**Petunia ericifolia** R.E. Fr. = **Calibrachoa ericifolia** (R.E. Fr.) Wijsman  
 Referencias: Wisjman, H. J. W., 1990.

**Petunia excellens** R.E. Fr. = **Calibrachoa excellens** (R.E. Fr.) Wijsman  
 Referencias: Wisjman, H. J. W., 1990.

**Petunia exserta** Stehmann

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1993; Stehmann, J. R., 1987.  
 Hierba. Anual o bianual. Endémica. 200–300 m.  
 Países: BRA(RGS).  
 Ejemplares de referencia: BRA[Sobral, M. 4290 (ICN, MVM, RB)].

**Petunia felipponei** Sandwith = **Calibrachoa felipponei** (Sandwith) Stehmann**Petunia guarapuavensis** Ando & Hashim.

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1995; Ando, T., Ishikawa, N., Watanabe, H., Kokubun, H., Yanagisawa, Y., Hashimoto, G., Marchesi, E. & Suarez, H., 2005; Ando, T., Soto, S. & Suárez, E., 2005.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 200–1300 m.  
 Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Cusato, L. 445 (BAA)]; BRA[Hashimoto, G. 65b (MBM)].

**Petunia hassleriana** R.E. Fr. = **Calibrachoa excellens** (R.E. Fr.) Wijsman  
 Referencias: Wisjman, H. J. W., 1990.

**Petunia helianthemoides** Sendtn. = **Calibrachoa ovalifolia** (Miers) Stehmann & Semir

**Petunia heterophylla** Sendtn. = **Calibrachoa heterophylla** (Sendtn.) Wijsman  
 Referencias: Wisjman, H. J. W., 1990.

[**Petunia humifusa** Dunal]

Notas: Nombre dudoso; el nombre pertenece a una especie no identificada de *Nicotiana*.

**Petunia humifusa** Speg., hom. illeg. = **Nicotiana acaulis** Speg.  
 Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

**Petunia humilis** R.E. Fr. = **Calibrachoa humilis** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir  
 Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

**Petunia inflata** R.E. Fr.

Sin.: *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman, *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman  
 Referencias: Ando, T., Ishikawa, N., Watanabe, H., Kokubun, H., Yanagisawa, Y., Hashimoto, G., Marchesi, E. & Suarez, H., 2005; Fries, R. E., 1911; Wisjman, H. J. W., 1982.

Hierba. Anual. Endémica. 0–800 m.  
 Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, COA, ITA).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 28478 (SI)]; BRA[Stehmann, J. R. 3938 (BCV)]; PRY[Icart, A. 12506 (SI)].

**Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. var. *depauperata* (R.E. Fr.) L.B. Sm. & Downs = **Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **depauperata** (R.E. Fr.) Stehmann

**Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **depauperata** (R.E. Fr.) Stehmann

Sin.: *Petunia dichotoma* Sendtn., *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. var. *depauperata* (R.E. Fr.) L.B. Sm. & Downs, *Petunia violacea* Lindl. subsp. *depauperata* R.E. Fr.

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
 Hierba. Perenne. Endémica. 100–1000 m.  
 Países: BRA(RGS, SCA); URY(ROC).  
 Ejemplares de referencia: BRA[Ule, E. H. G. 1526 (WU)]; URY[Rodriguez 8143 (MVFA)].

*Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp.  
*inflata* (R.E. Fr.) Wijsman = **Petunia inflata** R.E. Fr.  
Referencias: Ando, T., Ishikawa, N., Watanabe, H.,  
Kokubun, H., Yanagisawa, Y., Hashimoto, G.,  
Marchesi, E. & Suarez, H., 2005.

**Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp.  
**integrifolia**

Sin.: *Nicotiana integrifolia* (Hook.) Kuntze, *Nierembergia punicea* Sendtn., *Petunia phoenicea* D. Don ex Loudon, *Petunia violacea* Lindl., *Salpiglossis integrifolia* Hook., *Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman

Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Ando, T. & Hashimoto, G., 1993, 1995; Cabrera, A. L., 1979; Cosa de Gastiazoro, M., 1991; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hunziker, A. T., 1979b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA);  
PRY(APY, COA); URY(ART, CAS, FLO, PAY, RIV,  
RNO, ROC, SAO).

Ejemplares de referencia: ARG[Salgado, C. R. 3 (CTES)];  
BRA[Hunziker, A. T. 20227 (CORD)]; PRY[Mereles, F.  
6192 (FCQ, MO)]; URY[Alonso Paz, E. 3611  
(MVFQ)].

*Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp.  
*occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman = **Petunia**  
**occidentalis** R.E. Fr.

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1993.

**Petunia interior** Ando & Hashim.

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1996; Ando, T.,  
Soto, S. & Suárez, E., 2005.

Hierba. Perenne. Endémica. 200–1000 m.

Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[Ando, T. 114a (BAB)];  
BRA[Hashimoto, G. 569b (MBM)].

*Petunia intermedia* (Graham) G. Don = **Calibrachoa**  
**linearis** (Hook.) Wijsman

Referencias: Wisjman, H. J. W., 1990.

*Petunia kleinii* L.B. Sm. & Downs = **Calibrachoa caesia**  
(Sendtn.) Wijsman

*Petunia linearis* (Hook.) Paxton = **Calibrachoa linearis**  
(Hook.) Wijsman

Referencias: Wisjman, H. J. W., 1990.

*Petunia linoides* Sendtn. = **Calibrachoa linoides**  
(Sendtn.) Wijsman

Referencias: Wisjman, H. J. W., 1990.

**Petunia littoralis** L.B. Sm. & Downs

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1993; Smith, L. B.  
& Downs, R. J., 1966.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Klein, R. M. 5852 (HBR,  
US)].

[*Petunia longiflora* Raf.]

Notas: Nombre dudoso.

[*Petunia longifolia* Rojas Acosta]

Notas: Nombre dudoso.

*Petunia macrodactylon* L.B. Sm. & Downs  
= **Calibrachoa linoides** (Sendtn.) Wijsman

*Petunia micrantha* R.E. Fr. = **Calibrachoa micrantha**  
(R.E. Fr.) Stehmann & Semir

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

*Petunia minima* (Phil.) Reiche = **Combera minima**  
(Phil.) Sandwith

Referencias: Ricardi, M., 1962.

*Petunia nyctaginiflora* Juss. = **Petunia axillaris** (Lam.)  
Britton, Stern & Poggenb. subsp. **axillaris**

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

**Petunia occidentalis** R.E. Fr.

Sin.: *Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell. subsp.  
*occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman, *Stimoryne integrifolia*  
(Hook.) Wijsman subsp. *occidentalis* (R.E. Fr.)  
Wijsman

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1993; Ando, T.,  
Kurata, M., Sasaki, S., Ueda, Y., Hashimoto, G. &  
Marchesi, E., 1995; Cabrera, A. L., 1983d; Tsukamoto,  
T., Ando, T., Kurata, M., Watanabe, H., Kokubun, H.,  
Hashimoto, G. & Marchesi, E., 1998.

Hierba. Anual. Endémica. 500–2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 5557 (BM, K)].

*Petunia ovalifolia* Miers = **Calibrachoa ovalifolia**  
(Miers) Stehmann & Semir

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

*Petunia paranensis* Dusén = **Calibrachoa paranensis**  
(Dusén) Wijsman

*Petunia parodii* Steere = **Petunia axillaris** (Lam.)  
Britton, Stern & Poggenb. subsp. **parodii** (Steere)  
Cabrera

*Petunia parviflora* Juss. = **Calibrachoa parviflora** (Juss.)  
D'Arcy

*Petunia parviflora* Juss. var. *glabriuscula* Dunal  
= **Calibrachoa parviflora** (Juss.) D'Arcy

*Petunia parviflora* Juss. var. *villosa* Dunal = **Calibrachoa**  
**parviflora** (Juss.) D'Arcy

**Petunia patagonica** (Speg.) Millán

Sin.: *Nierembergia patagonica* Speg.

Referencias: Millán, R., 1941; Rossow, R. A., 1999f.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.  
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33050* (SI)].

*Petunia phoenicea* D. Don ex Loudon = **Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia**

Referencias: Cabrera, A. L., 1979.

*Petunia propinqua* Miers = **Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **axillaris**  
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

*Petunia pubescens* (Spreng.) R.E. Fr. = **Calibrachoa pubescens** (Spreng.) Stehmann

*Petunia pygmaea* R.E. Fr. = **Calibrachoa pygmaea** (R.E. Fr.) Wijsman

**Petunia reitzii** L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Stimoryne reitzii* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman  
Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1993; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2760* (HBR, US)].

**Petunia riograndensis** Ando & Hashim.

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1998.

Hierba. Perenne. Endémica. 200–500 m.

Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hashimoto, G. 860b* (MBM)].

*Petunia rupestris* Dusén = **Calibrachoa paranensis** (Dusén) Wijsman

**Petunia saxicola** L.B. Sm. & Downs

Referencias: Ando, T. & Hashimoto, G., 1993; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba. Perenne. Endémica. 900 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 13931* (HBR, US)].

*Petunia scabridula* C.V. Morton = **Calibrachoa scabridula** (C.V. Morton) Stehmann

**Petunia scheideana** L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Stimoryne scheideana* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman

Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1964, 1966; Wijsman, H. J. W. & Jong, J. H., 1985.

Hierba. Perenne. Endémica. 900–1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7522* (HBR, US)].

**Petunia secreta** Stehmann & Semir

Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 2005.

Hierba. Anual. Endémica. 300–400 m.

Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[*Stehmann, J. R. 1213* (UEC)].

*Petunia sellowiana* Sendtn. = **Calibrachoa sellowiana** (Sendtn.) Wijsman

*Petunia sendtneriana* R.E. Fr. = **Calibrachoa sendtneriana** (R.E. Fr.) Stehmann & Semir  
Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

[*Petunia serpyllifolia* Sendtn.]

Notas: Nombre dudoso.

*Petunia serrulata* L.B. Sm. & Downs = **Calibrachoa serrulata** (L.B. Sm. & Downs) Stehmann & Semir  
Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

*Petunia spathulata* L.B. Sm. & Downs = **Calibrachoa spathulata** (L.B. Sm. & Downs) Stehmann & Semir  
Referencias: Stehmann, J. R. & Semir, J., 1997.

*Petunia thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn. = **Calibrachoa thymifolia** (A. St.-Hil.) Stehmann & Semir

[*Petunia thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn.

f. *brevipedunculata* R.E. Fr.]

Notas: Nombre dudoso.

[*Petunia thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn. f. *effusa* R.E. Fr.]  
Notas: Nombre dudoso.

[*Petunia thymifolia* (A. St.-Hil.) Sendtn. f. *gracilis* R.E. Fr.]

Notas: Nombre dudoso.

*Petunia variabilis* R.E. Fr. = **Calibrachoa excellens** (R.E. Fr.) Wijsman

*Petunia violacea* Lindl. = **Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia**  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

*Petunia violacea* Lindl. subsp. *depauperata* R.E. Fr. = **Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **depauperata** (R.E. Fr.) Stehmann  
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

*Petunia viscidula* (Kunth) Miers = **Calibrachoa parviflora** (Juss.) D'Arcy

*Petunia viscosa* Colla, hom. illeg. = **Nicotiana miersii** J. Remy var. **miersii**

**Phrodus Miers**

Número de especies: 1 endémica

*Phrodus bridgesii* Miers = **Phrodus microphyllus** (Miers) Miers

**Phrodus microphyllus** (Miers) Miers

Sin.: *Alona microphylla* Miers, *Phrodus bridgesii* Miers, *Phrodus nodosus* Miers, *Phrodus pendulus* (Phil.) Phil.  
 Referencias: Aguilar, R., Bernardello, G. & Galetto, L., 2002; Hunziker, A. T., 1979b, 2001; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.  
 Arbusto. Endémica. 500–2900 m.  
 Países: CHL(III, IV).  
 Ejemplares de referencia: CHL[Bernardello, G. 847 (CORD)].

*Phrodus nodosus* Miers = **Phrodus microphyllus** (Miers) Miers

*Phrodus pendulus* (Phil.) Phil. = **Phrodus microphyllus** (Miers) Miers

**Physalis L.**

Número de especies: 9

**Physalis angulata** L.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Muñoz, J. D., 1996.  
 Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, PHA); URY(RIV).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Keller, H. A. 22 (CTES)]; BRA[Hatschbach, G. 14439 (NY)]; PRY[Degen, R. 3141 (CTES, FCQ, MO)]; URY[Antúnez, J. J. 26882 (MVFA)].

**Physalis cordata** Mill.

Referencias: Martínez, M., 1998.  
 Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.  
 Países: BRA(PAR).  
 Ejemplares de referencia: BRA[Lindeman, J. C. 4386 (NY)].

*Physalis hygrophila* Mart. = **Physalis pubescens** L. var. **hygrophila** (Mart.) Dunal

Referencias: Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.

**Physalis lagascae** Roem. & Schult.

Sin.: *Physalis rydbergii* Rusby  
 Referencias: Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.  
 Hierba. Anual. Nativa. 0–600 m.  
 Países: ARG(JUJ).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Toledo, J. M. 247 (CORD, MCNS, NY, SI)].

*Physalis mendocina* Phil. = **Physalis viscosa** L.

Referencias: Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.

*Physalis neesiana* Sendtn. = **Physalis pubescens** L. var. **hygrophila** (Mart.) Dunal

Referencias: Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.

**Physalis nicandroides** Schldtl.

Referencias: Knapp, S., Stafford, M., Sousa-Peña, M. & Martínez, M., 2005.  
 Hierba. Anual. Nativa. 100–1000 m.  
 Países: PRY(PAI).  
 Ejemplares de referencia: PRY[Zardini, E. M. 30417 (MO, PY)].

*Physalis organifolia* Lam. = **Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998a.

**Physalis peruviana** L.

Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.  
 Hierba. Perenne. Nativa.  
 Países: CHL(IV, V, VI, IJF, RME).  
 Ejemplares de referencia: CHL[Gunckel, L. H. 40452 (CONC)].

**Physalis pruinosa** L. var. **argentina** J.M. Toledo & Barboza

Referencias: Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.  
 Hierba. Anual. Nativa. 0–1300 m.  
 Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 23083 (CORD, CTES, MCNS, NY, SI)]; PRY[Schinini, A. 16522 (NY)].

[*Physalis pruinosa* L. var. *pruinosa*]

Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

**Physalis pubescens** L. var. **hygrophila** (Mart.) Dunal

Sin.: *Physalis hygrophila* Mart., *Physalis neesiana* Sendtn.  
 Referencias: Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.  
 Hierba. Anual. Nativa. 100–1000 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 2138 (CORD, SI)]; BRA[Rambo, B. 40244 (LIL)]; PRY[Bordas, E. 18055 (CORD, CTES)].

**Physalis pubescens** L. var. **pubescens**

Referencias: Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Martínez, M., 1998; Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.  
 Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.  
 Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAN, CEN, GUA, PHA); URY(ART, RNO, SAO, SOR, TYT).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Biganzoli, F. 879 (SI)]; BRA[Smith, L. B. 14167 (NY)]; PRY[Mereles, F. 6004 (CTES, FCQ, MO)]; URY[Berro, M. B. 3274 (MVFA)].

*Physalis rydbergii* Rusby = **Physalis lagascae** Roem. & Schult.

Referencias: Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.

**Physalis subilsiana** J.M. Toledo

Referencias: Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.  
 Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.  
 Países: ARG(SAL); PRY(APY, PHA).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Toledo, J. M. 226 (CORD, NY, SI)]; PRY[Vanni, R. O. 2632 (CTES)].

**Physalis viscosa** L.

Sin.: *Physalis mendocina* Phil.  
 Referencias: Cabrera, A. L., 1965b, 1979, 1983d; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Rossow, R. A., 1999f; Toledo, J. M. & Barboza, G. E., 2005.  
 Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(III, IV, V, VIII, IX, RME); PRY(APY, CEN, COA, PHA); URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 347 (CORD, CTES, SI)]; BRA[Krapovickas, A. 38489 (CORD, CTES)]; CHL[Garaventa, A. 326 (CONC)]; PRY[Mereles, F. 6021 (CTES, FCQ, MO)]; URY[Lombardo, A. 4522 (MVJB)].

*Pionandra cornigera* (Dunal) Miers = **Solanum pelagicum** Bohs

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Pionandra flagrans* (Ten.) Miers = **Solanum pseudoquina** A. St.-Hil.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Pionandra premnifolia* Miers = **Solanum premnifolium** (Miers) Bohs

Referencias: Bohs, L., 1994a.

*Pteroglossis laxa* Miers = **Reyesia chilensis** Gay

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

## Reyesia Gay

Número de especies: 4 endémicas

**Reyesia cactorum** (I.M. Johnst.) D'Arcy

Sin.: *Salpiglossis cactorum* I. M. Johnst.

Referencias: Cosa de Gastiazoro, M., 1993; Dillon, M. O., 2005; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b; Hunziker, A. T., 2001; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.

Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3500 m.

Países: CHL(II, III).

Ejemplares de referencia: CHL[Junge, C. 5191 (CONC, LIL)].

**Reyesia chilensis** Gay

Sin.: *Pteroglossis laxa* Miers, *Reyesia laxa* (Miers) D'Arcy, *Salpiglossis brachysiphon* I.M. Johnst., *Salpiglossis chilensis* (Gay) Wettst.

Referencias: Dillon, M. O., 2005; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b; Hunziker, A. T., 1979b, 2001; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.

Países: CHL(I, II, III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[Werdermann, E. 821 (BM, CORD, G, GH, K, U, US)].

**Reyesia juniperoides** (Werderm.) D'Arcy

Sin.: *Salpiglossis juniperoides* Werderm.

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

Hierba. Perenne. Endémica. 2500 m.

Países: CHL(I).

Ejemplares de referencia: CHL[Werdermann, E. 1054 (B)].

*Reyesia laxa* (Miers) D'Arcy = **Reyesia chilensis** Gay

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

**Reyesia parviflora** (Phil.) Hunz.

Sin.: *Salpiglossis parviflora* Phil.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Plissock, P., 2002; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b, 1995c; Hunziker, A. T., 1977b, 1979b; Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999.

Hierba. Anual. Endémica. 2900–3500 m.

Países: ARG(MEN, SJU); CHL(II, III, IV, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, J. H. 4874 (CORD)]; CHL[Luebert B., F. 241 (EIF)].

*Saccardophyton azurella* Skotts. = **Benthamiella azurella** (Skotts.) A. Soriano

Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.

*Saccardophyton pycnophylloides* Speg. = **Benthamiella spegazziniana** A. Soriano

Referencias: Arroyo-Leuenberger, S. C., 2000.

## Salpichroa Miers

Número de especies: 4

*Salpichroa ciliata* (Schltdl.) Miers = **Lycium ciliatum** Schltdl.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Salpichroa diffusa* auct. non Miers = **Salpichroa ramosissima** Miers

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Salpichroa mandoniana* Wedd. var. *tucumanensis* Griseb. = **Salpichroa tristis** Miers var. **tristis**

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

**Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Sin.: *Atropa organifolia* (Lam.) Desf., *Atropa rhomboidea* Hook., *Jaborosa montevidensis* Casar., *Physalis organifolia* Lam., *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *divaricata* Miers, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer, *Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *pubescens* Miers, *Salpichroma rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer

Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c; Cabrera, A. L., 1965b, 1983d; Chiarini, F., Barboza, G. E. & Marticorena, A., 2007; Keel, S., 1984; Rossow, R. A., 1999f; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–2500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, RNE, SAL, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(V, VIII); PRY(AMA, CEN, PAI); URY(ROC).

Ejemplares de referencia: ARG[Hurrell, J. A. 5405 (MU, SI)]; BRA[Ule, E. H. G. 1100 (US)]; CHL[Muñoz, C. 1799 (SGO)]; PRY[Hahn, W. J. 2539 (PY)]; URY[Alonso Paz, E. 3612 (MVFQ)].

**Salpichroa ramosissima** Miers

Sin.: *Salpichroa diffusa* auct. non Miers  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c; Keel, S., 1984.  
 Arbusto. Nativa. 3000–3500 m.  
 Países: ARG(JUJ).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Fries, R. E. 951 (CORD)].

*Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers = **Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *divaricata* Miers = **Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer = **Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Salpichroa rhomboidea* (Hook.) Miers var. *pubescens* Miers = **Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

**Salpichroa scandens** Dammer

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c;  
 Cabrera, A. L., 1971b, 1983d; Chiarini, F., Barboza, G. E. & Marticorena, A., 2007; Keel, S., 1984.  
 Arbusto. Nativa. 2000–4000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Cialdella, A. M. 529 (SI)];  
 CHL[Cocucci, A. A. 3279 (CORD, CTES)].

**Salpichroa tristis** Miers var. **lehmannii** (Dammer) Keel

Sin.: *Salpichroma alata* Dammer, *Salpichroma lehmannii* Dammer  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c;  
 Chiarini, F., Barboza, G. E. & Marticorena, A., 2007;  
 Keel, S., 1984.  
 Arbolito. Nativa. 3500–4500 m.  
 Países: ARG(JUJ); CHL(I).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 15348 (LP)];  
 CHL[Villagrán, C. 4099 (CONC)].

**Salpichroa tristis** Miers var. **tristis**

Sin.: *Salpichroa mandoniana* Wedd. var. *tucumanensis* Griseb., *Salpichroma mandoniana* Wedd.  
 Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c; Keel, S., 1984.  
 Arbusto. Nativa. 2000–3000 m.  
 Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
 Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 761 (CORD)].

*Salpichroma alata* Dammer = **Salpichroa tristis** Miers var. **lehmannii** (Dammer) Keel

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Salpichroma lehmannii* Dammer = **Salpichroa tristis** Miers var. **lehmannii** (Dammer) Keel

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Salpichroma mandoniana* Wedd. = **Salpichroa tristis** Miers var. **tristis**

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998c.

*Salpichroma rhomboidea* (Hook.) Miers var. *mollis* Dammer = **Salpichroa organifolia** (Lam.) Baill.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1998a.

**Salpiglossis Ruiz & Pav.**

Número de especies: 2 endémicas

*Salpiglossis anomala* (Miers) D'Arcy = **Bouchetia anomala** (Miers) Britton & Rusby

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995a.

*Salpiglossis atropurpurea* Graham = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Salpiglossis barclayana* Sweet = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Salpiglossis brachysiphon* I.M. Johnst. = **Reyesia chilensis** Gay

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

*Salpiglossis cactorum* I. M. Johnst. = **Reyesia cactorum** (I. M. Johnst.) D'Arcy*Salpiglossis chilensis* (Gay) Wettst. = **Reyesia chilensis** Gay

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

*Salpiglossis coccinea* Lindl. = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Salpiglossis fulva* Courtois = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Salpiglossis integrifolia* Hook. = **Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia***Salpiglossis juniperoides* Werderm. = **Reyesia juniperoides** (Werderm.) D'Arcy

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

*Salpiglossis linearis* Hook. = **Calibrachoa linearis** (Hook.) Wijsman

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995d.

*Salpiglossis linifolia* (Miers) Wettst. = **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Salpiglossis parviflora* Phil. = **Reyesia parviflora** (Phil.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995d.

*Salpiglossis picta* Sweet = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Salpiglossis prostrata* Hook. & Arn. = **Calibrachoa parviflora** (Juss.) D'Arcy

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1995d.

*Salpiglossis purpurea* Miers = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Salpiglossis purpurea* Miers var. *atropurpurea* (Graham) Miers = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

**Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Sin.: *Salpiglossis atropurpurea* Graham, *Salpiglossis barclayana* Sweet, *Salpiglossis coccinea* Lindl., *Salpiglossis fulva* Courtois, *Salpiglossis picta* Sweet, *Salpiglossis purpurea* Miers, *Salpiglossis purpurea* Miers var. *atropurpurea* (Graham) Miers, *Salpiglossis straminea* Hook., *Salpiglossis straminea* Hook. var. *picta* (Sweet) Hook.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cosa de Gastiazoro, M., 1993; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979a, 1995d; Rossow, R. A., 1999f.

Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.

Países: ARG(MEN, NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[Rossow, R. A. 3108 (BAB)]; CHL[Arroyo, M. T. K. 20055 (CONC)].

**Salpiglossis pinscens** Clos

Referencias: Dillon, M. O., 2005; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

Arbusto. Endémica. 700–2800 m.

Países: CHL(III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[Werdermann, E. 419 (BM, CORD, F, G, GH, K, LIL, M, S, SI, U, Z)].

*Salpiglossis straminea* Hook. = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Salpiglossis straminea* Hook. var. *picta* (Sweet) Hook. = **Salpiglossis sinuata** Ruiz & Pav.

Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1979b.

*Salpiglossis tenuis* (Phil.) Wettst. = **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

**Schizanthus Ruiz & Pav.**

Número de especies: 12 endémicas

*Schizanthus albiflorus* Phil. = **Schizanthus candidus** Lindl.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

**Schizanthus alpestris** Poepp.

Sin.: *Schizanthus angustifolius* Phil., *Schizanthus glanduliferus* Phil.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

Hierba. Anual. Endémica. 900–2900 m.

Países: CHL(IV, V, RME).

Ejemplares de referencia: CHL[Werdermann, E. 213 (E, K, M)].

*Schizanthus angustifolius* Phil. = **Schizanthus alpestris** Poepp.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus araucanus* Phil. = **Schizanthus grahamii** Gillies

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2001; Rossow, R. A., 1999f.

*Schizanthus calycosus* Phil. = **Schizanthus hookeri** Gillies ex Graham

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2001; Rossow, R. A., 1999f.

**Schizanthus candidus** Lindl.

Sin.: *Schizanthus albiflorus* Phil.

Referencias: Dillon, M. O., 2005; Grau, J. & Gronbach, E., 1984; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.

Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.

Países: CHL(III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[Grau, J. 2075 (M)].

*Schizanthus diazii* Phil. = **Schizanthus grahamii** Gillies

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2001; Rossow, R. A., 1999f.

*Schizanthus fallax* I.M. Johnst. = **Schizanthus laetus** Phil.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus floribundus* Phil. = **Schizanthus porrigens** Graham

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus gayanus* Phil. = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus gilliesii* Phil. = **Schizanthus grahamii** Gillies

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2001; Rossow, R. A., 1999f.

*Schizanthus glanduliferus* Phil. = **Schizanthus alpestris** Poepp.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus gracilis* Clos = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

**Schizanthus grahamii** Gillies

Sin.: *Schizanthus araucanus* Phil., *Schizanthus diazii* Phil.,  
*Schizanthus gilliesii* Phil., *Schizanthus incanus* Morren,  
*Schizanthus retusus* Hook.

Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei,  
O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002;  
Cosa de Gastiazoro, M., 1993; Grau, J. & Gronbach, E.,  
1984; Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2001; Hunziker,  
A. T., 1979b; Rossow, R. A., 1999f; Walters, D. R.,  
1969.

Hierba. Anual o bianual. Endémica. 1500–3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VII, VIII, RME).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33384* (SI)];  
CHL[*Ricardi, M. 2960* (CONC)].

*Schizanthus heterophyllus* Phil. = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

**Schizanthus hookeri** Gillies ex Graham

Sin.: *Schizanthus calycosus* Phil.  
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena,  
C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M.,  
2001[2000]; Grau, J. & Gronbach, E., 1984; Hunziker,  
A. T. & Cosa, M. T., 2001; Rossow, R. A., 1993b,  
1999f.

Hierba. Anual o bianual. Endémica. 1300–3000 m.  
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX,  
RME).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2275* (CORD,  
CTES, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20054* (CONC)].

*Schizanthus humilis* Phil. = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus incanus* Morren = **Schizanthus grahamii** Gillies

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2001; Rossow,  
R. A., 1999f.

**Schizanthus integrifolius** Phil.

Referencias: Dillon, M. O., 2005; Grau, J. & Gronbach, E.,  
1984.

Hierba. Anual. Endémica. 700–1500 m.  
Países: CHL(III, IV).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Grau, J. 2244* (M)].

*Schizanthus lacinosus* Phil. = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

**Schizanthus lacteus** Phil.

Sin.: *Schizanthus sanromanii* Phil.  
Referencias: Dillon, M. O., 2005; Grau, J. & Gronbach, E.,  
1984; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos,  
R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A.  
& Arancio, G., 1998.

Hierba. Anual. Endémica. 0–700 m.  
Países: CHL(II, III).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 788* (BM,  
K)].

**Schizanthus laetus** Phil.

Sin.: *Schizanthus fallax* I.M. Johnston.  
Referencias: Dillon, M. O., 2005; Grau, J. & Gronbach, E.,  
1984; Teillier, S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.  
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.  
Países: CHL(I, II, III).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 817* (BM, E,  
K, M)].

*Schizanthus latifolius* Phil. = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus lilacinus* Kunze = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

**Schizanthus litoralis** Phil.

Sin.: *Schizanthus splendens* Sudzuki  
Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984; Marticorena, C.,  
Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K.,  
Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.  
Hierba. Anual. Endémica. 100–800 m.  
Países: CHL(II, III, IV, V).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 912* (E, K)].

**Schizanthus parvulus** Sudzuki

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.  
Hierba. Anual. Endémica. 300–600 m.  
Países: CHL(IV).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz s.n.* (SGO)].

**Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Sin.: *Schizanthus gayanus* Phil., *Schizanthus gracilis* Clos,  
*Schizanthus heterophyllus* Phil., *Schizanthus humilis*  
Phil., *Schizanthus lacinosus* Phil., *Schizanthus latifolius*  
Phil., *Schizanthus lilacinus* Kunze, *Schizanthus*  
*tenuifolius* Phil., *Schizanthus tenuis* Phil.  
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei,  
O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Grau, J.  
& Gronbach, E., 1984.  
Hierba. Anual. Endémica. 100–1500 m.  
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (BM, K, P,  
W)].

*Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. var. *humilis* Lindl.  
= **Schizanthus tricolor** Grau & Gronbach

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

**Schizanthus porrigens** Graham

Sin.: *Schizanthus floribundus* Phil.  
Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.  
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.  
Países: CHL(IV, V, RME).  
Ejemplares de referencia: CHL[*King, T. s.n.* (E, GOET)].

*Schizanthus retusus* Hook. = **Schizanthus grahamii** Gillies

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2001; Rossow,  
R. A., 1999f.

*Schizanthus sanromanii* Phil. = **Schizanthus lacteus** Phil.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus splendens* Sudzuki = **Schizanthus litoralis** Phil.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus tenuifolius* Phil. = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

*Schizanthus tenuis* Phil. = **Schizanthus pinnatus** Ruiz & Pav.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

**Schizanthus tricolor** Grau & Gronbach

Sin.: *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. var. *humilis* Lindl.

Referencias: Grau, J. & Gronbach, E., 1984.

Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.

Países: CHL(V, RME).

Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 712* (BM, E, GOET, K, W)].

## Schwenckia L.

Número de especies: 4

**Schwenckia americana** L. var. **americana**

Sin.: *Schwenckia americana* L. var. *hirta* (Klotzsch)

Carvalho, *Schwenckia hirta* Klotzsch

Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1983d; Freire de Carvalho, L. A., 1978; Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2005; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL);

BRA(PAR); PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29250* (SI)];

BRA[*Dusén, P. K. H. 1507* (F, GH, NY)];

PRY[*Zardini, E. M. 3603* (FCQ, MO)].

**Schwenckia americana** L. var. **angustifolia** Schmidt

Referencias: Freire de Carvalho, L. A., 1978.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8028* (GH, K, LIL, NY, S)].

*Schwenckia americana* L. var. *hirta* (Klotzsch) Carvalho = **Schwenckia americana** L. var. **americana**

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2005.

**Schwenckia curviflora** Benth.

Referencias: Freire de Carvalho, L. A., 1978; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MAL).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 860* (LIL, MBM, RB)]; URY[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

**Schwenckia grandiflora** Benth.

Sin.: *Schwenckia ulei* Dammer

Referencias: Freire de Carvalho, L. A., 1978; Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2005.

Subarbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS); BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 11550* (CORD)]; BRA[*Hatschbach, G. 15791* (F, LIL, MBM, NY)].

*Schwenckia hirta* Klotzsch = **Schwenckia americana** L. var. **americana**

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2005.

**Schwenckia juncooides** Chodat

Referencias: Freire de Carvalho, L. A., 1978; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–200 m.

Países: BRA(PAR); PRY(CAN).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9725* (B, MBM)]; PRY[*Marín, G. 263* (PY)].

*Schwenckia tenuis* (Phil.) Griseb. = **Leptoglossis linifolia** (Miers) Griseb.

Referencias: Rossow, R. A., 1999f.

*Schwenckia ulei* Dammer = **Schwenckia grandiflora** Benth.

Referencias: Hunziker, A. T. & Cosa, M. T., 2005.

## Sessea Ruiz & Pav.

Número de especies: 2, 1 endémica

**Sessea regnellii** Taub.

Referencias: Hunziker, A. T., 1979b, 2001; Keller, H. A., 2006; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto o árbol. Nativa. 0–600 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 2851* (CTES)]; BRA[*Smith, L. B. 12925* (HBR, R, US)].

**Sessea vestioides** (Schltdl.) Hunz.

Sin.: *Cestrum vestioides* Schltdl., *Sessea vischeri* Chodat,

*Sesseopsis vestioides* (Schltdl.) Bitter, *Sesseopsis vischeri* (Chodat) Hassl.

Referencias: Hunziker, A. T., 1977a, 1979b; Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(sin localidad); PRY(PAI); URY(SAO, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 4089* (CTES)]; BRA[*Sellow, F. s.n.* (G, U)]; PRY[*Rojas, T. 6062* (CORD)]; URY[*Del Puerto, O. 5570* (MVFA)].

*Sessea vischeri* Chodat = **Sessea vestioides** (Schltdl.) Hunz.

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.

*Sesseopsis vestioides* (Schltdl.) Bitter = **Sessea vestioides** (Schltdl.) Hunz.

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.

*Sesseopsis vischeri* (Chodat) Hassl. = **Sessea vestioides** (Schltdl.) Hunz.

Referencias: Romanutti, A. & Hunziker, A. T., 1998.

*Siphonema filicaulis* Raf. = **Nierembergia linariifolia** Graham var. **linariifolia**

Referencias: Cocucci, A. A. & Hunziker, A. T., 1995a.

*Solandra longipes* Sendtn. = **Dysochroma longipes** (Sendtn.) Miers

*Solandra viridiflora* Sims = **Dysochroma viridiflorum** (Sims) Miers

Referencias: Hunziker, A. T., 2001.

## **Solanum L.**

Número de especies: 231, 97 endémicas, 2 introducidas

*Solanum aberrans* Phil. = **Solanum paposanum** Phil.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum abutiloides** (Griseb.) Bitter & Lillo

Sin.: *Cyphomandra abutiloides* Griseb., *Solanum hibiscifolium* Rusby

Referencias: Bohs, L., 1994a; Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Roe, K. E., 1972.

Arbusto o árbol. Nativa. 500–2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Lorentz, P. G. 995 (CORD, G, GOET)].

**Solanum acaule** Bitter

Sin.: *Solanum acaule* Bitter var. *caulescens* Bitter, *Solanum acaule* Bitter var. *subexinterruptum* Bitter, *Solanum depexum* Juz., *Solanum schreiteri* Bukasov, nom. nud., *Solanum uyunense* Cárdenas

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; D'Arcy, W. G., 1993; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Lorentz, P. G. 662 (CORD)].

*Solanum acaule* Bitter var. *aemulans* (Bitter & Wittm.)

Correll = **Solanum aemulans** Bitter & Wittm.

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum acaule* Bitter var. *caulescens* Bitter = **Solanum acaule** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum acaule* Bitter var. *subexinterruptum* Bitter = **Solanum acaule** Bitter

Referencias: Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum acaule* Bitter subsp. *aemulans* (Bitter & Wittm.)

Hawkes & Hjert. = **Solanum aemulans** Bitter & Wittm.

*Solanum acerosum* Sendtn. = **Solanum vaillantii** Dunal

Referencias: Mentz, L. A. & Olivera, P. L., 2004; Nee, M., 1991b.

*Solanum acroleucum* Bitter = **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;

Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

**Solanum aculeatissimum** Jacq.

Referencias: Mentz, L. A. & Olivera, P. L., 2004; Nee, M., 1999.

Arbusto. Nativa. 0–1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 13740 (MBM, US)]; PRY[Schinini, A. 27998 (CTES)].

*Solanum adelphum* C.V. Morton = **Solanum confusum** C.V. Morton

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum adenochlamys* Bitter = **Solanum glandulosipilosum** Bitter

Referencias: Morton, C. V., 1976.

**Solanum adscendens** Sendtn.

Referencias: Mentz, L. A. & Olivera, P. L., 2004; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(COS); BRA(RGS); PRY(CON).

Ejemplares de referencia: ARG[Krapovickas, A. 25819 (CTES, K)]; BRA[Rambo, B. 28581 (PACA)]; PRY[Zardini, E. M. 57320 (MO)].

**Solanum adpersum** Witasek

Referencias: Mentz, L. A. & Olivera, P. L., 2004.

Arbusto. Nativa. 0–100 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 24874 (MBM)].

*Solanum adventitium* Polg. = **Solanum americanum** Mill.

Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.

**Solanum aemulans** Bitter & Wittm.

Sin.: *Solanum acaule* Bitter subsp. *aemulans* (Bitter & Wittm.) Hawkes & Hjert., *Solanum acaule* Bitter var. *aemulans* (Bitter & Wittm.) Correll, *Solanum x indunii* K.A. Okada & A.M. Clausen

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Hosaka, K. & Spooner, D. M., 1992; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3600 m.

Países: ARG(JUJ, LRI).

Ejemplares de referencia: ARG[Okada, K. A. 6055 (BAL)].

**Solanum aenictum** C.V. Morton

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(COS); PRY(GUA, ITA).

Ejemplares de referencia: ARG[Krapovickas, A. 17161 (CTES)]; PRY[Montes, J. E. 16616 (CORD, LIL)].

**Solanum affine** Sendtn.

Sin.: *Solanum jatrophiifolium* Dunal, *Solanum micans* Witasek, *Solanum spectabile* Steud. var. *subhastatum* Sendtn.

Referencias: Mentz, L. A. & Olivera, P. L., 2004; Nee, M., 1991a, b, 1999.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 6543 (HBR, US)].

*Solanum aguaraquiya* Piso ex Sendtn. = **Solanum chenopodioides** Lam.**Solanum alatirameum** Bitter

Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Endémica. 800–1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 13299 (F, GH, NY, S)].

*Solanum alatum* Dunal, hom. illeg. = **Solanum hoehnei** C.V. Morton

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum alatum* Seem. & J.A. Schmidt, hom. illeg. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.

**Solanum albidum** Dunal

Sin.: *Solanum incanum* Ruiz & Pav., *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg., *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. subsp. *carabayense* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var. *dryophyllum* Bitter, *Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var. *tardecalscens* Bitter, *Solanum paniculatum* L. var. *chulumani* Dunal

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2001; Nee, M., 1999.

Árbol. Nativa. 400–2500 m.

Países: ARG(SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Schulz, A. G. 5436 (CTES, NY)].

*Solanum albiflorum* Phil. = **Solanum pinnatum** Cav.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

[*Solanum album* Larrañaga, hom. illeg.]

Notas: Nombre dudoso.

**Solanum aligerum** Schltldl.

Sin.: *Solanum grossum* C.V. Morton, *Solanum paraneurotrichum* Bitter, nom. nud.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto o arbolito. Nativa. 1000–2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 24873 (CORD)].

**Solanum aloysiifolium** Dunal

Sin.: *Solanum cymosum* auct. non Ruiz & Pav., *Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *lanceolatum* Kuntze, *Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *subdentatum* Kuntze, *Solanum lorentzii* Bitter, *Solanum lorentzii* Bitter var. *tucumanicum* Bitter, *Solanum polystrichostylum* Bitter var. *lorentzii* (Bitter) Edmonds

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Edmonds, J. M., 1977.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 500–2500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 34121 (SI)].

*Solanum alphonsi* Dunal var. *alphonsi* = **Solanum pinnatum** Cav.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum alphonsi* Dunal var. *tagua-tagua* Dunal = **Solanum pinnatum** Cav.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum alternato-pinnatum** Steud.

Sin.: *Solanum juciri* Mart. ex Sendtn., *Solanum juciri* Mart. ex Sendtn. f. *paraguariense* Hassl., *Solanum oleraceum* Vell., hom. illeg., *Solanum viridipes* Dunal, *Solanum viridipes* Dunal var. *intermedium* Hassl.

Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Schinini, A. & López, M. G., 1997.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).

Ejemplares de referencia: ARG[Kermes, E. 139 (SI)]; BRA[Dusén, P. K. H. 16559 (NY)]; PRY[Jiménez, B. 1212 (BM, CTES, MO, PY)].

*Solanum alticola* Bitter = **Solanum megistacrolobum** Bitter

Referencias: Giannatasio, R. B. & Spooner, D. M., 1994a, b.

*Solanum alticola* Bitter var. *xanthotrichum* Hawkes = **Solanum megistacrolobum** Bitter

Referencias: Giannatasio, R. B. & Spooner, D. M., 1994a, b.

**Solanum americanum** Mill.

Sin.: *Solanum adventitium* Polg., *Solanum americanum* Mill. var. *nodiflorum* (Jacq.) Edmonds, *Solanum curtipes* Bitter, *Solanum nigrum* L. var. *americanum* (Mill.) O.E. Schulz, *Solanum nigrum* L. var. *virginicum* L., *Solanum nodiflorum* Jacq., *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *acuminatum* Chodat, *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *microphyllum* Hassl., *Solanum nodiflorum* Jacq. var. *sapucayense* Chodat, *Solanum oleraceum* Dunal, *Solanum sciaphilum* Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1991b; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1200 m.

Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, V, VI); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA); URY(CAS, MON, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1286* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13848* (HBR)]; CHL[*Behn, K. s.n.* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 5643* (FCQ, MO)]; URY[*Brack, P. 208* (HAS)].

*Solanum americanum* Mill. var. *nodiflorum* (Jacq.) Edmonds = ***Solanum americanum*** Mill.

***Solanum amygdalifolium*** Steud.

Sin.: *Solanum angustifolium* Lam., *Solanum angustifolium* Lam. var. *macrophyllum* Dunal, *Solanum brittonianum* Morong, *Solanum handelianum* Morong, *Solanum persicifolium* Mart., hom. illeg.

Referencias: Cabrera, A. L., 1965b, 1979, 1983d; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mentz, L. A., 2004; Morton, C. V., 1976.

Arbusto. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, CON, COA, MIE, PAI, PHA); URY(COL, MON, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15429* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 333* (PACA)]; PRY[*Mereles, F. 4738* (CTES, FCQ)]; URY[*Seijo, G. J. 2541* (CTES)].

*Solanum andicola* C.V. Morton = ***Solanum riojense*** Bitter

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b.

*Solanum andigenum* Juz. & Bukasov = ***Solanum tuberosum*** L. subsp. ***andigenum*** (Juz. & Bukasov) Hawkes

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum andinum* Reiche = ***Solanum furcatum*** Dunal

***Solanum angustifidum*** Bitter

Sin.: *Solanum jasminifolium* auct. non Sendtn., *Solanum quadripartitum* auct. non Dunal

Referencias: Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto. Nativa. 0–2500 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5042* (MU, SI)].

*Solanum angustifolium* Lam. = ***Solanum amygdalifolium*** Steud.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.

*Solanum angustifolium* Lam. var. *brevifolium* Dunal = ***Solanum crispum*** Ruiz & Pav.

*Solanum angustifolium* Lam. var. *macrophyllum* Dunal = ***Solanum amygdalifolium*** Steud.

Referencias: Morton, C. V., 1976.

***Solanum annuum*** C.V. Morton

Sin.: *Solanum micrantherum* Cabrera

Referencias: Barboza, G. E., 2004; Morton, C. V., 1976.

Hierba. Anual. Endémica. 2100–3300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8507* (US)].

***Solanum anoacanthum*** Sendtn.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

Arbusto. Nativa. 500–1100 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26500* (MBM, NY)].

***Solanum apaense*** Chodat

Referencias: Nee, M., 1999.

Subarbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(CON).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8363* (P, S, W)].

***Solanum aparadense*** L.A. Mentz & M. Nee

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

Arbusto. Endémica. 800–1300 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Mentz, L. A. 230* (FLOR, ICN, MBM, NY, PACA)].

***Solanum apiahyense*** Witasek

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

Hierba. Perenne. Nativa. 900 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25582* (G, MBM)].

*Solanum aquinas* Bukasov, nom. nud. = ***Solanum tuberosum*** L. subsp. ***tuberosum***

Referencias: Hawkes, J. G., 1990.

*Solanum arborescens* Moench = ***Solanum bonariense*** L.

Referencias: Matesevach, M., 2002.

***Solanum arenarium*** Sendtn.

Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A., 2004.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–200 m.

Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 44290* (B, GH, US)].

*Solanum arequipense* Bitter = ***Solanum furcatum*** Dunal

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

***Solanum argenteum*** Dunal

Referencias: Freire de Carvalho, L. A., 1996; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–800 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 1800* (HBR, MBM, NY)].

*Solanum argentinicum* Lechn. = ***Solanum tuberosum*** L. subsp. ***andigenum*** (Juz. & Bukasov) Hawkes

Referencias: Ochoa, C. M., 1990.

**Solanum argentinum** Bitter & Lillo

Sin.: *Solanum argentinum* Bitter & Lillo var. *chroniotrichum* Bitter, *Solanum cervantesii* auct. non Lag., *Solanum chroniotrichum* (Bitter) C.V. Morton, *Solanum nitidum* auct. non Ruiz & Pav.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1991b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CAA, CEN, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[Lorentz, P. G. 648 (CORD)]; PRY[Mereles, F. 5570 (CTES, FCQ, MO)].

*Solanum argentinum* Bitter & Lillo var. *chroniotrichum* Bitter = **Solanum argentinum** Bitter & Lillo

Referencias: Nee, M., 1999.

**Solanum aridum** Morong

Sin.: *Solanum conditum* C.V. Morton, *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *ovalifolium* Kuntze

Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Matesevach, M., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Nee, M., Bohs, L. & Knapp, S., 2006.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 5685 (SI)]; PRY[Mereles, F. 5694 (CTES, FCQ, MO)].

*Solanum aridum* Morong var. *pusillum* Hassl. = **Solanum multispinum** N.E. Br.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum arnezii* Cárdenas = **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

*Solanum arrebenta* Vell. = **Solanum capsicoides** All.

Referencias: Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum asarifolium* Kunth & Bouché = **Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

[*Solanum asperolanatum* Ruiz & Pav.]

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Solanum asperolanatum* auct. non Ruiz & Pav. = **Solanum scuticum** M. Nee

Referencias: Nee, M., Bohs, L. & Knapp, S., 2006.

*Solanum astroites* Jacq. = **Solanum bonariense** L.

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum atriplicifolium* Gillies ex Nees = **Solanum tweedianum** Hook.

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

*Solanum atriplicifolium* Gillies ex Nees var. *minus* Gillies ex Nees = **Solanum sarrachoides** Sendtn.

Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997; Edmonds, J. M., 1972.

*Solanum atriplicoides* Herter = **Solanum tweedianum** Hook.

**Solanum atropurpureum** Schrank

Sin.: *Solanum atropurpureum* Schrank var. *aureimicans* Bitter, *Solanum atropurpureum* Schrank var.

*diaphanadenium* Bitter, *Solanum atropurpureum* Schrank var. *ochrochlorum* Dunal, *Solanum vernicatum* Lindl.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[Gamerro, J. C. 134 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 24438 (MBM, UPCB)]; PRY[Jiménez, B. 165 (BM, CTES, MO, PY)]; URY[Del Puerto, O. 3199 (US)].

*Solanum atropurpureum* Schrank var. *aureimicans* Bitter = **Solanum atropurpureum** Schrank

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum atropurpureum* Schrank var. *diaphanadenium* Bitter = **Solanum atropurpureum** Schrank

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum atropurpureum* Schrank var. *ochrochlorum* Dunal = **Solanum atropurpureum** Schrank

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

[*Solanum aurantiacum* Rojas Acosta]

Notas: Nombre dudoso.

[*Solanum aurantium* Larrañaga]

Notas: Nombre dudoso.

*Solanum auriculatum* Aiton = **Solanum mauritianum** Scop.

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum auriculatum* auct. non Aiton = **Solanum granulosum-leprosum** Dunal

Referencias: Cabrera, A. L., 1979.

*Solanum australe* C.V. Morton = **Lycianthes pauciflora** (Vahl) Bitter

Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997.

*Solanum balansae* Hassl. = **Solanum hasslerianum** Chodat

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum balansae* Hassl. var. *lyratifidum* Hassl.

= **Solanum hasslerianum** Chodat

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum balansae* Hassl. var. *typicum* Hassl., nom. inval.

= **Solanum hasslerianum** Chodat

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum balbisii* Dunal = **Solanum sisymbriifolium**  
Lam.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum balbisii* Dunal var. *bipinnata* Hook. = **Solanum  
sisymbriifolium** Lam.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum balbisii* Dunal var. *purpureum* Hook.

= **Solanum sisymbriifolium** Lam.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum ballsii* Hawkes = **Solanum vernei** Bitter &  
Wittm.

**Solanum bangii** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

Arbusto. Nativa. 1500–3000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Kiesling, R. 1559 (SI)].

*Solanum basilobum* Bitter = **Solanum nigrescens**  
M. Martens & Galeotti

**Solanum bermejense** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

Arbusto. Nativa. 1000–2000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 15797 (LP,  
SI)].

*Solanum berterianum* (J. Remy) F. Phil. = **Solanum  
crispum** Ruiz & Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

**Solanum berthaultii** Hawkes

Sin.: *Solanum berthaultii* Hawkes f. *zudaniense* (Cárdenas)

Correll, *Solanum litusinum* Ochoa, *Solanum tarijense*

Hawkes, *Solanum tarijense* Hawkes var. *pojoense*

(Cárdenas) Correll, *Solanum trigalense* Cárdenas,

*Solanum vallegrandense* Cárdenas, *Solanum*

*vallegrandense* Cárdenas var. *pojoense* Cárdenas,

*Solanum zudaniense* Cárdenas

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;

Hawkes, J. G., 1990; Morton, C. V., 1976; Nee, M.,

1999; Spooner, D. M. & van den Berg, R. G., 1992.

Hierba. Perenne. Nativa. 1200–4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 737  
(CORD)].

*Solanum berthaultii* Hawkes f. *zudaniense* (Cárdenas)

Correll = **Solanum berthaultii** Hawkes

Referencias: Spooner, D. M. & van den Berg, R. G., 1992.

**Solanum betaceum** Cav.

Sin.: *Cyphomandra betacea* (Cav.) Sendtn., *Cyphomandra  
crassifolia* (Ortega) Kuntze, *Solanum crassifolium*  
Ortega

Referencias: Bohs, L., 1994a; Cabrera, A. L., 1983d; Nee,  
M., 1999.

Árbol. Nativa. 500–1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 7705 (SI)].

*Solanum bijugum* Bitter = **Solanum microdontum** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;

van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum bipinnatifidum* Larrañaga = **Solanum  
sisymbriifolium** Lam.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum bistellatum** L.B. Sm. & Downs

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Smith,

L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Nativa. 0–1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Smith, L. B. 10881 (B, HBR,  
US)].

*Solanum bitteri* Hassl. = **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,

C. M., 1990.

*Solanum boergeri* Bukasov = **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,

C. M., 1990.

*Solanum boerhaviifolium* Sendtn. = **Solanum laxum**  
Spreng.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum boerhaviifolium* Sendtn. var. *calvum*

C.V. Morton = **Solanum laxum** Spreng.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum bonariense* Bukasov, nom. nud. = **Solanum  
chacoense** Bitter

Referencias: Hawkes, J. G., 1990.

**Solanum bonariense** L.

Sin.: *Solanum arborescens* Moench, *Solanum astroites* Jacq.,

*Solanum fastigiatum* Willd., *Solanum saponaceum*

Dunal var. *uruguense* Griseb.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Matesevach, M., 2002;

Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, DFE, ERI); URY(CLA, MON, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[Chiarini, F. 642 (CORD)];

URY[Berro, M. B. 2342 (G)].

*Solanum bonariense* L. f. *intermedium* Hassl. = **Solanum  
guaraniticum** A. St.-Hil.

- Solanum bonariense* L. f. *leptophyllum* Chodat  
= **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.
- Solanum bonariense* L. f. *lobatum* (Hassl.) Chodat  
= **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.
- Solanum bonariense* L. f. *subintegrum* (Hassl.) Chodat,  
nom. illeg. = **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.
- Solanum bonariense* L. f. *typicum* Hassl., nom. inval.  
= **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.
- Solanum bonariense* L. var. *paraguariense* (Chodat)  
Chodat = **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.
- Solanum bonariense* L. var. *villaricense* (Morong) Chodat  
= **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.
- Solanum brachyantherum** Phil.  
Sin.: *Solanum geissei* Phil.  
Referencias: Dillon, M. O., 2005; Marticorena, C., Matthei,  
O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K.,  
Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998;  
Nee, M., 1999; PBI Solanum project, 2006.  
Hierba. Perenne. Endémica. 100–700 m.  
Países: CHL(I, II, III, IDE).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3566* (CONC)].
- Solanum breucheri* Correll = **Solanum brevicaule** Bitter
- Solanum brevicaule** Bitter  
Sin.: *Solanum breucheri* Correll, *Solanum gourlayi* Hawkes,  
*Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *saltense*  
A.M. Clausen & K.A. Okada, *Solanum gourlayi*  
Hawkes subsp. *vidaurrei* (Cárdenas) Hawkes & Hjert.,  
*Solanum incamayoense* K.A. Okada & A.M. Clausen,  
*Solanum leptophyes* Bitter, *Solanum leptophyes* Bitter  
f. *gourlayi* (Hawkes) Correll, *Solanum vidaurrei*  
Cárdenas  
Referencias: Miller, J. T. & Spooner, D. M., 1999; Spooner,  
D. M., Mc Lean, K., Ramsay, G., Waugh, R. & Bryan,  
G. J., 2005; van den Berg, R. G., Miller, J. T., Ugarte,  
M. L., Kardolus, J. P., Villand, J., Nienhuis, J. &  
Spooner, D. M., 1998.  
Hierba. Perenne. Nativa. 1900–3800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Okada, K. A. 4434* (BAL)].
- Solanum brevidens* Phil. = **Solanum palustre** Schltld.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.
- Solanum brevidens* Phil. var. *glabrescens* (Dunal)  
Hawkes = **Solanum palustre** Schltld.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.
- Solanum brevipedunculatum** Rusby  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.  
Arbusto. Nativa. 1000–1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 33141* (CTES)].

- Solanum brevistylum* Wittm., nom. nud. = **Solanum fernandezianum** Phil.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999;  
Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G., 1990.
- Solanum bridgesii* A. DC., hom. illeg. = **Solanum palustre** Schltld.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.
- Solanum bridgesii** Phil. var. **bridgesii**  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(VI, RME).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 5048* (CONC)].
- Solanum bridgesii** Phil. var. **ocellatum** (Phil.) Witasek  
ex Reiche  
Sin.: *Solanum ocellatum* Phil.  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.  
Subarbusto. Endémica.  
Países: CHL(RME).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].
- Solanum brittonianum* Morong = **Solanum amygdalifolium** Steud.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.
- Solanum brownii* Chodat, hom. illeg. = **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.
- Solanum brusquense* L.B. Sm. & Downs = **Solanum wacketii** Witasek  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum bullatum** Vell.  
Sin.: *Solanum macropus* Dunal  
Referencias: Mentz, L. A. & Olivera, P. L., 2004; Nee, M.,  
1991a, 1999; Roe, K. E., 1972; Smith, L. B. & Downs,  
R. J., 1966.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17428* (B, FLOR,  
NY, P)].
- Solanum bustillosii* Phil. = **Solanum etuberosum** Lindl.  
Referencias: Brücher, E. H., 1966a; Contreras-M., A. &  
Spooner, D. M., 1999; Correll, D. S., 1962.
- Solanum caavurana** Vell.  
Sin.: *Solanum caavurana* Vell. f. *angustifolia* Chodat &  
Hassl., *Solanum caavurana* Vell. f. *pauciflora* Chodat,  
*Solanum megalocarpon* C.V. Morton  
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. &  
Peña-Chocarro, M. C., 2000; Knapp, S., 2002; Mentz,  
L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976;  
Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–800 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, SCA);  
PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA,  
GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

- Ejemplares de referencia: ARG[Krapovickas, A. 24276 (CTES, MO, WIS)]; BRA[Hatschbach, G. 15846 (F, NY, US, WIS)]; PRY[Balansa, B. 2122 (P), Marin, G. 439 (BM, CTES, G, MO, PY)].
- Solanum caavurana* Vell. f. *angustifolia* Chodat & Hassl.  
= **Solanum caavurana** Vell.
- Solanum caavurana* Vell. f. *pauciflora* Chodat  
= **Solanum caavurana** Vell.  
Referencias: Knapp, S., 2002.
- Solanum caeruleum* Vell. = **Solanum campaniforme**  
Roem. & Schult.  
Referencias: Knapp, S., 2002.
- Solanum caesium** Griseb.  
Sin.: *Solanum oranense* Bitter  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 7521 (SI)].
- Solanum caipipendense* Cárdenas = **Solanum chacoense**  
Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.
- Solanum caldasii* Dunal var. *glabrescens* Dunal  
= **Solanum palustre** Schldtl.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.
- Solanum calileguae** Cabrera  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Nee, M., 1999.  
Arbusto. Endémica. 500–1800 m.  
Países: ARG(JUJ).  
Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 25639 (SI)].
- Solanum calophyllum* Phil. = **Solanum triflorum** Nutt.  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Hunziker, A. T., 1989.
- Solanum calvescens* Bitter = **Solanum chacoense** Bitter
- Solanum campaniforme** Roem. & Schult.  
Sin.: *Solanum caeruleum* Vell., *Solanum dusenii* L.B. Sm. & Downs, *Solanum microrbitum* L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Knapp, S., 2002.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 6506 (HBR, US)].
- Solanum canoasense* L.B. Sm. & Downs = **Solanum cassioides** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum capsicastrum* Link ex Schauer = **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Knapp, S., 2002.
- Solanum capsicastrum* Link ex Schauer var. *caaguazuense* Chodat = **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Knapp, S., 2002.
- Solanum capsicoides** All.  
Sin.: *Solanum arrebenta* Vell., *Solanum ciliare* Willd., *Solanum ciliatum* Lam., *Solanum sinuatifolium* Vell., *Solanum sphaerocarpum* Moric.  
Referencias: Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1991b.  
Arbusto. Nativa. 0–700 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: ARG[Moscone, E. A. 234 (CORD)]; BRA[Hatschbach, G. 44522 (MBM, NY)].
- [*Solanum cari* Molina]  
Notas: Nombre dudoso.
- Solanum carnosipes* Rusby = **Solanum riparium** Pers.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.
- Solanum cassioides** L.B. Sm. & Downs  
Sin.: *Solanum canoasense* L.B. Sm. & Downs, *Solanum cataractae* L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 300–1400 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 7202 (HBR, US)].
- Solanum castaneum** Carvalho  
Referencias: Freire de Carvalho, L. A., 1996; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.  
Arbusto. Nativa. 0–200 m.  
Países: BRA(PAR).  
Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 19615 (MBM)].
- Solanum catamarcae* Bitter ex Brücher, nom. nud.  
= **Solanum sanctae-rosae** Hawkes  
Referencias: Brücher, E. H., 1970; Correll, D. S., 1962; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.
- Solanum catanduvae* L.B. Sm. & Downs = **Solanum johannae** Bitter  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum cataractae* L.B. Sm. & Downs = **Solanum cassioides** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- [*Solanum caudiculatum* Phil.]  
Notas: Nombre dudoso.
- Solanum cavanillesii* Dunal, hom. illeg. = **Solanum pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum cavanillesii* Dunal var. *subintegrifolium* Dunal  
= **Solanum pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum cervantesii* auct. non Lag. = **Solanum argentinum** Bitter & Lillo  
Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum cevallos-tovarii* Cárdenas = **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

### **Solanum chacoense** Bitter

Sin.: *Solanum arnezii* Cárdenas, *Solanum bitteri* Hassl.,  
*Solanum boergeri* Bukasov, *Solanum bonariense*  
Bukasov, nom. nud., *Solanum caipipendense* Cárdenas,  
*Solanum calvescens* Bitter, *Solanum chacoense* Bitter  
f. *caipipendense* (Cárdenas) Correll, *Solanum chacoense*  
Bitter f. *gibberulosum* (Juz. & Bukasov) Correll,  
*Solanum chacoense* Bitter f. *glabrescens* (Hassl.) Hassl.,  
*Solanum chacoense* Bitter f. *plurijugum* Hassl., nom.  
nud., *Solanum chacoense* Bitter subsp. *muelleri* (Bitter)  
Hawkes & Hjert., *Solanum chacoense* Bitter subsp.  
*subtilius* (Bitter) Hawkes, *Solanum chacoense* Bitter  
var. *angustisectum* (Hassl.) Hassl., *Solanum cordobense*  
Bukasov, *Solanum cuevoanum* Cárdenas, *Solanum*  
*dolichostigma* Bukasov, nom. nud., *Solanum emmeae*  
Juz. & Bukasov, *Solanum garciae* Juz. & Bukasov,  
*Solanum gibberulosum* Juz. & Bukasov, *Solanum*  
*guaraniticum* Hassl. f. *glabrescens* Hassl., *Solanum*  
*guaraniticum* Hassl. f. *plurijugum* Hassl., *Solanum*  
*guaraniticum* Hassl. var. *angustisectum* Hassl., *Solanum*  
*guaraniticum* Hassl., hom. illeg., *Solanum horovitzii*  
Bukasov, *Solanum horovitzii* Bukasov var. *glabristylum*  
Hawkes, nom. nud., *Solanum horovitzii* Bukasov var.  
*multijugum* Hawkes, *Solanum jamesii* Torr. var.  
*grandifrons* Bitter, *Solanum jujuyense* Hawkes,  
*Solanum knappei* Juz. & Bukasov, *Solanum laplaticum*  
Bukasov, *Solanum muelleri* Bitter, *Solanum muelleri*  
Bitter f. *densipilosum* Correll, *Solanum parodii* Juz. &  
Bukasov, *Solanum premaglia* L. Planch., nom. nud.,  
*Solanum saltense* Hawkes, *Solanum schickii* Juz. &  
Bukasov, *Solanum subtilius* Bitter, *Solanum tuberosum*  
L. subsp. *guaraniticum* Bertoni, *Solanum tuberosum* L.  
var. *glabriusculum* Dunal, *Solanum yungasense* auct.  
non Hawkes

Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. &  
Ortiz, M., 1994; Brücher, E. H., 1956; Cabrera, A. L.,  
1979, 1983d; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V.,  
1976; Nee, M., 1999; Ochoa, C. M., 1990; Soria Rey,  
N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–2400 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ,  
LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC);  
BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CEN, COA,  
GUA, MIE, PAD); URY(SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 112* (SI)];  
BRA[*Smith, L. B. 8360* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M.*  
*4546* (FCQ, MO)]; URY[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

*Solanum chacoense* Bitter f. *caipipendense* (Cárdenas)  
Correll = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,  
C. M., 1990.

*Solanum chacoense* Bitter f. *gibberulosum* (Juz. &  
Bukasov) Correll = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,  
C. M., 1990.

*Solanum chacoense* Bitter f. *glabrescens* (Hassl.) Hassl.  
= **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
Morton, C. V., 1976; Ochoa, C. M., 1990.

*Solanum chacoense* Bitter f. *pilosulum* (Hassl.) Hassl.  
= **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp.  
**malmeanum** (Bitter) Hawkes & Hjert.  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V.,  
1976.

*Solanum chacoense* Bitter f. *plurijugum* Hassl., nom. nud.  
= **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Morton, C. V., 1976; Ochoa, C. M., 1990.

*Solanum chacoense* Bitter var. *angustisectum* (Hassl.)  
Hassl. = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,  
C. M., 1990.

*Solanum chacoense* Bitter subsp. *muelleri* (Bitter)  
Hawkes & Hjert. = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,  
C. M., 1990.

*Solanum chacoense* Bitter subsp. *subtilius* (Bitter)  
Hawkes = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,  
C. M., 1990.

*Solanum chaetophorum* C.V. Morton = **Solanum**  
**tenuispinum** Rusby  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Nee, M., 1991b.

### **Solanum chamaesarachidium** Bitter

Sin.: *Chamaesaracha boliviensis* Dammer  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1991b;  
Barboza, G. E., 2004; Cabrera, A. L., 1983d; Morton,  
C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Hierba. Anual. Nativa. 2100–4900 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 428*  
(CORD)].

*Solanum chenopodifolium* Dunal = **Solanum**  
**chenopodioides** Lam.  
Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.

**Solanum chenopodioides** Lam.

Sin.: *Solanum aguarakuia* Piso ex Sendtn., *Solanum chenopodifolium* Dunal, *Solanum gracile* Dunal var. *microphyllum* Dunal, *Solanum gracile* Dunal, hom. illeg., *Solanum gracilius* Herter, *Solanum isabellii* Dunal, *Solanum nigrum* L. var. *aguarakuia* (Sendtn.) Reiche, p.p., *Solanum nigrum* L. var. *frutescens* auct. non A. Br., *Solanum ottonis* Hyl., *Solanum pterocaulon* Dunal var. *aguarakuia* (Piso ex Sendtn.) Dunal, *Solanum sublobatum* Willd., *Solanum subspatulatum* Sendtn., *Solanum vile* Bitter

Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1991b; Cabrera, A. L., 1965b, 1979; Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997; Knapp, S., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PHA); URY(COL, FLA, MON, ROC, SJO).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 343 (CORD, CTES, SI)]; BRA[Lindeman, J. C. 1972 (U)]; PRY[Mereles, F. 6105 (CTES, FCQ)]; URY[Seijo, G. J. 2659 (CTES)].

**Solanum chilense** (Dunal) Reiche

Sin.: *Lycopersicon chilense* Dunal

Referencias: Dillon, M. O., 2005; Nee, M., 1999; Peralta, I. E. & Spooner, D. M., 2005.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.

Países: CHL(I, II).

Ejemplares de referencia: CHL[Matthei, O. R. 337 (CONC)].

**Solanum chiloense** (A. DC.) Berthault = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990.

**Solanum chilotanum** Hawkes, nom. nud. = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G., 1990.

**Solanum chloranthum** DC., hom. illeg. = **Solanum viarum** Dunal

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1991b.

**Solanum chloroleucum** Dunal = **Solanum paniculatum** L.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

**Solanum chodatianum** Huber = **Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

**Solanum chroniotrichum** (Bitter) C.V. Morton = **Solanum argentinum** Bitter & Lillo

Referencias: Nee, M., 1999.

**Solanum ciliare** Willd. = **Solanum capsicoides** All.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Nee, M., 1991b.

**Solanum ciliatum** Lam. = **Solanum capsicoides** All.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1991b.

**Solanum cinnamomeum** Sendtn.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999.

Árbol. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 21704 (FLOR, HUCS, MBM, Z)].

**Solanum citrifolium** Willd. ex Roem. & Schult.

f. *intermedium* Hassl. = **Solanum sanctae-catharinae** Dunal

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum citrifolium** Willd. ex Roem. & Schult. var.

*leucodendron* (Sendtn.) Hassl. = **Solanum leucodendron** Sendtn.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum citrifolium** Willd. ex Roem. & Schult. var.

*ochandrum* (Dunal) Hassl. = **Solanum sanctae-catharinae** Dunal

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum citrifolium** Willd. ex Roem. & Schult. var.

*typicum* Hassl., nom. inval. = **Solanum sanctae-catharinae** Dunal

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum claviceps** Griseb. = **Solanum palinacanthum** Dunal

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Nee, M., 1999.

**Solanum cochabambense** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

Arbusto. Nativa. 500–2000 m.

Países: ARG(JUJ, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 24106 (LP, SI)].

**Solanum codonanthum** Bitter = **Solanum fiebrigii** Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 2005;

Cabrera, A. L., 1983d; Nee, M., 1999.

**Solanum collectaneum** C.V. Morton

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.

Arbusto. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 919 (LP, SI)].

**Solanum collinum** Dunal = **Solanum maglia** Schldl.

Referencias: Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G. & Hjerting,

J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

**Solanum commersonii** Dunal ex Poir. f. *malmeanum*

(Bitter) Correll = **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **malmeanum** (Bitter) Hawkes & Hjert.

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;

Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *mechoguense* (Bukasov) Correll = ***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabratum* Hook. f. = ***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., p.p. = ***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., p.p. = ***Solanum maglia*** Schltld.

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum commersonii* Dunal var. *glabriusculum* J. Remy, hom. illeg. = ***Solanum maglia*** Schltld.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Walp., p.p. = ***Solanum maglia*** Schltld.

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glanduloso-pubescens* Hook. f. = ***Solanum kurtzianum*** Bitter & Wittm.

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pilosiusculum* Hook. f. = ***Solanum kurtzianum*** Bitter & Wittm.

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pseudostipulatum* Hassl. = ***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **malmeanum** (Bitter) Hawkes & Hjert.

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Chodat, hom. illeg. = ***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **malmeanum** (Bitter) Hawkes & Hjert.

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Sendtn. = ***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *violaceum* Herter, nom. nud. = ***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Brücher, E. H., 1976; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969.

***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Sin.: *Solanum acroleucum* Bitter, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Sendtn., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *violaceum* Herter, nom. nud., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *mechoguense* (Bukasov) Correll, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabratum* Hook. f., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., p.p., *Solanum compactum* Bukasov, nom. nud., *Solanum debile* Dunal, *Solanum henryi* Bukasov & Lechn., *Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *laticaulis* Lechn., *Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *pubescens* Lechn., *Solanum mechonguense* Bukasov, *Solanum mercedense* Bukasov, *Solanum ohronzii* Carrière, *Solanum rionegrinum* Lechn., *Solanum sorianum* Bukasov, *Solanum tenue* Sendtn., *Solanum tenue* Sendtn. var. *raphanifolium* Dunal

Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L., 1979; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.

Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(CAS,

COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 3425* (CTES, LIL)]; BRA[*Smith, L. B. 10210* (HBR, LL, R, US)]; URY[*Alonso Paz, E. 3677* (MVFQ)].

***Solanum commersonii*** Dunal ex Poir. subsp. **malmeanum** (Bitter) Hawkes & Hjert.

Sin.: *Solanum chacoense* Bitter f. *pilosulum* (Hassl.) Hassl., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pseudostipulatum* Hassl., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pubescens* Chodat, hom. illeg., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. f. *malmeanum* (Bitter) Correll, *Solanum guaraniticum* Hassl. f. *pilosulum* Hassl., *Solanum malmeanum* Bitter, *Solanum millanii* Bukasov & Lechn., *Solanum pseudostipulatum* (Hassl.) Bukasov

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(RGS); PRY(CEN, COA, GUA, ITA).

- Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 1002 (CORD)]; BRA[Costa, D. M. 108 (ICN)]; PRY[Bertoni, M. M. 4274 (LIL)].
- Solanum compactum* Bukasov, nom. nud. = **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**  
Referencias: Brücher, E. H., 1976; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Morton, C. V., 1976.
- Solanum compressum** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966; Tressens, S. G., 2000.  
Arbolito o árbol. Endémica. 0–1400 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: ARG[Tressens, S. G. 5885 (CTES)]; BRA[Reitz, P. R. 7867 (HBR, US)].
- Solanum comptum** C.V. Morton  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Schinini, A. & López, M. G., 1999.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR); PRY(APY, APA, CEN).  
Ejemplares de referencia: ARG[Schwarz, G. J. 214 (LIL, NY)]; PRY[Schinini, A. 23852 (CTES)].
- Solanum concarense** Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1989; Nee, M., 1999.  
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.  
Países: ARG(SLU).  
Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 14547 (CORD)].
- Solanum concavum* Lindl. = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Knapp, S., 1989.
- Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Nee, M., 1999.
- Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *robustus* Chodat = **Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *typicum* Chodat, nom. inval. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum concinnum** Sendtn.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[Mattos, A. 6595 (CORD)].
- Solanum conditum* C.V. Morton = **Solanum aridum** Morong  
Referencias: Nee, M., Bohs, L. & Knapp, S., 2006.
- Solanum confusum** C.V. Morton  
Sin.: *Cyphomandra adelpha* (C.V. Morton) A. Child ex Bohs, *Solanum adelphum* C.V. Morton  
Referencias: Bohs, L., 2001; Cabrera, A. L., 1983d.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 500–2000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Kiesling, R. 8295 (SI)].
- Solanum congestiflorum* Dunal = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Knapp, S., 1989.
- Solanum congestiflorum* Dunal var. *longifolium* Dunal = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Knapp, S., 1989.
- Solanum congestiflorum* Dunal var. *pannosum* (Phil.) Reiche = **Solanum pannosum** Phil.
- Solanum congestiflorum* Dunal var. *syringifolium* (Kunth & Bouché) Reiche = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.
- Solanum consimile** C.V. Morton  
Sin.: *Solanum ledesmense* Cabrera, *Solanum saponaceum* auct. non Dunal  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Arbusto. Nativa. 400–2700 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 5058 (SI)].
- Solanum convolvulus* Sendtn. = **Solanum flaccidum** Vell.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum cordobense* Bukasov = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Brücher, E. H., 1956.
- Solanum corniculatum* Hieron. = **Lycianthes rantonnei** (Carrière) Bitter  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.
- Solanum corumbense** S. Moore  
Sin.: *Cyphomandra verruculosa* Hassl., *Solanum tumescens* S. Knapp, *Solanum verruculosum* (Hassl.) Hassl.  
Referencias: Knapp, S., 2002.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 300–400 m.  
Países: PRY(CON).  
Ejemplares de referencia: PRY[Vanni, R. O. 391 (CTES, PY)].
- Solanum corymbiflorum** (Sendtn.) Bohs subsp. **corymbiflorum**  
Sin.: *Cyphomandra corymbiflora* Sendtn., *Cyphomandra kleinii* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra macrophylla* L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Bohs, L., 1994a; Nee, M., 1999.  
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1300 m.  
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 7183 (SI)]; BRA[Dombrowski, L. T. 4922 (CTES)].

**Solanum corymbiflorum** (Sendtn.) Bohs subsp.**mortoniana** (L.B. Sm. & Downs) Bohs

Sin.: *Cyphomandra corymbiflora* Sendtn. subsp. *mortoniana* (L.B. Sm. & Downs) Bohs, *Cyphomandra mortoniana* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra patrum* L.B. Sm. & Downs

Arbusto. Endémica. 900–2000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11922* (MBM, US)].

**Solanum coxii** Phil.

Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(X).

Ejemplares de referencia: CHL[*Cox, G. s.n.* (SGO)].

**Solanum crassifolium** Ortega = **Solanum betaceum** Cav.

Referencias: Bohs, L., 1994a.

**Solanum crassipes** Phil. = **Solanum montanum** L.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum crassipes** Phil. var. *aberrans* (Phil.) Bitter = **Solanum paposanum** Phil.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum crebrum** C.V. Morton ex L.B. Sm.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b; Morton, C. V., 1976.

Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.

Países: ARG(CAT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2166* (G, LIL, NY, W)].

**Solanum crenato-dentatum** Dunal, p.p. = **Solanum furcatum** Dunal

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

**Solanum crenato-dentatum** Dunal, p.p. = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

**Solanum crispum** Ruiz & Pav.

Sin.: *Solanum angustifolium* Lam. var. *brevifolium* Dunal, *Solanum berterianum* (J. Remy) F. Phil., *Solanum concavum* Lindl., *Solanum congestiflorum* Dunal, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *longifolium* Dunal, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *syringifolium* (Kunth & Bouché) Reiche, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *elaegnifolium* Dunal, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *ligustrinum* (Lodd.) Dunal, *Solanum gayanum* (J. Remy) F. Phil., *Solanum landbeckii* Phil., *Solanum ligustrinum* Lodd., *Solanum pyrrocarpum* Phil., *Solanum sadae* Phil., *Solanum subnervium* Dunal, *Solanum syringifolium* Kunth & Bouché, *Solanum tomatillo* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia berteriana* J. Remy, *Witheringia crispa* (Ruiz & Pav.) J. Remy, *Witheringia gayana* J. Remy, *Witheringia tomatillo* J. Remy

Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Knapp, S., 1989; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto. Endémica. 0–2500 m.

Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6594* (BA, SI)]; CHL[*Werdermann, E. 479* (BM, K, MO)].

**Solanum crispum** Ruiz & Pav. var. *elaegnifolium* Dunal = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

**Solanum crispum** Ruiz & Pav. var. *ligustrinum* (Lodd.) Dunal = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

**Solanum cuevoanum** Cárdenas = **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

**Solanum cultum** (A. DC.) Berthault = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990.

**Solanum curtipes** Bitter = **Solanum americanum** Mill.

Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.

[*Solanum cutervannum* Zahlbr.]

Sin.: *Solanum pulverulentum* Pers., hom. illeg.

Referencias: Knapp, S., Stafford, M., Sousa-Peña, M. & Martínez, M., 2005.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[*Solanum cylindricum* Vell.]

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

**Solanum cymosum** auct. non Ruiz & Pav. = **Solanum aloysiifolium** Dunal**Solanum cyrtopodium** Dunal

Sin.: *Solanum poeppigianum* Dunal, nom. nud., *Solanum puberulum* Phil.

Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; PBI Solanum project, 2006.

Arbusto. Endémica. 0–2000 m.

Países: CHL(VIII, IX).

Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1345* (CONC)].

**Solanum dealbatum** Lindl. = **Solanum elaeagnifolium** Cav.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Matesevach, A. M., 2002.

**Solanum debile** Dunal = **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum decorticans* Sendtn. = **Solanum inodorum** Vell.  
Referencias: Nee, M., 1999.

**Solanum delicatulum** L.B. Sm. & Downs

Referencias: Gutiérrez, A., Barboza, G. E. & Mentz, L. A., 2006; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–800 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, GUA).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 816 (CORD)]; BRA[Klein, R. M. 1131 (HBR)]; PRY[Caballero Mármori, G. 1336 (CTES)].

**Solanum delitescens** C.V. Morton

Sin.: *Solanum delitescens* C.V. Morton var. *amphidoxum* C.V. Morton, *Solanum pteropodum* auct. non Humb. & Bonpl. ex Dunal

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1991b; Cabrera, A. L., 1983d; Knapp, S., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 500–2000 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 7652 (SI)].

*Solanum delitescens* C.V. Morton var. *amphidoxum* C.V. Morton = **Solanum delitescens** C.V. Morton  
Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum deltaicum* Cabrera = **Solanum nigrescens**

M. Martens & Galeotti

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

[*Solanum deltoideum* Colla]

Notas: Nombre dudoso.

*Solanum densiflorum* Sendtn., hom. illeg. = **Solanum piluliferum** Dunal

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum depexum* Juz. = **Solanum acaule** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

[*Solanum depexum* Juz. var. *chorruense* Hawkes]

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

Notas: Nombre dudoso.

**Solanum deterrimum** C.V. Morton

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Morton, C. V., 1976.

Subarbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, ERI).

Ejemplares de referencia: ARG[Ruiz Huidobro, A. M. 1614 (SI)].

*Solanum diemii* Brücher = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum diflorum* Vell. = **Solanum pseudocapsicum** L.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum diflorum* Vell. var. *angustifolium* Kuntze = **Solanum pseudocapsicum** L.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum diflorum* Vell. var. *pulverulentum* Chodat = **Solanum pseudocapsicum** L.

Referencias: Morton, C. V., 1976.

**Solanum diploconos** (Mart.) Bohs

Sin.: *Cyphomandra diploconos* (Mart.) Sendtn.,

*Cyphomandra fragans* (Hook.) Sendtn., *Witheringia diploconos* Mart.

Referencias: Bohs, L., 1994a; Nee, M., 1999.

Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).

Ejemplares de referencia: BRA[Hunziker, A. T. 2019 (CORD)]; PRY[Fiebrig, K. A. G. 6456 (SI)].

*Solanum dolichostigma* Bukasov, nom. nud. = **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Ochoa, C. M., 1990.

[*Solanum donianum* Walp.]

Sin.: *Solanum verbascifolium* L.

Referencias: Nee, M., 1999.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Solanum dusenii* L.B. Sm. & Downs = **Solanum campaniforme** Roem. & Schult.

Referencias: Knapp, S., 2002.

**Solanum echegarayi** Hieron.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b; Morton, C. V., 1976.

Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.

Países: ARG(MEN, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 24813 (CORD)].

**Solanum elaeagnifolium** Cav.

Sin.: *Solanum dealbatum* Lindl., *Solanum elaeagnifolium*

Cav. var. *angustifolium* Kuntze, *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *argyrocroton* Griseb., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *grandiflorum* Griseb., *Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *leprosum* (Ortega) Dunal, *Solanum leprosum* Ortega, *Solanum saponaceum* Hook., hom. illeg.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Matesevach, M., 2002; Morton, C. V., 1976.

Hierba. Perenne. Nativa. 200–3300 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, RME); PRY(APY, CEN, PHA); URY(COL, MON, PAY, SOR).

- Ejemplares de referencia: ARG[*Bernardello, G. 503* (CORD)]; CHL[*Matthei, O. R. 428* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 5109* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Berro, M. B. 1942* (G)].
- Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *angustifolium* Kuntze  
= **Solanum elaeagnifolium** Cav.  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *argyrocroton* Griseb.  
= **Solanum elaeagnifolium** Cav.  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *grandiflorum* Griseb.  
= **Solanum elaeagnifolium** Cav.  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *leprosum* (Ortega) Dunal = **Solanum elaeagnifolium** Cav.  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum elaeagnifolium* Cav. var. *ovalifolium* Kuntze  
= **Solanum aridum** Morong  
Referencias: Nee, M., Bohs, L. & Knapp, S., 2006.
- Solanum emmeae* Juz. & Bukasov = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.
- Solanum endoadenium** Bitter  
Sin.: *Solanum endoadenium* Bitter var. *robustius* Bitter, *Solanum sericeum* Ruiz & Pav. var. *strigillosum* Griseb.  
Referencias: Morton, C. V., 1976; Moscone, E. A., 1992.  
Arbusto. Endémica. 1000–3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 24909* (CORD)].
- Solanum endoadenium* Bitter var. *robustius* Bitter  
= **Solanum endoadenium** Bitter  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum etuberosum** Lindl.  
Sin.: *Solanum bustillosii* Phil., *Solanum etuberosum* Lindl. var. *antucense* Bitter, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *bustillosii* (Phil.) Witasek, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *chillanense* Bitter, *Solanum kunzei* Phil., *Solanum looseri* Juz., *Solanum subandinum* F. Meigen, *Solanum tuberosum* L. var. *polemoniifolium* Hook. f.  
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Brücher, E. H., 1966a; Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999; Nee, M., 1999.  
Hierba. Perenne. Endémica. 400–3000 m.  
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20181* (CONC, SGO)].
- Solanum etuberosum* Lindl. var. *antucense* Bitter  
= **Solanum etuberosum** Lindl.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.
- Solanum etuberosum* Lindl. var. *bustillosii* (Phil.) Witasek = **Solanum etuberosum** Lindl.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.
- Solanum etuberosum* Lindl. var. *chillanense* Bitter  
= **Solanum etuberosum** Lindl.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.
- Solanum euacanthum** Phil.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Hierba. Anual. Endémica. 0–3000 m.  
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1576* (CORD)].
- Solanum evonymoides* J. Remy, hom. illeg. = **Solanum valdiviense** Dunal  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Morton, C. V., 1976.
- Solanum fabrisii** Cabrera  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.  
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.  
Países: ARG(JUJ).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21071* (SI)].
- Solanum famatinae* Bitter & Wittm. = **Solanum spgazzinii** Bitter  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.
- Solanum fasciculatum* Vell. = **Aureliana fasciculata** (Vell.) Sendtn. var. *fasciculata*  
Referencias: Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1991[1990].
- Solanum fastigiatum* Willd. = **Solanum bonariense** L.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum fastigiatum* Willd. var. *acicularium* Dunal  
= **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum fernandezianum** Phil.  
Sin.: *Solanum brevistylum* Wittm., nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *fernandezianum* (Phil.) Reiche  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999; Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G., 1990; Nee, M., 1999.  
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1700 m.  
Países: CHL(IJF).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 5178* (CONC)].
- Solanum feuillei* Dunal = **Solanum pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum fiebrigii** BitterSin.: *Solanum codonanthus* Bitter

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1991b, 2005; Cabrera, A. L., 1983d; Edmonds, J. M., 1972.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 500–3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Cabrera, A. L. 21012 (SI)].

*Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *lanceolatum* Kuntze  
= **Solanum aloysiifolium** Dunal*Solanum filiforme* Ruiz & Pav. var. *subdentatum* Kuntze  
= **Solanum aloysiifolium** Dunal**Solanum flaccidum** Vell.Sin.: *Solanum convolvulus* Sendtn., *Solanum flaccidum* Vell.  
var. *heterophyllum* Witasek

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Smith, L. B. &amp; Downs, R. J., 1966.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, SPE).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 19019 (MBM)]; PRY[Hassler, E. 11288 (G, W)].

*Solanum flaccidum* Vell. var. *heterophyllum* Witasek  
= **Solanum flaccidum** Vell.

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004.

[*Solanum flagellare* Sendtn.]

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Olivera, P. L., 2004.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Solanum flagrans* Ten. = **Solanum pseudoquina**  
A. St.-Hil.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum flavistrigosum* Bitter = **Solanum turneroides**  
Chodat

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum flexuosum* (J. Remy) Phil. = **Solanum**  
**remyanum** Phil.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

[*Solanum floribundum* Rojas Acosta]

Notas: Nombre dudoso.

*Solanum foetidum* Ruiz & Pav. = **Solanum luteo-album**  
Pers.*Solanum fonckii* Phil. ex Reiche, nom. nud. = **Solanum**  
**tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. &amp; Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990.

**Solanum fragile** Wedd.Sin.: *Solanum grandidentatum* Phil., *Solanum myriadenium*  
Bitter, *Solanum tarapacanicum* Phil.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Dillon, M. O., 2005; Edmonds, J. M., 1972.

Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.

Países: ARG(JUJ, TUC); CHL(I).

Ejemplares de referencia: ARG[Fries, R. E. 890 (P, S)]; CHL[Ricardi, M. 4758 (CONC)].

*Solanum fundatum* C.V. Morton = **Lycianthes saltensis**  
Bitter

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1992.

**Solanum furcatum** DunalSin.: *Solanum andinum* Reiche, *Solanum arequipense* Bitter, *Solanum crenato-dentatum* Dunal, p.p., *Solanum furcatum* Dunal var. *acutedentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *obtusdentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *subintegerrimum* Nees, *Solanum muricatum* Bertero ex Dunal, nom. nud., *Solanum rancaguense* Dunal, *Solanum robinsonianum* Bitter, *Solanum subandinum* Phil., hom. illeg.

Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. &amp; Rodríguez Ríos, R., 1999; Edmonds, J. M., 1972.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–1900 m.

Países: CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, IJF, RME).

Ejemplares de referencia: CHL[Bertero, C. L. G. 633 (P), Marticorena, C. 1077 (CONC, G)].

*Solanum furcatum* Dunal var. *acutedentatum* Nees  
= **Solanum furcatum** Dunal*Solanum furcatum* Dunal var. *obtusdentatum* Nees  
= **Solanum furcatum** Dunal*Solanum furcatum* Dunal var. *subintegerrimum* Nees  
= **Solanum furcatum** Dunal**Solanum fusiforme** L.B. Sm. & DownsSin.: *Cyphomandra fusiformis* (L.B. Sm. & Downs) A. Child  
ex Bohs

Referencias: Bohs, L., 2001; Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Smith, L. B. &amp; Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Nativa. 0–900 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 5538 (SI)]; BRA[Smith, L. B. 9658 (HBR, US)]; PRY[Caballero Marmor, G. 281 (CTES)].

*Solanum garciae* Juz. & Bukasov = **Solanum chacoense**  
Bitter

Referencias: Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

*Solanum gaudichaudiana* (J. Remy) Phil. = **Solanum**  
**pinnatum** Cav.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum gaudichaudii** Dunal

Referencias: Marticorena, C. &amp; Quezada, M., 1985.

Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.

Países: CHL(IV, V).

Ejemplares de referencia: CHL[Jiles, C. 1837 (CONC)].

[*Solanum gaudichaudii* Dunal var. *canescens* Dunal]

Notas: Nombre dudoso.

*Solanum gaudichaudii* Dunal var. *pyrethrifolium*

(Griseb.) Kuntze = ***Solanum triflorum*** Nutt.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a;  
Hunziker, A. T., 1989.

*Solanum gaudichaudii* Dunal var. *viride* Dunal

= ***Solanum pinnatum*** Cav.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum gayanum* (J. Remy) F. Phil. = ***Solanum***

***crispum*** Ruiz & Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

*Solanum geissei* Phil. = ***Solanum brachyantherum*** Phil.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

***Solanum gemellum*** Mart. ex Sendtn.

Sin.: *Solanum gemellum* Mart. ex Sendtn. var. *racemiforme*  
Witasek

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton,  
C. V., 1976; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[Vanni, R. O. 859 (NY)];  
BRA[Hatschbach, G. 26836 (MBM, UPCB)].

*Solanum gemellum* Mart. ex Sendtn. var. *racemiforme*

Witasek = ***Solanum gemellum*** Mart. ex Sendtn.

*Solanum geminifolium* Schldtl. = ***Solanum***

***schlechtendalianum*** Walp.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.

*Solanum geniculatistrigosum* Bitter = ***Solanum***

***turneroides*** Chodat

Referencias: Nee, M., 1999.

[*Solanum germainii* Phil.]

Notas: Nombre dudoso.

***Solanum gertii*** S. Knapp

Referencias: Knapp, S., 1992, 2002.

Arbusto o arbolito. Endémica. 800–900 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Oliveira, P. I. 285 (MBM,  
NY)].

*Solanum gibberulosum* Juz. & Bukasov = ***Solanum***

***chacoense*** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,  
C. M., 1990.

*Solanum gigantophyllum* Bitter = ***Solanum***

***microdontum*** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

***Solanum gilioides*** Rusby

Sin.: *Solanum nicandricalyx* Cabrera

Referencias: Barboza, G. E., 2004.

Hierba. Anual. Nativa. 3000–3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Negritto, M. A. 429  
(CORD)].

***Solanum glaberrimum*** C.V. Morton

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b;  
Morton, C. V., 1976.

Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.

Países: ARG(LRI, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[Covas, G. 1235 (GH, NY)].

*Solanum glanduliferum* Hawkes = ***Solanum***

***infundibuliforme*** Phil.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G., 1990;  
Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

***Solanum glandulosipilosum*** Bitter

Sin.: *Solanum adeno-chlamys* Bitter

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.

Países: ARG(CAT, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Subils, R. 3609 (CORD)].

*Solanum glaucescens* Baclé ex Dunal, nom. nud.

= ***Solanum glaucophyllum*** Desf.

Referencias: Bohs, L., 2001.

***Solanum glaucophyllum*** Desf.

Sin.: *Solanum glaucescens* Baclé ex Dunal, nom. nud.,  
*Solanum glaucum* Bertol., *Solanum glaucum* Dunal,  
hom. illeg., *Solanum malacoxylon* Sendtn., *Solanum*  
*malacoxylon* Sendtn. f. *albo-marginatum* (Chodat)  
Hassl., *Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *vulgare* Hassl.,  
*Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *albo-marginatum*  
Chodat, *Solanum malacoxylon* Sendtn. var.  
*angustissimum* Kuntze, *Solanum malacoxylon* Sendtn.  
var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum*  
*malacoxylon* Sendtn. var. *latifolium* Kuntze, *Solanum*  
*malacoxylon* Sendtn. var. *subvirescens* Hassl., *Solanum*  
*melanoxylon* Sendtn., *Solanum pulverulentum* auct. non  
Pers.

Referencias: Bohs, L., 2001; Cabrera, A. L., 1979, 1983d;  
Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mentz, L. A. &  
Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Sayagués,  
L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.

Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL,  
SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON,  
COA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(CAS, CLA,  
COL, MON, ROC, SJO).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 357 (CORD,  
SI)]; BRA[Sacco, J. C. 816 (F, NY)]; PRY[Hassler, E.  
3201 (BM, NY, W)]; URY[Herter, W. G. F. 659 (B,  
MO, NY, SI)].

[*Solanum glaucum* Rojas Acosta, hom. illeg.]

Notas: Nombre dudoso.

*Solanum glaucum* Bertol. = **Solanum glaucophyllum** Desf.

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum glaucum* Dunal, hom. illeg. = **Solanum glaucophyllum** Desf.

Referencias: Bohs, L., 2001.

[*Solanum glaucumfruticosum* Larrañaga]

Notas: Nombre dudoso.

**Solanum gnaphalocarpon** Vell.

Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

Arbusto. Nativa. 700–1300 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2180* (GH)].

*Solanum gonatotrichum* Bitter = **Solanum turneroides** Chodat

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum gourlayi* Hawkes = **Solanum brevicaule** Bitter

Referencias: Miller, J. T. & Spooner, D. M., 1999; Spooner, D. M., Mc Lean, K., Ramsay, G., Waugh, R. & Bryan, G. J., 2005.

*Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *saltense* A.M. Clausen & K.A. Okada = **Solanum brevicaule** Bitter

Referencias: Miller, J. T. & Spooner, D. M., 1999; Spooner, D. M., Mc Lean, K., Ramsay, G., Waugh, R. & Bryan, G. J., 2005.

*Solanum gourlayi* Hawkes subsp. *vidaurrei* (Cárdenas) Hawkes & Hjert. = **Solanum brevicaule** Bitter

Referencias: Miller, J. T. & Spooner, D. M., 1999; Spooner, D. M., Mc Lean, K., Ramsay, G., Waugh, R. & Bryan, G. J., 2005.

*Solanum gracile* Dunal, hom. illeg. = **Solanum chenopodioides** Lam.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.

*Solanum gracile* Dunal var. *microphyllum* Dunal = **Solanum chenopodioides** Lam.

Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.

*Solanum gracilius* Herter = **Solanum chenopodioides** Lam.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.

*Solanum gracillimum* Sendtn. = **Solanum hirtellum** (Spreng.) Hassl.

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum grandidentatum* Phil. = **Solanum fragile** Wedd.

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

*Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *apaense* Chodat & Hassl. = **Solanum lycocarpum** A. St.-Hil.

*Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl. = **Solanum lycocarpum** A. St.-Hil.

*Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. var. *macrocarpum* Hassl. = **Solanum lycocarpum** A. St.-Hil.

**Solanum granulosum-leprosum** Dunal

Sin.: *Solanum auriculatum* auct. non Aiton, *Solanum verbascifolium* L. f. *eupulverulentum* Hassl., *Solanum verbascifolium* L. f. *granuloso-leprosum* (Dunal) Hassl.

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1979; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Roe, K. E., 1972; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE); URY(ROC, SJO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1659* (SI)]; BRA[*Schwarz, G. J. 7352* (CORD)]; PRY[*Zardini, E. M. 4494* (FCQ, MO)]; URY[*Rosengurt, B. 1984* (NY)].

*Solanum grossum* C.V. Morton = **Solanum aligerum** Schlttdl.

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum guaraniticum* Hassl., hom. illeg. = **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

**Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum bonariense* L. f. *intermedium* Hassl., *Solanum bonariense* L. f. *leptophyllum* Chodat, *Solanum bonariense* L. f. *lobatum* (Hassl.) Chodat, *Solanum bonariense* L. f. *subintegrum* (Hassl.) Chodat, nom. illeg., *Solanum bonariense* L. f. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum bonariense* L. var. *paraguariense* (Chodat) Chodat, *Solanum bonariense* L. var. *villaricense* (Morong) Chodat, *Solanum fastigiatum* Willd. var. *acicularium* Dunal, *Solanum paraguariense* Chodat, hom. illeg., *Solanum villaricense* Morong, *Solanum villaricense* Morong f. *lobatum* Hassl., *Solanum villaricense* Morong f. *subintegrum* Hassl., *Solanum villaricense* Morong f. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum villaricense* Morong var. *paraguariense* (Chodat) Hassl.

Referencias: Chiarini, F., Barboza, G. E. & Marticorena, A., 2007; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).

- Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1343* (SI)]; BRA[*Ariza Espinar, L. 1168* (CORD)]; PRY[*Arenas, P. 697* (CORD, SI), *Zardini, E. M. 47455* (AS, MO)].
- Solanum guaraniticum* Hassl. f. *glabrescens* Hassl.  
= **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.
- Solanum guaraniticum* Hassl. f. *pilosulum* Hassl.  
= **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **malmeanum** (Bitter) Hawkes & Hjert.  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.
- Solanum guaraniticum* Hassl. f. *plurijugum* Hassl.  
= **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.
- Solanum guaraniticum* Hassl. var. *angustisectum* Hassl.  
= **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976; Ochoa, C. M., 1990.
- Solanum haarupii* Bitter = **Solanum tweedianum** Hook.  
Referencias: Edmonds, J. M., 1972.
- Solanum handelianum* Morong = **Solanum amygdalifolium** Steud.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.
- Solanum hasslerianum** Chodat  
Sin.: *Solanum balansae* Hassl., *Solanum balansae* Hassl. var. *lyratifidum* Hassl., *Solanum balansae* Hassl. var. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum brownii* Chodat, hom. illeg., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *euinerme* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *oblongifolium* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat f. *quercifolium* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *ambiguum* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *aureomicans* Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *horridum* Chodat & Hassl., *Solanum hasslerianum* Chodat var. *subinerme* Hassl., *Solanum rizzinianum* Mattos  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, PHA, SPE).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 197* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 52311* (MBM, NY, Z)]; PRY[*Hassler, E. 4369* (BM, G, W)].
- Solanum hasslerianum* Chodat f. *euinerme* Hassl.  
= **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum hasslerianum* Chodat f. *oblongifolium* Hassl.  
= **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum hasslerianum* Chodat f. *quercifolium* Hassl.  
= **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum hasslerianum* Chodat var. *ambiguum* Hassl.  
= **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.
- Solanum hasslerianum* Chodat var. *aureomicans* Hassl.  
= **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum hasslerianum* Chodat var. *genuinum* Hassl., nom. inval. = **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum hasslerianum* Chodat var. *horridum* Chodat & Hassl. = **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.
- Solanum hasslerianum* Chodat var. *subinerme* Hassl.  
= **Solanum hasslerianum** Chodat  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum hastatilobum** Bitter  
Sin.: *Solanum hastatilobum* Bitter subsp. *brachyphyllum* Bitter  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b; Morton, C. V., 1976.  
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU, SLU).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7855* (SI, UNSL)].
- Solanum hastatilobum* Bitter subsp. *brachyphyllum* Bitter  
= **Solanum hastatilobum** Bitter  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1991b.
- Solanum hatschbachii* Carvalho = **Solanum swartzianum** Roem. & Schult.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum hauthalii** Bitter  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.  
Subarbusto. Nativa. 3000–3500 m.  
Países: ARG(JUJ).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21489* (LP, SI)].
- Solanum heleonastes** S. Knapp  
Referencias: Knapp, S., 2002; Nee, M., 1999.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 100–500 m.  
Países: ARG(CHA, COS, MIS); PRY(CAA, ÑEE).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 5671* (CTES, F, MO, WIS)]; PRY[*Keel, S. 1479* (FCQ)].

*Solanum heliotropifolium* Dunal var. *sellowianum*  
(Sendtn.) Dunal = **Solanum sellowianum** Sendtn.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum henryi* Bukasov & Lechn. = **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *laticalix* Lechn.  
= **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum henryi* Bukasov & Lechn. f. *pubescens* Lechn.  
= **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

**Solanum herba-bona** Reiche  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Países: CHL(III).  
Ejemplares de referencia: CHL[*King s.n.* (G, W)].

**Solanum heterantherum** Witasek ex Reiche  
Sin.: *Solanum tomentosum* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia tomentosa* J. Remy  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; PBI Solanum project, 2006.  
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.  
Países: CHL(III, IV, V).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1513* (CONC)].

*Solanum hibiscifolium* Rusby = **Solanum abutiloides** (Griseb.) Bitter & Lillo  
Referencias: Roe, K. E., 1972.

**Solanum hieronymi** Kuntze  
Sin.: *Solanum montanum* auct. non Ruiz & Pav., *Solanum pocote* Hieron. ex Millán  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.  
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 569* (CORD)]; PRY[*Degen, R. 3094* (CTES, FCQ, MO)].

*Solanum higueraum* Cárdenas = **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

**Solanum hirtellum** (Spreng.) Hassl.  
Sin.: *Atropa hirtella* Spreng., *Solanum gracillimum* Sendtn., *Solanum hirtellum* (Spreng.) Hassl. var. *diminutum* Hassl.

Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Stutz, L. C., 1983.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.  
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6671* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 3244* (CORD)]; PRY[*Zardini, E. M. 40732* (PY)].

*Solanum hirtellum* (Spreng.) Hassl. var. *diminutum* Hassl. = **Solanum hirtellum** (Spreng.) Hassl.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

**Solanum hoehnei** C.V. Morton  
Sin.: *Solanum alatum* Dunal, hom. illeg.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5929* (FLOR, HBR)].

**Solanum homalospermum** Chiarini  
Referencias: Chiarini, F., 2004.  
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1000 m.  
Países: ARG(CAT, COR).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Chiarini, F. 505* (CORD, NY)].

*Solanum horovitzii* Bukasov = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

*Solanum horovitzii* Bukasov var. *glabristylum* Hawkes, nom. nud. = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Ochoa, C. M., 1990.

*Solanum horovitzii* Bukasov var. *multijugum* Hawkes = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

**Solanum huayavillense** Del Vitto & Petenatti  
Sin.: *Solanum pachyantherum* Bitter, hom. illeg.  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1995.  
Subarbusto. Nativa. 1000–2000 m.  
Países: ARG(JUJ, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Del Vitto, L. A. 2182* (UNSL)].

*Solanum humile* Bernh. = **Solanum nigrum** L. var. **humile** (Bernh.) Boiss.

*Solanum improvidum* Brücher = **Solanum kurtzianum** Bitter & Wittm.  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum inaequale* Vell. = **Solanum pseudoquina**

A. St.-Hil.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum incamayoense* K.A. Okada & A.M. Clausen  
= **Solanum brevicaule** Bitter

Referencias: Miller, J. T. &amp; Spooner, D. M., 1999; Spooner, D. M., Mc Lean, K., Ramsay, G., Waugh, R. &amp; Bryan, G. J., 2005; van den Berg, R. G., Miller, J. T., Ugarte, M. L., Kardolus, J. P., Villand, J., Nienhuis, J. &amp; Spooner, D. M., 1998.

*Solanum incanum* Ruiz & Pav. = **Solanum albidum**  
Dunal

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

**Solanum incarceratum** Ruiz & Pav.

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1991b.

Arbusto. Nativa. 400 m.

Países: BRA(PAR); PRY(CAN, CEN).

Ejemplares de referencia: BRA[Lindeman, J. C. 4268 (K, NY)]; PRY[Hassler, E. 5803 (NY, PY)].

**Solanum incisum** Griseb. var. **incisum**

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976; Moscone, E. A., 1992.

Subarbusto. Endémica. 1500–2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 24876 (CORD)].

**Solanum incisum** Griseb. var. **paucilobatum**

C.V. Morton

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Subarbusto. Endémica. 2000–2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Schreiter, R. 10595 (LIL)].

**Solanum incisum** Griseb. var. **septato-pilosum**

C.V. Morton

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.

Países: ARG(CAT).

Ejemplares de referencia: ARG[Sleumer, H. O. 2375 (LIL, US)].

**Solanum incisum** Griseb. var. **tenuisectum** (Kuntze)

Bitter ex C.V. Morton

Sin.: *Solanum tenuisectum* Kuntze

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Subarbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[Stuckert, T. J. V. 7019 (G)].

**Solanum incurvipilum** Bitter

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Arbusto. Endémica. 2000–3000 m.

Países: ARG(SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Kurtz, F. 12512 (CORD, S)].

**Solanum infundibuliforme** Phil.Sin.: *Solanum glanduliferum* Hawkes, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *angustepinnatum* Bitter, *Solanum microphyllum* Hawkes, hom. illeg., *Solanum pinnatifidum* Cárdenas, hom. illeg., *Solanum platypterum* Hawkes, *Solanum xerophyllum* Hawkes

Referencias: Brücher, E. H., 1966a; Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G. &amp; Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).

Ejemplares de referencia: ARG[Negritto, M. A. 427 (CORD)]; CHL[Philippi, R. A. s.n. (SGO, W)].

*Solanum infundibuliforme* Phil. var. *angustepinnatum*  
Bitter = **Solanum infundibuliforme** Phil.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005.

**Solanum inodorum** Vell.Sin.: *Solanum decorticans* Sendtn., *Solanum laurinum* Dunal

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. &amp; Downs, R. J., 1966.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1300 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Klein, R. M. 540 (B, CORD, HBR)].

**Solanum interandinum** BitterSin.: *Solanum masafueranum* Bitter & Skotts., *Solanum pentlandii* Dunal subsp. *interandinum* (Bitter) Edmonds

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: CHL(IJF).

Ejemplares de referencia: CHL[Skottsberg, C. J. F. 363 (C, K, P)].

*Solanum ipecacuanha* Chodat = **Solanum pseudocapsicum** L.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum ipecacuanha* Chodat var. *calvescens* Chodat  
= **Solanum pseudocapsicum** L.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum ipecacuanha* Chodat var. *obovata* Chodat  
= **Solanum pseudocapsicum** L.

Referencias: Knapp, S., 2002.

**Solanum ipomoea** Sendtn.Sin.: *Solanum ipomoea* Sendtn. var. *ipomoeoides* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum ipomoea* Sendtn. var. *macrostachyum* Hassl., *Solanum ipomoeoides* Chodat & Hassl.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Morton, C. V., 1976; PBI Solanum project, 2006.

Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL); PRY(COA, PHA).

Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 1853 (SI)]; PRY[Hassler, E. 3320 (G, P, W)].

*Solanum ipomoea* Sendtn. var. *ipomoeoides* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Solanum ipomoea** Sendtn.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum ipomoea* Sendtn. var. *macrostachyum* Hassl.  
= **Solanum ipomoea** Sendtn.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum ipomoeoides* Chodat & Hassl. = **Solanum ipomoea** Sendtn.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum iraniense** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.  
Arbusto. Endémica. 100–900 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: ARG[Bernardi, L. 18835 (K)];  
BRA[Hatschbach, G. 45519 (MBM)].

*Solanum isabellii* Dunal = **Solanum chenopodioides**  
Lam.  
Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997; Knapp,  
S., 2002.

[*Solanum itatiaiae* Glaz. ex Edmonds]  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[*Solanum izquierdo* Phil.]  
Notas: Nombre dudoso.

*Solanum jamesii* Torr. var. *grandifrons* Bitter = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Spooner, D. M., van den Berg, R. G., Rodríguez,  
A., Bamberg, J., Hijmans, R. J. & Lara-Cabrera, S. I.,  
2004.

*Solanum jasminifolium* auct. non Sendtn. = **Solanum angustifidum** Bitter  
Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum jasminoides* Paxton = **Solanum laxum** Spreng.  
Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum jatrophiifolium* Dunal = **Solanum affine** Sendtn.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M.,  
1991b.

**Solanum johannae** Bitter  
Sin.: *Solanum catanduva* L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Eskuche, U. G., 1989; Mentz, L. A. & Oliveira,  
P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs,  
R. J., 1966.  
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: ARG[Tressens, S. G. 6438 (SI)];  
BRA[Reitz, P. R. 1732c (CORD)].

*Solanum juanense* Wittm. ex Hawkes & Hjert., nom. nud.  
= **Solanum kurtzianum** Bitter & Wittm.  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Hawkes, J. G., 1990; Morton, C. V., 1976.

*Solanum jubeba* Vell. = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum juciri* Mart. ex Sendtn. = **Solanum alternato-pinnatum** Steud.  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Nee, M., 1999;  
Schinini, A. & López, M. G., 1997.

*Solanum juciri* Mart. ex Sendtn. f. *paraguariense* Hassl.  
= **Solanum alternato-pinnatum** Steud.  
Referencias: Matesevach, M., 2002; Schinini, A. & López,  
M. G., 1997.

*Solanum jujuense* Hawkes = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M. &  
Barboza, G. E., 2005.

**Solanum julocrotonoides** Hassl.  
Referencias: Chiarini, F., Barboza, G. E. & Marticorena, A.,  
2007; Nee, M., 1991a, 1999; Roe, K. E., 1972.  
Arbusto. Nativa. 300–900 m.  
Países: ARG(MIS); PRY(APA, AMA, CAU).  
Ejemplares de referencia: ARG[Schwarz, G. J. 5263 (B, LIL,  
W)]; PRY[Hassler, E. 8945 (F, G, GH, NY)].

**Solanum juncalense** Reiche  
Sin.: *Solanum juncalense* Reiche subsp. *aconcaguae* Bitter  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b;  
Morton, C. V., 1976.  
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.  
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(V).  
Ejemplares de referencia: ARG[Ruiz Leal, R. A. 6420 (LIL,  
MERL)]; CHL[Buchtien, O. 150 (SGO)].

*Solanum juncalense* Reiche subsp. *aconcaguae* Bitter  
= **Solanum juncalense** Reiche  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b.

**Solanum juvenale** Thell.  
Sin.: *Solanum meloncillo* Parodi  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Matesevach, A. M., 2002;  
Morton, C. V., 1976; Moscone, E. A., 1992; Nee, M.,  
1999.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, LPA, LRI,  
SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY); URY(PAY,  
RNO).  
Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 24947  
(CORD)]; PRY[Vanni, R. O. 2153 (CTES)];  
URY[Herter, G. 99630 (Z)].

*Solanum kieslingii* Cabrera = **Solanum maturecalvans**  
Bitter  
Referencias: Knapp, S., 2002.

**Solanum kleinii** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L.,  
2004; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto o subarbusto. Nativa. 900–1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[Smith, L. B. 7321 (HBR, NY,  
US)].

*Solanum knappei* Juz. & Bukasov = **Solanum chacoense**  
Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

**Solanum krauseanum** Phil.  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.  
Arbusto. Endémica. 0–900 m.  
Países: CHL(X, XI).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 87* (CONC)].

*Solanum kunzei* Phil. = **Solanum etuberosum** Lindl.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.

**Solanum kurtzianum** Bitter & Wittm.  
Sin.: *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glanduloso-pubescens* Hook. f., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *pilosiusculum* Hook. f., *Solanum improvidum* Brücher, *Solanum juanense* Wittm. ex Hawkes & Hjert., nom. nud., *Solanum macolae* Bukasov, *Solanum mendozianum* Bukasov, nom. nud., *Solanum velascanum* Bitter & Wittm.  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2500 m.  
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2645* (LIL, US)].

**Solanum lacerdae** Dusén  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5435* (B, CORD, HBR, NY)].

*Solanum landbeckii* Phil. = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Knapp, S., 1989.

*Solanum laplaticum* Bukasov = **Solanum chacoense**  
Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

*Solanum laurinum* Dunal = **Solanum inodorum** Vell.  
Referencias: Nee, M., 1999.

**Solanum laxum** Spreng.  
Sin.: *Solanum boerhaviifolium* Sendtn., *Solanum boerhaviifolium* Sendtn. var. *calvum* C.V. Morton, *Solanum jasminoides* Paxton  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.  
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(COL, FLA, MON, SAO, TAC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1108* (SI)]; BRA[*Tessmann, G. 6554* (CORD)]; PRY[*Jiménez, B. 183* (BM, PY)]; URY[*Berro, M. B. 4797* (K)].

*Solanum ledesmense* Cabrera = **Solanum consimile**  
C.V. Morton  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Nee, M., 1999.

*Solanum leprosum* Ortega = **Solanum elaeagnifolium**  
Cav.  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum leptophyes* Bitter = **Solanum brevicaule** Bitter

*Solanum leptophyes* Bitter f. *gourlayi* (Hawkes) Correll = **Solanum brevicaule** Bitter

*Solanum leptostigma* Juz. ex Bukasov = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

[*Solanum leucodendron* Sendtn.]  
Sin.: *Solanum citrifolium* Willd. ex Roem. & Schult. var. *leucodendron* (Sendtn.) Hassl.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Solanum ligustrinum* Lodd. = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.

*Solanum litusinum* Ochoa = **Solanum berthaultii**  
Hawkes  
Referencias: Spooner, D. M. & van den Berg, R. G., 1992.

*Solanum looseri* Juz. = **Solanum etuberosum** Lindl.  
Referencias: Brücher, E. H., 1966a; Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999; Correll, D. S., 1962.

*Solanum lorentzii* Bitter = **Solanum aloysiifolium** Dunal  
Referencias: Edmonds, J. M., 1977.

*Solanum lorentzii* Bitter var. *montigenum* C.V. Morton = **Solanum montigenum** (C.V. Morton) Cabrera  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Solanum lorentzii* Bitter var. *tucumanicum* Bitter = **Solanum aloysiifolium** Dunal

*Solanum lucidum* Moric. = **Aureliana fasciculata** (Vell.)  
Sendtn. var. **fasciculata**  
Referencias: Hunziker, A. T. & Barboza, G. E., 1991[1990].

**Solanum luridifuscescens** Bitter  
Referencias: Bohs, L., 2001; Nee, M., 1999.  
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 800–1100 m.  
Países: BRA(PAR).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20327* (CTES, Z)].

[*Solanum luteo-album* Pers.]  
Sin.: *Solanum foetidum* Ruiz & Pav.  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Solanum lyciiforme* Dammer = **Lycianthes lycioides** (L.) Hassl.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum lycioides* L. = **Lycianthes lycioides** (L.) Hassl.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum lycioides* L. var. *parvifolium* Wedd.

= **Lycianthes lycioides** (L.) Hassl.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

**Solanum lycocarpum** A. St.-Hil.

Sin.: *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *apaense* Chodat & Hassl., *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Solanum grandiflorum* Ruiz & Pav. var. *macrocarpum* Hassl.

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Keel, S. & Rivarola, N., 1997a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mentz, L. A., 2004; Nee, M., 1999.

Arbusto. Nativa. 0–1100 m.

Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, CON, SPE).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13270* (MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 1848* (BM, CTES, MO, PY)].

**Solanum lycopersicoides** Dunal

Referencias: Smith, S. D. & Peralta, I. E., 2002.

Arbusto. Nativa. 1500–3600 m.

Países: CHL(I).

Ejemplares de referencia: CHL[*Smith, W. A. 7* (MO)].

*Solanum macolae* Bukasov = **Solanum kurtzianum**

Bitter & Wittm.

Referencias: Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum macronema* Sendtn. = **Solanum paniculatum** L.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum macropus* Dunal = **Solanum bullatum** Vell.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum maglia* Molina, nom. nud. = **Solanum maglia** Schltld.

Referencias: Hawkes, J. G., 1990.

**Solanum maglia** Schltld.

Sin.: *Solanum collinum* Dunal, *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Hook. f., p.p., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* J. Remy, hom. illeg., *Solanum commersonii* Dunal ex Poir. var. *glabriusculum* Walp., p.p., *Solanum maglia* Molina, nom. nud., *Solanum maglia* Schltld. var. *brevifrons* Bitter, *Solanum maglia* Schltld. var. *collinum* (Dunal) Bitter, *Solanum maglia* Schltld. var. *witasekianum* Bitter, *Solanum tuberosum* L. var. *maglia* (Schltld.) A. DC.

Referencias: Brücher, E. H., 1997[1996]; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.

Países: ARG(MEN); CHL(IV, V).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 10470* (LIL, MERL)]; CHL[*Poeppig, E. F. 72* (BM, G, P, W)].

*Solanum maglia* Schltld. var. *brevifrons* Bitter = **Solanum maglia** Schltld.

Referencias: Correll, D. S., 1962.

*Solanum maglia* Schltld. var. *chubutense* Bitter

= **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum maglia* Schltld. var. *collinum* (Dunal) Bitter

= **Solanum maglia** Schltld.

Referencias: Brücher, E. H., 1966a; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum maglia* Schltld. var. *guaytecarum* Bitter

= **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum maglia* Schltld. var. *witasekianum* Bitter

= **Solanum maglia** Schltld.

Referencias: Brücher, E. H., 1966a; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum maglia* Schltld. subsp. *meridionale* Bitter

= **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990.

*Solanum maioranthum* L.B. Sm. & Downs = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum malacoxylon* Sendtn. = **Solanum**

**glaucophyllum** Desf.

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *albo-marginatum*

(Chodat) Hassl. = **Solanum glaucophyllum** Desf.

Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum malacoxylon* Sendtn. f. *vulgare* Hassl.

= **Solanum glaucophyllum** Desf.

Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *albo-marginatum*

Chodat = **Solanum glaucophyllum** Desf.

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum malacoxylon* Sendtn. var. *angustissimum* Kuntze

= **Solanum glaucophyllum** Desf.

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum malacoxyton* Sendtn. var. *genuinum* Hassl.,  
nom. inval. = **Solanum glaucophyllum** Desf.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum malacoxyton* Sendtn. var. *latifolium* Kuntze  
= **Solanum glaucophyllum** Desf.  
Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum malacoxyton* Sendtn. var. *subvirescens* Hassl.  
= **Solanum glaucophyllum** Desf.  
Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum malmeanum* Bitter = **Solanum commersonii**  
Dunal ex Poir. subsp. **malmeanum** (Bitter) Hawkes  
& Hjert.  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. = **Solanum**  
**albidum** Dunal  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var.  
*dryophyllum* Bitter = **Solanum albidum** Dunal  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. var.  
*tardecavescens* Bitter = **Solanum albidum** Dunal  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum mandonis* Van Heurck & Müll. Arg. subsp.  
*carabayense* Bitter = **Solanum albidum** Dunal  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum manoelii* Moric. = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum maracayuense* Bitter = **Solanum nigrescens**  
M. Martens & Galeotti  
Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

**Solanum marginatum** L. f.  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.  
Arbusto. Introducida. 0–100 m.  
Países: CHL(V, VII, VIII, IJF).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9190*  
(CONC, M)].

*Solanum maritimum* Meyen ex Nees = **Solanum**  
**pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum masafueranum* Bitter & Skottsb. = **Solanum**  
**interandinum** Bitter

**Solanum matadori** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Bohs, L., 2001; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L.,  
2004; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto. Endémica. 800–1200 m.  
Países: BRA(SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7254* (HBR, NY,  
US)].

**Solanum maturecalvans** Bitter  
Sin.: *Solanum kieslingii* Cabrera  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Knapp, S., 2002.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 1100–1800 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1525* (SI)].

**Solanum mauritianum** Scop.  
Sin.: *Solanum auriculatum* Aiton, *Solanum tabacifolium*  
Vell., *Solanum verbascifolium* L. var. *auriculatum*  
(Aiton) Kuntze  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton,  
C. V., 1976; Nee, M., 1991a, 1999; Roe, K. E., 1972;  
Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.  
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON,  
PAY, RIV, ROC, SAO, TAC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Parker s.n.* (GH)];  
BRA[*Rambo, B. 31108* (PACA)]; URY[*Osten, C.*  
*22426* (GH)].

*Solanum mechonguense* Bukasov = **Solanum**  
**commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &  
Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

**Solanum medians** Bitter  
Sin.: *Solanum tacnaense* Ochoa  
Hierba. Perenne. Nativa. 3100–3300 m.  
Países: CHL(I).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 133a* (MA)].

*Solanum megalocarpon* C.V. Morton = **Solanum**  
**caavurana** Vell.  
Referencias: Knapp, S., 2002; Nee, M., 1999.

**Solanum megalochiton** Mart.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M.,  
1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 27462* (NY)];  
BRA[*Reitz, P. R. 3547* (B, G, HBR, K, M, NY, Z)].

**Solanum megistacrolobum** Bitter  
Sin.: *Solanum alticola* Bitter, *Solanum alticola* Bitter var.  
*xanthotrichum* Hawkes, *Solanum megistacrolobum*  
Bitter subsp. *toralapanum* (Cárdenas & Hawkes)  
R.B. Giannattasio & D.M. Spooner, *Solanum*  
*megistacrolobum* Bitter var. *toralapanum* (Cárdenas &  
Hawkes) Ochoa, *Solanum tilcarensis* Hawkes, *Solanum*  
*toralapanum* Cárdenas & Hawkes  
Referencias: Brücher, E. H., 1997[1996]; Cabrera, A. L.,  
1983d; Giannattasio, R. B. & Spooner, D. M., 1994a, b;  
Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Morton, C. V.,  
1976.  
Hierba. Perenne. Nativa. 2600–4300 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 354*  
(CORD)].

*Solanum megistacrolobum* Bitter var. *toralapanum*

(Cárdenas & Hawkes) Ochoa = **Solanum megistacrolobum** Bitter

Referencias: Giannatasio, R. B. & Spooner, D. M., 1994a, b.

*Solanum megistacrolobum* Bitter subsp. *toralapanum*

(Cárdenas & Hawkes) R.B. Giannatasio & D.M. Spooner = **Solanum megistacrolobum** Bitter

Referencias: Giannatasio, R. B. & Spooner, D. M., 1994a, b.

*Solanum meizonanthum* Bitter = **Solanum tweedianum**

Hook.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979.

*Solanum melanoxyloides* Sendtn. = **Solanum**

**glaucophyllum** Desf.

Referencias: Bohs, L., 2001.

**Solanum melissarum** Bohs

Sin.: *Cyphomandra divaricata* (Mart.) Sendtn., *Cyphomandra divaricata* (Mart.) Sendtn. var. *herbacea* Sendtn.

Referencias: Bohs, L., 1994a; Nee, M., 1999.

Árbol. Nativa. 0–800 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20903* (C, CTES)].

*Solanum meloncillo* Parodi = **Solanum juvenale** Thell.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Matesevach, M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum mendocinum* Phil. = **Solanum triflorum** Nutt.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Hunziker, A. T., 1989.

*Solanum mendozianum* Bukasov, nom. nud. = **Solanum**

**kurtzianum** Bitter & Wittm.

Referencias: Hawkes, J. G., 1990.

*Solanum mercedense* Bukasov = **Solanum commersonii**

Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

**Solanum metarsium** C.V. Morton

Sin.: *Solanum pulchellum* Phil., hom. illeg.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3700 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(II).

Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 432* (CORD)]; CHL[*Matthei, O. R. 214* (CONC, SGO)].

*Solanum micans* Witasek = **Solanum affine** Sendtn.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

*Solanum micrantherum* Cabrera = **Solanum annum**

C.V. Morton

Referencias: Barboza, G. E., 2004.

**Solanum microdontum** Bitter

Sin.: *Solanum bijugum* Bitter, *Solanum cevallos-tovarii*

Cárdenas, *Solanum gigantophyllum* Bitter, *Solanum*

*higueranum* Cárdenas, *Solanum microdontum* Bitter

subsp. *gigantophyllum* (Bitter) Hawkes & Hjert.,

*Solanum microdontum* Bitter var. *gigantophyllum*

(Bitter) Ochoa, *Solanum microdontum* Bitter var.

*metriophyllum* (Bitter) Ochoa, *Solanum simplicifolium*

Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter subsp.

*gigantophyllum* (Bitter) Bitter, *Solanum simplicifolium*

Bitter subsp. *microdontum* (Bitter) Hawkes, nom. inval.,

*Solanum simplicifolium* Bitter var. *gigantophyllum*

(Bitter) Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var.

*metriophyllum* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var.

*mollifrons* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter var.

*trimerophyllum* Bitter, *Solanum simplicifolium* Bitter

var. *variabile* Brücher & H. Ross, *Solanum tafiensis*

Lillo ex Hawkes & Hjert., nom. nud.

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;

van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3200 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Tolaba, J. A. 2875* (CORD,

MCNS)].

*Solanum microdontum* Bitter var. *gigantophyllum* (Bitter)

Ochoa = **Solanum microdontum** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;

van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum microdontum* Bitter var. *metriophyllum* (Bitter)

Ochoa = **Solanum microdontum** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;

van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum microdontum* Bitter subsp. *gigantophyllum*

(Bitter) Hawkes & Hjert. = **Solanum microdontum** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;

van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum microphyllum* Hawkes, hom. illeg. = **Solanum**

**infundibuliforme** Phil.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G. &

Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990;

Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum microrbitum* L.B. Sm. & Downs = **Solanum**

**campaniforme** Roem. & Schult.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum millanii* Bukasov & Lechn. = **Solanum**

**commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **malmeanum** (Bitter) Hawkes & Hjert.

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &

Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum molinae* Juz. = **Solanum tuberosum** L. subsp.

**tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;

Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum montanum* auct. non Ruiz & Pav. = **Solanum hieronymi** Kuntze  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Matesevach, A. M., 2002.

**Solanum montanum** L.  
Sin.: *Solanum crassipes* Phil., *Solanum phyllanthum* Cav.,  
*Solanum phyllanthum* Cav. var. *crassipes* (Phil.)  
Witasek ex Reiche  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; PBI  
Solanum project, 2006.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Países: CHL(I, II, III, IV).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

[*Solanum montevidense* Spreng.]  
Notas: Nombre dudoso.

**Solanum montigenum** (C.V. Morton) Cabrera  
Sin.: *Solanum lorentzii* Bitter var. *montigenum* C.V. Morton  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.  
Arbusto. Endémica. 500–3500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4760* (SI)].

**Solanum mortonii** Hunz.  
Referencias: Hunziker, A. T., 1979a; Matesevach, M., 2002;  
Nee, M., 1999.  
Arbusto. Endémica. 700–900 m.  
Países: ARG(CAT).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 633*  
(CORD)].

*Solanum muelleri* Bitter = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,  
C. M., 1990.

*Solanum muelleri* Bitter f. *densipilosum* Correll  
= **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa,  
C. M., 1990.

**Solanum multispinum** N.E. Br.  
Sin.: *Solanum aridum* Morong var. *pusillum* Hassl., *Solanum multispinum* N.E. Br. var. *grandiflorum* Hassl.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Degen, R. & Mereles, F.,  
1996; Matesevach, M., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee,  
M., 1999.  
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(COS, FOR, SFE); PRY(APY, PHA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 511* (CORD,  
CTES, SI)]; PRY[*Mereles, F. 4719* (CTES, FCQ, MO)].

*Solanum multispinum* N.E. Br. var. *grandiflorum* Hassl.  
= **Solanum multispinum** N.E. Br.  
Referencias: Matesevach, M., 2002.

*Solanum muricatum* Bertero ex Dunal, nom. nud.  
= **Solanum furcatum** Dunal

*Solanum muticum* N.E. Br. = **Lycianthes rantonnei**  
(Carrière) Bitter  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum myriadenium* Bitter = **Solanum fragile** Wedd.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Edmonds, J. M., 1972.

[*Solanum narcoticum* Bitter]  
Referencias: Bohs, L., 2001.  
Notas: Nombre dudoso.

**Solanum neorossii** Hawkes & Hjert.  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1983;  
Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E.,  
2005; Nee, M., 1999.  
Hierba. Endémica. 2500–3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Hawkes, J. G. 3878* (K),  
*Sleumer, H. O. 3747* (LIL)].

*Solanum nicandricalyx* Cabrera = **Solanum gilioides**  
Rusby  
Referencias: Barboza, G. E., 2004.

**Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti  
Sin.: *Solanum basilobum* Bitter, *Solanum crenato-dentatum*  
Dunal, p.p., *Solanum deltaicum* Cabrera, *Solanum maioranthum* L.B. Sm. & Downs, *Solanum maracayuense* Bitter, *Solanum nigrum* L.  
f. *brevipetiolare* (Chodat) Chodat, *Solanum nigrum* L.  
f. *floribundum* Hassl., *Solanum nigrum* L.  
f. *longepedunculatum* Hassl., *Solanum nigrum* L.  
f. *longepetiolatum* Hassl., *Solanum nigrum* L. subsp.  
*chacoense* Hassl., *Solanum nigrum* L. var.  
*brevipetiolare* (Chodat) Hassl., *Solanum nigrum* L. var.  
*genuinum* Hassl., nom. inval., *Solanum nigrum* L. var.  
*pilcomayense* (Morong) Chodat, *Solanum nigrum* L.  
var. *subhastatum* Hassl., *Solanum pilcomayense*  
Morong, *Solanum pilcomayense* Morong var.  
*brevipetiolare* Chodat, *Solanum pilcomayense* Morong  
var. *vicinum* C.V. Morton, *Solanum pulchrilobum*  
Bitter, *Solanum pulchrilobum* Bitter var.  
*longepetiolatum* (Hassl.) Parodi, *Solanum pulchrilobum*  
Bitter var. *paucilobum* Bitter, *Solanum rojasii* Chodat,  
*Solanum syringoideum* Bitter, *Solanum syringoideum*  
Bitter subsp. *pilcomayense* (Morong) Hassl., *Solanum syringoideum* Bitter var. *pyncnostichanthum* Bitter  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Edmonds, J. M., 1972;  
Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.  
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 400–1500 m.  
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE,  
TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAN, CEN,  
CON, COA, PHA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 22192*  
(CTES, ICN)]; BRA[*Hatschbach, G. 10036* (MBM)];  
PRY[*Morong, T. 898* (US)].

**Solanum nigrum** L.  
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena,  
C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M.,  
2001[2000]; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.  
Hierba. Anual. Introducida. 0–3600 m.  
Países: CHL(V, VII).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 994923*  
(CONC, SGO)].

- Solanum nigrum* L. f. *brevipetiolare* (Chodat) Chodat  
= **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- Solanum nigrum* L. f. *floribundum* Hassl. = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- Solanum nigrum* L. f. *longepedunculatum* Hassl.  
= **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- Solanum nigrum* L. f. *longepetiolatum* Hassl. = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- Solanum nigrum* L. var. *aguaraquiya* (Sendtn.) Reiche,  
p.p. = **Solanum chenopodioides** Lam.
- Solanum nigrum* L. var. *americanum* (Mill.) O.E. Schulz  
= **Solanum americanum** Mill.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum nigrum* L. var. *brevipetiolare* (Chodat) Hassl.  
= **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- Solanum nigrum* L. var. *frutescens* auct. non A. Br.  
= **Solanum chenopodioides** Lam.
- Solanum nigrum* L. var. *genuinum* Hassl., nom. inval.  
= **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- [*Solanum nigrum* L. var. *humile* (Bernh.) Boiss.]  
Sin.: *Solanum humile* Bernh.  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.
- [*Solanum nigrum* L. var. *miniaturum* Bernh.]  
Notas: Nombre dudoso.
- Solanum nigrum* L. var. *pilcomayense* (Morong) Chodat  
= **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- [*Solanum nigrum* L. var. *stylosum* Witasek ex Reiche]  
Notas: Nombre dudoso.
- Solanum nigrum* L. var. *subhastatum* Hassl. = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- Solanum nigrum* L. var. *virginicum* L. = **Solanum americanum** Mill.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum nigrum* L. subsp. *chacoense* Hassl. = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- Solanum nitidibaccatum* Bitter = **Solanum physalifolium**  
Rusby var. **nitidibaccatum** (Bitter) Edmonds  
Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997;  
Edmonds, J. M., 1977, 1986.
- Solanum nitidum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Knapp, S., 1989.  
Arbusto. Nativa. 3000–3500 m.  
Países: CHL(I).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 345* (CONC)].
- Solanum nitidum* auct. non Ruiz & Pav. = **Solanum argentinum** Bitter & Lillo  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum nodiflorum* Jacq. = **Solanum americanum** Mill.  
Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.
- Solanum nodiflorum* Jacq. var. *acuminatum* Chodat  
= **Solanum americanum** Mill.  
Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.
- Solanum nodiflorum* Jacq. var. *micropyllum* Hassl.  
= **Solanum americanum** Mill.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum nodiflorum* Jacq. var. *sapucayense* Chodat  
= **Solanum americanum** Mill.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum novemlobum* Dunal = **Solanum pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI *Solanum* project, 2006.
- Solanum novemlobum* Dunal var. *pauciflorum* Dunal  
= **Solanum pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI *Solanum* project, 2006.
- Solanum nudum* Dunal var. *pseudoindigoferum* Hassl.  
= **Solanum symmetricum** Rusby  
Referencias: Knapp, S., 2002.
- Solanum oblongum* auct. non Ruiz & Pav. = **Solanum trichoneuron** Lillo  
Referencias: Knapp, S., 2002.
- Solanum oceanicum* Brücher = **Solanum tuberosum** L.  
subsp. **tuberosum**  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &  
Barboza, G. E., 2005.
- Solanum ocellatum* Phil. = **Solanum bridgesii** Phil. var.  
**ocellatum** (Phil.) Witasek ex Reiche
- Solanum ochoanum* Lechn. = **Solanum tuberosum** L.  
subsp. **tuberosum**  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &  
Barboza, G. E., 2005.
- Solanum ochrandrum* Dunal = **Solanum sanctae-catharinae** Dunal  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum odoriferum** Vell.  
Sin.: *Solanum pachyantherum* Witasek  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton,  
C. V., 1976; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–900 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1975b* (NY)];  
BRA[*Krapovickas, A. 43753* (CTES)].

*Solanum ohrondii* Carrière = **Solanum commersonii**Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

[*Solanum okadae* Hawkes & Hjert.]

Referencias: Clausen, A. M. &amp; Ispizúa, V. N., 2005.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Solanum oleraceum* Dunal = **Solanum americanum**

Mill.

Referencias: Edmonds, J. M. &amp; Chweya, J. A., 1997; Morton, C. V., 1976.

*Solanum oleraceum* Vell., hom. illeg. = **Solanum alternato-pinnatum** Steud.

Referencias: Matesevach, M., 2002; Nee, M., 1999; Schinini, A. &amp; López, M. G., 1997.

[*Solanum olympicum* Hassl.]

Notas: Nombre dudoso.

**Solanum oplocense** HawkesSin.: *Solanum subandigenum* Hawkes var. *camarguense* Cárdenas

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G. &amp; Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.

Países: ARG(JUJ).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 1401 (CORD), Correll, D. S. 666 (K)].

*Solanum oranense* Bitter = **Solanum caesium** Griseb.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.

*Solanum ottonis* Hyl. = **Solanum chenopodioides** Lam.

Referencias: Del Vitto, L. A. &amp; Petenatti, E. M., 1999a; Edmonds, J. M. &amp; Chweya, J. A., 1997.

**Solanum pabstii** L.B. Sm. & Downs

Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A., 2004; Smith, L. B. &amp; Downs, R. J., 1966.

Arbolito o árbol. Endémica. 200–1200 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Pabst, G. F. J. 6200 (B, US)].

*Solanum pachyantherum* Bitter, hom. illeg. = **Solanum huayavillense** Del Vitto & Petenatti

Referencias: Del Vitto, L. A. &amp; Petenatti, E. M., 1995.

*Solanum pachyantherum* Witasek = **Solanum odoriferum** Vell.

Referencias: Del Vitto, L. A. &amp; Petenatti, E. M., 1995; Morton, C. V., 1976.

**Solanum palinacanthum** DunalSin.: *Solanum claviceps* Griseb., *Solanum palinacanthum* Dunal f. *velutinum* Chodat, *Solanum palinacanthum* Dunal var. *acutilobum* Dunal, *Solanum vexans* S. Moore

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Pensiero, J. F. &amp; Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B. &amp; Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Nativa. 0–2500 m.

Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 4077 (CORD, SI)]; BRA[Reitz, P. R. 16506 (HBR, US)]; PRY[Schinini, A. 27421 (CTES)].

*Solanum palinacanthum* Dunal f. *velutinum* Chodat = **Solanum palinacanthum** Dunal

Referencias: Matesevach, M., 2002.

*Solanum palinacanthum* Dunal var. *acutilobum* Dunal = **Solanum palinacanthum** Dunal

Referencias: Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004.

**Solanum palitans** C.V. Morton

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Nativa. 500–3000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Negritto, M. A. 290 (CORD, CTES, SI)].

**Solanum palustre** Schltld.Sin.: *Solanum brevidens* Phil., *Solanum brevidens* Phil. var. *glabrescens* (Dunal) Hawkes, *Solanum bridgesii* A. DC., hom. illeg., *Solanum caldasii* Dunal var. *glabrescens* Dunal, *Solanum palustre* Schltld. var. *glabrescens* Walp., *Solanum pearcei* Phil., *Solanum tuberosum* L. var. *brevidens* (Phil.) Reiche, *Solanum tuberosum* L. var. *pearcei* (Phil.) Reiche

Referencias: Brücher, E. H., 1966a; Contreras-M., A. &amp; Spooner, D. M., 1999; Del Vitto, L. A. &amp; Petenatti, E. M., 1999a; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 100–1200 m.

Países: ARG(NEU, RNE); CHL(V, VI, VIII, IX, X).

Ejemplares de referencia: ARG[Rossov, R. A. 2040 (BAB)]; CHL[Fonk, F. s.n. (SGO, W)].

*Solanum palustre* Schltld. var. *glabrescens* Walp.= **Solanum palustre** Schltld.

Referencias: Contreras-M., A. &amp; Spooner, D. M., 1999.

**Solanum paniculatum** L.Sin.: *Solanum chloroleucum* Dunal, *Solanum jubeba* Vell., *Solanum macronema* Sendtn., *Solanum manoelii* Moric., *Solanum paniculatum* L. f. *canescens* Hassl., *Solanum paniculatum* L. f. *flavescens* Hassl., *Solanum paniculatum* L. f. *repandum* Hassl., *Solanum paniculatum* L. subsp. *pseudoauriculatum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum paniculatum* L. var. *ellipticum* Chodat, *Solanum paniculatum* L. var. *integrifolium* Dunal, *Solanum pseudoauriculatum* Chodat & Hassl.

- Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Schinini, A. & López, M. G., 2001; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, ITA, MIE, SPE).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 23861* (CTES, G, LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 41580* (CTES, MBM)]; PRY[*Marin, G. 626* (CTES, MO, PY)].
- Solanum paniculatum* L. f. *canescens* Hassl. = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Schinini, A. & López, M. G., 2001.
- Solanum paniculatum* L. f. *flavescens* Hassl. = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Schinini, A. & López, M. G., 2001.
- Solanum paniculatum* L. f. *repandum* Hassl. = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Schinini, A. & López, M. G., 2001.
- Solanum paniculatum* L. var. *chulumani* Dunal = **Solanum albidum** Dunal  
Referencias: Matesevach, M., 2002.
- Solanum paniculatum* L. var. *ellipticum* Chodat = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Schinini, A. & López, M. G., 2001.
- Solanum paniculatum* L. var. *integrifolium* Dunal = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Schinini, A. & López, M. G., 2001.
- Solanum paniculatum* L. subsp. *pseudoauriculatum* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Schinini, A. & López, M. G., 2001.
- Solanum pannosum** Phil.  
Sin.: *Solanum congestiflorum* Dunal var. *pannosum* (Phil.) Reiche  
Referencias: Muñoz-Pizarro, C., 1960.  
Arbusto. Endémica.  
Países: CHL(VII).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Vidal, M. s.n.* (SGO, W)].
- Solanum paposanum** Phil.  
Sin.: *Solanum aberrans* Phil., *Solanum crassipes* Phil. var. *aberrans* (Phil.) Bitter, *Solanum phyllanthum* Cav. var. *aberrans* (Phil.) Witasek ex Reiche  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; PBI *Solanum* project, 2006.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Países: CHL(IV).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, W)].
- [*Solanum paraguariense* Dunal]  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.  
Notas: Nombre dudoso.
- Solanum paraguariense* Chodat, hom. illeg. = **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.  
Referencias: Chiarini, F. & Barboza, G. E., 2007.
- Solanum paranense** Dusén  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–1800 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hertel, R. 6594* (CORD)].
- Solanum paraneurotrichum* Bitter, nom. nud. = **Solanum aligerum** Schltdl.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum parodii* Juz. & Bukasov = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.
- Solanum patagonicum* C.V. Morton = **Solanum physalifolium** Rusby var. **nitidibaccatum** (Bitter) Edmonds
- Solanum pauciflorum* Vahl = **Lycianthes pauciflora** (Vahl) Bitter  
Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997.
- Solanum pavimenti** L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Gutiérrez, A., Barboza, G. E. & Mentz, L. A., 2006.  
Arbusto. Endémica. 900 m.  
Países: BRA(SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Barboza, G. E. 910* (CORD)].
- Solanum pearcei* Phil. = **Solanum palustre** Schltdl.  
Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.
- Solanum pedersenii** Cabrera  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(COS, ERI).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Morello, J. 422* (SI)].
- Solanum pelagicum** Bohs  
Sin.: *Cyphomandra cornigera* Dunal, *Cyphomandra maritima* L.B. Sm. & Downs, *Pionandra cornigera* (Dunal) Miers  
Referencias: Bohs, L., 2001.  
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–300 m.  
Países: BRA(SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40366* (CTES, NY, Z)].
- Solanum pennellii** Correll var. **elachistus** Martic. & Quezada  
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1991.  
Arbusto. Endémica. 1500 m.  
Países: CHL(I).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Hoffmann, A. E. 8913* (CONC)].

**Solanum pentlandii** Dunal

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Países: CHL(I).

Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (K)].*Solanum pentlandii* Dunal subsp. *interandinum* (Bitter)Edmonds = **Solanum interandinum** Bitter

Referencias: Edmonds, J. M., 1977.

*Solanum persicifolium* Mart., hom. illeg. = **Solanum amygdalifolium** Steud.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.

**Solanum peruvianum** L.Sin.: *Lycopersicon peruvianum* (L.) Mill.

Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Peralta, I. E. &amp; Spooner, D. M., 2005.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.

Países: CHL(I).

Ejemplares de referencia: CHL[*Rick, C. M. 7502* (LL)].*Solanum phyllanthum* Cav. = **Solanum montanum** L.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum phyllanthum* Cav. var. *aberrans* (Phil.) Witasek ex Reiche = **Solanum pposanum** Phil.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum phyllanthum* Cav. var. *crassipes* (Phil.) Witasek ex Reiche = **Solanum montanum** L.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

**Solanum physalidicalyx** BitterSin.: *Solanum physalidicalyx* Bitter var. *integrescens* Bitter, *Solanum physalidicalyx* Bitter var. *plurilobulatum* Bitter

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1991b; Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.

Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC); PRY(APY).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 25232* (CORD)]; PRY[*Vanni, R. O. 2100* (CTES)].*Solanum physalidicalyx* Bitter var. *integrescens* Bitter = **Solanum physalidicalyx** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

*Solanum physalidicalyx* Bitter var. *plurilobulatum* Bitter = **Solanum physalidicalyx** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

**Solanum physalifolium** Rusby var. *nitidibaccatum* (Bitter) EdmondsSin.: *Solanum nitidibaccatum* Bitter, *Solanum patagonicum* C.V. Morton

Referencias: Del Vitto, L. A. &amp; Petenatti, E. M., 1991b; Edmonds, J. M. &amp; Chweya, J. A., 1997; Edmonds, J. M., 1986; Morton, C. V., 1976.

Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU); CHL(XII).

Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6018* (SI, UNSL)]; CHL[*Donat, A. 415* (BA, BAF, SI)].**Solanum physalifolium** Rusby var. **physalifolium**

Referencias: Edmonds, J. M., 1986.

Hierba. Anual. Nativa. 1000–1500 m.

Países: ARG(SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hawkes, J. G. 3644* (OXF)].*Solanum pilcomayense* Morong = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti*Solanum pilcomayense* Morong var. *brevipetiolare*Chodat = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti*Solanum pilcomayense* Morong var. *vicinum* C.V. Morton = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti**Solanum piluliferum** DunalSin.: *Solanum densiflorum* Sendtn., hom. illeg.

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9859* (MBM)].**Solanum pimpinellifolium** L.Sin.: *Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill., *Lycopersicon pissisi* Phil., *Solanum pissisi* (Phil.) Reiche

Referencias: Marticorena, C., com. pers.; PBI Solanum project, 2006; Peralta, I. E. &amp; Spooner, D. M., 2005.

Arbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: CHL(III).

Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 7690* (G)].**Solanum pinetorum** (L.B. Sm. & Downs) BohsSin.: *Cyphomandra angustifolia* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra hispida* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra pinetorum* L.B. Sm. & Downs

Referencias: Bohs, L., 1994a; Nee, M., 1999.

Arbusto o arbolito. Nativa. 700–2100 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2363* (CORD)].*Solanum pinnatifidum* Cárdenas, hom. illeg. = **Solanum infundibuliforme** Phil.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005.

**Solanum pinnatum** Cav.Sin.: *Solanum albiflorum* Phil., *Solanum alphonsi* Dunal var. *alphonsi*, *Solanum alphonsi* Dunal var. *tagua-tagua* Dunal, *Solanum cavanillesii* Dunal var. *subintegrifolium* Dunal, *Solanum cavanillesii* Dunal, hom. illeg., *Solanum feullei* Dunal, *Solanum gaudichaudiana* (J. Remy) Phil., *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *viride* Dunal, *Solanum maritimum* Meyen ex Nees, *Solanum*

- novemlobum* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal var. *pauciflorum* Dunal, *Solanum pinnatum* Cav. var. *subintegrifolium* (Dunal) Reiche, nom. inval., *Solanum pinnatum* Cav. var. *tomentosum* Reiche, *Solanum runcinatum* Ruiz & Pav., *Solanum septemlobum* Phil., hom. illeg., *Witheringia gaudichaudiana* J. Remy, *Witheringia pinnata* (Cav.) J. Remy  
Referencias: Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Nee, M., 1999; PBI Solanum project, 2006.  
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 100–800 m.  
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VII, RME).  
Ejemplares de referencia: CHL[Lammers, T. G. 7907 (CONC)].
- Solanum pinnatum* Cav. var. *subintegrifolium* (Dunal) Reiche, nom. inval. = **Solanum pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.
- Solanum pinnatum* Cav. var. *tomentosum* Reiche = **Solanum pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.
- Solanum pissisi* (Phil.) Reiche = **Solanum pimpinellifolium** L.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.
- Solanum platense** Dieckman  
Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1991b.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.  
Países: ARG(BAI, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); URY(MAL, RIV, ROC, TYT).  
Ejemplares de referencia: ARG[Hauman, L. L. s.n. (SI)]; BRA[Rambo, B. 39565 (PACA, PEL)]; URY[Arrillaga de Maffei, B. R. 2312 (US)].
- Solanum platycypellon** S. Knapp  
Referencias: Knapp, S., 1992, 2002.  
Arbusto. Nativa. 1600–1700 m.  
Países: ARG(SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[Lorentz, P. G. 255 (NY)].
- Solanum platypterum* Hawkes = **Solanum infundibuliforme** Phil.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.
- Solanum pocote* Hieron. ex Millán = **Solanum hieronymi** Kuntze  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, A. M., 2002.
- Solanum poeppigianum* Dunal, nom. nud. = **Solanum cyrtopodium** Dunal
- Solanum polyphyllum** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Países: CHL(I).  
Ejemplares de referencia: CHL[Rahmer, C. s.n. (SGO)].
- Solanum polystrichostylum* Bitter var. *lorentzii* (Bitter) Edmonds = **Solanum aloysiifolium** Dunal  
Referencias: Edmonds, J. M., 1977.
- Solanum premaglia* L. Planch., nom. nud. = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990.
- Solanum premnifolium** (Miers) Bohs  
Sin.: *Cyphomandra premnifolia* (Miers) Dunal, *Pionandra premnifolia* Miers  
Referencias: Bohs, L., 1994a; Nee, M., 1999.  
Arbusto. Nativa. 0–700 m.  
Países: BRA(PAR).  
Ejemplares de referencia: BRA[Dusén, P. K. H. 2923 (F, GH, NY, S)].
- Solanum profusum** C.V. Morton  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976.  
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.  
Países: ARG(JUJ).  
Ejemplares de referencia: ARG[Balls, E. K. 5915 (US)].
- Solanum pseudoauriculatum* Chodat & Hassl. = **Solanum paniculatum** L.  
Referencias: Schinini, A. & López, M. G., 2001.
- Solanum pseudocapsicum** L.  
Sin.: *Solanum capsicastrum* Link ex Schauer, *Solanum capsicastrum* Link ex Schauer var. *caaguazuense* Chodat, *Solanum diflorum* Vell., *Solanum diflorum* Vell. var. *angustifolium* Kuntze, *Solanum diflorum* Vell. var. *pulverulentum* Chodat, *Solanum ipecacuanha* Chodat, *Solanum ipecacuanha* Chodat var. *calvescens* Chodat, *Solanum ipecacuanha* Chodat var. *obovata* Chodat, *Solanum pseudocapsicum* L. f. *calvescens* (Chodat) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosulum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosum* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. subsp. *diflorum* (Vell.) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *ambiguum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *hygrophilum* (Schltdl.) Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *normale* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. var. *parvifolium* Kuntze, *Solanum pseudocapsicum* L. var. *sendtnerianum* Hassl., *Solanum pseudocapsicum* L. var. *typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum tucumanense* Griseb.  
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1991b; Cabrera, A. L., 1983d; Gutiérrez, A., Barboza, G. E. & Mentz, L. A., 2006; Knapp, S., 2002; Morton, C. V., 1976.  
Subarbusto. Nativa. 0–1700 m.  
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, IV, VIII, IJF, RME); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, ÑEE, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).  
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 7871 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 9663 (US)]; CHL[Plowman, T. C. 2668 (GH, US)]; PRY[Hassler, E. 12381 (K, MO, NY, US)]; URY[Del Puerto, O. 5781 (F)].

*Solanum pseudocapsicum* L. f. *calvescens* (Chodat)  
Hassl. = **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosulum* Hassl.  
= **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum pseudocapsicum* L. f. *pilosum* Kuntze  
= **Solanum pseudocapsicum** L.

*Solanum pseudocapsicum* L. var. *ambiguum* Hassl.  
= **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum pseudocapsicum* L. var. *hygrophilum* (Schltdl.)  
Hassl. = **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum pseudocapsicum* L. var. *normale* Kuntze  
= **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum pseudocapsicum* L. var. *parvifolium* Kuntze  
= **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum pseudocapsicum* L. var. *sendtnerianum* Hassl.  
= **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum pseudocapsicum* L. var. *typicum* Hassl., nom.  
inval. = **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum pseudocapsicum* L. subsp. *diflorum* (Vell.)  
Hassl. = **Solanum pseudocapsicum** L.  
Referencias: Knapp, S., 2002.

**Solanum pseudodaphnopsis** L.A. Mentz & Stehmann  
Referencias: Mentz, L. A. & Stehmann, J. R., 2003.  
Arbusto. Endémica. 0–100 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, A. 382* (B,  
MBM, PACA, W)].

*Solanum pseudolycoioides* Chodat & Hassl., hom. illeg.  
= **Lycianthes pauciflora** (Vahl) Bitter  
Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997.

*Solanum pseudolycoioides* Rusby = **Lycianthes lycioides**  
(L.) Hassl.  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

**Solanum pseudoquina** A. St.-Hil.  
Sin.: *Cyphomandra flagrans* (Ten.) Walp., *Pionandra*  
*flagrans* (Ten.) Miers, *Solanum flagrans* Ten., *Solanum*  
*inaequale* Vell., *Solanum ramosissimum* Dunal,  
*Solanum undatifolium* Dunal  
Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L.,  
2004; Nee, M., 1999.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA);  
PRY(APA, CAN, COA, SPE).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14687* (SI, US)];  
BRA[*Hatschbach, G. 18184* (BH, MO, NY, US)];  
PRY[*Hassler, E. 5096* (G, K, MO, NY)].

*Solanum pseudostipulatum* (Hassl.) Bukasov = **Solanum**  
**commersonii** Dunal ex Poir. subsp. **malmeanum**  
(Bitter) Hawkes & Hjert.  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &  
Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum pterocaulon* Dunal var. *aguaraquiya* (Piso ex  
Sendtn.) Dunal = **Solanum chenopodioides** Lam.  
Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.

*Solanum pteropodum* auct. non Humb. & Bonpl. ex  
Dunal = **Solanum delitescens** C.V. Morton

*Solanum puberulofructum* Correll = **Solanum spegazzinii**  
Bitter

*Solanum puberulum* Phil. = **Solanum cyrtopodium**  
Dunal  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

[*Solanum pugae* Phil.]  
Notas: Nombre dudoso.

*Solanum pulchellum* Phil., hom. illeg. = **Solanum**  
**metarsium** C.V. Morton  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b.

*Solanum pulchrilobum* Bitter = **Solanum nigrescens**  
M. Martens & Galeotti

*Solanum pulchrilobum* Bitter var. *longepetiolatum*  
(Hassl.) Parodi = **Solanum nigrescens** M. Martens &  
Galeotti

*Solanum pulchrilobum* Bitter var. *paucilobum* Bitter  
= **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti

*Solanum pulchrum* Dunal = **Solanum sessile** Ruiz & Pav.  
Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum pulverulentum* auct. non Pers. = **Solanum**  
**glaucophyllum** Desf.

*Solanum pulverulentum* Pers., hom. illeg. = **Solanum**  
**cutervannum** Zahlbr.

[*Solanum pumilum* Rojas Acosta]  
Notas: Nombre dudoso.

**Solanum pygmaeum** Cav. var. **hastatum** Bontea ex  
Aellen  
Referencias: Cabrera, A. L., 1965b.  
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.  
Países: ARG(BAI).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

**Solanum pygmaeum** Cav. var. **pygmaeum**

Referencias: Cabrera, A. L., 1965b, 1979; Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN, NEU, SDE, SFE, SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[Burkart, A. 22721 (LP, SI)].

**Solanum pygmaeum** Cav. var. **suspensum** C.V. Morton

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(COR, SFE).

Ejemplares de referencia: ARG[Stuckert, T. J. V. 4713 (CORD, G)].

**Solanum pyrethrifolium** Griseb. = **Solanum triflorum**

Nutt.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Hunziker, A. T., 1989.

**Solanum pyrrocarpum** Phil. = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

**Solanum quadripartitum** auct. non Dunal = **Solanum angustifidum** Bitter

Referencias: Morton, C. V., 1976.

**Solanum radicans** L. f.

Sin.: *Solanum ruderalis* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia ruderalis* J. Remy

Referencias: Nee, M., 1999.

Subarbusto. Nativa. 500–2800 m.

Países: CHL(I, III, IV, VI).

Ejemplares de referencia: CHL[Matthei, O. R. 400 (CONC)].

**Solanum ramosissimum** Dunal = **Solanum pseudoquina**

A. St.-Hil.

Referencias: Knapp, S., 2002.

**Solanum ramulosum** Sendtn.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, GUA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[Gamerro, J. C. 155 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 250 (CORD)]; PRY[Hassler, E. 6208 (G, W)].

**Solanum rancaguense** Dunal = **Solanum furcatum**

Dunal

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

[**Solanum rancaguinum** Phil.]

Notas: Nombre dudoso.

**Solanum rantonnetii** Carrière = **Lycianthes rantonnei** (Carrière) Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

**Solanum ratum** C.V. Morton

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(COR).

Ejemplares de referencia: ARG[Bartlett, H. H. 20623 (GH, NY, US)].

**Solanum reductum** C.V. Morton

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1991b; Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 24331 (CORD)].

**Solanum reflexum** Schrank

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Subarbusto. Nativa. 0–1400 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Smith, L. B. 14638 (HBR, NY, US)].

**Solanum reflexum** auct. non Schrank = **Solanum viarum** Dunal

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

**Solanum reineckii** Briq.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Subarbusto. Endémica. 0–100 m.

Países: BRA(RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Klein, R. M. 8837 (FLOR, HBR, US)].

**Solanum reitzii** L.B. Sm. & Downs

Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

Arbolito o árbol. Endémica. 0–900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 4092 (B, NY)].

**Solanum remyanum** Phil.

Sin.: *Solanum flexuosum* (J. Remy) Phil., *Witheringia flexuosa* J. Remy

Referencias: Dillon, M. O., 2005; Nee, M., 1999; PBI Solanum project, 2006; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.

Países: CHL(II, III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[Quezada, M. 176 (CONC)].

[**Solanum renggeri** Schltldl.]

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

Notas: Nombre dudoso.

**Solanum restrictum** C.V. Morton

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Hierba. Anual. Endémica. 500–1500 m.

- Países: ARG(COR).  
Ejemplares de referencia: ARG[Bartlett, H. H. 20171 (US)].
- Solanum rickii* Correll = **Solanum sitiens** I.M. Johnst.  
Referencias: Nee, M., 1999.
- Solanum riojense** Bitter  
Sin.: *Solanum andicola* C.V. Morton  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999b.  
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Sleumer, H. O. 3214 (LIL, SI)].
- Solanum rionegrinum* Lechn. = **Solanum commersonii**  
Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**  
Referencias: Brücher, E. H., 1976; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Morton, C. V., 1976.
- Solanum riparium** Pers.  
Sin.: *Solanum carnosipes* Rusby, *Solanum verbascifolium* L. var. *caducum* Kuntze  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Roe, K. E., 1972.  
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1500 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 7467 (SI)].
- Solanum rivulare* Mart. ex Sendtn. = **Solanum stipulatum** Vell.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum rizzinianum* Mattos = **Solanum hasslerianum**  
Chodat  
Referencias: Mentz, L. A., 2004.
- Solanum robinsonianum* Bitter = **Solanum furcatum**  
Dunal  
Referencias: Edmonds, J. M., 1972.
- Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Sin.: *Solanum alatum* Seem. & J.A. Schmidt, hom. illeg., *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl., *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *robustius* Chodat, *Solanum conceptionis* Chodat & Hassl. var. *typicum* Chodat, nom. inval., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *decurrens* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *rupestre* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *typicum* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *conceptionis* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *decurrens* Hassl., *Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *laxepilosum* Hassl.  
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1200 m.  
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
- Ejemplares de referencia: ARG[Subils, R. 4258 (CORD)]; BRA[Hatschbach, G. 24496 (M, MBM, NY)]; PRY[Zardini, E. M. 4425 (FCQ, MO)].
- Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *decurrens* Hassl. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Referencias: Matesevach, M., 2002.
- Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *rupestre* Hassl. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum robustum* H.L. Wendl. f. *typicum* Hassl. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Referencias: Matesevach, M., 2002.
- Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *conceptionis* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Referencias: Matesevach, M., 2002; Morton, C. V., 1976.
- Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *decurrens* Hassl. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.
- Solanum robustum* H.L. Wendl. var. *laxepilosum* Hassl. = **Solanum robustum** H.L. Wendl.  
Referencias: Matesevach, M., 2002; Morton, C. V., 1976.
- Solanum rojasii* Chodat = **Solanum nigrescens**  
M. Martens & Galeotti
- Solanum ruderale* (J. Remy) F. Phil. = **Solanum radicans**  
L. f.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.
- Solanum rufescens** Sendtn.  
Sin.: *Solanum xiphocephalum* L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999.  
Arbolito. Nativa. 0–1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[Reitz, P. R. 9138 (FLOR, HBR, NY, US)].
- Solanum ruiz-lealii** Brücher  
Referencias: Brücher, E. H., 1962, 1997[1996]; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Raimondi, J. P., Peralta, I. E., Masuelli, R. W., Freingold, S. & Camadro, E. L., 2005.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.  
Países: ARG(MEN).  
Ejemplares de referencia: ARG[Carette, B. s.n. (MERL), Ruiz Leal, R. A. 23395 (BAL)].
- Solanum runcinatum* Ruiz & Pav. = **Solanum pinnatum**  
Cav.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.
- Solanum sabinii* (A. DC.) Berthault, p.p. = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990.

*Solanum sadae* Phil. = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

**Solanum salamancae** Hunz. & Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1993b.

Hierba. Anual. Endémica. 1000–1500 m.

Países: ARG(SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 696 (CORD)].

**Solanum saldanhae** Glaz.

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004.

Arbusto. Nativa. 200 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[Hatschbach, G. 7893 (MBM)].

**Solanum salicifolium** Phil.

Referencias: Morton, C. V., 1976; Moscone, E. A., 1992.

Arbusto. Endémica. 1000–2500 m.

Países: ARG(LRI, MEN, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[Boelcke, O. 9873 (BAB, SI)].

*Solanum saltense* (Bitter) C.V. Morton, hom. illeg.= **Lycianthes saltensis** Bitter

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum saltense* Hawkes = **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

**Solanum sanctae-catharinae** DunalSin.: *Solanum citrifolium* Willd. ex Roem. & Schult.f. *intermedium* Hassl., *Solanum citrifolium* Willd. exRoem. & Schult. var. *ochandrum* (Dunal) Hassl.,*Solanum citrifolium* Willd. ex Roem. & Schult. var.*typicum* Hassl., nom. inval., *Solanum ochrandrum*

Dunal

Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. &amp; Peña-Chocarro, M. C., 2000; Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Sayagués, L., Graf, E. &amp; Delfino, L., 2000; Smith, L. B. &amp; Downs, R. J., 1966.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1100 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, COA, PAI); URY(CLA, RIV, TAC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 6848 (SI)]; BRA[Mentz, L. A. 291 (CORD, ICN)]; PRY[Hassler, E. 4429 (BM, W)]; URY[Arrillaga de Maffei, B. R. 1859 (MVFA)].

**Solanum sanctae-rosae** HawkesSin.: *Solanum catamarcae* Bitter ex Brücher, nom. nud.

Referencias: Brücher, E. H., 1970; Correll, D. S., 1962;

Hawkes, J. G. &amp; Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach,

M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Mentz, L. A. &amp; Oliveira,

P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 1500–4000 m.

Países: ARG(CAT, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 4737 (BA, GH, LIL, LP, S, SI, US)].

**Solanum sanfurgoi** Phil.

Referencias: Muñoz-Pizarro, C., 1960.

Arbusto. Endémica.

Países: CHL(VII).

Ejemplares de referencia: CHL[Sanjurjo, L. s.n. (SGO)].

*Solanum sanmartiniense* Brücher = **Solanum tuberosum**L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. &amp; Hjerting, J. P. K., 1969;

Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005.

*Solanum saponaceum* auct. non Dunal = **Solanum****consimile** C.V. Morton

Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum saponaceum* Hook., hom. illeg. = **Solanum****elaegnifolium** Cav.

Referencias: Del Vitto, L. A. &amp; Petenatti, E. M., 1999a;

Matesevach, A. M., 2002.

*Solanum saponaceum* Dunal var. *uruguense* Griseb.= **Solanum bonariense** L.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Morton, C. V., 1976.

*Solanum sarachidium* Bitter = **Solanum sarrachoides**

Sendtn.

Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

**Solanum sarrachoides** Sendtn.Sin.: *Solanum atriplicifolium* Gillies ex Nees var. *minus*Gillies ex Nees, *Solanum sarachidium* Bitter, *Solanum**sarrachoides* Sendtn. var. *sarachidium* (Bitter)C.V. Morton, *Solanum styleanum* Dunal

Referencias: Cabrera, A. L., 1965b, 1979; Degen, R. &amp; Mereles, F., 1996; Edmonds, J. M. &amp; Chweya, J. A., 1997; Edmonds, J. M., 1972, 1986; Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, SDE); BRA(RGS); CHL(V, VI, VII); PRY(APY, PHA); URY(MAL, MON, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[Cuezzo, A. R. 2412 (L, UPS)]; BRA[Rambo, B. 25721 (B, PACA)]; CHL[Bridges, T. C. 400 (K)]; PRY[Hassler, E. 2493 (BM, GOET)]; URY[Berro, M. B. 7206 (K)].

*Solanum sarrachoides* Sendtn. var. *sarachidium* (Bitter)C.V. Morton = **Solanum sarrachoides** Sendtn.

Referencias: Edmonds, J. M., 1986.

*Solanum schickii* Juz. & Bukasov = **Solanum chacoense**

Bitter

Referencias: Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

**Solanum schlechtendalianum** Walp.Sin.: *Solanum geminifolium* Schltdl.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976;

Nee, M., 1999.

Arbusto. Nativa. 500–1000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5361* (LIL, SI)].

*Solanum schreiteri* Bukasov, nom. nud. = **Solanum  
acaule** Bitter  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Morton, C. V., 1976.

*Solanum schwackeanum* L.B. Sm. & Downs = **Solanum  
schwackei** Glaz.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

**Solanum schwackei** Glaz.  
Sin.: *Solanum schwackeanum* L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.  
Arbusto. Nativa. 0–500 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Schwacke, C. A. W. 175* (R, US)].

**Solanum sciadostylis** (Sendtn.) Bohs  
Sin.: *Cyphomandra reitzii* L.B. Sm. & Downs, *Cyphomandra  
sciadostylis* Sendtn., *Cyphomandra sciadostylis* Sendtn.  
var. *trichocarpa* Hassl.  
Referencias: Bohs, L., 1994a; Nee, M., 1999.  
Arbusto o árbol. Nativa. 200–1500 m.  
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA,  
CAA, GUA).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11000* (SI)];  
BRA[*Krapovickas, A. 33649* (C, CTES, MO)];  
PRY[*Rojas, T. 10863* (G, NY)].

*Solanum sciaphilum* Bitter = **Solanum americanum**  
Mill.  
Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997; Mentz,  
L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

**Solanum scuticum** M. Nee  
Sin.: *Solanum asperolanatum* auct. non Ruiz & Pav.,  
*Solanum tabacifolium* Dunal, hom. illeg.  
Referencias: Nee, M., Bohs, L. & Knapp, S., 2006.  
Arbolito. Nativa. 0–1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16743*  
(MBM)]; PRY[*Hassler, E. 11252* (BM, GH, K, MO, S,  
UC, W)].

**Solanum sellowianum** Sendtn.  
Sin.: *Solanum heliotropifolium* Dunal var. *sellowianum*  
(Sendtn.) Dunal  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.  
Arbusto. Nativa. 800 m.  
Países: BRA(PAR).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10428* (P)].

*Solanum sembarto* Kuntze = **Solanum valdiviense** Dunal  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

[*Solanum sembarto* Kuntze var. *pubescens* Kuntze]  
Notas: Nombre dudoso.

*Solanum sembarto* Kuntze var. *varians* Kuntze  
= **Solanum valdiviense** Dunal  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum septemlobum* Phil., hom. illeg. = **Solanum  
pinnatum** Cav.  
Referencias: PBI Solanum project, 2006.

[*Solanum sericeum* Ruiz & Pav.]  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Solanum sericeum* Ruiz & Pav. var. *strigillosum* Griseb.  
= **Solanum endoadenium** Bitter  
Referencias: Morton, C. V., 1976.

[*Solanum sessile* Ruiz & Pav.]  
Sin.: *Solanum pulchrum* Dunal  
Referencias: Nee, M., 1999.  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

**Solanum setosissimum** Bitter ex L.A. Mentz & M. Nee  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.  
Arbusto. Endémica. 100–1000 m.  
Países: BRA(PAR, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Stellfeld, C. 4886* (G,  
MBM)].

[*Solanum setulosistylum* Bitter]  
Notas: Nombre dudoso.

*Solanum sidifolium* Speg. = **Solanum tweedianum** Hook.  
Referencias: Edmonds, J. M., 1972.

*Solanum simplicifolium* Bitter = **Solanum microdontum**  
Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum simplicifolium* Bitter var. *gigantophyllum*  
(Bitter) Bitter = **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum simplicifolium* Bitter var. *metriophyllum* Bitter  
= **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum simplicifolium* Bitter var. *mollifrons* Bitter  
= **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum simplicifolium* Bitter var. *trimerophyllum* Bitter  
= **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum simplicifolium* Bitter var. *variabile* Brücher &  
H. Ross = **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *gigantophyllum*  
(Bitter) Bitter = **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005;  
van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *microdontum*  
(Bitter) Hawkes, nom. inval. = **Solanum  
microdontum** Bitter

Referencias: van den Berg, R. G. & Spooner, D. M., 1992.

*Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *venturii* Hawkes,  
nom. nud. = **Solanum venturii** Hawkes & Hjert.  
Referencias: Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G., 1956.

**Solanum sinuatiexcisum** Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 2005;  
Edmonds, J. M., 1972.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 1500–3100 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2311* (LIL,  
W)].

*Solanum sinuatifolium* Vell. = **Solanum capsicoides** All.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

**Solanum sinuatirecurvum** Bitter

Sin.: *Solanum sinuatirecurvum* Bitter subsp. *crispatellum*  
Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Del Vitto, L. A. &  
Petenatti, E. M., 1999b.

Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 352*  
(CORD)].

*Solanum sinuatirecurvum* Bitter subsp. *crispatellum*  
Bitter = **Solanum sinuatirecurvum** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Del Vitto, L. A. &  
Petenatti, E. M., 1999b.

**Solanum sisymbriifolium** Lam.

Sin.: *Solanum balbisii* Dunal, *Solanum balbisii* Dunal var.  
*bipinnata* Hook., *Solanum balbisii* Dunal var.  
*purpureum* Hook., *Solanum bipinnatifidum* Larrañaga,  
*Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *albiflorum* Kuntze,  
*Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *lilacinum* Kuntze,  
*Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *brevilobum* Dunal,  
*Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *heracleifolium*  
Sendtn., *Solanum sisymbriifolium* Lam. var.  
*macrocarpum* Kuntze

Referencias: Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Degen, R. &  
Mereles, F., 1996; Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A.  
& Oliveira, P. L., 2004; Morton, C. V., 1976; Moscone,  
E. A., 1992; Nee, M., 1999; Soria Rey, N., Basualdo,  
I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Hierba o subar busto. Perenne. Nativa. 0–1700 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ,  
LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR,  
RGS, SCA); CHL(V, VIII); PRY(APY, CEN, COA,  
ÑEE, PAI, PHA); URY(COL, MON).

Ejemplares de referencia: ARG[*Jørgensen, P. 150* (SI)];  
BRA[*Hatschbach, G. 10771* (MBM)]; CHL[*Pfister, A.*  
*s.n.* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 13063* (FCQ, MO)];  
URY[*Herter, W. G. F. 51* (M)].

*Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *albiflorum* Kuntze  
= **Solanum sisymbriifolium** Lam.

Referencias: Matesevach, M., 2002.

*Solanum sisymbriifolium* Lam. f. *lilacinum* Kuntze  
= **Solanum sisymbriifolium** Lam.

Referencias: Matesevach, A. M., 2002.

[*Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *angustiloba* Speg.]  
Notas: Nombre dudoso.

*Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *brevilobum* Dunal  
= **Solanum sisymbriifolium** Lam.

Referencias: Matesevach, M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *heracleifolium*  
Sendtn. = **Solanum sisymbriifolium** Lam.

Referencias: Matesevach, M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum sisymbriifolium* Lam. var. *macrocarpum* Kuntze  
= **Solanum sisymbriifolium** Lam.

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

**Solanum sitiens** I.M. Johnst.

Sin.: *Solanum rickii* Correll

Referencias: Correll, D. S., 1961; Nee, M., 1999; Smith, S. D.  
& Peralta, I. E., 2002.

Arbusto. Endémica. 2500–3400 m.

Países: CHL(II).

Ejemplares de referencia: CHL[*Rick, C. M. 224* (LL)].

*Solanum sleumeri* Correll = **Solanum spgazzinii** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G. &  
Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990;  
Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum sorianum* Bukasov = **Solanum commersonii**  
Dunal ex Poir. subsp. **commersonii**

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. &  
Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum sparcistrigosum* Bitter = **Solanum turneroides**  
Chodat

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum spectabile* Steud. var. *subhastatum* Sendtn.  
= **Solanum affine** Sendtn.

Referencias: Nee, M., 1991b.

**Solanum spgazzinii** Bitter

Sin.: *Solanum famatinae* Bitter & Wittm., *Solanum*  
*puberulofructum* Correll, *Solanum sleumeri* Correll

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G. &  
Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990;  
Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V.,  
1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 500–3700 m.

Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 715*  
(CORD)].

*Solanum sphaerocarpum* Moric. = **Solanum capsicoides**  
All.

Referencias: Matesevach, M., 2002.

*Solanum spiraeoides* Dunal = **Solanum valdiviense**

Dunal

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Solanum spretum* C.V. Morton = **Solanum tredecimgranum** Bitter

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1995, 1999a.

**Solanum stipulatum** Vell.

Sin.: *Solanum rivulare* Mart. ex Sendtn.

Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100–1600 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13435* (NY, UPCB, US)].

**Solanum stuckertii** Bitter

Sin.: *Cyphomandra stuckertii* (Bitter) D'Arcy, *Solanum stuckertii* Bitter var. *angustifrons* Bitter, *Solanum stuckertii* Bitter var. *atrichostylum* Bitter, *Solanum stuckertii* Bitter var. *obrutum* C.V. Morton, *Solanum stuckertii* Bitter var. *pilosistylum* C.V. Morton, *Solanum stuckertii* Bitter var. *trichostylum* Bitter

Referencias: Bohs, L., 2001; Dottori, N. M., 1995; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Arbusto o arbolito. Nativa. 200–2500 m.

Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. J. V. 21589* (CORD, G)].

*Solanum stuckertii* Bitter var. *angustifrons* Bitter = **Solanum stuckertii** Bitter

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum stuckertii* Bitter var. *atrichostylum* Bitter = **Solanum stuckertii** Bitter

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum stuckertii* Bitter var. *obrutum* C.V. Morton = **Solanum stuckertii** Bitter

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum stuckertii* Bitter var. *pilosistylum* C.V. Morton = **Solanum stuckertii** Bitter

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum stuckertii* Bitter var. *trichostylum* Bitter = **Solanum stuckertii** Bitter

Referencias: Bohs, L., 2001.

*Solanum styleanum* Dunal = **Solanum sarrachoides** Sendtn.

Referencias: Edmonds, J. M., 1986.

*Solanum subandigenum* Hawkes var. *camarguense* Cárdenas = **Solanum oplocense** Hawkes

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

*Solanum subandinum* F. Meigen = **Solanum etuberosum** Lindl.

Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.

*Solanum subandinum* Phil., hom. illeg. = **Solanum furcatum** Dunal

*Solanum subenervium* Dunal = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.

**Solanum subhastatum** L.B. Sm. & Downs

Sin.: *Cyphomandra subhastata* (L.B. Sm. & Downs) A. Child ex Bohs

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

Subarbusto. Endémica. 300 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7053* (HBR)].

*Solanum sublobatum* Willd. = **Solanum chenopodioides** Lam.

Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997; Nee, M., 1999.

*Solanum subspatulatum* Sendtn. = **Solanum chenopodioides** Lam.

Referencias: Edmonds, J. M. & Chweya, J. A., 1997.

**Solanum subsylvestris** L.B. Sm. & Downs

Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.

Arbusto. Endémica. 500–900 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 3006* (HBR, US)].

*Solanum subtilius* Bitter = **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

**Solanum swartzianum** Roem. & Schult.

Sin.: *Solanum hatschbachii* Carvalho, *Solanum swartzianum* Roem. & Schult. subsp. *chrysophyllum* (Dunal) Carvalho

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1200 m.

Países: BRA(PAR, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12073* (MBM)].

*Solanum swartzianum* Roem. & Schult. subsp. *chrysophyllum* (Dunal) Carvalho = **Solanum swartzianum** Roem. & Schult.

**Solanum symmetricum** Rusby

Sin.: *Solanum nudum* Dunal var. *pseudoindigoferum* Hassl., *Solanum versabile* C.V. Morton

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Knapp, S., 2002; Nee, M., 1999.

- Arbusto o arbolito. Nativa. 0–2000 m.  
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR);  
PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).  
Ejemplares de referencia: ARG[Schwindt, E. 3286 (BH)];  
BRA[Hatschbach, G. 13249 (NY, US)]; PRY[Balansa,  
B. 3126 (P), Knapp, S. 9130 (BM, PY)].
- Solanum syringifolium* Kunth & Bouché = **Solanum  
crispum** Ruiz & Pav.  
Referencias: Knapp, S., 1989.
- Solanum syringoideum* Bitter = **Solanum nigrescens**  
M. Martens & Galeotti
- Solanum syringoideum* Bitter var. *pyncostichanthum*  
Bitter = **Solanum nigrescens** M. Martens & Galeotti
- Solanum syringoideum* Bitter subsp. *pilcomayense*  
(Morong) Hassl. = **Solanum nigrescens** M. Martens  
& Galeotti
- Solanum tabacifolium* Dunal, hom. illeg. = **Solanum  
scuticum** M. Nee  
Referencias: Nee, M., Bohs, L. & Knapp, S., 2006.
- Solanum tabacifolium* Vell. = **Solanum mauritianum**  
Scop.  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum tacnaense* Ochoa = **Solanum medians** Bitter
- Solanum tafense* Lillo ex Hawkes & Hjert., nom. nud.  
= **Solanum microdontum** Bitter  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Morton, C. V., 1976; van den Berg, R. G. & Spooner,  
D. M., 1992.
- Solanum tarapacanam* Phil. = **Solanum fragile** Wedd.  
Referencias: Edmonds, J. M., 1972.
- Solanum tarijense* Hawkes = **Solanum berthaultii**  
Hawkes  
Referencias: Spooner, D. M. & van den Berg, R. G., 1992.
- Solanum tarijense* Hawkes var. *pojoense* (Cárdenas)  
Correll = **Solanum berthaultii** Hawkes  
Referencias: Spooner, D. M. & van den Berg, R. G., 1992.
- Solanum tascalense* Brücher = **Solanum tuberosum** L.  
subsp. **andigenum** (Juz. & Bukasov) Hawkes  
Referencias: Brücher, E. H., 1966b; Matesevach, M. &  
Barboza, G. E., 2005.
- Solanum tejucense* Dunal = **Solanum vaillantii** Dunal  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.
- Solanum tenue* Sendtn. = **Solanum commersonii** Dunal  
ex Poir. subsp. **commersonii**  
Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969;  
Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V.,  
1976.
- Solanum tenue* Sendtn. var. *raphanifolium* Dunal  
= **Solanum commersonii** Dunal ex Poir. subsp.  
**commersonii**  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.
- Solanum tenuisectum* Kuntze = **Solanum incisum** Griseb.  
var. **tenuisectum** (Kuntze) Bitter ex C.V. Morton  
Referencias: Morton, C. V., 1976.
- Solanum tenuispinum** Rusby  
Sin.: *Solanum chaetophorum* C.V. Morton  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M., 2002;  
Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1991b, 1999.  
Subarbusto. Nativa. 500–3000 m.  
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, S. 154 (SI)].
- [*Solanum thymifolium* Roem. & Schult.]  
Notas: Nombre dudoso.
- Solanum tilcareense* Hawkes = **Solanum  
megistacrolobum** Bitter  
Referencias: Giannatasio, R. B. & Spooner, D. M., 1994a, b.
- [*Solanum tinctorium* Rojas Acosta]  
Notas: Nombre dudoso.
- Solanum toldense** Matesevach & Barboza  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2001;  
Matesevach, M., 2002.  
Arbusto. Nativa. 1700–1900 m.  
Países: ARG(SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[Barboza, G. E. 281 (CORD,  
MCNS, SI)].
- Solanum tomatillo* (J. Remy) F. Phil. = **Solanum crispum**  
Ruiz & Pav.
- Solanum tomentosum* (J. Remy) F. Phil. = **Solanum  
heterantherum** Witasek ex Reiche  
Referencias: PBI *Solanum* project, 2006.
- Solanum toralapanum* Cárdenas & Hawkes = **Solanum  
megistacrolobum** Bitter
- Solanum trachytrichium** Bitter  
Referencias: Knapp, S., 2002; Mentz, L. A. & Oliveira, P. L.,  
2004; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999; Smith, L. B.  
& Downs, R. J., 1966.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–1300 m.  
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA,  
CAN, GUA, ITA).  
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 6876 (SI)];  
BRA[Hatschbach, G. 10152 (US)]; PRY[Schinini, A.  
23169 (CTES, NY)].
- Solanum tredecimgranum** Bitter  
Sin.: *Solanum spretum* C.V. Morton  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1995, 1999a;  
Morton, C. V., 1976.  
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V).  
Ejemplares de referencia: ARG[Boelcke, *O. 3653* (BAA, BAB, US)]; CHL[Buchtien, *O. s.n.* (US)].

**Solanum trichoneuron** Lillo

Sin.: *Solanum oblongum* auct. non Ruiz & Pav.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Knapp, S., 2002; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Arbusto o arbolito. Nativa. 500–2000 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Venturi, *S. 410* (LIL)].

**Solanum triflorum** Nutt.

Sin.: *Solanum calophyllum* Phil., *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *pyrethrifolium* (Griseb.) Kuntze, *Solanum mendocinum* Phil., *Solanum pyrethrifolium* Griseb., *Solanum triflorum* Nutt. var. *calophyllum* (Phil.) Bitter, *Solanum triflorum* Nutt. var. *pyrethrifolium* (Griseb.) Probst  
Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Hunziker, A. T., 1989; Nee, M., 1999.  
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.  
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TUC).  
Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, *A. T. 24805* (CORD)].

*Solanum triflorum* Nutt. var. *calophyllum* (Phil.) Bitter  
= **Solanum triflorum** Nutt.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Hunziker, A. T., 1989.

*Solanum triflorum* Nutt. var. *pyrethrifolium* (Griseb.) Probst = **Solanum triflorum** Nutt.

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Hunziker, A. T., 1989.

*Solanum trigalense* Cárdenas = **Solanum berthaultii** Hawkes

Referencias: Spooner, D. M. & van den Berg, R. G., 1992.

**Solanum tripartitum** Dunal

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.  
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.  
Países: ARG(JUJ, SAL).  
Ejemplares de referencia: ARG[Negritto, *M. A. 310* (CORD, CTES, SI)].

[*Solanum triste* Jacq.]

Referencias: Knapp, S., Stafford, M., Sousa-Peña, M. & Martínez, M., 2005.  
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

*Solanum tuberosum* L. var. *brevidens* (Phil.) Reiche  
= **Solanum palustre** Schltld.

Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.

*Solanum tuberosum* L. var. *chiloense* A. DC. = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G., 1990.

*Solanum tuberosum* L. var. *chubutense* (Bitter) Hawkes  
= **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum tuberosum* L. var. *cultum* A. DC. = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990.

*Solanum tuberosum* L. var. *fernandezianum* (Phil.) Reiche = **Solanum fernandezianum** Phil.

Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999; Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G., 1990.

*Solanum tuberosum* L. var. *glabriusculum* Dunal  
= **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

*Solanum tuberosum* L. var. *guaytecarum* (Bitter) Hawkes  
= **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969.

*Solanum tuberosum* L. var. *maglia* (Schltld.) A. DC.  
= **Solanum maglia** Schltld.

*Solanum tuberosum* L. var. *pearcei* (Phil.) Reiche  
= **Solanum palustre** Schltld.

Referencias: Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.

*Solanum tuberosum* L. var. *polemoniifolium* Hook. f.  
= **Solanum etuberosum** Lindl.

Referencias: Brücher, E. H., 1966a; Contreras-M., A. & Spooner, D. M., 1999.

*Solanum tuberosum* L. var. *sabinii* A. DC., p.p.  
= **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G., 1990.

*Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Hook. f. = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Macloskie, hom. illeg. = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

**Solanum tuberosum** L. subsp. **andigenum** (Juz. & Bukasov) Hawkes

Sin.: *Solanum andigenum* Juz. & Bukasov, *Solanum argentinicum* Lechn., *Solanum tascalense* Brücher  
Referencias: D'Arcy, W. G., 1993; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; Ochoa, C. M., 1990.

Hierba. Perenne. Nativa. 1200–3600 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, *A. T. 1292* (CORD, SI)].

*Solanum tuberosum* L. subsp. *guaraniticum* Bertoni

= **Solanum chacoense** Bitter

Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

**Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**

Sin.: *Solanum aquinas* Bukasov, nom. nud., *Solanum chiloense* (A. DC.) Berthault, *Solanum chilotanum* Hawkes, nom. nud., *Solanum cultum* (A. DC.) Berthault, *Solanum diemii* Brücher, *Solanum fonckii* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Solanum leptostigma* Juz. ex Bukasov, *Solanum maglia* Schldtl. subsp. *meridionale* Bitter, *Solanum maglia* Schldtl. var. *chubutense* Bitter, *Solanum maglia* Schldtl. var. *guaytecarum* Bitter, *Solanum molinae* Juz., *Solanum oceanicum* Brücher, *Solanum ochoanum* Lechn., *Solanum sabinii* (A. DC.) Berthault, p.p., *Solanum sanmartiniense* Brücher, *Solanum tuberosum* L. var. *chiloense* A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *chubutense* (Bitter) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *cultum* A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *guaytecarum* (Bitter) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *sabinii* A. DC., p.p., *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Hook. f., *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Macloskie, hom. illeg., *Solanum zykini* Lechn.

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Hawkes, J. G., 1990; Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.

Hierba. Perenne. Nativa. 500–3000 m.

Países: ARG(CHU, NEU, SCR); CHL(II, V, VI, VIII, IX, X, XI, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[Brücher, O. 1095 (SI)]; CHL[Junge, C. 3009 (CONC)].

*Solanum tucumanense* Griseb. = **Solanum**

**pseudocapsicum** L.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum tumescens* S. Knapp = **Solanum corumbense**

S. Moore

Referencias: Knapp, S., 2002.

**Solanum turneroides** Chodat

Sin.: *Solanum flavistrigosum* Bitter, *Solanum geniculatistrigosum* Bitter, *Solanum gonatotrichum* Bitter, *Solanum sparcistrigosum* Bitter

Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Nee, M., 1999.

Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(CAN, CON, COA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[Morrone, O. 4084 (SI)]; PRY[Hassler, E. 4396 (BM, G)].

**Solanum tweedianum** Hook.

Sin.: *Solanum atriplicifolium* Gillies ex Nees, *Solanum atriplicoides* Herter, *Solanum haarupii* Bitter, *Solanum meizonanthum* Bitter, *Solanum sidifolium* Speg.

Referencias: Cabrera, A. L., 1979; Edmonds, J. M., 1972; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA); CHL(V); PRY(APY); URY(MON).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cano 2603* (US)]; CHL[*Cuming, H. 783* (K)]; PRY[*Degen, R. 2629* (FCQ)]; URY[*Arechavaleta, J. 3079* (Z)].

*Solanum undatifolium* Dunal = **Solanum pseudoquina**

A. St.-Hil.

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum urbanum* Morong = **Lycianthes rantonnei**

(Carrière) Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum urbanum* Morong var. *foliosum* Chodat

= **Lycianthes rantonnei** (Carrière) Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum urbanum* Morong var. *nervosum* Chodat

= **Lycianthes rantonnei** (Carrière) Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum urbanum* Morong var. *ovatifolium* Chodat

= **Lycianthes pauciflora** (Vahl) Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992; Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997.

*Solanum urbanum* Morong var. *subtomentosum* Chodat

= **Lycianthes rantonnei** (Carrière) Bitter

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum urbanum* Morong var. *typicum* Chodat, nom.

inval. = **Lycianthes rantonnei** (Carrière) Bitter

*Solanum uyunense* Cárdenas = **Solanum acaule** Bitter

Referencias: Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

**Solanum vaillantii** Dunal

Sin.: *Solanum acerosum* Sendtn., *Solanum tejucense* Dunal

Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1991b, 1999.

Arbusto. Nativa. 0–1500 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 4534* (PACA)].

**Solanum valdiviense** Dunal

Sin.: *Solanum evonymoides* J. Remy, hom. illeg., *Solanum sembarto* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *varians* Kuntze, *Solanum spiraeoides* Dunal

Referencias: Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M., 1999a; Morton, C. V., 1976; PBI *Solanum* project, 2006.

Arbusto. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(NEU); CHL(VIII, IX, X).

Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 2053* (BAA)]; CHL[*Marticorena, C. 1527* (CONC)].

*Solanum vallegrandense* Cárdenas = **Solanum**

**berthaultii** Hawkes

Referencias: Spooner, D. M. & van den Berg, R. G., 1992.

*Solanum vallegrandense* Cárdenas var. *pojoense*Cárdenas = **Solanum berthaultii** Hawkes

Referencias: Spooner, D. M. &amp; van den Berg, R. G., 1992.

**Solanum variabile** Mart.

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. &amp; Downs, R. J., 1966.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1100 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).

Ejemplares de referencia: BRA[Klein, R. M. 3218 (FLOR, HBR, MBM, PACA)]; PRY[Fiebrig, K. A. G. 5733 (G)].

*Solanum velascanum* Bitter & Wittm. = **Solanum kurtzianum** Bitter & Wittm.

Referencias: Hawkes, J. G. &amp; Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976.

**Solanum velleum** Thunb.

Referencias: Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004.

Arbusto. Nativa. 200–800 m.

Países: BRA(SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[Souza, M. L. 692 (FLOR)].

**Solanum venturii** Hawkes & Hjert.Sin.: *Solanum simplicifolium* Bitter subsp. *venturii* Hawkes, nom. nud.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Correll, D. S., 1962; Hawkes, J. G. &amp; Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. &amp; Barboza, G. E., 2005; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2300 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 19306 (CORD)].

*Solanum verbascifolium* L. = **Solanum donianum** Walp.

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum verbascifolium* L. f. *eupulverulentum* Hassl. = **Solanum granulosum-leprosum** Dunal*Solanum verbascifolium* L. f. *granuloso-leprosum* (Dunal) Hassl. = **Solanum granulosum-leprosum** Dunal

Referencias: Roe, K. E., 1972.

*Solanum verbascifolium* L. var. *auriculatum* (Aiton)Kuntze = **Solanum mauritianum** Scop.

Referencias: Morton, C. V., 1976.

*Solanum verbascifolium* L. var. *caducum* Kuntze= **Solanum riparium** Pers.

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.

**Solanum vernei** Bitter & Wittm.Sin.: *Solanum ballsii* Hawkes, *Solanum vernei* Bitter & Wittm. subsp. *ballsii* (Hawkes) Hawkes & Hjert.

Referencias: Brücher, E. H. &amp; Ross, H., 1953; Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G. &amp; Hjerting, J. P. K., 1969; Morton, C. V., 1976; Nee, M., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 1900–3500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[Hunziker, A. T. 20392 (CORD)].

*Solanum vernei* Bitter & Wittm. subsp. *ballsii* (Hawkes) Hawkes & Hjert. = **Solanum vernei** Bitter & Wittm.*Solanum vernicatum* Lindl. = **Solanum atropurpureum** Schrank

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Morton, C. V., 1976.

*Solanum verruculosum* (Hassl.) Hassl. = **Solanum corumbense** S. Moore

Referencias: Knapp, S., 2002.

*Solanum versabile* C.V. Morton = **Solanum symmetricum** Rusby

Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Knapp, S., 2002.

**Solanum vervoorstii** C.V. Morton

Referencias: Morton, C. V., 1976.

Subarbusto. Endémica. 2500–3000 m.

Países: ARG(CAT).

Ejemplares de referencia: ARG[Sleumer, H. O. 2481 (US, W)].

*Solanum vexans* S. Moore = **Solanum palinacanthum** Dunal

Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Nee, M., 1991b.

**Solanum viarum** DunalSin.: *Solanum chloranthum* DC., hom. illeg., *Solanum reflexum* auct. non Schrank, *Solanum viridiflorum* Schltld.

Referencias: Matesevach, M., 2002; Mentz, L. A. &amp; Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999; Smith, L. B. &amp; Downs, R. J., 1966.

Arbusto. Nativa. 0–800 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE); URY(MON, RIV, TAC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[de Llamas, A. 1598 (SI)]; BRA[Smith, L. B. 5807 (US)]; PRY[Hassler, E. 2386 (G, NY, W)]; URY[Herter, W. G. F. 1086 (B, G, M, NY, Z)].

*Solanum vidaurrei* Cárdenas = **Solanum brevicaule** Bitter*Solanum vile* Bitter = **Solanum chenopodioides** Lam.

Referencias: Edmonds, J. M. &amp; Chweya, J. A., 1997.

*Solanum villaricense* Morong = **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.

Referencias: Nee, M., 1999.

*Solanum villaricense* Morong f. *lobatum* Hassl. = **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.*Solanum villaricense* Morong f. *subintegrum* Hassl. = **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.

*Solanum villaricense* Morong f. *typicum* Hassl., nom. inval. = **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.

*Solanum villaricense* Morong var. *paraguariense* (Chodat) Hassl. = **Solanum guaraniticum** A. St.-Hil.

*Solanum violifolium* Schott f. *chacoense* Hassl.  
= **Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum violifolium* Schott f. *decadontum* Hassl.  
= **Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum violifolium* Schott f. *lilaciniflora* Hassl.  
= **Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum violifolium* Schott var. *asarifolium* (Kunth & Bouché) Hassl. = **Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter  
Referencias: Benítez de Rojas, C. E. & D'Arcy, W. G., 1997.

*Solanum violifolium* Schott var. *majus* Dunal  
= **Lycianthes asarifolia** (Kunth & Bouché) Bitter  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1992.

*Solanum viridiflorum* Schltdl. = **Solanum viarum** Dunal  
Referencias: Nee, M., 1991b.

*Solanum viridipes* Dunal = **Solanum alternato-pinnatum** Steud.  
Referencias: Matesevach, M., 2002; Nee, M., 1999.

*Solanum viridipes* Dunal var. *intermedium* Hassl.  
= **Solanum alternato-pinnatum** Steud.  
Referencias: Matesevach, A. M., 2002; Nee, M., 1999.

**Solanum viscosissimum** Sendtn.  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004; Nee, M., 1999.  
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1200 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7385* (MBM, RB)].

**Solanum wacketii** Witasek  
Sin.: *Solanum brusquense* L.B. Sm. & Downs  
Referencias: Mentz, L. A. & Oliveira, P. L., 2004.  
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.  
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).  
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24055* (MBM)].

**Solanum weddellii** Phil.  
Referencias: Marticorena, C., Matthei, O. R., Rodríguez Ríos, R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.  
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 4000–4200 m.  
Países: CHL(I, II).  
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 1353* (CONC)].

[*Solanum wissaduloides* S. Moore]  
Notas: Nombre dudoso.

*Solanum xerophyllum* Hawkes = **Solanum infundibuliforme** Phil.  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d; Hawkes, J. G. & Hjerting, J. P. K., 1969; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum xiphocephalum* L.B. Sm. & Downs = **Solanum rufescens** Sendtn.  
Referencias: Mentz, L. A., 2004.

*Solanum yungasense* auct. non Hawkes = **Solanum chacoense** Bitter  
Referencias: Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Solanum zudaniense* Cárdenas = **Solanum berthaultii** Hawkes  
Referencias: Spooner, D. M. & van den Berg, R. G., 1992.

**Solanum zuloagae** Cabrera  
Referencias: Cabrera, A. L., 1983d.  
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1000–2000 m.  
Países: ARG(JUJ).  
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 225* (SI)].

*Solanum zykinii* Lechn. = **Solanum tuberosum** L. subsp. **tuberosum**  
Referencias: Hawkes, J. G., 1990; Matesevach, M. & Barboza, G. E., 2005.

*Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman = **Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **axillaris**

*Stimoryne axillaris* (Lam.) Wijsman subsp. *parodii* (Steere) Wijsman = **Petunia axillaris** (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. subsp. **parodii** (Steere) Cabrera

*Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman = **Petunia integrifolia** (Hook.) Schinz & Thell. subsp. **integrifolia**

*Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *inflata* (R.E. Fr.) Wijsman = **Petunia inflata** R.E. Fr.

*Stimoryne integrifolia* (Hook.) Wijsman subsp. *occidentalis* (R.E. Fr.) Wijsman = **Petunia occidentalis** R.E. Fr.

*Stimoryne reitzii* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman = **Petunia reitzii** L.B. Sm. & Downs

*Stimoryne scheideana* (L.B. Sm. & Downs) Wijsman = **Petunia scheideana** L.B. Sm. & Downs

*Trechonaetes bipinnatifida* Phil. = **Jaborosa caulescens** Gillies & Hook. var. **bipinnatifida** (Dunal) Reiche  
Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Trechonaetes bridgesii* Dunal = **Jaborosa laciniata**

(Miers) Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987;  
Rossow, R. A., 1999g.*Trechonaetes floribunda* Phil. = **Jaborosa sativa** (Miers)

Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Trechonaetes laciniata* Miers = **Jaborosa laciniata**

(Miers) Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987;  
Rossow, R. A., 1999g.*Trechonaetes lanigera* Phil. = **Jaborosa lanigera** (Phil.)

Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Trechonaetes leucotricha* Speg. = **Jaborosa leucotricha**

(Speg.) Hunz.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1987;  
Rossow, R. A., 1999g.*Trechonaetes machucana* Phil. = **Jaborosa parviflora**

(Phil.) Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Trechonaetes parviflora* Phil. = **Jaborosa parviflora**

(Phil.) Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Trechonaetes rotacea* Lillo = **Jaborosa rotacea** (Lillo)

Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

*Trechonaetes sativa* Miers = **Jaborosa sativa** (Miers)

Hunz. &amp; Barboza

Referencias: Barboza, G. E. &amp; Hunziker, A. T., 1987, 1998a.

**Vassobia Rusby**

Número de especies: 1

**Vassobia breviflora** (Sendtn.) Hunz.Sin.: *Acnistus bornmulleri* Dammer, *Acnistus breviflorus* Sendtn., *Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *glabratus* Hassl., *Acnistus breviflorus* Sendtn. f. *indutus* Hassl., *Acnistus breviflorus* Sendtn. var. *glabratus* Sendtn., *Acnistus galanderi* Dammer, *Acnistus glabratus* (Sendtn.) Dammer, *Acnistus hauthalii* Dammer, *Acnistus lycioides* Dammer, *Acnistus mollis* Dammer, *Acnistus parviflorus* Griseb., *Acnistus parviflorus* Griseb. var. *arboresus* (Griseb.) Griseb., *Acnistus schunckii* Dammer, *Acnistus sellowii* Dammer, *Acnistus spinescens* (Sendtn.) Dammer, *Acnistus spinosus* Dammer, *Acnistus ulei* Dammer, *Bassovia pyrastrer* Dunal, *Bassovia pyrastrer* Dunal var. *glabriusculum* Dunal, *Bassovia spina-alba* (Dunal) Griseb., *Capsicum breviflorum* (Sendtn.) Hunz., *Capsicum glandulosum* Dunal, *Capsicum pyrastrer* (Dunal) Kuntze, *Dierbachia breviflora* (Sendtn.) Kuntze, *Dierbachia parviflora*(Sendtn.) Kuntze, *Dunalia breviflora* (Sendtn.) Sleumer, *Fregirardia spina-alba* Dunal, *Iochroma arboreum* Griseb.

Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. &amp; Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1979, 1983d; Hunziker, A. T., 1984d; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. &amp; Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Árbol. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(PAY, SAO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1818* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 44263* (BR, LIL, P)]; PRY[*Zardini, E. M. 4638* (FCQ, MO)]; URY[*Schroeder, J. s.n.* (BAF)].*Vassobia iochromoides* Hunz. = **Eriolarynx****iochromoides** (Hunz.) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1986, 2000b.

*Vassobia lorentzii* (Dammer) Hunz. = **Eriolarynx****lorentzii** (Dammer) Hunz.

Referencias: Hunziker, A. T., 1960, 1977a, 1984d, 2000b.

**Vestia Willd.**

Número de especies: 1 endémica

**Vestia foetida** (Ruiz & Pav.) Hoffmanns.Sin.: *Vestia lycioides* Willd.

Referencias: Hunziker, A. T., 1979b.

Arbusto. Endémica. 200 m.

Países: CHL(V, VI, VIII, IX, X).

Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, F. 25374* (CORD)].*Vestia lycioides* Willd. = **Vestia foetida** (Ruiz & Pav.)

Hoffmanns.

Referencias: Hunziker, A. T., 1979b.

*Waddingtonia floribunda* Phil. = **Nicotiana miersii**J. Remy var. **lychnoides** (J. Remy) Goodsp.

Referencias: Goodspeed, T. H., 1954.

*Withania pulvinata* Dunal = **Lycium ciliatum** Schldl.

Referencias: Bernardello, L. M., 1986.

*Witheringia berteriana* J. Remy = **Solanum crispum**

Ruiz &amp; Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

*Witheringia crispa* (Ruiz & Pav.) J. Remy = **Solanum****crispum** Ruiz & Pav.

Referencias: Del Vitto, L. A. &amp; Petenatti, E. M., 1999a.

*Witheringia diploconos* Mart. = **Solanum diploconos**

(Mart.) Bohs

*Witheringia flexuosa* J. Remy = **Solanum remyanum**

Phil.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Witheringia gaudichaudiana* J. Remy = **Solanum**

**pinnatum** Cav.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Witheringia gayana* J. Remy = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

*Witheringia picta* Mart. = **Athenaea picta** (Mart.) Sendtn.

Referencias: Barboza, G. E. & Hunziker, A. T., 1989; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1966.

*Witheringia pinnata* (Cav.) J. Remy = **Solanum pinnatum** Cav.

*Witheringia ruderalis* J. Remy = **Solanum radicans** L. f.

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

*Witheringia tomatillo* J. Remy = **Solanum crispum** Ruiz & Pav.

Referencias: Knapp, S., 1989.

*Witheringia tomentosa* J. Remy = **Solanum**

**heterantherum** Witasek ex Reiche

Referencias: PBI Solanum project, 2006.

## SPHENOCLEACEAE

1 género, 1 especie introducida.

### **Sphenoclea Gaertn.**

Número de especies: 1 introducida

**Sphenoclea zeylanica** Gaertn.

Referencias: Milano, V. A. & Molinari, E., 1974; Muñoz, J. D., 1996.

Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.

Países: ARG(ERI, FOR, SAL); PRY(CEN).

Ejemplares de referencia: ARG[Muñoz, J. D. 2206 (SI)]; PRY[Zardini, E. M. 36038 (AS, MO)].

## STERCULIACEAE

Autores: Cristóbal, C. L. & Saunders, J. (*Waltheria*)

7 géneros, 69 especies, 16 especies endémicas.

### **Ayenia L.**

Número de especies: 14, 6 endémicas

**Ayenia acalyphifolia** Griseb.

Sin.: *Lorentzia saltenia* Hieron.

Referencias: Cristóbal, C. L., 1960, 1998.

Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(SAL, SDE, TUC); PRY(APY).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 331* (CORD)].

**Ayenia aprica** Cristóbal

Referencias: Cristóbal, C. L., 1960, 1998, 2005.

Subarbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CAU, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI); URY(TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 10037* (LIL)]; BRA[*Palacios, M. A. 1296* (LIL)]; PRY[*Krapovickas, A. 45664* (CTES)]; URY[*Castellanos, A. 17669* (LIL)].

**Ayenia cordobensis** (Hieron.) Hieron.

Sin.: *Lorentzia cordobensis* Hieron.

Referencias: Cristóbal, C. L., 1960, 1998.

Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SJU, SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. J. V. 12304* (CORD, G, LIL)].

*Ayenia echinococca* K. Schum. ex Kuntze = **Byttneria dentata** Pohl

Referencias: Cristóbal, C. L., 1960, 1976.

*Ayenia ekmanii* Cristóbal = **Ayenia mansfeldiana**

(Herter) Herter ex Cristóbal

Referencias: Cristóbal, C. L., 1996a.

**Ayenia eliae** Cristóbal

Referencias: Cristóbal, C. L., 1960, 1998; Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Subarbusto. Nativa. 400–500 m.

Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY).

Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 1356* (LIL)]; PRY[*Degen, R. 2633* (FCQ)].

*Ayenia hirta* auct. non A. St.-Hil. & Naudin = **Ayenia nummularia** Cristóbal

Referencias: Cristóbal, C. L., 1998.

**Ayenia krapovickasii** Cristóbal

Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.

Subarbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).

Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 13093* (FCQ, MO)].

**Ayenia lingulata** Griseb.

Sin.: *Lorentzia saltenia* Hieron. var. *angustifolia* Hieron.

Referencias: Cristóbal, C. L., 1960, 1998.

Subarbusto. Endémica. 700–1600 m.

Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1312* (LIL)].

**Ayenia magna** L.

Referencias: Cristóbal, C. L., 1960; Dorr, L. J., 1999.

Subarbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(APY).

Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 12699* (LIL)].