

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**



agrositos

Σπόροι για μεγάλες αποδόσεις

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ • ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

www.agrositos.gr



SCAN ME



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η AGROSITOS A.E. ιδρύθηκε το 2010 και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων γύρω από τον γεωργικό τομέα. Ξεκίνησε με κύρια δραστηριότητα την εμπορία δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη) και το 2012 επεκτάθηκε και στον τομέα της σποροπαραγωγής. Πλέον, η εταιρία μας κατέχει αποκλειστικές ποικιλίες σε σιτάρι σκληρό, σιτάρι μαλακό, κριθάρι, βίκο, κτηνοτροφικό μπιζέλι και κτηνοτροφικό κουκί. Το 2014, άρχισε να κάνει σημαντικά βήματα και στον τομέα των εξαγωγών κυρίως σε χώρες όπως η Κύπρος και η Ιταλία.

Σε εθνικό επίπεδο, η AGROSITOS A.E. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Σιτηρών και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την πάροδο των χρόνων η εταιρία ανέπτυξε συνεργασίες με μερικούς από τους μεγαλύτερους σποροπαραγωγικούς οίκους ανά τον κόσμο και πλέον έχει εδραιωθεί στον συγκεκριμένο κλάδο.

Επίσης, η AGROSITOS A.E. πραγματοποιεί συμβολαιακή καλλιέργεια (σύμβαση) με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Amstel, Heineken), τη μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα στον τομέα της ζυθοποιίας. Με πληθώρα παρόμοιων συνεργασιών, γεννήθηκε η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας κι έτσι η AGROSITOS A.E. έχει πλέον ένα σύγχρονο σποροκαθαριστήριο καθώς και μηχάνημα επένδυσης σπόρου. Οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτείνονται επιπλέον και στον τομέα των κτηνοτροφικών φυτών με ένα ευρύ φάσμα ποικιλιών (Sorghum, Lolium, Alfalfa, Setaria Italica, Pennisetum Glaucum) κ.α.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία δραστηριοποιείται και στο χώρο της θρέψης, παράγοντας μια πλήρη σειρά διαφυλλικών λιπασμάτων για όλες τις καλλιέργειες, έτσι ώστε να υποστηρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.

Προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας με ποιότητα, συνέπεια και ειλικρίνεια.

► ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

- Σελ. 3-4 Σκληρό Σιτάρι
- Σελ. 5-6 Μαλακό Σιτάρι
- Σελ. 7 Τριτικάλε
- Σελ. 7 Βρώμη
- Σελ. 8 Σίκαλη

► ΨΥΧΑΝΘΗ

- Σελ. 8 Βίκος
- Σελ. 9 Κτηνοτροφικό Μπιζέλι
- Σελ. 10 Κτηνοτροφικό Κουκί
- Σελ. 10 Λούπινο (Γλυκό)

► ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

- Σελ. 11 Μηδική
- Σελ. 11-12 Τριφύλλι
- Σελ. 13 Λόλιο
- Σελ. 14 Festolium
- Σελ. 14 Δακτυλίδα
- Σελ. 14 Φεστούκα
- Σελ. 14 Σούλα
- Σελ. 14 Ονοβρυχίδα
- Σελ. 15-16 Κτηνοτροφικά Μείγματα

► ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

- Σελ. 17 Πεννίζετο
- Σελ. 17 Κεχρί
- Σελ. 18 Σόργο
- Σελ. 19 Καλλιέργειες κάλυψης δενδρώνων
- Σελ. 19 Μουστάρδα
- Σελ. 19 Φυτά με νηματοδοκτόνο δράση
- Σελ. 20 Καλαμπόκι

► ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ

- Σελ. 21-31 Γκαζόν



▶ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (TRITICUM DURUM)

ΖΩΗ (ΖΟΙ)

Σταθερότητα Simeto και ποσότητα Μεξικάλι-81

- ▶ Γενεαλογία/Pedigree: **Simeto x Μεξικάλι - 81**
- ▶ Νέα ποικιλία του Ινστιτούτου Σιτηρών και Βάμβακος
- ▶ Πολύ πρώιμη
- ▶ Υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά
- ▶ Ασύγκριτη σταθερότητα αποδόσεων
- ▶ Ιδανική για περιοχές της χώρας με ξηροθερμικές συνθήκες
- ▶ Έτος εγγραφής ποικιλίας: 2011

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| • ΣΤΑΧΥΣ: | Πυραμοειδής, συμπαγής με λευκά άγανα |
| • ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ: | Ανοιχτό κεχριμπαρένιο |
| • ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: | Πολύ Πρώιμη |
| • ΑΔΕΛΦΩΜΑ: | Καλό |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: | Μεγάλη |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 3 ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ: | Ανθεκτική |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: | Καλή |
| • ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: | Πολύ Καλή |
| • ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: | Ευρεία |
| • ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ: | 40 gr |
| • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: | Ανοιξιόατική |
| • ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: | Νοέμβριος (Α' & Β' 10ήμερο) |
| • ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: | 18-20kg/στρ. |

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|-------------------------------|------|
| • ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ: | 90% |
| • ΠΡΩΤΕΪΝΗ % (P) (NX5,7): | 14,7 |
| • ΧΡΩΣΤΙΚΗ ppm (Β-ΚΑΡΟΤΙΝΙΟ): | 7,51 |
| • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ: | 93,4 |



CESARE

Ο βασιλιάς της ποιότητας

- ▶ Γενεαλογία/Pedigree: **Iride x Orobel**
- ▶ Μεσο-όψιμη
- ▶ Ιταλική ποικιλία
- ▶ Εξαιρετική και σταθερή ποιότητα
- ▶ Άριστη αντίσταση στο πλάγιασμα
- ▶ Ανθεκτικότητα στις κοινές ασθένειες του σιταριού
- ▶ Σπόρος με υψηλό ειδικό βάρος και άριστη ποιότητα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: | Μεσο-όψιμη ποικιλία |
| • ΑΔΕΛΦΩΜΑ: | Μέτριο |
| • ΥΨΟΣ: | Μέσο |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: | Υψηλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: | Πολύ καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΩΪΔΙΟ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ: | Υψηλή |
| • ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ: | 45 -50 gr |
| • ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: | 22-23κιά/στρ. |

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| • ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: | Εξαιρετικό |
| • ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ: | Εξαιρετικό |
| • ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ: | Υψηλή (εώς 18%) |
| • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ: | Υψηλή |



Γενεαολογία/Pedigree: **Claudio X Saragolla****ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

• ΥΨΟΣ:	Μεσαίο
• ΣΤΑΧΥΣ:	Μεγάλο
• ΑΓΑΝΟ:	Λευκό
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Μεσο-πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:	Υψηλό
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Ανθεκτικό
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:	Ανθεκτικό
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ:	Ανθεκτικό
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:	Ανθεκτικό
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ:	Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ:	Πολύ Καλή
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Ανοιξιότικη
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:	τέλος Οκτώβρη- αρχές Νοέμβρη
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	20-22kg / στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:	82-84 kg/hl
• ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ:	50-52g
• YELLOW INDEX:	22-24
• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ:	Πολύ Καλό
• ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ:	Υψηλή

**ΜΕΞΙΚΑΛΙ - 81 (MEXICALI - 81)****Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά**

- ▶ Ποικιλία πολύ υψηλής απόδοσης
- ▶ Ίσως η πιο παραγωγική ποικιλία στην Ελλάδα
- ▶ Άριστη προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΥΨΟΣ:	Μέτρια
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Πολύ Πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:	Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Μεγάλη
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:	Μέτρια
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 3 ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:	Ανθεκτική
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:	Μέτρια
• ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:	Καλή
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Ευρεία
• ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ:	44gr
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Ανοιξιότικη
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:	Πρώτο 15ήμερο Νοεμβρίου
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	18-20kg/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΑΛΩΔΩΝ:	67%
• ΠΡΩΤΕΪΝΗ % (P) (NX5,7):	13,5
• ΧΡΩΣΤΙΚΗ ppm (B-KAROTINIO):	5,8

▶ **ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ** (*TRITICUM AESTIVUM*)**BELLINI****Μαλακό για όλες τις χρήσεις**

- ▶ Γενεαλογία/Pedigree: **Serio x Isengrain**
- ▶ Νέα Ιταλική ποικιλία
- ▶ Έχει στάχυ με άγανο
- ▶ Ανθεκτική στον παγετό, την ξηρασία και τις ασθένειες
- ▶ Άριστο εκατολιτρικό βάρος

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| • ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ: | Μεσαίο |
| • ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: | Μέσου βιολογικού κύκλου |
| • ΑΓΑΝΟ: | Μακρύ, Λευκό |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: | Πολύ Καλή |
| • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ: | Καλή |
| • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΚΩΡΙΑΣΗ: | Καλή |
| • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ: | Πολύ Καλή |
| • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ: | Πολύ Καλή |
| • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ: | Άριστη |
| • ΒΑΡΟΣ 1000 ΣΠΟΡΩΝ: | 39-44 gr |
| • ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: | 20-22 κιλά/στρ. |

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ: | Λευκό |
| • ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: | Άριστο |
| • ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: | Μέσο-Σκληρό |

ALEPPO**Άριστη αρτοποιητική ικανότητα****ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ: | Μεσαίο |
| • ΣΤΑΧΥΣ: | Με Άγανο |
| • ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΟΥ: | Λευκό |
| • ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: | Οκτώβριος-Ιανουάριος |
| • ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: | Μέσο-πρώιμη |
| • ΑΔΕΛΦΩΜΑ: | Πολύ Καλό |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: | Καλή |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ: | Ανθεκτικό |
| • ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ: | Ανθεκτικό |
| • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ: | Καλή |
| • ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ: | Πολύ Καλή |

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: | 81-83 kg/hl |
| • ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ: | 34-37g |
| • ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: | Σκληρό |
| • ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ: | Υψηλή |

ΒΕΡΓΙΝΑ (Παλιό νούμερο Γ84) (VERGINA)

Ο ήλιος του μαλακού

- ▶ Πολύ ανθεκτική στον παγετό
- ▶ Κατάλληλη για τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές
- ▶ Έχει στάχυ χωρίς άγανο
- ▶ Παρουσιάζει πολύ υψηλή παραγωγικότητα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΥΨΟΣ:	100±10 CM
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Μεσο-πρώιμη
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:	Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:	Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:	Μέτρια
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:	Πολύ καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:	Ανθεκτική
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Καλή
• ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΩΝ ΚΟΚΚΩΝ:	36±5 gr.
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	20 κιλά/στρ.
• ΑΠΟΔΟΣΗ:	550±60 κιλά/στρ.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:	70,5
• ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (N X 5,7):	12,5 ± 0,5
• Zeleny test (Τιμή καθίζησης):	19 ± 2
• ΒΑΛΟΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ:	38 ± 2
• ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:	Μέτρια



ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ELISAVET)

Η Ποιότητα στο μαλακό

- ▶ Νέα ποικιλία του Ινστιτούτου Σιτηρών και Βάμβακος
- ▶ Πολύ ανθεκτική στον παγετό, την ξηρασία και τις ασθένειες
- ▶ Έχει στάχυ με άγανο
- ▶ Παρουσιάζει πλούσιο αδελφωμα
- ▶ Άριστη αρτοποιητική ικανότητα.
- ▶ Ιδανική ποικιλία για ενσίρωση

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΥΨΟΣ:	Μέτριο (90 ± 10 εκ)
• ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:	Πρώιμο
• ΑΔΕΛΦΩΜΑ:	Πλούσιο
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΩΙΔΙΟ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ:	Πολύ Καλή
• ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΤΙΑΣΗ:	Πολύ Καλή
• ΒΑΡΟΣ 1000 ΚΟΚΚΩΝ:	35 ± 3 gr.
• ΑΠΟΔΟΣΗ:	550 ± 60 κιλά/ στρ.
• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:	Ευρεία
• ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:	18 κιλά/στρ
• ΕΔΑΦΟΣ:	Σε όλους τους τύπους εδαφών

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• ΧΡΩΜΑ ΣΠΟΡΟΥ:	Κόκκινο
• ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:	78-80
• ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (N X 5,7):	15 ± 2
• Zeleny test (Τιμή καθίζησης):	38 ± 4
• ΒΑΛΟΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ:	52 ± 3
• ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:	Άριστη



▶ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ (TRITICOSECALE)

ΑΛΚΜΗΝΗ (ALKMINI)



Απόλυτη παραγωγή με άριστη ποιότητα

- ▶ Γενεαλογία/Pedigree: **Triticale x Triticosecale Wittmack**
- ▶ Αγανοφόρος ποικιλία, με δυνατό καλάμι
- ▶ Πολύ πρώιμη
- ▶ Πολύ υψηλές και σταθερές αποδόσεις
- ▶ Σπόρος μεγάλος που γεμίζει καλά
- ▶ Είναι κατάλληλη για αρτοποιήση και πολύ καλή ως ζωοτροφή
- ▶ Άριστη για βιοαέριο λόγω της υψηλής παραγωγής βιομάζας
- ▶ Κατάλληλη για ενσίρωση

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΥΨΟΣ:
 - ΣΤΑΧΥΣ:
 - ΜΗΚΟΣ ΣΤΑΧΥ:
 - ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ:
 - ΑΔΕΛΦΩΜΑ:
 - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ:
 - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ:
 - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ:
 - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:
 - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
 - ΒΑΡΟΣ 1.000 ΚΟΚΚΩΝ:
 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:
 - ΚΑΤΑΜΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:
 - ΑΠΟΔΟΣΗ:
 - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ:
- Υψηλή
Μέτριος,
συμπαγής
Μακρύς (12-15 cm)
Πολύ πρώιμη
Πλούσιο
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Άριστη
Ειδική στα φτωχά και
όξινα εδάφη
43±2
Ανοιξιάτικη
Φθινοπωρινή-
Ανοιξιάτικη
**Πολύ υψηλή (+15%
των μαρτύρων, έως
780 kg)**
18-20 kg/στρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 76,0±2
- ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (N X 5,7): 13,5±0,5



▶ ΒΡΩΜΗ (AVENA SATIVA)

FULVIA

- ▶ Κόκκινη, δίκλωνη βρώμη υψηλής απόδοσης
- ▶ Μεγάλη αντοχή στην ξηρασία και στο πλάγιασμα
- ▶ Κατάλληλη για βόσκηση, ενσίρωση και παραγωγή καρπού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ: Πολύ πρώιμη
- ΥΨΟΣ: 85-90cm
- ΑΔΕΛΦΩΜΑ: Πλούσιο
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΜΑ: Πολύ Καλή
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ: Καλή
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ: Πολύ Καλή
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Καλή
- ΑΠΟΔΟΣΗ: Υψηλή
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ευρεία
- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ: 16-18kg/στρ
- ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 46-48 gr
- ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΩΝ ΚΟΚΚΩΝ: 34-36 gr.
- ΠΡΩΤΕΪΝΗ: 15-16%



▶ ΣΙΚΑΛΗ (SECALE CEREALE)

SITO 70



- ▶ Πρώιμη ποικιλία
- ▶ Ποικιλία με εξαιρετικά αγρονομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά
- ▶ Ανθεκτική στο ψύχος, στα αλατούχα εδάφη και στα χαμηλά Ph
- ▶ Εκμεταλλεύεται πολύ φτωχά εδάφη
- ▶ Κατάλληλη για άχυρο, χλωρή χορτονομή και ενσίρωση
- ▶ Πλούσιο αδέλφωμα
- ▶ Υψηλή παραγωγικότητα
- ▶ **Μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα ύψος**

ΨΥΧΑΝΘΗ

▶ ΒΙΚΟΣ (VICIA SATIVA)

MILUKA

▶ Υψηλή θρεπτική αξία σανού

- Χώρα προέλευσης: Ιταλία
- Άνθος: Βιολετί
- Ύψος: Ψηλή
- Πρωιμότητα: Μέσου βιολογικού κύκλου
- Προσαρμοστικότητα: Σε όλα τα εδάφη της Ελλάδας
- Κλιματική αντοχή: Κουφόβραση, κρύο και ξηρασία
- Αντοχή στον παγετό: Πολύ καλή
- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο- Άνοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 13-15 κιλά/στρ για καρπό
15-17 κιλά/στρ για σανό
- Χρήση: Βόσκηση, σανό, ενσίρωση και καρπό
- Απόδοση σε καρπό: 150 - 250 kg/στρ.
- Απόδοση σε σανό: Έως 1000 kg/στρ.
- Συσκευασία: 30-40 kg



ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDAS)

- Γενεαλογία/ pedigree: Armandes x Girlag
- Έτος εγγραφής ποικιλίας: 2016
- Άνθος: Ανοιχτό βιολετί
- Χρώμα σπόρου: Γκρι-καφέ
- Πρωιμότητα: Πολύ πρώιμη
- Κύκλος ωρίμανσης: Μεσο-πρώιμη
- Προσαρμοστικότητα: Άριστη
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Πολύ καλή
- Αντοχή στον παγετό: Καλή
- Παραγωγικότητα: Υψηλή παραγωγή σανού και καρπού
- Βάρος 1000 κόκκων: 43 - 51γρ.
- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο- Άνοιξη
- Ποσότητα σπόρου: 14-16 κιλά/στρ για καρπό
16-18 κιλά/στρ για σανό
- Χρήση: Παραγωγή σανού και καρπού
- Απόδοση σε καρπό: Έως 250 kg/στρ.
- Απόδοση σε σανό: 600-700 kg/στρ.
- Συσκευασία: 30-40 kg



▶ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ (*PISUM SATIVUM*)

ANDREA

- Χώρα προέλευσης: Τσεχία
- Άνθος βιολετί
- Εξαιρετικά παραγωγική ποικιλία
- Μέσος βιολογικός κύκλος
- Ταχεία ανάπτυξη
- Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος (**έως -18°C**)
- Χρώμα σπόρου καφέ-πράσινο
- Εποχή σποράς: Φθινόπωρο και Άνοιξη
- Ποσότητα Σπόρου: 14-16 kg/στρ. για καρπό
- Ποσότητα Σπόρου: 16-18 kg/στρ. για σανό
- Απόδοση σε καρπό: Έως 180-270 kg/στρ.
- Απόδοση σε σανό: 700-900 kg/στρ.
- Χρήση για σανό, ενσίρωση και καρπό
- Συσκευασία: Σάκος 30/40kg



ΔΩΔΩΝΗ (*DODONI*)

- Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
- Μέση στρεμματική απόδοση :800-1.000Kg σανό / στρ (ξηρικά χωράφια)
- Υψηλές αποδόσεις έως 300Kg/στρ σε καρπό
- Εποχή σποράς : Εναλλακτική Οκτώβριο-Νοέμβριο νωρίς την άνοιξη
- Συνιστώμενη ποσότητα σποράς : 16-18Kg/στρ (σανό)
- Συνιστώμενη ποσότητα σποράς : 14-16Kg/στρ (καρπό)
- Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη
- Αντοχή στον παγετό :έως -18o C
- Αντοχή στο πλάγιασμα
- Αντοχή στην ξηρασία: Μέτρια
- Αντοχή στο ωίδιο, τη σεπτορίαση, τη καστανή σκωρίαση και τη φουζαρίωση
- Χρώμα άνθους: Μωβ
- Ύψος : έως 155cm
- Βάρος 1000 κόκκων: 90-100gr
- Σε ευνοϊκές συνθήκες βλάστησης αναπτύσσει πλούσια φυτομάζα
- Άριστη προσαρμοστικότητα στις ελληνικές συνθήκες
- Χρησιμοποιείται για την παραγωγή σανού μετά από καλλιέργεια με διάφορα σιτηρά
- Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία



▶ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ (*VICIA FABA*)ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ (*POLYKARPI*)

- Ποικιλία σταθερή και παραγωγική σε καρπό
- Πρώιμη ποικιλία
- Ο σπόρος της είναι μαύρος, μικρού μεγέθους
- Σπέρνεται με τις συμβατικές σπαρτικές μηχανές το χειμώνα
- Εποχή σποράς: Οκτώβριο - Νοέμβριο
- Ποσότητα σπόρου: 12-15kg/στρ.
- Κατάλληλο Ρh εδάφους: Ουδέτερα και Αλκαλικά
- Συμπυκνωμένη πρωτεϊνούχα ζωτροφή για τα σιτηρέσια
- Αντικαθιστά πλήρως την σόγια στα σιτηρέσια με εκπληκτικά αποτελέσματα
- Πρωτεϊνικό περιεχόμενο: **έως 33%**
- Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο ψύχος και την ασθένεια σκληρωτίνα
- Ανθεκτική στο ψύχος και την ξηρασία.
- Ορθόκλαδη με ισχυρό στέλεχος (Αντοχή στο πλάγιασμα και εύκολη μηχανική συγκομιδή)
- Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αυξάνει το υπολειμματικό άζωτο
- Βάρος 1.000 σπόρων 300-320 γραμμάρια
- Μέση απόδοση 250 κιλά/στρ
- Χρήσεις: Παραγωγή καρπού, παραγωγή σανού, συγκαλλέργεια με διάφορα σιτηρά, χλωρά λίπανση

▶ ΓΛΥΚΟ ΛΟΥΠΙΝΟ (*LUPINUS ALBUS*)

- Πρώιμη ποικιλία
- Λευκά άνθη
- Σπέρνεται με τις συμβατικές σπαρτικές μηχανές το χειμώνα
- Εποχή σποράς: Σεπτέμβριο - Οκτώβριο
- Ποσότητα σπόρου: 13-15 kg/στρ.
- Ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες (Έως -10°C)
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (33,5%)
- Περιεκτικότητα σε αλκαλοειδή <0,02%
- Κατάλληλο pH=6,5 (Ωστόσο, μπορεί να καλλιεργηθεί σε εδάφη από 6-7,5)
- Ανθεκτικό στην ξηρασία
- Συνίσταται ο εμβολιασμός με Bradyrhizobium lupine, ειδικά σε χωράφια που δεν έχει καλλιεργηθεί πρόσφατα.
- Είναι εύγεστο ως ζωτροφή
- **Μπορεί να καταναλωθεί άμεσα από τα ζώα δίχως επεξεργασία**
- Μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την σόγια στα σιτηρέσια



► ΜΗΔΙΚΗ (*MEDICAGO SATIVA*)

RIVIERA VICENTINA

- Συντελεστής ληθάργου: 7
- Πρώιμη ποικιλία
- Πλούσιο φύλλωμα και λεπτό στέλεχος (βλαστός)
- Μεγάλη διάρκεια παρουσίας της στο χωράφι (5-6 χρόνια)
- Υψηλός ρυθμός αναβλάστησης κατά την περίοδο της Άνοιξης
- Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος και στις ξηροθερμικές συνθήκες
- Ανθεκτικότητα στις ασθένειες
- Όρθια ανάπτυξη
- Πλούσια φυλλική επιφάνεια
- Γρήγορη αναβλάστηση
- Κατάλληλη για χλωρή χορτονομή και ενσίρωση
- Υψηλή παραγωγικότητα, ακόμη και μετά από συχνές κοπές
- Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα
- Ποσότητα σπόρου σποράς: 2,5-3,5 kg/στρέμμα
- Συσκευασία: Σάκος 10/20/25kg



VENICE

- Συντελεστής ληθάργου: 6
- Μεσοπρώιμη ποικιλία
- Μεγάλη διάρκεια στο χωράφι
- Υψηλός ρυθμός αναβλάστησης και γρήγορο φύτρωμα την Άνοιξη
- Μέγεθος κεντρικού φύλλου: 18-33mm
- Εξαιρετική απόδοση
- Αντοχή σε νηματώδεις
- Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος.
- Ανθεκτικότητα σε όλες τις ασθένειες.
- Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
- Υψηλή πεπτικότητα χάρη στο πολύ λεπτό στέλεχος
- Μικρή απώλεια φυλλώματος κατά το στέγνωμα
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες φυτικές ίνες
- Κατάλληλο για βόσκηση, άχυρο και ενσίρωση.
- Ποσότητα σπόρου σποράς: 2,5-3,5 kg/στρέμμα
- Συσκευασία: Σάκος 10/20/25kg



► ΤΡΙΦΥΛΛΙ (*TRIFOLIUM SPP.*)

ΛΕΥΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ή ΕΡΠΟΝ (*TRIFOLIUM REPENS*)

- Έρπουσα ανάπτυξη
- Πολυετές φυτό (3-4 έτη)
- Προτιμά υγρές και δροσερές περιοχές
- Αντοχή στο κρύο
- Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών
- pH=5-8
- Πυκνό φύλλωμα
- Ανθεκτικό στη βόσκηση
- Σπόρος σποράς: 3,5kg/στρ.



ΛΕΙΜΩΝΙΑ ΦΥΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ RED CLOVER (*TRIFOLIUM PRATENSE*)

- Πολυετής καλλιέργεια (3 χρόνια)
- Γόνιμα εδάφη
- pH = 6,0 - 7,5, αντέχει όμως και σε πιο όξινα εδάφη, αρκεί να υπάρχει επάρκεια ασβεστίου στο έδαφος.
- Για βόσκηση, ενσίρωμα και σανό
- Σπόρος σποράς: 2,5 - 3,5 kg/στρ.



CRIMSON ΤΡΙΦΥΛΛΙ (*TRIFOLIUM INCARNATUM*)

- Ετήσια καλλιέργεια
- Για εύκρατα κλίματα και βορειότερα, αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -20°C)
- Πηλώδη εδάφη
- pH = 5,5 -7,5
- Σπόρος σποράς: 3-3,5 kg/στρ.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ (*TRIFOLIUM ALEXANDRINUM*)

- Ετήσια καλλιέργεια
- Ευπαθές στο ψύχος
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία
- Δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δυο ή περισσότερες κοπές
- Αντοχή στην ξηρασία
- Βαθιά εδάφη μέσης σύστασης
- Για αργιλώδη και αλκαλικά εδάφη
- pH = 6,0 - 8,0
- Σπόρος σποράς: 3kg/στρ.
- Περίοδος σποράς : Άνοιξη και φθινόπωρο
- 2-3 κοπές στην ξηρική καλλιέργεια
- 4-5 κοπές στην αρδευόμενη καλλιέργεια



ΠΕΡΣΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ (*TRIFOLIUM RESUPINATUM*)

- Ετήσιο φυτό
- Αντέχει αρκετά στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, γι' αυτό συνιστάται η καλλιέργειά του στις βοριότερες και ψυχρότερες περιοχές της χώρας μας
- Προσαρμόζεται σε βαριά και υγρά εδάφη.
- pH > 6,5 αλλά αναπτύσσεται ικανοποιητικά και σε ελαφρώς όξινα εδάφη (pH 5,5-5,7)
- Για αργιλώδη εδάφη
- Σπόρος Σποράς: 2-3kg/στρ.



▶ ΛΟΛΙΟ (*LOLIUM SPP.*)ΛΟΛΙΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ (*LOLIUM PERENNE*)**Ποικιλίες: Temprano
Nui**

- Πολυετής καλλιέργεια
- Κατάλληλη για βοσκή, σανό
- Αντοχή στο κρύο
- Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
- Εύγεστη για ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
- Γρήγορη αναβλάστηση
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδαφών
- Σπόρος σποράς: 5kg/στρ.

ΛΟΛΙΟ ΥΒΡΙΔΙΟ
(*LOLIUM PERENNE X LOLIUM MULTIFLORUM*)**Ποικιλία: Rusa**

- Συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις του μονοετούς Λόλιου τα πρώτα 2 χρόνια
- Διαρκεί για 3-4 χρόνια.
- Άριστη ποιότητα ζωοτροφής

ΛΟΛΙΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ
(*LOLIUM MULTIFLORUM*)**Ποικιλίες: Grazer Nova
Estanzuella**

- **Διπλοειδής ποικιλία**, πρώιμη με μικρό βιολογικό κύκλο
- Μονοετής καλλιέργεια
- Εξαιρετικά γρήγορη εγκατάσταση καλλιέργειας
- Κατάλληλη για σανό και βόσκηση
- Αντοχή στο κρύο
- Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
- Εύγεστη για τα ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
- Μεγάλη απόδοση, ειδικά στην πρώτη κοπή
- Σπόρος σποράς: 5kg/στρ.

ΛΟΛΙΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ
(*LOLIUM MULTIFLORUM*)**Ποικιλίες: Attain
Koga**

- **Τετραπλοειδής ποικιλία**, μεσο-όψιμη με μεγαλύτερο βιολογικό κύκλο
- Μονοετής καλλιέργεια
- Ανθεκτικότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
- Μεγάλο μέγεθος φύλλων και στελέχους, μεγαλύτερη απόδοση
- Κατάλληλη για βοσκή, σανό και κυρίως για ενσίρωση
- Ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες
- Εύγεστη για τα ζώα με υψηλή θρεπτική αξία
- Μεγάλη απόδοση, ειδικά στην πρώτη κοπή
- Σπόρος σποράς: 5kg/στρ.

ΦΕΣΤΟΛΟΛΙΟ (*FESTOLOLIUM*)

Ποικιλία: Perun

- Υβρίδιο (διασταύρωση) κτηνοτροφικής Φεστούκας και Λόλιου
- Χρησιμοποιείται σε μείγματα ή και μόνο του, σε βοσκοτόπια και λειμώνες
- Έχει μεγαλύτερη απόδοση σε παραγωγή χορτονομής σε σύγκριση με το πολυετές Λόλιο (έως και 25%) και ταυτόχρονα διατηρεί όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματά του.
- Εξαιρετική αντοχή στο ψύχος.
- Ανθεκτικότητα σε όλες τις ασθένειες.
- Υψηλή θρεπτική αξία και γευστικότητα.
- Κατάλληλο για βόσκηση, άχυρο και ενσίρωση.
- Ποσότητα σπόρου σποράς: 4-5kg / στρέμμα



ΔΑΚΤΥΛΙΑΔΑ (*DACTYLIS GLOMERATA*)

Ποικιλία Donata

- Αγροστώδες
- Φθινοπωρινή σπορά (Μέσα Σεπτεμβρίου - Οκτώβριος)
- 7 χρόνια διάρκεια
- Αντέχει στην αλατότητα του εδάφους.
- Ιδανικό για χορτονομή
- Αντοχή σε κρύο κλίμα και ξηρασία.
- Χρησιμοποιείται για σανό και βόσκηση
- Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ.



ΦΕΣΤΟΥΚΑ (*FESTUCA ARUNDINACEA*)

Ποικιλία: Kora

- Το πιο ανθεκτικό στην ξηρασία από όλα τα χορτονομικά αγροστώδη
- Ανοιξιάτικη σπορά - τέλη Μαρτίου
- Φθινοπωρινή σπορά μόνο για παραγωγή σπόρου
- Σαν επίσπορη καλλιέργεια από ψυχανθή.
- Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ.



ΣΟΥΛΑ (*SULLA CORONARIA*)

Ποικιλία: Bellante

- Για βαλτώδη, αμμοαργιλώδη εδάφη
- Βοηθάει πολύ στη δομή του εδάφους
- Προτείνεται για αμειψισπορά με σιτηρά
- Το 2ο χρόνο πιο παραγωγικό
- Να κόβεται πριν την άνθηση για να μην αναπτύσσονται πολύ τα αγκάθια στο στέλεχος
- Όχι σε ξηρές περιοχές
- Ποσότητα σποράς: 3-4kg/στρ. την άνοιξη.



ΟΝΟΒΡΥΧΙΑΔΑ (*ONOBRYCHIS VICIIFOLIA*)

- **Συνίσταται για άλογα και βοοειδή**
- Πολυετές ψυχανθές
- Ισχυρό ριζικό σύστημα
- Όρθιας έκφυσης
- Ύψος 60-80 cm, με κούφια στελέχη
- Ανθεκτική σε κρύο, ζέστη καθώς και σε υγρασία και ξηρασία
- Ελαφριά και πηλώδη εδάφη
- Αντοχή σε κρύο, ζέστη, υγρασία και ξηρασία
- Διετής καλλιέργεια
- Κατάλληλη για βόσκηση και σανό
- 5 kg ανά στρέμμα αναποφλοιώτο σπόρο
- 8 kg ανά στρέμμα αναποφλοιώτο σπόρο



▶ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ - ΠΟΛΥΕΤΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.20

- Πολυετές μείγμα
- Μείγμα αγροστωδών και ψυχανθών σπόρων με φεστούκα, λόλιο πολυετές, λόλιο ετήσιο, κοινό τριφύλλι, αγριοτριφύλλο τριφύλλι, κόκκινο τριφύλλι, λευκό τριφύλλι
- Παραγωγή για σανό και ενσίρωση
- Απαραίτητη η άρδευση της καλλιέργειας
- Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο/ Άνοιξη
- **Ποσότητα σπόρου: 6-7 kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.20
15%	LOIETTO IBRIDO
20%	FESTUCA ARUNDINACEA
30%	LOIETTO PERENNE
20%	LOIETTO ITALICO
7,5%	FLEOLO PRATENSE
2,5%	TRIFOGLIO PRATENSE
2,5%	TRIFOGLIO B.REPENS
2,5%	GINESTRINO

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Ν.26

- Πολυετές Μείγμα
- Χρησιμοποιείται για βόσκηση και σανό
- Ιδανικό για Πρόβατα αλλά κατάλληλο και για αγελάδες
- Κατάλληλη περίοδος σποράς: Φθινόπωρο/Άνοιξη
- **Ποσότητα σπόρου: 7-8kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.26
15%	LOIETTO PERENNE
20%	LOIETTO RIGIDO
15%	FESTUCA ROSSA
22%	FESTUCA ARUNDINACEA
10%	FLEOLO PRATENSE
5%	FESTUCA OVINA
4%	GINESTRINO
2%	TRIFOGLIO B.REPENS
7%	LUPINELLA IN GUSCIO



ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΞΗΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.30

- Πολυετές μείγμα
- Μείγμα αγροστωδών και ψυχανθών σπόρων με φεστούκα, λόλιο πολυετές, λόλιο ετήσιο, δακτυλίδα, ονοβρυχίδα, κόκκινο τριφύλλι, λευκό τριφύλλι
- **Αντοχή στην Ξηρασία**, κατάλληλο για έδαφος με χαμηλή διαθεσιμότητα νερού
- Παραγωγή για σανό
- Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο/ Άνοιξη
- **Ποσότητα σπόρου: 6-7 kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΞΗΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.30
10%	LOIETTO IBRIDO
20%	LOIETTO PERENNE
15%	LOIETTO ITALICO
25%	FESTUCA ARUNDINACEA
5%	ERBA MAZZOLINA
7,5%	FLEOLO PRATENSE
2,5%	TRIFOGLIO B.REPENS
2,5%	TRIFOGLIO PRATENSE
10%	LUPINELLA IN GUSCIO
2,5%	GINESTRINO

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ Ν.27

- Πολυετές μείγμα
- Χρησιμοποιείται για σανό και βόσκηση
- Γρήγορη εγκατάσταση στο χωράφι
- Άφθονη προσφορά υψηλής ποιότητας τροφή
- Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Άνοιξη
- **Ποσότητα σπόρου: 7-8kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ν.27
15%	LOIETTO IBRIDO
25%	FESTUCA ARUNDINACEA
10%	ERBA MAZZOLINA
35%	LOIETTO PERENNE
15%	FLEOLO PRATENSE

▶ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ - ΠΟΛΥΕΤΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ Ν.24

- Πολυετές μείγμα
- Κατάλληλο για βόσκηση και σανό
- Πολύ ανθεκτικό στο πάτημα
- Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Άνοιξη
- **Ποσότητα σπόρου: 10 kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ Ν.24
40%	LOIETTO PERENNE
40%	FESTUCA ARUNDINACEA
10%	ERBA MAZZOLINA
5%	POA PRATENSIS
5%	ERBA CAPRIOLA (Cynodon Dactylon)

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗ Ν.25

- Πολυετές μείγμα
- Ιδανικό για βοσειδή και πρόβατα
- Κατάλληλο για βοσκότοπους
- Πολύ ανθεκτικό στο πάτημα και στην βόσκηση
- Περίοδο σποράς: Φθινόπωρο /Άνοιξη
- **Ποσότητα σπόρου: 8-9 kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 5/10/20kg

%	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗ Ν.25
10%	LOIETTO IBRIDO
35%	LOIETTO PERENNE
20%	FESTUCA ARUNDINACEA
14%	FLEOLO PRATENSE
2%	TRIFOGLIO PRATENSE
5%	ERBA MAZZOLINA
2%	TRIFOGLIO B.REPENS
10%	LUPINELLA IN GUSCIO
2%	GINESTRINO



▶ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΕΤΗ

BARALDO

- Μονοετές Μείγμα
- Κατάλληλο για σανό και βόσκηση
- Κατάλληλο για αγελάδες και αιγοπρόβατα
- Περιέχει: Σίκαλη, Βίκο, Τριφύλλι Ινκαρνατουμ, Τριφύλλι Αλεξανδρινό
- Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο
- **Ποσότητα σπόρου: 5-6kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 20/25kg

%	BARALDO
40%	SEGALE
25%	VECCIA
15%	TRIF. INCARNATO
20%	TRIF. ALESSANDRINO/SQUARROSO

FRAVELO

- Μονοετές Μείγμα
- Κατάλληλο για ενσίρωμα
- Κατάλληλο για αγελάδες και αιγοπρόβατα
- Περιέχει: Λόλιο Τετραπλοειδές, Βρώμη, Σιτάρι για ενσίρωμα
- Κατάλληλη εποχή σποράς: Φθινόπωρο
- **Ποσότητα σπόρου: 10-12kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 20/25kg

%	FRAVELO
45%	FRUMENTO MUTICO
36%	AVENA (MAX POSEIDON)
13%	AVENA (m77)
6%	LOIETTO ITA. TETRAPLOIDE, TARDIVO

AGROSITOS

- Μονοετές μείγμα
- Μείγμα με υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόμενο
- Ιδανικό για ζωοτροφή
- Φθινοπωρινή σπορά
- Κατάλληλο για σανό, βόσκηση και ενσίρωση
- **Ποσότητα σπόρου: 8-11kg/στρ.**
- Συσκευασία: Σάκος 25kg

%	AGROSITOS
36%	LOIETTO
19%	AVENA
15%	TRIF. ALESSANDRINO
15%	TRIF. INCARNATUM
11%	FRUMENTO MUTICO
4%	VECCIA

ΠΕΝΝΙΖΕΤΟ (*PENNISETUM GLAUCUM*)

- Χώρα προέλευσης: Νότια Αφρική
- Μικρός βιολογικός κύκλος (**60 ημερών**)
- Ποικιλία που προέρχεται από την υποτροπική ζώνη με **μεγάλη ανθεκτικότητα στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες**
- Σε ευνοϊκές συνθήκες μπορούμε να πάρουμε έως 3 κοπές
- **Αν κοπεί στο σωστό ύψος (60-70cm) μπορούμε να πετύχουμε την μέγιστη πρωτεΐνη 22-23%**
- Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
- **Κατάλληλο για ενσίρωση (έως 5τ./στρ), για σανό και για βόσκηση**
- Είναι πολύ γευστικό και προτείνεται ειδικά σε αιγοπρόβατα, αγελάδες και άλογα
- Καλύτερο από ότι το σόργο διότι δεν περιέχει τοξικές ουσίες ή άλλους αντιδιατροφικούς παράγοντες
- Ποσότητα σποράς 3kg και βάθος σποράς 2-3cm
- Ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους για σπορά 16 βαθμούς κελσίου
- Μπορεί να σπαρθεί έως και αρχές Αυγούστου, ακόμη και μετά από σιτηρά χωρίς άρωση αλλά μόνο με δισκοσβάρνα.
- Κατάλληλο για βιοαέριο



ΚΕΧΡΙ ή ΑΓΡΙΟΚΡΙΘΑΡΟ (*SETARIA ITALICA*)

- Χώρα προέλευσης: Ινδία
- **Ποικιλία μικρού βιολογικού κύκλου(50-60 ημερών)**
- Συνήθως σπέρνεται σαν δεύτερη καλλιέργεια για μία άφθονη κοπή
- Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Για μέγιστη απόδοση χρειάζεται πότισμα.
- Υψηλό στέλεχος έως και 2 m. και λεπτό στέλεχος για γρήγορο στέγνωμα
- **Κατάλληλο για σανό έως 1000 kg/στρ. Ξηρή μάζα (μάρτυρας στο Παλαμά Καρδίτσας, καλοκαίρι 2019)**
- Ποσότητα σποράς 5kg
- Βάθος σποράς 2-3cm, όχι παραπάνω
- Περίοδος σποράς: Αρχές Απριλίου - Αρχές Αυγούστου



PACIFIC GRAZE (*Sorghum Bicolor x Sorghum Sudanense*)

- Υβρίδιο Αμερικανικής προέλευσης
- Έχει πρώιμο κύκλο (63-65 ημέρες από την σπορά)
- Ύψος 1,80-2 μέτρα
- Εξαιρετική αναβλάστηση
- 3 - 4 κοπές (υπό ιδανικές συνθήκες)
- Χρησιμοποιείται από 0,90cm και μετά
- Χρησιμοποιείται για ενσίρωμα και βόσκηση
- Ιδανικό για παραγωγή υψηλής ποιότητας σανού λόγω του λεπτού στελέχους
- Καλή αντοχή στην ξηρασία
- Ιδανική λύση για αμειψισπορά
- **Ποσότητα Σπόρου: 5kg/στρ.**
- Συσκευασία : Σάκος 25 kg

**LATTE** (*Sorghum Bicolor x Sorghum Sudanense*)

- Υβρίδιο Αμερικανικής προέλευσης
- Ανθεκτική στην ξηρασία
- Ύψος 3 μέτρα
- Όψιμη ποικιλία πολλαπλών κοπών
- **Μεγάλη παραγωγή βιομάζας (6-6,5 τόνους/στρ.)**
- Εξαιρετική ικανότητα αναβλάστησης
- Άριστη ζωοτροφή
- **Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική είχε 20% περισσότερο πρωτεΐνη σε σχέση με τους μάρτυρες**
- Εξαιρετική πεπτικότητα
- Κατάλληλο για βόσκηση, σανό και ενσίρωμα
- Ιδανικό για βιοαέριο εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής βιομάζας
- Υψηλή αντοχή σε συνθήκες υγρασίας
- Ανοιξιάτικη σπορά (ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 16°C)
- Λίπανση 10-15 μονάδες αζώτου/ στρέμμα
- **Ποσότητα σπόρου: 4-5 kg/στρ.**
- Συσκευασία : Σάκος 25 kg

**SREM - ΣΟΡΓΟ** (*Sudangrass*)

Η πιο διαδεδομένη ποικιλία Σόργο που χρησιμοποιείται για ενσίρωμα και βόσκηση. Εξαιρετική ποιότητα. Χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα και εξαιρετική αναβλάστηση η οποία εξασφαλίζεται με 3-4 κοπές το χρόνο ή με πιθανή σπορά με περισσότερες από μια περιόδους. Προορίζεται και για κατανάλωση ως φρέσκο. Κατάλληλο σημείο κοπής για παραγωγή σανό στο 1,5m.

- Βιολογικός Κύκλος: Πρώιμο 60-65 ημερών
- Χρήση: Σανό, Ενσίρωμα και Βόσκηση
- Ανθεκτικό στο πλάγιασμα
- Ανθεκτικό στη ξηρασία
- Λίπανση: Μέγιστο 10-15N/στρέμμα
- Αναβλαστήσεις: Εξαιρετική, πολλών κοπών
- Περίοδος σποράς: Άνοιξη
- **Ποσότητα σπόρου σποράς: 5 κιλά/στρ.**
- Παραγωγή: **8-10 τόνους /στρ. (πράσινη ουσία) & 2 τόνους/στρ. (σανό)**



► ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΣΟΤΤΟΦΡΥΤΤΕΤΟ LUCIO

Συστήνεται για γόνιμα και ποτιστικά εδάφη

- Μίγμα ειδικών ποικιλιών με χαμηλή βλαστική ανάπτυξη
- Πολύ καλή κάλυψη και έλεγχο ζιζανίων
- Παρουσιάζει χαμηλό ανταγωνισμό με τον οπωρώνα σε αντίθεση με τα ζιζάνια. Εξαιρετική ικανότητα στήριξης και σημαντική μείωση διάβρωσης του εδάφους.
- Συστήνεται για οπωρώνες εντατικής φροντίδας και καλλιέργειας
- Περιέχει: Λόλιο πολυετές, 2 είδη φεστούκα και πόα
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Μέση
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μέση - Υψηλή
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ STRESS: Μέση - Υψηλή
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ): Μέση - Υψηλή
- ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Φθινόπωρο, νωρίς την Άνοιξη
- ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 6-8kg/στρ.



ΣΟΤΤΟVIGNETO GAIO

Συστήνεται για φτωχά εδάφη με έλλειψη νερού

- Ποικιλία με φυτά χαμηλής ανάπτυξης
- Παρουσιάζει μειωμένο ανταγωνισμό με τα καλλιεργούμενα είδη
- Είναι ανθεκτική στο πάτημα και από οχήματα
- Περιορίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων και απαιτεί λίγες κοπές
- Συστήνεται για αμπελώνες και οπωρώνες μικρών εισροών
- Περιέχει: Λόλιο, 3 είδη φεστούκα και λευκό τριφύλλι
- ΧΡΗΣΗ: Χόρτα για οπωρώνες και αμπελώνες
- Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Γρήγορη
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μέση
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ STRESS: Μέση
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ): Μέση - Χαμηλή
- ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: Φθινόπωρο, νωρίς την Άνοιξη
- ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 6-8kg/στρ.



► ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

ANDROMEDA

- Μεσοπρώιμη ποικιλία
- Εξαιρετικά παραγωγική
- Αντοχή στους νηματώδεις
- Μικρή ανθεκτικότητα στον παγετό
- Καλή αντοχή στη σκληρωτίνια
- Καλή αντοχή στον περονόσπορο
- ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου
- ΣΠΟΡΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 1-1,5kg/στρ.



► ΦΥΤΑ ΜΕ ΝΗΜΑΤΟΔΟΚΤΟΝΟ & ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ποικιλίες: Brilliant και Minaret

1. Είδος σιναπιού που σπέρνεται πριν από την καλλιέργεια που θέλουμε να προστατέψουμε από την προσβολή.
2. Αφού σπείρουμε το σινάπι και περάσουμε δύο μήνες περίπου, το ενσωματώνουμε (δισκοσβαρνίζουμε) στο έδαφος, με σκοπό να μειωθεί ο πληθυσμός των νηματωδών και των σιδηροσκουλήκων.
3. Στη συνέχεια μπορούμε να σπείρουμε την καλλιέργειά μας.
 - Χώρα προέλευσης: Ολλανδία
 - Ριζικό σύστημα που βελτιώνει τη δομή του εδάφους
 - Εποχή σποράς: άνοιξη
 - Σπόρος σποράς: 2,5 kg/στρ.
 - Κατάλληλο για θερμοκήπια και για υπαίθριους αγρούς



► ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ZEA MAYS)

KUBRICK

- Σταθερότητα παραγωγής 130 ημερών
- Φυτό μεσαίου ύψους
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε λινολεϊκό οξύ στον κόκκο
- Ιδανικό για ζωοτροφή (ειδικότερα χοίρου)
- Χρήση: Καρπός, ενσίρωση



SISMICO

- Υψηλή παραγωγικότητα σε βέλτιστες καταστάσεις 127 ημερών
- Ανταγωνιστικό με μεταγενέστερα υβρίδια
- Εξαιρετικά αρχική βλαστική δύναμη
- Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές περιοχές καλλιέργειας
- Χρήση: Καρπός



MUNDIAL

Η σειρά MUNDIAL αποτελείται από Αμερικανικές ποικιλίες με χαρακτηριστικό το έντονο πράσινο χρώμα, περιέχει βιοενεργοποιητές και μυκόρριζες (συμβιωτικοί μύκητες). Τα πλεονεκτήματα που προκαλούνται από την ξηρή επεξεργασία με βιοενεργοποιητές και μυκόρριζες είναι πολλά:

- αναγεννά το έδαφος κοντά στην ριζόσφαιρα
- βοηθά στη βελτιστοποίηση της λίπανσης και της άρδευσης
- βελτιώνει την ισορροπία του οικοσυστήματος του εδάφους
- προωθεί την ανάπτυξη και τη ριζική λειτουργία αυξάνοντας την αντοχή του φυτού στο στρες.

Επίσης αυξάνει την ικανότητα της ρίζας των φυτών στην απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών από την οργανική ουσία και την αντοχή στο υδατικό στρες. Ακόμα η παρουσία από τριχόδερμα είναι καθοριστική μιας και ανταγωνίζεται στο χώρο άλλους μύκητες οι οποίοι είναι παθογόνοι.

- Mundial N. 210 Για παραλιακούς κήπους
- Mundial N. 220 Για γήπεδα ποδοσφαίρου
- Mundial N. 230 Για περιοχές με ξηρασία και χαμηλή συντήρηση
- Mundial N. 330 Για αθλητικές εγκαταστάσεις
- Mundial N. 340 Για διακοσμητικούς κήπους
- Mundial N. 400 Για την δημιουργία χλοοτάπητα σε ρολό



STAR GREEN

Σειρά από μείγματα σπόρων για χλοοτάπητες που προορίζονται για τον τομέα του χόμπι. Παρουσιάζεται μια σειρά μειγμάτων σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις κύριες χρήσεις. Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται επιλέγονται με μεγάλη προσοχή στην παγκόσμια σκηνή, αξιοποιώντας τα αγρονομικά αποτελέσματα των κύριων ερευνητικών και επιλεγμένων ινστιτούτων. Τα πιο περιζήτητα χαρακτηριστικά είναι η προσαρμοστικότητα, η αντοχή στις ασθένειες, η αντοχή στο πάτημα και οι θερμικές και υδατικές καταπονήσεις. Οι προτεινόμενες συνθέσεις έχουν δοκιμαστεί εδώ και δεκαετίες. Επανεξετάζονται ετησίως για να ανταποκρίνονται στις κλιματικές αλλαγές και να βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των νεοσύστατων ποικιλιών.

- BS/101 SUN Για ηλιόλουστες περιοχές
- BS/102 SUN Για ηλιόλουστες περιοχές και αποκατάσταση του γκαζόν.
- BS/103 POWER Ποικιλία με πολύ αντοχή σε ξηρασία, ασθένειες και πάτημα.
- BS/104 ENERGY Με μεγάλη δυνατότητα αναγέννησης.
- CONI/120 PLAY PROF Για αθλητικές εγκαταστάσεις.
- AS/110 OMBRA Για περιοχές με σκιά.
- AS/130 OMBRA Για χαμηλό φωτισμό λόγω δέντρων.



MUNDIAL

Mundial N. 210

Προορίζεται για Δημόσιους και ιδιωτικούς **κήπους** και παρτέρια. Κατάλληλο για **παράκτιες περιοχές**. Αποτελείται από ποικιλίες σπόρων που είναι ανθεκτικές σε θερμά κλίματα και σε υψηλή αλατότητα. Έχει αργή ανάπτυξη με αντοχή στο πάτημα.

Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 250-270 m²

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 4 κιλά ανά 100m²
Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.
Φροντίδα: Προσοχή σε παράσιτα και ασθένειες.
Άρδευση: Χρειάζεται στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης.
Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.
Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες.
Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.


Mundial N. 220

Προορίζεται για **αθλητικές εγκαταστάσεις** και περιοχές με έντονο πάτημα. Ταχέως αναπτυσσόμενο μείγμα με μεγάλη αναγεννητική ισχύ, ειδικά κατάλληλο για γήπεδα ποδοσφαίρου και αθλητικών χώρων. Αποτελεί έναν ισχυρό, παχύ και έντονο πράσινο χλοοτάπητα.

Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 285-330 m², 2,5 κιλών 70-80 m², 1 κιλού 28-33 m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 3-3,5 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και μυκητολογικές ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη.

Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

Mundial N. 230

Προορίζεται για Δημόσιους και ιδιωτικούς κήπους, αθλητικούς χώρους και **περιοχές χαμηλής συντήρησης**.

Μίγμα ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία και στην θερμότητα. Δεν είναι κατάλληλο για κομψούς διακοσμητικούς κήπους. Απαιτεί χαμηλή συντήρηση. Συνιστούμε την κοπή σε ύψος περίπου 4 εκατοστών.

Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 220-250 m², των 2,5 κιλών 55-60 m²

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 4-4,5 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και ασθένειες.

Άρδευση: Χρειάζεται στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης.

Βλάστηση: 7-10 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

Mundial N. 330

Προορίζεται για **αθλητικές εγκαταστάσεις** και περιοχές με έντονο πάτημα. Ταχέως αναπτυσσόμενο μείγμα με μεγάλη αναγεννητική ισχύ και αντοχή στο πάτημα, ειδικά κατάλληλο για γήπεδα ποδοσφαίρου και αθλητικών χώρων.

Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 330-380 m², 2,5 κιλών 80-90 m², 1 κιλού 33-38 m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 2,5-3 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και μυκητολογικές ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη.

Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.


Mundial N. 340

Προορίζεται για Δημόσιους και ιδιωτικούς **κήπους** και παρτέρια. Το μείγμα αυτό αποτελείται από είδη και ποικιλίες υψηλής ποιότητας, όπου σχηματίζουν ένα **διακοσμητικό** σκούρο πράσινο γκαζόν. Απαιτεί μία μέτρια συντήρηση και ανθεκτική σε σοβαρές ασθένειες.


Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 285-335 m², των 2,5 κιλών 70-85 m², 1 κιλού 28-33 m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 3-3,5 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης.

Βλάστηση: 8-15 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες σε ύψος 3-5cm.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

Mundial N. 400

Προορίζεται για την δημιουργία **ρολού χλοοτάπητα**. Ο χλοοτάπητας αυτός που θα δημιουργηθεί θα είναι ανθεκτικός στην φθορά, θα έχει ταχεία ανάπτυξη και μεγάλη ικανότητα αναγέννησης.


Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 250-285 m², 2,5 κιλών 60-70 m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 3,5-4 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης.

Βλάστηση: 7-10 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες σε ύψος 3-5cm.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

STAR GREEN


BS/101 SUN

Προορίζεται για Δημόσιους και ιδιωτικούς **κήπους** και παρτέρια. Κατάλληλο για **ηλιόλουστες περιοχές**. Πυκνός χλοοτάπητας με φωτεινό πράσινο χρώμα και επιθετικότητα προς τα ζιζάνια. Ο χλοοτάπητας δημιουργείται γρήγορα, προσαρμόζεται σε πολλές διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και απαιτεί μία μέση προς χαμηλή συντήρηση.


Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 280-330 m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 3,5-4 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη.

Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες σε ύψος 4-5cm.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

BS/102 SUN

Προορίζεται για πάρκα διακοσμητικούς κήπους και αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατάλληλο για **ηλιόλουστες περιοχές**. Το μείγμα αυτό χρησιμοποιείται για την **αποκατάσταση της χλόης** από ένα πυκνό ομοιόμορφο χλοοτάπητα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε Lolium.

Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 270-280 m², των **5 κιλών** 130-150m², **1 κιλού** 27-30 m²

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 4 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-

Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-

Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και

σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και

μυκητολογικές ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη.

Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

BS/103 POWER

Προορίζεται για Δημόσιους και ιδιωτικούς κήπους, περιοχές χαμηλής συντήρησης. Μίγμα ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θερμότητα και χάρη στο ριζικό του σύστημα το οποίο αναπτύσσεται βαθιά ακόμη και σε βαριά εδάφη, είναι **ανθεκτικό και στην ξηρασία και αρκετά ανθεκτικό στις ασθένειες**. Είναι ιδανικό για έδαφος με κακή στράγγιση ή χωρίς άρδευση. Πολύ **ανθεκτικό στο πάτημα** και διατηρεί καλό χρώμα και κατά την διάρκεια του χειμώνα.

Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 270-280 m², των **5 κιλών** 130-150m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 4 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-

Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-

Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και

σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και

ασθένειες

Άρδευση: Απαραίτητη στις πρώτες

φάσεις της ανάπτυξης.

Βλάστηση: 7-10 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες σε ύψος 4-5cm..

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

BS/104 ENERGY

Προορίζεται για Δημόσιους, ιδιωτικούς κήπους αποκατάσταση κήπων και αθλητικών χώρων λόγω της μεγάλης **αναγεννητικής ισχύς** της ποικιλίας. Μίγμα κορυφαίας ποιότητας αμερικανικής πολυετή ήρας. Αποτελεί ένα πυκνό και ομοιόμορφο χλοοτάπητα που παρέχει εξαιρετική κάλυψη ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.


Συσκευασία:

Σάκος των 5 κιλών 130-150 m², **1 κιλού** 27-30 m²

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 4-4,5 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-

Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου

Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και

σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και

ασθένειες

Άρδευση: Απαραίτητη στις πρώτες

φάσεις της ανάπτυξης.

Βλάστηση: 7-10 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες σε ύψος 4-5cm.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.


CONI/120 PLAY PROF

Προορίζεται για **αθλητικούς χώρους** ή και ιδιωτικούς κήπους. Προσαρμόζεται σε όλα τα κλίματα. Κατάλληλο για **γήπεδα ποδοσφαίρου** ή για ιδιωτικούς κήπους που χρησιμοποιούνται συχνά λόγω της μεγάλης αντοχής στο πάτημα.



Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 280-330 m², των 5 κιλών 130-150m², 1 κιλού 27-30 m², 0,5 κιλού 13-15m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 3,5 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη.

Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες σε ύψος 4-5cm.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

AS/110 OMBRA

Προορίζεται για πάρκα και διακοσμητικούς κήπους με **μικρή έκθεση στον ήλιο**. Αργά αναπτυσσόμενος χλοοτάπητας από μίγμα με είδη ανθεκτικά και με έντονο πράσινο χρώμα.



Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 270-280 m², των 5 κιλών 130-150m², 1 κιλού 27-30 m², 0,5 κιλού 13-15m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 3,5-4 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη.

Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες σε ύψος 4-5cm.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.


AS/130 OMBRA UNDERGROWTH

Δημιουργία ενός αργά αναπτυσσόμενου χλοοτάπητα που προορίζεται για πάρκα και διακοσμητικούς κήπους. Χάρη στις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλο για κήπους που η επιφάνεια τους **καλύπτεται από φυτά** με αποτέλεσμα την **μικρή έκθεση στον ήλιο**.


Συσκευασία:

Σάκος των 10 κιλών 270-280 m², των 5 κιλών 130-150m², 1 κιλού 27-30 m².

Ποσοστό %



Ποικιλίες



Ποσότητα σποράς: 3,5 κιλά ανά 100m²

Περίοδος σποράς: Βέλτιστη Μάρτιος-Απρίλιος ή τέλος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Είναι δυνατή η σπορά και σε κοντινούς μήνες όταν οι

κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.
Φροντίδα: Προσοχή σε ζιζάνια και ασθένειες.

Άρδευση: Απαραίτητη.

Βλάστηση: 8-12 ημέρες σε ιδανικές συνθήκες.

Πρώτο κόψιμο: Μετά από 21-30 ημέρες σε ύψος 4-5cm.

Πρώτη χρήση: Περιορίζεται μετά από 60-70 ημέρες.

CYNODON DACTYLON

Η αγριάδα (Cynodon dactylon) είναι ποώδες πολυετές φυτό χαμηλής ανάπτυξης. Το υπόγειο μέρος του φυτού δημιουργεί διάφορα ριζώματα και στόλωνες που η κορυφή τους βγαίνουντας από το έδαφος σχηματίζει νέους βλαστούς.

Χρησιμοποιείται για δημιουργία χλοοταπήτων και ως καλλωπιστικό φυτό σε κήπους και πάρκα για εδαφοκαλύψεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με θερμά κλίματα λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητας της στην ξηρασία.



BLACK JACK

Προορίζεται: Για γήπεδα γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις, κήπους, πάρκα.

Το Black Jack είναι ένα υβρίδιο υψηλής ποιότητας με αντοχή στα θερμά και στα ψυχρά κλίματα και χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική του αντοχή στις ασθένειες και στην γρήγορη ανάκαμψη του από το στρες. Σχηματίζει ένα πολύ πυκνό και συμπαγές χλοοτάπητα με έντονο πράσινο χρώμα, λεπτά φύλλα και έχει ένα μεγάλο αριθμό ριζωμάτων. **Χρησιμοποιείται μόνη της με 25-30 γρ./τμ ή σε μείγμα με F.Arundinacea ή L.Perenne σε ποσοστό 25 %.**



Πυκνότητα	Μεγάλη
Χρώμα	Βαθύ πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Μεγάλη
Λεπτότητα	Πολύ λεπτό
Αντοχή στις ασθένειες	Μεγάλη

TALL FESCUE (FESTUCA ARUNDINACEA)

Η Festuca arundinacea (Festuca arundinacea) είναι ανθεκτική στην ξηρασία και στο ψύχος. Αδελφώνει έντονα έχει βαθύ ριζικό σύστημα και δίνει πλούσιο φύλλωμα. Ο χλοοτάπητας που δημιουργεί είναι πυκνός πράσινος σκούρος και έχει μεγάλη αντοχή στο πάτημα, στην συχνή χρήση, στη ζέστη και στη ξηρασία.

Είναι κατάλληλο για αθλητικά γήπεδα, πάρκα κήπους και άλλα. Ποσότητα σποράς άνοιξης: 35-40gr /m2.ενώ για καλοκαίρι- φθινόπωρο: 50gr/ m2.Εποχή σποράς: Μάρτιος - Απρίλιος- Μάιος- Σεπτέμβριος- Οκτώβριος.



RHAMBLER

Πυκνότητα	Μεγάλη
Χρώμα	Σκούρο πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Ανθεκτική
Λεπτότητα	Μεσόφυλλη
Αντοχή στις ασθένειες	Μεγάλη

STARLETT

Πυκνότητα	Μεγάλη
Χρώμα	Σκούρο πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Πολύ ανθεκτική
Λεπτότητα	Πλατύφυλλη
Αντοχή στις ασθένειες	Πολύ μεγάλη



THOR

- Εξαιρετικό σκούρο πράσινο χρώμα, με υψηλή γενετική και χειμερινή απόχρωση
- Εξαιρετική απόδοση σε σκιερά μέρη

Πυκνότητα	Μεγάλη
Χρώμα	Σκούρο πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Ανθεκτική
Λεπτότητα	Λεπτόφυλλη
Αντοχή στις ασθένειες	Μεγάλη



FESTUCA ROSSA (*FESTUCA RUBRA*)

Ποικιλία με μεγάλη αντοχή και προσαρμοστικότητα. Αποτελείται από ισχυρά ριζώματα που γεμίζουν τα κενά στο γρασίδι. Αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες και την αλατότητα και τις κύριες μυκητολογικές ασθένειες σε ένα χλοοτάπητα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή και με άλλες ποικιλίες του ίδιου είδους. Το λεπτό του φύλλο του δίνει εξαιρετική εμφάνιση στον χλοοτάπητα. **Ποσότητα σποράς άνοιξης: 35-40 gr/m²**



MAXIMA 1

Υψηλή ανοχή στο στρες, στις υψηλές θερμοκρασίες και στην αλατότητα του εδάφους

Πυκνότητα	Μεγάλη
Χρώμα	Βαθύ πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Ανθεκτική
Λεπτότητα	Λεπτόφυλλη
Αντοχή στις ασθένειες	Πολύ μεγάλη

FESTUCA ROSSA FALLAX (*FESTUCA RUBRA COMMUTATA*)

Αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό και έχει πολύ λεπτά φύλλα. Προτιμά μαλακό χώμα με καλή στράγγιση και πλούσια σε οργανική ουσία. Αντέχει λίγες ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας πέρα από ορισμένα όρια. **Μπορεί να αντέξει κοπές και κάτω από τα 3cm.**

Κατάλληλο για συχνά χρησιμοποιούμενους διακοσμητικούς χλοοτάπητες, και μπορεί να αναμιχθεί με άλλα είδη για αθλητικούς χώρους. **Ποσότητα σποράς άνοιξης: 30 gr/m².**

CASANOVA

Είναι μια ποικιλία γκαζόν με πολύ καλή ποιότητα ειδικά στην κατηγορία γκαζόν για όλες τις χρήσεις. Η Casanova δημιουργεί ένα πολύ πυκνό χλοοτάπητα με ωραία και σταθερή μεσαία πράσινη εμφάνιση όλο το χρόνο. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του χειμώνα και της θερινής εμφάνισης του Casanova.

Έχει αρκετά καλή αντοχή στις περισσότερες ασθένειες του γκαζόν. Το Casanova παρουσιάζει πολύ περιορισμένη δευτερογενή ανάπτυξη μετά την κοπή, πράγμα που σημαίνει ότι βοηθά στη μείωση της συχνότητας κοπής.

Πυκνότητα	Μεγάλη
Χρώμα	Βαθύ πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Καλή
Λεπτότητα	Λεπτόφυλλη
Αντοχή στις ασθένειες	Πολύ καλή



FESTUCA ROSSA TRICOFILLA (*FESTUCA RUBRA TRICOPHILLA*)

Αυτό διαφέρει από το Red Fescue (*Festuca Rubra*) στο ότι έχει μικρότερα, πυκνότερα ριζώματα, για καλύτερη εγκατάσταση και ανάπτυξη. Αντέχει στην ξηρασία και την υπερβολική αλατότητα. Επομένως, είναι κατάλληλο για αναχώματα, πλαγιές και επίσης σκιασμένες περιοχές.

Διαμορφώνει γκαζόν ανθεκτικό στο πάτημα και δημιουργεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Είναι επομένως κατάλληλο για διακοσμητικό γκαζόν και χώρους παιχνιδιού. **Ποσότητα σποράς άνοιξης: 30 gr/m².**

PERENNIAL RYEGRASS (LOLIUM PERENNE)

Γκαζόν μεγάλης αντοχής στο ψύχος, στις ασθένειες και στο πάτημα. Η εγκατάστασή και η ανάπτυξη του είναι γρήγορη.

Τους καλοκαιρινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες θέλει φροντίδα με αρκετά ποτίσματα σε αντίθεση με τον χειμώνα που δεν χρειάζεται καθόλου. **Ποσότητα σποράς άνοιξης: 35-40 gr/m². ενώ για αναπλήρωση κενών 50 gr /m².**

**ADAGIO**

Το λεπτό φύλλο και το σκούρο πράσινο χρώμα χαρακτηρίζουν τη νέα ποικιλία ADAGIO. Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα αυτής της ποικιλίας είναι η εξαιρετική καταλληλότητά του για γκαζόν σε χώρους αναψυχής. Ειδικά σε δημόσιους χώρους πρασίνου, απαιτούνται ποικιλίες γκαζόν με εξαιρετικά καλή βαθμολογία καταλληλότητας για έντονη έκθεση στον ήλιο.

Η βαθμολογία καταλληλότητας του ADAGIO το καθιστά ανεκτίμητο συστατικό σε μίγματα σπόρων γκαζόν. Το ADAGIO είναι ένα αργά αναπτυσσόμενο γρασίδι κι έχει την ικανότητα να καταστέλλει αποτελεσματικά την προσβολή ζιζανίων, γεγονός που υπογραμμίζει την υπεροχή αυτής της ποικιλίας.

Πυκνότητα	Μεγάλη
Χρώμα	Σκούρο πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Ανθεκτική
Λεπτότητα	Λεπτόφυλλη
Αντοχή στις ασθένειες	Μεγάλη

PASPALUM NOTATUM (BAHIA GRASS)

Το Paspalum notatum είναι ένα γκαζόν προερχόμενο από τη Βραζιλία με σύστημα βαθιάς ρίζας. Σχηματίζει ένα «χαλί» με πιο χοντρή υφή και έχει καλή ανοχή στην ξηρασία και χαμηλή συντήρηση (προσαρμόζεται σε ξηρά, αμμώδη, αλατούχα και φτωχά εδάφη)

Καλή ανθεκτικότητα στο πάτημα και αντοχή στη σκιά. Δεν αντέχει θερμοκρασίες κάτω των 0 ° για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης χρησιμοποιείται συχνά για την διακοπή της διάβρωσης του εδάφους σε επικλινή κτήματα. **Ποσότητα σποράς άνοιξης: 30-35 gr /m².**

Πυκνότητα	Πολύ μεγάλη
Χρώμα	Σκούρο πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Ανθεκτική
Λεπτότητα	Λεπτόφυλλη
Αντοχή στις ασθένειες	Πολύ μεγάλη

DICHONDRA REPENS**DICHONDRA**

Αυτό το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη επειδή είναι χαμηλό, έρπεται, διακλαδίζεται και έχει μικροσκοπικά στρογγυλεμένα φύλλα. Αντέχει τη θερμότητα με κάποια μικρή άρδευση. Δεν υπομένει στην ξηρασία και μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Δεν υπομένει το πάτημα, αλλά αντέχει πολύ καλά στην σκίαση. Δεν χρειάζεται κούρεμα σε καλά στραγγιζόμενες, ηλιόλουστες περιοχές αν και μπορεί να κοπεί μία φορά το μήνα για να αναπτυχθεί οριζόντια ανάπτυξη. Αποτελεί ένα αρκετά πυκνό και κομψό πράσινο χλοοτάπητα. Χρησιμοποιείται για χλοοτάπητες σε κατοικημένες περιοχές και για μικρές γλάστρες σε εύκρατες ζώνες. **Ποσότητα σποράς άνοιξης: 10 gr /m².**

Πυκνότητα	Υψηλή
Χρώμα	Έντονο πράσινο
Ανθεκτικότητα στο πάτημα	Μέτρια
Λεπτότητα	-
Αντοχή στις ασθένειες	Καλή



- **MACROTHERME:** Φυτά κατάλληλα για ζεστά καλοκαίρια με ήπιους χειμώνες, κατάλληλα για μεσογειακό κλίμα
- **MICROTHERME:** Φυτά κατάλληλα για κρύους χειμώνες και ήπια καλοκαίρια.

MACROTHERME

BLACK JACK (*Cynodon dactylon*)

Προορίζεται: Για γήπεδα γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις, κήπους, πάρκα.

Το BlackJack είναι ένα υβρίδιο υψηλής ποιότητας με αντοχή στα θερμά και στα ψυχρά κλίματα και χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική του αντοχή στις ασθένειες και στην γρήγορη ανάκαμψη του από το στρες. Σχηματίζει ένα πολύ πυκνό και συμπαγές χλοοτάπητα με έντονο πράσινο χρώμα, λεπτά φύλλα και έχει ένα μεγάλο αριθμό ριζωμάτων.

MAYA (*Cynodon sactylon*)

Προορίζεται: Κήπους και πάρκα.

Από τις καλύτερες αμερικανικές ποικιλίες για την παραγωγή χλοοτάπητα. Έχει φωτεινό πράσινο χρώμα και καλή ανάπτυξη. Σχηματίζει ένα πυκνό και συμπαγή τάπητα με πολύ λεπτά φύλλα. Πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες στο κρύο και στο στρες.

AGROSTIDE (*Creeping Bentgrass*)

Προορίζεται: Για γήπεδα γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις.

Πολυετές είδος που σχηματίζει έναν πολύ πυκνό και έντονο πράσινο χλοοτάπητα, φέρει στύλους και η εξάπλωση του δίνει μία ομοιόμορφη κάλυψη. Έχει εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και είναι κατάλληλο για το μεσογειακό κλίμα. Η συνιστώμενη δόση του είναι 6gr/m².

Whittet kikuyu grass (*Pennisetum clandestinum*)

Το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή σε ξηρασία, αλατότητα, θερμότητα και ασθένειες. Έχει μικρή περίοδο χειμερινής αδράνειας σε παράκτιες περιοχές με ήπιους χειμώνες. Συνεπώς μπορεί να διατηρήσει το πράσινο χρώμα ακόμα και κατά τους ψυχρούς μήνες.

Dichondra (*Dichondra repens*)

Αυτό το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη επειδή είναι χαμηλό, έρπετε, διακλαδίζεται και έχει μικροσκοπικά στρογγυλεμένα φύλλα. Αντέχει τη θερμότητα με κάποια μικρή άρδευση. Δεν υπομένει στην ξηρασία και μπορεί δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Δεν υπομένει το πάτημα, αλλά αντέχει πολύ καλά στην σκίαση. Δεν χρειάζεται κούρεμα σε καλά στραγγιζόμενες, ηλιόλουστες περιοχές αν και μπορεί να κοπεί μία φορά το μήνα για να προκληθεί οριζόντια ανάπτυξη.

Αποτελεί ένα αρκετά πυκνό και κομψό πράσινο χλοοτάπητα. Χρησιμοποιείται για χλοοτάπητες σε κατοικημένες περιοχές και για μικρές γλάστρες σε εύκρατες ζώνες.

Erba Capriola (*Cynodon dactylon*)

Πολυετές φυτό με στόλινες και ριζώματα με λεπτά φύλλα. Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους των εδαφών ακόμα και στα αλατούχα. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία κάνοντας το ακόμα και την θερινή περίοδο να έχει ένα λαμπερό πράσινο χρώμα. Το φυτό εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 10°C. Εξαπλώνεται γρήγορα σχηματίζοντας ένα πυκνό, ομοιόμορφο χλοοτάπητα ανθεκτικό στο πάτημα. Μπορεί να κοπεί χαμηλά έως και 2 εκατοστά. Δεν αντέχει στην σκιά. Κατάλληλο για χώρους άθλησης, για διακόσμηση, για στερέωμα αναχωμάτων πλαγιές και αμμώδεις περιοχές.

GRAMINACEAE

Lolietto perene (*Lolium perenne*)

Ποικιλία μεγάλης αντοχής στο ψύχος, στις ασθένειες και στο πάτημα. Η εγκατάστασή και η ανάπτυξη του είναι γρήγορη. Στους καλοκαιρινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες θέλει φροντίδα με αρκετά ποτίσματα σε αντίθεση με τον χειμώνα που δεν χρειάζεται καθόλου.

Agrostide stolonifera (*Agrostis palustris*)

Ποικιλία υψηλής ποιότητας, ιδανική για γήπεδα γκολφ. Έρπων φυτό το οποίο έχει πολυάριθμους στόλνες δημιουργώντας έτσι ένα πυκνό και ομοιόμορφο χλοοτάπητα. Θα πρέπει να κόβεται χαμηλά 0,5-2cm. Απαιτεί επαρκή λίπανση και τακτικό πότισμα εξαιτίας του πολύ επιφανειακού του ριζικού συστήματος.

Agrostide tenue (*Agrostis stenuis*)

Το είδος αυτό ανατάσσεται ταχύτερα σε μορφή τούφας και ενίοτε σε έρπουσα μορφή. Προσαρμόζεται εύκολα στις περιβαλλοντικές συνθήκες και σε διάφορα εδάφη. Δεν αντέχει στην ξηρασία οπότε πρέπει να ποτίζεται τακτικά το καλοκαίρι. Θα πρέπει να γίνει καλή σπορά για να αναπτυχθεί ένας πυκνός χλοοτάπητας που αντιστέκεται καλά ενάντια σε κοπές. Είναι ιδανικό για διακοσμητικούς χλοοτάπητες και ιδιωτικούς κήπους.

Festuca arundinacea (*Festuca arundinacea*)

Η ποικιλία αυτή είναι ανθεκτική στην ξηρασία και στο ψύχος. Αδελφώνει έντονα έχει βαθύ ριζικό σύστημα και δίνει πλούσιο φύλλωμα. Ο χλοοτάπητας που δημιουργεί είναι πυκνός πράσινος σκούρος και έχει μεγάλη αντοχή στο πάτημα, στην συχνή χρήση στην ζέστη και στην ξηρασία. Είναι κατάλληλο για αθλητικά γήπεδα, πάρκα κήπους και άλλα.

Festuca rossa (*Festuca rubra*)

Ποικιλία με μεγάλη αντοχή και προσαρμοστικότητα. Αποτελείται από ισχυρά ριζώματα που γεμίζουν τα κενά στο γρασίδι. Αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες και την αλατότητα και τις κύριες μυκητολογικές ασθένειες σε ένα χλοοτάπητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή και με άλλες ποικιλίες του ίδιου είδους. Το λεπτό του φύλλο του δίνει εξαιρετική εμφάνιση στον χλοοτάπητα.

Festuca rossa commutata (*Festuca rubra fallax*)

Αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό και έχει πολύ λεπτά φύλλα. Προτιμά μαλακό χώμα με καλή στράγγιση και πλούσια σε οργανική ουσία. Αντέχει λίγες ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας πέρα από ορισμένα όρια. Μπορεί να αντέξει κοπές και κάτω από τα 3cm. Κατάλληλο για συχνά χρησιμοποιούμενους διακοσμητικούς χλοοτάπητες, και μπορεί να αναμιχθεί με άλλα είδη για αθλητικούς χώρους.

Festuca rossa tricofilla (*Festuca rubra tricophilla*)

Η ποικιλία αυτή έχει πυκνές ρίζες και καλή ανάπτυξη. Αντέχει στην ξηρασία και στην υπερβολική αλατότητα. Είναι κατάλληλο για αναχώματα, πλαγιές και σκιασμένες περιοχές. Είναι ανθεκτική στο πάτημα και δημιουργεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Είναι επομένως κατάλληλο για διακοσμητικό γκαζόν και περιοχές για παιχνίδι.



ΑΓΡΟΣΙΤΟΣ Α.Ε.
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ • ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

2° χλμ. Ν.Μουδανίων - Σιθωνίας, 63200, Χαλκιδική
Τηλ: +30 2373025804 | Κιν: +30 6947895914 | e-mail: vasilios.tapalis@agrositos.gr

www.agrositos.gr