


## ■ *Liolaemus hermannunezi* Pincheira-Donoso, Scolaro & Schulte, 2007

**Nombre común:** Lagartija de Núñez. *Núñez's lizard*.



**Etimología:** Dedicada al herpetólogo chileno Hernán Núñez, en reconocimiento a su contribución a la sistemática y ecología de las lagartijas chilenas.

**Reconocimiento:** Es de tamaño mediano y textura levemente fornida, con extremidades macizas y cortas. La cola es cilíndrica y mide casi 1,5 veces el cuerpo. La cabeza es algo más larga que ancha y el cuello, tan ancho como la cabeza, posee algunos pliegues poco marcados. Tiene un parche de escamas agrandadas en la zona posterior del muslo, notorio en los machos y menos marcado o casi imperceptible en las hembras y juveniles. El dorso se compone de escamas pequeñas, subtriangulares y de disposición subimbricada, fuertemente quilladas y nunca mucronadas. En los flancos presenta heteronotos. Las escamas ventrales son de mayor tamaño que las dorsales, romboidales, lisas e imbricadas. Solo los machos tienen entre siete y nueve poros precloacales. La coloración de fondo es grisácea o parda olivácea con la cabeza algo más oscura. El patrón dorsal se compone de manchas oscuras semicirculares o rectangulares bordeadas de blanco o gris. Generalmente, presenta dos manchas antehumerales negras. Los flancos están compuestos por manchas negras y blancas, estas últimas se esbozan como líneas. Los ejemplares de edad avanzada poseen escamas amarillas en los flancos, el dorso y/o la cola. El vientre es blanco grisáceo con melanismo en medio de la barriga y en la región gular de los machos, poco notorio en las hembras. Los juveniles presentan un parón de coloración compuesto por bandas longitudinales supraoculares y postoculares, de colores blanquecino, amarillento o rojizo. Entre estas bandas existen manchas negras de forma cuadrangular en series, bordeadas de blanco en su parte posterior.

**Distribución:** Es endémica de Chile en la Región del Biobío, aunque debido a su distribución cercana al paso fronterizo Pichachén, es esperable su presencia en Argentina. Se encuentra al sureste de la Laguna del Laja, en el sector Los Barros, Río Los Pinos y a los pies del Volcán Antuco, entre 1.450 y 1.550 msnm.

**Historia natural:** Habita en zonas montañosas cubiertas por estepa patagónica, con presencia de arbustos bajos (<50 cm) y también en laderas volcánicas con escasa vegetación. Suele esconderse en la base de los arbustos, enterrándose en suelos arenosos, menos frecuentemente bajo piedras. Se alimenta de insectos.

