

Cuadro 1. Especies recolectadas por Wendland en la región de Sarapiquí, Costa Rica, entre mayo y agosto de 1857.

Acanthaceae	<i>Geonoma cuneata</i> (como <i>Geonoma decurrens</i>) - Tipo
<i>Aphelandra aurantiaca</i> (como <i>Aphelandra bullata</i>) - Tipo	<i>Geonoma cuneata</i> subsp. <i>procumbens</i> (como <i>Geonoma procumbens</i>) - Tipo
Araceae	<i>Geonoma deversa</i> (como <i>Geonoma flaccida</i>) - Tipo
<i>Anthurium clavigerum</i> (como <i>Anthurium wendlandii</i>) - Tipo	<i>Geonoma ferruginea</i> - Tipo
<i>Anthurium flexile</i> - Tipo	<i>Geonoma ferruginea</i> subsp. <i>microspadix</i> (como <i>Geonoma microspadix</i>) - Tipo
<i>Anthurium microspadix</i> (como <i>Anthurium porrectum</i>) - Tipo	<i>Geonoma ferruginea</i> subsp. <i>microspadix</i> (como <i>Geonoma microstachys</i>) - Tipo
<i>Anthurium obtusilobum</i> - Tipo	<i>Geonoma lindeniana</i>
<i>Anthurium pallens</i> - Tipo	<i>Geonoma longepetiolata</i>
<i>Anthurium panduriforme</i> - Tipo	<i>Geonoma longivaginata</i> - Tipo
<i>Anthurium scherzerianum</i>	<i>Geonoma orbignyana</i> subsp. <i>hoffmanniana</i> (como <i>Geonoma hoffmanniana</i>) - Tipo
<i>Anthurium subsignatum</i> - Tipo	<i>Geonoma pinnatifrons</i> subsp. <i>binervia</i>
<i>Philodendron verrucosum</i>	<i>Iriartea deltoidea</i> (como <i>Iriartea gigantea</i>) - Tipo
<i>Spathiphyllum atrovirens</i> - Tipo	<i>Pholidostachys pulchra</i> - Tipo
<i>Spathiphyllum fulvovirens</i> - Tipo	<i>Prestoea decurrens</i> (como <i>Euterpe decurrens</i>)
<i>Spathiphyllum wendlandii</i> - Tipo	<i>Reinhardtia simplex</i> (como <i>Malortiea simplex</i>)
Arecaceae	<i>Socratea exorrhiza</i>
<i>Asterogyne martiana</i>	<i>Welfia regia</i> (como <i>Welfia georgii</i>) - Tipo
<i>Bactris caudata</i> - Tipo	Asteraceae
<i>Bactris gracilior</i>	<i>Galinsoga parviflora</i> (como <i>Galinsoga calva</i>)
<i>Bactris longiseta</i> - Tipo	' <i>Mikania wendlandii</i> ' (Espécimen 893)
<i>Bactris obovata</i> (como <i>Bactris wendlandiana</i>) - Tipo	' <i>Wulffia asperima</i> ' (Espécimen 938)
<i>Calyptrogyne ghiesbreghtiana</i> (como <i>Calyptrogyne brachystachys</i>) - Tipo	Espécimen sin nombre
<i>Calyptrogyne ghiesbreghtiana</i> subsp. <i>glauca</i> (como <i>Calyptrogyne sarapiquensis</i>) - Tipo	Begoniaceae
<i>Chamaedorea graminifolia</i>	<i>Begonia urticae</i> (como <i>Begonia urticae</i> var. <i>hispida</i>)
<i>Chamaedorea macrospadix</i>	Bromeliaceae
<i>Chamaedorea pumila</i> - Tipo	<i>Aechmea mariae-reginae</i> - Tipo
<i>Chamaedorea tepijilote</i> (como <i>Chamaedorea exorrhiza</i>) - Tipo	<i>Werauhia gladioliflora</i> (como <i>Tillandsia gladioliflora</i>) - Tipo
' <i>Euterpe altissima</i> ' (Espécimen 38)	Espécimen 976
<i>Geonoma congesta</i> - Tipo	Calceolariaceae
	<i>Calceolaria mexicana</i>

Campanulaceae

Burmeistera vulgaris (como
Burmeistera macrocalyx) - Tipo

Espécimen 824

Espécimen 842

Espécimen 848

Espécimen 830

Caryophyllaceae

Espécimen 865

Commelinaceae

Floscopa sp. (Espécimen 808)

Costaceae

Costus malortieanus - Tipo

Cyatheaceae

Cyathea wendlandii (como *Alsophila wendlandii*) - Tipo

Cyclanthaceae

Dicranopygium umbrophila

Equisetaceae

Espécimen sin número

Ericaceae

Espécimen 835

Espécimen 965

Espécimen 967

Espécimen 970

Euphorbiaceae

Acalypha sp. (Espécimen 945)

Gentianaceae

Symbolanthus pulcherrimus (como
Symbolanthus rubroviolaceus) - Tipo

Gesneriaceae

Besleria columneoides - Tipo

Besleria princeps - Tipo

Besleria triflora (como *Parabesleria triflora*)

Columnea anisophylla

Columnea grata (como *Stenanthus heterophyllus*)

Columnea lepidocaulis - Tipo]

Columnea linearis

Columnea magnifica

Columnea microcalyx - Tipo

Columnea microphylla

Columnea nicaraguensis

Columnea oxyphylla - Tipo

Columnea sanguinolenta

Columnea serrata

Columnea wendlandiana - Tipo

Columnea sp. (Espécimen 783)

Drymonia conchocalyx - Tipo

Drymonia lanceolata (como *Episcia lanceolata*) - Tipo

Episcia lilacina - Tipo

Gasteranthus wendlandianus (como

Besleria wendlandiana) - Tipo

Glossoloma ichthyoderma (como

Alloplectus ichthyoderma) - Tipo

Glossoloma tetragonum (como *Alloplectus tetragonus*)

Kohleria spicata

Kohleria trigridia (como *Capanea grandiflora*)

Pachycaulos nummularia (como

Hypocyrtia nummularia) - Tipo

Rhynchoglossum azureum (como *Klugia azurea*)

Solenophora insignis

Espécimen 1271

Gleicheniaceae

Mertensia sp. (Espécimen 1234)

Gunneraceae

Gunnera insignis (como *Gunnera wendlandii*) - Tipo

Hookeriaceae

Hookeria tuberculosa

Lamiaceae

Scutellaria costaricana - Tipo

Lentibulariaceae

Utricularia sp. (Especimen sin número)

Especimen 964

Loganiaceae

Potalia amara

Especimen 959

Lycopodiaceae

Lycopodiella cernua (como *Palhinhaea cernua*)

Selaginella moritziana

Lythraceae

Cuphea sp. (Especimen 791)

Malpighiaceae

Mascagnia vacciniifolia (como *Mascagnia vacciniifolia* var. *hispidula*) - Tipo

Malvaceae

Matisia obliquifolia

Especimen 924

Marattiaceae

Danaea wendlandii - Tipo

Melastomataceae

Conostegia rufescens (como

Conostegia puberula) - Tipo

Meriania phlomoides

Miconia costaricensis - Tipo

Miconia melanotricha

Miconia paleacea - Tipo

Miconia secungrandifolia (como

Leandra grandifolia) - Tipo

Triolena hirsuta (como *Bertolonia hirsuta*)

Meliaceae

Guarea hoffmanniana - Tipo

Orchidaceae

Calanthe calanthoides (como *Calanthe mexicana*)

Cranichis reticulata - Tipo

Crossoglossa tipuloides

Dichaea brachypoda - Tipo

Dressleria dilecta (como *Catasetum dilectum*) - Tipo

Epidendrum pergameneum - Tipo

Epidendrum platystigma - Tipo

Erycina pusilla (como *Oncidium iridifolium*)

Habenaria lactiflora var. *buccalis* - Tipo

Hexisia sp. (Especimen sin número)

Lepanthes blepharistes - Tipo

Lepanthes elata - Tipo

Lepanthes horrida - Tipo

Lepanthes tipulifera - Tipo

Malaxis crispifolia (como *Microstylis crispifolia*) - Tipo

Malaxis simillima (como *Microstylis simillima*) - Tipo

Masdevallia cupularis - Tipo

Maxillaria obscura (como *Maxillaria atrata* var. *brachyantha*) - Tipo

Maxillaria vaginalis - Tipo

Microchilus calophyllus (como *Physurus calophylla*) - Tipo

Microchilus tridax (como *Physurus tridax*) - Tipo

Platystele lancilabris (como *Stelis lancilabris*) - Tipo

Pleurothallis phyllocardia - Tipo

Pleurothallis ruscifolia

Prosthechea campylostalix (como *Epidendrum campylostalix*)

Scaphyglottis bilineata (como *Ponera bilineata*) - Tipo

Sobralia amabilis (como *Sobralia lepida*) - Tipo

Sobralia leucoxantha - Tipo

Sobralia lindleyana

Stelis pardipes - Tipo

Stelis parvula (como *Stelis microstigma*) - Tipo

Stelis parvula (como *Stelis microtis*) - Tipo

Stelis parvula (como *Stelis obscurata*) - Tipo

Stelis purpurascens (como *Stelis thecoglossa*) - Tipo

Stelis superbiens (como *Stelis leucopogon*) - Tipo

Oxalidaceae

Oxalis sp. (Espécimen 905)

Poaceae

'*Isachne scabra*' (Espécimen 926)

Lasiacis divaricata (como *Panicum divaricatum*)

Podostemaceae

Rhyncholacis sp. (Espécimen 914)

Polypodiaceae

Campyloneurum falcoideum (como *Polypodium falcoideum*) - Tipo

Primulaceae

Ardisia sp. (Espécimen 774)

Proteaceae

Roupala sp. (Espécimen 918)

Rosaceae

Rubus sp. (Espécimen 874)

Rubiaceae

Arachnothryx costaricensis

Cephaelis sp. (Espécimen 838)

Gomozia sp. (Espécimen 847)

Hamelia macrantha

Hamelia xerocarpa

Notopleura siggersiana

Palicourea elata (como *Psychotria elata*)

Palicourea galeottiana

Palicourea lasiorrhachis

Psychotria jimenezii (como *Psychotria wendlandiana*) - Tipo

Ravnia sp. (Espécimen 1274)

Warszewiczia coccinea

Espécimen 858

Espécimen 786

Espécimen sin número

Espécimen sin número

Selaginellaceae

Selaginella oaxacana (como

Selaginella wendlandii) - Tipo

Solanaceae

Cyphomandra sp. (Espécimen 962)

Tectariaceae

Tectaria sp. (Espécimen 763)

Tropaeolaceae

Tropaeolum moritzianum

Nota: La nomenclatura empleada se ajusta al Índice Internacional de Nombres de Plantas (IPNI), Plants of the World Online (POWO), así como a las enmiendas recientes (Dowe *et al.*, 2022). Cuando aparecen dos nombres, el primero es el vigente, mientras que el segundo (entre paréntesis) corresponde a aquel con el que la especie fue bautizada originalmente. El término "tipo" aparece al lado de aquellas especies que fueron descritas y bautizadas a partir de las recolecciones de Wendland en Sarapiquí. Nótese que no todas las especies tienen nombre completo. En los casos en que los especímenes están identificados solo hasta los niveles de género o familia, entre paréntesis se incluye su respectivo número o código de la muestra, según consta en los archivos del Herbario de la Universidad de Göttingen. Por su parte, los nombres informales o no oficiales se anotan entre comillas, y con el número de la muestra entre paréntesis.