

Helicodiscus Tryon 1866. Amer. journ. conch. II. p.
264: genus Patulinarum.
(Species 10.)

**Synopsis molluscorum marinorum
Indiarum occidentalium
imprimis Insularum danicarum.**

auctore O. A. L. Mörch.

(Contin. vid. XXIII. p. 143.)

Fam. Strombidae.

Gen. Strombus L.

335. *Strombus gigas* L.

πορφυρόλ s. Purpura Roncera Genuensibus, Ognatella Romanis Belon Aquat 1553. p. 419.

Murex marmoreus Rondelet 1554. p. 76. fig.

Murex marmoreus Rondeleti Gesn. 1558. p. 244. tab. XI.

Murex aculeatus Gesn. tab. X.

Murex marmoreus Rondeleti Aldrov. 1614. p. 334

Murex marmoratus striatus et virgatus Aldrov. p. 337. (adult.)

Murex aculeatus marmoreus Besl. rarer. 1642. tab. XX.

Lambis Rochefort Antill. 1658 non fig.

Murex über $\frac{1}{2}$ Elle lang. Olcar. Gottorf. 1665. p. 61. t. 32. f. 57 = Besler.

La Croqu du Lambis Du Tertre Hist. Antill. 1667, 2. p. 258.

Voluta utrobius aperta Dan Major 1675 fig. (frustulum).

Murex aculeatus Grew Mus. reg. 1681. p. 125.

Murex quem pisatores in mari tranquillo americano prope urbem Carthagena expiscantur, Garocoo cornuto Italoris vocatur Buon. Recr. 1681. f. 404—5. adult. (= List. 863) f. 303 (= List. 887.) (jun.)

Murex magis auritus Bon. f. 307—8.

Murex pyramidalis figura Bon. f. 303. (= List. 887.)

Murex auritus in mari Hispaniae americanae generatur Bon. 304.

Bucc. ampullaceum striatum clavicula muricata apertura leuiter purpurascente List. Hist. 1685. t. 886.

Bucc. pictura quadam undata List. 888. (= Rumph. 49. f. M.)

Murex orthocentrus purpureus Aldrov. List. 864. f. 19.

Bastard Switzer broek of Morgenstern Val. Mus. fig. 88. 90.

Murex jamaicensis Petiv. Gaz. t. 74. f. 1. (jun.)

Murex bilinguis jamaicensis maximus Petiv. Mem, for the Curious. 1708. p. 1089 n. 1.

id. spinis longis distantibus ib. n. 5.

id. Sloane Jam. 11. p. 247. in additam. p. 247. Lin. 35.

Alata labro et columella suberocea Mus. Richt. 1725 p. 318.

Bucc. gallicum Mus. Richt. 1725 p. 322.

Murex aure admodum expansa etc. Gualt. 1742 t. 33.

Buccinum rugosum mucrone insigne Gualt. fig. B. (jun.) E.

Trochoconus muricatus gallicus Klein. 1753. §. 192. p. 72. f. 85.

Conchilium maximum Browne Jam. 1756. p. 408.

Admiralis vicarius Knorr. V. t. 4. f. 11. (jun.) II. t. 29. f. 1. V. t. 4. f. 11.

Strombus lucifer L. X. n. 414. XII. n. 503. (jun.)

Cochlis alata marmorea. Ala aquilina Mart. 3.
f. 824.

Cochlis alata imperfecta. Alata mutilata gallica ib.
f. 878—81.

Tutuschncke, S. gigas. Oldendorf, Geschichte der
Mission, Barby 1777. p. 148.

Pyramea lucifer Linck Verz. 1807. p. 107.

var. α . labro postice acute angulato.

Murex maximus striatus Gualt. t. 34.

var. β . (monstr.?) labro postice coaretato-lobato.

Mus. Gottw. t. 18. f. 128.

Hab. in 3 to 4 fathoms water on bluish sand; eats species of *Sphaerococcus* (*S. confervoides* Agard) King-shell (Krebs Cat. p. 2) Cuba (d'Orb. n. 298) Guadeloupe (Beau) Jamaica (Lister) Bermuda (Redf.) St. Thomas, St. Johns, St. Croix, Tortola, St. Barth and Carthagena (Krebs, Riise, Hornbek.) Gustavia, St. Barthélémy (Euphrasén Reise St. Barthélemy 1798. p. 135.)

var. β . John Bremers Bay St. Thomas, constant variety (Krebs).

Animal. Duclos Chenu Ill. tab. 1. ♂. Kien. tab. 1.

336. *Strombus Goliath* Chemn.

List. Hist. f. 862. f. 18^a.

Alata lata, costosa Klein p. 100. §. 261. 1.

Strombus goliath Chemn. XI. 1795 p. 147. tab. 195 A.

Strombus goliath Wood Index 1828. t. 25. f. 23.
(copi.)

Strombus goliath Gray Descr. Cat. p. 2.

Alatus expansus Le deployé Humphr. Cat. p. 39.
n. 724?

α . t. *angustata*, apertura pallide carnea.

Murex auritus maximus marm. exoticus *) Fab. Col. exot. 1610 Cap. XXXI.

Murex marmoreus Aldrov. 1614. p. 335. 36. fig. prona et supina.

Strombus goliath Duclos Chenu Ill. t. 38. (non tab. 28. f. 4).

Strombus goliath Chenu Man. f. 1581.

Strombus goliath Reeve Iconica t. 1. f. 1.

Hab. Westindien? (Spgl.) Brasilia? (Humphr.) Guadeloupe (Beau, Fischer Cat. n. 858 p. 7.) Indian Ocean (Gray.)

Of the typical form I have seen single specimens in nearly all old collections. In the Museum of „Naturforschende Freunde“ at Berlin“ there is three specimens. Prof. Dunker has one. In Copenhagen one, besides the typical specimen and a young shell from a modern collection. The epidermis in this latter specimen is very thin and not like that of the preceding species, coriaceous.

337. *Strombus integer* Sws.

T. planiuscula, solidula, albescens; spira elongata, acuta, conica; ultimo anfractu postice leviter noduloso; labro tenui expanso.

Long. 200 mm.; lat. 150 mm.

Lister Hist. 1788. tab. 856 bene. == Fav. t. XX. f. A. 9.

Strombus integer, Swainsons Stromb., Gray Descr. Cat. June 1832. p. 2 n. 6.

Hab. „Florides“.

In 1869 I obtained by Mr. Landauer at Frankfurt a specimen from a french collection marked „S. inermis Florides“ exactly corresponding to Listers figure. It is the only I recollect to have seen.

*) „Neapoli ab amico fontium constructore dono habuimus quindecim ab hinc annis.“

338. *Strombus inermis* Sws.

T. planiuscula, nodis parvis, labro tenui simplice.

Strombus inermis Sws. Blight. Cat. teste Gray.

Strombus inermis Sow. Thes. p. 35. n. 46. t. 10.
f. 113.

Strombus inermis Desh. l. c. IX. p. 711 n. 34.

Strombus inermis Duclos Chenu Ill. t. 25. f. 4.

S. accipitrinus var. Reeve Icon. f. 14.

var. *a.* labro postice producto, linguaeforme.

S. Haitensis Sow. Geol. Journ. VI. 1850. p. 48.
t. IX. f. 7?

Hab. Antill. dan., verisim. I. St. Croix. Specim.
plur. in Mus. Hafn. Rocksound (Krebs 1876). Bahama
and coast of Florida. (Swift.)

I have never seen any transitions to the following
species.

339. *Strombus costatus* Gm.

Murex lacteus Rondel. p. 78. §. IX.

Murex lacteus Rondeleti Gesn. p. 244. fig. inf.
(copi.)

Murex lacteus Rondeleti Aldrov. p. 339. f. 2. (copi.)

Murex lacteus noster primus Aldrov. ib. p. 339.
f. 2.

Murex lacteus Mus. Gottw. VII. t. 1. f. 124.
(bona. jun.)

Ala accipitrina Mart. 3. f. 829 et 887 (jun.)

Fav. pl. 20 A. f. 1.

Strombus costatus Gm. p. 3520. n. 32, Desh. IX.
p. 687.

Strombus accipitrinus Lam. VII. p. 200. n. 2.

Strombus accipiter Dill. Cat. p. 669. n. 24.

Hab. In 5—7 fath. on bluish sand in Spratbay, St.
Thomas; eats sea-weed; lives in flocks. Queen shell,

spacy Queen shell. (Krebs. Cat. p. 1.) Hayti parait special (d'Orb. Cuba n. 299). Tortola, St. Croix (Krebs. Riise, v. Eggers) Guadeloupe (Beau) Bermuda (Redf.)

340. *Strombus raninus* Gm.

Bucc. bilingue subfuscum labro crasso recto subcroceo List. 871. f. 65.

Bucc. nebulosum primo orbis parte pulvinato ib. 891. f. 11. (jun.)

Murex marmoreus striatus et virgatus Aldrov. p. 337?

Murex marmoreus Grew Mus. reg. p. 125.

Murex magis auritus etc. Buon. f. 307. 8.

Pugil cinereus Heb. 317.

B. bilingue jamaicense vulgaris Petiv. Mem. for the Curious. 1708 p. 189. n. 33 *).

B. bilingue Sloane Jam. 2. p. 282. n. 17.

M. striatus rugosus Gualt. t. 32. f. F.

Seba t. 62. f. 4. 5. 9. 12. 13. 14. 15 & 27.

Rothe Froschschnecke Knorr. III. t. 11. f. 1. p. 25. VI. t. 26. f. 8.

Zeltzame Kamphaan Val. Mus. f. 91 & 93?

Mus. Gottw. §. VII. f. 133. lit. a.

Monodactylus subfuscus Klein §. 251. p. 48.

Alata lobata Cancer Bon. Klein §. 261. p. 100. t. VI. f. 108.

Conchylium albo-nigro variegata Browne Jam. p. 408. n. 7.

Pugil costoso-muricatus Cancer Mart. 3. f 836—37.

Strombus costoso-muricatus Mörch Cat. Yoldi. p. 61.

Strombus raninus Gm. p. 3511.

Lambis curruca Bolt. p. 14. — Linck p. 109.

*) This work I only know from Sloane. It is not in the Library of British Museum.

Strombus quadratus Perry Conch. t. XII. f. 1.

Strombus bituberculatus Lam. VII. 202 n. 6.

Strombus lobatus Sws. Ill. 2 Ser. t. 3. pl. 153.

Strombus lobatus Sow. Thes. f. 76—78.

Hab. Jamaica (Lister, Sloane) 5—7 fathoms on bluish sand; eats sea weed; lives in flocks together with the preceding species (Krebs Cat.) Cuba, Martinique, Guadeloupe, St. Lucie (d'Orb.) Cuba n. 301. Anguilla, St. Barth, St. Martin, St. Thomas, Trinidad, Barbadoes, Tortola (Krebs, Riise etc.) Carthagena N. gr. H. Krbs.) Bermuda (Redf.)

var. *pumilio*. Vera Cruz. (Liebm.)

341. *Strombus gallus* L.

Bucc. bilingue profunde striatum muricatum labro late sulcato ejusque unic. parte digitata List. 874. f. 3.

Cochlea Buon. f. 309, 10.

Murex minor laevis Barel. Ic. 1321. f. 1. p. 132.

Ala tuberosa et nodosa Heb. p. 318.

Kamphaanje Vleugelhorn Rumph. t. 37. f. 5.

Murex striatus etc. Gualt. t. 32. f. M.

Alata major senis muricibus Seba t. 62. f. 1. 2. p. 162.

Knorr IV. t. 12. f. 1. p. 21.

Angeli Ala. Cochlea alata monodactylus Mart. 3. f. 841. 42. 46.

Fav. pl. 21. f. A. 1.

Gottw. t. 11. f. 120 bon.

Alata aratrum Humph. Cat. p. 721.

Hab. On gravel in 1—2 fathoms water. St. Johns at Long point on Tortola (Krebs) Guadeloupe (Beau) Cuba, Martinique, St. Lucie (d'Orb. Cuba n. 300) Margarita (Hornb.)

Sbg. Strombidea Sws. (Strombella Schlüt.)

342. *Strombus pugilis* L.

Murex marmoreus candidus Aldr. 1614. p. 337.

fig. (trit.)

Murex orthocentrus purpureus ib. 340.

Murex elegantibus mucronibus tuberosus Buon. f. 299.

Il murice marmore overo litteo. Mus. Mosc. p. 212.

f. 3. §. 54.

Mus. Gottw. VII. t. 1. f. 125. 26.

Murex bilingue Sloane Jam. II. p. 253. n. 18.

Murex in summitate striatus Gualt. t. 32. f. B.

Alata lata leviter rostratus Kl. §. 261. p. 100 n. 16.

Oreille dechiré Argv. t. 15. f. A.

Conchilium croceum labris nitentibus Browne Jam. p. 408.

Oreille de cochon Davila p. 184. n. 320.

Straubenschnecken Knorr I. t. IX. f. 1. III. t. 16. f. 1.

Alata rubra aculeis armata Mart. 3. p. 86. f. 830 —31.

Alata aculeata Humph. Cat. n. 715.

Strombus cornutus Perry Conch. t. XI. f. 4.

α spinis duplicatis.

S. pugilis duplicatus Ch. X. p. 215. f. 1493.

S. pugilis d'Orb. Cuba. n. 313.

β . spinis dilatatis planis, compressis verticalibus Sow. Gen. f. 1, List. 901, f. 26.

Stronibus Sloanii Leach Miscellany.

S. pugilis var. *Sloanii* Duclos Chenu Ill. t. 7. f. 3. 4. Kien. p. 31. t. 20. f. 2. Chenu Man. f. 1582.

γ . spinis compr. horizontalibus Sow. Gen. f. 2. Hab. two fathoms water on mud (Krebs Cat. p. 2.) Cuba, Martinique, Guadeloupe, St. Lucie, Carthagena N. Granada, New-Orleans (d'Orb. Cuba n. 302) St.

Thomas, St. Croix, Tortola (Krebs, Riise) Vera Cruz
Venez. (Krebs) Brasilia, Rio Janeiro, (Reventlow, Krö-
yer, d'Orb.) Texas (Roemer) Cuba (Pfr.)

343. *Strombus alatus* Gm.

Bucc. dense striatum paulo ventricosius, clavicula
brevi List. 889 f. 70. t. 890.

Schwartze Flügelhorn Bolt. Mart. 3. f. 894.

Schwartze Flügelhorn Schröt. Einl. 1. p. 452, t. 2.
f. 14.

Strombus alatus Gm. p. 3513. n. 14.

The purple mouted var. of *S. pugilis* from Florida
Port. Cat. n. 1731.

Alata violacea Florida. Humphr. Cat. p. 716.

Strombus pyrulatus Lam. VII. 205. n. 13. IX.
p. 696. n. 13.

Strombus pyrulatus Kien. p. 29. n. 21. t. 19. f. 1.
pl. 34. f. 2.

Str. alatus Sow. Thes. n. 34. f. 72—75.

Triton pileare Enc. meth. t. 422. f. a. (jun.?)

Strombus sulcatus Anton Verz. p. 85. n. 2798.

var. α . *S. undulatus* Chem. in litt. Küster p. 39.
t. 46. f. 3—4.

Hab. Guadeloupe (Beau) Mexico (Anton) Vera Cruz
(Liebm.) St. Anna (Casp.) Florida (Humphr.) Cuba
(Pfr.)

Spec. dub.

344. *Strombus Listeri* Th. Gray.

,,T. fusiformi, turrita, alba, luteo-fasciata et macu-
lata, ultimo anfractu subcompresso, obtuse angulato, in-
ferne sulcato, spira longitudinaliter plicata, transversim
striata; labro plano. valde expanso, subquadrato, superne
producto, intus laevi.

Long. $4\frac{3}{5}$ unc.; lat. $1\frac{4}{5}$ unc.

Bucc. bilingue canadense labro laevi ex inferiore

parte mucronato, clavicula dense admodum striata, longa, tenuis. List. Hist. t. 855. Fav. t. XX. f. 1.

Epidromus canadensis Klein Tent. p. 53.

Strombus Listeri Th. Gray on a new sp. of *Strombus* in the Hunterian Museum at Glascov. Annals and Mag. of N. H. 2 Ser. 1852. X. p. 430.

Hab. Canada (Lister.)

Stromb. vittati L. affinis; *Aporrhais occidentalis* Beck, non absimilis sed quadruplo major.

345. *Strombus dubius „Sow.“* C. B. Ad.

Hab. Jamaica (Jay, C. B. Ad.) Florida (Ad.)

non *S. dubius* Sow. qua *Meta Reeve.* (Conella: Sws.)

an *S. alatus* Gm. jun.? = *S. pugilis* jun. Krebs.

Lyc. N. H. 1866. VIII. p. 398.

Fam. Tritonidae.

Gen. *Ranella* Lam.

Bursa Bolt. (non Petiv.) *Gyrineum* Link. *Bufonaria* Sch.

346. *Ranella spadicea* Mtf.

Concha laevis Aldr. p. 357. f. 6?

Long square whilk Grew. Mus. Reg. 1681. tab. X.

Bucc. brevir. compressum striatum ore dentato minus asper List. t. 995. f. 59.

Lagena ore semilunata Klein. §, 141. p. 50.

B. bufonia minus aspera *Bursa gallorum* Ch. IV. f. 1272—73.

Rana crassa Humph. Cat. N. 614. (nomen).

Fav. t. 32. f. B. 4.

Murex crassus Dill. 692. n. 23.

Bufo spadicea Mtf. C. S. p. 375. 1810.

Ranella granulata Lam. Enc. t. 412. f. 4. Hist. n. 8.

Ranella crassa d'Orb. Cuba. p. 164.

var. b. dorso ventroque uno-tuberculatis Lam. l. c.

Hab. Guadeloupe (Hotess Beau) Terra firma (Hornb.)
Porto Cabello (C. Wessel).

Subg. Lampas Schum.

247. *Ranella Thomae d'Orb.*

Ranella rhodostoma Beck. Sow. Ill. fig. 10. (non
Proc. 1841 nec Reeve.)

Ranella Thomae d'Orb. Cuba p. 164. t. 24. f. 23
—24.

Hab. St. Thomas grand prof. (d'Orb.) Frederiksvaerns
Fort St. Croix (Ovesen) Cuba (Andrea) New Providence
(Krebs).

Subg. Apollon Mtf. (Gyrinæ Sch. Biplex Perry.)

348. *Ranella corrugata Perry.*

Bucc. recurvir. labro duplicato List. 943. f. 39.?

Biplex corrugata Perry Conch. 1811. t. 5. f. 1.

Ranella granifera Lam. var. tritonea Mke. Cat.
Malsb. n. 930.

Ranella ponderosa Reeve f. 14.?

Hab. Guadeloupe (Duchassaing Krebs p. 25.) Hams-
bluf St. Croix (Krebs.) St. Thomas (Fru Eckardt Ma-
gens) Jamaica (Krebs).

349. *Ranella cubaniana d'Orb.*

Ranella cubaniana d'Orb. Cuba p. 105. p. 368. t.
23. f. 24.

Hab. Cuba (d'Orb., Andrea.) St. Lucie (d'Orb.) St. Croix
(Eggers.) St. Thomas (Mageus) Guadeloupe (Beau.)

Ranella semigranosa Lam. Kien. (non Reeve) R.
quercina Mörch et Ranella pustulosa Reeve ex Africa
occid. affines. An var. praecedentis.

Subg. Aspella Mörch.

350. *Ranella anceps Lam.*

Ranella anceps Lam. Hist. VII. 1822. p. 154. n.
13. IX. p. 550.

Ranella anceps Kien. Spec. gen. p. 36. n. 27. t. 4.
f. 2.

Ranella anceps Chenu Man. f. 722.
Hab. St. Thomas (Hornb. Riise.)

Gen. Triton Lam.

(not Tritonellum Val. Compt. Rendu 1858) Varicaria Fabr. 1823.

Sbg. Colubraria Schum.

Trompeta Petiv. Epidromus Klein, Mörch. Cumia Biv.

351. *Triton testaceum* Mörch.

Differit a T. obscuro Reeve t. crassiore, breviore,
anfr. convexioribus, asperis; columella granosa.

Turbo veluti malleo compressus etc. Buon. p. 119.
f. 48.?

Trompeta indica minor etc. The Pigmies Trumpet
Petiv. Gazoph. t. 55. f. 7. n. 259. (Copi.)

Epidromus arachnoides Kl. Tent. p. 53.

Triton testaceus Mörch Cat. Yoldi p. 107. n. 2009.
(nomen.)

Triton testaceus Mörch Cat. Henck. 1854. p. 13.
n. 479.

Triton testaceus Mörch Krebs Cat. p. 24.

Triton obscurus Reeve C. B. Adams, Krebs p. 23.
Hab. St. Thomas, St. Croix, St. Martin, (Krebs, Riise)
Guadeloupe (Beau) Jamaica (Ad.) St. Jean (Sommer.)
N. Providence (Krebs. Lyc. N. York. VIII. 1867.)

352. *Triton lanceolatum* Menke.

Ranella lanceolata Mke. Synops. 1828. p. 87. 1830.
p. 145. excl.syn. Helbl.

Triton lanceolatum Mke. Kien. Spec. gen. p. 27. t.
28. f. 1.

Triton lanceolatum Reeve f. 79.

Triton lanceolatum Desh. Lam. IX. p. 617. n. 35.

Triton lanceolatum Mörch Yoldi p. 108.

Hab. under stones and pieces of corals in one and two feet water (Krebs) Guadeloupe (Duchas, Beau) St. Thomas (Rüse) St. Croix, Crabisland, Trinidad, St. Martin, Anguilla (Krebs) Martinique, Havanna (Kien.) Porto-rico (Mke.) Vera Cruz (Liebm.) New Providence (Krebs.)

Sbg. Buccinatorium Petiver.

Buccinum Antiquorum, Rond. Charlest. Browne. Beck. Triton Mtf. Lampusia β Sch. Septa Perry. Tritonium Linck. Charonis Gistel.

a/ 353. *Triton marmoratum Linck.*

„Thick and heavy, slender upper whorls with minutely granulated revolving lines; columella brown with white plaits mostly narrow. Smaller and more ponderous in proportion in all stages.“ Conrad.

Buccinum variegatum ac striatum F. Col. Lister. t. 959. f. 12.

Buccinatorium barbadense majus Petiv. Mem. Curious 1708. f. 190. n. 20.

Bucc. maxim. variegatum Sloane Jam. 2. p. 244.

Buccinum Tritonis Kundm. Rariora 1737. p. 81. t. IV. f. 8.

Buccinum Tritonis Seba t. 39. f. 2 sup.

Bucc. Tritonis minus crocei vel aurei coloris Kl. p. 44. t. VII. n. 127 *).

Bucc. marm. undul.-varieg. Browne Jam. 2. p. 404.

Bucc. Tritonis Chem. IV. f. 1277—83.

Bucc. nereidum Humph. Cat. p. 34. n. 626 (nomen.)

Tritonium marmoratum Linck. Verz. 1807. p. 122.

Triton variegatum Lam. Enc. Meth. 1816. t. 421. f. 2.

Triton variegatum Kien. pl. 2.

*) Mus. Esgersianii,

Triton variegatum Conrad Philad. Proc. 2. Ser.
1848. p. 121.

pullus. Mart. IV. p. 233. f. 1410?

Voluta nasuta Gm. p. 3455.

Hab. Barbados (Lister). In two fathoms water on sea-weed St. Thomas (Krebs) Guadeloupe (Duchas. Beau.) Vera Cruz, N. Gr. (Krebs) St. Thomas (Riise) Vera Cruz (Liebm.)

354. *Triton nobile* Conrad.

„Body whorl dilated ventricose, tramped on the upper part, about which three of the ribs are prominent, rounded, the lower one broadest. Lgth. 11 inches; width $5\frac{3}{4}$ inches.“ (Conr.)

Strombus magnus Aldrov. 1614. t. X. f. 4.

Trompette marine Rochefort Antill. 1658 p. 227.
(Copi).

Trompette de mer Labat Nouv. Voy. 1724. 1. f.

268. (Copi).

Mus. Besler. t. 20. f. 4.

Fav. tab. 32. f. G. 1. 2.

Triton variegatum Blv. Man. t. 18. f. 3?

Triton variegatum Reeve t. 1. f. 3.

Triton nobile Conr. Journ. ac. Sc. Philad. 2 Ser.
1849. p. 212.

Hab. Jamaica, St. Johns. Carthagena N. Gr. Bermuda,
St. Thomas (C. B. Ad. Krebs, Riise, Hornb.) An var.
praeced.

Sbg. Lampusia Sch.

(*Simpulum* Kl. p. p.)

355. *Triton costatum* Born.

Bucc. rec. ventricosum magnis striis intervallo do-
natum List. t. 936. f. 31. (= Buon. f. 289).

Murex in orientali indiarum mari natus Buon. f. 289.

Bucc. rec. labro simplice List. t. 332. f. 27.

Murex fastigiatus dilute flavus Seba t. 57. f. 29. 31,

- Die getrocknete Birne Knorr V. t. 21. f. 1.
- Murex costatus Born Index 1778*) p. 296. Mus. p. 297.
- Buccinum costato-tuberculatum Chemn. IV. f. 1252.
53. (Forskal.)
- Buccinum quinquangulare Chem. IV. f. 1254.
- Argobuccinum nodosum Chem. IV f. 1255.
- Murex pileare L. Chemn. XI. f. 1837—38.
- Triton succinctum Lam. VII. p. 181. n. 8? N. Holl?
- Murex parthenopus Salis. Dill 2. p. 696. n. 29.
- Triton olearium L. Desh. IX. p. 629.
- α americanum.
- Triton pileare d'Orb. Am. mér. p. 449. n. 388 non L.
- Triton americanum d'Orb. Cuba p. 163. p. 355 t. 23. f. 22.
- $\alpha\alpha$. americanum, minus. Long. 45 mm.
- Triton brasiliense Gould. Bost. Proc. III. May. 1849. p. 142.
- Triton brasiliense Gould Exped. Shells. Add. p. 504. f. 296.
- Triton brasiliense Gould Otia p. 65.
- Hab. Cuba, Brasilia (d'Orb.) Guadeloupe (Beau) Tortola (Krebs) Margarita (Hornb.) Brasilia Rio Janeiro (Reventlow, Kröyer.)
- $\alpha\alpha$. Brasilia (P. W. Lund.)
356. Triton Martinianum d'Orb.
- Bucc. olearium jun. imperfectum apertura haud plicata edentula Chemn. IV. p. 56. f. 1250.
- Bucc. olearium hujus species adhuc reticulatum ib. f. 1251.
- Triton pileare Lam. VII. p. 182. n. 9.

*) Chem. vol. V. 1780. is however quoted by this species.

Triton pileare Mörch Yoldi. p. 108. n. 2024.

Triton Martinianum d'Orb. Cuba p. 162. n. 354.

var. *a latior*. Tr. vestitum Hinds. affinis.

Hab. Cuba, Guadeloupe, St. Lucia, St. Thomas (Sagra, Hotess., Hornbeck. d'Orb.) Carthagena, N. Gr. St. Johns Bermuda, Tortola, St. Martin Barbadoes (Krebs) Bahia (Andrea) Catinguiba (Hygom.)

357. *Triton aquatile* Reeve. occidentale.

Buccinum variegatum angustum labro duplicato
List. t. 934. f. 29.

Murex olearium L. Schröt. Einl. 1. p. 492. tab. 3.
f. 1.

Murex olearium L. Schröt. Wiedem. Archiv. IV.
2. p. 141. cfr.

Triton aquatile Reeve Icon. f. 24.

Triton vestitum Hinds. Krebs Cat. p. 29.

Hab. Jamaica (List.) Guadeloupe (Beau) St. Thomas Scholten, long. 95 mm.; Fru Eckardt. Riise. Krebs.)

358. *Triton rubecula* L. occidentale.

Difffert a forma indica: *T. pallidioire*, interstitiis rugarum columellae aurantiis; epidermide straminea, membranacea, laminis confertissimis ciliato-pectinatis.

Long. 32 mm.; lat. 17 mm.

Hab. St. Thomas, dredged by Joe (R. Swift.) sub nomine *R. gemmatum* Reeve. f. 60.

359. *Triton chlorostomum* Lam.

Triton chlorostomum Lam. XI. 185. n. 20. IX. p. 636. n. 20.

Triton chlorostomum Kien. p. 14. t. 12. f. 2.

Hab. Antill. (Lam.) Cuba, St. Lucie, Martinique, Guadeloupe (d'Orb. Cuba n. 351.) Jamaica, St. Johns, Bermud: (C. B. Ad. Krebs) St. Thomas (Hornb. Krebs) Vera Cruz (Liebm.)

var. *pumilio*. Long. 0,72 inch.; br. 0,36 inch. (Ad.)

Triton pulchellus C. B. Ad. Contr. 1850. Jan. p. 60.

Triton chlorostomum young. Krebs. Lyc. of N. York VIII. 1866. p. 398,

„This shell resembles a small and slender *T. chrysostomus*.“ Ad.

Hab. Jamaica (Ad.) St. Thomas (Riise) New Providence (Krebs).

360. *Triton Thersites* Reeve. occidentale.

T. elongata, anfr. angulati; interst. lir. cancellata.

Long. 25 mm. lat. 12 mm.

Triton Thersites Reeve. Proc. 1844. Ic. t. 13. f. 48.

Triton vespaeum Lam. Quorund.

Hab. Antill. (Bardenfl.) St. Croix (Ovesen) Eleuthera (Krebs.)

361. *Triton gracile* Reeve. occidentale.

T. alba, faucibus candidis; epid. straminea, ciliata; columella rugoso-plicata praesertim antice; canali gracili. Long. 33 mm.; lat. 14 mm.

Triton gracile Reeve Icon. f. 58.

Hab. St. Thomas (Riise.)

362. *Triton Krebsii* Mörch.

Differt a *T. corrugato* Lam.: spira brevissima, columella ad finem canalis rugosa, plica dentiforme ad initium canalis. Differt a *T. trigono* Gm.*): *T. crassiore*, spira longiore, apertura candidissima unicolore, plicis columellaribus minoribus. Epidermis laminis sat distantibus pectinatis, ciliis brevissimis, in laminae nodorum setigeris.

Long. 57 mm.; lat. 31 mm.

Hab. St. Thomas floating dock (Swift Krebs.) St. Croix (Mus. reg.)

*) *T. ficoides* Reeve. *T. caudatus* Kien. non Say. Guinea.

Sbg. Cymatium Bolt. (*Lotorium Mtf.*)363. *Triton femorale* L.

Buccinum triangulare Grew. Mus. reg. p. 130. t. X. f. 1. 2.

Bucc. peche stricta e la guscia pia sodia. Mus. Mosc. 1656. p. 214. f. 3.

Bucc. rec. magnum labro duplicato quasi triangulari List. t. 941. f. 37.

Bucc. triangulare Buon. f. 290.

Bucc. jamaicense triangulare Petiv. Mém. Cur. 1708. p. 190. n. 12.

Bucc. majus canaliculatum Gualt. t. 50. f. C.

Bucc. triang. Sloane Jam. II. p. 250. n. 10.

Bucc. fusc. fasciatum angulatum Browne Jam. 180.

Bucc. luteum Hebenstr. Richt. p. 314.

Mur. costosus labro duplicato Kl. §. 266. p. 102.

Pyrum triangulare subulatum Mart. 3. f. 1039.

Bucc. angulatum Humph. 627. B. porcellum ib. 626.

Lotorium lotor Mtf. 2. p. 583.

Hab. on bluish sandy mud together with *Strombus gallo-*
lus (Krebs p. 23.) Jamaica (Lister Ad.) St. Lucia, Cuba
(d'Orb. Nr. 350.) Martinique, Bresil (Kien.) Guadeloupe
(Beau) St. Johns, St. Thomas, St. Croix, St. Martin,
Tortola, Trinidad (Krebs, Riise).

*Sbg. Guttturnium Kl.*364. *Triton antillarum* d'Orb.

Lister t. 935.

Nodulus Heb. Mus. Richt. 315.

Purpura clathro-tuberosa Nodulus Mart. III. 1050
—51.

Triton nodulus Mörch Yoldi p. 109. n. 2041.

Triton tuberosum Lam. VII. p. 185. 18. p. p.

Triton tuberosum Reeve f. 1^b.

Triton tuberosum Gould Exped. Shells p. 240.

W. Ind.

Triton antillarum d'Orb. Cuba p. 161. n. 352. p. 23. f. 20,

Triton pyriformis Conr. J. ac. sc. Philad. 2. Ser. 1849. cfr.

Hab. Martinique, Guadeloupe (d'Orb.) Cuba (Andrea) St. Thomas (Riise, Krebs) Vera Cruz (Liebm.)

Sbg. Ranularia Schum. (Ranula Kratz. Regf. V. f. 50.)

365. *Triton cynocephalum* Lam.

Bucc. ampullaceum rostratum List. t. 893. f. 13. (jun.)

Purpura e mari brasiliensi habita si albedine observes etc. Buon. f. 338.

Bucc. e flavo annulata Seba t. 49. f. 74—75.

Bucc. e flavo annulata Fav. t. 34. f. A. 1?

Murex niveus Gm. p. 3545.

Triton cynocephalum Lam. VII. p. 184. n. 13.

Triton cynocephalum Kien. p. 3. t. XII. f. 1.

Hab. Guadeloupe (Beau) St. Johns, Jamaica, Bermuda (Ad.) St. Croix, St. Martin, (Krebs.) Bahia (Kien.)

Subg. Linatella Gray.

366. *Triton (Linatella?) tranquebaricum* Lam.

Hoc cochlea duplicato labio donata est. Pertinet ad Bucc. fastigiat. Seba t. 57. f. 33.

Argus fasciatus a bandelettes tuberculeuses et convexes. Fav. 1. p. 50.

Murex argus fasciatus Chem. X. p. 240. f. 1522.

Murex argus β Gm. 78.

Triton tranquebaricum Lam. Enc. t. 222. f. 6. Hist. VII. p. 189. n. 30. p. 640.

Triton tranquebaricum Reeve t. 14. f. 55. tab. 20. f. 55 trivaricosa, bene.

Triton Chemnitzii Gray. Bechey Voy. p. 110.

Triton balteatus Beck fide Reeve.

Ranella vexillum Cuming. Pfr. Reg. p. 97.

Hab. Guinea (Spgl. Praetorius, Mörk.), „Tranquebar“
no doubt erroneous.

α . minor, crassa. Long. 31 mm.; lat. 21 mm.

Hab. Porto Cabello (Krebs.)

β tenuis inflata; spira producta.

Long. 51 mm.; lat. 31 mm.

Hab. Barcellona (Krebs.)

367. *Triton (Linatella) Poulsenii* Mörch.

T. subglobosa ferruginea, canali brevissima; lira angulari leviter nodosa, columella profunde arcuata plicumque laevis, interdum antice plicis 1—2 obsoletis; epid. lineis confertissimis ciliatis.

Long. 51 mm.; lat. 38 mm.

Buccinum fastigiatum, album Seba t. 57. f. 30.

Buccinum costatum Meusch. Mus. Gevers. 1787. n.

605 non Born.

Triton cynocephalum Lam. Enc. t. 422. f. 3?

Hab. Curaçao, Portocabello (spm. 6 Krebs.)

Differ a sequente praesertim canali brevissima.

Mart. III. 1084: non absimilis.

368. *Triton (Linatella) rostratum* Mart.

Differ a praecedente praesertim canali producto.

Dolium rostratum Mart. 3. f. 1083.

Buccinum caudatum Gm. p. 3471. n. 6.

Cassidaria cingulata Lam. VII. p. 216. n. 3.

Triton undosum Kiener t. 6. f. 2. bene.

Hab. St. Thomas Harbour floating dock, (long. 48 mm.; lat. 30 mm.)

I cannot see any difference between the above specimen and a specimen from Pulo Penang collected by Prof. Reinhardt during the expedition of Galathea.

Sbg. Cabestana Bolt.

Aquillus Mtf. *Dolarium* Schlüt. *Neptunella* Gray. Proc.
1853. p. 38.

369. *Triton (Cabestana?) labiosum* Wood.

Murex labiosus Wood Ind. Supp. 1828. p. 18.

Triton labiosus Wood. Reeve Ic. f. 52. p. p.

Triton Loroisi Petit J. C. 1852. p. 53. t. 2. f. 8.
1856. p. 38.

Hab. between stones and coral pieces on 2 feet water at
St. Thomas (Krebs Cat. p. 23) Guadeloupe (Beau, Du-
chas.) St. Thomas, St. Croix (Ovesen, Riise) St. Martin,
Tortola (Krebs.) Cuba (Andrea) Vera Cruz (Liebm.)

Sp. ign.

Triton commutatum Dkr. teste Gabb. Philad. Tr.

Distorsio Bolt.

370. *Distorsio clathrata* Lam.

Diffr. a D. ridente Reeve, canali elongata.

Triton clathratum Lam. Enc. meth. 1816. t. 413.

f. 4. Hist. p. p.

Murex reticulatum L. Beck.

Buccinum reticulatum Humph. Cat. p. 34. n. 620.

var. α anguste reticulata.

Auris pilosa Seba t. 65. f. 5?

Cochlea canaliculata extus incurva Gualt. t. 31.

f. D?

Cassis penita Meusch. Gevers p. 388. n. 1258?

Hab. Portorico (Humphr.) St. Thomas (Hornb., Riise)
Haiti (Fokkes) Am. mer. (Lam.) Catinguba (Hygom.)

371. *Distorsio acuta* Perry. occidentalis.

Cassis vera. *Distorsio reticulata* Mart. 2. f. 405—6.

Murex mulus Dill. 2. p. 704. Wood Ind. t. 26.

f. 46?

Distorsio reticulata Bolt. p. 94. n. 1639.

Distorta acuta Perry 1811. t. XI. f. 1. 1811.

Triton clathratum Lam. p. p. Kien. t. 11. f. 1?

Hab. St. Thomas (Hornb.) Guadeloupe (Duchassaing)
Jamaica (Ad.) Carthagena N. Gr. (Krebs) Tortola
(Krebs.)

Cassis Kl.

Subg. Casmaria Ad.?

* 372. *Cassis Coronadoi Crosse.*

Cassis Coronadoi Crosse Journ. Crosse. J. C. 1867.

XV. p. 64. t. V. VI.

Hab. Matanzas, Cuba (Coronado in Barcellona, v. Lennep.)

Subg. Semicassis Kl.

373. *Cassis inflata* Shaw.

T. magna, tenuis, inflata, laeviuscula, evaricosa.

Bucc. recurvirostrum List. 996. f. 1.

Bucc. cassideum tessellatum Chem. XI. p. 76. f. 1792—93.

Bucc. granosum, Guinea Sol. Port. Cat. p. 1293. cfr.

Bucc. inflatum Shaw Miscellany V. 1789. pl. 953.

Cassis tessellata Pfr. Register p. VIII.

Hab. St. Thomas (Hornb.) Barbados (Lister.)

374. *Cassis granulata* Born.

T. globosa, minore, crassa, varicifera vel evaricifera.

Cassis ventricosa Mart. 2. 1771. f. 344. 45. (vari-
cifera) 350—52 (evaric.)

Cassis ventricosa Mörch Yoldi n. 2096.

Buccinum granulatum Born Index 1778. p. 239.
Mus. p. 248.

Cassidea granulosa Brug. Dict. n. 5. Lam. VII. p. 227. t. 20.

Cassidea inflata Shaw. Reeve f. 22.

Hab. St. Thomas, St. Croix (Riise, Krebs.) At certain
seasons of the year in seaweed on 2 or 3 feet water
and on the white sand of the beech. (Krebs p. 34)
Guadeloupe (Beau).

var. α . varicifera vel nuda; apertura patula.

Cassis granulosa Lam. Kien. t. 16. f. 33.

Hab. Brasilia (Reventl. Kröyer.) Catinguba (Hygom.)

375. *Cassis gibba* Gm.

T. ovata, angusta, porcata, rudis evaricosa.

List. 999. f. 64. Schröt. Einl. 1. p. 378.

Buccinum gibbum Gm. 3476. n. 24.

Buccinum undulatum Gm. var. Dill. 2. p. 545. n. 24.

Cassis globulus Bolt. 1798. p. 22. n. 371.

Bucc. cepa Bolt. n. 372.

var. α . angustior.

List. 1056. fig. inf. 9.

Cassis malum Bolt. p. 222. n. 370.

Hab. Catinguiba (Hygom) Cap Haiti (Liebm.) Florida, Carolina (Stimps.) St. Anna (Casp.) Vera Cruz (Liebm.)

376. *Cassis abbreviata* Lam.

T. rudis, varicibus validis 1—2.

Bucc. recurvirostr. ventricosum lev. cancellatum List. 1005. f. 65.

Turbo e lusitanico litore Bon. f. 157. (copi.)

Cassis abbreviata Lam. VII. 1822. p. 224. n. 12.

Cassis abbreviata Kien. p. 33. n. 21. t. 15. f. 31.

Hab. Antill. dan. (Riise, Hornb.) Guadeloupe (Beau) St. Thomas (Riise) Cap. Haiti (Liebm.).

377. *Cassis cicatrica* Meusch.

Bucc. ventr. tenue levi List. 1016. f. 75.

Bucc. cicatricosum Meusch. 1778. n. 1158.

Bucc. cicatricosum Gronov. Zoophyl. 1350. t. 2. f. 1. 2.

Bucc. recurvirostrum Gm. p. 3477. (non Reeve.)

Cassis laevigata Mke. Syn. 1828. p. 87. 1830. p. 115.

Cassis sulcosa Kien. p. 32. t. 16. f. 34.

Hab. Barbados (Lister. Hemmerich.) Guadeloupe (Duchas. Beau) St. Johns, Janaica, Carthagena, Tortola, St. Croix (Krebs) St. Thomas (Hornb. Riise).

var. α linea angulari, punctis asperis.

378. *Cassis lactea* Kien.

Bucc. bilineatum Gm. p. 3476. n. 23. (List. 998. f. 63.)?

Bucc. decussatum Penn. t. 79. f. 2. inf.

Bucc. bilineatum Mtg. Test. p. 244.

Cassis minuta Mke. Cat. Malsb. n. 806! (jun.)

Cassis lactea Kien. p. 38. t. 16. f. 35.

Cassis lactea Mörch Yoldi p. 113. n. 2099.

Hab. St. Thomas (Hornb. Riise.)

n. 373—78 an merae varietates.

Sbg. Goniogalea Mörch 1857. *Cat.* Suenson.

379. *Cassis madagascariensis* Lam.

Buccinum plicatum L. XII. 444. (Beck.)

Buccinum grande Soldr. *Cassidea grandis* Humphr.

Cat. p. 20. n. 318?

Fav. t. 20. f. A. 1. 2.

Cassis madagascariensis Lam. VII. p. 219. n. 1.

Cassis madagascariensis Kien. p. 7. n. 3. pl. 2. f. 2.

Cassis madagascariensis Chenu Ill. pl. 1. Man. f. 1121.

Cassis cameo Stimp. Sillim. Journ. 1860. p. 443.

Hab. St. Thomas, St. Croix (Krebs, Riise.) Jamaica (C. B. Ad.)

380. *Cassis flammea* L.

Lesser persian whilk Grew Mus. reg. p. 127. tab. 9.

Bucc. recurv. ventric. undatim depictum Turbo auritus tuberculatus Aldrov. List. 1005. f. 72.

Turbo non dissimilis drappo d'argento Bon. p. 131. f. 156.

Stormhoed Rumph. t. 23. n. 2.

Bursa jamaicensis maxime nodosa Petiv. Mem. Cur. 1708. p. 190. n. 18.

Cassis Seba t. 173. f. 5. 6. 10. 11. 14—16. 19 & 20.

Die gerippte und geflammte Sturmhaube. Attalische Kleid. Knorr. IV. t. 4. f. 1. III. t. X. f. 1. 2.

Westindische Sturmhaube Val. amb. pl. XI. f. 99.
100.

Bucc. striatum Meusch. Gronov. Zoophyl. p. 302.
t. 19. f. 18.

Vestis attalica genuina Mart. 2. f. 353—54.

Cassis ziczac s. plicata Meusch. Mus. 1297.

Cassis flammea Lam. Enc. t. 406. f. 3.

Cassis alba Perry t. 33. f. 2.

Cassis tuberosa jun. Kien. pl. 3. f. 5.

Hab. in 3 fathoms water on seaweed (Krebs p. 34)
Jamaica (Lister, Ad.) Cuba (d'Orb.) Guadeloupe (Beau)
Barbadoes, Antigua, Tortola (Krebs) St. Thomas (Hornb.
Rüise.)

381. *Cassis tuberosa* L.

Murex triangularis Rondelet. p. 46.

Murex triangularis Gesn. de Test. p. 244.

Murex triangularis Aldrov. p. 212. f. 4.

Cochlea indica ventricosa Bon. 323?

Cochlea cassidiformis umbilicata Labat. Voy. 5. p.
262. fig.

Cochlea cassidiformis Sloane Jam. II. p. 242. n. 2.

Cochlea cassidiformis Mus. Gottw. VIII. t. 1. p. 159.

Cochlea cassidiformis umb. marmorata, striis cancellatis Gualt. t. 41 A.

C. striata multicolor Bon. Kl. §. 237. 9. p. 92?

Cassis Seba t. 73. f. 10. 11. 12.

Gros Casque d'amerique Dav. Cat. p. 177. n. 297.

Casque triangulaire ib. p. 298.

Fav. t. 25. f. B. 2.

Cassis tuberosa, marmorata Mart. 2. p. 136. f. 359.

Cassis undulata Humphr. p. 19. n. 317.

var? t. minore, spira producta.

Cassis tuberosa, marmorata var. Mart. 2. f. 381. 82.

Cassis rotundata Perry t. 33. f. 1.

Hab. Cuba (d'Orb.) Jamaica, Bermuda (Ad.) Guadeloupe

(Beau, Duchassaing) Antigua, St. Johns, Tortola, St. Martin, Barbados (Krebs) St. Thomas (Rüse, Hornb.)

Subg. Cypraeocassis Stutchb.

382. *Cassis testiculus* L.

Bucc. ventr. t. labro pulvinato 3-cinctum et asperum
List. 1001. f. 66. (= Cochlea Bon. 162.)

Westindische Stormhoed Rumph. n. 3. p. 81. t.
23. f. 3.

Bucc. jam. vulg. umbilicatum Petiv. Mem. 1708. p.
190. n. 120.

Cochlea cassidiformis Gualt. t. 39. f. C.

Cassides crassae, Pileoli polonici dictae Seba t. 72.
f. 17—21.

Schellenschnecke Knorr. III. t. 8. f. 2. IV. t. 6. f. 1.

Cassis clathrata, squamis rufis. Pileolus polonicus
Mart. 2. f. 375—76.

Vestis attalica ib. f. 377—78.

Neritoides frequentius striata. Barel. p. 132. f.
1321—4. Sloane Jam. II. p. 248.

Cassis fasciatim flammea Klein p. 92. §. 376.

Casque des indes ou des Iles de France. Dav. p.
174. n. 289.

Fav. t. 26. f. D. 3.

Hab. Jamaica (Lister. Ad.) St. Johns, Arecibo, Carthagena, Bermuda (Ad.) Guadeloupe (Beau) St. Croix, Tortola, St. Barth, Barbadoes, Trinidad, Carthagena (Krebs.)

Morum Bolt.

Oniscia Sow. Theliostoma aut. apud Sow. Gen.

383. *Morum conoideum* Scop.

Rhombus parvus dentatus muricatus List. 791. f. 44.

Cypraea conoidea Scop. Delic. Insubr. 1786. t. 24.
f. 3. p. 78.

Moerbey. Val. Amb. pl. 4. f. 33.

Strombus oniscus L. Chem. XI. pl. 195 A. f. 1872.
 73! Wood pl. 22. f. 26.
Cassidea oniscus Brug. Dict. I. p. 432. n. 15.
Cassidaria oniscus Lam. VII. p. 217. X. p. 10.
 Kien. p. 92. t. 12. f. 5.
Oniscia oniscus Sow. Gen. XXIV. f. 4. Man. f. 469.
Oniscia Lamarckii Desh. X. p. 12. Chenu Man.
 f. 1139.
 Hab. St. Jean (Dr. Langemark.) Guadeloupe (Beau.)

384. *Morum oniscus* L. aut.

Strombus oniscus L. XII. p. 1210. Hanl. Ipsa Conch.
 p. 27. t. 5. f. 3.*)
Cochlea conoidea dentata Gualt. t. 22. f. L.
Rh. parvus dentatus muricatus Seba t. 55. f. 23.
 fig. plur.
Cassis-Erdbeere Knorr IV. t. 12. f. 4. VI. t. 15.
 f. 6.
Mus. Gottw. p. 37. pl. 26. f. 179 b. 180.
Cassis nodosa et *verruculata*. *C. parva* ind. occid.
 Mart. II. f. 357. 58.
Voluta verruculata Karsten Mus. Lesk. I. p. 226.
 1789.

Fav. t. 26. f. K.

Oniscia triseriata Mke. Syn. 1830. p. 64.?
 Hab. St. Thomas, St. Croix, Tortola, St. Barth, St.
 Johns, Anguilla, St. Martin (Krebs, Riise, Hornb.)

385. *Morum strombiforme* Reeve.

Rhomboides nodosus Petiv. Gazophyl. t. 48. f. 16.
Cypraea conoidea var. Scop. l. c.?
Oniscia strombiformis Reeve Proc. 1842. p. 91. C.
 S. p. 218. t. 253. f. 1.
Oniscia strombiformis Reeve Icon. f. 2.
Morum oniscus Ad. Gen. t. 23. f. 7.

*^o) an sp. seq.?

Hab. Honduras (Dyson) St. Thomas (Krebs, Riise) St. Croix (Ovesen).

386. Morum Dennisoni Reeve.

Oniscia Dennisoni Reeve. Proc. 1842. p. 21. C. S. t. 253. f. 5. 6.

Onisica Dennisoni Desh. Lam. X. p. 14. n. 3. Reeve Ic. f. 6.

Hab. Guadeloupe (Beau.)

Spec. dubiae.

Oniscia quadriseriata Mke. Syn. 1830. p. 145.

T. ovato-elliptica, crassa, albido spadiceoque varia, nodorum seriebus 4 sulcisque intermediis cineta; columella granulosa; labro intus dentato. Long. 1 poll. 3 lin.; lat. 9 lin.

Hab. ad Barbados. Attulit Christ. Hemmerich.

an M. strombiformis Reeve?

Cassidaria oniscus Lam. Kien. Anton? Verz. p. 94.

Sconsia Gray.

387. Sconsia striata Lam.

Fav. t. 26. f. G.

Cassidaria striata Lam. Enc. 405. f. 2. Hist. X. p. 10. n. 4.

Cassidaria striata Kien. p. 6. pl. 2. f. 3. Reeve Ic. f. 1.

Cassidaria striata Desh. Enc. I. p. 208. n. 1.

Cassidaria laevigata Sow. Geol. Journ. VI. p. 47. t. X. f. 2. affinis.

Cassidaria sublaevigata Guppy ib. XXII. p. 287. t. 19. f. 10. aff.

Hab. Jamaica?

Dolium Hill.

388. Dolium antillarum Mörch.

T. cylindrico-globosa, perforata; spira brevis, sutura

canaliculata, costis 19 magnis et 9 minoribus in intersticiis posterioribus; costa suturali bipartita; costis 4—5 in anfr. spirae, in intersticiis linea angusta mediana; apex nigricans.

Long. ap. $13\frac{1}{2}$ cm.; lat. $6\frac{1}{2}$ cm.

Dolium galea Krebs. Cat. p. 35. (non L.)

Hab. St. Thomas (Riise, Swift) Jamaica (Ad.)

var. brasiliiana. T. costis convexioribus, liris interstitialibus spirae obsoletissimis.

Hab. Brasilia (Romberg) Catinguba (Hygom, A. Benzon.)

Sbg. Galea Kl. Perdix Mtf. Dolium Browne. Brün.

389. *Dolium perdix* L. occidentalis.

List. 984. f. 43. (= Bon. 3. f. 191.)

Indian partridge shell Petiv. Amb. Gaz. 153. f. 13. Am. Cat. n. 504.

Perdix jamaicensis vulgaris Petiv. Mem. Curious 1708. p. 90. n. 21.

Sloane Jam. II. f. 246. n. 12.

Bucc. majus canaliculatum Gualt. t. 51. f. 1.

Dolium pennatum. D. perdix Mart. 3. f. 1079. p. 390.

Das Rebhuhn, Schellschnecke Knorr III. t. 8. f. 1.

Galea striata Klein. §. 167. 1. p. 56.

Urceus Kl. 139. IV. p. 149.

Melo reticulatus Kniph. Orig. t. 265.

Perdix reticulatus Mtf. C. S. 447.

α var.?

Bucc. brevir. tenue umbilicatum asperius striatum variegatum List. 985. f. 44.

Perdix. Seba t. 69. f. 12. 13.

Dolium pennatum Mart. f. 1078.

Dolium pennatum Mörch Cat. Yoldi. p. 110. n. 2058.

T. larvalis.

Helix sulphurea Ad. Contr. p. 33 & 98.

Hab. Jamaica (Lister, Ad.) St. Johns, Guadeloupe (Beau) Tortola, St. Martin, St. Barth., Barbadoes, Trinidad (Krebs) Vera Cruz (Liebm.)

β. brasili ana.

D. perdix var. Mörch Yoldi n. 2057.

Hab. Bahia (Andrea) Brasilia (Yoldi.)

Pyrula Lam.**390. Pyrula fortior Mörch.**

Ficus Seba t. 58. f. 3—5.

Figue blanche Dav. p. 216. t. 415.

Cochlea longa pyriformis Gualt. 26. f. M.

Ficus longa indiarum occidentalium Knorr III. t. 23. f. 1.

Pyrula reticulata Lam. Enc. meth. t. 432. f. 2. Lam. VII. p. 121. n. 9. (non Linck nec. Schloth.)

Pyrula reticulata Kien. p. 28. t. 12. f. 1.

Pyrula clathrata Rousseau Ill. Conch. tab. 2. (non Lam.)

Hab. Antill. (Magens) Campeche (Wessel canali ferruginea; vivide maculata.)

Differt a sequente t. ventricosiore, liris incrementis fortioribus.

391. Pyrula papyratia Say.

Pyrula nebula Humphr. cat. 585. (Florida.)

Pyrula papyratia Say. Journ. Phil. ac. I. Ser. II. 1822. p. 238.

Ficula gracilis „Sow.“ *) Phil. Mke. Zeitschr. 1848. p. 971.

Ficula gracilis Petit. J. Conch. 1852. p. 149.

Sycotypus papyratia Stimpson. Check List.

*) Tank. Cat. p. XVIII. n. 1615 = *P. Dussumieri* Kien. verisim,

Pyrula reticulata Sow. gen. n. XXIV.
 Hab. Florida (Humphr. Phil. Jay) Georgia and East
 Florida (Say.) Campeche (Phil.)

Sp. dub.

- Ficus Seba t. 58. f. I?
Ficus tenuis magna cancellata vel. *hispanica reticulata* Mart. 3. p. 17. f. 733.
Ficus cancellata Kl. §. 208. n. 8.
Pyrula ventricosa Sow. Tank. p. XVII. n. 1614.
 p. p.
 Hab. „Westind.“ Martini.
 an var. major P. *reticulatac?*
-

Fam. Cypraeacea.

Cypraea L.

Sbg. Erythraea Tournef. Barelier.

(Tigris Troschel non. Kl.)

392. *Cypraea cervus* L. Mantiss. p. 548.
Concha ven. maxima fusca innumeris maculis List.
 697. f. 44.
 Die grosse Porcellane Knorr I. t. 5. f. 3—4.
 Die westindische Argus Val. Verh. 585. f. 83 et
 p. 540.
 Faux argus de la grande espèce Dav. 279. n. 580.
Argus Indiae occidentalis fuscus Mart. 2. p. 348.
 f. 257—58.
 Le Firmament ou la Perdrix orientale Fav. Cat. p.
 69. n. 298.
Cypraeorum maxima Ch. X. f. 1393.
Cypraea oculata Meusch. 1778. n. 1066. Zoophyl.
 1271. Gm. p. 3403.
Cypraea atheroma Meusch. Gev. p. 402. n. 367—68.
Cypraea cervina Lam. Enc. meth. t. 351. f. 3.

Cypraea argus occidentalis Humphr. Cat. p. 9. n.

132. p. p.

Cypraea meleagris Bolt. 305.

Cypraea leucopsis Shaw Misc.

Hab. Westind. Valentyn, Kien. Pacific ocean under stones
(Cumg.) J do not know any perfectly authentical specimen
from Westindia.

393. *Cypraea exanthema* L.

*Concha venerea major fusca cui maculis majusculis
albis* List 669. p. 15. t. 698. f. 45.

eadem fasciata List. 699. f. 46.

Venerea ovi gallinacei figura exprimans Buon. f. 257.
266. 267.

Concha venerea jamaicensis Petiv. Mém. Cur. 1708.
p. 157. n. 9.

C. v. laevis subfuscata. Sloane p. 234. 235.

Erythraea maculis fuscis Barel. 1714. Ic. 1133. t.
1321. f. 22.

Porcellana spiralis Gualt. t. 16. f. O.

Porcellana Seba t. 76. f. 4. 5 & 15.

Argus pupilla fusca in iride alba Mart. 1. f. 289.
298. 300.

jun. Cypraea Zebra L. Gm. 3 non.

Rhombus tenuis ex fusco fasciatus List. 791. 37.

Cypraea bifasciata Gm. 3405. n. 33.

Cypraea plumbea Gm. 3403. 17.

Cypraea dubia Gm. p. 3405. n. 30.

var. b. maculis perpaucis ocellatis Lam. IX. p. 488.

Hab. Jamaica (List.) Cuba (Sagra) Martinique, Guadeloupe, St. Lucie (Candé, Beau) St. Barth, St. Martin, St. Thomas (Krebs, Riise) St. Croix (Hornb.)

var. c. pumilio Anegada (Riise.)

var. d. piriformis. Sow. Ill. f. 330.

394. *Cypraea mus* L.

*C. ven. fusca angustior minime gibba maculis latis
fuscis rufescentibus*. List. 688. f. 35.

- Venerea mole parva. Brasilia Buon. f. 325. (jun.)
 Het Carthageensche Kliphoorn Rumph. t. 39. f. S.
 Porcellana maculosa carthageniensis Heb. Richt.
 p. 300.
 Klipklevers Seba t. 76. f. 33. 34.
 Porcellana aus Maricaibo Knorr 3. t. 12. f. 3.
 Fav. pl. 30 A. f. A.
 Porcellana Achates linea fulva virgata d'Argv. p.
 267. t. 8. f. 2.
 Le Leopard, le Crapaud Dav. p. 269. 568. 273. 579.
 Porcellana Carthageniensis Mart. 1. p. 315 & 324.
 222—23.
 Cypraea vanelli (Guinea) Humphr. p. 8. n. 120.
 Cypraea autumnalis Perry t. 21. f. 2.
 jun. Bulla non umbilicata rarer subalbida Mart. 1.
 f. 209. 210.
 Bulla ferruginea Gm. p. 3432. Dill. Wood. t. 18.
 . 13.
 Hab. Cuba (Sagra) Martinique (Candé) Curaçao (Swift)
 Bonaire (Dietz.) Carthagena (Rumph.)
 395. Cypraea cinerea Gm.
 Concha venerea fusca, valde laevis duabus fasciis
 albidis exornata List. 667. f. 11.
 Concha ven. parva subcinerea ventre candida unica
 fascia fusca List. 668. f. 13.
 C. v. parva subfusca, levigata dorso bifasciato
 List. 670. f. 16.
 C. v. Jamaicensis fusca fascia rufa. Pet. Gaz. n.
 585. t. 80. f. 5.
 Sloane Jam. II. p. 235.
 Porcellana spiralis levigata subflava Gualt. t. 16. f. H.
 L. M.
 Porcellana spiralis levigata subflava Gualt. t. 16. f.
 L. M.

Porcellana cinerea latis fasciis fuscis Mart. 1. p. 316, 346. f. 254—55.

Cypraea fragiliodes Meusch. 1778. n. 1051. (List. 670. f. 16) *Zoophyl.* 1262.

Pore. grisea Meusch. Gev. n. 1349?

Cyprea cinerea Gm. 3402. 16. Lam. IX. p. 579. 22.

Cypraea translucens Gm. 3404.

Cypraea sordida Lam. IX. p. 510. n. 24. Ki. t. 26. f. 2.

Cypraea succineta „L.“ Mörch Cat. Yoldi. n. 2148. Hab. Jamaica, Barbados (List.) St. Thomas, Tortola, St. Barth, St. Martin, Anguilla, St. Domingo, Barbados (Krebs) Cuba, Martinique, Jamaica (d'Orb.) Guadeloupe (Beau) Vera Cruz (Liebm.) Bonaire (Riise)

396. *Cypraea surinamensis* Perry.

Cypraea surinamensis Perry 1811. pl. XX. f. 4.

Cypraca surinamensis Mörch Yoldi p. 116. n. 2184.

Cypraea surinamensis MSS. Br. Mus. Sow. Thes. f. 514. 15.

Cypraea nebulosa Kien. p. 63. t. 32. f. 3, non ab-similis.

Hab. Surinam (Perry.) Kurachie Woodw. Sir D. Bark-leys coll. The specimen of Count Yoldi was obtained by Mr. Cuming and is probably the same figured by Sowerby. Seq. an var.?

* 397. *Cypraea Aubryana* Jousseaume.

Cypraea Aubryana Jouss. Revue Zool. 1869. p. t. 18. f. 1—3.

Cypraea Aubryana Sow. Thes. f. 529—30.

Cypraea bicallosa, non bicalleusc. Coll. de Guade-loupe.

Hab. Guadeloupe (Musée des colonies de Paris.)

Sbg. Erosaria Troschel (Luponia „Gray“, Mörch 1853.)

398. *Cypraea bicallosa* Gray.

Cypraea bicallosa Gray. Misc. 1. p. 35. Descr. Cat. p. 7. n. 56?

Cypraea bicallosa Sow. Ill. n. 50. f. 10. Reeve f. 79.
Hab. St. Vincent W. Ind., Guilding (Reeve) Vera Cruz
vel St. Thomas (C. Wessel.)

Marie galante (Beau) verisim. sp. praeced.

399. *Cypraea spurca* L.

Conch. ven. Barbad. minor maculis flavescentibus
Petiv. n. 586. t. 95. f. 13. Mus. Gottw. pl. 5. f. 18?

Porcellana in utroque latere fimbriato Mart. 1. p.
402. f. 335.

Cypraea lota Born. p. 178. t. 8. f. 4. 5.

Cypraea acicularis Gm. p. 3421. n. 107.

Cypraea flaveola Lam. Enc. 356. f. 14. non L.

Cypraea spurca L. O. Fabr. Act. Hafn. 1821. 1824.
p. 75. d'Orb. Cuba n. 266.

Cypraea flaveola Desh. X. p. 558. n. 86.

Reeve f. 95.

Cypraea flaveola var. *alba* Sow. Ill. f. 81. 83. 104.

Luponia flaveola Roberts Am. J. C. 1870. p. 195.

Cypraea flaveola var. *labro-lineata* Gask. Proc. 1848.
p. 97?

Hab. Antill. (Hotess. Desh.) St. Croix (O. Fabr.) Martinique, St. Lucy, Cuba (d'Orb.) Guadeloupe (Beau) St. Thomas, St. Croix, St. Martin, Barbados (Krebs, Riise, Hornb. etc.) Vera Cruz (Liebm.)

Trivia Gray.

400. *Trivia pediculus* L.

Concha ven. striata cui summo dorso sinuato fusca
ncbulae striis eminentibus conspicuis List. 106. f. 56.

C. v. *americana* striata exigua Pet. Mem. Cur. 1708
p. 157. n. 16 Sloane Jam. 2. p. 236.

Porcellana fimbriata striata Gualt. t. 15. f. P. R.

Mus. Gottw. IV. t. IV. f. 45. a. f.

Pou de mer d'Argy. t. 18. f. L. Zoom. p. 40. f.
I. J. K.

Globuli marini s. Nussatellanae granulatae Seba t.
55. f. 22.

Ziczac Porcellaine Knorr VI. t. 17. f. 5.

Cypraea transverse striata Browne Jam. p. 410.

Cypraea pisum Meusch. 1778. n. 1071.

Cypraea sulcata Dill. 1. p. 666. n. 62. excl. var.

var. *labiosa* Gask. Proc. 1833. p. 202?

Hab. Jamaica, Barbados (List.) Cuba (Pfr., Sagra)
Martinique (Candé) Guadeloupe (Beau) St. Thomas,
St. Croix, St. Johns, Tortola, St. Martin, St. Barth,
Anguilla, Barbados, Trinidad (Krebs.)

var. *picturata*.

Hab. Florida.

401. *Trivia suffusa* Gray.

Trivia suffusa Gray Descr. Cat. n. 134. Sow. Ill.
f. 41. Reeve f. 142.

Trivia suffusa Desh. IX. p. 566. n. 97. Yoldi 2221.

Cypraea armandina Duclos. Kien. n. 140. pl. 46. f. 2.

Pot. & Mich. 1. p. 477 (nomen).

Cypraea pullata Hugh Oven. teste Sow. Thes.

Hab. Guadeloupe (Beau) St. Thomas, St. Croix, St.
Barth, St. Martin, Anguilla, Barbados, New Providence,
Trinidad, Watling (Krebs.)

402. *Trivia quadripunctata* Gray.

Trivia quadripunctata Gray Descr. Cat. p. 14. n.
120. Sow. Ill. f. 33.

Cypraea quadripunctata Reeve f. 146. Desh. IX.
p. 569. n. 101.

Cypraea rotunda Kien. n. 141. t. 53. f. 2. Mörch
Yoldi p. 2220.

Hab. Cuba, St. Lucy, New Orleans (d'Orb. p. 270) St.
Thomas, St. Croix, St. Johns, St. Barth, St. Martin,
Anguilla, Barbados, Trinidad, Jamaica (Krebs, Riise)
Watling, Guadeloupe, New Providence (Krebs.)

* 403. *Trivia candidula* Gask.

Cypraea candidula Gask. Proc. 1835. p. 200. Sow.
Ill. f. 149.

Cypraea candidula Reeve f. 151. 154.

Cypraea olorina Ducl. (teste Gask.)

Cypraea approximans Beck. (teste Gask.)

Hab. Mexico (Gask.)

404. *Trivia globosa* Gray.

Trivia globosa-*China* Gray Descr. Cat. n. 121.
Sow. Ill. n. 134. f. 34.

Cypraea pilula Kien. Krebs Cat. p. 41.

Cypraea subrostrata var. *alba* Krebs p. 42.

Hab. Cuba (Auber) N. Orleans (d'Orb.) St. Barth, Anguilla, St. Croix, St. Martin, St. Jean, Guadeloupe, (Krebs).

405. *Trivia subrostrata* Gray.

T. globosa obscure-violacea.

Trivia subrostrata Gray Descr. Cat. n. 124. Sow.
Ill. f. 36.

Cypraea subrostrata Reeve f. 147.

Hab. Guadeloupe (Beau) St. Johns, St. Croix, St. Barth, Anguilla, Barbados (Krebs) St. Thomas (Riise, Krebs).

406. *Trivia nivea* Gray.

Trivia nivea Gray Descr. Cat. n. 127. Sow. Ill.
f. 38.*

Cypraea nivea Gray Reeve f. 136.

Trivia oryza Gray Z. J. III. p. 319. Gask. Proc.
1848. p. 48.

Cypraea scabriuscula Kien. (non Gray.)

Hab. Cuba, New Orleans, Sur le côté nord (d'Orb. 217.)
Guadeloupe (Beau) Cuba (Andrea) Anguilla, St. Croix,
St. Barth, Watling J. (Krebs).

Erato Risso.

Lachryma Humphr. in Sow. Thes.

407. *Erato Maugeriae* Gray.

Erato Maugeriae Gray. Sow. Ill. f. 47. n. 4. Thes. p. 83. f. 7—9.

Hab. West Indies (Gray) St. Thomas, St. Barth (Krebs.) Guadeloupe (Beau) Curaçao, St. Martin (Krebs.)

Spec. dubiae.

Erato? *cypraeoides* C. B. Ad. Proc. Bost. Soc. 1845. p. t. Cat. p. 16.

Erato? *cypraeoides* Krebs Lyc. N. York. VIII. 1866. p. 395.

„T. solida, alba; anfr. infra suturam fusco-canaliculatis; spira plana, parva; apertura linearis, profunde emarginata; labro extra crasso, intus exile crenulato; labio per totum transversim exile plicato. Long. 0,₃₂₅ poll., lat. 0,₂ poll.“

Hab. Jamaica.

Pachybathron Gask.408. *Pachybathron cassidiforme* Gask.

„T. subcylindrico-ovata, opaca, alba, leviter trifasciata, dorso longitudinaliter rude striata; spira brevissima, subacuminiata; anfractibus quatuor prominulis, irregulariter crenulatis, ultimi margine posteriori carinam nodulosam extus sulco profundo circumdatam ad finem exteriorem aperturae desinente, apice subobtuso prominulo; basi subrotundata, lata, crassissima, ad marginem exteriorem abrupte terminata, et trans partem tertiam anteriorem testae lateris ad extremitatem columellarem desinente; apertura angustiuscula, parum arcuata; labro crasso, margine interiori exiliter denticulato; margine columellari dentes 12—14 lineares remotos, basin transeuntes et ad marginem interiorem sulci columellaris desinentes exhibente, sulco columellari lato, minime profundo; extremitatibus planis, prominentioribus, carinatis, posteriori non rostrato; canali profundo, breviusculo.“

Long. $25/_{100}$, lat. $15/_{100}$ poll.

Pachybathron cassidiformis Gask. Annals & Mag. Mag. 2. Ser. 1853. p. 2. t. 12. f. 1—3. Ad. Gen. t. 20. f. 4.

Pachybathron marginelloideum Chenu Man. f. 1141.
Hab. ad Ins. St. Vincenti (Gask.)

409. *Pachybathron marginelloideum* Gask.

T. subcylindrica, alba opaca, fascia brunnea spiram plerumque circumdante, fasciis tribus (quatuor?) lineis fulvis sagittaeformibus interruptis ciucta; dorso longitudinaliter leviter striato, sulcis remotis profundioribus parallelis excavatis impresso; spira plana, depressa (juniorum apice prominulo, obtuso), anfractibus 3—4, plus minusve crenulatis; basi rotundiuscula, lata, crassissima, ad marginem exteriorem abrupte latitudine decrescente et ad dorsum canalis desinente; apertura angustiuscula, parum arcuata, postice non rostrata; labro crasso, per totum marginem interiore denticulato, latere columellari denticulis 12—13 fortibus remotiusculis linearibus a margine per basin usque ad marginem interiore sulci columellaris extensis munito; sulco columellari lato, minime profundo; extremitalibus obtusis, crassis; canali brevi.

Long. $28/_{100}$; lat. $16/_{100}$ poll.

Pachybathron marginelloideum Gask. l. c. f. 4—6.

Pachybathron cassidiformis Chenu f. 1142.

Hab. in India occidentali. Gask.

Fam. Amphiperasidae.

Ovula Lam.

Amphiperas Meusch.

Sbg. Cyphoma Bolt.

Ultimus Mtf. *Carinea* Sws. *Binvoluta* Schlüt.

410. *Ovula gibbosa* L.

Concha utroque latere se colligens Fab. Col. Purp.

1616. p. 29. f. 5.

Venerea in littore brasiliani frequens Bon. 339.

Cochlea eburnea Brasilia Bon. f. 249.

Venerea brasiliensis Mus. Kirch. p. 471. n. 338.

Concha utroque latere se colligens List. 711. f. 64.

Veneroides alba, Concha veneris effusa Petiv. Gazoph.

1702. t. 15. f. 5.

Porcellana integra Gualt. t. 15. f. 3.

Porcellana albida gibbosa d'Argv. t. 18. f. Q.

Porcellanae albissimae Seba t. 55. f. 18.

Die gestumpfte Schn. Knorr I. t. 14. f. 3—6. VII.

t. 32. f. 4.

Bulla brasiliensis alba, Mart. I. f. 213—14.

Cyphoma gibbosa Bolt. p. 15. n. 253.

var. α rostrata.

Bulla oblonga, non dentata Mart. I. f. 211—12.

Cyphoma dorsata Bolt. p. 15. n. 254.

Ultimus gibbosus Mtf. 2. p. 642.

Ovula pharetra Perry t. 53. f. 2.

Ovulum gibbosum Sow. Thes. f. 17. 18?

Hab. Cuba (Sagra) Guadeloupe (Beau) Martinique, St. Lucie (d'Orb. n. 262) St. Thomas, St. Johns, Anguilla, Trinidad (Krebs, Rüise) Jamaica, Barbados, (Lister) Cumana, Anguilla (Krebs).

411. *Ovula intermedia* Sow.

Concha venerea altera dorso annulato, leviter admodum striata List. t. 712. f. 68.

Missile textorum Hebenstr. Mus. p. 302.

Porcellana rostrata, dorso parumper annulato Klein p. 90. n. 4.

Bulla oblonga Mart. I. f. 215—16.

Bulla spelta L. Dill. 2. p. 775 9.

Ovulum intermedium Sow. Spec. Conch. p. 9. f. 32—33.

Ovulum intermedium Sow. Thes. p. 479. f. 61—62.
Hab. Brasilia (Mawe. Sow. Suenson).

Sbg. Rhizorus Mtf.

Simnia Leach 1826. Scymnia Risso.

412. *Ovula carolinensis* Mörch.

T. solidula, pallide isabellina, labro et labio candi-
dissimis, antice et postice striata. Differt ab *O. inflexo*
(Gulf of Dulce) Sow. Ill. f. 60 t. graciliore. Differt
ab *O. deflexo* Sow. Thes. f. 37. 38 labro tenui.

Long. $20\frac{1}{2}$ mm.; lat. $5\frac{1}{2}$ mm.

Ovula uniplicata „Sow.“ Stimpson. Check List. et in
sched.

Hab. Charleston, S. Carolina (Stimpson com.).

413. *Ovula acicularis* Lam.

Concha venerea parva, admodum tenuis leviter
purpurascens List.* t. 711. f. 66.

Bulla secale Sold. MSS. Dill. Cat. 1. p. 474. Wood
Index p. 85. n. 7. t. 18. f. 7.

Ovula acicularis Lam. Ann. du Mus. 9. Hist. VII.
n. 9.

Ovulum aciculare Sow. Thes. p. 277. f. 43—46.

α. sulphurea.

β. purpurea.

Hab. Cuba d'Orb., St. Martin (Krebs) Guadeloupe
(Beau) Antill. (Maugé) Terra firma (Hornb.) Jamaica
(Soldr.) Coralbay, St. Jean (Krebs).

414. *Ovula subrostrata* Sow.

T. obscure purpurea, utrinque acuminata.

Ovula subrostrata Sow. Proc. 1848. p. 136.

Ovula subrostrata Sow. Thes. f. 39. 40.

Hab. Honduras (Dyson.) Brasilia (Suenson.)

415. *Ovula uniplicata* Sow.

T. aurantia, antice angulata rostro subtorto.

*⁾ an sp. praeced.? sed „purpurascens“ non quadrat.

Ovula uniplicata Sow. Proc. 1848. p. 135

Ovula uniplicata Sow. Thes. p. 478. f. 30. 31. 32.

Hab. Brasilia (P. W. Lund) Rio Janeiro (Sow.) „South Carolina obtained, (not „dredged“) near Charleston S. Carolina by Mr. Cumg.“ probably erroneous.

* 416. *Ovula antillarum* Sow.

T. obscure purpurea utrinque obtusa.

Ovula antillarum Sow. Reeve f. 64.

Hab. Antill. (Cumg.)

Ovalum aequale Sow. Ill. p. 61. Panama Cumg.
peraffinis.

Pedicularia Sws.

* 417. *Pedicularia decussata* Gould.

Pedicularia decussata Gould Proc. Bost. Soc. V.
1854. p. 127. 1855. p. 126.

Pedicularia decussata Gould Otia p. 215.

Hab. Georgia & Florida (Gould.)

Fam. Naticidae.

Stomatia Hill.

Cryptostoma Blv. *Sigaretus* Lam.

418. *Stomatia depressa* Phil.

Weisse Ohrläppchen Knorr VI. t. 39. f. 5 non IV.
t. 17. f. 5.

Cochlis elliptica etc. Mart. 1. f. 152?

Auris venerea alba. Humphr. Cat. p. 20. n. 330.

L'oreille de Venus toute blanche. Fav. p. 570.

Sigaretus depressus Phil. Abb. Juli 1844. p. 143.

t. 1. f. 3.

Sigaretus haliotoideum L. *) Recl. Chenu Ill. p. 19.

t. 3. f. 6--7.

*) *Helix haliotoidea* L. ex Hanley Ips. Conch. == *S. incisus*
Reeve.

Sigaretus antillarum Recl. J. Conch. 1851. p. 185.
Sigaretus haliotoides d'Orb. Cuba p. 37. n. 124.

Cryptostoma Leachii Blv. Man. p. 467. t. 42. f. 3.?
 Hab. St. Martin, Cuba (d'Orb, Liebm.) St. Thomas
 (Petit et Hornbeck) St. Jean (Magens, Sommer, Fru
 Eckardt, Ravn.) St. Thomas, Tortola (Krebs, Riise.)

419. *Stomatia perspectiva* Say.

Diffr. a praecedente *T. convexiore*, liris fortioribus.

Sigaretus perspectivus Say Am. C. p. 3. Sept. 1830.
 t. 25.

Sigaretus Leachii Blv. *) Sow. Gen. n. XIX. f. 3.

Cryptostoma carolinum Cuv. R. A. 3. 91 (nomen).

Sigaretus perspectivus Dekay p. 153. t. VII. f. 156.
 Hab. New Jersey and farther south (Say) Long Island
 (Dekay.)

Sbg. Stomatia Hill.

420. *Stomatia zonata* d'Orb.

Auris bahamica non perforata Petiv. Gaz. n. 587.
 293. t. 11. f. 4.

Stomatia gibbosa striis numerosis tenuibus, dusky
 chocolate Hill p. 119. t. 7. f. 2. (1752.)

Stomatia minor glabra Browne Jam. p. 398. d'Arg.
 t. 8. f. D.? t. 7. f. C.

Auricula muris Mart. 1. p. 176. p. 196. t. 151 & 154.

L'oreille de Venus Fav. 1. p. 59. t. 5. f. C.

Sigaretus zonatus d'Orb. Cuba 2. p. 35. n. 215.
 (1842.)

Sigaretus Martinianus Phil. Abb. Juli 1844. p. t.
 1. f. 5.

Sigaretus maculatus Say. Recl. Chenu Ill. p. 16. t.
 1. f. 1a.

Hab. St. Domingo (Fav.) St. Croix (Magens, Oersted.)

*) cfr. *S. Leachii* Blv. Reeve f. 13 Westindies.

Margarita (Hornb.) Guadeloupe (Hotessier, Beau) St. Martin (Krebs) St. Thomas (Riise) Brasilia (P. W. Lund.)

* 421. *Stomatia maculata* Say.

Sigaretus maculatus Say Am. Conch. n. 3. Sept. 1830.

Sigaretus maculatus Phil. Abbild. t. 2. f. 9 (copi.)
Hab. on the South coast of North America (Say.)

Natica Lam.

Sbg. Naticina Gray.

421. *Natica (Naticina) semisulcata* Gray.

Natica semisulcata Gray Beechy Voy. p. 136.

Natica semisulcata Phil. Abbild. p. 16. t. 1. f. 10.

Natica semisulcata Reeve f. 116.

Hab. Portorico (Reeve) St. Martin, St. Croix, St. Thomas, Tortola (Krebs, Riise). *Sarasota*, *Simpson*

Sbg. Neverita Risso.

422. *Natica (Neverita) campechiensis* Recluz.

Cochlea alba umbilico pulvinato margine circumdato clavicula compressa Lister t. 562. f. 9.

Neritaeformis pressa Meusch. Mus. Gev. 1787. n. 325 p. p.

Nerita duplicata S. Amer. Br. Mus. Wood Supp. t 8. f. 11.

Natica campechiensis Recl. Chenu Ill. t. 4. f. 9.

Natica campechiensis Reeve Ic. f. 1.

Hab. Sin. Campechiensis Ind. occid. (Lister.)

423. *Natica (Neverita) fossata* Gould.

T. perforata.

Natica fossata Gould Bost. Proc. II. 1847. p. 263.

Natica texicana Phil. M. Zeitschr. 1848. p. 158
(Mart. 1849.)

Natica texicana Römer Texas 1849. p. 457. n. 82.

var. *a. t. paulo magis depressa, umbilico simplece.*

var. β . t. paulo magis elevata, umbilico striato extus
margin'e prominente baseos, veluti carinula cincto (Phil.)
Hab. Florida coast (Gould, Stimp.) Galveston, Texas
(Römer) Vera Cruz (Liebm.) St. Anna (Casp.)
an var. praecedentis?

424. *Natica (Neverita) duplicata* Say.
T. imperforata.

Natica duplicata Say Journ. Ac. Sc. II. p. 247.
Natica duplicata Philippi Abbild. pl. 1. f. 9.
Natica duplicata Gould Mass. p. 236. f. 164. ed.
2. p. 345.
Hab. Charleston S. Carolina (Stimp.) Mouth of Rio
grande (Schott.) Nantucket common, Boston (less com-
mon.)

Sbg. Mamilla Schum.

Naticella Sws. Ruma Ch. Ad.

* 425. *Natica (Mamilla) Bernardii* Recluz.
Natica Bernardii Recluz J. Conch. 1851. p. 197.
t. 15. f. 1.
Hab. Golf de Mexique (Recl.) *Exotic?*

Sbg. Pollinices Mtf.

Mamma Kl. p. p. Mörch. Ad. Albula Bolt. p. p.
Eucaryum Ehrb. *Naticina* Guild.

426. *Natica (Pollinices) fuscata* (Ch.) Humphr.
Cochlea subflava unicolor List. 566. f. 14.
Platystoma subflavum, unicolor Klein p. 15. §. 40.
n. 7.
Vitellus saturate flavidicoloris Seba. t. 38. f. 32-33.
Klappenschnecke Knorr 1768. IV. t. 8. f. 4.
Geve t. 28. f. 306.
Mamelon souci Davila Cat. p. 119. n. 125. t. 2. p.
285. 1.
Cochlea semilunaris mammaeformis, maxime umbili-
cata Favart 2. p. 304.

Mamelon ou le Teton brun de Venus Fav. 1780.
t. 2. p. 285. t. XI. f. H. 1.

Mamma veneris fuscata seu lutea Ch. V. p. 282.
f. 1932—33.

Nerita mamilla β . Gm. 1789. p. 3676.

Nerita mamilla Schröt. Einl. t. II. p. 232.

Uber fuscatum Humphr. 1797. p. 21. n. 347.

Albula hepatica Bolt. p. 14. n. 249 (1798.)

Natica brunnea Linck Rost. 1807. p. 140.

Natica mamillaris Lam. V. p. 197. n. 3.

Natica mamillaris Reeve f. 29.

Natica fuscata Ch. Mörch Yoldi n. 2447.

Hab. Barbados, Jamaica (Lister) St. Thomas (Ch. Riise,
Krebs) Cuba, St. Lucie (d'Orb. n. 210) Jamaica, Car-
thagena (Krebs) Margarita (Hornb. long. 75 mm.) Catin-
guiba (Hygom) Vera Cruz (Liebm.) St. Anna (Casp.)
var.? obscura.

Natica bahiensis Recluz J. Conch. 1850. 1. p.
399.*)

Hab. Bahia (Recl.)

* 427. Natica (Pollinices) Draparnaudi Recl.

Natica Draparnaudii Recl. J. Conch. II. 1851. p.
198. t. 5. f. 11.

Hab. Le Golf de Mexique? Petit Coll. *err. of habitat.*

* 428. Natica (Pollinices) candidissima Recl.

Natica candidissima Recl. J. Conch. II. 1851. p.
87. t. 2. f. 3.

Hab. Bahia.

*) T. ovata, ventricosa, solida, superne cervina, inferne albido
cinerascente; spira vix exserta, conico-depressa, albida; anfractu in-
fimo versus suturam compressiusculo; apertura obliqua, semicirculari,
intus rufo-fusca; labio oblique subrecto, superne et extus callo, in-
crassato, medio sulco diviso; umbilico pervio, canali lato, intense
luteo rufo, medio spiraliter anguloso. Alt. 28 mm.; lat. 26 mm. Ap.
alt. 26 mm. ap. lat. 12 mm. (Recluz.)

429. *Natica (Pollinices) ochrostoma* Recl.

Natica ochrostoma Recl. Journ. de Conch. 1850.
p. 391. t. 19. f. 10.

Hab. Tortola, brought by a fisherman with other shells
1859 (Swift.)

* 430. *Natica (Pollinices) porcellana* d'Orb. mss.

T. anguste profunde umbilicata, oblique globosa,
solida, spira brevi, obtusa anfractibus superne concavo-
unidentatis, deinde convexis, apertura lunari-ovata, colu-
mella superne late callosa, callositate parva columnari
intrante; caerulecente lactea, epid. corneo flavicante
partim induta.

Natica porcellana d'Orb. mss. Recve. Ic. 1855. f. 102.

Hab. Bahia (Mus. Cumg.)

* 431. *Natica (Pollinices) uberina* d'Orb.

T. ovali, ventricosa, crassa, laevigata, alba; spira
prominula, acuta; anfr. senis, convexiusculis, ultimo
magno; apertura semilunari, apertura angulo posteriori
crassissimo, umbilico sulcato (callo funiculari; ex ione.)
Long. 20 mm.; diam. 15 mm.

Natica uberina d'Orb. Cuba p. 31. t. XVII. f. 19.

Hab. Cuba (Sagra) Martinique, Guadeloupe, St. Lucie
(St. Cyr. Hotess.)

432. *Natica (Pollinices) lactea* Guild.

Uber albatum Humphr. Cat. p. 21. n. 345 (nomen.)

Naticina lactea Guild. Linn. Trans. t. VI. p. 29.

Natica nitida Don. d'Orb. 2. p. 32. n. 209.

Natica pes elephantis Pfr. W. Arch. 1840. 1. p.

254. 289 non Ch.

Natica Pfeifferi Phil. Mke. Zeitschr. 1851. p. 45.
n. 43.

Natica Pfeifferi Phil. Küster 2. t. 19. f. 12.

Hab. Cuba, Martinique, St. Lucie, Guadeloupe (d'Orb.)
St. Thomas, Tortola (Riise) Vera Cruz (Liebm.) N.
Provid., Porto Plata (Krebs.)

433. *Natica (Pollinices) caribaea* Phil.

T. ovata, sordide alba, ad suturam zona lactea munita; anfractibus superius vix convexis, spira brevi, acuta; apertura semiorbiculari, umbilico parvo; callo lato cum labio confluente illum maxime ex parte opplente.

Alt. 8; diam. 7 lin.

Nerita nitida Don. IV. 1802. pl. 144?

Nerita nitida Mtg. Supp. p. 149.

Natica mamilla Lam. Brown. Ill. 1827. t. 43. f. 7—11 bene.

Natica caribaea Phil. Proc. 1850. p. 234.

Natica caribaea Phil. Reeve Ic. 1855. f. 168.

Hab. St. John (Phil.) Tortola (Krebs) St. Croix, Guadeloupe (Riise.)

„Forma omnino accedit ad *N. mamillatam* vel *N. lacteum* et umbilico pervio cum *N. lacteo* convenit. Differt tamen umbilico longe angustiore, et callo ejus longe majore; an nihilominus mera var.? *N. uberina* d'Orb. t. longe angustiore magis differre videtur. (Phil.)

Natica Adans. s. strict.

Sbg. Stigmaulax Mörch.

operculum costa mediana lata aspera.

434. *Natica (Stigmaulax) cancellata* Herrm.

Operculum: costa mediana crassa verrucosa, lineis 3 marginalibus compressis serratis, deinde lira crassa. (coll. Swift.)

Cochlea variegata cancellata List. 556. f. 16.

Cochlea carolina rugis tessellatis undatis; lattice furrowed. Petiv. gazoph. n. 566. t. 69. f. 5.

Nerita rugosa granosa, flammis rubicundis insignita Chem. V. f. 1911—12.

Nerita cancellata Herrm. Ntf. 1781. XV. Stück. t. 2. f. 8—9.

Nerita cancellata Gm. p. 3670.

Cochlea sulcata Bolt. p. 104 n. 1859.

Natica cancellata Lam. VI. p. 204. n. 31.

Natica sulcata Reeve f. 91. 95. p. p. Desh. VII. p. 645. p. p.

Natica (Stigmaulax) rugosa Ch. Mörch Yoldi. n. 2464. p. 133. Schröt. Register.

Hab. Westind. (Chem.) St. Thomas (Riise) Guadeloupe Beau) St. Johns, Porto-Plato, St. Croix, Trinidad (Krebs.)

Diffrerit a sequente testa candida fulvo nebulosa, spiraliter lineata, costis decussatis.

435. *Natica (Stigmaulax) sulcata* Born.

Operculum: costa mediana conferte et irregulariter mamillato-verrucosa, marginem versus laevigata; margine externo sulcis acutis 4 inaequalibus (coll. Riise.)

Nerita sulcata Born Ind. p. 466. Mus. p. 270. t. 17. f. 5—6.

Nerita rugosa, anfr. longitudinaliter rugosis Ch. V. f. 1902—3.

Nerita rugosa Gm. p. 3673.

Cochlis plicata Bolt. p. 104. n. 1858.

Natica costata Mke. Malsb. 1829. p. 12. Synops. p. 47.

Natica (Stigmaulax) sulcata Mörch Yoldi n. 2463. Hab. St. Thomas, St. Croix. Guadeloupe (Riise, Krebs.)

Diffrerit a praecedente t. unicolore, substantia dura, interstitiis costarum spiraliter impresso-lineatis.

* 436. *Natica (Stigmaulax?) Haneti* Recluz.

Natica Haneti Recl. J. Conch. 1. 1850. p. 289. t. 13. f. 6—7.

Hab. Bahia (Hanet.)

Subg. Nacca Riss.

Operculum multisulcatum.

437. *Natica (Nacca) canrena* L. Ch.

Cochlea fusca, cuius lineis spirales aliquot albicantes

intersecant characteres quidum nigri List. t. 556. f. 4.
(operculum.)

Cochlea umbilicata rotundata et nitida Buon. p. 16.
f. 372.

Cochlea umbilicata Kirch. p. 365. p. 473. Petiv. t.
156. f. 4.

Cochlea marina umb. fulvida *a.* Gualt. t. 67. f. V.

Cochlea marina Geve t. 27. f. 290^b.

Cochlea marina d'Argv. t. 7. f. A.

Nerita ombilique des indes Dav. Cat. p. 116. n. 166.

Die bandirte halbe Mond Knorr III. t. 15. f. 4.
t. 20. f. 40.

Platystoma litterata Klein. §. 39. p. 13.

Ala papilionis Ch. V. f. 1860—61. (operculum.)

Natica fascié L'aile de papillon. Fav. 2. p. 276.

Neritaeformis fusca Meusch. Gev. 276. n. 338. (Gualt
67. p. V.)

Nerita pellis erminea Martyn Un. Conch. 109.
(Chenu ed. t. 37. f. 3.)

Lunatus vittatus Humphr. Cat. p. 21. n. 307.

Cochlis canrena Bolt. n. 1843.

Natica canrena L. Lam. Enc. t. 453. f. 1. Sow.
Gen. f. 1.

Natica canrena Pot. & Mich. Douai p. 291. t. 28
f. 21—23. (op.)

Hab. Carolina, Bahama (Lister.) Pernambuco (Petiver)
Martinique, St. Dominique (Fav.) Florida (Alphen) d'Orb.
n. 207. St. Lucie, Guadeloupe, Cuba d'Orb., Jamaica
Turks Island, Bermuda (Ad.) Rio Janeiro d'Orb. Am.
mer. p. 400.

St. Barth, St. Thomas, St. Johns, Tortola, Anguilla,
St. Martin (Krebs, Riise, Scholten, Magens, Sommer,
Castonier.)

Sbg. Cochlis (Bolt.) n.

Operculum politum, sulco marginali impresso.

438. *Natica (Cochlis) pennata* Ch. Schröt.

Nerita pennata maculis semilunaribus Chem. V. f. 1921.

Nerita pennata perforata ib. p. 242.

Nerita canrena d. Gm.

Nerita canrena H. Dill. I. p. 997.

Nerita pennata Schröter Register 1788. p. 72.

Natica Chemnitzii p. p. Pfr. Reg.

var.

Natica eayennensis Recl. J. C. 1850. p. 383. t. 14. f. 6.

Hab. Cayenne (Recluz.) Trinidad (Riise, Swift.) Westind. (Ch.), Catinguba dredged in the river (Hygom.)

Differt a sequente apertura patula, spira brevi.

439. *Natica (Cochlis) limacina* Jousseaume.

Nerita maroccana Chem. V. f. 1905. 6.

Nerita marochiensis Gm.

Natica taeniata Mke. Cat. Malsb.

Natica Chemnitzii Pfr. Register p. p.

Natica limacina Jousseaume Rev. Zool. 1874. I. p. 14. t. 2. f. 7—8.

Hab. Trinidad (Riise) St. Croix (v. Eggers) Antill.? (Jouss.)

var. major. Long. 32 mm.; diam. 24 mm.

Natica affinis v. d. Busch. Phil. Abb. non absimilis.

Hab. Catinguba (Hygom.)

440. *Natica (Cochlis) livida* Pfr.

„T. subglobosa, solida, unicolore livida, anfr. 4 infra suturam oblique rugosis, ultimo ventroso; umbilico semilunari; callo fusco: apertura intus nitida, fusca: Pfr.

Long. 7, diam. 7 lin.

Cochlea parva subrufa media et ima parte ustulatae albicante List. t. 559. f. 2.

Natica livida Pfr. Arch. f. N. G. VI. 1840. p. 254. n. 99.

Natica jamaicensis Ad. Contr. 1850. p. 111.

Natica jamaicensis Ad. Reeve Ic. f. 131.?

var. *nigrescens* Ad. Contr. p. 112.

Hab. Cuba (Pfr.) Jamaica (Ad.) St. Thomas, Guadeloupe (Riise) St. Croix (Ovesen.)

* 441. *Natica (Cochlis) rufilabris* Reeve.

T. obtecte umbilicata, subglobosa, tenuicula, spira mediocri, subexserta, anfractibus rotundatis, laevibus, apertura ovata, columella superne callosa, callositate lata reflexa umbilicum tegente; livido plumbea, obsolete fasciata, nitente, encausta columellari et callositate vivide castaneis.

Natica rufilabris Reeve Ic. f. 102. Juni 1855.*)

Hab. Bahia (Mus. Cumg.)

an var. *praecedentis*?

442. *Natica (Cochlis) proxima* C. B. Ad.

N. Dillwyni Payr. peraff. Operculum laevigatum, costa et linea impressa marginali; anfr. primi opaci asperi.

Nerita rufa Mtg. Supp. p. 150. t. 30. f. 3. (bene.)

Nerita rufa Brown Ill. B. C. 1827. t. 43. f. 3—6.

Nerita rufa Brown Enc. Brit. VI. 902.

Natica proxima C. B. Ad. Contr. 1850. p. 111.

Natica proxima Reeve Icon. f. 126. mala.

Hab. Jamaica (C. B. Ad.) St. Martin, Porto Plata, St. Jean, Cuba (Krebs) St. Thomas, Curaçao, St. Croix (Riise), Vera Cruz, Liebmann.

Spm. max. diam. 13 mm.

442. *Natica (Cochlis) lacernula* d'Orb.

T. globoso-oblonga, laevigata, fusco-rubra, suturis albescientibus, zona alba antice cincta; spira brevi, acuminata, anfr. quinis, subconvexis, ultimo magno; apertura oblonga; aperturae angulo posteriori calloso; umbilico calloso, longitudinaliter fissurato. Long. 13. mm.; diam. 10. mm. d'Orb.

*) an figura confusa cum praecedente?

Operculum politum, anguste marginatum; margine antico crasso subliliter granuloso. (M.)

Natica pulchella Pfr. Arch. f. N. G. 1840. p. 254.
n. 100?

Natica lacernula d'Orb. Cuba 1842. 2. p. 35. n. 213.
t. 17. f. 23—25.

Natica Menkeana Phil. Conch. Cab. t. 15. f. 8.

Natica Menkeana Mke. Zeitschr. 1851. p. 46.

Natica arachnoidea Mke. in litt.

Natica depressa Gray. (quorund.)

var. α lineis rufis sparsis.

Hab. Martinique, Cuba (Sagra, Candé) Portorico (Mke.)

Nassau, Portorico, Anguilla, N. Providence, Watling (Krebs) St. Thomas, St. Croix (Rüse.)

* 443. *Natica (Cochlis) Sagraiana* d'Orb.

T. globosa, tenui, laevigata, albescente, lineolis fuscis longitudinaliter undulatis, confertim interruptis ornata; spira brevi, obtusa, anfractibus quatuor convexiusculis, ultimo magno, umbilico calloso, antice fissurato, apertura ovali. d'Orb.

Long. 11 mm., diam. 10 mm.

Natica pulchella Pfr. Arch. f. N. G. 1840. VI. 2.
p. 254.?*) non Risso.)

Natica Sagraiana d'Orb. Cuba 1842. p. 34. n. 212.
XVII. f. 20. 22.

Natica Sagraiana (N. filosa Phil.) Weink. Mittelm.
2. p. 247.

Hab. Cuba (Sagra) but the locality erroneous according to Recluz J. Conch. III. p. 271. I have not seen any American specimen.

*) *N. pulchella* T. parva, subglobosa, nitida, alba, lineolis longitudinalibus undatis picta; spira mammillata; anfr. 3 convexis; umbilico callo nigricante clauso. (Pfr.)

Long. $3\frac{1}{2}$; diam. $3\frac{1}{4}$ lin.

= *N. Sagraiana* d'Orb. teste Philippi.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Mörch Otto Andreas Lawson

Artikel/Article: [Synopsis molluscorum marinorum Indiarum
occideiitalium imprimis Insularum danicarum. 14-66](#)