



CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANNELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecília Z. Amaral
Silvana A. Henriques Nallin
Tatiana Menchini Steiner

Campinas
2010

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecília Z. Amaral
Silvana A. Henriques Nallin
Tatiana Menchini Steiner

Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, UNICAMP, CP 6109, 13083-970,
Campinas, SP, Brasil.
E-mail: ceamaral@unicamp.br; tatims@unicamp.br

Esta compilação das espécies de poliquetas do Brasil é dedicada a todos aqueles que em algum momento tiveram o privilégio de admirar a beleza e avaliar a importância que este grupo representa para a ciência.

Cecilia Amaral

Este catálogo deve ser citado como:

AMARAL, A.C.Z., NALLIN, S.A.H. & STEINER, T.M. 2010. Catálogo das espécies de Anelida Polychaeta do Brasil. http://www.ib.unicamp.br/destaques/biota/bentos_marinho/prod_cien/texto_poli.pdf (consultado em ...).

Campinas
2010

INTRODUÇÃO

Os primeiros registros de poliquetas do Brasil foram publicados por Müller (1858), que descreveu treze novas espécies marinhas da Ilha de Santa Catarina, e por Kinberg (1865, 1910) com algumas espécies coletadas pela expedição “Eugenies” ao largo da costa brasileira. A edição de 1910 é excelente e apresenta pranchas de primoroso trabalho gráfico. Hartman (1948) publicou uma revisão destas espécies descritas por Kinberg entre os anos de 1865 e 1910, tornando-se um importante trabalho taxonômico, que contém minuciosa e bem documentada descrição e discussão de muitas dessas espécies. Hansen (1882), a partir de material proveniente, principalmente, da região do Rio de Janeiro, descreveu 42 espécies de poliquetas colecionadas por Edouard Joseph L.M. van Beneden durante uma viagem ao Brasil e à Argentina. Os trabalhos de Friedrich (1950) e Tebble (1960), com material procedente do Atlântico Sul, devem ser os mais conhecidos.

Excetuados esses trabalhos, a taxonomia dos anelídeos poliquetas no Brasil iniciou-se efetivamente com os estudos realizados por Edmundo Ferraz Nonato, professor da Universidade de São Paulo. Até 1970, Nonato trabalhou no Laboratório Costeiro do Instituto Oceanográfico em Ubatuba, quando publicou uma série de espécies novas (Nonato, 1958, 1963, 1965, 1966). Desde então, foi responsável pela formação dos primeiros poliquetólogos existentes no país, tendo elaborado, nesta época, o trabalho sobre os poliquetas da Região Nordeste (Nonato & Luna, 1970a, b).

A partir da década de 70, grande interesse foi despertado pelo estudo, tanto sistemático como ecológico, dos poliquetas no país e, consequentemente, um razoável número de trabalhos que tratam prioritariamente de poliquetas marinhos bentônicos, principalmente na Costa Sudeste-Sul, foi realizado. O estudo dos poliquetas no Brasil é ainda incipiente, mas apresentou avanços importantes ao longo das últimas décadas, com a interação entre as gerações de poliquetólogos e uma significativa intensificação dos estudos taxonômicos, filogenéticos, biológicos e ecológicos.

Com apoio do CNPq, deu-se início a publicação de uma série de trabalhos sobre os anelídeos poliquetas da costa brasileira (Amaral & Nonato, 1981, 1982, 1984, 1994), com o objetivo de efetuar um levantamento e fornecer descrições das espécies referidas para o Brasil. Amaral & Nonato (1996) publicaram chaves atualizadas para a identificação das 57 famílias e 275 gêneros até então registrados para a costa brasileira.

Distribuída ao longo de uma costa que compreende mais de 37° de latitude, a fauna brasileira de poliquetas marinhos reflete a diversidade de habitats característicos das diferentes áreas geográficas. Entre os variados tipos de ambientes encontram-se os recifes de corais, costões rochosos, estuários, lagoas costeiras, manguezais, praias, em substratos arenosos, areno-lamosos e lamosos, entre outros, lembrando ainda que os poliquetas ocupam também ambientes de águas continentais e terrestres. Ao lado de espécies

cosmopolitas ou com ampla distribuição circuntropical, ocorrem espécies peculiares da fauna antártica e da caraíbica, com predominância desta última. O número de espécies consideradas endêmicas para determinadas áreas é grande, o que pode ser consequência do pequeno número de trabalhos realizados sobre o grupo na costa brasileira.

Das diferentes regiões do Brasil, os estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro são os que possuem a fauna de poliquetas mais conhecida, uma vez que, tradicionalmente, mantém pesquisadores que se dedicam ao estudo do grupo. O volume de informações disponíveis para o Estado de São Paulo constitui um reflexo direto da maior intensidade de trabalhos realizados na região. As primeiras informações sobre os poliquetas deste Estado foram fornecidas por Treadwell (1923, 1932) e Luederwaldt (1929); ambos descreveram espécies provenientes da Ilha de São Sebastião e da Baixada Santista. Nas décadas de 70 e 80 a produção foi relevante, mas o maior número de trabalhos vem sendo realizado desde 1990.

Há ainda problemas graves relacionados com a natureza das publicações científicas sobre poliquetas no país. Boa parte do conhecimento mais recente sobre a fauna brasileira em algumas regiões continua sob a forma de relatórios técnicos, resumos ou dissertações acadêmicas, de divulgação mais restrita ou regional. A integração sistemática destas informações, associada a levantamentos sistemáticos adicionais, tem se transformado aos poucos numa prioridade dos estudos regionais, como é o caso dos programas REVIZEE (MMA), BIOA (FAPESP), com trabalhos de cunho taxonômicos recentemente publicados, como: Amaral & Rossi-Wongtschowski (2004), Amaral *et al.* (2005), Lavrado & Ignácio (2006) e Lavrado & Viana (2007), Lana *et al.*, 2006.

Sendo o grupo predominantemente marinho, são poucas as citações a respeito dos poliquetas de água doce, restringindo-se apenas à Família Histiobdellidae (animais comensais que habitam a cavidade branquial de crustáceos decápodes).

APRESENTAÇÃO

Dado o volume de informações obtidas, a divulgação da compilação dos trabalhos desenvolvidos com os anelídeos poliquetas do Brasil, além de facilitar o acesso às informações existentes, completa importante fonte de informação para o conhecimento da diversidade do grupo e dos estudos abordados até o momento, contribuindo para uma progressiva compreensão das prioridades atuais e futuras.

Para executar este levantamento foi realizada uma recuperação dos dados históricos e elaborada uma ampla revisão bibliográfica que incluiu dissertações, teses, artigos completos publicados em revistas ou anais de congressos e resumos.

Apesar da tentativa de recuperação de toda a produção científica gerada no Brasil, algumas falhas podem ocorrer. Assim sendo, este levantamento pode ser constantemente atualizado a partir de correções, sugestões e adições de títulos não incluídos nesta compilação. Essas informações devem ser enviadas para o e-mail: ceamaral@unicamp.br.

A ordenação das famílias segue, em grande parte, a organização proposta por Rouse & Fauchald (1997) e alterações contidas em Rouse & Pleijel (2001), conforme apresentado a seguir.

Rouse & Pleijel (2001): 4.

"Polychaetes"

Scolecida

ARENICOLIDAE, CAPITELLIDAE, COSSURIDAE, MALDANIDAE, OPHELIIDAE, ORBINIIDAE, PARAONIDAE, QUESTA, SCALIBREGMATIDAE

Palpata

Aciculata

Pyllodocida

Aphroditiformia

APHRODITOIDEA (incl. Acoetidae, Aphroditidae, Eulepethidae, Polynoidae), PHOLOIDAE, SIGALIONIDAE, PISIONIDAE

Nereidiformia

CHRYSOPETALIDAE, HESIONIDAE, NAUTILINIELLIDAE, NEREIDIDAE, PILARGIDAE, SYLLIDAE, NEREIDIFORMIA INCERTAE SEDIS (incl. *Hesionides*, *Microphthalmus*)

Pyllodocida unplaced

GLYCERIFORMIA, ICHTHYOTOMUS, LACYDONIA, LOPADORHYNCHIDAE, "MINOR PELAGICS" (includes Iospiidae, *Pontodora*, Typhloscolecidae), MYZOSTOMIDA, NEPTYHYIDAE, PARALACYDONIA, PHYLLODOCIDAE, SPHAERODORIDAE, TOMOPTERIDAE, PHYLLODOCIDA INCERTAE SEDIS (incl. *Antonbruunia*, *Struwela*, *Yndolacia*)

AMPHINOMIDA (incl. Amphinomidae, Euphrasinidae)

Eunicida

DORVILLEIDAE, EUNICIDAE, HARTMANIELLIDAE, HISTRIOBDELLIDAE, LUMBRINERIDAE, OENONIDAE, ONUPHIDAE

Aciculata unplaced

ABERRANTA, NERILLIDAE, SPINTHER

Canalipalpata

Sabellida

OWENIIDAE, SABELLARIIDAE, SABELLIDAE, SERPULIDAE, SIBOGLINIDAE

Terebellida

Cirratuliformia

ACROCIRRIDAE, CIRRATULIDAE, CTENODRILIDAE, FAUVELIOPSIDAE, FLABELLIGERIDAE,
POEOBIIDAE AND *FLOTA, STERNASPIS*

Terebelliformia

ALVINELLIDAE, AMPHARETIDAE, PECTINARIIDAE, TEREBELLIDAE (incl. Trichobranchidae)

Spionida

APISTOBRANCHUS, CHAETOPTERIDAE, MAGELONA, HETEROSPIO, POECILOCHAETUS,
SPIONIDAE, TROCHOCHAETA, UNCISPIONIDAE

Canalipalpata unplaced

POLYGORDIIDAE, PROTODRILIDA

"Polychaetes" *incertae sedis*

AEOLOSOMATIDAE AND POTAMODRILIDAE, PAREROGODRILIDAE AND *HRABEIELLA,*
PSAMMODRILIDAE

As 62 famílias já registradas para o Brasil estão listadas como apresentadas a seguir. Duas delas, Questidae e Ctenodrilidae, não possuem espécies listadas neste catálogo, por ainda não estarem definidas, nas publicações, as espécies nominais. As demais espécies encontram-se em ordem alfabética e foram nominadas conforme identificação apresentada na publicação original.

No banco de dados constam informações sobre localidade (quando disponível), região de ocorrência, tipo de fundo, profundidade (conforme consta da publicação) e a referência bibliográfica de onde foram extraídos os dados.

Famílias referidas para o Brasil

1. SCOLECIDA

- 1.1 Arenicolidae Johnston, 1835
- 1.2 Capitellidae Grube, 1862
- 1.3 Cossuridae Day, 1963
- 1.4 Maldanidae Malmgren, 1867
- 1.5 Opheliidae Malmgren, 1867
- 1.6 Orbiniidae Hartman, 1842
- 1.7 Paraonidae Cerruti, 1909
- 1.8 Questidae Hartman, 1966
- 1.9 Scalibregmatidae Malmgren, 1867 (= Scalibregmidae)

2. PALPATA, ACICULATA, PHYLLODOCIDA, APHRODITIFORMIA

- 2.1 Acoetidae (=Polyodontidae)
- 2.2 Aphroditidae
- 2.3 Eulepethidae (=Pareulepidae)
- 2.4 Pholoidae Kinberg, 1858 (Pholoididae)
- 2.5 Pisionidae Ehlers, 1901
- 2.6 Polynoidae
- 2.7 Sigalionidae Kinberg, 1856

3. PALPATA, ACICULATA, PHYLLODOCIDA, NEREIDIFORMIA

- 3.1 Chrysopetalidae Ehlers, 1864 (=Palmyridae)
- 3.2 Hesionidae Grube, 1850
- 3.3 Nereididae Johnston, 1865
- 3.4 Pilargidae Saint-Joseph, 1899
- 3.5 Syllidae Grube, 1850

4. PALPATA, ACICULATA, PHYLLODOCIDA

- 4.1 Alciopidae Ehlers, 1864
- 4.2 Glyceridae Grube, 1850
- 4.3 Goniadidae Kinberg, 1866
- 4.4 Iospilidae Bergström, 1914
- 4.5 Lopadorhynchidae

- 4.6 Myzostomidae von Graff, 1877
- 4.7 Nephtyidae Grube, 1850
- 4.8 Paralacydoniidae
- 4.9 Phyllodocidae Örsted, 1843a
- 4.10 Sphaerodoridae Malmgren, 1867
- 4.11 Thyphloscolecidae Uljanin, 1878
- 4.12 Tomopteridae Johnston, 1865

5. PALPATA, ACICULATA, AMPHINOMIDA

- 5.1 Amphynomidae Lamarck, 1818
- 5.2 Euphosinidae

6. PALPATA, ACICULATA, EUNICIDA

- 6.1 Dorvilleidae Chamberlin, 1919
- 6.2 Eunicidae Berthold, 1827
- 6.3 Histiobdellidae Vaillant, 1890
- 6.4 Iphitimidae Fauchald, 1970
- 6.5 Lumbrineridae Schmarda, 1861 (incl. Lysaretidae - parte)
- 6.6 Oenonidae Kinberg, 1865 (incl. Arabellidae, Lysaretidae - parte)
- 6.7 Onuphidae Kinberg, 1865

7. PALPATA, CANALIPALPATA, SABELLIDA

- 7.1 Oweniidae Rioja, 1917
- 7.2 Sabelariidae Johnston, 1865
- 7.3 Sabellidae Latreille, 1825
- 7.4 Serpulidae Latreille, 1825

8. PALPATA, CANALIPALPATA, TEREBELLIDA, CIRRATULIFORMIA

- 8.1 Acrocirridae Banse, 1969
- 8.2 Cirratulidae Ryckholdt, 1851
- 8.3 Fauveliopsidae Hartman, 1971
- 8.4 Flabelligeridae Saint-Joseph, 1894
- 8.5 Sternaspidae Carus, 1863
- 8.6 Ctenodrilidae Kennel, 1882

9. PALPATA, CANALIPALPATA, TEREBELLIDA, TEREBELLIFORMIA

- 9.1 Ampharetidae Malmgren, 1866
- 9.2 Pectinariidae Quatrefages, 1866
- 9.3 Terebellidae Grube, 1850
- 9.4 Trichobranchidae Malmgren, 1866

10. PALPATA, CANALIPALPATA, SPIONIDA

- 10.1 Apistobranchidae
- 10.2 Chaetopteridae Audouin & Milne Edwards, 1833
- 10.3 Heteropionidae Hartman, 1963
- 10.4 Magelonidae Cunningham & Ramage, 1888
- 10.5 Poecilochaetidae Hartman, 1963
- 10.6 Spionidae Grube, 1850

Abreviaturas utilizadas neste catálogo: entremarés (entre); infralitoral (infra); plancton (planc); (*) espécies novas descritas em dissertações e teses.

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Tipo de Fundo: | A - Areia | L - Lama (silte + argila) |
| | AF e AMF - Areia fina e muito fina | LAAF - Lama com areia fina |
| | AFL - areia fina com lama | OS - Diferentes tipos de substratos: pequenos blocos rochosos, coral, conchas, esponjas e algas, calcário biodetrítico |
| | AFCa - areia fina com carbonato de cálcio | |
| | AgSAr - argila siltico-arenosa | |
| | AL - Areo-lamoso | |
| | AM - Areia média | SAg - Silte argiloso |
| | AMG - Areia muito grossa | SAgAr - Silte argilo-arenoso |
| | AS - Areia siltica | SAr - Silte arenoso |
| | ASAg - Areia siltico-argilosa | SP - Sob pedras |
| | C - Cascalho | |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABBUD, A. & NOGUEIRA, J.M.M. 2006. Novas ocorrências de serpulídeos (Polychaeta: Serpulidae) para a costa brasileira. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 48.
- ABREU, J. 1978. **Ecologia e Distribuição dos Polychaeta e Mollusca na Enseada da Fortaleza (Ubatuba, Estado de São Paulo)**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 77p.
- ALMEIDA, T.C.M. & RUTA, C. 1998. Polychaete assemblages in soft sediments near a subtidal macroalgae bed at Arraial do Cabo (Rio de Janeiro, Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p. 61.
- ALMEIDA, T.C.M. & RUTA, C. 2000. Effects of a subtidal macroalgae bed on soft-bottom Polychaete assemblages in Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brazil. **Bulletin of Marine Science**, **67**(1): 199-207.
- ALMEIDA, T.C.M., DI DOMENICO, M. & ROHR, T.E. 2007. Pattern of polychaetes diversity around an oil well on the southern Brazilian shelf, **9th International Polychaete Conference**, p. 115.
- ALMEIDA, T.C.M., PESSERL, B.H., MARTINS, G.A.L., VIVAN, J.M. 2009. Levantamento dos polychaeta macrofaunais do infralitoral da região centro-norte do Estado de Santa Catarina-Brasil, **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 23.
- ALMEIDA, T.C.M., RIBEIRO, Z.A. & COUTINHO, R. 2001. Ecology of *Armandia longicaudata* (Caullery, 1944) in a subtidal sandy bottom in upwellind southeast coast, Brazil. **7th International Polychaete Conference**, p. 127.
- ALONSO, F., PAIVA, P.C., RUTA, C., IGNACIO, B.L., JUNQUEIRA, A.O.R. 2009. Poliquetas da Baía da Ilha Grande, RJ, Brasil, e a influência do tipo de substrato (natural e artificial) na distribuição de suas espécies dominantes. **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 30.
- ALVES, T.M. 2008. **Contribuição ao Conhecimento Taxonômico de Terebellidae e Trichobranchidae (Annelida: Polychaeta) da Região Sudeste-Sul do Brasil**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 176p.
- AMARAL, A.C.Z. & MIGOTTO, A.E. 1980. Importância dos anelídeos poliquetas na alimentação da macrofauna demersal e epibentônica da região de Ubatuba. **Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo**, **29**(2): 31-35.
- AMARAL, A.C.Z. & MORGADO, E.H. 1994. Alteraciones en la fauna de anelidos poliquetos de Araçá, São Sebastião (SP - Brasil). **Rev. Acad. Colomb. Cienc.**, **19**(72): 147-152.
- AMARAL, A.C.Z. & MORGADO, E.H. 1997. *Stratiocirrus* (Annelida: Polychaeta: Histriobdellidae) associated with a freshwater decapod, with the description of a new species. **Proc. Biol. Soc. Wash.**, **110**(3): 471-475.
- AMARAL, A.C.Z. & MORGADO, E.H. 1998. Biodiversidade da macrofauna bentônica de praias da costa brasileira. **Publ. ACIESP, São Paulo**, **5**(104): 99-112.
- AMARAL, A.C.Z. & MORGADO, E.H. 1999. Filo Annelida – Classe Polychaeta. In: **Biodiversidade do Estado de São Paulo, Síntese do Conhecimento ao Final do Século XX, 3: Invertebrados Marinhos**, Migotto, A. & Tiago, C.G. (eds.), São Paulo: FAPESP, p. 161-175.
- AMARAL, A.C.Z. & NONATO, E.F. 1981. **Anelídeos Poliquetos da Costa Brasileira. 1/2. Características e Chave para Famílias - Glossário**. Brasília, CNPq/Coordenação Editorial, 47 p.
- AMARAL, A.C.Z. & NONATO, E.F. 1982. **Anelídeos Poliquetos da Costa Brasileira. 3. Aphroditidae e Polynoidae**. CNPq, Coordenação Editorial, Brasília, 46p.
- AMARAL, A.C.Z. & NONATO, E.F. 1984. **Anelídeos Poliquetos da Costa Brasileira. 4. Polydoridae, Pholoidae, Sigalionidae e Eulepethidae**. CNPq, Coordenação Editorial, Brasília, 54 p.
- AMARAL, A.C.Z. & NONATO, E.F. 1994. Anelídeos poliquetos da costa brasileira. 5. Pisionidae, Chrysopetalidae, Amphynomidae e Euphosinidae. **Revta. bras. Zool.**, **11**(2): 361-390.

- AMARAL, A.C.Z. & NONATO, E.F. 1996. **ANNELIDA POLYCHAETA - Características, Glossário e Chaves para Famílias e Gêneros da Costa Brasileira.** Ed. UNICAMP, Campinas, SP, 124 p.
- AMARAL, A.C.Z. (Org.) & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.D.B. (Org.). 2004. **Biodiversidade Bentônica da Região Sudeste-Sul do Brasil - Plataforma Externa e Talude Superior.** Série Documentos Revizee: Score-Sul. 1. ed. São Paulo, SP: Instituto Oceanográfico - USP., v. 1. 216 p.
- AMARAL, A.C.Z. 1975. **Ecologia e Contribuição dos Anelídeos Poliquetos Para a Biomassa Bêntica da Zona das Marés, no Litoral Norte do Estado de São Paulo.** Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 104p.
- AMARAL, A.C.Z. 1977a. Um poliqueto endoparasita, *Labrorrostratus proficus* sp. nov. em Nereídeo. **Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo**, 26: 285-292.
- AMARAL, A.C.Z. 1977b. **Anelídeos Poliquetos do Infralitoral em Duas Enseadas da Região de Ubatuba - Aspectos Ecológicos.** Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 137p.
- AMARAL, A.C.Z. 1979. Ecologia e contribuição dos anelídeos poliquetos para a biomassa bêntica da zona das marés, no litoral norte do Estado de São Paulo. **Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo**, 28(1): 1-52.
- AMARAL, A.C.Z. 1980a. Anelídeos poliquetos do infralitoral em duas enseadas da região de Ubatuba. II. Aspectos ecológicos. **Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo**, 29(1): 69-87.
- AMARAL, A.C.Z. 1980b. Breve caracterização dos gêneros da família Capitellidae Grube (Annelida, Polychaeta) e descrição de *Nonatus longilineus* gen. sp. nov. **Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo**, 29(1): 99-106.
- AMARAL, A.C.Z. 1987. Breve caracterização de *Phragmatopoma lapidosa* Kinberg, 1867 (Polychaeta, Sabellariidae). **Revta. bras. Zool.**, 3(8): 471-474.
- AMARAL, A.C.Z., DENADAI, M.R., TURRA, A. & RIZZO, A.E. 2003. Intertidal macrofauna in brazilian subtropical tide-dominate sandy beaches. **J. Coas. Res.**, 35: 446-455.
- AMARAL, A.C.Z., LANA, P.C., RIZZO, A.E., STEINER, T.M., PARDO, E.V., SANTOS, C.S.G., CARVALHO, A.C., WAGNER, M.F.R., GARAFFONI, A.R.S., BRASIL, A.C., RIBEIRO, Z., NOGUEIRA, J.M.M., ABBUD, A., ROSSI, M.C.S. & FUKUDA, M.V. 2004a. Filo Annelida - Classe Polychaeta. In: **Biodiversidade Bentônica da Região Sudeste-Sul do Brasil - Plataforma Externa e Talude Superior.** Série Documentos Revizee: Score Sul / Responsável Carmen Lucia Del Bianco Rossi-Wongtschowski, Amaral, A.C.Z. & Rossi-Wongtschowski, C.L.D.B. (eds.), MMA, p. 114-125.
- AMARAL, A.C.Z., MORGADO, E.H. & HENRIQUES, S.A. 1998b. Polychaeta (Annelida) from the brazilian coast. **6th Internacional Polychaete Conference**, p. 62.
- AMARAL, A.C.Z., MORGADO, E.H. & SALVADOR, L.B. 1998a. Poliquetas bioindicadores de poluição orgânica em praias paulistas. **Rev. Brasil. Biol.**, 58(2):307-316.
- AMARAL, A.C.Z., MORGADO, E.H., LOPES, P.P., BELÚCIO, L.F., LEITE, F.P.P. & FERREIRA, C.P. 1990. Composition and distribution of the intertidal macrofauna of sandy beaches on São Paulo coast. Anais do II Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira - Estrutura, Função e Manejo. **Publ. ACIESP, São Paulo**, 3(71): 258-279.
- AMARAL, A.C.Z., MORGADO, E.H., PARDO, E.V. & REIS, M.O. 1995. Estrutura da comunidade de poliquetos da zona entremarés em praias da Ilha de São Sebastião (SP). **Publ. esp. Inst. oceanogr., S. Paulo**, (11): 229-237.
- AMARAL, A.C.Z., NONATO, E.F. & MORGADO, E.H. 1987. Alterações na fauna de anelídeos poliquetos da Praia do Saco da Ribeira, Ubatuba - SP. Anais do I Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira - Síntese dos Conhecimentos; **Publ. ACIESP, S. Paulo**, 3(54): 244-257.
- AMARAL, A.C.Z., NONATO, E.F. & PETTI, M.A.V. 1994. Contribution of the polychaetous annelids to the diet of some brazilian fishes. **Mém. Mus. natn. Hist. nat.**, 162: 331-337.

- AMARAL, A.C.Z., RIZZO, A.E. & ARRUDA, E.P. 2005. Biodiversidade bêntica marinha no estado de São Paulo: praias arenosas. **XI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR)**, p. 405.
- ARAUJO, L.M., AIRES, P.V.T, PEIXOTO, R.F., BARBOSA, L.S., BARBOSA, A.C., RUTA, C. 2009. Distribuição específica dos anelídeos poliquetas em substrato inconsolidado do Arquipélago de Sant'anna, Macaé-RJ, **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, Argentina**, p. 31.
- ASSIS, E.A., ALONSO, C. & CHRISTOFFERSEN, M.L. 2008. First record of *Ficopomatus uschakovi* (Pillai, 1960) Serpulidae (Polychaeta: Annelida) for the Western Atlantic. **Revista Nordestina de Biologia**, **19**(1): 51-58.
- ATTOLINI, F.S. 1997. **Composição e Distribuição dos Anelídeos Poliquetas na Plataforma Continental da Região da Bacia de Campos, RJ, Brasil**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 122p.
- ATTOLINI, F.S. 2002. **Padrões de Distribuição de Poliquetas Macrobióticos na Região de Plataforma Externa e Talude Superior Entre Cabo Frio (RJ) e Cabo de Santa Marta (SC), Costa Sudeste do Brasil**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 115p.
- AVELLAR, L.M., NOGUEIRA, J.M.M. & SANTOS, C.S.G. 2006. Biodiversidade de poliquetas nereidídeos (Polychaeta: Nereididae) em costões rochosos do Estado de São Paulo. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 32.
- BARROS Jr, F.C.R. 1997. **A Macrofauna Bentônica nas Praias Arenosas dos Arredores da Baía de Guaratuba-PR, Brasil**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 100p.
- BARROSO, R. & PAIVA, P.C. 2009. Polychaeta de mar profundo do Sudeste do Brasil, **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, Argentina**, p. 96.
- BARROSO, R., PAIVA, P.C., KLAUTAU, M. 2006. Avaliação do cosmopolitismo do verme de fogo *Eurythoe complanata* (Pallas, 1766) (Polychaeta – Amphinomidae) através de abordagens morfológicas e moleculares. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, S. Paulo**, p. 27.
- BEMVENUTI, C.E. 1983. **Efeitos da Predação Sobre as Características Estruturais de uma Comunidade Macrozoobentônica numa Enseada Estuarina da Lagoa dos Patos, R.S. Brasil**. Dissertação de Mestrado, Universidade do Rio Grande, 120p.
- BEMVENUTI, C.E. 1987. Macrofauna bentônica da região estuarial da Lagoa dos Patos, RS, Brasil. **Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira, SP**, **1**(1): 428-459.
- BERLANDI, R.M. & PAIVA, P.C. 2009. Biodiversidade em dois bancos de algas calcárias (Rodolitos) na costa leste brasileira, **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, Argentina**, p. 98.
- BHAUD, M.R. & PETTI, M.A.V. 2001. *Spiochaetopterus nonatoi*, a new species of Chaetopteridae (Polychaeta) from Brazil: biogeographical consequences. **J. Mar. Biol. Assoc. UK**, **81**: 225-234.
- BJÖRNBERG, T. & RADASHEVSKY, V.I. 2006. *Spioncola mustacia* n. gen. e sp. de clausídeo (Crustácea, Copepoda), parasita de *Dipolydora armata* (Polychaeta, Spionidae). **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 74.
- BLANKENSTEYN, A. & LANA, P.C. 1987. *Octobranchus longipes* sp. n. (Trichobranchidae: Polychaeta) da costa sudeste do Brasil. **Arq. Biol. Tecnol.**, **30**(4): 671-676.
- BLANKENSTEYN, A. 1988. **Terebellidae e Trichobranchidae (Annelida: Polychaeta) da Costa Sudeste do Brasil (24-27S)**. Dissertação de Mestrado, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 129p.
- BOLÍVAR, G.A. & LANA, P.C. 1986. Magelonidae (Annelida, Polychaeta) do litoral sudeste do Brasil. **Nerítica, Pontal do Sul, PR**, **1**(3): 131-147.
- BOLÍVAR, G.A. & LANA, P.C. 1987. Spionidae (Annelida, Polychaeta) do litoral do Estado do Paraná. **Nerítica, Pontal do Sul, PR**, **2**(1): 107-148.
- BOLIVAR, G.A. & LANA, P.C. 1988. Padrões de distribuição de Spionidae e Magelonidae (Annelida: Polychaeta) do litoral do Estado do Paraná. **An. Sem. Reg. Ecol., SP**, **6**: 247-267.

- BOLIVAR, G.A. 1986. **Padrões de Distribuição de Spionidae e Magelonidae (Annelida: Polychaeta) do Litoral do Estado do Paraná.** Dissertação de Mestrado, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 116p.
- BOLIVAR, G.A. 1990. **Orbiniidae, Paraonidae, Heterospionidae, Cirratulidae, Capitellidae, Maldanidae, Scalibregmidae e Flabelligeridae (Annelida: Polychaeta) da Costa Sudeste do Brasil (22°57'S - 27°20'S).** Tese de Doutorado, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 191p.
- BONIFÁCIO, P.H.O., LIMA, M.P.R., FREITAS, G.M.R. & SOUZA, J.R.B. 2006. Estudo taxonômico de *Epidiopatra* cff. *hupferiana* (Augener, 1918) (Polychaeta: Onuphidae) da VII Expedição Oceanográfica – Revizee NE – III e IV. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 28.
- BORZONE, C.A. 1988. **Estudo da Macrofauna Bentônica Infralitoral da Região Costeira adjacente à Barra de Rio Grande, RS, Brasil.** Dissertação de Mestrado, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 113p.
- BRASIL, A.C.S. & SILVA, S.H.G. 1998. Spatial distribution of Polychaetes in a soft-bottom community at Saco do Céu (Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p. 71.
- BRASIL, A.C.S. & SILVA, S.H.G. 2000. Spatial distribution of Polychaeta in a soft-bottom community at Saco do Céu, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brazil. **Bull. Mar. Sci.**, 67 (1): 103-112.
- BRASIL, A.C.S. 2003. **Filogenia de Magelonidae Cunningham & Ramage, 1888 (Annelida – Polychaeta) Com Base na Morfologia Externa.** Tese de Doutorado, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 105p.
- BRASIL, A.C.S., PAIVA, P.C., CAVALCANTI, G.H. & FERNANDEZ, M.P.C. 2007. Deep-sea polychaetes associated with coral banks of Campos Basin: first records for the Brazilian continental margin, Southwest Atlantic. **9th International Polychaete Conference**, p.101.
- BRASIL, A.C.S., SANTOS, C.S.G. & DOMINGUES, M. 2006. Técnicas de preparação de lâmina de parapódios de Polychaeta para estudo e depósito em coleções. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 23.
- BRAUKO, K.M., LANA, P.C. & NETO, L.S. 2009. Efeitos da passagem de sistemas frontais sobre as associações de poliquetas em duas praias arenosas do Estado do Paraná (Brasil). **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, Argentina**, p. 33.
- CAMARGO, M.G. & BORZONE, C.A. 1998. Polychaete-sediment relationships and distribution at subtidal depths nearby Patos Lagoon Mouth, Rio Grande, RS, Brazil. **6th International Polychaete Conference**, p. 76.
- CAMARGO, M.G. & LANA, P.C. 1994. Lumbrineridae (Annelida: Polychaeta) da costa Sul e Sudeste do Brasil. III. Padrões regionais e zoogeográficos de distribuição. **Nerítica, PR**, 8(1-2): 21-30.
- CAMARGO, M.G. & LANA, P.C. 1995a. Lumbrineridae (Polychaeta: Eunicemorpha) da costa Sul e Sudeste do Brasil. I. *Lysarete*, *Arabelloneris*, *Lumbrineriopsis*, *Lumbrinerides*, *Paraninoe* e *Ninoe*. **Iheringia, Sér, Zool., Porto Alegre**, (79): 77-91.
- CAMARGO, M.G. & LANA, P.C. 1995b. Lumbrineridae (Polychaeta: Eunicemorpha) da costa sul e sudeste do Brasil. II. *Lumbrineris*. **Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre**, (79): 93-120.
- CAMARGO, M.G. 1993. **Lumbrineridae (Annelida: Polychaeta) da Costa Sul e Sudeste do Brasil.** Dissertação de Mestrado, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 119p.
- CAPITOLI, R.R., BEMVENUTI, C.E. & GIANUCA, N.M. 1978. Estudos de ecologia bentônica na região estuarial da Lagoa dos Patos. I - As comunidades bentônicas. **Atlântica, Rio Grande**, 3: 5-22.
- CARVALHEIRA, L.V. 1993. **Macroinfauna Bêntica da Lagoa de Marapendi, Complexo Lagunar de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil.** Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 171p.
- CONTI, R.C., CARMO, T.M.S., ROCHA, G.B. 1996. Aspectos ecológicos da fauna de anelídeos poliquetas do manguezal do Rio da Passagem, Vitória, Espírito Santo. **Reunião Especial da SBPC. Anais Florianópolis: SBPC**, p. 493.

- CORBISIER, T.N. 1981. **Aspectos Ecológicos da Macrofauna Bentônica da Zona Entremarés Arenosa, no Sistema Estuarino de Santos (Estado de São Paulo, Brasil)**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 123 p.
- CORBISIER, T.N. 1989. **Aspectos Ecológicos das Associações de Espécies da Macrofauna Bentônica e Avaliação do Efeito da Predação Sobre a Sua Estrutura na Praia do Codó (Ubatuba, SP, Brasil)**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 88p.
- CORBISIER, T.N. 1991. Benthic macrofauna of sandy intertidal zone at Santos estuarine system, São Paulo, Brazil. **Bolm. Inst. oceanogr., São Paulo**, 39(1): 1-13.
- CORBISIER, T.N. 1994. Macrozoobentos da Praia do Codó (Ubatuba, SP) e a presença de *Halodule wrightii* Ascherson. **Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo**, 42(1/2): 99-111.
- CORRÊA, D.D., 1948. A Polychaete from the Amazon – Region. **Boletim de Zoologia**, 13: 245-255.
- COSTA, D.A., ASSIS, J.E. & CHRISTOFFERSEN, M.L. 2008. New synonym of *Hesione splendida* (Hesionidae, Polychaeta, Annelida). **Revista Brasileira de Biociências (Online)**, 16: 131-133.
- COSTA-PAIVA, E.M. & KLATAU, M. 2006a. Estudo taxonômico do complexo *Branchiomma nigromaculatum* (Baird, 1865) (Annelida: Polychaeta: Sabellidae) na costa brasileira. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 50.
- COSTA-PAIVA, E.M. & PAIVA, P.C. 2007. A morphometric analysis of *Eunice Cuvier* (Annelida, Polychaeta) species. **Revta bras. Zool.**, 24(2): 353-358.
- COUTO, E.C.G. & FERNANDES, A.C.M. 1998. The ecology of *Laeonereis acuta* (Treadwell, 1923) (Polychaeta: Nereididae) in the estuaries of the Sergipe and Piauí rivers (Northeastern Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p. 32.
- DAOLIO, R.F., MACCORD, F.S. & AMARAL, A.C.Z. 2009. Abundância e ocorrência de polidorídeos em bancos de *Mytella charruana* e biologia populacional de *Polydora neocaeca*. **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, Argentina**, p. 80.
- DAOLIO, R.F., MACCORD, F.S. & AMARAL, A.C.Z. 2007. Morphometric differences of *Polydora neocaeca* (Polychaeta: Spionidae) living on shells and inside mud-blister of *Mytella charruana* (Mollusca: Bivalvia). **9th International Polychaete Conference**, p. 113.
- DAUVIN, J.C. & BELLAN, G., 1994. Systematics, ecology and biogeographical relationships in the sub-family Travisinae (Polychaeta, Opheliidae). **Mém. Mus. natn. Hist. nat.**, 162: 169-184.
- DAUVIN, J.C. & THIÉBAUT, E. 1994. Is *Owenia fusiformis* Delle Chiaje a cosmopolitan species? **Mém. Mus. natn. Hist. nat.**, 162: 383-404.
- DUARTE, L.F.L. & NALESSO, R.C. 1996. The sponge *Zygomycale parishii* (Bowerbank) and its endobiotic fauna. **Est. Coast. Shelf Sci.**, 42: 139-151.
- DUARTE, L.F.L. 1980. **A Endofauna da Esponja Zygomycale parishii (Bowerbank) (Composição, Dominância, Diversidade e Natureza da Associação)**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 103 p.
- ELIAS, R., BREMEC, C.S., LANA, P.C. & ORENSANZ, J.M. 2003. Opheliidae (Polychaeta) from the Southwestern Atlantic ocean, with the description of *Travisia amadoi* n.sp., *Ophelina gaucha* n.sp., and *Ophelina alata* n.sp. **Hydrobiologia**, 496: 75-85.
- FARIAS, M.C.V. & COUTO, E.C.G. 1998. Trophic relations between Polychaeta and *Achirus declivis* (Chabanaud, 1940) (Teleostei: Soleidae) in the river Sergipe estuary (Northeastern, Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p. 84.
- FAUCHALD, K. 1976. Some Nephtyidae (Polychaeta) from Ubatuba, Brasil. **Bull. South. Calif. Acad. Sci.**, 75(1): 16-19.
- FERREIRA, C.P. 1989. **Manguezais do Estado do Pará: Fauna de Galerias Perfuradas por Teredos em Toras de Rhizophora**. Tese de Doutorado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 160 p.

- FLORÊNCIO, M.A.P. 2000. **Dinâmica Populacional e Produção Secundária de *Laeonereis acuta* (Treadwell, 1923) na Praia de Enseada dos Corais – Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco – Brasil.** Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, 69 p.
- FLORÊNCIO, M.S. 1999. **Ciclo Reprodutivo e Histologia do Trato Digestivo de *Laeonereis acuta* (Treadwell, 1923) da Praia de Enseada dos Corais – Pernambuco.** Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, 78 p.
- FLYNN, M.N., TARARAM, A.S. & WAKABARA, Y. 1996. Effects of habitat complexity on the structure of macrobenthos association in a *Spartina alterniflora* marsh. *Rev. bras. oceanogr.*, 44(1): 9-21.
- FORNERIS, L. 1969. Fauna Bentônica da Baía do Flamengo, Ubatuba. Aspectos Ecológicos. Tese de Livre-Docência, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 215 p.
- FRIEDRICH, H. 1950. Vorkommen und Verbreitung der pelagischen Polychaeten im Atlantischen Ozean. Auf Grund der Fänge der Meteor Expedition. *Kiel. Meeresforsch.*, 7: 5–23.
- FUKUDA, M.V. & NOGUEIRA, J.M.M. 2006b. A new species of *Odontosyllis* Claparède, 1893 (Polychaeta: Syllidae: Eusyllinae), and description of Brazilian material of *Odontosyllis* cf. *fulgurans* (Audouin and Milne Edwards, 1834). *Zoological Studies*, 45(2), 223-233.
- FUKUDA, M.V. & NOGUEIRA, J.M.M. 2007a. Two new occurrences of *Erinaceusyllis* San Martín, 2005 (Syllidae: Eusyllinae) in Brazil. *9th International Polychaete Conference*, p.128.
- FUKUDA, M.V. & NOGUEIRA, J.M.M. 2007b. A new species and a new occurrence of *Eusyllis* Malmgren, 1867 (Syllidae: Eusyllinae) in Brazil. *9th International Polychaete Conference*, p. 127.
- FUKUDA, M.V. & NOGUEIRA, J.M.M. 2009. Eusyllinae (Polychaeta: Syllidae) coletados pelo programa REVIZEE/SCORE SUL. *2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta*, p. 61.
- FUKUDA, M.V. & NOGUEIRA. J.M.M. 2006a. Três novas ocorrências de silídios (Polychaeta: Syllidae) para a costa brasileira. *1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta*, p. 34.
- FUKUDA, M.V., YUNDA-GUARIN, G. & NOGUEIRA, J.M.M. 2009. The genus *Prosphaerosyllis* (Polychaeta: Syllidae: Exogoninae) in Brazil, with description of a new species. *J. Mar. Biol. Assoc. U.K.*, 89(7), 1443–1454.
- GARRAFFONI, A.R.S. & AMARAL, A.C.Z. 2007. Reproduction and development in *Nicolea uspiana* (Polychaeta: Terebellidae), *9th International Polychaete Conference*, p.131.
- GARRAFFONI, A.R.S. & AMARAL, A.C.Z. 2009. Postlarval development of *Nicolea uspiana* (Polychaeta: Terebellidae). *Zoologia*, 26 (1): 61-66.
- GLASBY, C.J. 1999. **The Taxonomy and Phylogeny of the Namanereidinae (Nereididae: Polychaeta).** Thesis (Ph. D.), School Biology Science, University of Sydney. 360p.
- GRUET, Y. & LANA, P.C. 1988. Remarks on the opercular paleae of *Sabellaria bella* Grube, 1870 and *Sabellaria bellis* Hansen, 1882 (Sabellariidae; Polychaeta) from the southeast coast of Brazil. *Nerítica, Pontal do Sul, PR*, 3(1): 31-36.
- HADLICH, H.L., LANA, P.C. 2009. Análise experimental de contaminação por óleo bunker em comunidades de poliquetas de um baixio não vegetado na Baía de Paranaguá, Brasil. *2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta*, p. 20.
- HANSEN, G.A. 1882. Recherches sur les annélides recueillies par M. le professeur E. Van Beneden pendant son voyage au Brésil e à La Plata. *Acad. Roy. Sci. Beig., Bruxelles, Mém.* 44: 1-29.
- HARTMAN, O. 1948. The marine annelids erected by Kinberg with notes on some other types in the swedish State Museum. *Arkiv. för Zoologi*, 42(1): 1-137.
- HARTMANN-SCHRÖDER, G. 1956. Neue Armandia-Arten (Opheliidae, Polychaeta) aus Brasilien und El Salvador. *Beiträge zur neotropischen Fauna, I. Bd. Heft*, 1: 63-68.
- HOSTIN, L.M., OLIVEIRA, V. & SANDRINI-NETO, L. 2009. Escalas de variabilidade espacial das associações de poliquetas na área de influência do futuro terminal pesqueiro público de Belém (Pará-Brasil), *2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, Argentina*, p. 19.

- IRVING, M.A. 1991. **Estrutura da Macroinfauna Bêntica da Zona Entremarés de Sepetiba (Rio de Janeiro - Brasil): Aspectos Descritivos e Metodológicos.** Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 179 p.
- KAMADA, B.P. & SHIMIZU, R.M. 2006. Avaliação dos efeitos da presença de um riacho permanente em alguns aspectos ecológicos de *Scolelepis goodbodyi* Jones (Polychaeta: Spionidae) na Praia da Enseada, Guarujá, São Paulo. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 72.
- KAWAKAMI, E. & AMARAL, A.C.Z. 1983. Importância dos anelídeos poliquetas no regime alimentar de *Etropus longimanus* Norman, 1933 e *Symphurus jenynsi* Evermann Kendall, 1907 (Pisces, Pleuronectiformes). **Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre**, (62): 47-54.
- KINBERG, J.G.H. 1865. Annulata Nova. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Stockholm, 21: 559-574.
- KINBERG, J.G.H. 1910. Annulata. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 78p.
- LANA, P.C. & BREMEC, C.S. 1994. Sabellariidae (Annelida, Polychaeta) from south America. **Mém. Mus. natn. Hist. nat., Paris**, 162: 211-222.
- LANA, P.C. & GRUET, Y. 1989. *Sabellaria wilsoni* sp.n. (Polychaeta, Sabellariidae) from the southeast coast of Brazil. **Zool. Scr.**, 18(2): 239-244.
- LANA, P.C. & GUISS, C. 1991. Influence of *Spartina alterniflora* on the structure and temporal variability of macrobenthic associations in a tidal flat of Paranaguá Bay (southeastern Brazil). **Mar. Ecol. Prog. Ser.**, 73: 231-244.
- LANA, P.C. & SOVIERZOSKI, H.H. 1987. *Neanthes bruaca* sp. n. e *Nereis broa* sp. n. (Nereidae: Polychaeta) da costa sudeste do Brasil. **Arq. Biol. Tecnol.**, 30(4): 677-688.
- LANA, P.C. 1981. **Padrões de Distribuição e Diversidade Específica de Anelídeos Poliquetos na Região de Ubatuba, Estado de São Paulo.** Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 111 p.
- LANA, P.C. 1983. *Lumbriclymene noemias* sp. n. (Maldanidae, Polychaeta) da costa sudeste do Brasil, com uma sinopse do gênero. **Arq. Biol. Tecnol.**, 26(1): 51-59.
- LANA, P.C. 1984. **Anelídeos Poliquetas Errantes do Estado do Paraná.** Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. 110p.
- LANA, P.C. 1986a. Nephthyidae (Annelida; Polychaeta) do litoral do Estado do Paraná (Brasil). **Nerítica**, 1(1): 135-154.
- LANA, P.C. 1986b. Macrofauna bêntica de fundos sublitorais não consolidados da Baía de Paranaguá (Paraná). **Nerítica, Pontal do Sul, PR**, 1(3): 79-89.
- LANA, P.C. 1987. Padrões de distribuição geográfica dos poliquetas errantes (Annelida: Polychaeta) do Estado do Paraná. **Ciência e Cultura**, 39(11): 1060-1063.
- LANA, P.C. 1991a. Sigalionidae (Polychaeta) from the Coast of Paraná (SE Brazil) and adjacent areas. **Ophelia**, 5: 121-132.
- LANA, P.C. 1991b. Onuphidae (Annelida: Polychaeta) from southeastern Brazil. **Bull. Mar. Sci.**, 48(2): 280-295.
- LANA, P.C., ALMEIDA, M.V.O., FREITAS, C.A.F., COUTO, E.C.G., CONTI, L.M.P., GONZALES-PERONTI, A.L., GILES, A.G., LOPES, M.J.S., SILVA, M.H.C. & PEDROSO, L.A. 1989. Estrutura espacial de associações macrobênticas sublitorais da Gamboa Perequê (Pontal do Sul, Paraná). **Nerítica, Pontal do Sul, PR**, 4(1/2): 119-136.
- LANA, P.C., COUTO, C.G. & ALMEIDA, M.V.O. 1997. Polychaete distribution and abundance in intertidal flats of Paranaguá Bay (SE Brazil). **Bull. Mar. Sci.**, 60(2): 433-442.
- LANA, P.C., SANTOS, C.S.G., GARRAFFONI, A.R.S., OLIVEIRA, V.M. & RADASHEVSKY, V. 2006. Checklist of polychaete species from Paraná State (Southern Brazil). **Check List (UNESP)**, 2: 30-63.
- LAVRADO, H.P. & IGNÁCIO, B.L. 2006. **Biodiversidade Bentônica da Região Central da Zona Econômica Exclusiva Brasileira**, Vol. 1, 1^a. Ed., Museu Nacional, UFRJ, Rio de Janeiro, 389p.

- LAVRADO, H.P. & VIANA, M.S. 2007. **Atlas de Invertebrados Marinhos da Região Central da Zona Econômica Exclusiva Brasileira – parte 1**, Vol. 1, 1^a ed., Museu Nacional da UFRJ, Rio de Janeiro, 258p.
- LIMA, M.P.R., BONIFACIO, P.H.O., FREITAS, G.M.R. & SOUZA, J.R.B. 2006b. Variações espaciais e temporais em associação de Polychaeta em um estuário eutrofizado (Recife- PE, Brasil). **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 58.
- LIMA, M.P.R., PAIVA, E.P. & SOUZA, J.R.B. 2006a. Estudo taxonômico das subfamílias Autolytinae, Exogoninae e Eusyllinae (Polychaeta: Syllidae) da VII Expedição Oceanográfica – Revizee NE – IV.. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 37.
- LOPES, P.P. 1993. **Estrutura da Comunidade de Poliquetos da Zona Entremarés da Região do Araçá, São Sebastião (SP)**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 106 p.
- LORENZI, L. & BORZONE, C.A. 2009. Variabilidade da infântia adjacente a estruturas rochosas na plataforma rasa do litoral do Paraná, Brasil. **Zoologia**, **26**(4): 716-724.
- LUEDERWALDT, H. 1929. Resultados de uma excursão científica à Ilha de São Sebastião no litoral do Estado de São Paulo e em 1925. **Rev. do Museu Paulista**, (16): 1-79.
- MACCORD, F.S. & AMARAL, A.C.Z. 2005b. Morphometric analyses of two species of *Scolelepis* (Polychaeta: Spionidae). **J. Mar. Biol. Ass. U. K.**, **85**: 829-834.
- MACCORD, F.S. & AMARAL, A.C.Z. 2007. The reproductive cycle of *Scolelepis goodbodyi* (Polychaeta, Spionidae). **Mar. Biol.**, **151**:1009-1020.
- MACCORD, F.S., PARDO, E.V. & AMARAL, A.C.Z. 2006. Estado do conhecimento da biologia populacional e reprodutiva e produção secundária de Polychaeta no Brasil. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 59.
- MACHADO, M.C.S. 1986. **Sistema Planctônico da Região do Emissário Submarino de Esgotos de Ipanema, Rio de Janeiro - RJ - Populações Zooplânctônicas: Anelida Polychaeta**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 256 p.
- MACIEL, P.M. 1996. **Distribuição e Abundância dos Anelídeos Poliquetos e Seu Papel Trófico no Ecossistema Costeiro do Canal de São Sebastião, São Paulo (Brasil)**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 130p.
- MANGUM, C.P. 1966. Two new species of *Clymenella* (Polychaeta: Maldanidae) from Brazil. **Postilla Yale Peabody Museum**, **104**: 1-10.
- MASI, B.P. & ZALMON, I.R. 2008. Zonação de comunidade benthica do entremarés em molhes sob diferente hidrodinamismo na costa norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Revta. bras. Zool.**, **35**(4): 662-673.
- MATOS, L.W.G., SOVIERZOSKI, H.H. 1996. Anelídeos poliquetos de praia arenosa de Ponta Verde, Maceió, AL. **XXI Congresso Brasileiro de Zoologia**, p. 23.
- MONTEIRO, A.M.G. 1980. **A Macrofauna do Infralitoral Superior das Praias de Santos e São Vicente**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 127p.
- MORGADO, E.H. & AMARAL, A.C.Z. 1981a. Anelídeos poliquetos associados a um briozoário. I. Eunicidae, Lumbrineridae, Lysaretidae e Dorvilleidae. **Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre**, (60): 33-54.
- MORGADO, E.H. & AMARAL, A.C.Z. 1981b. Anelídeos poliquetos associados a um briozoário. II. Palmyridae. **Bolm. Inst. oceanogr., São Paulo**, **30**(1): 87-89.
- MORGADO, E.H. & AMARAL, A.C.Z. 1981c. Anelídeos poliquetos associados a um briozoário. III. Polynoidae. **Bolm. Inst. oceanogr., São Paulo**, **30**(1): 91-96.
- MORGADO, E.H. & AMARAL, A.C.Z. 1984. Anelídeos poliquetos associados ao briozoário *Schizoporella unicornis* (Johnston). IV. Phyllodocidae e Hesionidae. **Revta. bras. Zool., S. Paulo**, **2**(2): 49-54.
- MORGADO, E.H. & AMARAL, A.C.Z. 1985. Anelídeos poliquetos associados ao briozoário *Schizoporella unicornis* (Johnston). V. Syllidae. **Revta. bras. Zool., S. Paulo**, **3**(4): 219-227.

- MORGADO, E.H. & AMARAL, A.C.Z. 1989. Anelídeos poliquetos da região de Ubatuba (SP) - Padrões de distribuição geográfica. *Revta. bras. Zool.*, **6**(3): 535-568.
- MORGADO, E.H. & AMARAL, A.C.Z. 1997. Onuphidae (Annelida, Polychaeta) da Região de Ubatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo, Brasil. *Revta. bras. Zool.*, **14**(1): 45-56.
- MORGADO, E.H. 1980. *A Endofauna de Schizoporella unicornis (Johnston, 1847) (Bryozoa), no Litoral Norte do Estado de São Paulo*. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 118 p.
- MORGADO, E.H. 1988. *Anelídeos Poliquetos do Sublitoral da Região de Ubatuba - SP, Compreendida Entre as Ilhas Anchieta e Vitória*. Tese de Doutorado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas. 180 p.
- MORGADO, E.H., AMARAL, A.C.Z., NONATO, E.F. & SALVADOR, L.B. 1994. Intertidal sandy beaches Polychaetes of São Sebastião island, southern Brazil. *Mém. Mus. natn. Hist. nat.*, **162**: 485-492.
- MORGADO, E.H., AMARAL, A.C.Z., BELÚCIO, L.F., LOPES, P.P., FERREIRA, C.P. & LEITE, F.P.P. 1990. The intertidal macrofauna of São Sebastião complex beaches (São Sebastião - SP). Anais do II Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira - Estrutura, Função e Manejo. *Publ. ACIESP, São Paulo*, **3**(71): 314-325.
- MÜLLER, F. 1858. Einiges über die Anneliden Fauna der Insel Sta. Catarina an der Brasilianischen Küste. *Arch. Für Naturgeschichte*, **24**(1): 211-220.
- MUNIZ, P., PIRES-VANIN, A.M.S., BURONE, L. & SILVA, J.P. 1996. Density and distribution of polychaetes in the infralitoral of Mar Virado Bight (Ubatuba, SP) southeastern brazilian coast. *An. Acad. bras. Ci.*, **68**(3): 453-462.
- MUNIZ, P., SUMIDA, P.Y.G. & PIRES-VANIN, A.M.S. 2000. Throphic structure of Polychaetes in two Bays of the Southeastern Brazilian Coast (Mar Virado and Fortaleza, Ubatuba, São Paulo). *Oebalia*, **24**: 39-53.
- NETTO, S.A. & LANA, P.C. 1994. Effects of sediment disturbance on the structure of benthic fauna in a subtropical tidal creek of southeastern Brazil. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, **106**: 239-247.
- NETTO, S.A. & LANA, P.C. 1995. Zonação e estratificação da macrofauna bêntica em um banco arenoso-lodoso do setor euhalino de alta energia da Baía de Paranaguá (Paraná, Brasil). *Iheringia, Porto Alegre*, **(79)**: 27-37.
- NEVES, G. & OMENA, E.P. 2003. Influence of sponge morphology on the composition of the polychaete associated fauna from Rocas Atoll, northeast Brazil. *Coral Reefs*, **22**: 123-129.
- NOGUEIRA, J.M.M. & AMARAL, A.C.Z. 1997. Anelídeos poliquetas associados ao coral *Mussismilia hispida* (Verrill) na Laje de Santos (SP-Brasil) – Análise Preliminar. *VII Congresso Latino-americano sobre Ciências do Mar, Resumos expandidos*, **7**(2): 219-220.
- NOGUEIRA, J.M.M. & AMARAL, A.C.Z. 1998. Sabellidae (Annelida – Polychaeta) associated with the stony coral *Mussismilia hispida* (Verrill, 1808) on islands of São Paulo's State Coast, Brazil. *6th International Polychaete Conference*, p. 105.
- NOGUEIRA, J.M.M. & AMARAL, A.C.Z. 2000. *Amphicorina schlenzae*, a small sabellid (Polychaeta, Sabellidae) associated with a stony coral on the coast of São Paulo State, Brazil. *Bull. Mar. Sci.*, **67**(1): 617-623.
- NOGUEIRA, J.M.M. & AMARAL, A.C.Z., 2001. New terebellids (Polychaeta: Terebellidae) living in colonies of a stony coral in the State of São Paulo, Brazil. *Proc. Biol. Soc. Wash.*, **114**(1): 285-296.
- NOGUEIRA, J.M.M. & FUKUDA, M.V. 2007a. A new species of *Trypanosyllis* Claparède, 1864 (Polychaeta: Syllidae) from Southeastern Brazil, together with a redescription of Brazilian material of *Trypanosyllis zebra* (Grube, 1860). *9th International Polychaete Conference*, p.162.
- NOGUEIRA, J.M.M. & FUKUDA, M.V. 2007b. A new species of *Trypanosyllis* (Polychaeta: Syllidae) from Brazil, with a redescription of Brazilian material of *Trypanosyllis zebra*. *J. Mar. Biol. Assoc. U.K.*, **88**(5), 913–924.

- NOGUEIRA, J.M.M. & RIZZO, A.E. 2001. A new species of *Branchiomaldane* (Polychaeta: Arenicolidae) from the State of São Paulo, South-Eastern Brazil. *Mar. Biol. Assoc. U.K.*, **81**:415-421.
- NOGUEIRA, J.M.M. & SAN MARTÍN, G., 2001. *Syllis* Savigny, 1818 (Polychaeta:Sylidae) living in corals in the state of São Paulo, southeastern Brazil. **7th International Polychaete Conference**, p. 136.
- NOGUEIRA, J.M.M. & STEINER, T.M., 2001. *Asclerocheilus tropicus* Blake, 1981 (Polychaeta: Scalibregmatidae): redescription based on Brazilian specimens. **7th International Polychaete Conference**, p. 137.
- NOGUEIRA, J.M.M. & YUNDA-GUARIN, G. 2008. A new species of *Syllis* (Polychaeta: Syllidae: Syllinae) from off Fortaleza, north-easternBrazil. *J.Mar.Biol.Ass.U.K.*, **88**(7), 1391–1399.
- NOGUEIRA, J.M.M. 1995. **Análise Qualitativa e Quantitativa da Fauna Associada ao Coral *Musismilia hispida* (Verrill) (Cnidaria, Scleratinia) do Litoral Norte do Estado de São Paulo.** Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 122 p.
- NOGUEIRA, J.M.M. 2002. *Asclerocheilus tropicus* Blake, 1981 (Polychaeta: Scalibregmatidae): redescription based on Brazilian specimens. *Proc. Biol. Soc. Wash.*, **115**(2): 323-332.
- NOGUEIRA, J.M.M. 2003. A new species of *Paraeupolynnia* Young and Kritzler, 1986 (Polychaeta: Terebellidae: Terebellinae) from Brazil. *Sci. Mar.*, **67**(4): 403-411.
- NOGUEIRA, J.M.M. 2006a. Família Scalibregmatidae, pp. 116-117. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- NOGUEIRA, J.M.M. 2006b. Família Syllidae, pp. 134-164. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- NOGUEIRA, J.M.M., 2000. **Anelídeos Poliquetas associados ao Coral *Mussimilia hispida* (Verrill, 1868) em Ilhas do Litoral do Estado de São Paulo. Phyllodocida, Amphinomida, Eunicida, Spionida, Terebellida e Sabellida.** Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 265 p.
- NOGUEIRA, J.M.M., GARRAFFONI, A.R.S. & ALVES, T.M. 2004c. A new species of *Streblosoma* Sars, 1872 (Polychaeta, Terebellidae, Thelepodinae) from Brazil, with comments on *Streblosoma oligobranchiatum* Nogueira & Amaral, 2001. *Beaufortia*, **54**(7): 93-103.
- NOGUEIRA, J.M.M., HUTCHINGS, P.A. & AMARAL, A.C.Z. 2003. *Articulatia*, a new genus of Terebellinae (Polychaeta, Terebellidae) living in Brazilian corals. *J. Mar. Biol. Assoc. UK*, **83**(4): 761-770.
- NOGUEIRA, J.M.M., ROSSI, M.C.S. & LÓPEZ, E. 2006. Intertidal species of *Branchiomma* Kölliker and *Pseudobranchiomma* Jones (Polychaeta: Sabellidae: Sabellinae) occurring on rocky shores along the State of São Paulo, Southeastern Brazil. *Zoological Studies*, **45**(4): 586-610.
- NOGUEIRA, J.M.M., SAN MARTÍN, G. & AMARAL, A.C.Z., 2001a. Description of five new species of Exogoninae Rioja, 1925 (Polychaeta: Syllidae) associated with the stony coral *Mussimilia hispida* (Verril, 1868) in São Paulo, Brazil. *Journal of Natural History*, **35**(12): 1773-1794.
- NOGUEIRA, J.M.M., SAN MARTÍN, G. & FUKUDA, M.V. 2004b. On some exagonines (Polychaeta, Syllidae, Exogoninae) from the northern coast of the State of São Paulo, southeastern Brazil – results of Biota/Fapesp/Bentos Marinho Project. *Meiofauna Marina*, **13**: 45-77.
- NOGUEIRA, J.M.M., STEINER, T.M. & AMARAL, A.C.Z., 2001b. Descriptions of two new species of *Eunice* Cuvier, 1817 (Polychaeta: Eunicidae) from coastal islands of the State of São Paulo, Brazil. *Sci. Mar.*, **65**(1):47-57.
- NOGUEIRA, J.M.M; LOPEZ, E. & ROSSI, M.C.S. 2004a. *Kirkia heterobranchiata*, a new genus and new species of extratubular embryo-brooding sabellid (Polychaeta, Sabellidae) from São Paulo, with comments on the phylogeny of the group. *Mar. Biol. Assoc. UK*, **84**(4): 701-710.
- NONATO, E.F. & LUNA, J.A.C. 1970a. Anelídeos poliquetas do Nordeste do Brasil. I - Poliquetas bentônicos da costa de Alagoas e Sergipe. *Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo*, **19**: 57-130.

- NONATO, E.F. & LUNA, J.A.C. 1970b. Sobre alguns poliquetas de escama do Nordeste do Brasil. *Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo*, **18**(1): 63-91.
- NONATO, E.F. 1958. Sobre duas arenicolas da costa brasileira (Annelida, Polychaeta). *Oceanografia Biológica*, **3**: 1-7.
- NONATO, E.F. 1963. *Poecilochaetus australis* sp. nova. (Annelida, Polychaeta). *Neotropica*, **9**: 17-26.
- NONATO, E.F. 1965. *Eunice sebastiani* sp. nova. (Annelida, Polychaeta). *Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo*, **14**: 133-139.
- NONATO, E.F. 1966a. Anelídeos poliquetas da campanha científica do pesqueiro "Pescal II". *Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo*, **15**(1): 65-74.
- NONATO, E.F. 1966b. *Sternaspis capillata* sp. n. (Annelida, Polychaeta). *Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo*, **15**(1): 79-84.
- NONATO, E.F. 1973. Anelídeos Poliquetas. Relatório sobre a segunda pesquisa oceanográfica e pesqueira do Atlântico Sul entre Torres e Maldonado (Lat. 29°S - 35°S). *Programa Rio Grande do Sul II*, Parte I.
- NONATO, E.F. 1981. **Contribuição ao Conhecimento dos Anelídeos Poliquetas Bentônicos da Plataforma Continental Brasileira, Entre Cabo Frio e o Arroio Chuí**. Tese de Livre-Docência, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 246 p.
- NONATO, E.F., BOLÍVAR, G.A. & LANA, P.C. 1986. *Laonice branchiata*, a new species of Spionidae (Annelida; Polychaeta) from the southeastern brazilian coast. *Nerítica, Pontal do Sul, PR*, **1**(3): 21-25.
- OCCHIONI, G.E., BRASIL, A.C.S. & ARAUJO, A.F.B. 2009a. Morphometric study of *Phragmatopoma caudata* (Kroyer) Mørch, 1863 (Polychaeta – Sabellida - Sabellariidae). *Zoologia*, **26** (4): 739-746.
- OCCHIONI, G.E., BRASIL, A.C.S. & ARAUJO, A.F.B. 2009b. Estudo morfométrico de *Phragmatopoma caudata* (Kroyer) Mørch, 1863 (Polychaeta – Sabellida - Sabellariidae). **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 58.
- OLIVEIRA, V.M. & LANA, P.C. 2009. Revisão taxonômica de *Laeonereis* (Hartman, 1945) (Polychaeta: Nereididae). **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 67.
- OLIVEIRA, V.M., SANTOS, C.S.G. & LANA, P.C. 2006. Implicações morfométricas dos processos de anestesia e fixação de *Laeonereis acuta* (Treadwell, 1923) (Polychaeta, Nereididae). **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 31.
- OLIVEIRA, V.M., SANTOS, C.S.G., LANA, P.C. & CAMARGO, M.G. 2010. Morphological variation caused by fixation techniques may lead to taxonomic confusion in *Laeonereis* (Polychaeta: Nereididae). *Zoologia*, **27**(1): 146-150.
- OMENA, E.P. & AMARAL, A.C.Z. 1997. Distribuição espacial de Polychaeta (ANNELIDA) em diferentes ambientes entremarés de praias de São Sebastião. *Oecologia Brasiliensis, Ecologia de Praias Arenosas do Litoral Brasileiro*, **3**: 183-196.
- OMENA, E.P. & AMARAL, A.C.Z. 1998. Population dynamics of *Laeonereis acuta* (Treadwell, 1923) (Polychaeta: Nereididae) from the Enseada Beach (São Sebastião, SP, Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p. 109.
- OMENA, E.P. & AMARAL, A.C.Z. 2001. Morphometric study of the nereidid *Laeonereis aculata* (Annelida: Polychaeta). *J. Mar. Biol. Assoc. UK*, **81**: 423-426.
- OMENA, E.P. & AMARAL, A.C.Z. 2003. Sandy beach morphodynamic and the polychaete fauna in Southeast Brazil. *J. Coast. Res.*, **35**: 431-439.
- OMENA, E.P. & NEVES, G. 2001. Polychaete distribution in seagrass beds (*Halodule wrightii*) along the coast of Rio de Janeiro (southeast Brazil). **7th International Polychaete Conference**, p. 141.
- OMENA, E.P. 1998. **Poliquetas da Região Entremarés de Praias do Litoral Norte do Estado de São Paulo**. Tese de Doutorado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 101 p.

- OMENA, E.P., JUNQUEIRA, A.O.R. & TAVARES, M. 2006a. Inventário da fauna de anelídeos poliquetas da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 24.
- OMENA, E.P., JUNQUEIRA, A.O.R. & TAVARES, M. 2006b. Estrutura das comunidades de anelídeos poliquetas do infralitoral da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 60.
- OMENA, E.P., OIGMAN, S.S. & AMARAL, A.C.Z. 1997. Distribuição temporal do Polychaeta Nereidae *Laeonereis acuta* (Webster, 1880) em uma planície de maré (São Sebastião, SP – Brasil). **VII Congresso Latino-americano sobre Ciências do Mar, Resumos expandidos**, 7(2), 245-247p.
- ORENSANZ, J.M. & GIANUCA, N.M. 1974. Contribuição ao conhecimento dos anelídeos poliquetas do Rio Grande do Sul, Brasil. I. Lista sistemática preliminar e descrição de três novas espécies. **Comum. Mus. Ci. PUCRGS, Porto alegre**, 4: 1-37.
- ORENSANZ, J.M. & RAMIREZ, F.C. 1973. Taxonomía y distribución de los poliquetos pelágicos del Atlántico Suboccidental. **Boletín del Instituto de Biología Marina, Argentina**, 21: 1-101.
- PAGLIOSA, P.R. & LANA, P.C. 1998. Population dynamics and secondary production of *Nereis oligohalina* (Nereididae: Polychaeta) from a subtropical marsh in SE Brazil. **6th International Polychaete Conference**, p. 110.
- PAGLIOSA, P.R. & LANA, P.C. 2000. Population dynamics and secondary production of *Nereis oligohalina* (Nereididae: Polychaeta) from a subtropical marsh in southeast Brazil. **Bull. Mar. Sci.**, 67(1): 259-268.
- PAIVA, P.C. & NONATO, E.F. 1991. On the genus *Iphitime* (Polychaeta: Iphitimidae) and description of *Iphitime sartorae* sp. nov. a commensal of Brachyuran crabs. **Ophelia**, 34(3): 209-215.
- PAIVA, P.C. 1990. **Padrões de Distribuição e Estrutura Trófica dos Anelídeos Poliquetas da Plataforma Continental do Litoral Norte do Estado de São Paulo**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 146 p.
- PAIVA, P.C. 1993a. Anelídeos poliquetas da plataforma continental norte do Estado de São Paulo: I - Padrões de densidade e diversidade específica. **Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo**, 41(1/2): 69-80.
- PAIVA, P.C. 1993b. Trophic structure of a shelf polychaete taxocoenosis in southern Brazil. **Cah. Biol. Mar.** 35: 39-55.
- PAIVA, P.C. 1996. **Variação Espacial e Temporal da Macrofauna Bentônica da Enseada de Picinguaba, Ubatuba, SP - Relevância no Planejamento Amostral em Estudos Oceanográficos e de Monitoramento Ambiental de Fundos Marinhos Inconsolidados**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 140 p.
- PAIVA, P.C. 2001. Soft-bottom polychaetes of the Abrolhos bank, eastern Brazil. **7th International Polychaete Conference**, p. 145.
- PAIVA, P.C. 2006. Estudos moleculares em poliquetas tropicais. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 22.
- PAIVA, P.C., BARROSO, R. & SOLÉ-CAVA, A.M. 2006. Especiação ecológica e nanismo em espécies do complexo *Eurythoe complanata* (Pallas, 1766) (Polychaeta, Amphinomidae) no Arquipélago Marinho de Abrolhos-BA. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 68.
- PARDO, E.V & AMARAL, A.C.Z. 2009. Cirratulidae da região Sudeste e Sul do Brasil. **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 71.
- PARDO, E.V. & AMARAL, A.C.Z. 1997. Análise do conteúdo do trato digestivo de *Cirriformia tentaculata* e *Naineris setosa* (Annelida: Polychaeta). **VII Congresso Latino-americano sobre Ciências do Mar, Resumos expandidos**, 7(2), 267.
- PARDO, E.V. & AMARAL, A.C.Z. 1998. Feeding behavior and diet of the Cirratulid, *Cirriformia filigera* (Delle Chiaje, 1825). **6th International Polychaete Conference**, p. 114.
- PARDO, E.V. & AMARAL, A.C.Z. 2006. Foraging and mobility in three species of aciculata (Annelida:Polychaeta). **Braz. J. Biol.**, 66(4): 1065-1072.

- PARDO, E.V. 1995. **Padrões de Distribuição e Estrutura Trófica dos Poliquetos da Região Entremarés de Praias da Ilha de São Sebastião (Ilhabela, SP)**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", 77 p.
- PARDO, E.V., MACCORD, F.S. & AMARAL, A.C.Z. 2006a. Dinâmica populacional e produção do Polychaeta *Capitella capitata* em ambientes entremarés enriquecidos organicamente. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 70.
- PARDO, E.V., RADASHEVSKY, V.I. & AMARAL, A.C.Z. 2006b. Família Spionidae, pp. 205-220. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- PASSOS, G.M., OLIVEIRA, L.S., COUTO, E.C.G. & BOEHS, G. 2006. Fauna de poliquetas de faixas entremarés da região estuarina da bacia do Rio Cachoeira, Ilhéus, Bahia (Brasil). **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 55.
- PEREZ, L.F., FLORES, A.A.V. & SILVA, H.R. 2006. The sabellariid *Phragmatopma caudata* (Kroyer, MS), Mörch, 1863: taxonomic status and geographic variation along northeast and southeast of the brazilian coast. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 51.
- PERKINS, T.H. 1980. Review of species referred to *Ceratonereis mirabilis*, and descriptions of new species of *Ceratonereis*, *Nephtys*, and *Goniada* (Polychaeta). **Proc. Biol. Soc. Wash.**, **93**(1): 1-49.
- PESO-AGUIAR, M.C., SANTA-ISABEL, L.M., JESUS, A.C.S. & DUTRA, L.X.C. 1998. Polychaete (Annelida) communities under the influence of oil, spills and their derivatives at Todos os Santos Bay, Bahia, Brazil. **6th International Polychaete Conference**, p. 116.
- PETTI, M.A.V. & NONATO, E.F., 1998. Temporal variation of polychaetes from (southeastern Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p. 118.
- PETTI, M.A.V. & NONATO, E.F., 2000. Temporal variation of Polychaetes from Picinguaba and Ubatumirim bights (southeastern Brazil). **Bull. Mar. Sci.**, **67**(1): 127-136.
- PETTI, M.A.V. 1990. **Hábitos Alimentares dos Crustáceos Decápodos Brachiuros e seu Papel na Rede Trófica do Infralitoral de Ubatuba (Litoral Norte do Estado de São Paulo, Brasil)**. Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 150 p.
- PETTIBONE, M.H. 1971. Revision of some species referred to *Leptonereis*, *Nicon* and *Laeonereis*. **Smith. Contr. Zool.**, **104**: 53.
- PIRES-VANIN, A.M.S. 1995. A macrofauna bêntica da plataforma continental ao largo de Ubatuba, São Paulo, Brasil. **Publção esp. Inst. oceanogr., S. Paulo**, (10): 137-158.
- PIRES-VANIN, A.M.S., BROMBERG, S. & SILVA, D.A.M. 2006. Avaliação da fauna de Polychaeta em áreas impactadas por contaminação orgânica no Canal de São Sebastião, SP. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 62.
- PIRES-VANIN, A.M.S., CORBISIER, T.N., ARASAKI, E. & MÖELLMANN, A.M. 1997. Composição e distribuição espaço-temporal da fauna bêntica no Canal de São Sebastião. **Relat. téc. inst. oceanogr.**, (41): 29-46.
- PRANTONI, A.L., LANA, P.C. & DI DOMENICO, M. 2009. Respostas de curto prazo das associações de poliquetas à pesca de arrasto na plataforma interna do Paraná (Brasil). **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, Argentina**, p. 13.
- QUINTANA, C.O. 2008. **Relações Entre as Comunidades Bênticas e a Matéria Orgânica Sedimentar: Respostas a Qualidade dos Recursos Alimentares e Influencia na Diagenese Recente**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 182p + anexos.
- RADASHEVSKY, V.I & NOGUEIRA, J.M.M. 2003. Life history, morphology and distribution of *Dipolydora armata* (Polychaeta:Spionidae). **J. Mar. Biol. Ass. U.K.**, **83**: 375-384.
- RADASHEVSKY, V.I. & LANA, P.C. 2007. *Laonice* (Annelida: Spionidae) from South America: an identification key and description of a new species. **9th International Polychaete Conference**, p. 169.

- REBELO, F.C. 1988. Primeira ocorrência do poliqueta estuarino *Namalycastis abiuma* (Muller, in Grube, 1871) na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (Polychaeta, Nereidae), incluindo notas de laboratório. **Boletim da Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Ciências Biológicas e de Geociências**, 41: 3-12.
- REIS, M.O. & AMARAL, A.C.Z. 1998. Comparative study of Polychaete composition from Araçá intertidal region, São Sebastião (SP, Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p.120.
- REIS, M.O. 1995. **Estrutura e Dinâmica da Macrofauna Bêntica de Poliquetos da Região Entremarés de Praias da Ilha de São Sebastião (SP)**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, 81 p.
- REIS, M.O., MORGADO, E.H., DENADAI, M.R. & AMARAL, A.C.Z. 2000. Polychaete zonation on sandy beaches of São Sebastião Island, São Paulo State, Brazil. **Revta. bras. Oceanogr.**, 48(2): 107-117.
- RIBEIRO, Z.A., ALMEIDA, T.C.M. & BRASIL, A.C.S. 2001. Morphometric study of *Armandia longicaudata* (Caullery, 1944) (Polychaeta: Opheliidae) a methodological approach. **7th International Polychaete Conference**, p. 159.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 1997. Variação espaço-temporal de anelídeos poliquetas de um setor da Praia Engenho D’água, Canal de São Sebastião (SP - Brasil). **VII Congresso Latino-americano sobre Ciências do Mar, Resumos expandidos**, 7 (2): 347-349.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 1998. Composition and distribution of Polychaetes in the beach intertidal region of the São Sebastião Channel (São Paulo, Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p. 121.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 2000. Temporal variation of annelids in the intertidal zone of beaches of the São Sebastião Channel, southern Brazil. **J. Mar. Biol. Assoc. UK**, 80: 1007-1017.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 2001a. Environmental variables and intertidal beach annelids of São Sebastião Channel (State of São Paulo, Brazil). **Rev. Biol. Trop.**, 49(3-4): 849-857.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 2004a. *Bathyglycinde profunda* (Hartman & Fauchald) (Polychaeta, Goniadidae): new combination. **Revta. Bras. Zool.**, 21(4): 937-942.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 2004b. *Progoniada* and *Goniadella* (Annelida: Polychaeta: Goniadidae) of the outer shelf and continental slope off the southeastern coast of Brazil. **J. Mar. Biol. Assoc. UK**, 84(1): 47-58.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 2006. Família Pisionidae, pp. 118-120. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 2007a. Nephtyidae (Annelida: Polychaeta) from São Paulo State, Brazil, including a new record for the brazilian coast. **9th International Polychaete Conference**, p.175.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z. 2007b. First occurrence of the family Paralacydoniidae (Annelida: Polychaeta) in the south atlantic ocean. **Biota Neotropica**, 7(1) 2-4.
- RIZZO, A.E. & AMARAL, A.C.Z., 2001b. Spatial distribution of annelids in the intertidal zone in São Sebastião Channel, Brazil. **Sci. Mar.**, 65(4): 323-331.
- RIZZO, A.E. & STEINER, T.M. 2006a. Família Glyceridae, pp. 165-172. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- RIZZO, A.E. & STEINER, T.M. 2006b. Família Goniadidae, pp. 173-186. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- RIZZO, A.E. 1998. **Composição e Distribuição de Anelídeos da Região Entremarés das Praias São Francisco e Engenho D’água, Canal de São Sebastião (SP)**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, 74 p.

- RIZZO, A.E. 2002. **Anelídeos Poliquetas da Plataforma Externa e Talude Continental ao Largo da Costa do Estado de São Paulo**. Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, 167 p.
- RIZZO, A.E. 2006a. Família Paralacydoniidae, pp. 187-188. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- RIZZO, A.E. 2006b. Família Sphaerodoridae, pp. 189-190. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- RIZZO, A.E., OLIVEIRA, L.S., PASSOS, G.M., COUTO, E.C.G. & BOEHS, G. 2009. Distribuição espaço-temporal de anelídeos poliquetas de planícies de marés do estuário do Rio Cachoeira, Ilhéus, Bahia (Brasil), **2º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 36.
- RIZZO, A.E., SALAZAR-VALLEJO, S.I. & AMARAL, A.C.Z. 2006. Pilargidae de Saint-Joseph, 1899 (Annelida Polychaeta) da região Sudeste e Sul do Brasil. . **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 30.
- RIZZO, A.E., SARTOR, S.M. & NUCCI, P.R. 2007b. Benthic macrofauna of estuarine soft bottoms of the Baixada Santista (São Paulo, Brazil). **9th International Polychaete Conference**, p. 174.
- ROCHA, R.M. 1993. **Comunidade Incrustante em Substrato Duro não Estabilizado na Zona Entremarés (São Sebastião, SP)**. Tese de Doutorado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 111 p.
- RODRIGUES, H.A., PÉREZ, C.D., NEVES, B.M. & SOUZA, J.R.B. 2006. Alimentação de *Hermodice carunculata* (Pallas, 1776) (Polychaeta- Amphinomidae) em bancos de *Carijoa riisei* (Duchassaing & Michelotti, 1860) (Cnidaria – Anthozoa). **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 67.
- ROSSI, M.C.S. 2008. **Contribuição ao Conhecimento Taxonômico dos Poliquetas Sabelídeos (Polychaeta: Sabellidae) da Região Sudeste do Brasil**. Tese de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 176p.
- ROUSE, G.W. & FAUCHALD, K. 1997. Cladistics and polychaetes. **Zool. Scr.**, **26**(2):139-204.
- ROUSE, G.W. & PLEIJEL, F. 2001. **Polychaetes**. Oxford University Press, Oxford, 354 p.
- RULLIER, F. & AMOUREUX, L. 1979. Annélides Polychaètes. **Ann. Inst. océanogr.**, (55): 145-206.
- SALAZAR-VALLEJO, S.I. 1990. Redescription of *Sigambra grubii* Müller, 1858 and *Hermundura tricuspis* Müller, 1858 from Brazil and designation of neotypes (Polychaeta: Pilargidae). **J. Nat. Hist.**, **24**: 507-517.
- SANTA-ISABEL, L.M., CERQUEIRA, W.R.P. & ALVES, O.F.S., 1996. Associação entre *Ophionereis reticulata* (Say) (Ophiuroidea, Ophionereididae) e *Malmgreniella variegata* (Treadwell) (Polychaeta, Polynoidae) das praias de Salvador, Bahia, Brasil. **Revta. Bras. Zool.**, **13**(1): 137-142.
- SANTA-ISABEL, L.M., LEÃO, Z.M.A.N. & PESO-AGUIAR, M.C., 2000. Polychaetes from the Guarajuba coral reefs, Bahia, Brazil. **Bull. Mar. Sci.**, **67**(1): 645-653.
- SANTI, L. 2008. **Estratégias Reprodutivas e Dinâmica Populacional de *Poecilochaetus australis Nonato, 1963* (Polychaeta, Spionida) em Local Sujeito a Influencia de Efluentes Urbanos Não Tratados, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil: Projeto Australis**. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 137p.
- SANTI, L., SUMIDA, P.Y.G. & PAIVA, P.C. 2006. O status taxonômico de *Poecilochaetus australis Nonato, 1963* (Poecilochaetidae, Spionida) – uma reavaliação. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 44.
- SANTOS A.S., BRASIL, A.C.S. & CHRISTOFFERSEN, M.L. 2006. Sabellariidae (Annelida: Polychaeta) da costa brasileira – estado atual de conhecimento e distribuição espacial. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 52.
- SANTOS, A.S. 2006. **Terebellidae do Nordeste e Sabellariidae da Costa do Brasil (Annelida: Polychaeta) – Taxonomia e Distribuição Espacial no Contexto Atual do Conhecimento**. Monografia de Graduação, Universidade Federal da Paraíba, 225p.

- SANTOS, A.S., BRASIL, A.C. & CHRISTOFFERSSEN, M.L. 2007a. Brazilian species of Sabellariidae (Sabellida): actual status and distribution. **9th International Polychaete Conference**, p.180.
- SANTOS, A.S., BRASIL, A.C.S. & CHRISTOFFERSEN, M.L. 2006b. Sabellariidae (Annelida: Polychaeta) da costa brasileira – estado atual do conhecimento, distribuição espacial e indicação de novos táxons. **XXVI Congresso Brasileiro de Zoologia**, p. ?
- SANTOS, A.S., BRASIL, A.C.S. & CHRISTOFFERSEN, M.L. 2009. Redescrição de *Sabellaria bellis* Hansen, 1882 com descrição de três novas espécies para América do Sul. **2º Simpósio Latino-Americanano de Polychaeta**, p. 75.
- SANTOS, A.S., NOGUEIRA, J.M.M., FUKUDA, M.V. & CHRISTOFFERSEN, M.L. 2010. New terebellids (Polychaeta: Terebellidae) from northeastern Brazil. **Zootaxa**, **2389**: 1-46.
- SANTOS, A.S., PAIVA, P.C., CAVALCANTI, G.H. & FERNANDEZ, M.P.C. 2007b. Deep-sea polychaetes associated with coral banks of Campos Basin: first records for the Brazilian continental margin, Southwest Atlantic. **9th International Polychaete Conference**, p. 101.
- SANTOS, C. 2007. Nereididae from Rocas Atoll (Northeast Brazil). **9th International Polychaete Conference**, p. 181.
- SANTOS, C.S.G. & MACKIE, A.S.Y. 2006. *Poecilochaetus* (Annelida, Polychaeta): two new species from Paranaguá Bay, Paraná, Brazil. **1º Simpósio Latino-Americanano de Polychaeta**, p. 45.
- SANTOS, C.S.G. & MACKIE, A.S.Y. 2008. New species of *Poecilochaetus* Claparède, 1875 (Polychaeta, Spionida, Poecilochaetidae) from Paranaguá Bay, southeastern Brazil. **Zootaxa**, **1790**: 53-68.
- SANTOS, C.S.G. & STEINER, T.M. 2006. Família Nereididae, pp. 121-133. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- SANTOS, C.S.G. 1996. **Nereididae (Annelida; Polychaeta) da costa Nordeste do Brasil (2ºS-18ºS)**. Dissertação de Mestrado, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 170 p.
- SANTOS, C.S.G. 2001. **Revisão e Análise Cladística da Subfamília Gymnonereidinae Banse, 1977 (Nereididade Polychaeta)**. Tese de Doutorado, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 139p.
- SANTOS, M. A. & AMARAL, A.C.Z. 1980. Anelídeos poliquetos do Estuário do Rio Sergipe. **II Encontro de Zoologia do Nordeste**, p. 2.
- SANTOS, M.A., SANTOS, C.S.G. & OLIVEIRA, C.M.M. 1994. Polychaeta in the estuary of the Piauí River, Sergipe, Brazil. **Mus. natn. Hist. nat., Paris**, : 541-547.
- SANTOS, P.J.P. & SILVA, V.M.A.P. 1992/93. *Macrochaeta westheidei* n.sp.: first Record of Acrocirridae for the brazilian coast (Annelida; Polychaeta). **Nerítica, Curitiba**, **7** (1-2): 7-12.
- SANTOS, P.J.P. 1990. **Ecologia de *Scolelepis gaucha* (Polychaeta: Spionidae) nas Praias do Rio Grande do Sul: Uma Abordagem Dinâmica da Interação População-Ambiente**. Dissertação de Mestrado, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 167 p.
- SANTOS, P.J.P. 1991. Morphodynamical influence of a temporary freshwater stream on the population dynamics of *Scolelepis gaucha* (Polychaeta:Spionidae) on a sandy beach in southern Brazil. **Bull. Mar. Sci.**, **48**: 657-664.
- SANTOS, P.J.P. 1994. Population dynamics and production of *Scolelepis gaucha* (Polychaeta: Spionidae) on the sandy beaches of Southern Brazil. **Mar. Ecol. Prog. Ser.**, **110**: 159-165.
- SEABRA, L.C., GUIMARAENS, M.A. 1991. Estudo preliminar dos anelídeos poliquetos associados às algas bentônicas do canal de Itajurú, Cabo Frio – RJ. **XVIII Congresso Brasileiro de Zoologia. Salvador**, p. 23.
- SHIMIZU, R.M. 1991. **A Comunidade de Macroinvertebrados da Região Entremarés da Praia de Barequeçaba, São Sebastião, SP**. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 72 p.

- SILVA, J.Z.P. 2002. **Análise Filogenética de Espécies Selecionadas do Gênero *Eunice* (Eunicidae, Polychaeta).** Dissertação de Mestrado, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 52 p.
- SOARES, A.G. 1992. **Estrutura Espeço-Temporal das Associações da Zona de Arrebentação Interna da Praia do Cassino, Rio Grande do Sul - Brasil.** Dissertação de Mestrado, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 192 p.
- SOLIS-WEISS, V., FAUCHALD, K. & BLANKENSTEYN, A. 1991. Trichobranchidae (Polychaeta) from shallow warm water áreas in the western Atlantic Ocean. **Proc. Biol. Soc. Wash.**, **104**(1): 147-158.
- SORDO, L.N. & LANA, P.C. 2007. Effects of the decline of *Halodule wrightii* meadows on polychaete associations, in Paranaguá Bay (Southern Brazil). **9th International Polychaete Conference**, p. 190.
- SOUZA, J.R.B. & BORZONE, C.A. 2000. Population dynamics and secondary production of *Scolelepis squamata* (Polychaeta: Spionidae) in an exposed sandy beach of southern Brazil. **Bull. Mar. Sci.**, **67**(1): 221-233.
- SOUZA, J.R.B. & BORZONE, C.A. 2007. Population dynamics and secondary production of *Euzonus furciferus* Ehlers (Polychaeta, Opheliidae) in an exposed sandy beach of Southern Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia**, **24**(4): 1139-1144.
- SOUZA, J.R.B. & GIANUCA, N.M. 1995. Zonation ans seasonal variation of the intertidal macrofauna on a sandy beach of Paraná State, Brazil. **Sci. Mar.**, **59**(2): 103-111.
- SOUZA, J.R.B. 1991. **Zonação e Variação Temporal da Macrofauna Bentônica da Praia Arenosa de Barrancos - PR.** Dissertação de Mestrado, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, 67 p.
- SOUZA, R.C.R. 1989. **A Fauna dos Bancos de Areia de *Phragmatopoma lapidosa* Kinberg, 1867 (Annelida, Polychaeta) da Região de Ubatuba, SP.** Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 83 p.
- SOVIERZOSKI, H.H. 1991. **Estrutura Temporal da Comunidade Macrobentônica da Foz do Rio Maciel, Baía de Paranaguá, Paraná.** Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Paraná, 98 p.
- STEINER, T.M & AMARAL, A.C.Z. 2006b. O gênero *Diopatra* (Polycaheta, Onuphidae); espécies conhecidas e o complexo *D. cuprea* no Brasil. . **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta, S. Paulo**, p. 29
- STEINER, T.M. & AMARAL, A.C.Z. 1999b. The family Histiobdellidae (Annelida, Polychaeta) including descriptions of two new species from Brazil and a new genus. **Contr. Zool.**, **68**(2): 95-108.
- STEINER, T.M. & AMARAL, A.C.Z. 2000. Two new species of *Marpophysa* Quatrefages, 1865 (Eunicidae, Polychaeta) from intertidal sandy beaches of the São Sebastião Channel, State of São Paulo (Brazil). **Bull. Mar. Sci.**, **67**(1): 479-489.
- STEINER, T.M. & AMARAL, A.C.Z. 2001. Eunicida (Polychaeta) from intertidal sandy beaches on the coast of the State of São Paulo, Brazil. **7th International Polychaete Conference**, p. 171.
- STEINER, T.M. & AMARAL, A.C.Z. 2006a. Família Onuphidae, pp. 191-204. In: **Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da Região Sudeste-Sul do Brasil**, Volume 1 (Amaral, A.C.Z., Rizzo, A.E., Arruda, E.P., orgs.). Editora da USP, São Paulo, 287p.
- STEINER, T.M. & AMARAL, A.C.Z. 2009. *Arabella aracaensis*, a new species with growth rings on its mandibles, and some remarks on the endoparasitic *Labrrostratus prolificus* (Polychaeta, Oenonidae) from southern Brazil. **J. Nat. Hist.**, **43**: 2537-2551.
- STEINER, T.M. & AMARAL, A.C.Z., 1998. Nereididae, Goniadidae, Glyceridae, Onuphidae and Eunicidae from intertidal sandy beaches of the São Sebastião Channel, São Paulo (Brazil). **6th International Polychaete Conference**, p. 134.
- STEINER, T.M. 2000. **Eunicida e Phyllodocida (Polychaeta, Aciculata) de praias do litoral norte do Estado de São Paulo.** Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 180p.

- STEINER, T.M. 2005. **Estudo Taxonômico da Família Onuphidae (Annelida, Polychaeta) das Regiões Sudeste e Sul do Brasil.** Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 210p.
- TARARAM, A.S. 1994. **Distribuição Espacial e Temporal da Macrofauna Bentopelágica em Marisma da Região de Cananéia (SP, Brasil).** Tese de Livre-Docência, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 169 p.
- TEBBLE, N. 1960. The distribution of pelagic polychaetes in the south Atlantic Ocean. **Discovery Reports**, **30**: 161-300.
- TEMPERINI, M.T. 1981. **Sistemática e Distribuição dos Poliquetos Errantes da Plataforma Continental Brasileira entre as Latitudes de 23°05'S e 30°00'S.** Dissertação de Mestrado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 89 p.
- TOMMASI, L.R. 1967. Observações preliminares sobre a fauna bêntica de sedimentos moles da Baía de Santos e regiões vizinhas. **Bolm. Inst. oceanogr., São Paulo**, **16**(1): 43-65.
- TOMMASI, L.R. 1970. Observações sobre a fauna bêntica do Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia (SP). **Bolm. Inst. oceanogr., São Paulo**, **19**: 43-56.
- TOMMASI, L.R. 1979. **Considerações Ecológicas Sobre o Sistema Estuarino de Santos (SP).** Tese de Livre-Docência, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, volumes I e II, 489 p.
- TREADWELL, A.L. 1923. Duas novas espécies de Annelidos Polychetos do gênero *Nereis*. **Rev. do Museu Paulista**, **(11)**: 1-10.
- TREADWELL, A.L. 1932. Annelidos Polychetos novos da Ilha de São Sebastião. **Rev. do Museu Paulista**, **2**(17): 1-21.
- VALENÇA, A.P.M.C., SANTOS, P.J.P., CARVALHO, P.V.V.C. & BOTTER-CARVALHO, M.L. 2006. Variação espaço-temporal de *Streblospio benedicti* (Spionidae) e *Sternaspis aff. capillata* (Sternaspidae) em áreas estuarinas impactadas no litoral norte e Pernambuco (NE, Brasil). **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 71.
- VAROLI, F.M.F. 1988. **Associações Bentônicas da Zona Entremarés do Sistema Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia, São Paulo.** Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 306 p.
- WEISS, L. & PAGLIOSA, P.R. 2006. Lista preliminar das espécies dos Annelida Polychaeta de Santa Catarina e sua distribuição ao longo da costa brasileira. **1º Simpósio Latino-Americano de Polychaeta**, p. 26.
- WESTHEIDE, W., 1974. Interstitielle Polychaeten aus brasilianischen Sandstränden. **Mikrofauna des Meeresbodens**, **31**: 1-18.
- WU, B., RUIPING, S & YANG, J. 1985. **The Nereidae (Polychaetous Annelids) of the Chinese Coast.** Beijing: China Ocean Press, 234 p.
- ZANOL, J., PAIVA, P.C. & ATTOLINI, F.S. 2000. *Eunice* and *Palola* (Eunicidae: Polychaeta) from the eastern Brazilian Coast (13°00'- 22°30'S). **Bull. Mar. Sci.**, **67**(1): 449-463.
- ZIBROWIUS, H. 1970. Contribution à l'étude des Serpulidae (Polychaeta Sedentaria) du Brésil. **Bolm. Inst. oceanogr., São Paulo**, **19**: 1-32.

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Arenicolidae | <i>Arenicola</i> | <i>brasiliensis</i> | Nonato, 1958 | SP | | | Amaral & Morgado, 1999 |
| 1 | Arenicolidae | <i>Arenicola</i> | <i>brasiliensis</i> | Nonato, 1958 | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 1 | Arenicolidae | <i>Arenicola</i> | <i>brasiliensis</i> | Nonato, 1958 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975 |
| 1 | Arenicolidae | <i>Arenicola</i> | <i>brasiliensis</i> | Nonato, 1958 | SP, S. Sebastião | | entre | Nonato, 1981 |
| 1 | Arenicolidae | <i>Arenicola</i> | <i>cristata var. brasiliensis</i> | Nonato, 1958 | SP, Ubatuba | | entre | Nonato, 1958 |
| 1 | Arenicolidae | <i>Arenicola</i> | <i>glasselli</i> | Berkeley & Berkeley, 1939 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Nonato, 1958 |
| 1 | Arenicolidae | <i>Branchiomaldane</i> | <i>maryae</i> | Nogueira & Rizzo, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 3 - 10m; fauna associada | Nogueira & Rizzo, 2001 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | Brasil, Nordeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | AM | entre | Amaral et al., 1987 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Caraguatatuba | | entre | Amaral et al., 1998a |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1998a |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b, 1980a |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | RJ | AM | infra | Carvalheira, 1993 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, I. Sto. Amaro | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, V. Carvalho | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Bertioga | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | PI | | entre; estuário | Couto & Fernandes, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SE | | entre; estuário | Couto & Fernandes, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SE, Aracaju | | infra; estuário | Farias & Couto, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Paranaguá | AF, AMF, AL | 0 - 3 m; estuário | Lana et al., 1989 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | Brasil | | | MacCord et al., 2006 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | PR, Paranaguá | AL | entre | Netto & Lana, 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | AG, AF, AMF | entre | Pardo et al., 2006a |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | BA, Ilhéus | AM, L | entre; estuário | Passos et al., 2006 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | BA | | entre | Peso-Aguiar et al., 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | A, AMF | entre | Reis & Amaral, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 17m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>capitata</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Cananéia | AM, AF, AMF | entre | Varoli, 1988 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitella</i> | <i>perarmata</i> | (Gravier, 1911) | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitellethus</i> | <i>dispar</i> | (Ehlers, 1907) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitellides</i> | <i>jonesi</i> | Hartman, 1959 | SP, Santos | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitomastus</i> | <i>minutus</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitomastus</i> | <i>minutus</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitomastus</i> | <i>minutus</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitomastus</i> | <i>minutus</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitomastus</i> | <i>minutus</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitomastus</i> | <i>minutus</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitomastus</i> | <i>minutus</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Capitellidae | <i>Capitomastus</i> | <i>minutus</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>caducus</i> | (Grube, 1846) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4m | Lana, 1981 |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>caducus</i> | (Grube, 1846) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>caducus</i> | (Grube, 1846) | SP | L, OS | 7 - 67m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>caducus</i> | (Grube, 1846) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>caducus</i> | (Grube, 1846) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>lumbricoides</i> | Grube, 1878 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>lumbricoides</i> | Grube, 1878 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>lunulatus</i> | Ehlers, 1889 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>lunulatus</i> | Ehlers, 1889 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Dasybranchus</i> | <i>rectus</i> | Treadwell, 1901 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Caraguatatuba | | entre | Amaral et al., 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b, 1980a |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | RS | | infra; estuário | Capitoli et al., 1978 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Bertioga | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, V. Carvalho | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | PR, Paranaguá | AF, AMF, AL | 0 - 3 m; estuário | Lana et al., 1989 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis & Amaral, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>filiformis</i> | (Claparède, 1864) | SP, Cananéia | AM, AF, AMF | entre | Varoli, 1988 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | RS, L. dos Patos | AF, AMF | entre | Bemvenuti, 1983 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | RS, L. dos Patos | A | infra; estuário | Bemvenuti, 1987 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | PR, Paranaguá | AF, AMF, AL | 0 - 3 m; estuário | Lana et al., 1989 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | PR, Paranaguá | AL | entre | Netto & Lana, 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | PR, Paranaguá | AL | entre; estuário | Netto & Lana, 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Heteromastus</i> | <i>similis</i> | Southern, 1921 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Leiocapitella</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1947 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SC | | 10 -12m | Almeida et al., 2009 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Santos | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>capensis</i> | Day, 1961 | SP, Ubatuba | AMF, L | 3 - 17m | Petti & Nonato, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Mediomastus</i> | <i>capensis</i> | Day, 1961 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 1 | Capitellidae | <i>Neopseudocapitella</i> | <i>brasiliensis</i> | Rullier & Amoureaux, 1979 | BA, Abrolhos | | | Paiva, 2001 |
| 1 | Capitellidae | <i>Neopseudocapitella</i> | <i>brasiliensis</i> | Rullier & Amoureaux, 1979 | SE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Nonatus</i> | <i>longilineus</i> | Amaral, 1980 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Nonatus</i> | <i>longilineus</i> | Amaral, 1980 | SC | | infra | Amaral, 1980b |
| 1 | Capitellidae | <i>Nonatus</i> | <i>longilineus</i> | Amaral, 1980 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Capitellidae | <i>Nonatus</i> | <i>longilineus</i> | Amaral, 1980 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Nonatus</i> | <i>longilineus</i> | Amaral, 1980 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>hemipodus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>latericeus</i> | Sars, 1851 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>latericeus</i> | Sars, 1851 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>latericeus</i> | Sars, 1851 | PR | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>latericeus</i> | Sars, 1851 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>latericeus</i> | Sars, 1851 | RS | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>latericeus</i> | Sars, 1851 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lineatus</i> | Claparède, 1870 | RS | | infra | Kawakami & Amaral, 1983 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral et al., 1977b; 1980a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Cananéia | A, L | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Santos | A, L | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | L | 10 - 15m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | L | 10 - 15m | Morgado, 1988 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | A | 15 - 45m | Petti, 1990 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1997 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Capitellidae | <i>Notomastus</i> | <i>lobatus</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Paraleiocapitella</i> | <i>massambica</i> | Thomassin, 1970 | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Capitellidae | <i>Paraleiocapitella</i> | <i>mossambica</i> | Thomassin, 1970 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Paraleiocapitella</i> | <i>mossambica</i> | Thomassin, 1970 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Capitellidae | <i>Scyphoprocetus</i> | <i>djiboutiensis</i> | Gravier, 1906 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1998 |
| 1 | Capitellidae | <i>Scyphoprocetus</i> | <i>djiboutiensis</i> | Gravier, 1906 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Capitellidae | <i>Scyphoprocetus</i> | <i>djiboutiensis</i> | Gravier, 1906 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Capitellidae | <i>Scyphoprocetus</i> | <i>djiboutiensis</i> | Gravier, 1906 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Capitellidae | <i>Scyphoprocetus</i> | <i>djiboutiensis</i> | Gravier, 1906 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>candida</i> | Hartman, 1955 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>candida</i> | Hartman, 1955 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>candida</i> | Hartman, 1955 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>candida</i> | Hartman, 1955 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>candida</i> | Hartman, 1955 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>candida</i> | Hartman, 1955 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>delta</i> | Reish, 1958 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>delta</i> | Reish, 1958 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Cossuridae | <i>Cossura</i> | <i>delta</i> | Reish, 1958 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychis</i> | <i>amoena</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Ubatuba | | infra | Mangum, 1966 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychis</i> | <i>amoena</i> | (Kinberg, 1866) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychis</i> | <i>amphiglypta</i> | (Ehlers, 1897) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychis</i> | <i>amphiglypta</i> | (Ehlers, 1897) | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychis</i> | <i>amphiglypta</i> | (Ehlers, 1897) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychis</i> | <i>amphiglypta</i> | (Ehlers, 1897) | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Maldanidae | <i>Asychnis</i> | <i>atlanticus</i> | Kinberg, 1867 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychnis</i> | <i>atlanticus</i> | Kinberg, 1867 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychnis</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1867) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychnis</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1867) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Maldanidae | <i>Asychnis</i> | <i>collariceps</i> | (Augener, 1906) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Augener, 1906) | RJ, Arraial do Cabo | | 3 - 6 m | Almeida & Ruta, 2000 |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | PR, Paranaguá | L | 13m; estuário | Lana, 1986b |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 1 | Maldanidae | <i>Axiothella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Mangun, 1966) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Maldanidae | <i>Chirimia</i> | <i>amoena</i> | (Kinberg, 1867) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Maldanidae | <i>Chirimia</i> | <i>amoena</i> | (Kinberg, 1867) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Maldanidae | <i>Chirimia</i> | <i>amoena</i> | (Kinberg, 1867) | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Chirimia</i> | <i>amoena</i> | (Kinberg, 1867) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Chirimia</i> | <i>amoena</i> | (Kinberg, 1867) | PR | | | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Chirimia</i> | <i>amoena</i> | (Kinberg, 1867) | RJ | | | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | PR, Paranaguá | A, AF, AMF, L, OS | 6 - 17 m; estuário | Lana, 1986b |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | | 1 - 12m | Mangum, 1966 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, Santos | | infra | Mangum, 1966 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | AL | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | AMF, L | 3 - 17m | Petti & Nonato, 2000 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 6m; estuário | Lana, 1986b |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | | 1 - 12m | Mangum, 1966 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Santos | | infra | Mangum, 1966 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | AMF, L | 3 - 17m | Petti & Nonato, 2000 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>lombricoides</i> | (Quatrefages, 1865) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella</i> | <i>torquata</i> | (Leidy, 1855) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella (Axiothella)</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella (Axiothella)</i> | <i>brasiliensis</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Maldanidae | <i>Clymenella (Axiothella)</i> | <i>catenata</i> | (Malmgren, 1865) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>coronata</i> | Verrill, 1900 | SP, Ubatuba | AM | 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>coronata</i> | Verrill, 1900 | SP, Ubatuba | AM | 45m | Morgado, 1988 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>dalesi</i> | Mangun, 1966 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>droebachiensis</i> | (Sars, 1872) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 15 - 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>droebachiensis</i> | (Sars, 1872) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 15 - 45m | Morgado, 1988 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>droebachiensis</i> | (Sars, 1872) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>lombriocoides</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>oerstedi</i> | (Claparède, 1863) | SP, Ubatuba | | 25 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>oerstedi</i> | (Claparède, 1863) | SP, Ubatuba | | 25 - 50m | Morgado, 1988 |
| 1 | Maldanidae | <i>Euclymene</i> | <i>oerstedi</i> | (Claparède, 1863) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Maldanidae | <i>Heteroclymene</i> | <i>robusta</i> | Arwidsson, 1907 | SP, Ubatuba | L | 10 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Maldanidae | <i>Heteroclymene</i> | <i>robusta</i> | Arwidsson, 1907 | SP, Ubatuba | L | 10 - 35m | Morgado, 1988 |
| 1 | Maldanidae | <i>Lumbrycymene</i> | <i>noemias</i> | Lana, 1983 | RJ | | | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Lumbrycymene</i> | <i>noemias</i> | Lana, 1983 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1983 |
| 1 | Maldanidae | <i>Lumbrycymene</i> | <i>noemias</i> | Lana, 1983 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 45 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Maldanidae | <i>Lumbrycymene</i> | <i>noemias</i> | Lana, 1983 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 45 - 50m | Morgado, 1988 |
| 1 | Maldanidae | <i>Lumbrycymene</i> | <i>noemias</i> | Lana, 1983 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Maldanidae | <i>Maldane</i> | <i>glebifex</i> | Grube, 1860 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Maldanidae | <i>Maldane</i> | <i>sarsi</i> | Malmgren, 1865 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Maldanidae | <i>Maldane</i> | <i>sarsi</i> | Malmgren, 1865 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado, 1988 |
| 1 | Maldanidae | <i>Petaloproctus</i> | <i>socialis</i> | Andrews, 1891 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 1 | Maldanidae | <i>Praxillella</i> | <i>affinis</i> | (Sars, 1872) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Maldanidae | <i>Praxillella</i> | <i>affinis</i> | (Sars, 1872) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 1 | Maldanidae | <i>Praxillella</i> | <i>gracilis</i> | (Sars, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Maldanidae | <i>Rhodine</i> | <i>antarctica</i> | Gravier, 1907 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 1 | Maldanidae | <i>Rhodine</i> | <i>loveni</i> | Malmgren, 1865 | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Rhodine</i> | <i>loveni</i> | Malmgren, 1865 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Rhodine</i> | <i>loveni</i> | Malmgren, 1865 | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Maldanidae | <i>Rhodine</i> | <i>loveni</i> | Malmgren, 1865 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Maldanidae | <i>Rhodine</i> | <i>loveni</i> | Malmgren, 1865 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Maldanidae | <i>Rhodine</i> | <i>loveni</i> | Malmgren, 1865 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ammotrypane</i> | <i>aulogaster</i> | Rathke, 1843 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ammotrypane</i> | <i>aulogaster</i> | Rathke, 1843 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ammotrypane</i> | <i>cylindricaudatus</i> | Hansen, 1878 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ammotrypane</i> | <i>trigintae</i> | Hartman, 1953 | RS | L | 80m | Orensan & Gianuca, 1974 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | Brasil, Sudeste | AF, AMF | 10m | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | SP, I. S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1995 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>agilis</i> | (Andrews, 1891) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 1998 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | PR, B. de Paranaguá | | | Brasil et al., 2006 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, Santos | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Vicente | | entre | Monteiro, 1990 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, Santos | | infra | Monteiro, 1990 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SE | L, OS | 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, Santos | AM | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, Ubatuba | AM | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | RJ | | fauna associada | Omena & Neves, 2001 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis & Amaral, 1998 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Opheliidae | Armandia | agilis | (Andrews, 1891) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | hossfeldi | Hartmann-Schröder, 1956 | PR | AL | 13m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | hossfeldi | Hartmann-Schröder, 1956 | PR | AF, AMF | | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | hossfeldi | Hartmann-Schröder, 1956 | SP | | | Hartmann-Schröder, 1956 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | hossfeldi | Hartmann-Schröder, 1956 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 13 - 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 1 | Opheliidae | Armandia | hossfeldi | Hartmann-Schröder, 1956 | PR, B. de Paranaguá | | fauna associada | Sordo & Lana, 2007 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | hossfeldi | Hartmann-Schröder, 1956 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Shimizu, 1991 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | hossfeldi | Hartmann-Schröder, 1956 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | ihabelae | Hartmann-Schröder, 1956 | SP | | | Hartmann-Schröder, 1956 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | loboi | Elías & Bremec, 2002 | PR | AF, AMF | 10m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | loboi | Elías & Bremec, 2002 | PR, P. de Paranaguá | AF, AMF | 10m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | loboi | Elías & Bremec, 2002 | PR, Paranaguá | AF, AMF | 10m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | loboi | Elías & Bremec, 2002 | PR, I. de Gererês | AL | 9m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | longicaudata | (Caullery, 1944) | RJ, Arraial do Cabo | | infra | Almeida & Ruta, 1998 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | longicaudata | (Caullery, 1944) | RJ, Arraial do Cabo | | 3 - 6 m | Almeida & Ruta, 2000 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | longicaudata | (Caullery, 1944) | Brasil | | infra | Almeida et al., 2001 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | longicaudata | (Caullery, 1944) | RJ, Cabo Frio | | | Ribeiro et al., 2001 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | maculata | Webster, 1884 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Opheliidae | Armandia | maculata | (Webster, 1884) | PR, Paranaguá | AL | 18m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | maculata | (Webster, 1884) | RS, 34°19' S, 52°0'44" | A | 38m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | maculata | (Webster, 1884) | PR, I. de Gererês | AL | 9m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | Armandia | maculata | (Webster, 1884) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>maculata</i> | (Webster, 1884) | AL | A, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>maculata</i> | (Webster, 1884) | SP, Ubatuba | A, C | 43m | Nonato, 1981 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>maculata</i> | (Webster, 1884) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>maculata</i> | (Webster, 1884) | PB | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>polyophtalma</i> | Kükenthal, 1887 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>polyophtalma</i> | Kükenthal, 1887 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>polyophtalma</i> | Kükenthal, 1887 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 1 | Opheliidae | <i>Armandia</i> | <i>polyophtalma</i> | Kükenthal, 1887 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus</i> | <i>furcifera</i> | (Ehlers, 1897) | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus</i> | <i>furcifera</i> | (Ehlers, 1897) | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus</i> | <i>furciferus</i> | Ehlers, 1887 | PR, B. de Paranaguá | A | entre | Brauko et al., 2009 |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus</i> | <i>furciferus</i> | Ehlers, 1897 | PR, B. de Paranaguá | | entre | Souza & Borzone, 2007 |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus (Thoracophelia)</i> | <i>furcifera</i> | (Ehlers, 1897) | PR | AM, AF, AMF | entre | Borzone et al., prelo |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus (Thoracophelia)</i> | <i>furcifera</i> | (Ehlers, 1897) | RS | | infra | Orensanz & Giana, 1974 |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus (Thoracophelia)</i> | <i>furcifera</i> | (Ehlers, 1897) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário | Souza & Giana, 1995 |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus (Thoracophelia)</i> | <i>furcifera</i> | (Ehlers, 1897) | | AF, AMF | entre | Souza, 1991 |
| 1 | Opheliidae | <i>Euzonus (Thoracophelia)</i> | <i>mamillata</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelia</i> | <i>formosa</i> | (Kinberg, 1866) | AL | A, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelia</i> | <i>formosa</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Ubatuba | AL, C | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelia</i> | <i>formosa</i> | (Kinberg, 1866) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelia</i> | <i>formosa</i> | (Kinberg, 1866) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelia</i> | <i>pulchella</i> | Tebble, 1953 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>abanchiata</i> | Stop-Bowitz, 1948 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>acuminata</i> | Oersted, 1843 | Brasil, 26°29'5"S, 48°21'4" | AL | 37m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>acuminata</i> | Oersted, 1843 | Brasil, 25°55'4"S, 47°52'3" | AL | 50m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>acuminata</i> | Oersted, 1843 | Brasil, 26°22'1"S, 48°19'8" | AL | 51m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>acuminata</i> | Oersted, 1843 | Brasil, 26°22'1"S, 48°19'8" | AL | 51m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>acuminata</i> | Oersted, 1843 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>alata</i> | Elías et al., 2003 | Brasil, 25°26'S, 47°55'W | AF, AMF | | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>aulogaster</i> | (Rathke, 1843) | SP, Ubatuba | L | 35 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>aulogaster</i> | (Rathke, 1843) | SP, Ubatuba | L | 35 - 50m | Morgado, 1988 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>aulogastrella</i> | Hartman & Fauchald, 1971 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>chaetifera</i> | Hartman, 1965 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>cylindricaudata</i> | Hansen, 1878 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>cylindricaudata</i> | Hansen, 1878 | PR | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>cylindricaudata</i> | Hansen, 1882 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>cylindricaudatus</i> | Hansen, 1878 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>gaucha</i> | Elías et al., 2003 | Brasil, 25°46'S, 48°12'8"W | AF, AMF | | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>kinbergii</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>kinbergii</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>kinbergii</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>kinbergii</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>kinbergii</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina scaphigera</i> | <i>scaphigera</i> | Ehlers, 1901 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina scaphigera</i> | <i>scaphigera</i> | Ehlers, 1901 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Opheliidae | <i>Ophelina</i> | <i>syringopyge</i> | Ehlers, 1901 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 1 | Opheliidae | <i>Polyopthalmus</i> | <i>pictus</i> | (Dujardin, 1839) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Opheliidae | <i>Thoracophelia</i> | <i>furcifera</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>amadoi</i> | Elías et al., 2003 | Brasil, 32°41'S, 52°16'W infra | AF, AMF | 16m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>amadoi</i> | Elías et al., 2003 | Brasil, 25°26'S, 47°55'W infra | AF, AMF | 23m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>amadoi</i> | Elías et al., 2003 | Brasil, 23°13'S, 47°42'W infra | AF, AMF | 21m | Elías et al., 2003 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>forbesii</i> | Johnston, 1840 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>forbesii</i> | Johnston, 1840 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>forbesii</i> | Johnston, 1840 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>forbesii</i> | Johnston, 1840 | Brasil | | | Dauvin & Bellan, 1994 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>forbesii</i> | Johnston, 1840 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 30m | Lana, 1981 |
| 1 | Opheliidae | <i>Travisia</i> | <i>forbesii</i> | Johnston, 1840 | RJ, | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Haploscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | SP, Caraguatatuba | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Haploscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Haploscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Haploscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Haploscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Haploscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 200m | Paiva, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Haploscoloplos</i> | <i>kerguelensis</i> | (McIntosh, 1885) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | SP, I. S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1995 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | Brasil, Sudeste | | | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>fragilis</i> | (Verrill, 1873) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>kerguelensis</i> | (McIntosh, 1885) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>kerguelensis</i> | (McIntosh, 1885) | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>kerguelensis</i> | (McIntosh, 1885) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>kerguelensis</i> | (McIntosh, 1885) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>kerguelensis</i> | (McIntosh, 1885) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>robustus</i> | (Verrill, 1873) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>robustus</i> | (Verrill, 1873) | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>robustus</i> | (Verrill, 1873) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>robustus</i> | (Verrill, 1873) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>robustus</i> | (Verrill, 1873) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>robustus</i> | (Verrill, 1873) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 m | Paiva, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>robustus</i> | (Verrill, 1873) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Leitoscoloplos</i> | <i>robustus</i> | (Verrill, 1873) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>bicornis</i> | Hartman, 1951 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>laevigata</i> | (Grube, 1855) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>laevigata</i> | (Grube, 1855) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, I. S. Sebastião | AM | infra | Amaral et al., 1995 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Ubatuba | | entre | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | | entre | Pardo & Amaral, 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Naineris</i> | <i>setosa</i> | (Verrill, 1900) | SP | L | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Orbinia</i> | <i>latreillii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Orbinia</i> | <i>latreillii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Orbinia</i> | <i>latreillii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Orbinia</i> | <i>latreillii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Orbinia</i> | <i>latreillii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Orbinia</i> | <i>latreillii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Orbinia</i> | <i>latreillii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | SP, Cananéia | L, C | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 8 - 40 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | RS | L | 18m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>felix</i> | Kinberg, 1866 | RS | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Phylo</i> | <i>norvegicus</i> | (Sars, 1872) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scolaricia</i> | <i>capensis</i> | Day, 1961 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scolaricia</i> | <i>papillifera</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scolaricia</i> | <i>papillifera</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 30m | Lana, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scolaricia</i> | <i>papillifera</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scolaricia</i> | <i>papillifera</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scolaricia</i> | <i>papillifera</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scolaricia</i> | <i>papillifera</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Shimizu, 1991 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>agrestis</i> | Nonato & Luna, 1970 | BA, Abrolhos | | | Paiva, 2001 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>marginatus</i> | (Ehlers, 1864) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>texana</i> | Maciolek & Holland, 1978 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>treadwelli</i> | Eisig, 1914 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>treadwelli</i> | Eisig, 1914 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>treadwelli</i> | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>treadwelli</i> | Eisig, 1914 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>treadwelli</i> | Eisig, 1914 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos</i> | <i>treadwelli</i> | Eisig, 1914 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>dubia</i> | Tebble, 1955 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>dubia</i> | Tebble, 1955 | SP, Ubatuba | AMG | infra | Lana, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>dubia</i> | Tebble, 1955 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>dubia</i> | Tebble, 1955 | SP, Ubatuba | A | 15 - 45m | Petti, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>dubia</i> | Tebble, 1955 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>dubia</i> | Tebble, 1955 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>dubia</i> | Tebble, 1955 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>gracilis</i> | Pillai, 1961 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>johnstonei</i> | Day, 1934 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>johnstonei</i> | Day, 1934 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>johnstonei</i> | Day, 1934 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | PR, Paranaguá | A, AM, AF, AMF, L, OS | 3 - 16 m; estuário | Lana, 1986b |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | L | 15m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | L | 15m | Morgado, 1988 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>ohluni</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, Santos | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | A, C | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>rubra</i> | (Webster, 1879) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>verax</i> | (Kinberg, 1866) | RJ, Arraial do Cabo | | 3 - 6 m | Almeida & Ruta, 2000 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>verax</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>verax</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | <i>verax</i> | (Kinberg, 1866) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | verax | (Kinberg, 1866) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | verax | (Kinberg, 1866) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Leodamas)</i> | verax | (Kinberg, 1866) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | agrestis | Nonato & Luna, 1970 | AL | L, OS | 0 - 20; 51 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | agrestis | Nonato & Luna, 1970 | AL | | infra | Nonato & Luna, 1970a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | agrestis | Nonato & Luna, 1970 | SE | | infra | Nonato & Luna, 1970a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | agrestis | Nonato & Luna, 1970 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | capensis | (Day, 1961) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | madagascarensis | Fauvel, 1919 | SP, Cananéia | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | madagascarensis | Fauvel, 1919 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45 m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | madagascarensis | Fauvel, 1919 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | madagascarensis | Fauvel, 1919 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | madagascarensis | Fauvel, 1919 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4m | Lana, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | L | 15 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | L | 15 - 50m | Morgado, 1988 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | AL | 5 - 6m | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Ubatuba | AL | entre | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Orbiniidae | <i>Scoloplos (Scoloplos)</i> | treadwelli | Eisig, 1914 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 1 | Paraonidae | <i>Acesta</i> | lopezi | (Berkeley & Berkeley, 1956) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aedicira</i> | belgicae | (Fauvel, 1936) | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aedicira</i> | belgicae | (Fauvel, 1936) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aedicira</i> | belgicae | (Fauvel, 1936) | RS | L | 18m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 1 | Paraonidae | <i>Allia</i> | albatrossae | (Pettibone, 1957) | RJ, Arraial do Cabo | | 3 - 6 m | Almeida & Ruta, 2000 |
| 1 | Paraonidae | <i>Allia</i> | albatrossae | (Pettibone, 1957) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | albatrossae | Pettibone, 1957 | PR | | 10m | Prantoni et al., 2009 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | albatrossae | Pettibone, 1957 | PR, B. de Paranaguá | | fauna associada | Sordo & Lana, 2007 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fauveli | Hartman, 1957 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fauveli | Hartman, 1957 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fauveli | Hartman, 1957 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fragilis | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fragilis | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fragilis | Webster, 1879 | SP, I. S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1995 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fragilis | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fragilis | Webster, 1879 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | fragilis | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | neosuecica | Hartman, 1965 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | neosuecica | Hartman, 1965 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | pseudoarticulata | Hobson, 1972 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | A. Aricidea | Lopes, 1993 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | suecica | Eliason, 1920 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | suecica | Eliason, 1920 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 1 | Paraonidae | <i>Aricidea</i> | suecica | Eliason, 1920 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Paraonidae | Aricidea | suecica | Eliason, 1920 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea | suecica | Eliason, 1920 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea | suecica simplex | Day, 1963 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m; A. Acmira | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea | suecica simplex | Day, 1963 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea | suecica simplex | Day, 1963 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acesta) | suecica simplex | Day, 1963 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | catherinae | Laubier, 1967 | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | catherinae | Laubier, 1967 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | finitima | Strelzov, 1973 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | lopezi lopezi | Berkeley & Berkeley, 1956 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | simplex | Day, 1963 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | simplex | Day, 1963 | Brasil, Sudeste | | | Bolívar, 1990 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | simplex | Day, 1963 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | simplex | Day, 1963 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | simplex | Day, 1963 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | simplex | Day, 1963 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | simplex | Day, 1963 | SP, S. Sebastião | | 2 - 29m | Pires-Vanin et al., 2006 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | suecica simplex | Day, 1963 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | taylori | Pettibone, 1965 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | taylori | Pettibone, 1965 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | taylori | Pettibone, 1965 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Acmira) | taylori | Pettibone, 1965 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Allia) | albatrossae | Pettibone, 1957 | RJ, Arraial do Cabo | | infra | Almeida & Ruta, 1998 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Allia) | albatrossae | Pettibone, 1957 | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Allia) | albatrossae | Pettibone, 1957 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Allia) | albatrossae | Pettibone, 1957 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Allia) | albatrossae | Pettibone, 1957 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Allia) | quadrilobata | Webster & Benedict, 1887 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Aricidea) | fragilis | Webster, 1879 | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Aricidea) | fragilis | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Aricidea) | fragilis | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Aricidea) | fragilis | Webster, 1879 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Aricidea) | fragilis | Webster, 1879 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Aricidea) | fragilis | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | Aricidea (Aricidea) | fragilis | Webster, 1879 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | aciculatus | Hartman, 1957 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | americanus | Strelzov, 1973 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | americanus | Strelzov, 1973 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | americanus | Strelzov, 1973 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | americanus | Strelzov, 1973 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | americanus | Strelzov, 1973 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | americanus | Strelzov, 1973 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | americanus | Strelzov, 1973 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 m | Paiva, 1996 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | americanus | Strelzov, 1973 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | branchiatus | Ehlers, 1909 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | branchiatus | Ehlers, 1908 | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | branchiatus | Ehlers, 1908 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | branchiatus | Ehlers, 1908 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 1 | Paraonidae | Cirrophorus | branchiatus | Ehlers, 1908 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Paraonidae | <i>Cirrophorus</i> | <i>branchiatus</i> | Ehlers, 1908 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Paraonidae | <i>Cirrophorus</i> | <i>branchiatus</i> | Ehlers, 1908 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 m | Paiva, 1996 |
| 1 | Paraonidae | <i>Cirrophorus</i> | <i>branchiatus</i> | Ehlers, 1908 | SP, Ubatuba | AMF, L | 3 - 17m | Petti & Nonato, 2000 |
| 1 | Paraonidae | <i>Cirrophorus</i> | <i>branchiatus</i> | Ehlers, 1908 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | <i>Cirrophorus</i> | <i>furcatus</i> | (Hartman, 1957) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 1 | Paraonidae | <i>Cirrophorus</i> | <i>lyriformes</i> | (Annenkova, 1934) | SP, Ubatuba | | infra | Morgado & Amaral, 1989 |
| 1 | Paraonidae | <i>Cirrophorus</i> | <i>lyriformes</i> | (Annenkova, 1934) | SP, S. Sebastião | L | 15 - 35m | Morgado, 1988 |
| 1 | Paraonidae | <i>Cirrophorus</i> | <i>lyriformes</i> | (Annenkova, 1934) | SP, Ubatuba | | infra | Morgado, 1988 |
| 1 | Paraonidae | <i>Levinsenia</i> | <i>gracilis</i> | (Tauber, 1979) | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Paraonidae | <i>Levinsenia</i> | <i>gracilis</i> | (Tauber, 1979) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 1 | Paraonidae | <i>Levinsenia</i> | <i>gracilis</i> | (Tauber, 1979) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 1 | Paraonidae | <i>Levinsenia</i> | <i>gracilis</i> | (Tauber, 1979) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 m | Paiva, 1996 |
| 1 | Paraonidae | <i>Levinsenia</i> | <i>gracilis</i> | (Tauber, 1979) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 1 | Paraonidae | <i>Levinsenia</i> | <i>oligobranchiata</i> | Strelzov, 1973 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Paraonidae | <i>Paradoneis</i> | <i>abbranchiata</i> | Hartmann, 1965 | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 1 | Paraonidae | <i>Paradoneis</i> | <i>armata</i> | Glémarec, 1966 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 1 | Paraonidae | <i>Paradonereis</i> | <i>lyra</i> | (Southern, 1914) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 1 | Paraonidae | <i>Paradonereis</i> | <i>lyra</i> | (Southern, 1914) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 1 | Paraonidae | <i>Paradonereis</i> | <i>lyra</i> | (Southern, 1914) | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 1 | Paraonidae | <i>Paradonereis</i> | <i>lyra</i> | (Southern, 1914) | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 1 | Paraonidae | <i>Paraonis</i> | <i>gracilis oculata</i> | Hartman, 1957 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 1 | Paraonidae | <i>Paraonis</i> | <i>pygoenigmatica</i> | Jones, 1968 | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 1 | Scalibregmatidae | <i>Asclerocheilus</i> | <i>tropicus</i> | Blake, 1981 | SP | | infra; fauna associada | Nogueira & Steiner, 2001 |
| 1 | Scalibregmatidae | <i>Scalibregma</i> | <i>inflatum</i> | Rathke, 1843 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 1 | Scalibregmatidae | <i>Scalibregma</i> | <i>inflatum</i> | Rathke, 1843 | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 1 | Scalibregmatidae | <i>Scalibregma</i> | <i>inflatum</i> | Rathke, 1843 | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 1 | Scalibregmatidae | <i>Asclerocheilus</i> | <i>tropicus</i> | Blake, 1981 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2002 |
| 1 | Scalibregmatidae | <i>Asclerocheilus</i> | <i>tropicus</i> | Blake, 1981 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira, 2002 |
| 1 | Scalibregmatidae | <i>Asclerocheilus</i> | <i>tropicus</i> | Blake, 1981 | SP | | fauna associada | Nogueira, 2006a |
| 2 | Acoetidae | <i>Euarche</i> | <i>tubifex</i> | Ehlers, 1887 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 2 | Acoetidae | <i>Eupanthalis</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1876 | BA | A, AL, OS | 26 - 150m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Eupanthalis</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1876 | RS | A, AL, OS | 26 - 150m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Eupanthalis</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1876 | RJ | A, AL, OS | 26 - 150m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Eupanthalis</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1876 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Acoetidae | <i>Eupanthalis</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1876 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Acoetidae | <i>Eupanthalis</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1876 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Acoetidae | <i>Eupanthalis</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1876 | RS | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Acoetidae | <i>Eupanthalis</i> | <i>rudipalpa</i> | Amaral & Nonato, 1984 | RS | AM | 195m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>bicolor</i> | Grube, 1877 | SP | L | 100 - 200m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>bicolor</i> | Grube, 1877 | RS | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>bicolor</i> | Grube, 1877 | SP | L | 10m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>gracilis</i> | Kinberg, 1858 | RJ | | 35 e 50m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>oculea</i> | Treadwell, 1901 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>oerstedi</i> | Kinberg, 1855 | RS | L | 107m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>oerstedi</i> | Kinberg, 1855 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>oerstedi</i> | Kinberg, 1855 | PR | L | 71 - 84m | Lana, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>oerstedi</i> | Kinberg, 1855 | SC | L | 71 - 84m | Lana, 1984 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>oerstedi</i> | Kinberg, 1855 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Acoetidae | <i>Panthalis</i> | <i>oerstedi</i> | Kinberg, 1855 | RS | L | 107m | Temperini, 1981 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | oculea | (Treadwell, 1901) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | oculea | (Treadwell, 1901) | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | oculea | (Treadwell, 1901) | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | oculea | (Treadwell, 1901) | AL | | 0 - 20m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | oculea | (Treadwell, 1901) | SE | A, L, OS | 9m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | panamensis | (Chamberlin, 1919) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | pustulata | (Treadwell, 1924) | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | pustulata | (Treadwell, 1924) | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | pustulata | (Treadwell, 1924) | AL | | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | pustulata | (Treadwell, 1924) | AL | OS | 25m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Acoetidae | Polyodontes | pustulata | (Treadwell, 1924) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | aculeata | Linnaeus, 1761 | SP, Juréia | AL | 5 - 200m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | aculeata | Linnaeus, 1761 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | aculeata | Linnaeus, 1761 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | aculeata | Linnaeus, 1761 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | aculeata | Linnaeus, 1761 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | aculeata | Linnaeus, 1761 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | aculeata | Linnaeus, 1761 | SP | A, L | 47m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | alta | Kinberg, 1910 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | PR | A, L | 5 - 200m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | RJ | A, L | 5 - 200m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | RS | A, L | 5 - 200m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | SC | A, L | 5 - 200m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | SP | A, L | 5 - 200m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | PR | L | 71m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | PR | | infra | Lana, 1984 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | PR | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | RS | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | SC | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | RS | A, L | 47 - 140m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | longicornis | Kinberg, 1855 | RS | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrodisia | magna | Treadwell, 1925 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | RJ | A, C | 1000m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | PR | A, C | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | RS | A, C | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | SC | A, C | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | SP | A, C | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | RJ | A, L, C | 1000m | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | RS | A, L, C | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | SP | A, L, C, OS | 66 - 103m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Aphroditidae | Aphroditella | alta | (Kinberg, 1855) | RS | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrogenia | alba | Kinberg, 1855 | RJ | | 180m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrogenia | alba | Kinberg, 1855 | PR | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrogenia | alba | Kinberg, 1855 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | Aphrogenia | alba | Kinberg, 1855 | RS | | infra | Nonato, 1981 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2 | Aphroditidae | <i>Aphrogenia</i> | <i>alba</i> | Kinberg, 1855 | SC | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Aphrogenia</i> | <i>alba</i> | Kinberg, 1855 | SP | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Laetmonice</i> | <i>parva</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Laetmonice</i> | <i>parva</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RS | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Laetmonice</i> | <i>parva</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Laetmonice</i> | <i>parva</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Laetmonice</i> | <i>parva</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RS | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Lamelleulepethus</i> | <i>orensanzi</i> | Pettibone, 1986 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | BA | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | ES | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | AL | A, L, OS | 51 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | AL | L, OS | 27 - 90m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Aphroditidae | <i>Pontogenia</i> | <i>chrysocoma</i> | (Baird, 1865) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Grubeulepis</i> | <i>bracteata</i> | Nonato, 1981(*) | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Grubeulepis</i> | <i>bracteata</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Grubeulepis</i> | <i>frimbriata</i> | (Treadwell, 1901) | BA | L, AL | 0 - 50m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Grubeulepis</i> | <i>fimbriata</i> | (Treadwell, 1901) | CE, Fortaleza | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Grubeulepis</i> | <i>frimbriata</i> | (Treadwell, 1901) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Grubeulepis</i> | <i>tebblei</i> | Pettibone, 1960 | RJ | L | 25m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Grubeulepis</i> | <i>tebblei</i> | Pettibone, 1960 | ES | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Pareulepis</i> | <i>fimbriata</i> | (Treadwell, 1901) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Pareulepis</i> | <i>fimbriata</i> | (Treadwell, 1901) | AL | A, L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Eulepethidae | <i>Pareulepis</i> | <i>fimbriata</i> | (Treadwell, 1901) | AL | A, L | 19 - 21m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Eulepethidae | <i>Pareulepis</i> | <i>multibranchiata</i> | Amaral & Nonato, 1984 | RJ | A, L | 80m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Eulepethidae | <i>Pareulepis</i> | <i>multibranchiata</i> | Amaral & Nonato, 1984 | RS | A, L | 80m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | ES | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | PR | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | SC | AL | 20 - 57m | Lana, 1984 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | PR | AL | 57m | Lana, 1984 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | L | 15 - 55m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | L | 15 - 55m | Morgado, 1988 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | SP | L, C | 26, 54m | Temperini, 1981 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta</i> | (Fabricius, 1780) | RJ | A | 32m | Temperini, 1981 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta hirsuta</i> | Rullier & Amoureaux, 1979 | BA | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>minuta hirsuta</i> | Rullier & Amoureaux, 1979 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>synophtalmica</i> | Claparède, 1868 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>synophtalmica</i> | Claparède, 1868 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 35m | Morgado, 1988 |
| 2 | Pholoidae | <i>Pholoe</i> | <i>synophtalmica</i> | Claparède, 1868 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 2 | Pisionidae | <i>Ephesiopsis</i> | <i>guayanae</i> | Hartman & Fauchald, 1971 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2 | Pisionidae | <i>Pisione</i> | <i>parhelenae</i> | de Wilde & Govaere, 1995 | SP | | | Rizzo & Amaral, 2006 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | PR | | | Rizzo & Amaral, 2006 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | SP | | | Rizzo & Amaral, 2006 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | SP, Cananéia | | entre | Amaral & Nonato, 1994 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral & Nonato, 1994 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | SP, Ubatuba | | entre | Amaral & Nonato, 1994 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | PR | AM, AF, AMF | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário | Souza & Gianuca, 1995 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | PR | AF, AMF | entre | Souza, 1991 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | SP, S. Sebastião | | entre | Westheide, 1974 |
| 2 | Pisionidae | <i>Pisionidens</i> | <i>indica</i> | (Aiyar & Alikunhi, 1940) | SP, Ubatuba | | entre | Westheide, 1974 |
| 2 | Polynoidae | <i>Antinoe</i> | <i>microps</i> | Kinberg, 1855 | RJ | | local. tipo | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Chaetacanthus</i> | <i>magnificus</i> | (Grube, 1875) | SP, Ubatuba | A, SP | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Chaetacanthus</i> | <i>magnificus</i> | (Grube, 1875) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Polynoidae | <i>Chaetacanthus</i> | <i>magnificus</i> | (Grube, 1875) | SP | | endofauna | Nogueira, 1995 |
| 2 | Polynoidae | <i>Chaetacanthus</i> | <i>magnificus</i> | (Grube, 1875) | SP, Ubatuba | SP | entre | Nonato, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>nodosa</i> | (Sars, 1861) | SP, Ubatuba | L | 25m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>nodosa</i> | (Sars, 1861) | SP, Ubatuba | L | 25m | Morgado, 1988 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>nodosa</i> | (Sars, 1861) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1980a |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR | | infra | Lana, 1984; 1987 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>papillosa</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1980a |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR | L, AL, OS | 6 - 12m | Lana, 1984 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 6m; estuário | Lana, 1986b |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 2 | Polynoidae | <i>Eunoë</i> | <i>serrata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 2 | Polynoidae | <i>Euphionella</i> | <i>besnardi</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RS | AL, OS | 200m | Amaral & Nonato, 1982 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 | Polynoidae | <i>Euphionella</i> | <i>besnardi</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RS | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Gattyana</i> | <i>cirrosa rustica</i> | Nonato, 1981 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 2 | Polynoidae | <i>Gattyana</i> | <i>cirrosa rustica</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, S. Sebastião | OS | infra; endofauna | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, Ubatuba | OS | infra; endofauna | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981c |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981c |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnida</i> | <i>glabra</i> | Hartman, 1939 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>australis</i> | (Kinberg, 1855) | RS | | infra | Orensan & Gianuca, 1974 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | RJ, B. de Sepetiba | | infra; costão | Omena et al., 2006a |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | SP, Santos | A, L | 0 - 16m | Tommasi, 1967 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | SP, Santos | | entre | Tommasi, 1967 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | SC | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | SP, Santos | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | SP, Ubatuba | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | PR | | entre | Lana, 1984 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | PR | OS | infra | Lana, 1984 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | PR, Paranaguá | L, OS | 3 - 18 m; estuário | Lana, 1986b |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | SC | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Halosydnella</i> | <i>brasiliensis</i> | (Kinberg, 1858) | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | PB | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | RN | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | SP, Ubatuba | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | RN | OS | 69 m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | PB | OS | 54 m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | Costa Sul | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | RJ, B. de Sepetiba | | infra; costão | Omena et al., 2006a |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>aculeata</i> | Andrews, 1891 | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>ernesti</i> | Augener, 1931 | BA, Abrolhos | | | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | BA | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Ubatuba | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | PR | L | 54m | Lana, 1984 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Ubatuba | L | 25m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Ubatuba | L | 25m | Morgado, 1988 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP | C, OS | 48 - 132m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP | L | 54m | Temperini, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunulata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>lunutata</i> | (delle Chiaje, 1841) | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, Ubatuba | | endofauna | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, S. Sebastião | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981c |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>macginitiei</i> | Pettibone, 1955 | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Harmothoe</i> | <i>reticulata</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lagisca</i> | <i>floecosa unidentata</i> | Augener, 1906 | RJ, Macaé | | 701 - 1000m; fauna associada | Brasil et al., 2007 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lagisca</i> | <i>floecosa unidentata</i> | Augener, 1906 | RJ, B. de Campos | | infra; fauna associada | Santos et al., 2007b |
| 2 | Polynoidae | <i>Lagisca</i> | <i>lepidia</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RS | AL | 200m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lagisca</i> | <i>lépida</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RS | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>esbelta</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RS | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>esbelta</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>esbelta</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RS | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>virens</i> | (Blanchard, 1849) | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>virens</i> | (Blanchard, 1849) | SE | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>virens</i> | (Blanchard, 1849) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>virens</i> | (Blanchard, 1849) | AL | OS | 51 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>virens</i> | (Blanchard, 1849) | AL | OS | 27 - 30 m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>virens</i> | (Blanchard, 1849) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidasthenia</i> | <i>virens</i> | (Blanchard, 1849) | PB | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>brasiliensis</i> | (Quatrefages, 1865) | BA | | | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981c |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981c |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | AL | A, OS | 10 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | AL | A, OS | 19 - 35m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | AL | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>caeruleus</i> | Kinberg, 1855 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>panamensis</i> | (Hartman, 1939) | BA | | | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>panamensis</i> | (Hartman, 1939) | ES | | | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>panamensis</i> | (Hartman, 1939) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>tenuisetosus</i> | (Gravier, 1901) | ES | | infra | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Lepidonotus</i> | <i>tenuisetosus</i> | (Gravier, 1901) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Malmgrenia</i> | <i>castanea</i> | McIntosh, 1900 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 2 | Polynoidae | <i>Malmgrenia</i> | <i>marquesensis</i> | (Monro, 1928) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 2 | Polynoidae | <i>Malmgreniella</i> | <i>variegata</i> | (Treadwell, 1917) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Robertianella</i> | <i>synophtalma</i> | McIntosh, 1885 | AL | | 2900m | Amaral & Nonato, 1982 |
| 2 | Polynoidae | <i>Scalasetosus</i> | <i>gracilis</i> | Morgado & Amaral, 1981 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Scalasetosus</i> | <i>gracilis</i> | Morgado & Amaral, 1981 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 2 | Polynoidae | <i>Scalasetosus</i> | <i>gracilis</i> | Morgado & Amaral, 1981 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981c |
| 2 | Polynoidae | <i>Scalasetosus</i> | <i>gracilis</i> | Morgado & Amaral, 1981 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981c |
| 2 | Polynoidae | <i>Scalasetosus</i> | <i>pellucidus</i> | (Ehlers, 1864) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Scalasetosus</i> | <i>pellucidus</i> | (Ehlers, 1864) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Scalasetosus</i> | <i>pellucidus</i> | (Ehlers, 1864) | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Scalasetosus</i> | <i>pellucidus</i> | (Ehlers, 1864) | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 2 | Polynoidae | <i>Subadyte</i> | <i>pellucida</i> | (Ehlers, 1864) | PR | OS | infra | Lana, 1984 |
| 2 | Polynoidae | <i>Subadyte</i> | <i>pellucida</i> | (Ehlers, 1864) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | PR | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | RS | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | PR | L | 90 - 136m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | SP | L | 90m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | PR | L | 90 - 135m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | RS | L | 107m | Temperini, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Ehlersileanira</i> | <i>incisa</i> | (Grube, 1878) | SP | L | 90m | Temperini, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Fimbriosthenelais</i> | <i>marijuanae</i> | Lana, 1991 | PR | AF, AMF, OS | 45 - 50m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Fimbriosthenelais</i> | <i>marijuanae</i> | Lana, 1991 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Fimbriosthenelais</i> | <i>marijuanae</i> | Lana, 1991 | PR | A, AF, AMF, OS | 18 - 45m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Fimbriosthenelais</i> | <i>marijuanae</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Neopsammolycé</i> | <i>catenulata</i> | (Amaral & Nonato, 1984) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolycé</i> | <i>arenosa</i> | (delle Chiaje, 1841) | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolycé</i> | <i>arenosa</i> | (delle Chiaje, 1841) | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolycé</i> | <i>arenosa</i> | (delle Chiaje, 1841) | AL | A, L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolycé</i> | <i>arenosa</i> | (delle Chiaje, 1841) | AL | OS | 50m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolycé</i> | <i>arenosa</i> | (delle Chiaje, 1841) | PA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolycé</i> | <i>catenulata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RJ | A, OS | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolycé</i> | <i>catenulata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolycé</i> | <i>catenulata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR | | infra | Lana, 1987 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>catenulata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | PR | L | 71m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>catenulata</i> | Amaral & Nonato, 1982 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>ctenidophora</i> | Day, 1973 | PR | L, AL, OS | 71, 147m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>fimbriata</i> | Hartman, 1939 | CE | AMG, OS | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>fimbriata</i> | Hartman, 1939 | RJ | AMG, OS | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>fimbriata</i> | Hartman, 1939 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>fimbriata</i> | Hartman, 1939 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>flava</i> | Kinberg, 1855 | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>flava</i> | Kinberg, 1855 | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>flava</i> | Kinberg, 1855 | | Brasil, Sudeste | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>flava</i> | Kinberg, 1855 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>flava</i> | Kinberg, 1855 | PR | L, OS | 145m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>flava</i> | Kinberg, 1855 | AL | L, OS | 51 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>flava</i> | Kinberg, 1855 | SE | L, OS | 540m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>kinbergi</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>kinbergi</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>kinbergi</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>kinbergi</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>kinbergi</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Psammolyce</i> | <i>spinosa</i> | Hartman, 1939 | CE | OS | 72m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>arenicola</i> | Verril, 1880 | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>arenicola</i> | Verril, 1880 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>arenicola</i> | Verril, 1880 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>arenicola</i> | Verril, 1880 | PR | AF, AMF, L | 24 - 34m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>arenicola</i> | Verril, 1880 | AL | A | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>arenicola</i> | Verril, 1880 | AL | OS | 25m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>buskii</i> | McIntosh, 1876 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AF, AMF, AM | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AF, AMF | 20 - 30m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SC | AF, AMF | 20 - 30m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AF, AMF | entre | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado, 1988 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | RS | A | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário | Souza & Gianuca, 1995 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AF, AMF | 0 - 2m | Souza, 1991 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>cirriferum</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AF, AMF | entre | Souza, 1991 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | RJ | AMG, OS | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 7m | Lana, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | RJ | | infra | Lana, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | PR | | infra | Lana, 1984; 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | PR | AF, AMF, L, OS | 21 - 30; 91m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sigalion</i> | <i>taquari</i> | Amaral & Nonato, 1984 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | ES | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | SP | C, OS | 87m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | PR | L, C | 66 - 88m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>articulata</i> | Kinberg, 1855 | SP | C | 70m | Temperini, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, Ubatuba | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, Ubatuba | | 30m | Lana, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>boa</i> | (Johnston, 1839) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>caerulea</i> | (Schmarda, 1861) | SP, I. S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>coerulea</i> | (Schmarda) | SP, S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | SP, Ubatuba | A | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | PR | AM, AF, AMF | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | RS, Rio Grande | | 2 - 13 m | Camargo & Borzone, 1998 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | PR | AL | 2 - 50m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | PR, Paranaguá | A, L, OS | 6m; estuário | Lana, 1986b |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | PR | A, AF, AMF, L, OS | 2 - 66 m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | PR | AF, AMF | 0 - 2m | Souza, 1991 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limicola</i> | (Ehlers, 1864) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>limnicola</i> | (Ehlers, 1864) | PR, B. de Paranaguá | | | Brasil et al., 2006 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>mulleri</i> | Grube, 1875 | SC | | | Weiss & Pagliosa, 2006 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>mulleri</i> | Grube, 1875 | SC | | | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>neoleanrae</i> | Hartman, 1939 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>zeylanica</i> | Willey, 1905 | BA | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>zeylanica</i> | Willey, 1905 | PE | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>zeylanica</i> | Willey, 1905 | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>zeylanica</i> | Willey, 1905 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>zeylanica</i> | Willey, 1905 | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelais</i> | <i>zeylanica</i> | Willey, 1905 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>atypica</i> | Berkeley & Berkerley, 1941 | ES | A | 0,65m | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>atypica</i> | Berkeley & Berkerley, 1941 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>atypica</i> | Berkeley & Berkerley, 1941 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>atypica</i> | Berkeley & Berkerley, 1941 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>atypica</i> | Berkeley & Berkerley, 1941 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>atypica</i> | Berkeley & Berkerley, 1941 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>peterseni</i> | Lana, 1991 | PR | L | 147m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>peterseni</i> | Lana, 1991 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenelanella</i> | <i>peterseni</i> | Lana, 1991 | PR | A, L, OS | 145m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | AL | L | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | AL | L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | AL | L | 19, 42m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>grubei</i> | (Treadwell, 1901) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>japonica</i> | (McIntosh, 1885) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>japonica</i> | (McIntosh, 1885) | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | AL | L | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | RJ | L | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SP, Ubatuba | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | PR | AL | 63 - 174m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SC | AL | 63 - 174m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | PR | L | 97 - 174 m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SP, Ubatuba | L | 10 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SP, Ubatuba | L | 10 - 35m | Morgado, 1988 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | AL | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | AL | L | 50m | Nonato & Luna, 1970b |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | BA | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SE | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | RS | L | 107m | Temperini, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Sthenolepis</i> | <i>oculata</i> | (Hartman, 1942) | SC | | 174m | Temperini, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>edwardsii</i> | (Kinberg, 1855) | RJ | AL, OS | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>edwardsii</i> | (Kinberg, 1855) | PR | AL, OS | 12m | Lana, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>edwardsii</i> | (Kinberg, 1855) | PR, Paranaguá | A, L, OS | 12m; estuário | Lana, 1986b |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>edwardsii</i> | (Kinberg, 1855) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>edwardsii</i> | (Kinberg, 1855) | PR | AF, AMF | 27m | Lana, 1991a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>edwardsii</i> | (Kinberg, 1855) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>lewisii</i> | (Berkeley & Berkeley, 1939) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>lewisii</i> | (Berkeley & Berkeley, 1939) | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1984 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>lewisii</i> | (Berkeley & Berkeley, 1939) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>lewisii</i> | (Berkeley & Berkeley, 1939) | SP, S. Vicente | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>lewisii</i> | (Berkeley & Berkeley, 1939) | SP, Santos | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>lewisii</i> | (Berkeley & Berkeley, 1939) | AL | A | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 2 | Sigalionidae | <i>Thalenessa</i> | <i>lewisii</i> | (Berkeley & Berkeley, 1939) | AL | A | 23m | Nonato & Luna, 1970b |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>brunnea</i> | Morgado & Amaral, 1981 | SP, S. Sebastião | OS | endofauna | Amaral & Nonato, 1994 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>brunnea</i> | Morgado & Amaral, 1981 | SP, Ubatuba | OS | endofauna | Amaral & Nonato, 1994 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>brunnea</i> | Morgado & Amaral, 1981 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981b |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>brunnea</i> | Morgado & Amaral, 1981 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981b |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>brunnea</i> | Morgado & Amaral, 1981 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>brunnea</i> | Morgado & Amaral, 1981 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; endofauna | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>goodei</i> | Webster, 1884 | RJ | OS | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>goodei</i> | Webster, 1884 | SP, Litoral norte | OS | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>obscura</i> | (Grube, 1868) | SC | | in | Amaral & Nonato, 1994 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Bhawania</i> | <i>obscura</i> | (Grube, 1868) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, Ubatuba | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981b |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Chrysopetalum</i> | <i>occidentale</i> | Johnson, 1897 | SP, Ubatuba | | endofauna | Souza, 1989 |
| 3 | Chrysopetalidae | <i>Paleanotus</i> | <i>chrysolepis</i> | Schmarda, 1861 | ES | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>arenicolus</i> | (LaGreca, 1946) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>arenicolus</i> | (LaGreca, 1946) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>brevipalpa</i> | Hartmann-Schröder, 1959 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>callithrix</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>callithrix</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>callithrix</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>callithrix</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>capensis</i> | (Day, 1963) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>capensis</i> | (Day, 1963) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 3 | Hesionidae | <i>Gyptis</i> | <i>capensis</i> | (Day, 1963) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>margaritae</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>margaritae</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>margaritae</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>margaritae</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>margaritae</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>picta</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>picta</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1984 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>picta</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado, 1980 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>picta</i> | Müller, 1858 | AL | A, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>picta</i> | Müller, 1858 | SE | A, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>proctochona</i> | Schmarda, 1861 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | CE, Paracuru | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | CE, Camocim | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | CE, Fortaleza | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | CE, Taíba | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | RN, Natal | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | PB, João Pessoa | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | PB, Cabedelo | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | PE, S. J. Coroa Grande | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | AL, Maceió | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesione</i> | <i>splendida</i> | Lamarck, 1818 | SE | | | Costa et al., 2008 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesionides</i> | <i>gohari</i> | Hartmann-Schöder, 1960 | PR | | entre | Di Domenico et al., 2006 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesionides</i> | <i>gohari</i> | Hartmann-Schöder, 1960 | SC | | entre | Di Domenico et al., 2006 |
| 3 | Hesionidae | <i>Hesionides</i> | <i>gohari</i> | Hartmann-Schröder, 1960 | SP | | entre | Westtheide, 1974 |
| 3 | Hesionidae | <i>Leocrates</i> | <i>claparedii</i> | (Costa in Claparède, 1868) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1984 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1984 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Ubatuba | L | 15m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Ubatuba | L | 15m | Morgado, 1988 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Ubatuba | | entre | Nonato, 1981 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 3 | Hesionidae | <i>Ophiodromus</i> | <i>pugettensis</i> | (Johnson, 1901) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>agilis</i> | Ehlers, 1864 | RJ | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>agilis</i> | Ehlers, 1864 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>obscura</i> | Verril, 1873 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>obscura</i> | Verril, 1873 | PR | C | infra | Lana, 1984 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>obscura</i> | Verril, 1873 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>obscura</i> | Verril, 1873 | RJ, B. de Sepetiba | | infra; costão | Omena et al., 2006a |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>obscura</i> | Verrill, 1873 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>obscura</i> | Verril, 1873 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>obscura</i> | Verril, 1873 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>obscura</i> | Verril, 1873 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>pallida</i> | (Claparède, 1864) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>pallida</i> | (Claparède, 1864) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 3 | Hesionidae | <i>Podarke</i> | <i>pallida</i> | (Claparède, 1864) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | PR | | | Santos, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | SC | | | Santos, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | SP | | | Santos, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>loveni</i> | Malmgren, 1867 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | PE | | | Hartman, 1965 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | PR | AL | 0 - 4m | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SE | | C. crosslandi | Santos et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SE | | estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | BA | | estuário; recifes | Santos, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | SE | | estuário; recifes | Santos, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>oculata</i> | Banse, 1977 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratocephale</i> | <i>rocaensis</i> | Santos & Lana, 2001 | RN, Atol das Rocas | OS | entre | Santos, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>costae</i> | (Grube, 1840) | SE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>costae</i> | (Grube, 1840) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>excisa</i> | (Grube, 1874) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>excisa</i> | (Grube, 1874) | SC | | | Perkins, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>excisa</i> | (Grube, 1874) | BA | | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>excisa</i> | (Grube, 1874) | SE | | entre; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>excisa</i> | (Grube, 1874) | PB, João Pessoa | | entre; estuário; praia | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>hircincola</i> | (Eisig, 1870) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>hircincola</i> | (Eisig, 1870) | PB, João Pessoa | | recifes de coral | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>keiskama</i> | Day, 1953 | SP | L | 18m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>longicirrata</i> | Perkins, 1980 | RN, Atol das Rocas | | fauna associada | Santos, 2007 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>mirabilis</i> | Kinberg, 1866 | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>mirabilis</i> | Kinberg, 1866 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>mirabilis</i> | Kinberg, 1866 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>mirabilis</i> | Kinberg, 1866 | PE, F. de Noronha | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>mirabilis</i> | Kinberg, 1866 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>mirabilis</i> | Kinberg, 1866 | RN, Atol das Rocas | OS | | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>singularis</i> | Treadwell, 1929 | AL, Maceió | | 14m | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>singularis</i> | Treadwell, 1929 | MA, São Luis | | 14m | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>singularis</i> | Treadwell, 1929 | PB, João Pessoa | | 14m | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>singularis</i> | Treadwell, 1929 | AL, Maceió | | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>singularis</i> | Treadwell, 1929 | MA, São Luis | | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>singularis</i> | Treadwell, 1929 | PB, João Pessoa | | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Ceratonereis</i> | <i>vitatta</i> | Langerhans, 1884 | PB | | 26m | Santos, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Eunereis</i> | <i>patagonica</i> | (McIntosh, 1885) | RS | | | Orensan & Gianuca, 1974 |
| 3 | Nereididae | <i>Gymnonereis</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | CE, Fortaleza | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 3 | Nereididae | <i>Gymnonereis</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Gymnonereis</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | SC | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Gymnonereis</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Gymnonereis</i> | <i>crosslandi</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | Brasil, Nordeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, Caraguatatuba | | entre | Amaral et al., 1998a |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1998a |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | RS, L. dos Patos | | infra; estuário | Bemvenuti, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | RS | | infra; estuário | Capitoli et al., 1978 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, Bertioga | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, I. Sto. Amaro | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, Santos | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, V. Carvalho | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PI | | entre; estuário | Couto & Fernandes, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SE | | entre; estuário | Couto & Fernandes, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PE | AM | entre | Florêncio, 1999 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PE | AM | entre | Florêncio, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PR, B. de Paranaguá | | entre | Hadlich et al., 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário, Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PR, Paranaguá | AF, AMF, AL | 0 - 2,8m; estuário | Lana et al., 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PR | AF, AMF, AL | 0 - 1m | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PR | AF, AMF, AL | entre | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PE, Recife | L | estuário | Lima et al., 2006b |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | Brasil | | | MacCord et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | PR, Paranaguá | A, L | entre | Netto & Lana, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>acuta</i> | (Treadwell, 1923) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Omena et al., 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | BA, Ilhéus | AM, L | entre; estuário | Passos et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | BA | | entre | Peso-Aguiar et al., 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis & Amaral, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, I. S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | BA, Ilhéus | AM | entre; estuário | Rizzo et al., 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | Brasil, Nordeste | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | Brasil, Sudeste | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | Brasil, Sul | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | BA | | estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SE | | estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | PR, Paraguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, Caraguatatuba | | entre | Steiner, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | acuta | (Treadwell, 1923) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | | Abreu, 1978 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | AM | entre | Amaral et al., 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | RS, L. dos Patos | AF, AMF | entre | Bemvenuti, 1983 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | RS | AF, AMF | Estu.* | Bemvenuti, 1983 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | RJ | AM | infra | Carvalheira, 1993 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | AL | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | BA | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | CE | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | ES | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | MA | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | PA | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | PB | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | PE | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | PI | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | PR | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | RJ | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | RN | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | RS | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | SC | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | culveri | (Webster, 1879) | SE | | | Oliveira & Lana, 2009 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>culveri</i> | (Webster, 1879) | SP | | | Oliveira & Lana, 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>culveri</i> | (Webster, 1879) | Brasil | | | Oliveira et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>culveri</i> | (Webster, 1879) | PR, B. de Paranaguá | | entre | Oliveira et al., 2010 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>culveri</i> | (Webster, 1879) | SP | | entre | Omêna & Amaral, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>culveri</i> | (Webster, 1879) | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>culveri</i> | (Webster, 1879) | SE | | | Santos & Amaral, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>culveri</i> | (Webster, 1879) | SP, Cananéia | AM, AF, AMF | entre | Varoli, 1988 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>glaуca</i> | (Claparède, 1870) | SP | A, L, OS | 27 - 740m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Laeonereis</i> | <i>glaуca</i> | (Claparède, 1870) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Leptonereis</i> | <i>maculata</i> | Treadwell, 1928 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |
| 3 | Nereididae | <i>Lycastis</i> | <i>siolii</i> | (Corrêa, 1948) | Brasil | | | Corrêa, 1948 |
| 3 | Nereididae | <i>Lycastopsis</i> | <i>pontica</i> | (Bobretzky, 1872) | PR | OS | entre | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Lycastopsis</i> | <i>pontica</i> | (Bobretzky, 1872) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Micronereides</i> | <i>capensis</i> | Day, 1963 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 3 | Nereididae | <i>Micronereides</i> | <i>capensis</i> | Day, 1963 | PR | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 3 | Nereididae | <i>Micronereides</i> | <i>capensis</i> | Day, 1963 | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Micronereides</i> | <i>capensis</i> | Day, 1963 | RS | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Micronereides</i> | <i>capensis</i> | Day, 1963 | SC | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Micronereides</i> | <i>capensis</i> | Day, 1963 | Brasil | L | 100 - 500m | Santos, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>abiuma</i> | (Müller in Grube, 1871) | NO, litoral amazônico | | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>abiuma</i> | (Müller in Grube, 1871) | ES | | | Conti et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>abiuma</i> | (Müller in Grube, 1871) | PA | | entre | Ferreira, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>abiuma</i> | (Müller in Grube, 1871) | PA, Belém | | infra; estuário | Hostin et al., 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>abiuma</i> | (Müller in Grube, 1871) | PR | OS | entre | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>abiuma</i> | (Müller in Grube, 1871) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>abiuma</i> | (Müller in Grube, 1871) | RJ | | | Rebelo, 1988 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>abiuma</i> | (Müller in Grube, 1871) | SE | | | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>brevicornis</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SC | | | Glasby, 1999 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>brevicornis</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SC | | | Weiss & Pagliosa, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>longicirris</i> | (Takahashi, 1933) | AM | | | Wu et al. , 1985 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>senegalensis</i> | (Saint Joseph, 1900) | PA, Ilha de Marajó | | | Glasby, 1999 |
| 3 | Nereididae | <i>Namalycastis</i> | <i>siolii</i> | (Corrêa, 1948) | PA, Ilha de Marajó | | | Glasby, 1999 |
| 3 | Nereididae | <i>Namanereis</i> | <i>littoralis</i> | (Müller in Grube, 1871) | SC | | | Glasby, 1999 |
| 3 | Nereididae | <i>Namanereis</i> | <i>littoralis</i> | (Müller in Grube, 1871) | SC | | | Weiss & Pagliosa, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>arenaceodonta</i> | Moore, 1903 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>arenaceodonta</i> | Moore, 1903 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SC | | infra | Almeida et al., 2009 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | 68m | Corbisier, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | L | 20 - 40m | Lana & Sovierzoski, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | PR | A, AF, AMF, L | 4 - 12m | Lana & Sovierzoski, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SC | L | 50m | Lana & Sovierzoski, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP | A, L | 68m | Lana & Sovierzoski, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | PR | AL | 4 - 68m | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SC | AL | 4 - 68m | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP | AL | 4 - 68m | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | PR, Paranaguá | L, OS | 13m; estuário | Lana, 1986b |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | L | infra | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | L | 15 - 35m | Morgado, 1988 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | RJ, B. de Sepetiba | A | infra | Omena et al., 2006a |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, I. S. Sebastião | AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, S. Sebastião | | 2 - 29m | Pires-Vanin et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, I. S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | RS | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SC | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SE | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>bruaca</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP | | entre | Steiner, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>ceciliae</i> | Steiner & Santos, 2004 | SP | | entre; fauna associada; costão | Avellar et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>caudata</i> | (delle Chiaje, 1828) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>caudata</i> | (delle Chiaje, 1828) | RN, Atol das Rocas | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>indica brunnea</i> | Day, 1957 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP | | entre; fauna associada; costão | Avellar et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RS, L. dos Patos | AF, AMF | entre | Bemvenuti, 1983 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PR, B. de Paranaguá | | | Brasil et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RJ | AM | infra | Carvalheira, 1993 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Bertioga | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, V. Carvalho | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessso, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PA | | entre | Ferreira, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PR | OS | 0 - 10m | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PR | OS | entre; estuário; costão | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PR, Paranaguá | A, C | 10m; estuário | Lana, 1986b |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RS | AL | 18m | Nonato, 1966a |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RS | L | 18m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | ES | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RJ | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | ES | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SE | | | Santos & Amaral, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | BA | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | ES | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PI | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RJ | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RN | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SC | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SE | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | BA | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | CE | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RN | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SE | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | BA | A | infra | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | CE | A | infra | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | RN | A | infra | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SE | A | infra | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PR, B. de Paranaguá | | fauna associada | Sordo & Lana, 2007 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Neanthes</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Cananéia | AM, AF, AMF | entre | Varoli, 1988 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>aculeata</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>aculeata</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>aculeata</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>aculeata</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>aculeata</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>arenaceodentata</i> | (Moore, 1903) | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>brevicirrata</i> | Treadwell, 1929 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>brevicirrata</i> | Treadwell, 1929 | SP, S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>brevicirrata</i> | Treadwell, 1929 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana & Sovierzoski, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | L | 25 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Ubatuba | L | 25 - 35m | Morgado, 1988 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | RJ | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>broa</i> | Lana & Sovierzoski, 1987 | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>coerulea</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>coerulea</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>coerulea</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>coerulea</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>coerulea</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>decora</i> | Treadwell, 1932 | SP, I. S. Sebastião | entre | | Treadwell, 1932 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>disparsetosa</i> | Treadwell, 1932 | SP, I. S. Sebastião | entre | | Treadwell, 1932 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>diversicolor</i> | (OF Muller, 1776) | SP | entre | | Omena & Amaral, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>falcaria</i> | (Willey, 1905) | RN, Atol das Rocas | AF | Poças de Maré | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>falsa</i> | Quatrefages, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>falsa</i> | Quatrefages, 1865 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>falsa</i> | Quatrefages, 1865 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>ferox</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>ferox</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>ferox</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>ferox</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>ferox</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>glasiovi</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>glasiovi</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>glasiovi</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>glasiovi</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>glasiovi</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>kauderni</i> | Fauvel, 1921 | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>lata</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>lata</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>lata</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>lata</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>lata</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>macrocephala</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>macrocephala</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>macrocephala</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>macrocephala</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>macrocephala</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>macrocephala</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>microphthalma</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>microphthalma</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>microphthalma</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>microphthalma</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>microphthalma</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>minor</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>minor</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>minor</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>minor</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>minor</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>nova</i> | Nonato, 1976 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>obscura</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>obscura</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>obscura</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>obscura</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>obscura</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | ES | | | Conti et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário, Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | PR, Paranaguá | A, L | entre; estuário, Spartina | Lana & Guiss, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | PR | OS | infra | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | Brasil | | | MacCord et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | PR, Paranaguá | | estuário; Spartina | Pagliosa & Lana, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | PR, Paranaguá | | estuário; Spartina | Pagliosa & Lana, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | AL | AL | entre; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | BA | AL | entre; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | MA, São Luis | AL | entre; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | RN | AL | entre; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>oligohalina</i> | (Rioja, 1946) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>panamensis</i> | Fauchald, 1977 | RN, Atol das Rocas | | fauna associada | Santos, 2007 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>pseudonereis</i> | Hartman, 1940 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP | | entre; fauna associada; costão | Avellar et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SC | AF, AMF, OS | 33m | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | PR | OS | entre | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Santos | | entre | Nonato, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Ubatuba | | entre | Nonato, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Santos | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | RJ, B. de Sepetiba | | infra; costão | Omena et al., 2006a |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | BA | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | PA | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | PE | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SC | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | AL | A | infra; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | BA | A | infra; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | CE | A | infra; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | MA | A | infra; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | PB | A | infra; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | PE | A | infra; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | PI | A | infra; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | RN | A | infra; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | AL | A | entre; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | BA | A | entre; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | CE | A | entre; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | MA | A | entre; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | PB | A | entre; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | PE | A | entre; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | PI | A | entre; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grübe, 1857 | RN | A | entre; praia; estuário | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>riisei</i> | Grube, 1857 | SP, Ubatuba | | | entre; endofauna Souza, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>scolopendroides</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>scolopendroides</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>scolopendroides</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>scolopendroides</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>scolopendroides</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Ubatuba | OS | 7 - 8m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Ubatuba | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>succinea</i> | (Frey & Leuckart, 1847) | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>trifasciata</i> | Grube, 1878 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 30m | Lana, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>trifasciata</i> | (Grube, 1878) | RN, Atol das Rocas | | entre; fauna associada | Neves & Omena, 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>trifasciata</i> | Grube, 1878 | BA | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>trifasciata</i> | Grube, 1878 | PE | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>trifasciata</i> | Grube, 1878 | PR | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>trifasciata</i> | Grube, 1878 | RN | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>virens</i> | (Sars, 1835) | SP | | | Omena & Amaral, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>zonata</i> | Malmgren, 1867 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>zonata</i> | Malmgren, 1867 | PR | OS | entre; costão | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>zonata</i> | Malmgren, 1867 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>zonata</i> | Malmgren, 1867 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> | <i>zonata</i> | Malmgren, 1867 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> (<i>Leptonereis</i>) | <i>acuta</i> | Treadwell, 1923 | SP, Santos | | entre | Treadwell, 1923 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> (<i>Neanthes</i>) | <i>palpata</i> | Treadwell, 1923 | SP, I. de Alcatrazes | | entre | Treadwell, 1923 |
| 3 | Nereididae | <i>Nereis</i> (<i>Perinereis</i>) | <i>melanocephala</i> | McIntosh, 1885 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Nicomedes</i> | <i>difficilis</i> | Kinberg, 1866 | RJ | | | Pettibone, 1971 |
| 3 | Nereididae | <i>Nicon</i> | <i>moniloceras</i> | (Hartman, 1840) | RS | | 183m | Temperini, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Nicon</i> | <i>pictus</i> | Kinberg, 1866 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Nicon</i> | <i>pictus</i> | Kinberg, 1866 | Brasil | | | Pettibone, 1971 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP | | entre; fauna associada; costão | Avellar et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | PR | OS | entre; costão | Lana, 1984 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | CE | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | MA | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | PA | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | PE | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | PI | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | RN | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | BA | AL | entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | CE | AL | entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | MA | AL | entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | PE | AL | entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | PI | AL | entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | RN | AL | entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>anderssoni</i> | Kinberg, 1866 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | PA | | entre | Ferreira, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | PR | | | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | PR | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | SC | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | SP | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | PA | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | RN, Atol da Rocas | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | SC | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | RN, Atol das Rocas | OS | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | BA | | | Seabra & Guimaraens, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | SP | | entre | Steiner & Amaral, 2001 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>cultrifera</i> | (Grube, 1840) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>elenacasoeae</i> | Rioja, 1947 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>floridana</i> | (Ehlers, 1868) | RN, Atol das Rocas | | fauna associada | Santos, 2007 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>nigropunctata</i> | (Horst, 1889) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | SP | | entre; fauna associada; costão | Avellar et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | PR | OS | entre; costão | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | AL | | | Matos & Sovierzoski, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | Brasil, Nordeste | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | MA | A | entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | AL | A | praia; entre; fauna associada | Santos, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | BA | A | praia; entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | CE | A | praia; entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | PB | A | praia; entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | PE | A | praia; entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | PI | A | praia; entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | RN | A | praia; entre; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>ponteni</i> | Kinberg, 1866 | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>pseudocamiguina</i> | (Augener, 1922) | BA, Abrolhos | | recifes | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>vancaurica</i> | (Ehlers, 1868) | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>vancaurica</i> | (Ehlers, 1868) | PR | OS | entre | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>vancaurica</i> | (Ehlers, 1868) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>vancaurica</i> | (Ehlers, 1868) | CE | | | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>vancaurica</i> | (Ehlers, 1868) | MA | | | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Perinereis</i> | <i>vancaurica</i> | (Ehlers, 1868) | SE | | | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Phyllonereis</i> | <i>benedenii</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Phyllonereis</i> | <i>benedenii</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Phyllonereis</i> | <i>benedenii</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Phyllonereis</i> | <i>benedenii</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Phyllonereis</i> | <i>benedenii</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP | | entre; fauna associada; costão | Avellar et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | CE | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | PA | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | PR | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | RN | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PR | OS | costão | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | CE | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PB | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PI | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | RN | A | entre | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | CE | A | infra | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PB | A | infra | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PI | A | infra | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | RN | A | infra | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>dumerilii</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>magalhaensis</i> | Kinberg, 1866 | PE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>magalhaensis</i> | Kinberg, 1866 | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Platynereis</i> | <i>magalhaensis</i> | Kinberg, 1866 | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>gallapaguensis</i> | Kinberg, 1866 | SP | | entre; fauna associada; costão | Avellar et al., 2006 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>gallapagensis</i> | Kinberg, 1866 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>gallapagensis</i> | Kinberg, 1866 | PR | OS | entre | Lana, 1984 |
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>gallapagensis</i> | Kinberg, 1866 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>gallapagensis</i> | Kinberg, 1866 | PE | | entre ; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>gallapagensis</i> | Kinberg, 1866 | RN | | entre ; fauna associada | Santos, 1996 |
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>palpata</i> | (Treadwell, 1923) | SP | | entre; fauna associada; costão | Avellar et al., 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>palpata</i> | (Treadwell, 1923) | SP | | | Santos & Steiner, 2006 |
| 3 | Nereididae | <i>Pseudonereis</i> | <i>variégata</i> | (Grube, 1857) | PR | | | Lana, 1984 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | Brasil | | | Rizzo et al., 2006 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>bassi</i> | Hartman, 1945 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>bassi</i> | Hartman, 1945 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>groenlandica</i> | McIntosh, 1879 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | PR | L, OS | 17m | Lana, 1984 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 17m; estuário | Lana, 1986b |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Ancistrosyllis</i> | <i>jonesi</i> | Pettibone, 1966 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | CE, Fortaleza | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | Brasil | | | Rizzo et al., 2006 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Pilargidae | <i>Cabira</i> | <i>incerta</i> | Webster, 1879 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, Bertioga | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m; Loandalia | Amaral, 1977b; 1980a |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Cananéia | A, L | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Santos | A, L | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A, L | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SP | A, L | 13m | Temperini, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>americana minuta</i> | Nonato, 1981(*) | SC | A, L | 50m | Temperini, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Loandalia</i> | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | Brasil | | | Rizzo et al., 2006 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | RS, Rio Grande | | 2 - 13 m | Camargo & Borzone, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | 5 - 11m | Corbisier, 1989 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | Hartman, 1947 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SC | AF, AMF, L, AL | 20 - 51m | Lana, 1984 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP | AF, AMF, L, AL | 20 - 51m | Lana, 1984 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | PR | AF, AMF, L, AL | 3 - 51m | Lana, 1984 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | PR, Paranaguá | A, AF, AMF, L, OS | 3 - 13m; estuário | Lana, 1986b |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 117m | Paiva, 1993b |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis & Amaral, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Parandalia</i> | <i>americana</i> | (Hartman, 1947) | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>americana minuta</i> | (Nonato, 1981) (*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197 m | Attolini, 1997 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 m | Paiva, 1996 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SP, Ubatuba | AMF, L | 3 - 17m | Petti & Nonato, 2000 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | PR | | 10m | Prantoni et al., 2009 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SC | A | entre | Salazar-Vallejo, 1990 |
| 3 | Pilargidae | Parandalia | <i>tricuspis</i> | (Müller, 1858) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 3 | Pilargidae | Pilargis | <i>berkeleyi</i> | Monro, 1933 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 3 | Pilargidae | Pilargis | <i>maculata</i> | Hartman, 1947 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sul | | 250 - 3000m | Almeida et al., 2007 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | Brasil, Nordeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 1998 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | RJ | AM | infra | Carvalheira, 1993 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR, B. de Paranaguá | | entre | Hadlich et al., 2009 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AF, AMF, AL | 0 - 3m; estuário | Lana et al., 1989 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR | L, AL | 0 - 10m | Lana, 1984 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR | | entre | Lana, 1984 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Pilargidae | Sigambra | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PE, Recife | L | estuário | Lima et al., 2006b |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 15m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 15m | Morgado, 1988 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AL | entre | Netto & Lana, 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AL | entre; estuário | Netto & Lana, 1995 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | BA | | entre | Peso-Aguiar et al., 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | | entre | Petti & Nonato, 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | Brasil | | | Rizzo et al., 2006 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SC | | entre | Salazar-Vallejo, 1990 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SE, Santos | | | Santos et al. , 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SC | L | 14; 160m | Temperini, 1981 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>grubii</i> | Müller, 1858 | SP, Cananéia | AM, AF, AMF | entre | Varoli, 1988 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>pettiboneae</i> | (Hartmann-Schörder, 1979) | SC | | infra | Almeida et al., 2009 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>tentaculata</i> | (Treadwell, 1941) | Brasil, Sudeste | | | Rizzo et al., 2006 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>tentaculata</i> | (Treadwell, 1941) | Brasil, Sul | | | Rizzo et al., 2006 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>tentaculata</i> | (Treadwell, 1941) | SP, Baixa Santista | | estuário | Rizzo et al., 2007b |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, I. Sto. Amaro | AF, AMF | entre | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, Bertioga | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, V. Carvalho | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>bassi</i> | (Hartman, 1945) | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>constricta</i> | (Southern, 1921) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>constricta</i> | (Southern, 1921) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>constricta</i> | (Southern, 1921) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Sigambra</i> | <i>constricta</i> | (Southern, 1921) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 3 | Pilargidae | <i>Synelmis</i> | <i>albini</i> | (Langerhans, 1881) | AL | A, L, OS | 0 - 50, 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 3 | Pilargidae | <i>Synelmis</i> | <i>albini</i> | (Langerhans, 1881) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Pilargidae | <i>Synelmis</i> | <i>albini</i> | (Langerhans, 1881) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Pilargidae | <i>Synelmis</i> | <i>amoureuxi</i> | Salazar-Vallejo, 2003 | Brasil, Sudeste | | | Rizzo et al., 2006 |
| 3 | Pilargidae | <i>Synelmis</i> | <i>amoureuxi</i> | Salazar-Vallejo, 2003 | Brasil, Sul | | | Rizzo et al., 2006 |
| 3 | Syllidae | <i>Amblyosyllis</i> | <i>formosa</i> | Claparède, 1863 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Amblyosyllis</i> | <i>formosa</i> | Claparède, 1863 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Autolytus</i> | <i>brachycephalus</i> | (Marenzeler, 1874) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Autolytus</i> | <i>prolifer</i> | (Müller, 1788) | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 3 | Syllidae | <i>Autolytus (Regulatus)</i> | <i>convolutus</i> | | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Autolytus (Regulatus)</i> | <i>cornutus</i> | | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Branchiosyllis</i> | <i>difazi</i> | Rioja, 1958 | AL | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Branchiosyllis</i> | <i>exilis</i> | (Gravier, 1900) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Branchiosyllis</i> | <i>exilis</i> | (Gravier, 1900) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Branchiosyllis</i> | <i>exilis</i> | (Gravier, 1900) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Branchiosyllis</i> | <i>oculata</i> | (Ehlers, 1887) | RN, Atol das Rocas | | entre; fauna associada | Neves & Omena, 2003 |
| 3 | Syllidae | <i>Branchiosyllis</i> | <i>oculata</i> | Ehlers, 1887 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>arminii</i> | (Langerhans, 1881) | SP, Caraguatatuba | | | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>arminii</i> | (Langerhans, 1881) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>arminii</i> | (Langerhans, 1881) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>arminii</i> | (Langerhans, 1881) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>clavata</i> | (Claparède, 1863) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>furcelligera</i> | | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>limbata</i> | (Claparède, 1863) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1998 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>oculata</i> | (Hartmann-Schröder, 1956) | SP, S. Sebastião | | entre | Westtheide, 1974 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>pusilla</i> | (Dujardin, 1839) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>pusilla</i> | (Dujardin, 1839) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>pusilla</i> | (Dujardin, 1839) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>subterranea</i> | (Hartmann-Schröder, 1960) | SP, S. Sebastião | | entre | Westtheide, 1974 |
| 3 | Syllidae | <i>Brania</i> | <i>subterranea</i> | (Hartmann-Schröder, 1960) | SP, Ubatuba | | entre | Westtheide, 1974 |
| 3 | Syllidae | <i>Ehlersia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Erinaceusyllis</i> | <i>centroamericana</i> | (Hartmann-Schroeder, 1959) | SP, Caraguatatuba | | costão | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | <i>Erinaceusyllis</i> | <i>centroamericana</i> | (Hartmann-Schroeder, 1959) | SP, S. Sebastião | A | | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | <i>Erinaceusyllis</i> | <i>subterranea</i> | (Hartmann-Schroeder, 1960) | SP, S. Sebastião | | | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | <i>Eunereis</i> | <i>patagonica</i> | (McIntosh, 1885) | RS | L | 80m | Orensan & Gianuca, 1974 |
| 3 | Syllidae | <i>Eurinaceusyllis</i> | <i>belizensis</i> | (Russell, 1989) | SP | | costão | Fukuda & Nogueira, 2007a |
| 3 | Syllidae | <i>Eurinaceusyllis</i> | <i>perkinsi</i> | (Riser, 1991) | SP | | costão | Fukuda & Nogueira, 2007a |
| 3 | Syllidae | <i>Eusyllis</i> | <i>assimilis</i> | Marenzeller, 1875 | Brasil, Sul | | infra | Fukuda & Nogueira, 2009 |
| 3 | Syllidae | <i>Eusyllis</i> | <i>kupfferi</i> | Langerhans, 1879 | Brasil | | entre; costão | Fukuda & Nogueira, 2006a |
| 3 | Syllidae | <i>Eusyllis</i> | <i>kupfferi</i> | Langerhans, 1879 | SP | | costão | Fukuda & Nogueira, 2007b |
| 3 | Syllidae | <i>Eusyllis</i> | <i>lamelligera</i> | Marion & Bobretzky, 1875 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Eusyllis</i> | <i>lamelligera</i> | Marion & Bobretzky, 1875 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Eusyllis</i> | <i>lamelligera</i> | Marion & Bobretzky, 1875 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 3 | Syllidae | <i>Exogone</i> | <i>arenosa</i> | Perkins, 1980 | RJ, Arraial do Cabo | | 3 - 6 m | Almeida & Ruta, 2000 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|----------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | 8 - 40m | Corbisier, 1989 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | PR | AL | 18m | Lana, 1984 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | PR, Paranaguá | L, OS | 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1981 | PR, Pontal do Paraná | | infra | Lorenzi & Borzone, 2009 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | SP, S. Sebastião | | 2 - 29m | Pires-Vanin et al., 2006 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 3 | Syllidae | Exogone | arenosa | Perkins, 1980 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Syllidae | Exogone | breviantennata | Hartmann-Schröder, 1959 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | Exogone | clavator | Ehlers, 1913 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Syllidae | Exogone | dispar | (Webster, 1879) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Syllidae | Exogone | dispar | (Webster, 1879) | SP | L, C | 26 - 94m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Exogone | dispar | (Webster, 1879) | RJ | A | 32m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Exogone | dispar | (Webster, 1879) | SC | A, L, C | 50 - 174m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Exogone | dispar | (Webster, 1879) | PR | | 50m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Exogone | gemmifera | Pagenstecher, 1862 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | Exogone | gemmifera | Pagenstecher, 1862 | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | Exogone | gemmifera | Pagenstecher, 1862 | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Syllidae | Exogone | loureai | (Berkeley & Berkeley, 1938) | Brasil, Nordeste | | infra; plataforma | Lima et al., 2006a |
| 3 | Syllidae | Exogone | occidentalis | Westheide, 1974 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 3 | Syllidae | Exogone | occidentalis | Westheide, 1974 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Syllidae | Exogone | occidentalis | Westheide, 1974 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Syllidae | Exogone | occidentalis | Westheide, 1974 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Syllidae | Exogone | occidentalis | Westheide, 1974 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | Exogone | occidentalis | Westheide, 1974 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | Exogone | occidentalis | Westheide, 1974 | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | Exogone | occidentalis | Westheide, 1974 | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | Exogone | verugera | (Claparède, 1868) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Syllidae | Exogone (Exogone) | breviantennata | (Hartmann-Schröder, 1959) | SP, Caraguatatuba | | | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | Exogone (Exogone) | breviantennata | Hartmann-Schröder, 1959 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Exogone (Exogone) | breviantennata | Hartmann-Schröder, 1959 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Exogone (Exogone) | dispar | Webster, 1879 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 3 | Syllidae | Exogone (Exogone) | marisae | Pascual, Nuñez & San Martín, 1996 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Exogone (Exogone) | marisae | Pascual, Nuñez & San Martín, 1996 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Exogone (Exogone) | naidina | Oersted, 1845 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Exogone (Parexogone) | exmouthensis | Hartmann-Schröder, 1980 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Exogone (Sylline) | aquadulicensis | Pascual, Nuñez & San Martín, 1996 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Exogone (Sylline) | aquadulicensis | Pascual, Nuñez & San Martín, 1996 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Grubeosyllis | breviarticulata | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP | | 4 - 7m; fauna associada | Nogueira et al., 2001a |
| 3 | Syllidae | Grubeosyllis | breviarticulata | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Grubeosyllis | breviarticulata | Nogueira, San Martin & Amaral, 2001 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | Grubeosyllis | clavata | (Claparède, 1863) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Grubeosyllis | clavata | (Claparède, 1863) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|----------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 3 | Syllidae | <i>Grubeosyllis</i> | <i>euritmica</i> | (Sardá, 1984) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Grubeosyllis</i> | <i>heterocirra</i> | (Rioja, 1941) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Grubeosyllis</i> | <i>heterocirra</i> | (Rioja, 1941) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Grubeosyllis</i> | <i>longiarticulata</i> | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP | | 4 - 7m; fauna associada | Nogueira et al., 2001a |
| 3 | Syllidae | <i>Grubeosyllis</i> | <i>longiarticulata</i> | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Grubeosyllis</i> | <i>longiarticulata</i> | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Grubeosyllis</i> | <i>longiarticulata</i> | Nogueira, San Martin & Amaral, 2001 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>aberrans</i> | (Fauvel, 1939) | PE | | | Rullier & Amourex, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | RN, Atol das Rocas | | entre; fauna associada | Neves & Omena, 2003 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP | | endofauna | Nogueira, 1995 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | AL | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | BA | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | ES | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | PA | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | PE | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | RJ | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | RN | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SE | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | BA | | infra | Rullier & Amourex, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | ES | | infra | Rullier & Amourex, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | PB | | infra | Rullier & Amourex, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | PE | | infra | Rullier & Amourex, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | RN | | infra | Rullier & Amourex, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Haplosyllis</i> | <i>spongicola</i> | (Grube, 1855) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | infra | Corbisier, 1989 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 30m | Lana, 1981 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, S. Vicente | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 3 | Syllidae | <i>Langerhansia</i> | <i>cornuta</i> | (Rathke, 1843) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Syllidae | <i>Miscellania</i> | <i>dentata</i> | Martin, Alós & Sarda, 1990 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Nuchalosyllis</i> | <i>lamellicornis</i> | Rullier & Amoureux, 1979 | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, S. Sebastião | A | 5m | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, Caraguatatuba | | entre; fauna associada | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, S. Sebastião | | entre; fauna associada | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, Ubatuba | | entre; fauna associada | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, Ubatuba | | infra | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, S. Vicente | | | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | PR | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1834) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>fulgurans</i> | (Audouin & M. Edwards, 1833) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>guillermo</i> | Fukuda & Nogueira, 2006 | SP, Guarujá | | entre; costão | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>guillermo</i> | Fukuda & Nogueira, 2006 | SP, Itanhaém | | entre; costão | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>guillermo</i> | Fukuda & Nogueira, 2006 | SP, S. Vicente | | entre; costão | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>guillermo</i> | Fukuda & Nogueira, 2006 | SP, Ubatuba | | entre; costão; fauna associada | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>guillermo</i> | Fukuda & Nogueira, 2006 | SP, Caraguatatuba | | costão; fauna associada | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>guillermo</i> | Fukuda & Nogueira, 2006 | SP, S. Sebastião | | entre; costão; fauna associada | Fukuda & Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 4 - 8m | Lana, 1981 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | PR | A | 15 - 25m | Lana, 1984 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | RS | A | 15 - 25m | Lana, 1984 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | SP | | endofauna | Nogueira, 1995 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | PR | A | 15m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>hetero-falchaeta</i> | Temperini, 1981(*) | RS | A | 25m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | <i>Odontosyllis</i> | <i>polycera</i> | (Schmarda, 1861) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Opisthodonta</i> | <i>morena</i> | Langerhans, 1879 | Brasil, Sul | | infra | Fukuda & Nogueira, 2009 |
| 3 | Syllidae | <i>Opisthosyllis</i> | <i>brunnea</i> | Langerhans, 1879 | Brasil | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Opisthosyllis</i> | <i>corallicola</i> | Hartmann-Schröder, 1964 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Paraehlersia</i> | <i>kerguelensis</i> | (McIntosh, 1885) | Brasil, Sul | | infra | Fukuda & Nogueira, 2009 |
| 3 | Syllidae | <i>Paraehlersia</i> | <i>mariae</i> | San Martín & Hutchings, 2006 | Brasil, Sul | | infra | Fukuda & Nogueira, 2009 |
| 3 | Syllidae | <i>Parasphaerosyllis</i> | <i>indica</i> | Monro, 1937 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Parexogone</i> | <i>anseforbansensis</i> | Boegemann & Westheide, 2004 | SP, Caraguatatuba | | | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | <i>Parexogone</i> | <i>anseforbansensis</i> | Böggemann & Westheide, 2003 | SP | | | Nogueira, 2006b |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3 | Syllidae | Parexogone | caribensis | San Martín, 1991 | SP, Caraguatatuba | | 35m | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | Parexogone | caribensis | San Martín, 1991 | SP, S. Sebastião | | 45m | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | Parexogone | caribensis | (San Martín, 1991) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | Petitia | amphophthalma | Siewing, 1956 | SP, Ubatuba | | entre | Westtheide, 1974 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | augeneri | Hartmann-Schröder, 1979 | Brasil, Sul | | infra | Fukuda & Nogueira, 2009 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | PR | L | 50 - 160m | Lana, 1984 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | SC | A, L, C | 50, 160m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | PR | | 50m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | pectinata | Temperini, 1981(*) | SP | L | 54m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | procera | Hartman, 1965 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Pionosyllis | weismanni | Langerhans, 1879 | Brasil | | 60 - 808m | Fukuda & Nogueira, 2006a |
| 3 | Syllidae | Proceraea | picta | (Ehlers, 1864) | Brasil, Nordeste | | infra; plataforma | Lima et al., 2006a |
| 3 | Syllidae | Proceraea | picta | Ehlers, 1864 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Proceraea | picta | Ehlers, 1864 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Prospaerosyllis | brachycephala | Fukuda et al., 2009 | CE, Fortaleza | | 10 - 14m | Fukuda et al., 2009 |
| 3 | Syllidae | Prospaerosyllis | isabelae | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 3 | Syllidae | Prospaerosyllis | isabellae | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | RJ | | 100 - 650m | Fukuda et al., 2009 |
| 3 | Syllidae | Prospaerosyllis | isabellae | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP | | 99 - 808m | Fukuda et al., 2009 |
| 3 | Syllidae | Prospaerosyllis | xarifae | (Hartmann-Schröder, 1960) | SP, Santos | | entre; costão | Fukuda et al., 2009 |
| 3 | Syllidae | Prospaerosyllis | xarifae | (Hartmann-Schröder, 1960) | SP, S. Sebastião | | costão | Fukuda et al., 2009 |
| 3 | Syllidae | Salvatoria | longiarticulata | (Nogueira, San Martín & Amaral, 2001) | SP, Caraguatatuba | | | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | annulata | Nogueira, San Martín & Fukuda, 2003 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | annulata | Nogueira, San Martín & Fukuda, 2004 | SP, Ubatuba | AF | | Nogueira et al., 2004b |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | bilobata | Perkins, 1980 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | bilobata | Perkins, 1980 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | brasiliensis | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP | | 4 - 7m; fauna associada | Nogueira et al., 2001a |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | brasiliensis | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | brasiliensis | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | brasiliensis | Nogueira, San Martin & Amaral, 2001 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | centroamericana | (Hartmann-Schröder, 1959) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | erinaceus | Claparède, 1863 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | erinaceus | Claparède, 1863 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | hystrix | Claparède, 1863 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | hystrix | Claparède, 1863 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | hystrix | Claparède, 1863 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | hystrix | Claparède, 1863 | SP | C | 26m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | hystrix | Claparède, 1863 | RJ | A | 32m | Temperini, 1981 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | isabelae | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | ?RS | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | isabelae | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | isabelae | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP | | 4 - 7m; fauna associada | Nogueira et al., 2001a |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | isabelae | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | Sphaerosyllis | longicaudata | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 | Syllidae | <i>Sphaerosyllis</i> | <i>mussismiliaicola</i> | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP | | 4 - 7m; fauna associada | Nogueira et al., 2001a |
| 3 | Syllidae | <i>Sphaerosyllis</i> | <i>mussismiliaicola</i> | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Sphaerosyllis</i> | <i>mussismiliaicola</i> | Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Sphaerosyllis</i> | <i>mussismiliaicola</i> | Nogueira, San Martin & Amaral, 2001 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Sphaerosyllis</i> | <i>piriferopsis</i> | Perkins, 1981 | Brasil | | 60 - 808m | Fukuda & Nogueira, 2006a |
| 3 | Syllidae | <i>Sphaerosyllis</i> | <i>piriferopsis</i> | Perkins, 1981 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Sphaerosyllis</i> | <i>subterranea</i> | (Hartmann-Schröder, 1960) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllides</i> | <i>denticulatum</i> | Nogueira, 2000 (*) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>aculigrossa</i> | (San Martin, 1990) | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>amica</i> | Quatrefages, 1865 | RJ, Ilha Grande | | 0,5 - 5m | Alonso et al., 2009 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>amica</i> | Quatrefages, 1865 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>amica</i> | Quatrefages, 1865 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>beneliahuae</i> | (Campoy & Alquézar, 1982) | SP | | infra; fauna associada | Nogueira & San Martín, 2001 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>beneliahuae</i> | (Campoy & Alquézar, 1982) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>beneliahuae</i> | (Campoy & Alquézar, 1982) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>brevicirris</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>brevicirris</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>brevicirris</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>brevicirris</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>brevicirris</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>corallicola</i> | Verrill, 1900 | SP | | infra; fauna associada | Nogueira & San Martín, 2001 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>corallicola</i> | Verrill, 1900 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>corallicola</i> | Verrill, 1900 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>corallicola</i> | Verril, 1900 | BA | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>corallicola</i> | Verril, 1900 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>cornuta</i> | Rathke, 1843 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>cornuta</i> | Rathke, 1843 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>cryptica</i> | Ben-Eliahu, 1977 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>cryptica</i> | Ben-Eliahu, 1977 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>garciai</i> | (Campany, 1982) | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gerlachi</i> | (Hartmann-Schröder, 1960) | SP | | infra; fauna associada | Nogueira & San Martín, 2001 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>glandulata</i> | Nogueira & San Martín, 2002 | SP | | infra; fauna associada | Nogueira & San Martín, 2001 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>glandulata</i> | Nogueira & San Martín, 2002 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>glandulata</i> | Nogueira & San Martín, 2002 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>glandulata</i> | Nogueira & Sant Martin, 2002 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP | | fauna associada | Nogueira & San Martín, 2001 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP | | endofauna | Nogueira, 1995 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | ES | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | RJ | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | RS | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP | | | Nogueira, 2006b |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | RJ, B. de Sepetiba | OS | | Omena et al., 2006a |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP | A, L, OS | 6 - 66m | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | SP | A, L, OS | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | ES | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1840 | RS | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>guidae</i> | Nogueira & Yunda-Guarin, 2008 | CE, Fortaleza | A | 12 - 14m | Nogueira & Yunda-Guarin, 2008 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>hyllebergi</i> | (Licher, 2000) | SP | | infra; fauna associada | Nogueira & San Martín, 2001 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>hyllebergi</i> | (Licher, 2000) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>hyllebergi</i> | (Licher, 2000) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>lutea</i> | (Hartmann-Schröder, 1960) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>lutea</i> | (Hartmann-Schröder, 1960) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>magellanica</i> | Augener, 1918 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>maryae</i> | San Martín, 1992 | SP | | infra; fauna associada | Nogueira & San Martín, 2001 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>maryae</i> | San Martín, 1992 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>maryae</i> | Sant Martin, 1992 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>ortizi</i> | San Martin, 1992 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>prolifera</i> | Krohn, 1852 | AL | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>prolifera</i> | Krohn, 1852 | RJ | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>prolifera</i> | Krohn, 1852 | SE | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>prolifera</i> | Krohn, 1852 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>pseudoarmillaris</i> | Nogueira & Sant Martin, 2002 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>truncata</i> | Haswell, 1920 | SP | | infra; fauna associada | Nogueira & San Martín, 2001 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>truncata</i> | Haswell, 1920 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>truncata</i> | Haswell, 1920 | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>tyrrhea</i> | (Licher & Kuper, 1998) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> | <i>variegata</i> | Grube, 1860 | RJ, Ilha Grande | | 0,5 - 5m | Alonso et al., 2009 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> (<i>Typosyllis</i>) | <i>lutea</i> | (Hartmann-Schröder, 1960) | BA | | infra; fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Syllis</i> (<i>Typosyllis</i>) | <i>prolixa</i> | Ehlers, 1901 | RS | | infra | Orensan & Gianuca, 1974 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>aurantiacus</i> | Nogueira & Fukuda, 2007b | SP, Peruíbe | | entre; costão | Nogueira & Fukuda, 2007b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>parvidentata</i> | Perkins, 1981 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>taeniaformis</i> | (Haswell, 1886) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>taeniaformis</i> | (Haswell, 1886) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>taeniaformis</i> | (Haswell, 1886) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>taeniaformis</i> | (Haswell, 1886) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>taeniaformis</i> | (Haswell, 1886) | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>taeniaformis</i> | (Haswell, 1886) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>taeniaformis</i> | (Haswell, 1886) | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>taeniaformis</i> | (Haswell, 1886) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP | | entre; costão; fauna associada | Nogueira & Fukuda, 2007a |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP, Ubatuba | | entre; costão | Nogueira & Fukuda, 2007b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP, S. Sebastião | | entre; costão | Nogueira & Fukuda, 2007b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP, Guarujá | | entre; costão | Nogueira & Fukuda, 2007b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP, Santos | | entre; costão | Nogueira & Fukuda, 2007b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP, S. Vicente | | entre; costão | Nogueira & Fukuda, 2007b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP, Caraguatatuba | | entre; costão | Nogueira & Fukuda, 2007b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | <i>zebra</i> | (Grube, 1860) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|----------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | zebra | (Grube, 1860) | RJ | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | zebra | (Grube, 1860) | SP | | | Nogueira, 2006b |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | zebra | Grube, 1860 | RJ, B. de Sepetiba | | infra; costão | Omena et al., 2006a |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | zebra | (Grube, 1860) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Trypanosyllis</i> | zebra | (Grube, 1860) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>armillaris</i> | (Müller, 1776) | AL | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>armillaris</i> | (Müller, 1776) | BA | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>armillaris</i> | (Müller, 1776) | PE | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>armillaris</i> | (Müller, 1776) | RN | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>armillaris</i> | (Müller, 1776) | AL | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>armillaris</i> | (Müller, 1776) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>armillaris</i> | (Müller, 1776) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>armillaris</i> | (Müller, 1776) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>cirropunctata</i> | (Michel, 1909) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>ehlersioides</i> | Marenzeller, 1890 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>fasciata</i> | (Malmgren, 1867) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | RJ, Arraial do Cabo | | 3 - 6 m | Almeida & Ruta, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | PR | L, OS | 10m | Lana, 1984 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | PR | | entre; costão | Lana, 1984 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | PR, Paranaguá | L, OS | 10m; estuário | Lana, 1986b |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | BA | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | RN | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>hyalina</i> | (Grube, 1863) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>maculata</i> | Imajima, 1966 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessso, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>maculata</i> | Imajima, 1966 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessso, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>maculata</i> | Imajima, 1966 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>maculata</i> | Imajima, 1966 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | Brasil, Sul | | 250 - 3000m | Almeida et al., 2007 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>maculata</i> | Imajima, 1966 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>maculata</i> | Imajima, 1966 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>maculata</i> | Imajima, 1966 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>maculata</i> | Imajima, 1966 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>prolifera</i> | (Krohn, 1852) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>prolifera</i> | (Krohn, 1852) | RJ | plancton | | Machado, 1986 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>prolifera</i> | (Krohn, 1852) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>prolifera</i> | (Krohn, 1852) | SP | | endofauna | Nogueira, 1995 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>prolifera</i> | (Krohn, 1852) | AL | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>prolifera</i> | (Krohn, 1852) | SE | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>prolifera</i> | (Krohn, 1852) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessso, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessso, 1996 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | PR | OS | entre; costão | Lana, 1984 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1985 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | AL | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | SE | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | PE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 3 | Syllidae | <i>Typosyllis</i> | <i>variegata</i> | (Grube, 1860) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 3 | Syllidae | <i>Umbellisyllis</i> | <i>clavata</i> | (Langerhans, 1879) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m ; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 4 | Alciopidae | <i>Alciopa</i> | <i>reynaudii</i> | Audouin & M. Edwards, 1829 | RS | | 0 - 246m | Tebble, 1960 |
| 4 | Alciopidae | <i>Alciopina</i> | <i>parassitica</i> | Claparède & Panceri, 1867 | RS | | 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Alciopidae | <i>Naiades</i> | <i>cantrainii</i> | delle Chiaje, 1830 | RN | | 0 - 182m | Tebble, 1960 |
| 4 | Alciopidae | <i>Plotohelmis</i> | <i>capitata</i> | (Greeff, 1876) | RS | | 90 - 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Alciopidae | <i>Rhynchonerella</i> | <i>gracilis</i> | Costa, 1862 | RS | | 90 - 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Alciopidae | <i>Rhynchonerella</i> | <i>petersi</i> | (Langerhans, 1880) | RS | | 90 - 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Alciopidae | <i>Torrea</i> | <i>candida</i> | (delle Chiaje, 1841) | RS | | 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Alciopidae | <i>Vanadis</i> | <i>crystallina</i> | Greeff, 1876 | AL | | 0 - 208m | Tebble, 1960 |
| 4 | Alciopidae | <i>Vanadis</i> | <i>crystallina</i> | Greeff, 1876 | BA | | 0 - 216m | Tebble, 1960 |
| 4 | Alciopidae | <i>Vanadis</i> | <i>formosa</i> | Claparède, 1870 | RS | | 0 - 246m | Tebble, 1960 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | RS | | estuário | Bemvenuti, 1987 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | PR, B. de Paranaguá | | | Brasil et al., 2006 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | PR | AF, AMF, AL | 0 - 33m | Lana, 1984 |
| 4 | Glyceridae | <i>Glycera</i> | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | PR, Paranaguá | AM, L, OS | 5, 10m; estuário | Lana, 1986b |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 45m | Morgado, 1988 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | A, L, C | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | RS | | infra | Orensanz & Giana, 1974 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, I. S. Sebastião | AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, I. S. Sebastião | AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP | | infra | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>americana</i> | Leidy, 1855 | SC | A, L | 94m | Temperini, 1981 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>brevicirris</i> | Grube, 1870 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>brevicirris</i> | Grube, 1870 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>brevicirris</i> | Grube, 1870 | RJ | | infra | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>brevicirris</i> | Grube, 1870 | SP | | infra | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>brevicirris</i> | Grube, 1870 | RJ | | 106 m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>brevicirris</i> | Grube, 1870 | SP | | 106 m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>brunnea</i> | | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>capitata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>capitata</i> | Oersted, 1843 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>capitata</i> | Oersted, 1843 | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>dibranchiata</i> | Ehlers, 1868 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>dibranchiata</i> | Ehlers, 1868 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>dibranchiata</i> | Ehlers, 1868 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>dibranchiata</i> | Ehlers, 1868 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>edentata</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>edentata</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>edentata</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>edentata</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>edentata</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>incerta</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>incerta</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>incerta</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>incerta</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>incerta</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>lapidum</i> | Quatrefages, 1865 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>lapidum</i> | Quatrefages, 1866 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>lapidum</i> | Quatrefages, 1866 | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-----------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>lapidum</i> | Quatrefages, 1866 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>lapidum</i> | Quatrefages, 1866 | SP | | 60 - 485 m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>longipinnis</i> | Grube, 1878 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>longipinnis</i> | Grube, 1878 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>longipinnis</i> | Grube, 1878 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>longipinnis</i> | Grube, 1878 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado, 1988 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>longipinnis</i> | Grube, 1878 | AL | A, L, OS | 21 - 50; 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>longipinnis</i> | Grube, 1878 | SE | A, L, OS | 21 - 50; 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | PR | L | 153 - 165 m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | PR | AF, AMF, AL | 45 - 51m | Lana, 1984 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | PR, Paranaguá | AF, AMF | 15,5m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado, 1988 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>oxycephala</i> | Ehlers, 1887 | SP | L | 153 - 165 m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>rouxii</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>rouxii</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>tesselata</i> | Grube, 1863 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>tesselata</i> | Grube, 1863 | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>tesselata</i> | Grube, 1863 | SE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>tesselata</i> | Grube, 1863 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 4 | Glyceridae | Glycera | <i>unicornis</i> | Savigny, 1818 | SP | L | 18m | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodia | <i>californica</i> | (Orensanz & Gianuca, 1974) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodia | <i>californiensis</i> | (Hartman, 1938) | PR, B. de Paranaguá | A | entre | Brauko et al., 2009 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodia | <i>californiensis</i> | (Hartman, 1938) | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Hemipodia | <i>simplex</i> | (Grube, 1857) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodia | <i>simplex</i> | (Grube, 1857) | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006a |
| 4 | Glyceridae | Hemipodia | <i>simplex</i> | (Grube, 1857) | SP, Caraguatatuba | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodia | <i>simplex</i> | (Grube, 1857) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodia | <i>californiensis</i> | (Hartman, 1938) | PR, Pontal do Paraná | | infra | Lorenzi & Borzone, 2009 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>californiensis</i> | Hartman, 1938 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>californiensis</i> | Hartman, 1938 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>californiensis</i> | Hartman, 1938 | SP, S. Sebastião | | | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>californiensis</i> | Hartman, 1938 | SP, S. Sebastião | | | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>californiensis</i> | Hartman, 1938 | SP, S. Sebastião | | | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>californiensis</i> | Hartman, 1938 | SP, Caraguatatuba | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>californiensis</i> | Hartman, 1938 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 4 | Glyceridae | Hemipodus | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, Caraguatatuba | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AM, AF, AMF | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AM, AF, AMF | entre | Borzone et al., prelo |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR, Paranaguá | AF, AMF, AL | 0 - 3m; estuário | Lana et al., 1989 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AM, AF, AMF | 0 - 18m | Lana, 1984 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AM, AF, AMF | 0 - 18m | Lana, 1984 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR, Paranaguá | AF, AMF | 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, Caraguatatuba | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Rizzo, 1998 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | A, L | entre | Shimizu, 1991 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR, Paranaguá | AF, AMF | estuário | Souza & Gianuca, 1995 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AF, AMF | 0 - 2m | Souza, 1991 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR | AF, AMF | entre | Souza, 1991 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>olivieri</i> | Orensanz & Gianuca, 1974 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AM | entre | Amaral et al., 1987 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1980a |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | | entre | Corbisier, 1989 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | entre | Nonato, 1981 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | entre | Nonato, 1981 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 4 | Glyceridae | <i>Hemipodus</i> | <i>rotundus</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 4 | Glyceridae | <i>Ophioglycera</i> | <i>eximia</i> | (Ehlers, 1900) | RS | L | 18m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | PR | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | SC | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | RS | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | SC | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | Brasil, Sudeste | | 325 - 508 m | Rizzo & Amaral, 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | Brasil, Sul | | 325 - 508 m | Rizzo & Amaral, 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Bathyglycinde</i> | <i>profunda</i> | (Hartman & Fauchald, 1971) | SP | L | 500m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | Brasil, Nordeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Bertioga | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Santos | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, V. Carvalho | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AF, AMF, AL | 0 - 3 m; estuário | Lana et al., 1989 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR | A, L, AL | 0 - 50m | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SC | A, L, AL | 0 - 50m | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR | A, L, AL | entre | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 4 - 9m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 35m | Morgado, 1988 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AL | entre; estuário | Netto & Lana, 1995 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, AL, C | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Goniadidae | <i>Glycinde</i> | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | BA, Ilhéus | AM, L | entre; estuário | Passos et al., 2006 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis & Amaral, 1998 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | RS | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SC | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Baixa Santista | | estuário | Rizzo et al., 2007b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | BA, Ilhéus | AM | entre; estuário | Rizzo et al., 2009 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>multidens</i> | Müller, 1858 | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>nordmanni</i> | (Malmgren, 1865) | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>nordmanni</i> | (Malmgren, 1865) | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>nordmanni</i> | (Malmgren, 1865) | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>nordmanni</i> | (Malmgren, 1865) | SP | | 99 - 282m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>picta</i> | Berkeley, 1927 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>picta</i> | Berkeley, 1927 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Glycinde | <i>picta</i> | Berkeley, 1927 | SP | | 147m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>acicula</i> | Hartman, 1940 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>acicula</i> | Hartman, 1940 | SP, Ubatuba | AM | 35 - 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>acicula</i> | Hartman, 1940 | SP, Ubatuba | AM | 35 - 45m | Morgado, 1988 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>acicula</i> | Hartman, 1940 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>brunnea</i> | Treadwell, 1906 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>brunnea</i> | Treadwell, 1906 | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>brunnea</i> | Treadwell, 1906 | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>brunnea</i> | Treadwell, 1906 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | <i>brunnea</i> | Treadwell, 1906 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|---------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | PR | AL | 50m | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Santos | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25 - 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25 - 45m | Morgado, 1988 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, I. S. Sebastião | AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, I. S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | PR | | 12 - 476m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP | | 12 - 476m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | brunnea | Treadwell, 1906 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | carolinae | Day, 1973 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | emerita | Audouin & M. Edwards, 1833 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | emerita | Audouin & M. Edwards, 1833 | PR | L, AL | 60 - 88m | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | emerita | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP | L, AL | 60 - 88m | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | emerita | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | emerita | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | falklandica | Pratt, 1901 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | RS | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SC | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | PR | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | PR, Paranaguá | AF, AMF, AL | 0 - 2,8m ; estuário | Lana et al., 1989 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | PR | A, L, AL | 4 - 17m | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | PR, Paranaguá | A, AF, AMF, L, OS | 3 - 17m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | littorea | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | AMF, L | 3 - 17m | Petti & Nonato, 2000 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, Caraguatatuba | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>littorea</i> | Hartman, 1950 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | RS | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SC | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | PR | AL | 5 - 50m | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | PR, Paranaguá | A, L | 5 - 16m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | A, AL | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 4 | Goniadidae | <i>Goniada</i> | <i>maculata</i> | Oersted, 1843 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 | Goniadidae | Goniada | maculata | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | maculata | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | maculata | Oersted, 1843 | PR | | 5 - 433m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | maculata | Oersted, 1843 | RJ | | 5 - 433m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | maculata | Oersted, 1843 | SP | | 5 - 433m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | maculata | Oersted, 1843 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | maculata | Oersted, 1843 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | maculata | Oersted, 1843 | SC | C | -160 | Temperini, 1981 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | multidens | | PR | AM, AF, AMF | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 4 | Goniadidae | Goniada | teres | Treadwell, 1931 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | teres | Treadwell, 1931 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | teres | Treadwell, 1931 | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | teres | Treadwell, 1931 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | teres | Treadwell, 1931 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 8m | Lana, 1981 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | teres | Treadwell, 1931 | SP | | 17 - 206m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | vorax | (Kinberg, 1866) | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | vorax | (Kinberg, 1866) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniada | vorax | (Kinberg, 1866) | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | vorax | (Kinberg, 1866) | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniada | vorax | (Kinberg, 1866) | RJ | | 60 - 101m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniada | vorax | (Kinberg, 1866) | SP | | 60 - 101m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | Goniadella | revizée | Rizzo & Amaral, 2004 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniadella | revizée | Rizzo & Amaral, 2004 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniadella | revizée | Rizzo & Amaral, 2004 | PR | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniadella | revizée | Rizzo & Amaral, 2004 | SC | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | Goniadella | revizée | Rizzo & Amaral, 2004 | PR | | 99 - 808m | Rizzo & Amaral, 2004b |
| 4 | Goniadidae | Goniadella | revizée | Rizzo & Amaral, 2004 | RJ | | 99 - 808m | Rizzo & Amaral, 2004b |
| 4 | Goniadidae | Goniadella | revizée | Rizzo & Amaral, 2004 | RS | | 99 - 808m | Rizzo & Amaral, 2004b |
| 4 | Goniadidae | Goniadella | revizée | Rizzo & Amaral, 2004 | SC | | 99 - 808m | Rizzo & Amaral, 2004b |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | aciculata | Hartmann-Schröder, 1960 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | SP | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 1998 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | PR | | infra | Lana, 1984 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | PR, Paranaguá | L, OS | 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | carolinae | Day, 1973 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | uncata | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | uncata | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | uncata | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | uncata | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | uncata | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | uncata | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Goniadidae | Goniadiides | uncata | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 | Goniadidae | <i>Ophioglycera</i> | <i>eximia</i> | (Ehlers, 1901) | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Ophioglycera</i> | <i>eximia</i> | (Ehlers, 1900) | RS | AL | 18m | Nonato, 1966a |
| 4 | Goniadidae | <i>Ophioglycera</i> | <i>eximia</i> | (Ehlers, 1900) | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 4 | Goniadidae | <i>Ophioglycera</i> | <i>eximia</i> | (Ehlers, 1900) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Goniadidae | <i>Ophioglycera</i> | <i>eximia</i> | (Ehlers, 1900) | RS | | 101 - 258m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | <i>Ophioglycera</i> | <i>eximia</i> | (Ehlers, 1900) | SP | | 101 - 258m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | PR | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | SC | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | PR | | 93 - 476m | Rizzo & Amaral, 2004b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | RJ | | 93 - 476m | Rizzo & Amaral, 2004b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | RS | | 93 - 476m | Rizzo & Amaral, 2004b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | SC | | 93 - 476m | Rizzo & Amaral, 2004b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | RJ | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | RS | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | SC | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | PR | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | PA | | estuário | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | PE | | | Rizzo & Steiner, 2006b |
| 4 | Goniadidae | <i>Progoniada</i> | <i>regularis</i> | Hartman, 1965 | SP | | 99 - 314m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Iospiidae | <i>Iospilus</i> | <i>phalacroides</i> | Viguier, 1886 | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 4 | Iospiidae | <i>Phalacrophorus</i> | <i>pictus</i> | Greeff, 1879 | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 4 | Iospiidae | <i>Phalacrophorus</i> | <i>pictus</i> | Greeff, 1879 | RS | | 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Iospiidae | <i>Phalacrophorus</i> | <i>uniformis</i> | Reibisch, 1893 | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 4 | Iospiidae | <i>Phalacrophorus</i> | <i>uniformis</i> | Reibisch, 1893 | RS | | 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Lopadorhynchidae | <i>Lopadorhynchus</i> | <i>uncinatus</i> | Fauvel, 1915 | RS | | 0 - 246m | Tebble, 1960 |
| 4 | Myzostomidae | <i>Cystimyzostomum</i> | <i>cysticolum</i> | (Graff, 1884) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Myzostomidae | <i>Myzostomum</i> | <i>irregulare</i> | von Graff, 1884 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>dibranchis</i> | (Grube, 1877) | SC | C | 160m | Temperini, 1981 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>dibranchis</i> | (Grube, 1877) | SP | A, L | 54 - 63m | Temperini, 1981 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Caraguatatuba | AMF | 15m | Rizzo & Amaral, 2007a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | SP | | | Rizzo & Amaral, 2007a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Ubatuba | | | Fauchald, 1976 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4m | Lana, 1981 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | PR | | 50 - 100m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | PR | | 50m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | PR | AL | 10 - 70m | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | PR, Paranaguá | A, L, OS | 6m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>juvenalis</i> | (Kinberg, 1866) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>macroura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaiyi</i> | Hartman, 1953 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaiyi</i> | Hartman, 1953 | PR | L, AL | 60 - 95m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaiyi</i> | Hartman, 1953 | SC | L, AL | 60 - 95m | Lana, 1984 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaii</i> | Hartman, 1953 | SP | L, AL | 60 - 95m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaii</i> | Hartman, 1953 | PR | L, AL | 60 e 95m | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaii</i> | Hartman, 1953 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaii</i> | Hartman, 1953 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaii</i> | Hartman, 1953 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaii</i> | Hartman, 1953 | RS | L | 80m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Aglaophamus</i> | <i>uruguaii</i> | Hartman, 1953 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Inermonephrys</i> | <i>palpata</i> | Paxton, 1974 | PR | A, AL | 25 - 88m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Inermonephrys</i> | <i>palpata</i> | Paxton, 1974 | SP | A, AL | 25 - 88m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Inermonephrys</i> | <i>palpata</i> | Paxton, 1974 | PR | AF, AMF, AL | 25 - 88m | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Inermonephrys</i> | <i>palpata</i> | Paxton, 1974 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Inermonephrys</i> | <i>palpata</i> | Paxton, 1974 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | SP | | | Rizzo & Amaral, 2007a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | | | Fauchald, 1976 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | PR | AL | 60 - 88m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | SP | AL | 60 - 88m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | SP | AL | 60 e 80m | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | PR | AL | 80m | Lana, 1987 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | AMG | 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | SP, Ubatuba | AMG | 50m | Morgado, 1988 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | RS | L | 80m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>acrochaeta</i> | Hartman, 1950 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>caeca</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>caeca</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Santos | AF, AMF | estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>caeca</i> | (Fabricius, 1780) | SP, V. Carvalho | AF, AMF | estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>caeca</i> | (Fabricius, 1780) | SP, S. Vicente | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>caeca</i> | (Fabricius, 1780) | SP, Santos | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>caeca</i> | (Fabricius, 1780) | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>californiensis</i> | Hartman, 1938 | SP | | | Rizzo & Amaral, 2007a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | PA, Belém | | infra; estuário | Hostin et al., 2009 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | RS, L. dos Patos | AF, AMF | entre | Bemvenuti, 1983 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | RS, L. dos Patos | A | estuário | Bemvenuti, 1987 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | RS | | estuário | Capitoli et al., 1978 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | PR | L, OS | infra | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | PR | AL | estuário | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | PR | AL | 1 - 5m; estuário | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>fluviatilis</i> | Monro, 1937 | SP, Cananéia | AM, AF, AMF | entre | Varoli, 1988 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>hombergii</i> | Savigny, 1818 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>magellanica</i> | Augener, 1912 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>magellanica</i> | Augener, 1912 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>magellanica</i> | Augener, 1912 | SP, Ubatuba | | | Fauchald, 1976 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>magellanica</i> | Augener, 1912 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>magellanica</i> | Augener, 1912 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 4 - 8m | Lana, 1981 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>paradoxa</i> | Malmgren, 1874 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>paradoxa</i> | Malmgren, 1874 | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>paradoxa</i> | Malmgren, 1874 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 35m | Morgado, 1988 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR | AM, AF, AMF | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | RS, Rio Grande | | 2 - 13 m | Camargo & Borzone, 1998 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR | AM, AF, AMF | 47m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR | AM, AF, AMF | 47m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | SP | AM, AF, AMF | 47m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR | AM, AF, AMF | 10 - 47m | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR | AM, AF, AMF | entre | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR, Paranaguá | A, AF, AMF, L, OS | 12 - 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Shimizu, 1991 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>simoni</i> | Perkins, 1980 | PR | AF, AMF | 0 - 2m | Souza, 1991 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | PR, B. de Paranaguá | | | Brasil et al., 2006 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP | | | Rizzo & Amaral, 2007a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | | | Fauchald, 1976 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | PR | AF, AMF, AL | 10 - 53m | Lana, 1984 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | PR | AF, AMF, AL | 10 e 53m | Lana, 1986a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 10,5m; estuário | Lana, 1986b |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | AL | A, L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SE | A, L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP, Litoral Norte | AF, AMF | 15 - 100 m | Paiva, 1990 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP, Litoral norte | | infra | Paiva, 1993a |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Nephtyidae | <i>Nephthys</i> | <i>squamosa</i> | Ehlers, 1887 | RJ | A | 32m | Temperini, 1981 |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | PR | | 156 - 400m | Rizzo & Amaral, 2007b |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | RJ | | 156 - 400m | Rizzo & Amaral, 2007b |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | SP | | 156 - 400m | Rizzo & Amaral, 2007b |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | PR | | | Rizzo, 2006a |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | RJ | | | Rizzo, 2006a |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | SP | | | Rizzo, 2006a |
| 4 | Paralacydoniidae | <i>Paralacydonia</i> | <i>paradoxa</i> | Fauvel, 1913 | | | 156 - 282m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Anaitides</i> | <i>erythrophylus</i> | (Schmarda, 1861) | AL | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Anaitides</i> | <i>erythrophylus</i> | (Schmarda, 1861) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | erythrophylloides | (Schmarda, 1861) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | erythrophylloides | (Schmarda, 1861) | SE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | madeirensis | (Langerhans, 1880) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | madeirensis | (Langerhans, 1880) | AL | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | madeirensis | (Langerhans, 1880) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | madeirensis | (Langerhans, 1880) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | madeirensis | (Langerhans, 1880) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | madeirensis | (Langerhans, 1880) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | mucosa | (Oersted, 1843) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | mucosa | (Oersted, 1843) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | mucosa | (Oersted, 1843) | SP | | endofauna | Nogueira, 1995 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | mucosa | (Oersted, 1843) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | mucosa | (Oersted, 1843) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m; Phylloco | Attolini, 1997 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | RS | | infra | Kawakami & Amaral, 1983 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 1 - 2m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Phyllodocidae | Anaitides | tamoya | Nonato, 1981(*) | SC | A, L | 50m | Temperini, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | Eteone | alba | Webster, 1879 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | Eteone | heteropoda | Hartman, 1951 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | Eteone | heteropoda | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 4 | Phyllodocidae | Eteone | heteropoda | Hartman, 1951 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | bilineata | (Johnston, 1840) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | bilineata | (Johnston, 1840) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | myriacyclum | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | myriacyclum | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | myriacyclum | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | myriacyclum | (Schmarda, 1861) | PR | | entre; costão | Lana, 1984 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | myriacyclum | (Schmarda, 1861) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | myriacyclum | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1984 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | myriacyclum | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | myriacyclum | (Schmarda, 1861) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | quinquelineata | Treadwell, 1901 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | viridis | (Linnaeus, 1767) | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1984 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | viridis | (Linnaeus, 1767) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1984 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | viridis | (Linnaeus, 1767) | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | viridis | (Linnaeus, 1767) | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 4 | Phyllodocidae | Eulalia | viridis | (Linnaeus, 1767) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 4 | Phyllodocidae | Eumida | sanguinea | (Oersted, 1843) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalesso, 1996 |
| 4 | Phyllodocidae | Eumida | sanguinea | (Oersted, 1843) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalesso, 1996 |
| 4 | Phyllodocidae | Eumida | sanguinea | (Oersted, 1843) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 4 | Phyllodocidae | Eumida | sanguinea | (Oersted, 1843) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4 | Phyllodocidae | <i>Eumida</i> | <i>sanguinea</i> | (Oersted, 1843) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1984 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Eumida</i> | <i>sanguinea</i> | (Oersted, 1843) | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Eumida</i> | <i>sanguinea</i> | (Oersted, 1843) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Eumida</i> | <i>sanguinea</i> | (Oersted, 1843) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Eumida</i> | <i>sanguinea</i> | (Oersted, 1843) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Genetyllis</i> | <i>castanea</i> | (Marenzeller, 1879) | PR | A | 1m | Lana, 1984 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Genetyllis</i> | <i>castanea</i> | (Marenzeller, 1879) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Genetyllis</i> | <i>castanea</i> | (Marenzeller, 1879) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; endofauna | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Hesionura</i> | <i>laubieri</i> | (Hartmann-Schröder, 1963) | SP, Ubatuba | | entre | Westheide, 1974 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Hesionura</i> | <i>laubieri</i> | (Hartmann-Schröder, 1863) | SC | | entre | Di Domenico et al., 2006 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Mystides</i> | <i>southerni</i> | Banse, 1954 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 8m | Lana, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Mystides (Pseudomystides)</i> | <i>elongata</i> | Southern, 1914 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Paranaitis</i> | <i>speciosa</i> | (Webster, 1870) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>arenae</i> | Webster, 1879 | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>lamelligera</i> | (Linnaeus, 1791) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>laminosa</i> | (Savigny, 1819) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>macrophthalma</i> | Schmarda, 1861 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | PR | AF, AMF | 28m | Lana, 1984 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45 m | Maciel, 1996 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | SP, Litoral Norte | | 15 - 100 m | Paiva, 1990 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce</i> | <i>mucosa</i> | Oersted, 1843 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Phyllodoce (Genetyllis)</i> | <i>castanea</i> | (Marenzeller, 1879) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 4 | Phyllodocidae | <i>Protomystides</i> | <i>bidentata</i> | (Langerhans, 1880) | RJ | A | 32m | Temperini, 1981 |
| 4 | Sphaerodorididae | <i>Ephesiopsis</i> | <i>guayanae</i> | Hartman & Fauchald, 1971 | SP | L | 100m | Rizzo, 2002 |
| 4 | Sphaerodorididae | <i>Ephesiopsis</i> | <i>guayanae</i> | Hartman & Fauchald, 1971 | RJ | | | Rizzo, 2006b |
| 4 | Sphaerodorididae | <i>Ephesiopsis</i> | <i>guayanae</i> | Hartman & Fauchald, 1971 | SP | | | Rizzo, 2006b |
| 4 | Thyphloscolecidae | <i>Sagitella</i> | <i>kowalewakii</i> | Wagner, 1872 | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 4 | Thyphloscolecidae | <i>Sagitella</i> | <i>kowalewakii</i> | Wagner, 1872 | RS | | 75 - 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Thyphloscolecidae | <i>Travisiopsis</i> | <i>dubia</i> | Stöp-Bowitz, 1948 | RS | | 75m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Thyphloscolecidae | <i>Travisiopsis</i> | <i>lobifera</i> | Levinsen, 1885 | RS | | 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Thyphloscolecidae | <i>Typhloscolex</i> | <i>muelleri</i> | Busch, 1851 | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 4 | Thyphloscolecidae | <i>Typhloscolex</i> | <i>muelleri</i> | Busch, 1851 | RS | | 75 - 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>elegans</i> | Chun, 1888 | RS | | 75m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>helgolandica</i> | Greeff, 1879 | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>ligulata</i> | Rosa, 1908 | RS | | 0 - 246m | Tebble, 1960 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>planktonis</i> | Apstein, 1900 | RS | | 75 - 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>planktonis</i> | Apstein, 1900 | BA | | infra | Tebble, 1960 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>planktonis</i> | Apstein, 1900 | RN | | infra | Tebble, 1960 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>planktonis</i> | Apstein, 1900 | RS | | infra | Tebble, 1960 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>rolasi</i> | Greeff, 1885 | RS | | plâncton ? | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>septentrionalis</i> | Quatrefages, 1865 | RS | | 100m | Orensanz & Ramirez, 1973 |
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>septentrionalis</i> | Quatrefages, 1865 | RN | | infra | Tebble, 1960 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 4 | Tomopteridae | <i>Tomopteris</i> | <i>septentrionalis</i> | Quatrefages, 1865 | RS | | infra | Tebble, 1960 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Amphinoe</i> | <i>rostrata</i> | (Pallas, 1766) | RJ | | entre | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Amphinoe</i> | <i>rostrata</i> | (Pallas, 1766) | SP | | entre | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Amphinoe</i> | <i>rostrata</i> | (Pallas, 1766) | PE | OS | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Amphinoe</i> | <i>rostrata</i> | (Pallas, 1766) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Amphinoe</i> | <i>rostrata</i> | (Pallas, 1766) | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | AM | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | CE | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | MA | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | PA | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | PB | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | PE | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | PI | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | RN | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | AL | A, L, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 5 | Amphinomidae | <i>Chloeia</i> | <i>viridis</i> | Schmarda, 1861 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | AL | | | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1776) | BA, Abrolhos | | | Barroso et al., 2006 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1776) | PE, Arq. S. Pedro / S. Paulo | | | Barroso et al., 2006 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1776) | PE, F. de Noronha | | | Barroso et al., 2006 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1776) | BA, Abrolhos | OS | 10m | Paiva et al., 2006 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1776) | BA, Abrolhos | SP | entre | Paiva et al., 2006 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | Brasil | | | Paiva, 2006 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | A | entre | Pardo & Amaral, 2006 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m ; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, I. S. Sebastião | AMG | entre | Pardo, 1995 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, I. S. Sebastião | AMG | entre | Reis, 1995 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | | | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | | | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | | | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | | | Rizzo, 1998 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, S. Sebastião | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | RN | | infra | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | BA | | fauna associada | Treadwell, 1932 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>complanata</i> | (Pallas, 1766) | SP, I. S. Sebastião | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>parvecarunculata</i> | Horst, 1912 | RJ | | infra | Luederwaldt, 1929 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Eurythoe</i> | <i>paupera</i> | (Grube, 1856) | SP, I. S. Sebastião | | entre | |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 5 | Amphinomidae | <i>Hermodice</i> | <i>carunculata</i> | (Pallas, 1776) | Brasil | | | Rodrigues et al., 2006 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hermodice</i> | <i>carunculata</i> | (Pallas, 1766) | PE | | | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hermodice</i> | <i>carunculata</i> | (Pallas, 1766) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hipponoa</i> | <i>gaudichaudi agulhana</i> | Day, 1967 | PR | | infra; subst. Flutuante | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hipponoa</i> | <i>gaudichaudi agulhana</i> | Day, 1967 | RS | | infra; subst. Flutuante | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hipponoa</i> | <i>gaudichaudi agulhana</i> | Day, 1967 | PR | OS | infra | Lana, 1984 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hipponoa</i> | <i>gaudichaudi agulhana</i> | Day, 1967 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hipponoa</i> | <i>gaudichaudi agulhana</i> | Day, 1967 | RS | | infra | Orensanz & Gianiucu, 1974 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hipponoe</i> | <i>gaudichaudi</i> | Audouin & M. Edwards, 1830 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Hypponoe</i> | <i>gaudichaudi</i> | Audouin & M. Edwards, 1830 | SP, S. Sebastião | | subst. flutuante | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | Brasil, Sul | | 250 - 3000m | Almeida et al., 2007 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | PR | AL | 10 - 15m; estuário | Lana, 1984 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | PR, Paranaguá | L | 13m; estuário | Lana, 1986b |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | L | 15m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | L | 15m | Morgado, 1988 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Linopherus</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Notopygos</i> | <i>crinita</i> | Grube, 1855 | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Notopygos</i> | <i>crinita</i> | Grube, 1855 | AL | A, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>posterobranchiata</i> | Barroso & Paiva, 2008 | RJ, B. de Campos | | 900 - 2000m | Barroso & Paiva, 2008 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | PR | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | RJ | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | SC | OS | 160m | Lana, 1984 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | SC | C | 160m | Temperini, 1981 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | SP | L | 54m | Temperini, 1981 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Paramphинome</i> | <i>besnardii</i> | Temperini, 1981(*) | RJ | A, L | 63m | Temperini, 1981 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Amaral & Nonato, 1982 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Amaral & Nonato, 1982 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | PR | | | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | | | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | SP | entre | Nonato, 1981 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | SP | entre | Nonato, 1981 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | | infra | Nonato, 1981 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 5 | Amphinomidae | <i>Pseudeurythoe</i> | <i>ambigua</i> | (Monro, 1933) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 5 | Euphrosinidae | <i>Euphrosine</i> | <i>aurantiaca</i> | Johnson, 1897 | AL | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Euphrosinidae | <i>Euphrosine</i> | <i>aurantiaca</i> | Johnson, 1897 | PE | | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Euphrosinidae | <i>Euphrosine</i> | <i>triloba</i> | Ehlers, 1887 | RJ | AL | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 5 | Euphrosinidae | <i>Euphrosine</i> | <i>triloba</i> | Ehlers, 1887 | SP, S. Sebastião | AL | infra | Amaral & Nonato, 1994 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>moniloceras</i> | (Moore, 1909) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, V. Carvalho | AF, AMF | estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1928) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>rudolphi anoculata</i> | Hartman, 1965 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>rudolphi anoculata</i> | Hartman, 1965 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>sociabilis</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>sociabilis</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>sociabilis</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>sociabilis</i> | (Webster, 1879) | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>sociabilis</i> | (Webster, 1879) | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Dorvillea</i> | <i>sociabilis</i> | (Webster, 1879) | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Pettiboneia</i> | <i>sanmatiensis</i> | Orensan, 1973 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Pettiboneia</i> | <i>sanmatiensis</i> | Orensan, 1973 | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Pettiboneia</i> | <i>sanmatiensis</i> | Orensan, 1973 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Pettiboneia</i> | <i>sanmatiensis</i> | Orensan, 1973 | SP | C | 26m | Temperini, 1981 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Protodorvillea</i> | <i>kefersteini</i> | (McIntosch, 1869) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Protodorvillea</i> | <i>simplex</i> | Temperini, 1981 (*) | RJ | A | 32m | Temperini, 1981 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Schistomerings</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | Brasil, Sul | | 250 - 3000m | Almeida et al., 2007 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Schistomerings</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Schistomerings</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | AMG, AG, AM, AF | entre | Corbisier, 1989 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Schistomerings</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | PR | L | 136m | Lana, 1984 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Schistomerings</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Schistomerings</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP | | 17 - 35m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Schistomerings</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Schistomerings</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Stauronereis</i> | <i>annulata</i> | (Moore, 1906) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Stauronereis</i> | <i>annulata</i> | (Moore, 1906) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Stauronereis</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Stauronereis</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Stauronereis</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | | infra | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Stauronereis</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | | infra | Morgado, 1988 |
| 6 | Dorvilleidae | <i>Stauronereis</i> | <i>rudolphi</i> | (delle Chiaje, 1828) | SC | C | 160m | Temperini, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>antennata</i> | (Savigny, 1820) | SP | | infra; endofauna | Nogueira, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>antennata</i> | (Savigny, 1820) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>aphroditoides</i> | (Pallas, 1788) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>aphroditoides</i> | (Pallas, 1788) | PE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>aphroditoides</i> | (Pallas, 1788) | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|--------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>argentinensis</i> | (Treadwell, 1929) | SP | OS | 37 - 100m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>argentinensis</i> | (Treadwell, 1929) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>argentinensis</i> | (Treadwell, 1929) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>argentinensis</i> | (Treadwell, 1929) | SP | OS | plâncton | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>argentinensis</i> | (Treadwell, 1929) | BA | | plâncton | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>argentinensis</i> | (Treadwell, 1929) | RN | | plâncton | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>atlantica</i> | Kinberg, 1865 | BA, Salvador | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>atlantica</i> | Kinberg, 1865 | BA, Salvador | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>atlantica</i> | Kinberg, 1865 | BA, Salvador | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>biannulata</i> | Moore, 1904 | AL | A, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>biannulata</i> | Moore, 1904 | SE | A, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>biannulata</i> | Moore, 1904 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>biannulata</i> | Moore, 1904 | PR | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>biannulata</i> | Moore, 1904 | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | SE | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>binominata</i> | Quatrefages, 1865 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | Brasil, Nordeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RJ, B. de Sepetiba | OS | | Omena et al., 2006a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | AL | AG, AM, AF, AMF, OS | 18 - 50 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | BA | AG, AM, AF, AMF, OS | 18 - 50 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | ES | AG, AM, AF, AMF, OS | 18 - 50 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RJ | AG, AM, AF, AMF, OS | 18 - 50 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SE | AG, AM, AF, AMF, OS | 18 - 50 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | AL | AG, AM, AF, AMF, OS | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | ES | AG, AM, AF, AMF, OS | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RJ | AG, AM, AF, AMF, OS | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SE | AG, AM, AF, AMF, OS | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | AL | | 50 - 60 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | BA | | 50 - 60 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | ES | | 50 - 60 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RJ | | 50 - 60 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SE | | 50 - 60 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | BA | AG, AM, AF, AMF, OS | | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>conglomerans</i> | Ehlers, 1887 | BA | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>conglomerans</i> | Ehlers, 1887 | | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>conglomerans</i> | Ehlers, 1887 | Brasil, 04°32'N 50°18'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>conglomerans</i> | Ehlers, 1887 | Brasil, 22°18'S 40°48'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>conglomerans</i> | Ehlers, 1887 | ES | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>donathi</i> | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | BA | OS | 29 - 65 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>donathi</i> | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | ES | OS | 29 - 65 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>donathi</i> | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | RJ | OS | 29 - 65 m | Zanol et al., 2000 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6 | Eunicidae | Eunice | donathi | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | BA | | 55 - 62m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | donathi | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | ES | | 55 - 62m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | donathi | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | RJ | | 55 - 62m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | edwinlinkae | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | BA | OS | 135 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | edwinlinkae | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | ES | OS | 135 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | edwinlinkae | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | RJ | OS | 135 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | edwinlinkae | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | ES | OS | 40 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | edwinlinkae | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | BA | | 40 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | edwinlinkae | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | RJ | | 40 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | A, OS | 5 - 63m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | A, OS | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | RJ | | fauna associada; 1 - 72 m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | AL | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | BA | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | CE | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | ES | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | PB | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | PE | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | RJ | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | RN | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | SE | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | AL | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | BA | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | CE | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | ES | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | PB | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | PE | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | RN | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | SE | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | SP | | 1 - 72 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | filamentosa | Grube, 1856 | SP | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | floridana | (Pourtales, 1869) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | floridana | (Pourtales, 1869) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | frauenfeldi | Grube, 1866 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | BA, Abrolhos | | fauna associada | Costa-Paiva & Paiva, 2007 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | Brasil, Sudeste | infra | | Costa-Paiva & Paiva, 2007 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | Brasil, 20°36'S 35°51'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | RJ | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | ES | | 1 - 110m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|--------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | RJ | | 1 - 110m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | BA | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | ES | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | fucata | Ehlers, 1887 | BA | | 1 - 110 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | guanica | (Treadwell, 1921) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | imogena | (Monro, 1924) | RJ, Ilha Grande | OS | 0,5 - 5m | Alonso et al., 2009 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2000 | BA | | | Costa-Paiva & Paiva, 2007 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP | A | entre; fauna associada | Nogueira et al., 2001b |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, S. Sebastião | | entre | Nogueira, 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | BA, Salvador | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | Brasil, 25°44'S 48°22'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | BA, 17°57'S 38°42'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner, 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Steiner, 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Steiner, 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | insularis | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, S. Sebastião | | infra | Steiner, 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | longicerrata | Webster, 1884 | AL | A, L, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | longicerrata | Webster, 1884 | SE | A, L, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | marconii | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira et al., 2001b |
| 6 | Eunicidae | Eunice | marconii | Nogueira, Steiner & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | marcusi | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | RJ | | 20 - 44m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | marcusi | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | ES | AM | 20 - 44m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | marcusi | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | RJ | AM | 20 - 44m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | marcusi | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | ES | | 20 - 44m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | miurai | Carrera-Parra & Salazar-Vallejo, 1998 | Brasil, 00°28'N 45°32'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | multicylindri | Shisko, 1981 | RJ | AG, AM | 20 - 60m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | multicylindri | Shisko, 1981 | BA | AG, AM | 20 - 60m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | multicylindri | Shisko, 1981 | ES | AG, AM | 20 - 60m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | mutilata | Webster, 1884 | BA | | 50 - 110m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | mutilata | Webster, 1884 | ES | | 50 - 110m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | nicidioformis | Treadwell, 1906 | RJ | | 60m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | norvegica | (Linnaeus, 1767) | RJ, B. de Campos | | infra; fauna associada | Santos et al., 2007b |
| 6 | Eunicidae | Eunice | norvegica | (Linnaeus, 1767) | RJ, Macaé | | 700 - 1000m; fauna associada | Brasil et al., 2007 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | Brasil, Sudeste | infra | | Costa-Paiva & Paiva, 2007 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | AL | | 20 - 100m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | BA | | 20 - 100m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | ES | | 20 - 100m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | RJ | | 20 - 100m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | SE | | 20 - 100m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | AL | AM | infra | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | BA | AM | infra | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | ES | AM | infra | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | RJ | AM | infra | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | ornata | Andrews, 1891 | SE | AM | infra | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | parva | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>parva</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>parva</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>parva</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>parva</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>prayensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AL, C | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>prayensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>prayensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>roussaei</i> | Quatrefages, 1866 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>roussaei</i> | Quatrefages, 1866 | RJ | AG | 15m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | costão; fauna associada | Costa-Paiva & Paiva, 2007 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | PR | OS | infra | Lana, 1984 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981b |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado & Amaral, 1981b |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP | | infra; endofauna | Nogueira, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | AL | A, L, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SE | A, L, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | RS | AL | 18m | Nonato, 1966a |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | RJ | | entre | Nonato, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | RS | L | 18m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | AL | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | BA, Salvador | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | BA, Salvador | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | Brasil, 23°50'S 45°56'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | ES, Guarapari | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP | | entre | Steiner & Amaral, 2001 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|--------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>rubra</i> | Grube, 1856 | SP, I. S. Sebastião | | entre; Leodice | Treadwell, 1932 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>sebastiani</i> | Nonato, 1965 | SP | | | Amaral & Morgado, 1999 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>sebastiani</i> | Nonato, 1965 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>sebastiani</i> | Nonato, 1965 | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>sebastiani</i> | Nonato, 1965 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Nonato, 1965 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>sebastiani</i> | Nonato, 1965 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>sebastiani</i> | Nonato, 1965 | SP, S. Sebastião | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>stigmatura</i> | (Verril, 1900) | Brasil, 19°45'S 39°31'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>stigmatura</i> | (Verril, 1900) | Brasil, 22°55'S 41°13'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>stigmatura</i> | (Verril, 1900) | Brasil, 26°46'S 40°05'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>stigmatura</i> | (Verril, 1900) | RJ | A, OS | 58 - 100m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>stigmatura</i> | (Verril, 1900) | ES | A, OS | 58 - 100m | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tenuis</i> | (Treadwell, 1921) | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tenuis</i> | (Treadwell, 1921) | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tenuis</i> | (Treadwell, 1921) | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tenuis</i> | (Treadwell, 1921) | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tenuis</i> | (Treadwell, 1921) | SP | | infra; endofauna | Nogueira, 1995 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>thomasiana</i> | Augener, 1922 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>thomasiana</i> | Augener, 1922 | BA | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>thomasiana</i> | Augener, 1922 | BA | | 37 - 67m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>thomasiana</i> | Augener, 1922 | ES | | 37 - 67m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>thomasiana</i> | Augener, 1922 | RJ | | 37 - 67m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tridentata</i> | Ehlers, 1905 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tridentata</i> | Ehlers, 1905 | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tridentata</i> | Ehlers, 1905 | PE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tridentata</i> | Ehlers, 1905 | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tubifex</i> | Crossland, 1904 | RJ, Ilha Grande | OS | 0,5 - 5m | Alonso et al., 2009 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tubifex</i> | Crossland, 1904 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>tubifex</i> | Crossland, 1904 | SP, S. Sebastião | | entre | Rocha, 1993 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>unifrons</i> | (Verrill, 1900) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>unifrons</i> | (Verrill, 1900) | Brasil, 21°41'25"S 40°21'16"W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>unifrons</i> | (Verrill, 1900) | BA, Salvador | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>unifrons</i> | (Verrill, 1900) | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>unifrons</i> | (Verrill, 1900) | Brasil, 18°34'S 38°04'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>violaceomaculata</i> | Ehlers, 1887 | RJ | | 60 - 150m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP | AL, OS | 88m | Lana, 1984 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | L | 10 - 15m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | L | 10 - 15m | Morgado, 1988 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Eunicidae | Eunice | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP | L, OS | 18 - 103m | Rullier & Amoureux, 1979 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>vitatta</i> | (delle Chiaje, 1828) | RS | | 183m | Temperini, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>vittata</i> | (delle Chiaje, 1828) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 1998 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>vittata</i> | (delle Chiaje, 1828) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>wasinensis</i> | Fauchald, 1992 | BA | | infra; fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | AL | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | BA | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | ES | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | RJ | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | SE | | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | AL | | 1 - 100 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | BA | | 1 - 100 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | ES | | 1 - 100 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | RJ | | 1 - 100 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice</i> | <i>websteri</i> | Fauchald, 1969 | SE | | 1 - 100 m; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | PR | OS | entre; costão | Lana, 1984 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP | | endofauna | Nogueira, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | AL | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, I. S. Sebastião | AMG | entre | Pardo, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, I. S. Sebastião | AMG | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | AL | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | BA | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | PE | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RJ | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RN | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SE | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, Ubatuba | OS | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | AL | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciation)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciidion)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciidion)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciidion)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciidion)</i> | <i>cariboea</i> | Grube, 1856 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciidion)</i> | <i>imogena</i> | Monro, 1924 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Eunice (Niciidion)</i> | <i>kinbergi</i> | Webster, 1884 | AL | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Euniphysa</i> | <i>rudis</i> | Nonato, 1981(*) | RS | | entre | Nonato, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Leodice</i> | <i>atlantica</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | Brasil | | | Amaral et al., 1998b |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessos, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, I. de Alcatrazes | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Laje de Santos | | 2 - 13 m; fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SE | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | A | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | AL | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | BA | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | PB | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RN | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | A, OS | 18 - 75m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | PE | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | AL | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | PB | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 6 | Eunicidae | <i>Lysidice</i> | <i>ninetta</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>angelensis</i> | Fauchald, 1970 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessos, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>angelensis</i> | Fauchald, 1970 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>angelensis</i> | Fauchald, 1970 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>angelensis</i> | Fauchald, 1970 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>angelensis</i> | Fauchald, 1970 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>conferta</i> | Moore, 1911 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>disjuncta</i> | Hartman, 1961 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>formosa</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>formosa</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | A | entre | Pardo & Amaral, 2006 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>formosa</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>formosa</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>formosa</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | AM, AF, AMF, AL | entre | Steiner & Amaral, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>formosa</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP | | entre | Steiner, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | PR | AF, AMF, AL | 25; 68 - 137m | Lana, 1984 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SC | AL | 68 - 137m | Lana, 1984 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SP | AL | 68 - 137m | Lana, 1984 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado, 1988 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SP | | 48 - 117m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SC | A, L, C | 50, 160m | Temperini, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>kinbergi</i> | McIntosh, 1910 | SP | A, L | 63m | Temperini, 1981 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>regalis</i> | Verrill, 1900 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>regalis</i> | Verrill, 1900 | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>regalis</i> | Verrill, 1900 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>regalis</i> | Verrill, 1900 | Brasil | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>regalis</i> | Verrill, 1900 | RJ, 22°55'S 44°10'W | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | PR | | entre; costão | Lana, 1984 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP | | infra; endofauna | Nogueira, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | RS | AL | 18m | Nonato, 1966a |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Marphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | RS | L | 18m | Orensan & Gianuca, 1974 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | infra | | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | BA | infra | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SE | infra | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | PR | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sanguinea</i> | (Montagu, 1815) | SP, I. S. Sebastião | entre | | Treadwell, 1932 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sebastiana</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, Caraguatatuba | entre | | Omena & Amaral, 2003 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sebastiana</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | entre | | Amaral et al., 2003 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sebastiana</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | entre | | Omena & Amaral, 2003 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sebastiana</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sebastiana</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sebastiana</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sebastiana</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP, S. Sebastião | AM, AF, AMF, AL | entre | Steiner & Amaral, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>sebastiana</i> | Steiner & Amaral, 2000 | SP | entre | | Steiner, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>stylobranchiata</i> | Moore, 1909 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>stylobranchiata</i> | Moore, 1909 | AL | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | <i>Morphysa</i> | <i>stylobranchiata</i> | Moore, 1909 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Amaral et al., 2003 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | infra; endofauna | | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, Ubatuba | infra; endofauna | | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | franja, infra; endofauna | | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, Ubatuba | franja, infra; endofauna | | Morgado, 1980 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, I. de Alcatrazes | fauna associada | | Nogueira, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Reis et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo & Amaral, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo & Amaral, 1998 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Rizzo, 1998 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | BA | fauna associada | | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, Ubatuba | entre; endofauna | | Souza, 1989 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP, S. Sebastião | entre | | Steiner & Amaral, 1998 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>hebes</i> | Verrill, 1900 | SP | entre | | Steiner, 2000 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>schmardae</i> | McIntosh, 1885 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>schmardae</i> | McIntosh, 1885 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Eunicidae | <i>Nematonereis</i> | <i>schmardae</i> | McIntosh, 1885 | PR | infra | | Lana, 1987 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | schmardae | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | schmardae | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | schmardae | McIntosh, 1885 | SP | | infra; endofauna | Nogueira, 1995 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | schmardae | McIntosh, 1885 | RJ | | | Nonato, 1981 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | schmardae | McIntosh, 1885 | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | schmardae | McIntosh, 1885 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | schmardae | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | schmardae | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | unicornis | (Grube, 1840) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | unicornis | (Grube, 1840) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | unicornis | (Grube, 1840) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Eunicidae | Nematonereis | unicornis | (Grube, 1840) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | BA, Abrolhos | | | Paiva, 2001 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | Brasil, 11°40'01"S 26°52'52"E | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | Brasil, 20°40'20"S 37°41'36"E | | | Silva, 2002 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | BA | L | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | ES | L | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | RJ | L | entre | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | BA | L | 22 - 125m ; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | ES | L | 22 - 125m ; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Palola | brasiliensis | Zanol, Paiva & Attolini, 2000 | RJ | L | 22 - 125m ; fauna associada | Zanol et al., 2000 |
| 6 | Eunicidae | Palola | esbelta | Morgado & Amaral, 1981 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Eunicidae | Palola | siciliensis | (Grube, 1840) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Eunicidae | Palola | siciliensis | (Grube, 1840) | AL | A, L, OS | 21 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Eunicidae | Palola | siciliensis | (Grube, 1840) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Eunicidae | Palola | siciliensis | (Grube, 1840) | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | arreliai | Amaral & Morgado, 1997 | Brasil | | | Amaral & Morgado, 1997 |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | arreliai | Amaral & Morgado, 1997 | SP | | | Steiner & Amaral, 1999b |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | arreliai | Amaral & Morgado, 1997 | SP, S. Pedro | | Gruta da Peroba | Steiner & Amaral, 1999b |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | arreliai | Amaral & Morgado, 1997 | SP, S. Pedro | | | Amaral & Morgado, 1997 |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | circensis | Steiner & Amaral, 1999 | PR | | | Steiner & Amaral, 1999b |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | platensis | Cordero, 1927 | SP | | | Steiner & Amaral, 1999b |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | platensis | Cordero, 1927 | SP, Cananéia | | riacho | Steiner & Amaral, 1999b |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | robustus | Steiner & Amaral, 1999 | SP | | | Steiner & Amaral, 1999b |
| 6 | Histiobdellidae | Stratiodrilus | robustus | Steiner & Amaral, 1999 | SP, Iguape | | Rio Esentredo | Steiner & Amaral, 1999b |
| 6 | Iphitimidae | Iphitime | sartorae | Paiva & Nonato, 1991 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 50m; comensal | Paiva & Nonato, 1991 |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | RS | L, OS | 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | RS | AF, AMF, OS | 30 - 150m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | SC (mat. ex., lat.) | AF, AMF, OS | 30 - 150m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | SP, Ubatuba | AF, AMF, OS | 30 - 150m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | RS | A, L, OS | 150m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | PR | AF, AMF | 30 - 50m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 30 - 50m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | SC | AF, AMF, OS | 30m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Arabelloneris | janeirensis | (Augener, 1934) | SP | AF, AMF | 36m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Augeneria | tentaculata | Monro, 1930 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Lumbrineridae | Augeneria | tentaculata | Monro, 1930 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 50m | Morgado, 1988 |
| 6 | Lumbrineridae | Dianinoe | nonatoi | (Camargo & Lana, 1995) | SP | AL | 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | Dianinoe | nonatoi | (Camargo & Lana, 1995) | RJ | AL | 70 - 100m | Camargo & Lana, 1994 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6 | Lumbrineridae | Dianinoe | nonatoi | (Camargo & Lana, 1995) | RS | AL | 70m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | Dianinoe | orensanzi | (Camargo & Lana, 1995) | RJ | AL | 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | Dianinoe | orensanzi | (Camargo & Lana, 1995) | RS | AL | 50m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbricalus | januarii | (Grube, 1878) | PR, B. de Paranaguá | | fauna associada | Sordo & Lana, 2007 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbricalus | januarii | (Grube, 1878) | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbricalus | januarii | (Grube, 1878) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbricalus | januarii | (Grube, 1878) | SP | | entre | Steiner & Amaral, 2001 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbricalus | januarii | (Grube, 1878) | SP | | entre | Steiner, 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gease | Orensan, 1973 | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 0 - 50m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | RJ | AF, AMF | 1 - 47m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | ES | AL | entre | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | ES | AL | 0 - 30m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | SP, Ubatuba | A, AF, AMF, L | 0 - 50m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | RJ | AM | 31m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | SP | AF, AMF | 35, - 47m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrinerides | gesae | Orensan, 1973 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SC | | 70m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | RJ | | 90 - 110m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 90m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | RJ | AF, AMF, L | 90m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SC | AF, AMF, L | 90m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, Ubatuba | | entre | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | PR | L | 8m; estuário | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | RJ | AM, AF, AMF, AL | 31 - 90m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP | AF, AMF | 35 - 45m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | RS | AL | 48 m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 90m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, Ubatuba | | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | PR | L | 8m; estuário | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | PR | AL | entre | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | mucronata | (Ehlers, 1908) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineriopsis | paradoxa | (Saint Joseph, 1888) | SP, Ubatuba | AMG | 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineris | albidentata | (Ehlers, 1908) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineris | albifrons | Crossland, 1924 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineris | albifrons | Crossland, 1924 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineris | albifrons | Crossland, 1924 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineris | albifrons | Crossland, 1924 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineris | albifrons | Crossland, 1924 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Lumbrineridae | Lumbrineris | albifrons | Crossland, 1924 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>albifrons</i> | Crossland, 1924 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>albifrons</i> | Crossland, 1924 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>albifrons</i> | Crossland, 1924 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 25 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 25 - 35m | Morgado, 1988 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>angrense</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>atlantica</i> | (Kinberg, 1865) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>atlantica</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | | 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>atlantica</i> | (Kinberg, 1865) | SC | | 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>atlantica</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | AM, C | 40 - 136m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>atlantica</i> | (Kinberg, 1865) | SC | AM, C | 40 - 136m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>atlantica</i> | (Kinberg, 1865) | SC | A, OS | 136m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>atlantica</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | AM | 31m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>atlantica</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>brasiliensis</i> | | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | ES | | 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | ES | | 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP | | 20 - 60m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | RJ | | 50 - 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SC | | 50 - 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | RS | | 50 - 80m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | PR | | 50m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP, Ubatuba | A, L | 30 - 120m | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | PR | AM, AF, AMF, L, OS | 36 - 113m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | RJ | AM, AF, AMF, L, OS | 36 - 113m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | RS | AM, AF, AMF, L, OS | 36 - 113m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SC | AM, AF, AMF, L, OS | 36 - 113m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP | AM, AF, AMF, L, OS | 36 - 113m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | ES | AL | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | PR | AF, AMF, AL | 25, 50m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP, Ubatuba | A, L | 30 - 120m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | RJ | A, AM, AF, AMF, L | 50 - 97m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | RS | A, L | 82 - 113m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | ES | AL | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP, Ubatuba | AMG | 8m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | PR | AF, AMF, AL | 25 - 51m | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SC | AF, AMF, AL | 51m | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP, S. Sebatião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP | | 35 - 73m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cingulata</i> | (Ehlers, 1897) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>coccinea</i> | (Reiner, 1804) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>coccinea</i> | (Renier, 1804) | ES | | entre | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>coccinea</i> | (Renier, 1804) | ES | AL | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>coccinea</i> | (Renier, 1804) | ES | AL | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>coccinea</i> | (Renier, 1804) | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>coccinea</i> | (Renier, 1804) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cruzensis</i> | Hartman, 1944 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cruzensis</i> | Hartman, 1944 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cruzensis</i> | Hartman, 1944 | ES | | entre | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cruzensis</i> | Hartman, 1944 | ES | AL | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cruzensis</i> | Hartman, 1944 | ES | AL | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>cruzensis</i> | Hartman, 1944 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>curtobolata</i> | Camargo & Lana, 1995 | PR ?(no mapa) | AF, AMF | infra | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>curtobolata</i> | Camargo & Lana, 1995 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>hebes</i> | Verril, 1880 | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>hebes</i> | Verril, 1880 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>hebes</i> | Verril, 1880 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>hebes</i> | Verril, 1880 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>hebes</i> | Verril, 1880 | SP, Cananéia | A, L | entre | Tararam, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | RJ, Ilha Grande | OS | 0,5 - 5m | Alonso et al., 2009 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | RJ, B. de Sepetiba | OS | | Omena et al., 2006a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | SC | | 40m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | SP | | 50 - 60m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | ES | | 50m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 50 m | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | SP, Ubatuba | AL | entre | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | ES | AL | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | PR | AF, AMF | infra; estuário | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | SP, Ubatuba | A, L | 50 m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | PR | OS | entre; costão | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | SP, Ubatuba | A, L | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | ES | AL | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | PR | OS | entre; costão | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | AL | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>inflata</i> | Moore, 1911 | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | SC | AF, AMF | 30m | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>janeirensis</i> | (Augener, 1934) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SP, Litoral sul | AF, AMF, L | 40 m | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | PR | A, L, OS | 33m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | PR | A, L, | estuário | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | PR | AF, AMF | 28m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SC | A, L | 33m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SP, Litoral sul | A, L | 40 m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | PR | A, L | 0,5, 6, 8m; estuário | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | PR | AF, AMF, AL | 5 - 25m | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | PR, Paranaguá | L, OS | 5, 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SP | A | 10 - 17m | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>januarii</i> | (Grube, 1878) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, Ubatuba | A, L | 0 - 140m | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, Ubatuba | A, L | entre | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | PR | AF, AMF, AL | 0 - 136m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | ES | AF, AMF | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | RJ (mat. exa., lat.) | AF, AMF | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, Ubatuba | A, L | 0 - 140m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, Ubatuba | A, L | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | RJ | AF, AMF | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | ES | AL | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | RS | AL | 18m | Nonato, 1966a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | RS | L | 18m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | PB | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | PE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | RS | A | 25m | Temperini, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | SC | A, L, C | 50, 160m | Temperini, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>latreilli</i> | Audouin & M. Edwards, 1834 | PR | C | 70m | Temperini, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>limicola</i> | Hartnab, 1944 | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SP | | 20 - 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | | 50 - 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | ES | | 50m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SC | | 50m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | ES | | entre | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SP | A, L | 0 - 100m | Camargo & Lana, 1995a?; b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SP | A, L | entre | Camargo & Lana, 1995a?; b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | PR (mater. exam.) | AF, AMF, L | 20 - 70m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SC | AF, AMF, L | 20 - 70m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | AF, AMF, L | 50 - 100m | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | ES | AF, AMF, AL | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | AF, AMF, AL | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SP | A, L | 0 - 100m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | AL | 37 - 97m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SC | AL | 48m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SP | A, L | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | AF, AMF | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | ES | AL | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>magalhaensis</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m ; Lumbrinereis | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>mainae</i> | (Camargo & Lana, 1995) | SC | | entre | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>mainae</i> | (Camargo & Lana, 1995) | SC | AL | entre | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>minima</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>minima</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>minima</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>paradoxa</i> | (Saint Joseph, 1888) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>paradoxa</i> | (Saint Joseph, 1888) | SP, Ubatuba | AL | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>paradoxa</i> | (Saint Joseph, 1888) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | AM | entre | Amaral et al., 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | Brasil | | | Amaral et al., 1998a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | | | 20m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP | | 30 - 60m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | RJ | | 50m | Camargo & Lana, 1994 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR | | infra; estuário | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 50m; costão | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | entre; costão | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | entre; estuário | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 50m; estuário | Camargo & Lana, 1995a,b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | RJ | A, L | entre; costão | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR | L, AL, OS | infra; estuário | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | RJ | AF, AMF | infra | Camargo & Lana, 1995b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | RJ | AM | 31m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | RS | AF, AMF | 4m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 50m; costão | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | entre; costão | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR | OS | entre; costão | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | RJ | AF, AMF | entre | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | entre; estuário | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR | L, AL | entre; estuário | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR | L, OS | 0,5, 1, 8m ; estuário | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 50m; estuário | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR | L | 10,5m | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR | OS | entre; costão | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR, Paranaguá | A, L, OS | 10,5m; estuário | Lana, 1986b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, I. S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR, Paranaguá | AL | entre | Netto & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | PR, Paranaguá | AL | entre; estuário | Netto & Lana, 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP | | infra; endofauna | Nogueira, 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Cananéia | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Santos | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | tetraura | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | AL | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP | | entre | Steiner & Amaral, 2001 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | SP | | entre | Steiner, 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lumbrineris</i> | <i>treadwelli</i> | Hartman, 1942 | AL | A | 0 - 20m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1965 | SC | | infra | Almeida et al., 2009 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | Brasil | | | Amaral et al., 1998a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Santos | AF, AMF, L | 20 - 60m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 20 - 60m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | AF, AMF, L | 50, 100m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SC | AF, AMF, L | 50m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR | | infra; estuário | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RS | AF, AMF, L | 10m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | AF, AMF, L | 20 - 77m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP | AF, AMF, L | 20 - 77m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 20 - 77m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SC | AF, AMF, L | 50m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | A, L | 6 - 80m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR | L | 6m; estuário | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SC | AL | 37m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | A, L | 6 - 80m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | AF, AMF, AL | 60 - 77m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR | AL | 2 - 8m; estuário | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR | L, AL | 1 - 17m | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 6 - 17 m; estuário | Lana, 1986b |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 50m | Morgado, 1988 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP | | 16 - 48m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SC | L | 14; 52m | Temperini, 1981 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Ninoe</i> | <i>oculata</i> | | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Paraninoe</i> | <i>antarctica</i> | (Monro, 1930) | RS | A, L | 50m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Paraninoe</i> | <i>antarctica</i> | (Monro, 1930) | RS | A, L | 82m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Paraninoe</i> | <i>antarctica</i> | (Monro, 1930) | RS | A, L | 82m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Scoletoma</i> | <i>mainae</i> | (Camargo & Lana, 1995) | SC | | | Weiss & Pagliosa, 2006 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Scoletoma</i> | <i>tetraura</i> | (Schmarda, 1861) | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Scoletoma</i> | <i>treadwelli</i> | (Hatman, 1956) | ES | | 6 - 18m; fauna associada | Berlandi & Paiva, 2009 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP | | 40m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | | 60m | Camargo & Lana, 1994 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | AF, AMF, AL | 58 - 66m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Litoral sul | AF, AMF, AL | 60 - 70m | Camargo & Lana, 1995a |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | AF, AMF | 58m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Litoral sul | AL | 66m | Camargo, 1993 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP ou PR? | AL | 66m | Lana, 1984 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RS | L | 18m | Orensan & Gianuca, 1974 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Lumbrineridae | <i>Lysarete</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>aracaensis</i> | Steiner & Amaral, 2009 | SP, S. Sebastião | AMF, AF | entre | Steiner & Amaral, 2009 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>dubia</i> | Treadwell, 1922 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>dubia</i> | Treadwell, 1922 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>dubia</i> | Treadwell, 1922 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>dubia</i> | Treadwell, 1922 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>dubia</i> | Treadwell, 1922 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | RJ, Ilha Grande | | 0,5 - 5m | Alonso et al., 2009 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | PR | OS | entre; costão | Lana, 1984 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>iricolor</i> | (Montagu, 1804) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 6 | Oenonidae | <i>Arabella</i> | <i>multidentata</i> | (Ehlers, 1887) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | SC ou PR? | AL | 50m | Lana, 1984 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado, 1988 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>filum</i> | (Claparède, 1868) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>mulleri</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>mulleri</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>mulleri</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Litoral norte | | infra | Paiva, 1993a |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>tenuis</i> | (Ehlers, 1900) | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>tenuis</i> | (Ehlers, 1900) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Oenonidae | <i>Drilonereis</i> | <i>tenuis</i> | (Ehlers, 1900) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Oenonidae | <i>Halla</i> | <i>parthenopeia</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 6 | Oenonidae | <i>Halla</i> | <i>parthenopeia</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 6 | Oenonidae | <i>Labrostratus</i> | <i>prolificus</i> | Amaral, 1977 | SP, S. Sebastião | AMF, AF | entre | Steiner & Amaral, 2009 |
| 6 | Oenonidae | <i>Labrostratus</i> | <i>prolificus</i> | Amaral, 1977 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Oenonidae | <i>Labrostratus</i> | <i>prolificus</i> | Amaral, 1977 | SP, Ubatuba | | infra; endoparasita | Amaral, 1977a |
| 6 | Oenonidae | <i>Labrostratus</i> | <i>prolificus</i> | Amaral, 1977 | SP, Ubatuba | AM, L | 35m; endoparasita | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Oenonidae | <i>Labrostratus</i> | <i>prolificus</i> | Amaral, 1977 | SP, Ubatuba | AM, L | 35m; endoparasita | Morgado, 1988 |
| 6 | Oenonidae | <i>Labrostratus</i> | <i>prolificus</i> | Amaral, 1977 | SP | | entre | Steiner & Amaral, 2001 |
| 6 | Oenonidae | <i>Labrostratus</i> | <i>prolificus</i> | Amaral, 1977 | SP | | entre | Steiner, 2000 |
| 6 | Oenonidae | <i>Laranda</i> | <i>gracilis</i> | | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1887 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | AM, L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1887 | SP, Ubatuba | AM, L | 35m | Morgado, 1988 |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1887 | AL | A, L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1887 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1897 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1887 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>lorum</i> | Ehlers, 1887 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>virginis</i> | (Kinberg, 1865) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>virginis</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Oenonidae | <i>Notocirrus</i> | <i>virginis</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>diphyllidia</i> | Schmarda, 1861 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>diphyllidia</i> | Schmarda, 1861 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>diphyllidia</i> | Schmarda, 1861 | SP, Ubatuba | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>diphyllidia</i> | Schmarda, 1861 | SP, S. Sebastião | | infra; endofauna | Morgado & Amaral, 1981a |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>diphyllidia</i> | Schmarda, 1861 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>diphyllidia</i> | Schmarda, 1861 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>diphyllidia</i> | Schmarda, 1861 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>fulgida</i> | Savigny, 1818 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>fulgida</i> | Savigny, 1818 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>fulgida</i> | Savigny, 1818 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Oenonidae | <i>Oenone</i> | <i>fulgida</i> | Savigny, 1818 | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m; Americonuphis | Borzone, 1988 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | PR | AF, AMF | entre | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | SP | | entre | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário | Souza & Gianuca, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | PR | AF, AMF | 0 - 2m | Souza, 1991 |
| 6 | Onuphidae | <i>Australonuphis</i> | <i>casamiquelorum</i> | Orensan, 1974 | PR | AF, AMF | entre | Souza, 1991 |
| 6 | Onuphidae | <i>Brevibrachium</i> | <i>hanneloreae</i> | Lana, 1989 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Brevibrachium</i> | <i>hanneloreae</i> | Lana, 1989 | PR | A, L | 66 - 137m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | 10m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | SP, Caraguatatuba | A, AM, AF, AMF | entre | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | SP, S. Sebastião | | entre | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | SP, S. Sebastião | A | entre | Pardo & Amaral, 2006 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | CE, Fortaleza | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | SP, Caraguatatuba | AG, AM, AF, AMF, L | entre; 1 - 10m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | SP, Ubatuba | | entre; 1 - 10m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | SP, S. Sebastião | | entre; 1 - 10m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>aciculata</i> | Knox & Cameron, 1971 | Brasil | | | Steiner & Amaral, 2006b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | RS | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>brasiliensis</i> | Kinberg, 1865 | SE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>chilensis</i> | Quatrefages, 1865 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>chilensis</i> | Quatrefages, 1865 | SP, S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | Brasil, Nordeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | Brasil | | | Amaral et al., 1998a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | Sp, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Santos | AF, AMF | entre | Corbisier, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | PR | AL, OS | 4 - 16,5m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | PR, Paranaguá | A, AM, L, OS | 4 - 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | AMG | 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | A | 10 - 45m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | AMG | 45m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | AL | A, L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SE | A, L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP | | 15m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | BA, Ilhéus | AM, L | entre; estuário | Passos et al., 2006 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | RS | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP | | entre | Steiner, 2000 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Tararam, 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>cuprea</i> | (Bosc, 1802) | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 2 - 6m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | SP, Caraguatatuba | AM | entre | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | PR | AS, OS | 6 - 18m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | SP, Caraguatatuba | AG, AM, AF, AMF | entre; 1- 6m | Steiner, 2005 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | SP, Ubatuba | AG, AM, AF, AMF | entre; 1-6m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre; 1-6m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>dexiognatha</i> | Paxton & Bailey-Brock, 1986 | Brasil | | | Steiner & Amaral, 2006b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>longicornis</i> | | RJ | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>neapolitana</i> | delle Chiaje, 1841 | SP | | entre | Steiner, 2000 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | AL | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SE | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | RS | AM, AF, AMF | 12 - 35m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, Caraguatatuba | AM, AF, AMF | 12 - 35m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 12 - 35m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | SP, S. Sebastião | AM, AF, AMF | 12 - 35m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>ornata</i> | Moore, 1911 | Brasil | | | Steiner & Amaral, 2006b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>spiribranchis</i> | Augener, 1906 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>spiribranchis</i> | Augener, 1906 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>spiribranchis</i> | Augener, 1906 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>spiribranchis</i> | Augener, 1906 | AL | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>splendidissima</i> | Kinberg, 1865 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | PR | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 13 - 45m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | 15 - 45m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 8 - 45m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | PR | L, AL | 39 - 78m | Lana, 1984 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | PR | A, L, AL, C | 39 - 78m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | AL | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | BA | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | Brasil | | | Steiner & Amaral, 2006b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 15 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 15 - 50m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | AL | A, L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | RJ | | entre | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | | entre | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | BA | | | Silva, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SC | L | 13 - 183m | Temperini, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP | L | 13 - 183m | Temperini, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SC | A, L | 50, 174m | Temperini, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP | A, L | 54, 63m | Temperini, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | RJ | AG, AM, AF, AMF, AS, L | 8 - 157m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SC | AG, AM, AF, AMF, AS, L | 8 - 157m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>tridentata</i> | Hartman, 1944 | SP | AG, AM, AF, AMF, AS, L | 8 - 157m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>variegata</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>variegata</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>variegata</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>variegata</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>variegata</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | Brasil, Nordeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1866 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | PR, Paranaguá | A, L, C | 4 - 18m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Diopatra</i> | <i>viridis</i> | Kinberg, 1865 | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 6 | Onuphidae | <i>Epidiopatra</i> | <i>huperiana</i> | (Augener, 1918) | Brasil, Nordeste | | infra; plataforma | Bonifácio et al., 2006 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | SC | AL, OS | 88 - 136m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | SP | AL, OS | 88 - 136m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | PR | A, L, C | 88 - 133m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | RS | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | SP | | 70 - 77m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>juvenalis</i> | Moore, 1911 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Hyalinoecia</i> | <i>tubicola</i> | (Müller, 1788) | SP | C | 70m | Temperini, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>atlantica</i> | (Hartman, 1965) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | RJ, Macaé | | 10 - 30m | Araújo et al., 2009 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Caraguatatuba | AM, AF, AMF | 5 - 35m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | A, AM, AF, AMF | 5 - 45m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | 7 - 45m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | RS, Rio Grande | | | Camargo & Borzone, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | PR | A, AF, AMF, AL | 1 - 13m; 25m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP | AF, AMF, AL | 51m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | PR, Paranaguá | L | 13m; estuário | Lana, 1986b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | PR, Paranaguá | AF, AMF, L, C | 1 - 50m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25 - 50m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 50m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP | | 16 - 50m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Caraguatatuba | AMF, L, OS | estuário | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Caraguatatuba | AMF, L, OS | 1 - 51m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AMF, L, OS | estuário | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AMF, L, OS | 1 - 51m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | AMF, L, OS | estuário | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | AMF, L, OS | 1 - 51m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | AMF, L, OS | 1 - 51m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | RS | | | Steiner & Amaral, 2006a |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>difficilis</i> | (Fauchald, 1982) | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | 35m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SC | AL | 50m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | PR | A, L | 50m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF, L | 35 - 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 35 - 45m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF, L | 35 - 45m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | RJ | AF, AMF, AS, Sag | 30 - 256m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP | AF, AMF, AS, Sag | 30 - 256m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>fauchaldi</i> | Lana, 1991 | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>mixta</i> | (Fauchald & Hancock, 1981) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>mixta</i> | (Fauchald & Hancock, 1981) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | 22m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | 5 - 45m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 9 - 45m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SC | L | 60 - 84m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | PR | L, C | 66 - 84m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, I. S. Sebastião | AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, I. S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | RJ | A, AMF, L | 22 - 254m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SC | A, AMF, L | 22 - 254m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, Cananéia | A, AMF, L | 22 - 254m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, Caraguatatuba | A, AMF, L | 22 - 254m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | A, AMF, L | 22 - 254m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | A, AMF, L | 22 - 254m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>nonatoi</i> | Lana, 1991 | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | RJ, Macaé | | 10 - 30m | Araújo et al., 2009 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SC | L, AL | 100 - 140m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | PR | L, AL | 60 - 140m | Lana, 1984 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | PR | A, L, C | infra | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 25m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | RJ, B. de Sepetiba | L | infra | Omena et al., 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | RJ, B. de Sepetiba | L | infra | Omena et al., 2006b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP | | 19 - 117m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP, Baixa Santista | | estuário | Rizzo et al., 2007b |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | RJ | A, L | 60 - 511m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP | A, L | 60 - 511m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | PR | A, L | 60 - 511m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SC | A, L | 60 - 511m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>orensanzi</i> | (Fauchald, 1982) | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>rubrencens</i> | (Augener, 1906) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>rubrescens</i> | (Augener, 1922) | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | RJ, Arraial do Cabo | | fauna associada | Almeida & Ruta, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | RJ, Arraial do Cabo | | fauna associada | Almeida & Ruta, 2000 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | PR | | 6 - 90m ; Onuphis | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | RJ | | 6 - 90m ; Onuphis | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | RS | | 6 - 90m ; Onuphis | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | SC | | 6 - 90m ; Onuphis | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | SP | | 6 - 90m ; Onuphis | Hansen, 1882 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 4 - 30m ; Onuphis | Lana, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | SC | | Onuphis | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Kinbergonuphis</i> | <i>tenuis</i> | (Hansen, 1882) | BA | | | Silva, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>fragilis</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>fragilis</i> | (Kinberg, 1865) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | 33m | Biota |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | 35m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | A, AM, AF, AMF | 9 - 45m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | PR | AF, AMF, AL | 25 - 88m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SC | AF, AMF, AL | 25 - 88m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF, L, C | 35 - 88m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 25 - 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25 - 45m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 25 - 45m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP | | 35 - 79m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | AM, AF, AMF | 9 - 157m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>intermedia</i> | (Kinberg, 1865) | SP | AM, AF, AMF | 9 - 157m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | 20m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | 5 - 10m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 5 - 44m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | PR | A, L, OS | 4 - 17m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SC | A, OS | 4 - 36m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP | A, OS | 4 - 36m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 4 - 16m; estuário | Lana, 1986b |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | PR, Paranaguá | A, AF, AMF, L, C | 4,5, 6 - 36m; estuário | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | RJ, B. de Sepetiba | A | infra | Omena et al., 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, Baixa Santista | | estuário | Rizzo et al., 2007b |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, Cananéia | AM, AF, AMF | 5 - 45m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, Caraguatatuba | AM, AF, AMF | 5 - 45m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 5 - 45m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP, São Sebastião | AM, AF, AMF | 5 - 45m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP | | entre | Steiner, 2000 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP | | entre | Steiner & Amaral, 2001 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>lineata</i> | Lana, 1991 | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m; Onuphis | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m ; Onuphis | Forneris, 1969 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | RS | | infra | Kawakami & Amaral, 1983 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, Ubatuba | | 10m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP | AL, C | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>nebulosa</i> | (Moore, 1911) | SP, S. Sebastião | | entre | Steiner & Amaral, 1998 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | 5 - 35m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 9 - 44m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 35m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 35m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | RJ | AM, AF, AMF, AS | 6 - 400m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP, Caraguatatuba | AM, AF, AMF, AS | 6 - 400m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF, AS | 6 - 400m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP, S. Sebastião | AM, AF, AMF, AS | 6 - 400m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>pallidula</i> | (Hartman, 1965) | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>stigmatis</i> | (Treadwell, 1922) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m ; Nothria | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>stigmatis</i> | (Treadwell, 1922) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>stigmatis</i> | (Treadwell, 1922) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>stigmatis</i> | (Treadwell, 1922) | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF | 20 - 30m ; Nothria | Lana, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>stigmatis</i> | (Treadwell, 1922) | RJ | | infra; Nothria | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>stigmatis</i> | (Treadwell, 1922) | SP | AL, C | infra; Nothria | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Mooreonuphis</i> | <i>stigmatis</i> | (Treadwell, 1922) | SC | A, L | 50m; Nothria | Temperini, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>anoculata</i> | Orensan, 1974 | RJ | AS, Sar | 133 - 510m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>anoculata</i> | Orensan, 1974 | SP | AS, Sar | 133 - 510m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>anoculata</i> | Orensan, 1974 | SC | AS, Sar | 133 - 510m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Lana, 1991 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Temperini, 1981(*) | RS | L | 183m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Temperini, 1981(*) | SP | L | 51m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Temperini, 1981(*) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 30 - 50m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Lana, 1991 | PR | AF, AMF, L, C | 36 - 183m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Lana, 1991 | SC | AF, AMF, L, C | 36 - 183m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Lana, 1991 | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Temperini, 1981(*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Lana, 1991 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Lana, 1991 | RJ | AS | 60 - 260m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Lana, 1991 | SP | AS | 60 - 260m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>benthophyla</i> | Temperini, 1981(*) | RS | | 183m | Temperini, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>britanica</i> | (McIntosh, 1903) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>iridescens</i> | Treadwell, 1922 | RS | | infra | Kawakami & Amaral, 1983 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>paxtonae</i> | Imajima, 1999 | RJ | A, AS | 60 - 314m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>paxtonae</i> | Imajima, 1999 | SP | A, AS | 60 - 314m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Nothria</i> | <i>textor</i> | Hartman & Fauchald, 1971 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>dibranchiata</i> | Willey, 1905 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>dibranchiata</i> | Willey, 1905 | SP, Ubatuba | | 10m | Morgado & Amaral, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>dibranchiata</i> | Willey, 1905 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Morgado, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>dorsalis</i> | (Ehlers, 1897) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | PR | AM, AF, AMF | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RS | | infra | Kawakami & Amaral, 1983 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | PR | AF, AMF, C | 47m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita</i> | Audouin & M. Edwards, 1833 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | 5 - 10m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 5 - 35m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | 5 - 7m | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, Ubatuba | AF, AMF | entre | Biota |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP | AF, AMF, OS | 47m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | CE, Fortaleza | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, Caraguatatuba | AM, AF, AMF | entre; 2 - 35m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | entre; 2 - 35m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | AM, AF, AMF | entre; 2 - 35m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | RS | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>eremita oculata</i> | Hartman, 1951 | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>intermedia</i> | | RJ | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>litoralis</i> | Monro, 1933 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>quadricuspis</i> | Sars, 1872 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>quadricuspis</i> | Sars, 1872 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>quadricuspis</i> | Sars, 1872 | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>setosa</i> | Kinberg, 1865 | RS | | infra; estuário | Bemvenuti, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>simoni</i> | Santos, Day & Rice, 1981 | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>verngreni</i> | | RJ | | | REMOVER HARTMAN |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>vexillaria</i> | Moore, 1911 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>vexillaria</i> | Moore, 1911 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>vexillaria</i> | Moore, 1911 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>vexillaria</i> | Moore, 1911 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 6 | Onuphidae | <i>Onuphis</i> | <i>vexillaria</i> | Moore, 1911 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Paradiopatra</i> | <i>hartmanae</i> | (Kirkegaard, 1980) | Brasil, Sul | | 250 - 3000m | Almeida et al., 2007 |
| 6 | Onuphidae | <i>Paradiopatra</i> | <i>hartmanae</i> | (Kirkegaard, 1980) | RJ | A, L | 99 - 314m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Paradiopatra</i> | <i>hartmanae</i> | (Kirkegaard, 1980) | SP | A, L | 99 - 314m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Paradiopatra</i> | <i>hartmanae</i> | (Kirkegaard, 1980) | SC | A, L | 99 - 314m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Paradiopatra</i> | <i>hartmanae</i> | (Kirkegaard, 1980) | PR | A, L | 99 - 314m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Paradiopatra</i> | <i>hartmanae</i> | (Kirkegaard, 1980) | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Paradiopatra</i> | <i>hartmanae</i> | (Kirkegaard, 1980) | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>agassizii</i> | Ehlers, 1887 | SC | | 50 - 100m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>agassizii</i> | Ehlers, 1887 | SP | | 50 - 100m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>agassizii</i> | Ehlers, 1887 | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SP | L | 88m | Lana, 1984 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | PR | | infra | Lana, 1987 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | RS | AL | 66m | Lana, 1991b |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | RS | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SP | | 77 - 108m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | PR | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | A, AS | 99 - 256m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SP | A, AS | 99 - 256m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SC | A, AS | 99 - 256m | Steiner, 2005 |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | RJ | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | RS | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SC | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 6 | Onuphidae | <i>Rhamphobrachium (Spinigerum)</i> | <i>verngreni</i> | (Kinberg, 1865) | SP | | | Steiner & Amaral, 2006a |
| 7 | Oweniidae | <i>Galathowenia</i> | <i>oculata</i> | (Zachs, 1923) | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 7 | Oweniidae | <i>Melinna</i> | <i>uruguaiyi</i> | Hessle, 1917 | RS | L | 80m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 7 | Oweniidae | <i>Myriochele</i> | <i>oculata</i> | Zachs, 1923 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 7 | Oweniidae | <i>Myriowenia</i> | <i>californienesis</i> | Hartman, 1960 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | Brasil, Nordeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, I. S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1995 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | Brasil | | | Amaral et al., 1998a |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | Brasil | | 12 - 63m | Dauvin & Thiébaut, 1994 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | PR, Paranaguá | A, AMG, L, OS | 3 - 16m; estuário; tubos | Lana, 1986b |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | AL | L, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SE | L, OS | 0 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | A, AL, C | entre | Nonato, 1981 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RJ | | entre | Nonato, 1981 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | A, AL, C | infra | Nonato, 1981 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RJ, B. de Sepetiba | A | infra | Omena et al., 2006a |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP | | 19 - 116m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | Brasil | | | Petti & Nonato, 1998 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | A | 15 - 45m | Petti, 1990 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1997 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP | A, L, C | 17 - 48m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | PR | AF, AMF | 0 - 2m | Souza, 1991 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 7 | Oweniidae | <i>Owenia</i> | <i>fusiformis</i> | delle Chiaje, 1844 | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Gesaia</i> | <i>lanai</i> | Kirtley, 1994 | Brasil | | | Santos et al., 2007a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1856) Mørch, 1863 | PR | | | Occhioni et al., 2009a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1856) Mørch, 1863 | RJ | | | Occhioni et al., 2009a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1856) Mørch, 1863 | SP | | | Occhioni et al., 2009a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1856) Mørch, 1863 | PR, I do Mel | | | Occhioni et al., 2009b |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1856) Mørch, 1863 | RJ, I. da Marambaia | | | Occhioni et al., 2009b |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1856) Mørch, 1863 | RJ, Mangaratiba | | | Occhioni et al., 2009b |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1856) Mørch, 1863 | SP, Ubatuba | | | Occhioni et al., 2009b |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1865) Mørch, 1863 | Brasil | | | Perez et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1865) Mørch, 1863 | Brasil, Nordeste | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1865) Mørch, 1863 | Brasil, Nordeste | | | Santos et al., 2006b |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | (Kroyer, 1865) Mørch, 1863 | Brasil | | | Santos et al., 2007a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>caudata</i> | | NE | | | Santos, 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | SP, Santos | | entre; costão | Amaral, 1987 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | SP, Ubatuba | | entre; costão | Amaral, 1987 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | RJ | | | Lana & Bramec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | RS | | | Lana & Bramec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | PR | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | RJ | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | RS | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | SC | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | SP, S. Sebastião | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | RJ | | entre | Masi & Zalmon, 2008 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | SP, S. Sebastião | SP | entre | Rocha, 1993 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | Brasil | | | Santos et al., 2007a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>virgini</i> | | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 7 | Sabellariidae | <i>Phragmatopoma</i> | <i>lapidosa</i> | Kinberg, 1867 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>alcocki</i> | Gravier, 1906 | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>alcocki</i> | Gravier, 1906 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>alcocki</i> | Gravier, 1906 | SE | | | Santos, 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | Brasil | | | Gruet & Lana, 1988 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | ES | | | Lana & Bramec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | SC | | | Lana & Bramec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | ES | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | PR | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | RJ | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | SC | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | SP | | entre; costão | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | ES | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | PR | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | SC | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | SP | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | Brasil | | | Santos et al., 2007a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bella</i> | Grube, 1870 | SP | | | Santos, 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | Brasil | | | Gruet & Lana, 1988 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | | Lana & Bramec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SC | | | Lana & Bramec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | PR | | | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SC | | | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SP | | | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | PR, Paranaguá | A, L, C, OS | 4,5, 10, 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SP, Ubatuba | A | 15 - 45m | Petti, 1990 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SC | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | ES | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | RJ, B. de Guanabara | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SP | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | Brasil | | | Santos et al., 2007a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | ES | | | Santos et al., 2009 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | RN | | | Santos et al., 2009 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>bellis</i> | Hansen, 1882 | SP | | | Santos et al., 2009 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>floridensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>floridensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>floridensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>floridensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>floridensis</i> | Hartman, 1944 | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>floridensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>floridensis</i> | Hartman, 1944 | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 1996 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>floridensis</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>gracilis</i> | Hartman, 1944 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>nanella</i> | Chamberlin, 1919 | ES | | | Lana & Bramec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>nanella</i> | Chamberlin, 1919 | RJ | | | Lana & Bramec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>nanella</i> | Chamberlin, 1919 | BA ? | | | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>nanella</i> | Chamberlin, 1919 | SP | | | Lana & Bremec, 1994 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>nanella</i> | Chamberlin, 1919 | ES | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>nanella</i> | Chamberlin, 1919 | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>virgini</i> | Ehlers, 1901 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>virgini</i> | Ehlers, 1901 | SP, S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | | PR | | 6 - 16,5m | Lana & Gruet, 1989 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | AL | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | BA | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | ES | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | PB | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | PE | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | PR | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | RJ | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | RN | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | SC | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | SE | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | SP | | | Santos et al., 2006 |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | Lana & Gruet, 1989 | Brasil | | | Santos et al., 2007a |
| 7 | Sabellariidae | <i>Sabellaria</i> | <i>wilsoni</i> | | NE | | | Santos, 2006 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphicorina</i> | <i>schlenzae</i> | Nogueira & Amaral, 2000 | SP, I. de Alcatrazes | | 4 - 7m; fauna associada | Nogueira & Amaral, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphicorina</i> | <i>schlenzae</i> | Nogueira & Amaral, 2000 | SP, Laje de Santos | | 4 - 7m; fauna associada | Nogueira & Amaral, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphicorina</i> | <i>schlenzae</i> | Nogueira & Amaral, 2000 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphicorina</i> | <i>schlenzae</i> | Nogueira & Amaral, 2000 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphiglena</i> | <i>lindae</i> | Rouse & Gambi, 1997 | SP, Guarujá | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphiglena</i> | <i>lindae</i> | Rouse & Gambi, 1997 | SP, S. Sebastião | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphiglena</i> | <i>lindae</i> | Rouse & Gambi, 1997 | SP, Santos | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphiglena</i> | <i>lindae</i> | Rouse & Gambi, 1997 | SP, Ubatuba | | costão; fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Amphiglena</i> | <i>lindae</i> | Rouse & Gambi, 1997 | SP, Caraguatatuba | | fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Augeneriella</i> | <i>hummelincki</i> | Banse, 1957 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>luctuosum</i> | (Grube, 1870) | SP, S. Vicente | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>luctuosum</i> | (Grube, 1870) | SP, Santos | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>lucullana</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | A, L | 4- 20m | Forneris, 1969 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>lucullana</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, Ubatuba | A | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, Ubatuba | A | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculata</i> | (Baird, 1865) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | BA, Abrolhos | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | BA, Salvador | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | ES, Guarapari | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | RJ, Arraial do Cabo | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | RJ, Mangaratiba | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | RJ, Rio de Janeiro | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | SP, S. Sebastião | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | SP, Santos | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>nigromaculatum</i> | (Baird, 1865) | SP, Ubatuba | | | Costa-Paiva & Klautau, 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>patriota</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Sebastião | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>patriota</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Vicente | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Branchiomma</i> | <i>patriota</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Santos | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>filicaudata</i> | Southern, 1914 | SP, Ubatuba | AM | 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>filicaudata</i> | Southern, 1914 | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>filicaudata</i> | Southern, 1914 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>filicaudata</i> | Southern, 1914 | SP, Ubatuba | AM | 45m | Morgado, 1988 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>infundibuliformis</i> | Kroyer, 1856 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | infra | Lana, 1981 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP | | 19 - 48m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>insularis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 7 | Sabellidae | <i>Chone</i> | <i>letterstedti</i> | (Kinberg, 1867) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Dasychone</i> | <i>ponce</i> | Treadwell, 1901 | SP | | entre | Treadwell, 1932 |
| 7 | Sabellidae | <i>Demonax</i> | <i>microphthalmus</i> | (Verril, 1873) | SP, Caraguatatuba | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Demonax</i> | <i>microphthalmus</i> | (Verril, 1873) | SP, Guarujá | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Demonax</i> | <i>microphthalmus</i> | (Verril, 1873) | SP, S. Sebastião | | costão; fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Demonax</i> | <i>microphthalmus</i> | (Verril, 1873) | SP, S. Vicente | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Demonax</i> | <i>microphthalmus</i> | (Verril, 1873) | SP, Santos | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Demonax</i> | <i>microphthalmus</i> | (Verril, 1873) | SP, Ubatuba | | costão; fauna associada | Rossi, 2008 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 7 | Sabellidae | Demonax | <i>microphtalmus</i> | (Verri, 1873) | SP, Caraguatatuba | | costão; fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Fabricia</i> | <i>filamentosa</i> | Day, 1963 | RJ | | fauna associada | Omena & Neves, 2001 |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>circumspiciens</i> | Ehlers, 1887 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>circumspiciens</i> | Ehlers, 1887 | AL | L, OS | 51 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>circumspiciens</i> | Ehlers, 1887 | SE | L, OS | 51 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>elegans</i> | (Webster, 1884) | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>elegans</i> | (Webster, 1884) | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>elegans</i> | (Webster, 1884) | AL | A, L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>elegans</i> | (Webster, 1884) | SE | A, L, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>elegans</i> | (Webster, 1884) | AL | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>elegans</i> | (Webster, 1884) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>elegans</i> | (Webster, 1884) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Hypsicomus</i> | <i>elegans</i> | (Webster, 1884) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Kirkiana</i> | <i>heterobranchiata</i> | Nogueira, López & Rossi, 2004 | SP, S. Sebastião | | costão; fauna associada | Nogueira et al., 2004a |
| 7 | Sabellidae | <i>Kirkiana</i> | <i>heterobranchiata</i> | Nogueira, López & Rossi, 2004 | SP, S. Sebastião | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Laonome</i> | <i>kroyeri</i> | Malmgren, 1865 | SP | | infra; plataforma | Paiva, 1990 |
| 7 | Sabellidae | <i>Laonome</i> | <i>kroyeri</i> | Malmgren, 1865 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 7 | Sabellidae | <i>Laonome</i> | <i>puncturata</i> | (Augener, 1918) | SP | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1998 |
| 7 | Sabellidae | <i>Manayunkia</i> | <i>brasiliensis</i> | Banse, 1956 | SP, Cananéia | | estuário | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1867) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1887) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1887) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1887) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1867) | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1867) | SP, S. Sebastião | A, AM | entre | Reis, 1995 |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1887) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1867) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1867) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1867) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 7 | Sabellidae | <i>Megalomma</i> | <i>bioculatum</i> | (Ehlers, 1867) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 7 | Sabellidae | <i>Notaulax</i> | <i>nudicollis</i> | (Kröyer, 1856) | SP, Ubatuba | | infra; fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamethus</i> | <i>singularis</i> | Hartman, 1965 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>fonticula</i> | (Hoagland, 1919) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>minuta</i> | (Treadwell, 1941) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Müller, 1788) | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Müller, 1788) | SP | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1998 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Müller, 1788) | SP | A, C, OS | 5 - 132m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Müller, 1788) | SP | A, C, OS | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Müller, 1788) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Müller, 1788) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Müller, 1788) | SC | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>torelli</i> | Malmgren, 1865 | RJ | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Potamilla</i> | <i>torelli</i> | Malmgren, 1865 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>emersoni</i> | Jones, 1962 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>emersoni</i> | Jones, 1962 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>minima</i> | Nogueira & Knigh-Jones, 2002 | SP, S. Vicente | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Ubatuba | | costão | Nogueira et al., 2006 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Sebastião | | costão | Nogueira et al., 2006 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Vicente | | costão | Nogueira et al., 2006 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Caraguatatuba | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Guarujá | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Sebastião | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Vicente | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Santos | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Ubatuba | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Caraguatatuba | | fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Sebastião | | fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paraemersoni</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Ubatuba | | fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paulista</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Sebastião | | costão | Nogueira et al., 2006 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paulista</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Vicente | | costão | Nogueira et al., 2006 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paulista</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Sebastião | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paulista</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, S. Vicente | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paulista</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Santos | | costão | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>paulista</i> | Nogueira, Rossi & López, 2006 | SP, Ubatuba | | costão; fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudobranchiomma</i> | <i>perkinsi</i> | Knight-Jones & Giangrande, 2003 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudopotamilla</i> | <i>reniformes</i> | (Bruguière, 1789) | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudopotamilla</i> | <i>reniformes</i> | (Bruguière, 1789) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudopotamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Bruguière, 1789) | RJ | | 100 - 187m | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudopotamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Bruguière, 1789) | SP | | 50 - 380m | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Pseudopotamilla</i> | <i>reniformis</i> | (Bruguière, 1789) | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Sabellidae | <i>Sabella</i> | <i>fusca</i> | Grube, 1870 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Sabella</i> | <i>microphthalma</i> | Verril, 1873 | RJ, B. de Sepetiba | OS | | Omena et al., 2006a |
| 7 | Sabellidae | <i>Sabella</i> | <i>microphthalma</i> | Verril, 1873 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Sabellastarte</i> | <i>indica</i> | (Savigny, 1818) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Sabellomma</i> | <i>minuta</i> | (Treadwell, 1914) | SP, S. Sebastião | | costão; fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Sabellomma</i> | <i>minuta</i> | (Treadwell, 1914) | SP, Ubatuba | | fauna associada | Rossi, 2008 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>braziliensis</i> | Treadwell, 1932 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>braziliensis</i> | Treadwell, 1932 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>braziliensis</i> | Treadwell, 1932 | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>gracilis</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>imperialis</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>imperialis</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>imperialis</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>imperialis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>imperialis</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>nobilis</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>nobilis</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>nobilis</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>nobilis</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>nobilis</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>simplex</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>simplex</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>simplex</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>simplex</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>simplex</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>spallanzanii</i> | Viviani, 1805 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>spallanzanii</i> | Viviani, 1805 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>spallanzanii</i> | Viviani, 1805 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Sabellidae | <i>Spirographis</i> | <i>spallanzanii</i> | Viviani, 1805 | SP, S. Sebastião | | | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 7 | Sabellidae | <i>Crucigera</i> | <i>websteri</i> | Benedict, 1886 | SE | L, OS | 51 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Serpulidae | <i>Dexiospira</i> | <i>pagenstecheri</i> | Quatrefages, 1865 | SP, S. Sebastião | L, OS | 90m; Spirorbis | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Dexiospira</i> | <i>pagenstecheri</i> | Quatrefages, 1865 | BA | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Ficopomatus</i> | <i>uschakovi</i> | (Pillai, 1960) | PB | | mangue | Assis et al., 2008 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | BA | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | ES | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | RJ | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | SE | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | SE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | SP, S. Sebastião | OS | 6 - 90m | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | SC | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | RJ | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Filograna</i> | <i>implexa</i> | Berkeley, 1827 | BA, Abrolhos | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>brachyacantha</i> | Rioja, 1941 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>brachyacantha</i> | Rioja, 1941 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>brachyacantha</i> | Rioja, 1941 | SP, S. Sebastião | SP | entre | Rocha, 1993 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>brachyacantha</i> | Rioja, 1941 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>brachyacantha</i> | Rioja, 1941 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>brachyacantha</i> | Rioja, 1941 | SP, Ubatuba | OS | 15m | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>brachyacantha</i> | Rioja, 1941 | SP, S. Sebastião | OS | 6m | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>californicus</i> | Treadwell, 1929 | AL | L, OS | 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>dirampha</i> | Mörch, 1863 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>dirampha</i> | Mörch, 1863 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>dirampha</i> | Mörch, 1863 | SP | A, L, C, OS | 5, 75m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>dirampha</i> | Mörch, 1863 | SP | A, L, C, OS | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>dirampha</i> | Mörch, 1863 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>dirampha</i> | Mörch, 1863 | PE | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>dirampha</i> | Mörch, 1863 | SC | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>dirampha</i> | Mörch, 1863 | SC | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>gairacensis</i> | Augener, 1934 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>gairacensis</i> | Augener, 1934 | SP, Ubatuba | A | 15 - 45m | Petti, 1990 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>gairacensis</i> | Augener, 1934 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>gairacensis</i> | Augener, 1934 | SC | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>parvus</i> | (Treadwell, 1901) | BA | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>parvus</i> | (Treadwell, 1901) | PE | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>parvus</i> | (Treadwell, 1901) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>parvus</i> | (Treadwell, 1901) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>parvus</i> | (Treadwell, 1901) | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>plateni</i> | (Kinberg, 1867) | RJ | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>plateni</i> | (Kinberg, 1867) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Amaral et al., 2004a |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>plateni</i> | (Kinberg, 1867) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Attolini, 1997 |
| 7 | Serpulidae | <i>Hydroides</i> | <i>plateni</i> | (Kinberg, 1867) | | | | Maciel, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SP | A, L | 5 - 48m | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SP | A, L | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | ES | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | RJ | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | RS | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SC | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | ES | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | RS | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SC | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | plateni | (Kinberg, 1867) | SC | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | uncinatus | (Philippi, 1844) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | uncinatus | (Philippi, 1844) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | uncinatus | (Philippi, 1844) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Serpulidae | Hydroides | uncinatus | (Philippi, 1844) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 7 | Serpulidae | Josephella | marenzelleri | Caulery & Mesnil, 1896 | PE, F. de Noronha | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Josephella | marenzelleri | Caulery & Mesnil, 1896 | BA, Abrolhos | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Josephella | marenzelleri | Caulery & Mesnil, 1896 | PE | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Neovermilia | aberrans | Rullier & Amoureux, 1979 | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Omphalopomopsis | fimbriata | (delle Chiaje, 1828) | BA, Abrolhos | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Paralaeospira | calypso | Zibrowius, 1970 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Serpulidae | Paralaeospira | calypso | Zibrowius, 1970 | SP, S. Sebastião | SP | entre; Spirorbis | Rocha, 1993 |
| 7 | Serpulidae | Paralaeospira | calypso | Zibrowius, 1970 | SP, S. Sebastião | L, OS | 90 - 100m; Spirorbis | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Paralaeospira | calypso | Zibrowius, 1970 | RJ | | infra; Spirorbis | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Placostegus | crystallinus | Zibrowius, 1968 | Brasil | | 60 - 808m | Abbud & Nogueira, 2006 |
| 7 | Serpulidae | Pomatoceros | minutus | Rioja, 1941 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Serpulidae | Pomatoceros | minutus | Rioja, 1941 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 7 | Serpulidae | Pomatoceros | minutus | Rioja, 1941 | SP, S. Sebastião | | entre | Rocha, 1993 |
| 7 | Serpulidae | Pomatoceros | minutus | Rioja, 1941 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 7 | Serpulidae | Pomatoceros | minutus | Rioja, 1941 | SP, S. Sebastião | OS | 6 - 15m | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Pomatostegus | stellatus | (Abilgaard, 1786) | RN | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Pomatostegus | stellatus | (Abilgaard, 1786) | BA, Abrolhos | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Protula | balboensis | Monro, 1933 | BA | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Protula | submedia | Augener, 1906 | SP, S. Sebastião | L, OS | 90m | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Protula | submedia | Augener, 1906 | BA | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Protula | submedia | Augener, 1906 | RJ | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Protula | submedia | Augener, 1906 | SC | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | multispinosa | (Monro, 1933) | PE | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | multispinosa | (Monro, 1933) | BA, Abrolhos | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | occidentalis | (MacIntosh, 1885) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | occidentalis | (MacIntosh, 1885) | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | occidentalis | (MacIntosh, 1885) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | occidentalis | (MacIntosh, 1885) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | occidentalis | (MacIntosh, 1885) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | occidentalis | (MacIntosh, 1885) | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | Pseudovermilia | occidentalis | (MacIntosh, 1885) | BA | | plâncton | Rullier & Amoureux, 1979 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | RJ | | plâncton | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 1996 |
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | SP, Ubatuba | OS | 15m | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | SP, S. Sebastião | L, OS | 40 - 110m | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | BA, Abrolhos | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | PE, F. de Noronha | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | PE | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 7 | Serpulidae | <i>Pseudovermilia</i> | <i>occidentalis occidentalis</i> | (MacIntosh, 1885) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 7 | Serpulidae | <i>Salmacina</i> | <i>vesiculos</i> | Nogueira, 2000 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Serpulidae | <i>Salmacina</i> | <i>vesiculos</i> | Nogueira, 2000 | SP, S. Sebastião | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 7 | Serpulidae | <i>Sclerostyla</i> | <i>ctenactis</i> | (Mörch, 1863) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Sclerostyla</i> | <i>ctenactis</i> | (Mörch, 1863) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Serpula</i> | <i>concharum</i> | Langerhans, 1870 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Serpula</i> | <i>vermicularis</i> | Linneu, 1767 | SE | L, OS | 51 - 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 7 | Serpulidae | <i>Serpula</i> | <i>vermicularis</i> | Linnaeus, 1767 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 7 | Serpulidae | <i>Spirobranchus</i> | <i>giganteus</i> | (Pallas, 1767) | BA | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Spirobranchus</i> | <i>giganteus</i> | (Pallas, 1767) | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 7 | Serpulidae | <i>Spirobranchus</i> | <i>giganteus</i> | (Pallas, 1767) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 7 | Serpulidae | <i>Spirobranchus</i> | <i>giganteus</i> | (Pallas, 1767) | PE, F. de Noronha | | infra | Zibrowius, 1970 |
| 7 | Serpulidae | <i>Spirorbis</i> | <i>moerchi</i> | Levinsen, 1883 | SP, S. Sebastião | SP | entre | Rocha, 1993 |
| 7 | Serpulidae | <i>Vermiliopsis</i> | <i>acanthophora</i> | Augener, 1914 | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 8 | Acrocirridae | <i>Macrochaeta</i> | <i>westheidei</i> | Santos & Silva, 1992/93 | RJ | AG | entre | Santos & Silva, 1992/93 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Aphelochaeta</i> | <i>marioni</i> | (Saint Joseph, 1894) | Brasil | | | Pardo & Amaral, 2009 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Aphelochaeta</i> | <i>monilaris</i> | (Hartmann, 1960) | Brasil | | | Pardo & Amaral, 2009 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Audouinia</i> | <i>tentaculata</i> | | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Caulleriella</i> | <i>alata</i> | Southern, 1914 | Brasil, Sudeste | | | Bolívar, 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Caulleriella</i> | <i>alata</i> | Southern, 1914 | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Caulleriella</i> | <i>cristata</i> | Blake, 1996 | Brasil | | | Pardo & Amaral, 2009 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Caulleriella</i> | <i>pacifica</i> | Berkeley, 1929 | Brasil | | | Pardo & Amaral, 2009 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Caulleriella</i> | <i>zelandica</i> | (McIntosh, 1911) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Chaetozone</i> | <i>setosa</i> | Malmgren, 1867 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>africanus</i> | Gravier, 1906 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>africanus</i> | Gravier, 1906 | BA | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>africanus</i> | Gravier, 1906 | BA | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>chrysoderma</i> | Claparède, 1870 | SP, Santos | | | Tommasi, 1979 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>danielseni</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>danielseni</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>danielseni</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>danielseni</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>danielseni</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>filiformis</i> | (Keferstein, 1862) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>filiformis</i> | (Keferstein, 1862) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>filiformis</i> | (Keferstein, 1862) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>filiformis</i> | (Keferstein, 1862) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>filiformis</i> | (Keferstein, 1862) | SP, infra | | 16 - 117m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>filiformis</i> | (Keferstein, 1862) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirratulus</i> | <i>filiformis</i> | (Keferstein, 1862) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Naesso, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Naesso, 1996 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 1997 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | Brasil | | | Pardo & Amaral, 1998 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1998 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>ocutata</i> | Treadwell, 1923 | SP, I. S. Sebastião | | entre; Audouinia | Treadwell, 1932 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>punctata</i> | (Grube, 1859) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m; Audouinia | Amaral et al., 1994 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4m | Lana, 1981 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP | | infra; endofauna | Nogueira, 1995 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Pardo & Amaral, 1997 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | A, AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1997 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, Santos | A, L | 2 - 60m; Audouinia | Tommasi, 1967 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Cirriformia</i> | <i>tentaculata</i> | (Montagu, 1808) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Dodecaceria</i> | <i>concharum</i> | Oersted, 1843 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Dodecaceria</i> | <i>concharum</i> | Oersted, 1843 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Protocirrineris</i> | <i>socialis</i> | Blake, 1996 | Brasil | | | Pardo & Amaral, 2009 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>marioni</i> | (Saint Joseph, 1894) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>dorsobranchia</i> | (Kirkegaard, 1959) | Brasil, Sudeste | | | Bolívar, 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>dorsobranchialis</i> | (Kirkegaard, 1959) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>dorsobranchialis</i> | (Kirkegaard, 1959) | PR | | infra | Bolívar, 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>dorsobranchialis</i> | (Kirkegaard, 1959) | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>filibranchia</i> | Day, 1961 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>marioni</i> | (Saint Joseph, 1894) | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>marioni</i> | (Saint Joseph, 1894) | PR, Paranaguá | AM, OS | 10m; estuário | Lana, 1986b |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>marioni</i> | (Saint Joseph, 1894) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Tharyx</i> | <i>marioni</i> | (Saint Joseph, 1894) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 8 | Cirratulidae | <i>Timarete</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, Litoral Norte | | costão | Pardo & Amaral, 2009 |
| 8 | Cirratulidae | <i>Timarete</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 8 | Cirratulidae | <i>Timarete</i> | <i>filigera</i> | (delle Chiaje, 1828) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 8 | Cirratulidae | <i>Timarete</i> | <i>punctata</i> | (Grube, 1859) | Brasil | | costão; fauna associada | Pardo & Amaral, 2009 |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>fauchaldi</i> | Katzmann & Laubier, 1974 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>fauchaldi</i> | Katzmann & Laubier, 1974 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>fauchaldi</i> | Katzmann & Laubier, 1974 | RJ | L | 206 - 511m | Revizee |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>fauchaldi</i> | Katzmann & Laubier, 1974 | SP | L | 206 - 511m | Revizee |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>fauchaldi</i> | Katzmann & Laubier, 1974 | RJ | L | 400m | Revizee |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>fauchaldi</i> | Katzmann & Laubier, 1974 | PR | L | 430 - 433m | Revizee |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>fauchaldi</i> | Katzmann & Laubier, 1974 | SP | L | 430 - 433m | Revizee |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>fauchaldi</i> | Katzmann & Laubier, 1974 | SP | L | 206 - 511m | Rizzo, 2002 |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>olgae</i> | Hartmann-Schroeder, 1983 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>olgae</i> | Hartmann-Schröder, 1983 | RJ | L | 511m | Revizee |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>olgae</i> | Hartmann-Schröder, 1983 | SP | L | 511m | Revizee |
| 8 | Fauveliopsidae | <i>Fauveliopsis</i> | <i>olgae</i> | Hartmann-Schröder, 1983 | SP | L | 511m | Rizzo, 2002 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Brada</i> | <i>mamillata</i> | Grube, 1877 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Naesso, 1996 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Brada</i> | <i>mamillata</i> | Grube, 1877 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Diplocirrus</i> | <i>glaucus</i> | (Malmgren, 1867) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Diplocirrus</i> | <i>glaucus australis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Diplocirrus</i> | <i>glaucus australis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Diplocirrus</i> | <i>glaucus australis</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Diplocirrus</i> | <i>glaucus australis</i> | Nonato, 1981(*) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Diplocirrus</i> | <i>glaucus australis</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Litoral norte | | infra | Paiva, 1993a |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Flabelligera</i> | <i>affinis</i> | Sars, 1820 | PE | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>capitata</i> | Nonato, 1966 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>capitata</i> | Nonato, 1966 | RS | AL | 18m | Nonato, 1966a |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>capitata</i> | Nonato, 1966 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>capitata</i> | Nonato, 1966 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>capitata</i> | Nonato, 1966 | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>eruca</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>laevis</i> | (Stimpson, 1856) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>laevis</i> | (Stimpson, 1856) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>laevis</i> | (Stimpson, 1856) | Brasil | | Amaral et al., 1994 | |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>laevis</i> | (Stimpson, 1856) | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>laevis</i> | (Stimpson, 1856) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF, L | 35 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>laevis</i> | (Stimpson, 1856) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF, L | 35 - 50m | Morgado, 1988 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>laevis</i> | (Stimpson, 1856) | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>parmata</i> | (Grube, 1878) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>parmata</i> | (Grube, 1878) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>parmata</i> | (Grube, 1878) | Brasil | | Amaral et al., 1994 | |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>parmata</i> | (Grube, 1878) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>parmata</i> | (Grube, 1878) | SP, Litoral norte | | infra | Nonato, 1981 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>parmata</i> | (Grube, 1878) | SP | A, L, OS | 7 - 48m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>parmata</i> | (Grube, 1878) | ES | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>parmata</i> | (Grube, 1878) | RN | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 8 | Flabelligeridae | <i>Pherusa</i> | <i>scutigera</i> | (Ehlers, 1887) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 8 | Flabelligeridae | Pherusa | scutigera | (Ehlers, 1887) | SE | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 8 | Flabelligeridae | Pherusa | scutigera | (Ehlers, 1887) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 8 | Flabelligeridae | Pherusa | scutigera | (Ehlers, 1887) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 8 | Flabelligeridae | Pherusa | scutigera | (Ehlers, 1887) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 8 | Flabelligeridae | Pherusa | xantotricha | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | arenosus | Kinberg, 1867 | RS | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | capitata | (Nonato, 1966) | RS | L | 18 e 80m | Orensan & Gianuca, 1974 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | eruca | (Claparède, 1869) | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | eruca | (Claparède, 1869) | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado, 1988 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | eruca | (Claparède, 1869) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | eruca | (Claparède, 1869) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | Brasil, Sudeste | | | Bolívar, 1990 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | SP, Santos | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | RJ | | infra | Bolívar, 1990 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 8 | Flabelligeridae | Piromis | roberti | (Hartman, 1951) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 8 | Flabelligeridae | Therochaeta | scutifera | (Ehlers, 1887) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 8 | Flabelligeridae | Therochaeta | scutifera | (Ehlers, 1887) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 8 | Flabelligeridae | Therochaeta | scutigera | (Ehlers, 1887) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 8 | Flabelligeridae | Therochaeta | scutigera | (Ehlers, 1887) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | PE, Litoral Norte | L | entre; estuário | Valença et al., 2006 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | PE, Litoral Norte | L | infra; estuário | Valença et al., 2006 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado, 1988 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | AL | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | SE | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | RJ | L | 127m | Nonato, 1966b |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | SP, Ubatuba | L | 52m | Nonato, 1966b |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | SC | | infra | Nonato, 1981 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 8 | Sternaspidae | Sternaspis | capillata | Nonato, 1966 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP | | 32 - 50m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, Ubatuba | A | 15 - 45m | Petti, 1990 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 8 | Sternaspidae | <i>Sternaspis</i> | <i>capillata</i> | Nonato, 1966 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Ampharete</i> | <i>kerguelensis</i> | McIntosch, 1885 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Ampharete</i> | <i>kerguelensis</i> | McIntosch, 1885 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>gunneri</i> | (Sars, 1835) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>gunneri</i> | (Sars, 1835) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>gunneri</i> | (Sars, 1835) | AL | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>gunneri</i> | (Sars, 1835) | SP | | 48 - 108m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>gunneri</i> | (Sars, 1835) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>gunneri</i> | (Sars, 1835) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>gunneri</i> | (Sars, 1835) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>gunneri</i> | (Sars, 1835) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A, C | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | SP | | 15 - 38m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 9 | Ampharetidae | <i>Amphicteis</i> | <i>latibranchiata</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sudeste | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AM | entre | Amaral et al., 1987 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1995 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Amaral et al., 1998a |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1998a |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | Brasil | | | Amaral et al., 1998a |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolda</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | PR, B. de Paranaguá | | | Brasil et al., 2006 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Cananéia | AF, AMF, L | entre; marisma | Flynn et al., 1996 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | A, L | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | PR | | estuário | Lana et al., 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 4,5m; estuário | Lana, 1986b |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 35m | Morgado, 1988 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AL | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Santi, 2008 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | RJ, B. de Guanabara | | | Santos et al., 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SE | | | Sovierzoski, 1991 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Tararam, 1994 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Cananéia | A, L | entre; marisma | Varoli, 1988 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Isolida</i> | <i>pulchella</i> | Müller, 1858 | SP, Cananéia | AM, AF, AMF | entre | |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 9 | Ampharetidae | <i>Melinna</i> | <i>cristata</i> | (Sars, 1851) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Melinna</i> | <i>cristata</i> | (Sars, 1851) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Melinna</i> | <i>uruguaii</i> | Hessle, 1917 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Melinna</i> | <i>uruguaii</i> | Hessle, 1917 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Ampharetidae | <i>Phyllocomus</i> | <i>hiltoni</i> | Chamberlin, 1919 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Schistocomus</i> | <i>hiltoni</i> | Chamberlin, 1919 | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 9 | Ampharetidae | <i>Schistocomus</i> | <i>hiltoni</i> | Chamberlin, 1919 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Lagis</i> | <i>pseudokorenii</i> | Day, 1955 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria</i> | <i>catharinensis</i> | Müller, 1856 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria</i> | <i>catharinensis</i> | Müller, 1856 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria</i> | <i>catharinensis</i> | Müller, 1856 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Amphictene)</i> | <i>catharinensis</i> | Müller, 1856 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Amphictene)</i> | <i>catharinensis</i> | Müller, 1856 | SP, Ubatuba | A, L | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Amphictene)</i> | <i>catharinensis</i> | Müller, 1856 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Amphictene)</i> | <i>catharinensis</i> | Müller, 1856 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Amphictene)</i> | <i>catharinensis</i> | Müller, 1856 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 10 - 35m | Morgado, 1988 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | A, L | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 9 | Pectinariidae | <i>Pectinaria (Pectinaria)</i> | <i>laelia</i> | Nonato, 1981(*) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 9 | Terebellidae | <i>Amaeana</i> | <i>trilobata</i> | (Sars, 1863) | SP | A, L | 70m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Amphitrite</i> | <i>variabilis</i> | (Risso, 1826) | SP, Ubatuba | | 22m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Artacama</i> | <i>benedeni</i> | Kinberg, 1866 | RJ | | 100m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Artacama</i> | <i>benedeni</i> | Kinberg, 1866 | SP, S. Sebastião | | 25m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Artacama</i> | <i>benedeni</i> | Kinberg, 1866 | SP, Caraguatatuba | | 44m | Alves, 2008 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SP | A, L | 50 - 100m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SC | L | 81m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | PR | L | 90m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SP, Ubatuba | L | 50m | Morgado, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SP, Ubatuba | L, AL, C | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | PR | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SC | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | RS | L | 80m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Terebellidae | Artacama | benedeni | Kinberg, 1866 | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 9 | Terebellidae | Artacama | proboscidea | Malmgren, 1866 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Terebellidae | Articulatia | aberrans | Nogueira, Hutchings & Amaral, 2003 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira et al., 2003 |
| 9 | Terebellidae | Articulatia | aberrans | Nogueira, Hutchings & Amaral, 2003 | SP, Laje de Santos | | fauna associada | Nogueira et al., 2003 |
| 9 | Terebellidae | Articulatia | aberrans | Nogueira, Hutchings & Amaral, 2003 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 9 | Terebellidae | Eupolynnia | cf. nebulosa | (Montagu, 1818) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Terebellidae | Eupolynnia | nebulosa | (Montagu, 1818) | SP | A, L | 90 - 100m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Eupolynnia | nebulosa | (Montagu, 1818) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Terebellidae | Euthelodus | setubalensis | McIntosh, 1885 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Terebellidae | Lanice | conchilega | (Pallas, 1766) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Terebellidae | Lanice | conchilega | (Pallas, 1766) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Terebellidae | Lanice | conchilega | (Pallas, 1766) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 25m | Morgado, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Lanice | conchilega | (Pallas, 1766) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Terebellidae | Lanice | conchilega | (Pallas, 1766) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Terebellidae | Loimia | grubei | (Grube, 1878) | SP, Ubatuba | | 10 - 35m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | grubei | (Grube, 1878) | SP, Caraguatatuba | | 11 - 45m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | grubei | (Grube, 1878) | SP, S. Sebastião | | 15 - 34m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | grubei | (Grube, 1878) | RS | | 99 - 100m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | grubei | (Grube, 1878) | SP, Caraguatatuba | | costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | grubei | (Grube, 1878) | SP, Ubatuba | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | grubei | (Grube, 1878) | SP | A, L | 40 - 70m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | grubei | (Grube, 1878) | PR | A, L | 71m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1995 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | PR | | entre | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | PR | A, AF, AMF, L, AL, C, OS | 5 - 18m; estuário | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Naesso, 1996 |
| 9 | Terebellidae | Loimia | medusa | (Savigny, 1818) | SP | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | | franja; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | AL | A, OS | 0 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | L | 18; 31m | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SP, Ubatuba | A | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | BA | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | RS | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | RS | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | BA | | fauna associada | Santa-Isabel et al., 2000 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | NE | | | Santos, 2006 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>medusa</i> | (Savigny, 1818) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 9 | Terebellidae | <i>Loimia</i> | <i>montagui</i> | (Grube, 1878) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Terebellidae | <i>Lysilla</i> | <i>loveni</i> | Malmgren, 1866 | SP | A, L | 65m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Lysilla</i> | <i>pacifica</i> | Hessle, 1917 | PR | A, L | 49 - 51m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Morgana</i> | <i>bisetosa</i> | Nogueira & Amaral, 2001 | SP | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 2001 |
| 9 | Terebellidae | <i>Morgana</i> | <i>bisetosa</i> | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 9 | Terebellidae | <i>Neoamphitrite</i> | <i>variabilis</i> | (Risso, 1826) | SP | A, L | 50 - 90m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Neoamphitrite</i> | <i>variabilis</i> | (Risso, 1826) | PR | L | 90m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>ceciliae</i> | Santos et al., 2010 | RN | | | Santos et al., 2010 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Ubatuba | | 6 - 24m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Caraguatatuba | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Guarujá | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Itanhaém | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Peruíbe | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, S. Sebastião | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, S. Vicente | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Santos | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Ubatuba | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Caraguatatuba | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, S. Sebastião | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, Ubatuba | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, S. Vicente | | entre; costão | Garraffoni & Amaral, 2007 |
| 9 | Terebellidae | <i>Nicolea</i> | <i>uspiana</i> | (Nogueira, 2003) | SP, S. Vicente | | entre | Garraffoni & Amaral, 2009 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 9 | Terebellidae | <i>Odysseus</i> | <i>virgini</i> | | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 9 | Terebellidae | <i>Paraeupolymnia</i> | <i>uspiana</i> | Nogueira, 2003 | SP, Caraguatatuba | | costão; fauna associada | Nogueira, 2003 |
| 9 | Terebellidae | <i>Paraeupolymnia</i> | <i>uspiana</i> | Nogueira, 2003 | SP, S. Vicente | | costão; fauna associada | Nogueira, 2003 |
| 9 | Terebellidae | <i>Paraeupolymnia</i> | <i>uspiana</i> | Nogueira, 2003 | SP, Ubatuba | | costão; fauna associada | Nogueira, 2003 |
| 9 | Terebellidae | <i>Paraeupolymnia</i> | <i>uspiana</i> | Nogueira, 2003 | SP, S. Sebastião | | fauna associada | Nogueira, 2003 |
| 9 | Terebellidae | <i>Phisidia</i> | <i>rubra</i> | Nogueira & Alves, 2006 | SP, Caraguatatuba | | costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Phisidia</i> | <i>rubra</i> | Nogueira & Alves, 2006 | SP, S. Sebastião | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>aloncae</i> | Santos et al., 2010 | RN | | | Santos et al., 2010 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>americanus</i> | | Brasil | | Otanes | REMOVER HARTMAN |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, Caraguatatuba | | 11 - 25m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | RJ | | 110 - 147m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | | 25 - 39m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP | | 99 - 157m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, Santos | | costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, Caraguatatuba | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, Ubatuba | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SC | A, L | 37 - 51m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | PR | A, L | 49 - 51m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | PR | AL, C | 18m; estuário | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP | A, L | 8 - 20m; estuário | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>corrientis</i> | McIntosh, 1885 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cretacea</i> | (Grube, 1860) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | RJ | | 100 - 147m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | RS | | 100m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | SP | | 90 - 505m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | SC | A, L | 37 - 51m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | SP | A, L | 40 - 60m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | PR, Paranaguá | A, L, OS | 6m; estuário | Lana, 1986b |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | AL | L, OS | 100m | Nonato & Luna, 1970a |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | BA | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | RJ | | entre | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>cristata</i> | (Müller, 1776) | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>herpini</i> | Fauvel, 1928 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>herpini</i> | Fauvel, 1928 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>herpini</i> | Fauvel, 1928 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Pista</i> | <i>herpini</i> | Fauvel, 1928 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 9 | Terebellidae | Pista | herpini | Fauvel, 1928 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Pista | herpini | Fauvel, 1928 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Terebellidae | Pista | herpini | Fauvel, 1928 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Pista | herpini | Fauvel, 1928 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Pista | herpini | Fauvel, 1928 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 35m | Morgado, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Pista | herpini | Fauvel, 1928 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Terebellidae | Pista | herpini | Fauvel, 1928 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | clavatus | | Brasil | | Cyaxares | REMOVER HARTMAN |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | coccineus | Grube, 1870 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | coccineus | Grube, 1870 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | hamiltoni | Benham, 1921 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | hamiltoni | Benham, 1921 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | hamiltoni | Benham, 1921 | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | hamiltoni | Benham, 1921 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | hamiltoni | Benham, 1921 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | hamiltoni | Benham, 1921 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SP, Ubatuba | L | 35m | Morgado, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | plumosus | (Wolleback, 1912) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | tenuisetis | Langerhans, 1880 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Terebellidae | Polycirrus | tenuisetis | Langerhans, 1880 | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Pseudostreblosoma | brevitentaculatum | Nogueira & Alves, 2006 | SP, S. Sebastião | | 15 - 34m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Pseudostreblosoma | brevitentaculatum | Nogueira & Alves, 2006 | SP, Ubatuba | | 9 - 45m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | infra | Lana, 1981 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 45m | Morgado, 1988 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | AL | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP | | 15 - 46m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | SP | A, L | 18; 47m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | bairdi | (Malmgren, 1866) | RJ | | | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | oligobranchiata | | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | oligobranchiatum | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, Caraguatatuba | | 25 - 26m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | oligobranchiatum | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, S. Sebastião | | 25m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | oligobranchiatum | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, Ubatuba | | 35 - 44m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | oligobranchiatum | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, Caraguatatuba | | costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | oligobranchiatum | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, S. Sebastião | | costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | Streblosoma | oligobranchiatum | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, Ubatuba | | costão | Alves, 2008 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>oligobranchiatum</i> | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, S. Sebastião | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>oligobranchiatum</i> | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, Caraguatatuba | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>oligobranchiatum</i> | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, S. Sebastião | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>oligobranchiatum</i> | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, Ubatuba | | fauna associada | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>oligobranchiatum</i> | Nogueira & Amaral, 2001 | SP | | fauna associada | Nogueira & Amaral, 2001 |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>oligobranchiatum</i> | Nogueira & Amaral, 2001 | SP, S. Sebastião | | costão | Nogueira et al., 2004c |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>patriciae</i> | Santos et al., 2010 | RN | | | Santos et al., 2010 |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>porchatensis</i> | Nogueira, Garraffoni & Alves, 2004 | SP, S. Vicente | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>porchatensis</i> | Nogueira, Garraffoni & Alves, 2004 | SP, Santos | | entre; costão | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>porchatensis</i> | Nogueira, Garraffoni & Alves, 2004 | SP, S. Vicente | | costão | Nogueira et al., 2004c |
| 9 | Terebellidae | <i>Streblosoma</i> | <i>porchatensis</i> | Nogueira, Garraffoni & Alves, 2004 | SP, Santos | | costão | Nogueira et al., 2004c |
| 9 | Terebellidae | <i>Terebella</i> | <i>leslieae</i> | Santos et al., 2010 | RN | | | Santos et al., 2010 |
| 9 | Terebellidae | <i>Terebella</i> | <i>jucunda</i> | | Brasil | | Amphitrite | REMOVER HARTMAN |
| 9 | Terebellidae | <i>Terebella</i> | <i>pterochaeta</i> | Schmarda, 1861 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessio, 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Terebella</i> | <i>pterochaeta</i> | Schmarda, 1861 | SP, Ubatuba | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 9 | Terebellidae | <i>Terebella</i> | <i>pterochaeta</i> | Schmarda, 1861 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | <i>Terebella</i> | <i>pterochaeta</i> | Schmarda, 1861 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | RJ | | 110m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Ubatuba | | 16 - 44m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Caraguatatuba | | 25 - 36m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, S. Sebastião | | 25 - 45m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP | | 99m | Alves, 2008 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | PR | A, L | 49 - 51m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP | A, L, C | 15 - 50m; estuário | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | PR | AL, C | 18m; estuário | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, I. S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP | | 20 - 40m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP | A, L, C, OS | 18 - 132m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | RJ | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP | | entre | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | NE | | | Santos, 2006 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 9 | Terebellidae | <i>Thelepus</i> | <i>setosus</i> | (Quatrefages, 1865) | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Octobranchus</i> | <i>longipes</i> | Blankensteyn & Lana, 1987 | PR | A, AL | 32 - 50m | Blankensteyn & Lana, 1987 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Octobranchus</i> | <i>longipes</i> | Blankensteyn & Lana, 1987 | SC | A, AL | 32 - 50m | Blankensteyn & Lana, 1987 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Octobranchus</i> | <i>longipes</i> | Blankensteyn & Lana, 1987 | SP | A, AL | 32 - 50m | Blankensteyn & Lana, 1987 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Octobranchus</i> | <i>longipes</i> | Blankensteyn & Lana, 1987 | SP | A, AL | 30 - 60m | Blankensteyn, 1988 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|---|------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | | 5 - 8m | Alves, 2008 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | 6 - 46m | Alves, 2008 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | Brasil | | | Amaral et al., 1998a |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SC | A, L | 38, 50m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | PR | AF, AMF, L, AL, C | 12 - 18m; estuário | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP | A, L, C | 8 - 80m; estuário | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | A, L | 16m; estuário | Lana, 1986b |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SE | A, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AL | entre | Nonato, 1981 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Litoral norte | AL | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | Brasil | | T. klemani | REMOVER HARTMAN |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | PR, B. de Paranaguá | | 10 - 35m | Solis-Weiss et al., 1991 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | anguicomus | Müller, 1858 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | koreni | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | koreni | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 9 | Trichobranchidae | Terebellides | koreni | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>koreni</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>koreni</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>lanai</i> | Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 | RS | | 100m | Alves, 2008 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>lanai</i> | Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 | SP, Ubatuba | | 16 - 45m | Alves, 2008 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>lanai</i> | Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 | SP, S. Sebastião | | 19 - 34m | Alves, 2008 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>lanai</i> | Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 | SP, Caraguatatuba | | 25 - 45m | Alves, 2008 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>lanai</i> | Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 | RJ | | 93 - 325m | Alves, 2008 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>lanai</i> | Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>lanai</i> | Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 | PR, B. de Paranaguá | | 45 - 50m | Solis-Weiss et al., 1991 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>sepultura</i> | Garrafoni & Lana, 2003 | RJ | | 147 - 275m | Alves, 2008 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 35m | Morgado, 1988 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Terebellides</i> | <i>stroemi</i> | Sars, 1835 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Trichobranchus</i> | <i>lobiungens</i> | Hessle, 1917 | SP | A, L | 70 - 120m | Blankensteyn, 1988 |
| 9 | Trichobranchidae | <i>Trichobranchus</i> | <i>lobiungens</i> | Hessle, 1917 | RS | L | 80m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 10 | Apistobranchidae | <i>Apistobranchus</i> | <i>typicus</i> | (Webster & Benedict, 1887) | RJ, B. de Campos | | 700 - 2000m | Barroso & Paiva, 2009 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>pergamentaceus</i> | Hansen, 1882 | PR | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>pergamentaceus</i> | Hansen, 1882 | RJ | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>pergamentaceus</i> | Hansen, 1882 | RS | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>pergamentaceus</i> | Hansen, 1882 | SC | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>pergamentaceus</i> | Hansen, 1882 | SP | | 6 - 90m | Hansen, 1882 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>pergamentascus</i> | Hansen, 1882 | SP, S. Sebastião | | entre | Luederwaldt, 1929 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | RJ, Macaé | | 10 - 30m | Araújo et al., 2009 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, I. S. Sebastião | | entre; C. <i>pergamentaceus</i> | Luederwaldt, 1929 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, Ubatuba | L | 10m | Morgado, 1988 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP | | infra; endofauna | Nogueira, 1995 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, Ubatuba | AL | entre | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | PR | | entre | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | RJ | | entre | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | PR | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, I. S. Sebastião | | entre | Treadwell, 1932 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 10 | Chaetopteridae | <i>Chaetopterus</i> | <i>variopedatus</i> | (Renier, 1804) | SP, Ubatuba | AL | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Phyllochaetopterus</i> | <i>socialis</i> | Claparède, 1870 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Phyllochaetopterus</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1863 | AL | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Phyllochaetopterus</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1863 | SE | L, OS | 21 - 50m | Nonato & Luna, 1970a |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Phyllochaetopterus</i> | <i>gracilis</i> | Grube, 1863 | BA | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Phyllochaetopterus</i> | <i>socialis</i> | Claparède, 1870 | SP | A, L | 21 - 46m | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | PR, Paranaguá | A, L, OS | 5, 6, 13m; estuário | Lana, 1986b |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 2000 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Santos | AL, C | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | AL, C | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Litoral norte | | infra | Paiva, 1993a |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | Brasil | | | Petti & Nonato, 1998 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>nonatoi</i> | Bahud & Petti, 2001 | RJ, B. de Sepetiba | L | infra | Omena et al., 2006a |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>nonatoi</i> | Bahud & Petti, 2001 | RJ, B. de Sepetiba | L | infra | Omena et al., 2006b |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>nonatoi</i> | Bahud & Petti, 2001 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>nonatoi</i> | Baud & Petti, 2001 | PR | | | Baud & Petti, 2001 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>nonatoi</i> | Baud & Petti, 2001 | RJ | | | Baud & Petti, 2001 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>nonatoi</i> | Baud & Petti, 2001 | SP | | | Baud & Petti, 2001 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Spiochaetopterus</i> | <i>typicus</i> | Sars, 1856 | RJ | | infra | Rullier & Amoureux, 1979 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Thelepsavus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Thelepsavus</i> | <i>costarum</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Telepsavus</i> | <i>costarum</i> | Claparède, 1870 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 10 | Chaetopteridae | <i>Telepsavus</i> | <i>costarum</i> | Claparède, 1870 | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 10 | Heterospionidae | <i>Heterospio</i> | <i>longissima</i> | Hartman, 1965 | Brasil | | | Bolívar, 1990 |
| 10 | Heterospionidae | <i>Heterospio</i> | <i>longissima</i> | Hartman, 1965 | SP | | 25 - 100m | Bolívar, 1990 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>crenulata</i> | Bolívar & Lana, 1986 | PR | AF, AMF | 10m | Bolívar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>crenulata</i> | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>crenulata</i> | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>crenulata</i> | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>crenulata</i> | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>crenulata</i> | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>nonatoi</i> | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>nonatoi</i> | Bolívar & Lana, 1986 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>nonatoi</i> | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>nonatoi</i> | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L, C | 3 - 5m | Bolívar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | <i>Magelona</i> | <i>nonatoi</i> | Bolívar & Lana, 1986 | RJ | A, L, OS | 3 - 25m | Bolívar & Lana, 1986 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>nonatoi</i> | Bolivar & Lana, 1986 | PR, B. de Paranaguá | | fauna associada | Sordo & Lana, 2007 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | PR | A, L, AL, OS | 1 - 17m | Bolivar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L, AL, C | 3 - 5m | Bolivar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | RJ | A, AL, OS | 4 - 17m | Bolivar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | PR | | infra | Bolivar & Lana, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | PR | A, L, AL, OS | 1 - 17m; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 1998 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | PR | | | Brasil, 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | RJ | | | Brasil, 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SC | | | Brasil, 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | A, AM, L, OS | 3 - 17m; estuário | Lana, 1986b |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | 2 - 29m | Pires-Vanin et al., 2006 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, I. S. Sebastião | AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Reis, 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SP, S. Sebastião | | entre | Santos et al., 1994 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | SE | | | |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>papillicornis</i> | Müller, 1858 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | PR | L, AL, OS | 2 - 17m | Bolivar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | PR | | infra | Bolivar & Lana, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | PR | A, L, OS | 2, 5, 13m; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>posterelongata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | RJ | A, OS | 23m | Bolívar & Lana, 1986b |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | PR | | entre | Bolívar & Lana, 1986b |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | PR | | 0 - 10m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | PR | | entre | Bolívar, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | PR | | | Brasil, 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | RJ | | | Brasil, 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>riojai</i> | Jones, 1963 | PR | AF, AMF | 0 - 2m | Souza, 1991 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AM, L | 3 - 5m | Bolivar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | PR | L, AL, OS | 3 - 17m | Bolivar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | A, AF, AMF, L, OS | 3 - 80m | Bolivar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | RJ | AF, AMF, L, OS | 4 - 34m | Bolivar & Lana, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SC | | 20 - 50m | Bolivar & Lana, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP | | 50m | Bolivar & Lana, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | PR | | 50m; estuário | Bolivar & Lana, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SP | AF, AMF, L, OS | 47, 56m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | <i>variolamellata</i> | Bolivar & Lana, 1986 | SC | L, AL | 48, 80m | Bolívar, 1986 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | PR | AL | 50m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | PR | A, L, AL, OS | 3 - 17m; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | PR, B. de Paranaguá | | | Brasil et al., 2006 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | PR, Paranaguá | A, AM, AF, AMF, L, OS | 6 - 17 m; estuário | Lana, 1986b |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 15 - 50m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 15 - 50m | Morgado, 1988 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 10 | Magelonidae | Magelona | variolamellata | Bolívar & Lana, 1986 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | infra | Lana, 1981 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | PR, Paranaguá | A, AF, AMF, L | 3, 6, 15,5m; estuário | Lana, 1986b |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 25m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 25m | Morgado, 1988 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | A, L | 0 - 5m | Nonato, 1963 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | PR | | plâncton | Nonato, 1963 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | RS | | plâncton | Nonato, 1963 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SC | | plâncton | Nonato, 1963 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | RS | | infra | Nonato, 1973 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | AL | 100m | Nonato, 1981 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Santos | AL | entre | Nonato, 1981 |
| 10 | Poecilochaetidae | Poecilochaetus | australis | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | AL | entre | Nonato, 1981 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | RJ | | entre | Nonato, 1981 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | RJ, B. de Guanabara | | infra | Santi et al., 2006 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>australis</i> | Nonato, 1963 | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>perequensis</i> | Santos & Mackie, 2008 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>perequensis</i> | Santos & Mackie, 2008 | PR, B. de Paranaguá | | | Santos & Mackie, 2006 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>perequensis</i> | Santos & Mackie, 2008 | PR, B. de Paranaguá | | | Santos & Mackie, 2008 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>polycirratus</i> | Santos & Mackie, 2008 | PR, B. de Paranaguá | | | Santos & Mackie, 2006 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>polycirratus</i> | Santos & Mackie, 2008 | PR, B. de Paranaguá | | | Santos & Mackie, 2008 |
| 10 | Poecilochaetidae | <i>Poecilochaetus</i> | <i>serpens</i> | Allen, 1904 | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Aonides</i> | <i>oxycephala</i> | (Sars, 1862) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 10 | Spionidae | <i>Aonides</i> | <i>paucibranchiata</i> | Southern, 1914 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Aonides</i> | <i>paucibranchiata</i> | Southern, 1914 | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Aonides</i> | <i>paucibranchiata</i> | Southern, 1914 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Apopriionospio</i> | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 10 | Spionidae | <i>Apopriionospio</i> | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Spionidae | <i>Apopriionospio</i> | <i>pygmaea</i> | (Hartman, 1961) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Apopriionospio</i> | <i>pygmaea</i> | Foster, 1971 | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>polybranchia</i> | (Haswell, 1885) | RJ | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>polybranchia</i> | (Haswell, 1885) | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>polybranchia</i> | (Haswell, 1885) | SP, Ubatuba | A | 4 - 19m | Quintana, 2008 |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>polybranchia</i> | (Haswell, 1885) | Brasil | | | Perialla claparedei REMOVER HARTMAN |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>redeki</i> | Okuda, 1937 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>redeki</i> | (Horst, 1920) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte & Nalessso, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>redeki</i> | (Horst, 1920) | SP, S. Sebastião | | 0 - 3m; endofauna | Duarte, 1980 |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>redeki</i> | (Horst, 1920) | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>redeki</i> | (Horst, 1920) | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>redeki</i> | Okuda, 1937 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>redeki</i> | Okuda, 1937 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>redeki</i> | Okuda, 1937 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Boccardia</i> | <i>uncata</i> | Berkeley, 1927 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 10 | Spionidae | <i>Dipolydora</i> | <i>armata</i> | (Langerhans, 1881) | Brasil, Sudeste | | | Björnberg & Radashevsky, 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Dipolydora</i> | <i>armata</i> | (Langerhans, 1881) | Brasil, Sul | | | Björnberg & Radashevsky, 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Dipolydora</i> | <i>armata</i> | (Langerhans, 1881) | SP, S. Sebastião | | | Björnberg & Radashevsky, 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Dipolydora</i> | <i>armata</i> | (Langerhans, 1880) | SP, Laje de Santos | | 5 - 6m; fauna associada | Radashevsky & Nogueira, 2003 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 10 | Spionidae | Dipolydora | armata | (Langerhans, 1880) | SP, I. de Alcatrazes | | 5 - 6m; fauna associada | Radashevsky & Nogueira, 2003 |
| 10 | Spionidae | Dipolydora | socialis | (Schmarda, 1861) | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | Dipolydora | tridentata | | SP, I. de Alcatrazes | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 10 | Spionidae | Dipolydora | tridentata | | SP, S. Sebastião | | fauna associada | Nogueira, 2000 |
| 10 | Spionidae | Dispio | magna | (Day, 1955) | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF | 30m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, Caraguatatuba | AM, AF, AMF | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, Ubatuba | | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | | entre | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | | 0 - 20m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | | entre | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | AM, AF, AMF | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | AM, AF, AMF | entre | Borzone et al., prelo |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 4 - 8m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Shimizu, 1991 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário | Souza & Giana, 1995 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | AF, AMF | 0 - 2m | Souza, 1991 |
| 10 | Spionidae | Dispio | remanei | Friedrich, 1956 | PR | AF, AMF | entre | Souza, 1991 |
| 10 | Spionidae | Dispio | uncinata | Hartman, 1951 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 10 | Spionidae | Dispio | uncinata | Hartman, 1951 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Spionidae | Dispio | uncinata | Hartman, 1951 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Spionidae | Dispio | uncinata | Hartman, 1951 | SP, Santos | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 10 | Spionidae | Dispio | uncinata | Hartman, 1951 | SP, S. Vicente | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 10 | Spionidae | Dispio | uncinata | Hartman, 1951 | SP, Santos | AF, AMF | entre | Monteiro, 1980 |
| 10 | Spionidae | Dispio | uncinata | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 10 | Spionidae | Dispio | uncinata | Hartman, 1951 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 10 | Spionidae | Laonice | antarcticae | Hartman, 1953 | Brasil | | | Radashevsky & Lana, 2007 |
| 10 | Spionidae | Laonice | branchiata | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 10 | Spionidae | Laonice | branchiata | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Laonice | branchiata | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Laonice | branchiata | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | PR | AL | 15 - 37m; plataforma | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SC | | 20 - 50m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | PR | | infra; estuário | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SC | AF, AMF, AL | 37m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | PR | AL | 15m; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AM, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | PR, Paranaguá | A, L, OS | 16, 18m; estuário | Lana, 1986b |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 10 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | L | 10 - 35m | Morgado, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | | 0 - 5m | Nonato et al., 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | PR | A, AF, AMF, L | 15, 33, 37m | Nonato et al., 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | RJ | | infra | Nonato et al., 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Cananéia | AL | 100m | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Santos | AL | 100m | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AL | 100m | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Cananéia | AL | entre | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Santos | AL | entre | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AL | entre | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | RJ, B. de Sepetiba | A | infra | Omena et al., 2006a |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>branchiata</i> | Nonato, Bolívar & Lana, 1986 | Brasil | | | Radashevsky & Lana, 2007 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1851) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | PR | AF, AMF, L | 5 - 68m; plataforma | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | SC | | 20 - 70m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | SP | | 20 - 80m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | PR | | 50m; estuário | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | SP | AF, AMF, L, AL | 32 - 68m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | SC | AF, AMF, L, AL | 37, 48m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | PR | L, AL | 50m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | PR | A, L, AL, OS | 5, 10m; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | SP, Ubatuba | AM, L | 10 - 50m | Morgado, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Laonice</i> | <i>cirrata</i> | (Sars, 1850) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | RS | L | 80m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | RJ | L | 102m; plataforma externa | Revizee |
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | SP | A | 18m | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 10 | Spionidae | Laonice | cirrata | (Sars, 1850) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Spionidae | Laonice | japonica | (Moore, 1907) | SP, Ubatuba | A, L | 2 - 60m | Forneris, 1969 |
| 10 | Spionidae | Laonice | japonica | (Moore, 1907) | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 10 | Spionidae | Laonice | japonica | (Moore, 1907) | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 10 | Spionidae | Laonice | weddellia | Hartman, 1978 | Brasil | | | Radashevsky & Lana, 2007 |
| 10 | Spionidae | Malacocerus | indicus | (Fauvel, 1928) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | Malacoceros | indicus | (Fauvel, 1928) | RJ | L | 100m; plataforma externa | Revizee |
| 10 | Spionidae | Malacoceros | vanderhorsti | (Augener, 1927) | SP, Ubatuba | L | 20m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | Malacoceros | vanderhorsti | (Augener, 1927) | SE | | | Santos et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Mandane | brevicornis | | Brasil | | | REMOVER HARTMAN |
| 10 | Spionidae | Marenzelleria | viridis | (Bochert, 1997) | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | PR | L | 33 - 50m | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | SC | | 20 - 50m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | PR | | 50m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | SC | A, AL, OS | 33m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | PR | L, AL | 50m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Microspio | pigmentata | (Reish, 1959) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Minuspio | cirrifera | (Würen, 1883) | RJ | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | Minuspio | cirrifera | (Würen, 1883) | RJ | L | 93m; plataforma externa | Revizee |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | africana | (Augener, 1918) | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | africana | (Augener, 1918) | SP, Cananéia | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | africana | (Augener, 1918) | SP, Santos | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | africana | (Augener, 1918) | SP, Ubatuba | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SC | | infra | Almeida et al., 2009 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral & Migotto, 1980 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | L | 10 - 50m | Amaral et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | Brasil | | | Amaral et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | Brasil | | | Amaral et al., 1998a |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m; Prionospio | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SP, Caraguatatuba | | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | PR | AF, AMF, L e AL | 32 - 80m; plataforma | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SC | | 20 - 100m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | SP | | 20 - 100m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | Parapriionospio | pinnata | (Ehlers, 1901) | PR | | 0 - 50m; estuário | Bolívar & Lana, 1988 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP | A, AF, AMF, L, AL | 32 - 68m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SC | L, AL | 37 - 85m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | PR | AL | 50m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | PR | L | 3m; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | RS | AF, AMF, L | 3 - 10m | Borzone, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m; Prionospio | Forneris, 1969 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | RS | | infra | Kawakami & Amaral, 1983 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 10 - 35m | Morgado, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP | | 16 - 75m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | RJ | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | | | Petti & Nonato, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | RJ | L | 100 - 103m | Revizee |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Shimizu, 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 10 | Spionidae | <i>Parapriionospio</i> | <i>pinnata</i> | (Ehlers, 1901) | SP, Cananéia | AF, AMF | 1 - 80m; estuário | Tommasi, 1970 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>ciliata</i> | Busch, 1802 | RJ | | plâncton | Machado, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>cornuta</i> | Bosc, 1802 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>cornuta</i> | Bosc, 1802 | SP, Caraguatatuba | | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>cornuta</i> | Bosc, 1802 | SP, Ubatuba | | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>cornuta</i> | Bosc, 1802 | Brasil | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>hopxtusa</i> | Claparède, 1870 | RJ | | infra | Rullier & Amoureaux, 1979 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>ligni</i> | Webster, 1879 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>neocaeca</i> | Williams & Radashevsky, 1999 | SP, Caraguatatuba | L | entre; fauna associada | Daolio et al., 2007 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>neocaeca</i> | Williams & Radashevsky, 1999 | SP, Caraguatatuba | L | entre; fauna associada | Daolio et al., 2009 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>neocaeca</i> | Williams & Radashevsky, 1999 | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>nuchalis</i> | Woodwick, 1953 | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>nuchalis</i> | Woodwick, 1953 | SP, Baixa Santista | | estuário | Rizzo et al., 2007b |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | PR | AL | 6 - 15,5m | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | PR | | infra; estuário | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | PR | A, L, OS | 6 - 16 m; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário; Spartina | Lana & Guiss, 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | PR, Paranaguá | A, L, OS | 6m; estuário | Lana, 1986b |
| 10 | Spionidae | <i>Polydora</i> | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | SP | | 18 - 76m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>socialis</i> | (Schmarda, 1861) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | PR | | 0,5m | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | PR | | infra; estuário | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | PR | | infra; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | RJ | AM | infra | Carvalheira, 1993 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | RJ, Sepetiba | L | entre | Irving, 1991 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | PR, Paranaguá | A, C | 10m; estuário | Lana, 1986b |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, S. Sebastião | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, Ubatuba | | franja, infra; endofauna | Morgado, 1980 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | PR, Paranaguá | AL | entre; estuário | Netto & Lana, 1995 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | | Pardo, 1995 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, S. Sebastião | | | Reis et al., 2000 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, S. Sebastião | A e AM | | Reis, 1995 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM | | Reis, 1995 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, S. Sebastião | | | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, S. Sebastião | | | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, S. Sebastião | | | Rizzo, 1998 |
| 10 | Spionidae | Polydora | <i>websteri</i> | Hartman, 1943 | SP, Ubatuba | | entre; endofauna | Souza, 1989 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>cirrifera</i> | Wirén, 1883 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>cirrifera</i> | Wirén, 1883 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>cristata</i> | Foster, 1971 | RJ, B. de Sepetiba | A | infra | Omena et al., 2006a |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | PR | AF, AMF | 18 - 25m | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | PR | | 20m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | PR | AF, AMF, OS | 18 - 25m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP | AF, AMF, OS | 20m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dayi</i> | Foster, 1969 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dubia</i> | Day, 1961 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dubia</i> | Day, 1961 | RJ | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dubia</i> | Day, 1961 | SE | | | Revizee |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>dubia</i> | Day, 1961 | PR | AL | 147 - 257m; plataforma externa | Santos et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | Prionospio | <i>ehlersi</i> | Fauvel, 1928 | | | 136m; plataforma | Bolívar & Lana, 1987 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>ehlersi</i> | Fauvel, 1928 | PR | | 100 - 200m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>ehlersi</i> | Fauvel, 1928 | PR | A, L | 136m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>ehlersi</i> | Fauvel, 1928 | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>ehlersi</i> | Fauvel, 1928 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | PR, Paranaguá | AL | estuário | Netto & Lana, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | RJ | | fauna associada | Omena & Neves, 2001 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>heterobranchia</i> | Moore, 1907 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>malmgreni</i> | Claparède, 1870 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m | Abreu, 1978 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>malmgreni</i> | Claparède, 1870 | SP, Ubatuba | A | entre | Amaral, 1975; 1979 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>malmgreni</i> | Claparède, 1870 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>malmgreni</i> | Claparède, 1870 | SP, Ubatuba | AM, L | 25 - 45m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>malmgreni</i> | Claparède, 1870 | SP, Ubatuba | AM, L | 25 - 45m | Morgado, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>malmgreni</i> | Claparède, 1870 | SP, Santos | | infra | Tommasi, 1979 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | AMG | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | PR | AL | 50m; plataforma | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SC | | 50m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | PR | AL | 50m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 4 - 30m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP | | 35 - 101m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | RJ | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | RJ | L | 99 – 435m; plataforma externa | Revizee |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | SP | L | 99 – 435m; plataforma externa | Revizee |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio</i> | <i>steenstrupi</i> | Malmgren, 1867 | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio (Minuspio)</i> | <i>cirrifera</i> | Light, 1978 | RJ, Ilha Grande | | | Brasil & Silva, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Prionospio (Minuspio)</i> | <i>cirrifera</i> | Wirén, 1883 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Pseudopolydora</i> | <i>diopatra</i> | Hsieh, 1992 | RJ, Macaé | | 10 - 30m | Araújo et al., 2009 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>chilensis</i> | (Hartmann-Schröder, 1962) | SP, Caraguatatuba | | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>chilensis</i> | (Hartmann-Schröder, 1962) | SP, S. Sebastião | | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>chilensis</i> | (Hartmann-Schröder, 1962) | SP, Ubatuba | | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>chilensis</i> | (Hartmann-Schröder, 1862) | Brasil | | | MacCord et al., 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>chilensis</i> | | SP, S. Sebastião | | entre | MacCord & Amaral, 2005b |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>chilensis</i> | (Hartmann-Schröder, 1962) | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>gaucha</i> | (Orensanz & Gianuca, 1974) | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>gaucha</i> | (Orensanz & Gianuca, 1974) | Brasil | | | MacCord et al., 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>gaucha</i> | (Orensanz & Gianuca, 1974) | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>gaucha</i> | (Orensanz & Gianuca, 1974) | RS | | infra | Santos, 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>gaucha</i> | (Orensanz & Gianuca, 1974) | RS | | infra | Santos, 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>gaucha</i> | (Orensanz & Gianuca, 1974) | RS | | infra | Santos, 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>gaucha</i> | (Orensanz & Gianuca, 1974) | RS | AF, AMF | 0 - 6m | Soares, 1992 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>goodbodyi</i> | (Jones, 1962) | PR, B. de Paranaguá | A | entre | Brauko et al., 2009 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>goodbodyi</i> | (Jones, 1962) | SP, Guarujá | | entre | Kamada & Shimizu, 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>goodbodyi</i> | (Jones, 1962) | SP, S. Sebastião | | entre | MacCord & Amaral, 2005b |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>goodbodyi</i> | (Jones, 1962) | SP, S. Sebastião | A | entre | MacCord & Amaral, 2007 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>goodbodyi</i> | (Jones, 1962) | Brasil | | | MacCord et al., 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 5 - 15m; Nerine agilis | Abreu, 1978 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 2003 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | Brasil | | | MacCord et al., 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, Caraguatatuba | AMG, AM, AF, AMF | entre | Amaral et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, I. S. Sebastião | AM | entre | Amaral et al., 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, Caraguatatuba | | entre | Amaral et al., 1998a |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Amaral et al., 1998a |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | Brasil | | | Amaral et al., 1998a |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, Ubatuba | A | entre; Nerine agilis | Amaral, 1975; 1979 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m; Nerine agilis | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | PR | | até 3m | Barros, 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | PR | | entre | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | PR | | 0 - 10m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | PR | | entre | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | PR | | entre | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | PR | AM, AF, AMF | 0 - 2m | Borzone et al., prelo |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | PR | AM, AF, AMF | entre | Borzone et al., prelo |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, Bertioga | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, I. Sto. Amaro | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | <i>squamata</i> | (Müller, 1806) | SP, Santos | AF, AMF | entre; estuário | Corbisier, 1981; 1991 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, Ubatuba | AMG, AM, AF, AMF | 0 - 5m; Halodule | Corbisier, 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Vicente | AF, AMF | entre; Nerine agilis | Monteiro, 1980 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, Santos | AF, AMF | entre; Nerine agilis | Monteiro, 1980 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Morgado et al., 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AF, AMF | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Morgado et al., 1994 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena & Amaral, 2003 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, Caraguatatuba | | entre | Omena, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Omena, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Pardo, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Reis et al., 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, I. S. Sebastião | AMG, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | A, AM, AF, AMF | entre | Reis, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001a |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo & Amaral, 2001b |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | | entre | Rizzo, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Shimizu, 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | PR | | entre | Souza & Borzone, 2000 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | PR, Paranaguá | AF, AMF | entre; estuário | Souza & Gianuca, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | PR | AF, AMF | entre | Souza, 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | squamata | (Müller, 1806) | SP, Santos | | Nerine agilis | Tommasi, 1979 |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | texana | Foster, 1971 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | texana | Foster, 1971 | SP, Caraguatatuba | AM | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | <i>Scolelepis</i> | texana | Foster, 1971 | RJ | L | 147m; plataforma externa | Revizee |
| 10 | Spionidae | <i>Spio</i> | quadrisetosa | Blake, 1983 | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Spio</i> | gaucha | Orensanz & Gianuca, 1974 | Brasil, Sul | AF, AMF | entre | Amaral & Morgado, 1998 |
| 10 | Spionidae | <i>Spio (Microspio)</i> | gaucha | Orensanz & Gianuca, 1974 | RS | | infra | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 10 | Spionidae | <i>Spio (Spiop)</i> | pettiboneae | Foster, 1971 | SP, Ubatuba | A, L | 1 - 2m | Amaral, 1977b; 1980a |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | berkeleyorum | Pettibone, 1962 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | berkeleyorum | (Pettibone, 1962) | RJ | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | berkeleyorum | (Pettibone, 1962) | RJ | L | 100 - 435m; plataforma externa | Revizee |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | bombyx | (Claparède, 1870) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | bombyx | (Claparède, 1870) | RJ | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | bombyx | (Claparède, 1870) | RJ, B. de Guanabara | | | Santi, 2008 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | bombyx | (Claparède, 1870) | PR | | 20m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | bombyx | (Claparède, 1870) | SP | | 20m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | bombyx | (Claparède, 1870) | PR | AF, AMF, OS | 20 - 25m | Bolívar, 1986 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>bombyx</i> | (Claparède, 1870) | SP | A, L | 33m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>bombyx</i> | (Claparède, 1870) | SP, Ubatuba | AF, AMF | 4 - 8m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>bombyx</i> | (Claparède, 1870) | SP, S. Sebastião | A, AF, AMF | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>bombyx</i> | (Claparède, 1870) | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>bombyx</i> | (Claparède, 1870) | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>bombyx</i> | (Claparède, 1870) | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>bombyx</i> | (Claparède, 1870) | RJ | L | 100 - 147m; plataforma externa | Revizee |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>bombyx</i> | (Claparède, 1870) | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>duplex</i> | (Chamberlin, 1919) | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>duplex</i> | (Chamberlin, 1919) | SP, Caraguatatuba | AF, AMF | entre | Biota |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>duplex</i> | (Chamberlin, 1919) | RJ, Baía de Sepetiba | A | infra | Omena et al., 2006a |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>duplex</i> | (Chamberlin, 1919) | PR | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>duplex</i> | (Chamberlin, 1919) | RJ | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>duplex</i> | (Chamberlin, 1919) | SP | | | Pardo et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>filiornis</i> | | RJ | | fauna associada | Omena & Neves, 2001 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | Grube, 1860 | RJ | | infra | Amaral et al., 2004a |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | (Grube, 1860) | Brasil, Sudeste | | 79 - 1126m | Attolini, 2002 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | (Grube, 1860) | PR | AL | 50 - 68m; plataforma | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | (Grube, 1860) | SP | | 50 - 100m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | (Grube, 1860) | PR | | 50m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | (Grube, 1860) | PR | L, AL | 50m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | (Grube, 1860) | SP | AL | 68m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | (Grube, 1860) | SP | | plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>kroeyeri</i> | (Grube, 1860) | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | RJ, B. de Campos | AMG, AM, AF, AMF, L | 12 - 197m | Attolini, 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | PR | L, AL | 6 - 80m; plataforma | Bolívar & Lana, 1987 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SC | | 20 - 50m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP | | 20 - 80m | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | PR | | 0 - 50m; estuário | Bolívar & Lana, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SC | AF, AMF, L, AL, OS | 33 - 80m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | PR | L, AL, OS | 50 - 51m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP | L, AL | 60m | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | PR | | entre; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | PR | A, L, AL | 6m; estuário | Bolívar, 1986 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | A, L | 4 - 20m | Forneris, 1969 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | AMG, AF, AMF, L | 20 - 30m | Lana, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | PR, Paranaguá | A, L | 6m; estuário | Lana, 1986b |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, S. Sebastião | AF, AMF | entre | Lopes, 1993 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, S. Sebastião | AF, AMF, L | 10 - 45m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, S. Sebastião | | 8 - 40m | Maciel, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 35m | Morgado & Amaral, 1989 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | AF, AMF, L | 25 - 35m | Morgado, 1988 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | | 5 - 10m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | L | 5 - 11m | Muniz et al., 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | AL | 1 - 20m | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | RJ | | infra | Nonato, 1981 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP | | 16 - 117m; plataforma | Paiva, 1990 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Litoral norte | AF, AMF | 15 - 100m | Paiva, 1990; 1993a,b |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10m | Paiva, 1996 |

CATÁLOGO DAS ESPÉCIES DE ANELIDA POLYCHAETA DO BRASIL

A. Cecilia Z. Amaral; Silvana A. H. Nallin; Tatiana M. Steiner - 2010

| G | FAMÍLIA | GÊNERO | ESPÉCIE | AUTOR | OCORRÊNCIA | TIPO DE FUNDO | REGIÃO / PROFUNDIDADE | BIBLIOGRAFIA |
|----|-----------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | AF, AMF | infra | Paiva, 1996 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | BA, Ilhéus | AM, L | entre; estuário | Passos et al., 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, S. Sebastião | A, L | 8 - 40m | Pires-Vanin et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Ubatuba | AF, AMF | 10 - 100m | Pires-Vanin, 1995 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, S. Sebastião | | infra | Pires-Vanin, et al., 1997 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | PR, Paranaguá | AM | 14 - 19m; estuário | Sovierzoski, 1991 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>missionensis</i> | Hartman, 1941 | SP, Santos | A, L | 2 - 60m | Tommasi, 1967 |
| 10 | Spionidae | <i>Spiophanes</i> | <i>soederstroemi</i> | Hartman, 1953 | RS | L | 80m | Orensanz & Gianuca, 1974 |
| 10 | Spionidae | <i>Streblospio</i> | <i>benedicti</i> | Webster, 1879 | PE, Recife | L | estuário | Lima et al., 2006b |
| 10 | Spionidae | <i>Streblospio</i> | <i>benedicti</i> | Webster, 1879 | PE, Litoral Norte | | entre; estuário | Valença et al., 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Streblospio</i> | <i>benedicti</i> | Webster, 1879 | PE, Litoral Norte | | infra; estuário | Valença et al., 2006 |
| 10 | Spionidae | <i>Streblospio</i> | <i>benedicti</i> | Webster, 1879 | SP | | entre | Omena & Amaral, 2001 |